




Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
384/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
384/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
384/D



Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
384/D

A XXVIII. Avo

Pharmacie Centrale de Clichy


384 387

105, BOULEVARD NATIONAL (en face la Mairie)

Louis Debacq

PHARMACIEN-CHIMISTE DE 1^{re} CLASSE, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

*De H. M. C. in nam
Guldenen*



P R A C T I C A
 IOANNIS ARCVLANI
 VERONENSIS

PARTICVLARIVM MORBORVM OMNIVM,
 In qua partium corporis humani anatome, morbi, symptomata, causæ,
 ac signa, atq; omninò vniuersa medendi ratio, & remedia
 adeò apertè, & copiosè traduntur, vt nullum aliud
 opus medicinæ studiosis hoc vno
 esse videatur vtilius.

*Magna diligentia cum probatis exemplaribus collata, et plurimis locis emendata IOANNIS MARINELLI Formi-
 ginenfis Medici opera: cuius tum scholia in plurima, tum explicationes in quindecim Rasis
 capita ab Arculano prætermiffa eduntur.*

Instrumenta verò chirurgica, quæ in opere hic, illic ab Authore citantur,
 ea sunt ad finem secundi indicis depicta.

*Indices duo insunt: alter quidem rerum, ac vocum scitu dignarum locupletior, quàm antea:
 alter verò capitulorum operis totius.*



ex bibl. octavij Caracianij gen.

Venetiis, ex officina Valgrifiana.

M D LX.

THOMAE RAVENNATI

PHILOLOGO DOCTISS. AC CELEBERRIMO

ARTIVM, ATQVE MEDICINAE DOCTORI

Ioannes Marinellus Medicus.

s. d.



OMINEM diuinum opus esse idcirco arbitrati sunt Philosophi, quod naturæ iura ab intelligentia vulgari remotiora perspicit, eaq; imitatur. qui huius quidem æmulationis vtilitatem humanæ societati afferunt maiorem, ij in deorum immortalium numero habiti sunt, atq; culti. sed hominum generi maximo hi sapientes vsui fuerunt, qui, id quod sæpe natura solet, extremum vitæ diem, qui quasi saxum Tantalo semper impendit, alicui prodixerunt. hinc Aesculapium, Hippocratem, & Galenum non hominibus; sed dijs simillimos facimus: qui plus in nostris corporibus conseruandis, & ab interitu vindicandis valerent, quam natura non his curandis solum; sed & in conficiendis. horum vestigia multi homines, multaq; sæcula sunt persecuti: quæ alij consecuti sunt: alij in molestis, inanibus, operosiq; negocijs fuerunt impliciti. tutum autem, & portum tranquillum tenuit Auicenna, Mesue, & Rasis: præter hos plurimi Græci, & vtrorunque sectatores. ex quorum operibus perspicua, & illustris Ioannis Arculani Veronensis medici nobilissimi explanatio, quam in Nonum Rasis librum de re medica ad Almanforem scripsit, sine controuersia primas fert partes. optimè nosti hominem EXCELLENTISS. THOMAE: quem tum diuinis tuis scriptis, quæ vitalem, & salutarem spiritum animantibus, qui animo cernunt, & ratione intelligunt, præbent, augentq;: tum grâdi, ac plena voce; cum superioribus annis publicè interpretandi munus obieris, in florentissimo Gymnasio Romano, Bononienfi, ac Patauino cum tua summa laude, & omnium auditorum admiratione celebrasti. hæc autem acuta interpretatio, quæ artem medicam planè exprimit, ob temporis malignitatem adedò manca, atq; mutila in lucem edita est, vt parum absit, quin, omitto mortis pericula, quæ humano corpori parari poterant; sed corrupta tota, & omninò deperdita esset. tamen (annus iam agitur) cum hæc manuscripta mihi in manus peruenerit, atq; cum his, quæ impressæ sunt, eam contulerim: præterea cum emendatissimo Rasis textu; innumerabilia reperi errata, & correxi. his addebam scholia, quæ multa difficilia in Rasis explanabant: sed obitus carissimi, & humanissimi patris me dolore iustissimo ita affecit, vt multorū interpretationem nullam habuerimus. quòd, si dii adiuuabunt; aliàs me facturum esse polliceor. tamen id tantum mihi sumendum putavi Arculani explanationem illustriori, atq; splendidiori candore notari posse, quam antea: quæ à nonnullis hominibus rei medicæ ignaris neglecta, & derelicta fulgentior apparet. huic fortasse, quod multi desiderant, non inest latinitas illa, quæ sermonem purum conseruet ab omni vitio remotum: verum, quemadmodum formosam mulierem pulchriorem reddit plebeia purpura, ac penè fusca; ita huiusce operis latina modestia, sed doctissima tantam habet pulchritudinem, vt nulla species ne excogitari quidem possit ornatior. Galeni verò, Auicennæ optimorum medicorum, & illius Rasis, cuius laudes in omni orbis terrarum gymnasio videmus esse celebratas, sectam, atq; institutionem, quod & tu CELEBERRIME THOMA facis, persequitur. artem præterea nobis perfectam explicat: & contrà empiricam ab

* 2 optimo

optimo medico alienam esse docet. nō quærit Ioannes ille Arculanus rationes eas, quæ ex coniectura pendent: non litigiosas disputationes, quibus huc, & illuc trahimur: vn de nullam adhibent humani corporis curandi dignitatem: nam hæc magis ad dialecti cum, quàm ad medicum spectât. quapropter iure dici potest eum in tenebris, cœcisq; nubibus, & procellis esse constitutum, qui Arculanum magistrum non sequitur. cuius, vt dicunt, Præticam cum mihi esset propositum in lucem edere; quis præco immor tali voce publicasset, laborabam. tandem te vnum DOCTISSIME THOMA per spexi: cuius fama iam pridem omnes peragrat terras. nam cunctæ gentes sonos vocis, qui infiniti videntur, tua incredibili prudentia, iustitia, ac pietate terminant: nemo est enim, qui tuo fideli consilio vsus non sit: cui arte medica, qua alios præstas, non fa tisfeceris: quem deniq; cum egestas imperaret, & scientia, & opibus non iuueris. cla ra res est, celeberrima, atque notissima te magna, & excelsa sequi, & appetere: con trā humilia viris fortibus indigna contemnere, nec idoneas dignitate tua iudicare. in ditium verò est illud sacratissimum Palatium, quod literarum virtuti Paduæ senatus permissu cōsecrasti. vnde ærea effigies, & naturale simulachrum supra diui Iuliani ædis Venetæ portam est tibi collocatum, & ad posteritatis memoriam proditum. quare o ptimo iure, ac meritò librum tibi committere debemus, quem publices; vt æternum tuum præconium posteris nostris, quid agendum, quidq; fugiendum sit, indicet. igitur te CLARISSIME THOMA etiam, atq; etiam rogo, vt id à me accipias, & vir tuti dicas. dica quoq; paruum opusculum meum lucubratum his iam contractionibus noctibus: quod breuiter ea capita explanat, quæ peritissimus Ioannes Arculanus mor te præuentus inexplicata reliquit. & medicinæ studiosis hoc tantum polliceare me bre ui, si id gratum fore eis cognouero; Nonum Rasis librum latinitate donatum, & à me expositum, vt imprimatur, curaturum. Vale.

INDEX CAPITVM QVAE IN HOC LI- bro habentur.

1	D E cephalaa & hemicrania. pag. 3. columna. 2.	
2	De scotomia & vertigine	15. c. 2
3	De phrenesi	18. c. 1
4	De lethargio	23. c. 1
5	De apoplexia	25. c. 2
6	De subeth	29. c. 1
8	De congelatione	31. c. 1
9	De paralyfi	22. c. 2
10	De stupore & tremore	34. c. 2
11	De tortura oris	37. c. 2
12	De spafmo	38. c. 2
13	De tetano	40. c. 1
14	De epilepsia	42. c. 1
15	De incubo	49. c. 1
16	De melancholia	50. c. 1
17	De catarrho	58. c. 2
18	De ophthalmia	53. c. 1
19	De vlceribus oculorum	60. c. 1
20	De his quae in oculis cadunt	72. c. 1
21	De albedine oculorum	72. c. 2
21	De scabie & pruritu oculorum	73. c. 2
22	De febel	75. c. 1
23	De pruritu lachrymalium	77. c. 1
24	De vngula in oculo	77. c. 2
25	De artaphati sine fanguine effuso in oculo	79. c. 1
26	De lachrymis	80. c. 1
27	De debilitate uifus	82. c. 2
28	De apostemate seu tumore palpebrarum	92. c. 1
29	De difpofitione pilorum palpebrarum	93. c. 1
30	De aqua descendente in oculo	94. c. 2
31	De nyctilope	105. c. 1
32	De dilatatione pupillae	108. c. 2
33	De fistula lachrymali	112. c. 1
34	De paffionibus aurium	114. c. 1
35	De dolore auris	115. c. 1
36	De ulcere aurium & fanie	119. c. 1
37	De fonitu & tinnitu	122. c. 1
39	De grauedine diminutione seu ablatione auditus	125. c. 1
40	De vermibus & paruis animalib. aurium	127. c. 1
41	De his quae in aures extrinfecus cadunt	127. c. 2
42	De agritudinibus nafi	128. c. 2
43	De fluxu sanguinis narium	129. c. 1
44	De vlceribus narium	131. c. 2
45	De polypo & haemorrhoidibus	132. c. 2
46	De nocuentis olfactus	134. c. 2
47	De paffionibus dentium	136. c. 2
48	De dolore dentium	138. c. 1
49	De exedendis dentibus	148. c. 2
50	De congelatione & stupore dentium	141. c. 2
51	De anatomia oris	142. c. 1
52	De agritudinibus linguae	142. c. 2
53	De pustula linguae	143. c. 1
54	De exitu sanguinis gingiuarum	244. c. 2
55	De casu vuluae	145. c. 1
56	De sanguifugis quae bibuntur	147. c. 2
57	De his quae intrant guttur	158. c. 1

58	De paffionibus linguae	148. c. 2
59	De grauedine linguae	149. c. 1
60	De tumore linguae	151. c. 2
61	De ranula linguae	152. c. 1
62	De his quae nascuntur in lingua	192. c. 2
63	De anatomia gutturis	153. c. 1
64	De angina seu synanche	154. c. 1
65	De anatomia pectoris	157. c. 1
66	De tuffi	158. c. 1
67	De afthmate	162. c. 2
68	De pleurefi seu pleuritide	167. c. 1
69	De peripneumonia	177. c. 1
70	De empyemate	179. c. 1
71	De fputo sanguinis	182. c. 1
72	De phthifi & vlceribus pulmonis	183. c. 1
73	De paffionibus cordis	191. c. 2
74	De tremore cordis	196. c. 1
75	De syncopi	197. c. 2
76	De cura tremoris cordis, & syncope cura	203. c. 1
77	De anatomia ftomachi & mcri	205. c. 1
78	De vomitu	206. c. 1
79	De cholericæ paffione	212. c. 2
80	De nocumento digestionis	216. c. 1
81	De dolore ftomachi	221. c. 2
82	De apostemate ftomachi	227. c. 2
83	De vlceribus ftomachi	228. c. 2
84	De fingultu	231. c. 2
86	De appetitu	235. c. 1
87	De corruptione appetitus	238. c. 2
88	De appetitu canino	239. c. 1
89	De bulimo	241. c. 2
90	De fiti	242. c. 1
91	De anatomia hepatis	244. c. 2
92	De debilitate hepatis	246. c. 2
94	De oppilatione hepatis	250. c. 1
95	De apostemate hepatis	251. c. 2
96	De dubelati hepatis	253. c. 1
97	De dolore hepatis	256. c. 1
98	De icteritia	257. c. 2
99	De hydropifi	263. c. 2
100	De anat. fplenis & dolore fplenis. 271. c. 2. 273. c. 1	
	De oppilatione fplenis	275. c. 2
	De inflatione fplenis	275. c. 2
101	De anatomia inteftinorum	276. c. 2
	De punftione inteftinorum	278. c. 2
	De rugitu & exitu ventofitatis inuoluntariae	280. c. 1
	De colica	280. c. 1
	Cura colica phlegmatica	288. c. 2
	Cura colica melancholica	290. c. 2
	Cura colica cholericæ	290. c. 2
	Cura colica ventofæ	290. c. 2
	Cura colica ex facibus	292. c. 1
	De colica apoftemofa	292. c. 2
	Cura colica ex torfione & ex defcenfu inteftini in bur- fam tefticulorum aut in aliquam rupturam mirach 293. c. 1	
	Cura reliquarum fpecierum colicæ	293. c. 2
102	De ileos	293. c. 2
	De fluxu ventris	294. c. 2
	Traftatus primus de fluxu ventris in generali duo conti- nens capitula	298. c. 1
	Cap. primum. De quidditate, fpeciebus, caufis, fignis, & prognoficis fluxus in generali	298. c. 1
	* 3 De regimi-	

INDEX CAPITVM

2	De regimine vniuersali præseruatio & cura.	299.c.2			
	Tractatus secundus de speciebus fluxus sumptis à causa materiali subiectiua continens duas partes distributas in decem capita	304.c.1			
2	De diarrhæa	304.c.1			
2	De fluxu sanguinis prouenientis à toto	305.c.1			
3	De fluxu diuersorum colorum	305.c.2			
4	De fluxu liquefactiua	305.c.2			
5	De cholericâ passione	306.c.2			
	Secunda pars est de speciebus fluxus sumptis à membris particularibus continens capitula sex	306.c.2			
6	De fluxu cerebrali	306.c.2			
7	De lienteria siue de fluxu stomachico	307.c.2			
3	De fluxu intestinali	310.c.1			
4	De teneſmo	313.c.1			
5	De fluxu hepatico	315.c.2			
	De fluxu hepatico chyloſo	316.c.1			
	De fluxu hepatico phlegmatico sub quo aquoſus continetur	317.c.1			
	De fluxu hepatico cholericô	318.c.2			
	De fluxu hepatico melancholico	317.c.2			
	De fluxu hepatico ſanguineo	321.c.1			
	De fluxu hepatico lotiua	321.c.2			
	De fluxu hepatico fetido	322.c.1			
	De fluxu hepatico uirulento	322.c.2			
	De fluxu hepatico qui eſt ſubſtantia hepatis aut ſibi ſmilatur	323.c.1			
6	De fluxu ſplenetico	323.c.2			
	Tractatus tertius de ſpeciebus Fluxus sumptis à causa materiali obiectiua continens tria capitula	324.c.2			
1	De fluxu ſtercoroſo	324.c.2			
2	De fluxu vermium	324.c.2			
3	De fluxu lapidum	325.c.1			
	Tractatus quartus de ſpeciebus fluxus penes cauſam efficiẽtem tria continens capitula	325.c.2			
1	De fluxu oppilatiua	326.c.1			
3	De fluxu à rebus nō naturalibus et extraneis ſicut mor-				
	ſus venenorum & venenorum ſumptio	329.c.2			
	Tractatus quintus. De ſpeciebus fluxus à cauſa formali capitulum vnum continens. De fluxu ſuaui & inſuaui	330.c.1			
	Tractatus ſextus. De ſpeciebus fluxus à cauſa finali capitulum vnum continens. De fluxu laudabili et illa-	330.c.2			
	dabili	330.c.2			
	De anatomia renum	331.c.1			
	De anatomia veſicæ	332.c.1			
	De difficultate vrinæ	336.c.1			
104	De lapide	340.c.2			
105	De apoſtemate quod fit in renib. & veſica	344.c.2			
106	De ardore vrinæ	346.c.2			
107	De miſctu ſanguinis & ſaniei	348.c.1			
108	De mola	350.c.1			
109	De anatomia ſiphac & mirach	351.c.1			
110	De eminentia & ruptura	355.c.1			
111	De dolore iuncturarum	365.c.1			
112	De dolore anchæ	365.c.1			
1	De fluxu vrinæ	366.c.1			
2	De vermibus qui generantur in ventre	367.c.2			
3	De hæmorrhoidibus, fiſtulis, & rhagadijs quæ in ano ſunt	369.c.2			
4	De egreſſionibus ani & matricis	370.c.1			
5	De ſuperfluitate menſtruorum cōſtringenda	370.c.2			
6	De prouocatione menſtruorum	371.c.2			
7	De rhagadijs vuluæ	372.c.1			
8	De apoſtemate quod fit in matrice	372.c.1			
9	De vlceribus quæ ſunt in matrice & eius cancro	372.c.2			
	372.c.1				
10	De præfocatione matricis	373.c.2			
11	De gibboſitate	374.c.1			
12	De varicibus	375.c.2			
13	De elephantiaſi				
14	De vlceratione renum quæ exterius fit in cute.				
	375.c.1				
15	De dolore qui fit in membris manifeſtis	375.c.2			

F I N I S.

INDEX RERVM, VOCVMQVE OMNIVM SCITV DIGNARVM, QVAE IN
hoc Arculani opere habentur. Primus numerus paginam indicat. Litera c. columnam,
quæ sunt duo. Sequens numerus columnarum ordinem.



NATOMIA capitis	tis curatio	240.c.1	ra	116.c.1
humani. pag. 1. col. 2	Apoplexia quid	25.c.2	Auris doloris à calid. curatio	116.c.1
Anatomia oculorum .	Apoplexia unde	25.c.2	Auris doloris à frigid. curatio	116.c.2
pag. 63 col. 1	Apoplexia fortis et debilis signa.	26.c.1	Auris doloris à uetustate cur.	116.c.1
Anatomia aurium. 114	Apoplexia transit in paralyfim	26.c.1	Aur. ulc. medicamentum mudificas. 120.c.1	
col. 1	Apoplexie duo modi significantes mor-	26.c.2	Auris ulcus medicamē cōsolidās. 120.c.1	
Anatomia narium	tem	26.c.2	Aurium: sonitus ex acuitate auditus cu-	
Anatomia dentium	Apoplexia fortis, debilis, media.	26.c.2	ra	224.c.1
Anatomia oris	Apoplexie species et causa	26.c.2	Aurium sonitus ex acuitate cum debilita	
Anatomia lingue	Apoplexie prognostica	26.c.2	te auditus curatio	124.c.1
Anatomia gutturis	Apoplexie urina	27.c.1	Aurium uermium signa	127.c.1
Anatomia pectoris	Apoplexia inchoantis signa	27.c.1	Aurium, in quibus figatur aliquid, cura-	
Anatomia cordis	Apoplectica corpora non debent sepeliri	27.c.2	tio	127.c.2
Anatomia meri et stom.	usq; ad tertiam diem	27.c.2	Aures quomodo extrahantur ea, quæ in-	
Anatomia hepatis	Apoplexie cura	27.c.2	grediuntur	128.c.1
Anatomia splenis	Apoplexie fortis, et debilis signa	26.c.1	Aurium signa carum primitiuarum.	115.c.2
Anatomia intestinorum	Apoplexie sanguinea signa	27.c.2	Aurium apost. quib. cognoscitur.	115.c.2
Anatomia renum	Apoplexie phleg. signa	28.c.1	Apostematis signa in aure	115.c.2
Anatomia uescæ	Apoplexie phlegmatica cura	28.c.1	Auris doloris cura	116.c.2
Anatomia siphac	Apoplexie sanguinea cura	28.c.2	Auris quale membrum	120.c.2
Ani fistularum cause, signa, et curatio	Apoplexia habet quinque curatiuas in-	28.c.2	Aurium cura quatuor exigit intentio-	
pag. 369 col. 1	tentiones	28.c.2	nes	121.c.1
Ani rhagadum cause, signa, et curatio,	Apoplecticorum dieta	29.c.1	Aurium sonitus et tinnitus	122.c.1
pag. 368 col. 2	Apostema lachrymalis	112.c.1	Auris ulcera quib. cognoscitur.	120.c.1
Ani egressionis cause, signa, et curatio,	Apostematū lachrymalium cause	112.c.2	Auris ulcerum cause	120.c.1
pag. 369 col. 2	Apostem. lachrymalis signa	112.c.2	Aurium ulcus	119.c.1
Anche dolor quid	Apostem. sanguinei, phlegmatici, choleri-	112.c.2	Aurium ulcerum cura	120.c.2
Anche cause	ci, melancholici cogni.	112.c.2	Auditus corruptio	122.c.1
Anche doloris species	Apostema lachrymalis triplex exigit re-	113.c.1	Auditus quare aliquando nimis acutus	
Anche doloris signa	gimen	113.c.1	pag.	122.c.2
Anche prognostica	Apostema hepatis triplex exigit regi-	251.c.2	Auditus corruptionis causa	122.c.2
Anche cura	men	251.c.2	Auditus corrupti seu soni. sig.	123.c.1
Anhelitum dilatantia	Apostema sanguineū hepatis	250.c.1	Auditus corruptionis prognost.	123.c.2
Anhelitus constrictionis cura	Apostematis sanguinei cura	251.c.2	Cura sonitus et tinnitus	124.c.1
Anhelitus cura	Apostem. frigidorum emplastrū.	251.c.2	Auditus grauedo, diminutio, abl.	125.c.1
Appetitus quid	Apostematum mirach et lacertorum uen-	252.c.1	Auditus grauedinis causa	125.c.1
Appetitus est duplex	tris cura	252.c.1	Auditus grauedinis signa	125.c.1
Appetitus quibus ex causis minuitur aut	Artetica, et podagra calidæ signa, et cu-	357.c.2	Auditus grauedinis à sordibus aurium	
deficiat	ratio	357.c.2	cura	125.c.2
Appetitus diminutionis ablationis cu-	Artetica, et podagra frigide signa, et	358.c.1	Auditus grauedinis ab humid.	126.c.1
ra	cura	358.c.1	Auditus grauedinis ex inanitione, et con-	
Appetitus excitatio perficitur octo mo-	Asclitis seu ascitis causa	267.c.1	sumptione corporis, et paucitate spiri-	
dis	Asclitis signa	267.c.1	tuum	126.c.1
Appetitus corruptus quid	Asclitis cura	267.c.2	Auditus grauedinis, quæ sequitur capitis	
Appetitus corruptus duplex	Asibma	162.c.2	affectiones, curatio	126.c.2
Appetitus corrupti causa	Asibma sumitur dupliciter	162.c.1	Auditus diminutio quibus cognosci-	
Appetitus corrupti signa	Asibmatis causa	162.c.2	tur	125.c.2
Appetitus corrupti cura	Asibmatis signa	163.c.1	Auditus diminu. progn.	125.c.2
Appetitus caninus quid	Asibmatis cura	164.c.1	Auditus grauedinis cura	126.c.1
Appetitus caninus est duplex	Aurium passiones	114.c.1	Cura uermium in aure	127.c.1
Appetitus canini causa	Aurium anatomia	114.c.1	Cura rerum durarum et liquidarum in	
Appetitus canini signa	Auris quid	114.c.1	aure.	128.c.1
Appetitus canini cura	Auris quare ordinata	114.c.2	B olismus seu bulimos quid.	241.c.2
Appetitus canini à causa frigida orti si-	Aurium situs	114.c.2	Bolismi cæ sunt duplices.	241.c.2
gna	Auris regimen præseruatiuum et confor-	115.c.1	Bolismi signa	241.c.2
Appetitus canini à causa frigida penden-	tatiuum	115.c.1	Bolismi prognostica	241.c.2
tis curatio	Auris dolor quid	115.c.1	Bolismi cura	241.c.2
Appetitus canini à causa calida penden-	Auris doloris signa	115.c.2	C achexia quid	263.c.1
tis signa	Auris doloris causa	115.c.1	Cachexie causa	263.c.1
Appetitus canini à causa calida penden-	Auris doloris cum apostemate calido cu-		Cachexie signa	263.c.2

IN ARCVLANI PRACTICAM

Cachexie prognostica	263.c.2	tum	10.c.2	Colicæ signa	282.c.2
Cachexie cura	268.c.2	Cephaleæ per communitatem ad stomac-		Colicæ prauæ signa	282.c.2
Cauteriorum formæ et canones obseruan-		chum cura	11.c.1	Colicæ salubris signa	282.c.2
di in cauterizando diffuse	353.c.2	Cephaleæ cura prouenientis à causa pri-		Colici doloris et renalis ex lapide diffe-	
Catarrhus quid	58.c.2	miua	12.c.1	rentia	282.c.2
Catarrhus sumitur tripliciter	58.c.2	Cephaleæ melancholicæ cura	12.c.2	Colicæ phlegmaticæ signa	283.c.2
Catarrhi causæ	59.c.1	Cephaleæ per cõitatem à toto	13.c.1	Colicæ phleg. prognost.	283.c.2
Catarrhi signa	59.c.2	Cephaleæ critica cura	13.c.1	Colicæ uentose signa	283.c.2
Catarrhi prognostica	60.c.1	Cephaleæ ex oppilatione cura	13.c.1	Colicæ uentose prognosticum	284.c.2
Catarrhi in cura causæ remotio est præ-		Cephaleæ ex percussione cura	13.c.1	Colicæ ex fœce signa	284.c.2
mittenda	60.c.1	Ceph. ex debilitate capitis cura	13.c.2	Colicæ ex fœce prognosticum	274.c.2
Capitis confortatio	22.c.1	Cephaleæ ex acuitate sensus	13.c.2	Colicæ apostemose signa	284.c.2
Catarrhorum diæta	62.c.2	Cephaleæ ex uermibus existētibus supra		Colicæ apostemose progn.	284.c.2
Catarrhū quæ sunt cõstringētia	62.c.1	stricturam narium	14.c.1	Colicæ ex intestini contorsione signa	
Catarrhi quæ sũt	62.c.1	Cephaleæ sanguinæ medicamenta uti-		pag. 284	col. 2
Catarrhi signa generalia	59.c.2	lia	6.c.2	Colicæ ex intestini contorsione prognos-	
Catarrhus est duplex	59.c.1	Cephaleæ sanguinæ intentiones curati-		sticum	284.c.3
Catarrhi cura exigit tres can-	50.c.1	uæ	6.c.2	Colicarum reliquarū quæ raro eueniunt	
Catarrhi cura	60.c.2	Cephaleæ sāguinæ utiles clysteres	7.c.1	signa	284.c.2
Catarrhi leuis curatio	62.c.2	Cephaleæ sanguinæ, quando, et quæ		Colicæ cārū primitiuarū signa	285.c.2
Catarrhi fortis curatio	62.c.2	phlebotomia sit utilis	7.c.2	Colicæ phlegmaticæ et cholericæ cura	
Catarrhi inueterati curatio	62.c.1	Cephaleæ sanguinæ quæ applicita con-		pag. 295	col. 1
Cataracta quid et unde	59.c.2	ueniant	7.c.1	Colicæ uentose signa	285.c.1
Cataracta sumitur dupliciter	100.c.1	Cholera euacuatio	7.c.2	Colicæ uentose cura	286.c.1
Cataractæ signa	101.c.2	Cephaleæ sanguinæ conueniens diæ-		Colicæ cholericæ cura	286.c.2
Cataractæ prognostica	102.c.1	ta	7.c.2	Colicæ apostemose cura	286.c.2
Cataractæ et imaginationum cura quæ-		Cephaleæ sanguinæ cibis, et potus uti-		Colicæ à causa calida cura	287.c.2
que exigit intentiones	102.c.1	lis	8.c.1	Colicæ phlegmaticæ cura: in qua parte	
Cataractæ modus deponendi	104.c.1	Cephaleæ sanguinæ signa	3.c.2	multa, de uentose colicæ cura tractat.	
Cephalea seu foda quid	3.c.2	Cephaleæ cholericæ signa	8.c.1	pag. 288	.c.2
Cephaleæ causæ et species	4.c.1	Cephaleæ cholericæ utilia digest.	7.c.2	Colicæ melancholicæ cura	290.c.2
Cephaleæ signa	5.c.1	Ceph. cholericæ utilia solutiu.	8.c.2	Colicæ ex torsione et ex descensu intesti-	
Cephaleæ prognosticum	6.c.1	Cholericæ passio	212.c.2	ni in bursam testiculorum aut in aliquā	
Cephaleæ sanguinæ cura	6.c.1	Cholericæ species	212.c.2	rupturam mirach cura	293.c.1
Cephaleæ cholericæ cura	8.c.1	Cholericæ causæ	212.c.1	Colicæ reliquarū specierū cura	293.c.2
Cephaleæ phlegmaticæ signa	15.c.1	Cholericæ signa	213.c.1	Colicæ à cholera pendens signa, et cu-	
Cephaleæ phlegmaticæ utiles pilule	5.c.1	Cholericæ cura	214.c.2	ra	285.c.2
Cephaleæ phleg. utilis unctio	9.c.1	Cholera passio quid	306.c.2	Colicæ apostemose signa, et cu-	285.c.2
Cephaleæ phlegmaticæ intentignes cura	9.c.2	Cholera passionis species, signa, causæ,		Congelatio sumitur quinq; modis	31.c.1
tiue	9.c.2	prognostica, et cura. quare in tractatu		Congelatio est duplex	31.c.2
Cephaleæ phlegmaticæ minoratium u-		de passione stomachi		Congelationis causæ	31.c.2
tile	9.c.2	Cholericæ passiōi quid cõferat	215.c.1	Congelationis signa	31.c.2
Cephaleæ phlegmaticæ conueniens dige-		Cholericæ passionis debilis signa	213.c.1	Congelationis prognostica	32.c.1
stium	9.c.2	Cholericæ passionis debilis curatio		Congelationis cura	32.c.1
Cephaleæ phlegmaticæ conueniens solu-		213.c.1		Congelationis à causa primitiuæ cura	
tium	9.c.2	Cholericæ passiōis fortis signa	213.c.2	32.c.1	
Cephaleæ phlegmaticæ uictus ratio uti-		Cholericæ passionis fortis curatio		Congelationis per communitatem cu-	
lis	10.c.2	213.c.2		ra	32.c.1
Cephaleæ calidæ emplastrū utile	10.c.2	Cholericæ passionis cum syncopi cura-		Congelationis à cerebro pendens cu-	
Cephaleæ frigidæ conueniens linimen-		tio	214.c.1	ra	32.c.1
tum	11.c.1	Cholericæ passioni uictus ratio uti-		Congelatio quid	31.c.1
Cephaleæ per communitatem ad stomac-		lis	214.c.1	Cor quid	191.c.2
chum signum	11.c.1	Cholera multitudinis causæ	214.c.2	Cordis anatomia	192.c.2
Cephaleæ per communitatem ad alia mē-		Cholera digestiuæ utilia	8.c.2	Cor potest pati omne genus ægritudinis	
bra intentiones curatiue	11.c.2	Cholera solutiuæ utilia	8.c.2	pag. 192	col. 2
Cephaleæ ita fortis, ut timeatur amif-		Cholera reprimētia	8.c.2	Cordis ægritudines famosæ sunt qua-	
sio uisus curatio	12.c.2	Cephaleæ cholericæ applicita quæ con-		tuor	183.c.1
Cephaleæ melancholicæ intentiones cu-		ueniunt	8.c.2	Cordis ægritudinum istarū quatuor cau-	
ratiue	12.c.2	Colica quid	278.c.2	sæ	193.c.2
Cephaleæ phlegmaticæ cura	9.c.1	Colicæ prognosticum	278.c.2	Cordis dispositiones octo modis signifi-	
Cephaleæ calidæ curationis complemen-		Colicæ cææ corporeæ duplices	280.c.2	cant	193.c.2
tum	10.c.2	Colicæ cææ per esētia quatuor	280.c.2	Cordis malarum complexionum signa.	
Cephaleæ frigidæ curationis cõplemen-		Colicæ causæ per cõitatem	281.c.2	pag. 193	col. 2
tum	10.c.2	Colicæ causæ primitiuæ	281.c.2	Cordis dispositionum curatio	194.c.1
				Cordis	

INDEX

Cordis tremoris descriptio, cause & signa	196.c.1	dentis curatio	218.c.1	Fluxus quidditas, species, causa, signa & prognostica in generali	298.c.1
Cordis tremoris prognostica	197.c.2	Digestionis debilitatis inueterate cura	218.c.2	Fluxus regimen uniuersale preseruatiuum et curatiuum	199.c.2
Cordis tremoris cura	200.c.2	Digestionis debilitatis ab intensione, uel à caliditate corrupte signa	219.c.1	Fluxus chylosi ex debilitate contentiue stomachi & intestinorum signa, & cura	296.c.1
Cordis tremoris à causa calida pendens signa	200.c.1	Digestionis debilitatis ab intensione, uel à caliditate corrupte curatio	219.c.1	Fluxus uentris quæ diarrhoea dicitur species, cause, signa, prognostic. & cura	304.c.1
Cordis tremoris à causa calida pendens cura	200.c.1	Digestionis debilitatis à caliditate cum corporis extenuatione curatio	219.c.2	Fluxus sanguinis prouenientis à toto species, causa, signa, prognostic. & cura	305.c.1
Cordis tremoris à causa frigida pendens signa	200.c.1	Digestionem, & stomachum à causa frigida debilitatum electarium confortans	220.c.1	Fluxus diuersorum colorum, species, causa, et signa, et prognostic. et cura	305.c.2
Cordis tremoris à causa frigida pendens cura	200.c.1	Digestio impeditur dupliciter	217.c.1	Fluxus liquefactiui species, causa, signa, prognostica & cura	305.c.2
Corizæ cura	63.c.1	Digestionis nocuenti signa	217.c.1	Fluxus cerebri quidditas, species, signa, causa, prognostic. et cura	305.c.2
Corizæ frigide signa	63.c.1	Digestionis nocuenti prognostic.	217.c.2	Fluxus stomachici seu lienterici quidditas, species, causa, signa, prognostica & cura	303.c.2
Corizæ frigide cura	63.c.1	Digestionis debilitatis signa & cura	217.c.2	Fluxus intestinalis quadrupl.	310.c.1
Chylosi fluxus signa	296.c.2	Dysentericæ cura	296.c.2	Fluxus sanguinei intestinalis species, causa, signa, prognostica & cura	310.c.2
Chylosi fluxus cura	296.c.2			Fluxus dysenterici quidditas, species, causa, signa, prognostica & cura	310.c.2
Cuthubut cura.	58.c.1			Fluxus qui dicitur tenebrinos species, signa, causa, prognostic. & cura	313.c.1
				Fluxus hepaticus quid	315.c.2
				Fluxus hepaticus habet nouem species penes materiam distinctas	315.c.2
				Fluxus hepatici chylosi quidditas, species, causa, signa, prognostic. et cura	316.c.1
				Fluxus hepatici sub quo aquosus continetur causa, signa, prognostica, & cura	317.c.1
				Fluxus hepatici cholerici species, causa, signa, prognostic. & cura	318.c.1
				Fluxus hepatici melancholici species, causa, signa, prognostica cura	318.c.2
				Fluxus hepatici sanguinei species, causa, signa, prognostica, & cura	321.c.2
				Fluxus hepatici lotiui causa, signa, prognostica, & cura	321.c.2
				Fluxus hepatici causa, signa, prognostica, cura	322.c.1
				Fluxus hepatici uirulenti causa, signa, prognostica et cura	322.c.2
				Fluxus hepatici qui est substantia hepatis, aut sibi affimi latur, causa, signa, prognostica & cura	323.c.1
				Fluxus splenetici species, causa, signa, prognostica, & cura	323.c.2
				Fluxus stercoreosi species, causa, signa, prognostica & cura	314.c.2
				Fluxus uermium species, causa, signa, prognostica & cura	314.c.2
				Fluxus lapidum causa, prognosticum, cura	315.c.1
				Fluxus critici quidditas, species, causa, signa, prognostica, & cura	315.c.2
				Fluxus symptomatici, quidditas, species, causa, signa, prognostic. et cura	324.c.2
				Fluxus	
Dentium anatomia & quare ordinati	136.c.2	Elephantiasis cura	201.c.2		
Dentium regimen conseruatiuum,	137.c.1	Elephantie causa, signa, & cura	374.c.2		
Dentium dolores	138.c.1	Empyema quid	179.c.1		
Dentium doloris causa	138.c.1	Empyematis causa	179.c.1		
Dentium doloris prognostica	138.c.2	Empyematis signa	179.c.2		
Dentium cura	138.c.2	Empyematis signa salutis & mortis	179.c.2		
Dentium doloris signa	138.c.1	Empyematis cura	179.c.2		
Dentium doloris à causa calida signa	138.c.2	Epilepsia quid	42.c.2		
Dentium doloris à causa calida cura	138.c.2	Epilepsie signa	42.c.2		
Dentium doloris à causa calida curatio	138.c.2	Epilepsie causa	42.c.2		
Dentium doloris à causa frigida signa	139.c.1	Epilepsie differentia ab apoplexia	43.c.1		
Dentium doloris à causa frigida cura	139.c.1	Epilepsie & spasmi differentia	43.c.1		
Dentis corrosi doloris cura	139.c.2	Epilepsie et uertiginis differentia	9.c.4		
Dentium extractio facilis	141.c.2	Epilepsie signa prognostica	43.c.1		
Dentium, qui dolent cum frigida tangunt causa, signa, prognostica, & cura	142.c.1	Epilepsie cura	43.c.2		
Dentium stuporis, seu congelationis descriptio	141.c.2	Epilepsie per comunitatem signa	43.c.2		
Dentium stuporis causa	141.c.2	Epilepsie per comunitatem cura	43.c.2		
Dentium stuporis signa	141.c.2	Epilepsie sanguineæ signa	44.c.2		
Dentium stuporis prognostic.	141.c.2	Epilepsie sanguineæ curatio	44.c.2		
Dentium stuporis cura	141.c.2	Epilepsie phlegmaticæ signa	44.c.2		
Dentium doloris cura mendosa	139.c.2	Epilepsie phlegmaticæ cura	44.c.2		
Dentium doloris cura uera	139.c.2	Epilepsie omni electarium utile	44.c.2		
Dentium cauterizationes	140.c.1	Epilepsie oratio medens	45.c.1		
Dentium extractio fit tribus modis	141.c.1	Epilepticorum diæta sordida	46.c.2		
Diabetis causa, signa, uictus ratio, & curatio	365.c.2				
Diarrhææ cura	304.c.1	Famæ syncopalis quid	239.c.1		
Diarrhææ cholericæ signa, & cura	296.c.2	Famæ syncopalis causa	239.c.2		
Digestionis nocuentum	216.c.1	Famæ syncopalis signa	239.c.2		
Digestionis corruptio fit quadrupliciter	216.c.1	Famæ syncopalis prognosticum	240.c.1		
Digestionis nocuenti cause sunt duplices	216.c.1	Famæ syncopalis cura	241.c.1		
Digestionis debilitatis à frigiditate pendens signa	218.c.1	Famæ diminutionis et ablationis prognostica	235.c.1		
Digestionis debilitatis à frigiditate pen-		Famæ seu appetitus diminutionis uel ablationis prognostica	235.c.1		
		Fistula lachrymalis quid	112.c.1		
		Fistule lachrymalis causa	112.c.2		
		Fistule signa & curatio	112.c.2		
		Fistule lachrymalis prognostic.	112.c.2		
		Fistule lachrymalis cura	112.c.1		
		Fistule lachrymalis curatio cum cautela	113.c.1		
		Fistula sumitur dupliciter	162.c.4		

INDEX

uuntur	81.c.1	Linguae apostematis cause & signa	14	375.c.2			
Lachrymarum fluxus unde	81.c.2	152.c.2	Menses prouocantia	271.c.1			
Lachrymarum fluxus in tristitia & risu	81.c.2	Linguae apostematis cura	152.c.2	Menstruorum superfluorū cura	371.c.1		
quare	81.c.2	Linguae pustula	143.c.1	Menstruorum superfuitatis cause, et cu	370.c.1		
Lachrymarum cura	81.c.2	Linguae pustularum species	143.c.1	ratio	370.c.1		
Lachryme cur fiant in forti intuitu ali-	81.c.1	Linguae pustularum signa	143.c.1	Menstruorum prouocationis curatio	371.c.1		
cuius obiecti	81.c.1	Linguae pustularum cause	143.c.1	Menstruorum medicamen	371.c.1		
Lachryme cur fiant uiso aliquo obiecto	81.c.2	Linguae pustularum prognost.	143.c.2	Membra mandantia que	371.c.1		
delectabili, uel audito	81.c.2	Linguae pustularum calidarum cura	143.c.2	Meri siue œsophagi anatomia	205.c.1		
Lachrymas sistens puluis	82.c.2	143.c.2	Meri quid	205.c.1	Meri operatio	205.c.1	
Lac	82.c.2	Linguae pustularum frigidarum curatio	143.c.2	Mola quid	348.c.1		
Lactis utilitas	82.c.2	143.c.2	Mola quadruplex	348.c.1	Molæ cause	348.c.1	
Lapidis species & cause	336.c.1	Linguae motus ledi tripliciter	148.c.2	Molæ signa	348.c.2		
Lapidis renum signa	332.c.1	Linguae complexio quibus cognoscitur.	149.c.1	Mole & impregnationis uere signa di-	348.c.2		
Lapidis uestice signa	337.c.1	149.c.1	Linguae tumor	151.c.2	stinctiua.	348.c.2	
Lapidis renum & uestice cura	337.c.2	Linguae tumoris causa	151.c.1	Mole prognostica	349.c.1		
Lapidis renū incisionis modus	339.c.2	Linguae tumoris signa	152.c.2	Mole cura	349.c.1		
Lapis an sit in renibus, uel uestice, cogni-	337.c.2	Linguae tumoris cura	152.c.2				
tio	337.c.2	Lienteria quid	195.c.1				
Lapis uestice quomodo curetur	337.c.2	Lienterie signa	295.c.1				
Lapidem uestice patietis dieta	338.c.1	Lienterie cura	295.c.1				
Lapis renum quomodo curetur	338.c.2	Lienterie cura à phlegmate pendentis.	196.c.2				
Lapis in iurga retentus cura	338.c.2	Lienterie à phlegmate signa	295.c.1				
Lapis renum transponitur	339.c.2	Lienterie à mala complexione frigida,	295.c.2				
Lethargie phlegmatica, uel melancholi-	24.c.2	& humida sine materia signa, & cura	295.c.2				
ca intentiones curatiue	24.c.2	tio	366.c.2				
Lethargie phlegmatica clystere conue-	14.c.2	Lumbricorum rotundorum cur.	366.c.2				
niens	14.c.2	Lumbricorum latorum curatio	366.c.1				
Lethargia quid	23.c.1	Lumbricorum ascaridum cu.	366.c.1				
Lethargie causa	23.c.2	Luxuriam cur indicant oculi lachrymo-	81.c.1				
Lethargie signa	27.c.2	si	81.c.1				
Lethargie signa	27.c.2						
Lethargie prognostica	24.c.1						
Lethargie cura	24.c.2						
Lethargie dieta	24.c.2						
Lenitium uentris	142.c.2						
Lenientia in passione pulmonis	142.c.2						
Lingua quid, & eius anatomia; & quare	142.c.2						
ordinata	142.c.2						
Linguae egritudines & earum curatio	143.c.1.1.148.c.2						
nes	143.c.1.1.148.c.2						
Linguae grauedo quid	149.c.1						
Linguae grauedinis causa	144.c.2						
Linguae grauedinis signa	144.c.2						
Linguae grauedinis prognost.	150.c.1						
Linguae grauedinis cura diffuse	152.c.1						
Linguae grauedinis ab humiditate phleg-	150.c.1						
matica pendentis curatio	150.c.1						
Linguae grauedinis ob paralyism, & mol-	150.c.2						
lificationem per communitatem à cere-	150.c.2						
bro	150.c.2						
Linguae grauedinis à siccitate, spasmus ob	150.c.2						
febres acutas curatio	150.c.2						
Linguae grauedinis ob longitudinem li-	150.c.2						
gamenti, quod est sub lingua, cura-	150.c.2						
tio	150.c.2						
Linguae ranule noua curatio	152.c.1						
Linguae ranule inueterata cura	152.c.1						
Linguae ranula	152.c.1						
Linguae ranula species	152.c.1						
Linguae ranula signa & cause	152.c.1						
Linguae ranula prognosticum	152.c.2						
Linguae ranule cura	152.c.2						
Linguae apostema	152.c.2						

Mania est duplex
 Manie cura diffuse
 Manie origo
 Marasmus
 Matricis apostematis cura
 Matricis egressionis cause, & cura
 tio
 Matricis ulcerum cura
 Matricis prefocationis cause, signa, &
 curatio
 Melancholia quid
 Melancholia dupliciter sumitur
 Melancholie signa
 Melancholia spes habet infinitas
 Melancholie causa
 Melancholie prognostica
 Melancholie cura diffuse
 Melancholie initiantis signa
 Melancholie perfectæ signa
 Melancholie splenetica signa.
 Melancholie splenetica cura
 Melancholie à causa extrinseca cura.
 53.c.1
 Melancholie à mania diuersa cura.
 53.c.1
 Melancholico à quibus abstinendum.
 53.c.1
 Melancholico obseruare necessarium.
 53.c.2
 Membroyum manifestorum doloris cu-

Nasus anatomia
 Nasus quale membrum
 Nasi compositio
 Narium sanguinis fluxus quid & unde
 Cause fluxus sanguinis narium
 Cause apertionis uenarum sunt duplices
 Signa prognostica
 Prognostica
 Cura fluxus sanguinis narium
 Narium fluxum sanguineum que sistant
 Narium ulcerum siccorum, & crustoso-
 rum cura
 Narium ulcerum humidorum curatio
 Narium polypi, & hemorrhoidum signa
 Narium ulcera
 Cause ulcerum & prognostica
 Naris ulcerum cura
 Narium polypus quid
 Narium polypi species
 Narium polypi causa
 Narium polypi signa
 Narium polypi prognostica
 Narium polypi cura
 Naso quomodo medicine applicandæ
 Nyctilops quid
 Nyctilopis & Haliar cause
 Nyctilopi & Haliartici qui
 Nyctilops & Haliar sunt species debili-
 tatis uisus
 Nyctilopis & Haliar signa
 Nyctilopis & Haliar prognostica
 Nyctilopis cura diffuse

Oculi anatomia
 Oculorū regimē triplex
 Oculorum cura
 Oculorum ulcera
 Oculorum

IN ARCVLANI PRACTICAM

Oculorum albedo	70.c.2	Ophthalmie prognostica	65.c.2	Pleuresis signa	168.c.1
Oculorum albedo quomodo mollescit	73.c.7.	Ophthalmie cura	65.c.2	Pleuresis signa prognosti.	170.c.1
Oculi distillatio quid	80.c.1	Ophthalmie curationis modus	67.c.2	Pleuresis cura	171.c.1
Oculi debilitatis signa	80.c.2	Ophthalmie noue cura	66.c.2	Pleureticus in qua parte sit phlebotomia	170.c.2
Oculorum albedinis spes sunt tres	72.c.2	Ophthalmie augmentantis cura	66.c.2	Pleuresis perniciose signa	170.c.2
Oculorum albedinis cura	73.c.1	Ophthalmie stantis curatio	66.c.2	Pleuresis perniciose curatio	170.c.2
Oculorum sanitatem conseruans electarium sublime	73.c.1	Ophthalmicorum dieta	68.c.1	Pleuresis, quae extra ad cutim permutatur signa	170.c.2
Oculorum isteritiam remouens medicamentum	261.c.1	Oppilationum cura	68.c.1	Pleuresis, quae extra ad cutim permutatur curatio	170.c.2
Oculi palpebrarum tumor	92.c.1	Oris anatomia	142.c.1	Podagra, & artetica calida signa, et cura	157.c.2
Oculi palpebrarum tumoris signa	92.c.1	Os quid	142.c.1	Podagra, & artetica frigida signa, & cura	158.c.1
Oculi palpebrarum tumoris species	92.c.1	Paralysis quid	32.c.2	Polypus narium	132.c.2
Oculi palpebrarum tumoris prognostica	92.c.2	Paralysis quare in una pte	32.c.1	Polypi species	133.c.1
Oculorum palpebrarum tumoris cura	92.c.2	Paralysis quadruplex est	32.c.2	Polypi causa	133.c.1
Oculi palpebrarum pilorum inuersio	93.c.1	Paralysis cause	32.c.2	Polypi prognostica	133.c.1
Oculi pilorum inuersionis cura	84.c.1	Paralysis signa	33.c.1	Polypi cura septem exigit intentiones.	133.c.2
Oculi imaginationum species sunt duplices	85.c.1	Paralysis prognostica	33.c.2	Polypi cancrofi cura	134.c.1
Oculi imaginationum species diuersificantur multipliciter	85.c.2	Paralysis phlegmatica cura	33.c.2	Polypi medicamen expertum	134.c.1
Oculorum imaginationum signa	102.c.2	Paralysis ex percussione cura	34.c.2	Podagra uide in distione Gutta.	
Oculorum imaginationum cura	102.c.2	Paralysis curatio consideranda	35.c.1	Pruritus lachrymalium	77.c.1
Oculorum imaginationum nouarum curatio	103.c.2	Paralysis sanguinea cura	36.c.1	Pruritus & scabies oculorum differunt	23.c.2
Oculi lachrymosi cur indicent luxuria.	81.c.1	Paralysis ex uulnere cura	36.c.1	Pruritus oculorum cause	75.c.2
Oculi sanguine effusi collyrium utile	79.c.2	Peripneumonia quid	177.c.1	Pruritus signa	74.c.1
Oculorum uisionum signa	98.c.2	Peripneumonia duplex	177.c.1	Pruritus prognostica	75.c.1
Oculorum uisionum prognost.	98.c.1	Peripneumoniae causa	177.c.1	Pulmo quid	75.c.1
Oculorum uisioni quaedam dubia occurrunt	95.c.2	Peripneumoniae signa	177.c.2	Pulmonis compositio ibidem	
Oculorum uisionum cura	95.c.2	Peripneumoniae prognost.	178.c.2	Pulmonis bothor curatio	179.c.1
Oculi pupillae dilatatio quid	108.c.2	Peripneumoniae cura	178.c.2	Pupillae dilatationis cum cephalaea curatio	3.c.2
Oculi pupillae dilatatio duplex	108.c.2	Peripneumoniae cholericae curatio	178.c.2	Pupillae dilatationis ob percussione curatio	3.c.2
Oculi pupillae dilatationis cae	108.c.2	Pectoris anatomia	157.c.1	Pustula linguae	143.c.1
Oculi pupillae dilatationis signa	109.c.1	Pectus quid	157.c.1	Pustularum linguae species	143.c.1
Oculi pupillae dilatationis prognostica	3.c.1	Pectoralium partium motus siue actiones.	158.c.1	Pustularum linguae signa.	143.c.1
Oculi pupillae dilatationis cura	3.c.1	Pectoris ulcera consolidantur multis causis	185.c.2	Pustularum linguae prognost.	143.c.2
Oculorum scabiei quid	73.c.2	Phthisis quid	185.c.1	Pustularum linguae cura	143.c.2
Oculorum scabiei species sunt triplices	73.c.2	Phthisis causa	186.c.1		
Olfactus quid	134.c.2	Phthisicorum complexio	186.c.1		
Olfactus nocumeta est triplex	134.c.2	Phthisicorum signa	186.c.2		
Olfactus amissio & nocumentum	134.c.2	Phthisicorum prognostica	186.c.2		
Olfactus nocumentum quibus cognoscitur	134.c.2	Phthisis specierum notitia	186.c.2		
Olfactus nocumenti causa	135.c.1	Phthisicorum dieta	187.c.2		
Olfactus nocumenti prognosticum	135.c.2	Phthisicorum cura	187.c.2		
Olfactus amissi optimum remedium	135.c.2	Phthisico balneum utile	187.c.1		
Olfactus cura	135.c.2	Phrenesis quid	18.c.1		
Ophthalmia quid & quotuplex	84.c.2	Phrenesis signa	18.c.2		
Ophthalmie causa	64.c.2	Phrenesis est duplex	18.c.1		
Ophthalmia dupliciter generat	64.c.2	Phrenesis causa	18.c.2		
Ophthalmia quibus cognoscitur	65.c.1	Phrenesis prognostica	20.c.1		
Ophthalmie signa	65.c.1	Phrenesis cura	21.c.2		
		Phrenesis nouae signa	18.c.1		
		Phrenesis nouae curatio	20.c.2		
		Phrenesis confirmata signa	18.c.2		
		Phrenesi uictus ratio conueniens	21.c.1		
		Phlegmatis crassi, & uisosi digestium	9.c.2		
		Phlegmatis subtilis digestium	10.c.1		
		Phlegmatis multum frigidi digestium	20.c.1		
		Pleura quid	167.c.1		
		Pleuresis quid	167.c.1		
		Pleuresis est duplex	167.c.1		
		Pleuresis causa	167.c.2		

Sanguis

I N D E X

S anguis quot modis uiridis uel deni-		Sebel utilia solutiua	75.c.2	Splenis apostematum prognostica	
grari possit	27.c.2	Sebel quæ digestiua conferant	76.c.1		274.c.1
Sanguinis sputum unde	182.c.1	Sebel conueniens locale	76.c.1	Splenis apostematum cura	274.c.1
Sanguinis sputum duplex	182.c.1	Sebel uictus ratio	77.c.1	Spleneticorum dieta	275.c.1
Sanguinis sputi causæ	182.c.1	Sitis quid	242.c.1	Splenis oppilationis causæ, et cura	
Sanguinis sputi signa	182.c.2	Sitis cuiuscunq; causæ	242.c.1		275.c.2
Sanguinis sputi progn.	182.c.2	Signa causæ sitis	242.c.1	Splenis inflationis signa, causæ et cura	
Sanguinis sputi cura diffuse	383.c.2	Sitis prognostica	243.c.1		275.c.2
Sanguinis sputo notanda	182.c.2	Sitis cura	243.c.1	Splenis doloris frigidi materialis signa	
Sanguinem mundificantia	184.c.1	Sitim sedantia sunt octo modi	243.c.2		276.c.1
Sanguinis mictus fit quadrupliciter		Siti diminutionis et ablationis causæ, et cura	243.c.2	Splenis doloris frigidi materialis cura	
	346.c.2	Sitim sedantia	243.c.2		276.c.1
Sanguinis mictus causæ	346.c.2	Singultus quid	231.c.2	Splenis doloris calidi signa	276.c.1
Sanguinis mictus signa	346.c.2	Singultus causæ	232.c.2	Splenis doloris calidi cura	276.c.1
Sanguinis mictus prognost.	347.c.1	Singultus signa	233.c.1	Splenis doloris uentosi signa	276.c.2
Sanguinis mictus cura	347.c.1	Singultus prognostica	233.c.1	Splenis doloris uentosi cura	276.c.2
Sanguisugorum bibitarum signa		Singultus cura	234.c.1	Sputi sanguinis ab uuula, palato, et par-	
	147.c.2	Singultus à uentositate pendens signa		tibus gutturis signa	182.c.2
Sanguisugorum cura	147.c.2		233.c.2	Sputi sanguinis ab uuula, palato, et par-	
Sanguinis mictus ob casum, uel percussio-		Singultus à uentositate pendens cura	233.c.2	tibus gutturis curatio	182.c.2
nem cura	447.c.1		233.c.2	Sputi sanguinis cum uomitu emanantis	
Sanguinis mictus ex sumptione rerum a-		Singultus ab inanitione orti signa	234.c.1	cura	183.c.1
cutarum curatio	347.c.2		234.c.1	Sputi sanguinis cum tussi curatio	
Saniei mictus curatio	347.c.2	Singultus ab inanitione orti cura.	234.c.1		183.c.1
Scotomia et uertigo	14.c.2	Singultui, et sternutationi confert reti-	234.c.1	Squinantie species	154.c.2
Scotomiae species sunt duplices	16.c.1	nere anbelitum	234.c.1	Squinantie causæ coniunctæ anteceden-	
Scotomiae causæ	16.c.1	Sief maturans pustulas	70.c.2	tes et primitiue	153.c.2
Scotomiae signa	16.c.2	Sief carnem generans, in ulceribus mun-	70.c.2	Squinantie signa	154.c.2
Scotomiae prognostica	17.c.1	dificans et sigillans	70.c.2	Squinantie prognostica	154.c.2
Scotomiae cura	17.c.1	Sief ulcerum uestigia subtilians	71.c.1	Squinantie cura diffuse	154.c.2
Scotomiae à causa primitiua cura	17.c.2	Sief scabiei, sebel, ungulæ et albedini	73.c.1	Synanchiæ calidæ signa	154.c.2
Scotomiae per communitatem cura.		conferens	73.c.1	Synanchiæ calidæ curatio	154.c.2
	17.c.1	Sief scabiei, oculorum et ulceribus con-	78.c.1	Synanchiæ frigidæ signa	155.c.1
Scotomiae per essentiam cura	17.c.1	ferens	78.c.1	Synanchiæ frigide curatio	155.c.1
Scotomiae à uaporibus pendens cura		Siphac anatomia	349.c.1	Sternutationi, et singultui confert reti-	
	17.c.1	Somnus triplex	29.c.2	nere anbelitum	234.c.1
Scotomiae phlegmaticæ signa	15.c.2	Somnifera	108.c.1	Stomachi et meri anatomia	205.c.1
Scotomiae phlegmaticæ cura	15.c.2	Somnus quid	29.c.2	Stomachus quid et quare ordinatus	
Scotomiae pendens à phlegmate per es-		Somni causæ	29.c.2		205.c.1
sentiam in capite cura	15.c.2	Spasmus quid	38.c.2	Stomachi solutio continua quibus cogno-	
Scotomiae sanguineæ signa	15.c.1	Spasmus duplex	39.c.1	scitur	206.c.1
Scotomiae sanguineæ cura	15.c.1	Spasmi causæ	39.c.2	Stomachum confortantia et confirman-	
Sciaticæ species	358.c.2	Spasmi signa	39.c.2	tia	208.c.2
Sciaticæ causæ	359.c.1	Spasmi prognostica	40.c.1	Stomachi regimen	208.c.2
Sciaticæ signa	359.c.1	Spasmi cura diffuse	41.c.1	Stomachi dolor	222.c.2
Sciaticæ prognostica	359.c.1	Spasmi ad materiam non proportionati	42.c.1	Stomachi doloris causæ sunt	221.c.2
Sciaticæ doloris cura diffuse	359.c.2	cura	41.c.1	Stomachi doloris signa	222.c.1
Scirbi anatomia	278.c.1	Spasmi à repletionem cura	41.c.1	Stomachi doloris prognostica	222.c.1
Scirbus quid	278.c.1	Spasmi ab inanitione cura	41.c.2	Stomachi doloris cura diffuse	223.c.2
Scirbi officium	278.c.1	Spasmi et epilepsiæ signa distinctiua	41.c.2	Stomachi doloris ab humore calido orti	
Scabiei et pruritus oculorum species, cau-			41.c.2	signa	222.c.2
se, signa, et prognost.	73.c.2	Splenis anatomia	271.c.2	Stomachi doloris ab humore calido orti	
Scabiei et pruritus differentia	74.c.2	Sermo uniuersalis de ægritudinibus sple-		curatio	222.c.2
Sebel quid	75.c.1	nis, ubi de speciebus, signis, causis,		Stomachi doloris à uentositate contracti	
Sebel est duplex	75.c.1	prognosticis et cura in generali tract.		signa	223.c.1
Sebel signa	75.c.1		272.c.1	Stomachi doloris à uentositate contracti	
Sebel causa	75.c.1	Splenis dolor	273.c.1	curatio	223.c.1
Sebel prognostica	75.c.2	Splenis apostemata	273.c.1	Stomachi doloris ab apostemate calido	
Sebel cura diffuse	75.c.2	Splenis apostematum et duritiei causæ		orti signa	229.c.1
Sebel ex retentione mestrurorum, uel			273.c.1	Stomachi doloris ab apostemate calido	
hemorrhoidarum phlebotomia saphhe-		Splenis apostematis signa	273.c.2	orti curatio	229.c.1
ne confert	759.c.2			Stomachi apostematæ species, signa, cau-	
Sebel pilulæ conuenientes	75.c.2			se, prognostica	227.c.2
				Stomach	

IN ARCVLANI PRACTICAM

Stomachi ulcerum species, signa, causæ & prognostica	228.c.2	Tetani cura	41.c.1	Tussis antiquæ, & catarrhalis curatio	160.c.2
Stupor quid	36.c.2	Tortura oris quid	37.c.2	Tussis cura diffuse	160.c.1
Stuporis species	36.c.2	Torturæ species	37.c.2	Tympanitis signa, causæ & prognostica	267.c.1
Stuporis causæ	36.c.2	Torturæ signa	37.c.2	Tympanitis cura	268.c.2
Stuporis signa	35.c.1	Torturæ causæ	37.c.2		
Stuporis prognostica	35.c.1	Torturæ prognostica	38.c.1		
Stuporis cura	35.c.2	Torturæ cura	38.c.1	Ventriculi causæ, et curatio	378.c.2
Stuporis recentis, & pauca materia causa	35.c.2	Torturæ pendentis à paralyti cura	38.c.1	Vene quidè sunt duplices	28.c.2
Stuporis fortis curatio	35.c.2	Torturæ utile gargarisma	38.c.1	Ventositatis in stomacho est causa duplex	223.c.1
Stuporis & tremoris differentia	35.c.2	Torturæ confert nux moschata	38.c.2	Ventositatis causæ	223.c.1
Subeth, sabara, dormitio uigilantia	25.c.1	Torturæ conuenit sternutatio	38.c.2	Ventositatis doloris cura	223.c.2
Subeth quid	29.c.1	Torturæ olea, quæ conueniant	38.c.2	Ventositatem soluentia	223.c.2
Subeth duplex	30.c.1	Torturæ intentionis curatiua	38.c.2	Ventositatis digestionis impedimentum	223.c.2
Subeth causæ	30.c.1	Torturæ ex spasmo utile est primò mollicare, deinde resoluerè ; sed in tortura ex paralyti tantummodo est resolutendum	38.c.2	Ventris fluxum retinentia	310.c.1
Subeth signa	30.c.2	Torturæ conferentia medicamentorum	38.c.2	Ventris solutiua in cephalica	7.c.1
Subeth prognostica	30.c.2	Torturæ sanguineæ optimè confert phlebotomia uenarum lingue	38.c.2	Venter quibus soluitur	248.c.1
Subeth cura	30.c.2	Torturæ conducit cauterium super uenam, quæ est post aurem	38.c.2	Ventris fluxus curatio per longum processum	298.c.1
Subeth est minor ægritudo, quam apoplexia	30.c.1	Torturæ ex causa frigida conueniens syrumpus	38.c.2	Vertigo quid	15.c.2
Subeth clysteria utilia, & quæ le est descriptum	30.c.1	Torturæ ex causa frigida utilis solutiua	38.c.2	Vertigo capituli quadrupliciter	15.c.2
Subeth locale conferens	30.c.1	Torturæ ex causa frigida conueniens gargarisma	38.c.2	Vertiginis species sunt duplices	16.c.1
Subeth sternutatorium utile	30.c.1	Torturæ nocet sternutatio, et gargarizatio ante purgationes	38.c.2	Vertiginis causa duplex	16.c.1
Subeth à causa primitiua pendentis curatio	30.c.2	Trachea quid	38.c.2	Vertiginis & epilepsiæ differentia	16.c.2
Subeth à frigiditate orti curatio	30.c.2	Tremor quid	35.c.2	Vertiginis signa	16.c.2
Subeth à uenenis sumptis cura.	31.c.1	Tremoris species	36.c.1	Vertiginis cura diffuse	17.c.1
Subeth à materia sanguinea, uel phlegmatica per essentiam in cerebro curatio	31.c.1	Tremoris causæ	36.c.1	Vertiginis materialis cura	17.c.2
Subeth à repletionem pendentis cura.	31.c.1	Tremoris signa	37.c.1	Vertiginis cuiuscunque curatio	17.c.2
Subeth à multa resolutione spirituum curatio	31.c.1	Tremoris prognostica	30.c.1	Vertiginis phlegmæ signa	15.c.2
Subeth per communitatem orti curatio	31.c.1	Tremoris cura	37.c.1	Vertiginis phlegmaticæ cura	15.c.2
Subeth quomodo curari debeat	31.c.1	Tremoris & icterigationis differentia	36.c.2	Vertiginis pendentis à phlegmate per essentiam capitis	15.c.2
Subeth non faciunt caliditas, & siccitas nisi per accidens	30.c.2	Tremori olea conuenientia	37.c.1	Vertiginis sanguineæ signa	15.c.1
Sudorem prouocantia	349.c.1	Tremori emplastrum conueniens	37.c.1	Vertiginis sanguineæ cura	15.c.1
Sudoris conditiones	160.c.2	Tremori capitis medicamen præstantissimum	37.c.1	Vermium cura	366.c.1
Synanchia seu angina quid	153.c.1	Tremori nocentia	37.c.2	Vescicæ anatomia	331.c.2
Stomachi doloris à frigido apostemate pendentis curatio	229.c.2	Tremori à causa frigida ueniens castoreum, & oleum de cucumere asinino sunt propria	37.c.2	Vescicæ quid	331.c.1
Syncopis signa	199.c.1	Tussis propria passio pulmonis	158.c.2	Vescicæ apostematis signa & curatio	342.c.2
Syncopis quid	197.c.2	Tussis quid	158.c.1	Vescicæ lapis uide lapis	82.c.2
Syncopis causæ	197.c.2	Tussis causæ est duplex	159.c.2	Visus debilitas diffusa	83.c.1
Syncopis prognostica	200.c.1	Tussis signa	159.c.2	Visus debilitas habet tres species	83.c.1
Syncopis cura	203.c.1	Tussis prognostica	160.c.1	Visus debilitatis causæ duplices diffusi	83.c.1
Tabies quid	183.c.1	Tussis à causa calida pendentis signa	160.c.1	Visus corruptæ causæ diffusi	85.c.2
Tenesmonis frigidi, & uentosii cura	297.c.1	Tussis à causa calida pendentis cura	160.c.1	Visus debilitatis signa diffusi	85.c.1
Tenesmonis inueterati curatio	297.c.1	Tussis à phlegmate pendentis signa	160.c.2	Visus debilitatis aut defectus prognostica	88.c.2
Tenesmos quid	297.c.1	Tussis à phlegmate pendentis cura	160.c.2	Visus debilitatis cura diffusa	89.c.1
Tenesmonis cura	297.c.1	Tussis à phlegmate pendentis cura	160.c.2	Visus debilitatis propter humiditatem phlegmaticam signa	88.c.2
Tetanus quid	40.c.1			Visus debilitatis propter humiditatem phlegmaticam curatio	88.c.2
Tetani species	40.c.1			Visus debilitatis ob siccitatem signa	89.c.1
Tetani signa	40.c.2			Visus debilitatis ob siccitatem cura	89.c.1
				Visum conseruantia	65.c.1
				Vlcera pulmonis	240.c.1
				Vlcerum pulmonis mundificatio & absterfusio	

I N D E X

<i>sterflo diffufe</i>	291.c.1	<i>Vomitus critici cura</i>	211.c.1	<i>Vrine difficultatis ex oppilatione coar-</i>	
<i>Ulcera matricis cura</i>	392.c.1	<i>Vomitus symptomatici cura</i>	211.c.1	<i>etatoria meatus signa, & cura</i>	
<i>Ulcera pectoris consolidantur multis de</i>		<i>Vomitus pręgnantis causa & cura.</i>		334.c.1	
<i>causis</i>	291.c.2		212.c.1	<i>Vrine difficultatis ob lapidem cura</i>	
<i>Umbilici augmentum quid</i>	351.c.2	<i>Vomitus sanguinis causa & cura</i>		334.c.2	
<i>Umbilici eminentia est septuplex</i>			212.c.2	<i>Vrine fluxus causa, signa, uictus ratio,</i>	
351.c.2		<i>Vomitiva</i>	212.c.2	<i>& curatio</i>	365.c.1
<i>Vngula oculi quid</i>	77.c.2	<i>Vomitum retinentia diffufe</i>	212.c.2	<i>Vulue rhagadam cause, signa, & cura</i>	
<i>Vngula oculi species</i>	77.c.2	<i>Vrine ardor</i>	343.c.2	<i>tio</i>	371.c.2
<i>Vngula oculi cause</i>	78.c.1	<i>Vrine ardoris cause</i>	343.c.1	<i>Vulue ulcerum, & apostematis curatio</i>	
<i>Vngula oculi prognostica</i>	78.c.1	<i>Vrine ardoris signa</i>	343.c.2	373.c.1	
<i>Vngula oculi cura</i>	78.c.1	<i>Vrine ardoris prognostica</i>	344.c.1	<i>Vulue cancrose, & ulcerose cause &</i>	
<i>Vomitus quid</i>	206.c.1	<i>Vrine ardoris cura diffufe</i>	344.c.1	<i>curatio</i>	372.c.1.2
<i>Vomitus duplex</i>	206.c.1	<i>Vrinandi actio dupliciter impeditur.</i>		<i>Vuule egritudines sunt quatuor</i>	
<i>Vomitus cause</i>	206.c.2	333.c.1		145.c.1	
<i>Vomitus signa</i>	207.c.1	<i>Vrinam retinendi actio tripliciter impe-</i>		<i>Vuule casus</i>	145.c.1
<i>Vomitus prognostica</i>	207.c.1	<i>ditur</i>	333.c.1	<i>Vuule casus signum</i>	145.c.2
<i>Vomitus medicine proprie</i>	208.c.2	<i>Vrina impeditur septē de causis</i>	333.c.1	<i>Vuule casus cura</i>	145.c.2
<i>Vomitum sistentes trochisci</i>	214.c.1	<i>Vrine difficultatis signa</i>	332.c.2	<i>Vuule egritudinum cura diffufe.</i>	
<i>Vomitus quibus morbis nocet aut con-</i>		<i>Vrine difficultatis prognost.</i>	333.c.1	146.c.2	
<i>fert</i>	209.c.1	<i>Vrine difficultatis cura diffufe</i>	334.c.1	<i>Vuule casus à caliditate signa</i>	145.c.2
<i>Que obseruanda sunt regimina in uomi-</i>		<i>Vrine difficultatis ex debilitatis attra-</i>		<i>Vuule casus à frigiditate signa</i>	145.c.2
<i>tu curando</i>	208.c.2	<i>etione signa, & curatio</i>	333.c.2	<i>Vuule casus à calid. curatio</i>	145.c.2
<i>Vomitus cibalis cura diffufe</i>	209.c.2	<i>Vrine difficultatis à casu, uel percussio-</i>		<i>Vuule casus à frigid. curatio</i>	145.c.2
<i>Vomitus humoralis duplex</i>	211.c.1	<i>ne signa, & curatio</i>	334.c.1		

F I N I S.



INSTRUMENTORVM CHIRVRGICORVM

formæ, quibus auctor hoc in libro pafsim vitur.

Acus argenteæ forma habetur. pag. 104. C. 1.

Forceps pro extrahendo rem in aurem ingreffam Picigarola dicta. in capite de ægritudinibus aurium. 128. C. 2.

Speculum ad aperiendas nares. in capite de ægritudinibus narium. 134. C. 1.

Forceps pro extrahendis dentibus Pulicæ dicta. 141. C. 1.

Forcipum pro extrahendis dentibus forma. pag. eadem

Forceps pro extrahendis fragmentis, quod Rostrum Ciconiæ dicunt. pag. eadem

Cannula pro inflando puluere ad vuulam. pag. 146. C. 1.

Speculum ad linguam comprimendam. pag. 146. C. 2.







Cannula pro vuula cauterio amputanda. pag. 147. C. 1.

Incisorium aureum uel ferreum ignitum cuius auriculæ sint ad angulos obtusos deflexæ. 147. C. 1.

Instrumentum de plumbo. 147. C. 2.

Cauterium à forma cuspidum triangulum constituentium, dictum triangulatum. pag. 361. C. 1.

Cauterium formam rotæ habens. 361. C. 1.



Cauterium rotæ similitudinē habens pro coxendicibus adurendis. 364. C. 2.

IOANNIS ARCVLANI VERO- NENSIS IN NONVM LIBRV M ALMANSORIS EXPOSITIO,

Cum scholijs IOANNIS MARINELLI Formiginensis medici.



XPOSITVRVS nonum
Almansoris reiectis superfluis
in librorum principijs inquiri
solutis, duo tantum nostro pro-
posito opportuna paucis expe-
diam. primum quidem erit de
laudibus & celebritate Rasis
qui hunc librum ædidi, quem
Regi Almanfori dedicauit.

haud enim dignum censuerim
eorum, qui humani genus sibi
obnoxium perpetuoq; deuinctum ingentibus meritis, æter-
nisq; fecere beneficijs, nomina in obscuro iacere sinere. ex
quibus permixtè Rasm fuisse arbitror: neminè enim (pa-
ce aliorum dixerim) siue græcos aut arabes, siue chaldæos,
aut latinos mente reuoluo, fuisse existimo, qui tantum medi-
cinæ adiecerit, cuiusfue studijs assidujsq; laboribus tantum
adoleuerit, siue rerum copiam, totiusq; negocij medicinalis
in uno uolumine re dacti immensitatem consydero qualis est
liber, quem continens appellauit, siue breuitatem, remq;
medicinalem exiguo perstrictam uolumine summa cū ele-
gantia, & uerborum uenustate, qualis est hic liber, nomine
Regis Almanforis nuncupatus, quem optimis approbatissi-
misq; sententijs refertum cernimus. quare nos illi, totumque
genus humanum plurimū debere profiteor. ideo unusquisq;
pro uirili, debet Rasi laudes eiusq; uoluminis celebritatem:
quæ iuxta peripateticorum principem ad illius etiā defun-
cti gloriam ac foelicitatē aliquid momēti allatura sunt, cum
id in ethicis multo plus referat, quam in tragedijs scelera pa-
trata narrari: ut quasi iam patrentur. secundum est de subie-
cto huius libri, eiusq; immensa utilitate. Totius enim huius
libri subiectum est corpus humanum arte sanabile, quod to-
tius medicinæ esse subiectum perhibet. huius uerò noni su-
biectum est corpus humanum arte sanabile secundum pas-
siones particulares singulis membris appropriatas. ex quo
huius libri immensa iam liquet utilitas: cum per eum omniū
ægritudinum à capite usque ad pedes nobis notitia salusq;
afferatur. quis est ergo qui pro huius libri scientia capeffen-
da labores metiri debeat, quis non omnia patientissimè fe-
rat incommoda, cum decus, opes, gloriam, cæteraq; exte-
riora ornamenta, sine quibus non contingit esse foelicem, per
eum nobis polliceri ualeamus: si enim pro quæstionibus Ia-
cobi, aut Vgonis Senensis tantum ocii temporisq; terimus
summa cum animaduertentia, animiq; applicatione, quarum
notitiam parum decoris, aut lucri nobis allatura speramus:
quanto magis pro huius libri scientia capeffenda inuigilare
debemus, ex quo tantorum copiam bonorum assecuturos
nos speramus? credite mihi experto, credite, quisquis hono-
res, opes, gloriam, apud homines gratiam consequi desyde-
rat, huic libro intendat. facili enim breui temporis decursu
hic omnia assequetur. sed de his satis, nunc agamus quod in-
stat. Continuat hic nonus ad præcedentes in hunc mo-
dum. postquam Rasis in primo libro determinauit de iuua-
mentis membrorum & anatomia corporis humani: Et in se-
cundo notificauit complexionēs, & humores, & physiono-
miam: in tertio de virtutibus medicinarum & ciborum: in
quarto de cōseruatione sanitatis: in quinto de decoratio-
ne: in sexto de regimine iter agentium: in septimo de aggre-
gationibus, & summis artis chirurgicæ: in octauo de uenenis,
eorumq; sanatione. placuit ipsi in hoc nono determinare de
ægritudinibus particularibus singulis membris apropiatis
à capite usque ad pedes: tandem in decimo determinaturus
de febribus, crisi & diebus ceticis, ex quibus omnibus to-
ta medicina integratur. ægritudines autem, de quibus hic

agitur, duobus modis dicuntur particulares: primo particu-
laritate prædicationis ad differentiam ægritudinum, de qui-
bus agit Auicenna in primo can. quæ dicuntur vniuersales
vniuersalitate prædicationis. secundo modo dicuntur parti-
culares: quia singulis membris appropriatæ ad differentiam
februm, apostematum, & cæterarū ægritudinum, de quibus
Auicenna agit in 4. quæ nullo membro appropriantur; illæ
enim dicuntur cōmunes cōmunitate indifferentiæ.

Diuiditur autem more quorundam hic liber in quinque
partes. in prima agit de ægritudinibus membrorum anima-
lium. in secunda agit de ægritudinibus membrorum spiritua-
lium. in tertia de ægritudinibus membrorum naturalium. in
quarta de ægritudinibus membrorum generatiuorum. in quin-
ta de ægritudinibus membrorum exteriorum. partes facili
patere possunt; quanquā conformius loquendo menti Ra-
sis hic liber diuidēdus est in nonaginta quinque partes, sicut
sunt nonaginta quinque capita: cum ipse, ut patet ex ordine
suo, nunquam diuiserit præsentem librum in sen, neque in
tractatus.

Intentio mea in expositione præsentis libri est primò cō-
pendiosè ponere anatomiam membri, de cuius dispositioni-
bus agendum est: deinde circa vnumquodq; capitulum inue-
stigare primo quid nominis, & quid rei dispositionis de qua
agitur, quod faciam circa rubricam: secundo species: tertio
causas: quarto signa tam generalia, quā particularia: quinto
prognosticum, quæ quatuor faciam circa eam partē, in qua
Rasis agit theoricè de his dispositionibus: sexto ponam curā
memorando intentiones curatiuas, nec non medicinas tam
simplices, quā compositas, illas intentiones perficientes,
quod vltimum faciam circa eam partē, in qua Rasis ponit
harum dispositionum curam. in quibus omnibus me conforma-
bo Rasi, Aui. Gal. Mesu, cæterisq; authoribus, & docto-
ribus illustribus. & si qua signa propria, aut medicinæ exper-
tæ apud me fuerint, quibus confidam; has subiungam secun-
dum opportunitatem. ille autem sit nobis in auxilium, à quo
coelum & tota natura pendet.

De anatomia capitis.

S Equendo igitur ordinem præmissum, ab anatomia capi-
tis est incipiendum. pro qua videndus est primo situs ca-
pitis: quod fuit in alto constitutum propter visum, non
propter alium sensum, non propter cerebrum, ut voluit
Princeps de intentione Galeni in principio tertij can. Ocu-
lus enim, qui est custos corporis, debuit esse in alto consti-
tutus, ut à longe fugienda, & cōsequenda faciliè possit intue-
ri. qui oculus debuit esse cōiunctus capiti, ut à cerebro per
nervos opticos reciperet spiritum visibilem: & e contrario
ut ab oculo deferrentur species visibiles per eosdem ad sen-
sum communem, quia etiam nerui optici compositionem o-
culi ingrediuntur, ut infra videbitur: ut etiam oculi recipe-
rent motum à secundo pari nervorum cerebri: quapropter
oportuit caput propter oculum esse in alto constitutum. de-
inde videnda est quantitas: fuit enim caput magnum, quia
debuit magnum cerebrum contineri, & maius in homine,
quā in alio animali respectu propriæ molis. fuit autem fa-
ctum figuræ sphericæ ex utraq; parte compressæ ut sit magis
tutum ab extrinsecis nocentibus: & quia figura sphericæ est
omnium capacissima. fuit autem creatum aliquid oblon-
gum, ut tres uentriculi in eo conuenientius distinguerentur
secundum longitudinem. numerus autem partium eius est
denarius, primo enim occurrunt capilli, secundo cutis, tertio
caro, quarto panniculus dictus almochati, quinto cranium,
sexto panniculi, dura mater, & pia mater, septimo substantia
medullaris cerebri, octauo duo panniculi sub cerebro, nono
rete mirabile, decimo os basilare, quod est basis, & fundamē-
to.

Io. Arculani

A tum

tum totius capitis. capilli autem fuerunt grossi multi & longi, tum ad tutelam capitis, tum ad decorem ordinati. cutis etiam fuit grossa, quia capilli in ea fixi debuerunt habere radices longas & grossas, ut etiam esset clypeus ossis cerebri. caro autem reperta fuit in fronte & temporibus, non in omnibus partibus capitis, & fuit muscosa ad dandum motum illis partibus. aliochati uero ordinata fuit ad tutelam ossis & cerebri, & etiam ad suspendendum duram matrem, cum qua colligatur, & ex qua generatur, mediantibus quibusdam nullis nervis & ligamentibus, qui egrediuntur à dura matre per commissuras cranei ad constitutionem huius panniculi, & hoc ne dura mater cerebrum comprimeret, propterea in actu pratico caueant chirurgici ne incidant hunc panniculum in locis commissurarum in quibus multum colligatur cum dura matre, & precipue in commissura coronali. nam nocumentum communicatum duræ matri facile posset esse mortale. craneum uero, fuit ex quinque ossibus compositum, habens duplicem tabulam, superiorem & inferiorem: unum os est in fronte, alterum posterius, & duo in lateribus, & unum inferius sub cerebro dictum basilare. Fuerunt autem plura ossa, & non unum, ne nocumentum communicatum uni parti, communicetur toti. & etiam, ut ex coniunctione quatuor ossium superiorum tres generentur commissuræ: prima coronalis ad modum coronæ, existens in parte anteriori capitis. secunda lambdæ literæ similis in parte posteriori existens: tertia sagittalis penetrans recte per medium capitis, à commissura coronali, scilicet ad lambdæ secundum capitis longitudinem. istæ tres fuerunt commissuræ ueræ, quia penetrant utrinque. sunt etiam & aliæ duæ commissuræ non ueræ à lateribus, dictæ non ueræ, quia non penetrant; uidelicet os utrinque sed solum primam tabulam. istæ autem commissuræ fuerunt serriles, id est ad modum denticulæ serræ coniunctæ, ut essent firmiores. non autem fuerunt nodales, quia motu non indiguerunt. et ab Auienna uocantur adorem, & fuerunt ordinatæ, ut fumi & nappores ad caput ascendentes facilius possint resolui, & ut uirtus medicinarum tempore necessitatis applicatarum capiti facilius penetraret in profundum. & propterea in actu pratico cum medici uolunt cerebrum alterare, aut aliquid ad eo resolvere, debet ponere medicinas super commissuris. panniculus autem dura mater immediate supponitur craneo, qui est panniculus satis durus, grossus, & fortis, undique cōplectens cerebrum non immediate nam immediate post ipsum sequitur pia mater, immediate undique cōplectens cerebrum, quæ pia mater est panniculus satis mollis, & subtilissimus. hæc autem gradatio facta fuit ne molle lædatur ex contactu duri. hi autem duo panniculi se profundant in cerebro usque ad uentriculos eius, diuidentes cerebrum anterior in duas medietates secundum longum, diuidentes etiam cerebrum posterius ab anteriori, quod factum fuit ne nocumentum uni parti adueniens facile communicetur toti. profundatio piæ matris ad intrinsecam cerebri modo iam dicto fuit propter nutritionem cerebri. sunt enim in pia matre disseminatæ uenæ multæ, & per ipsam sustentatæ, ordinatæ ad nutriendum cerebrum. substantia autem medullaris cerebri fuit alba, mollis, uiscosa, per hæc ordinata in nutritionem, & debitam generationem nervorum, & nuchæ inde prodeuntium, uerum cerebrum anterius est humidius & mollius quæ cerebrum posterius, & minus frigidum. hoc autem factum fuit, quia ex cerebro anteriori debet prodire nervi sensus, qui sunt molliores, & ex posteriori nucha nervi motus, qui debet esse duriores. in cerebro autem sunt tres uentriculi distincti secundum longitudinem eius. in prima parte cerebri est uentriculus primus magnus diuisus in duas medietates, dextram scilicet, & sinistram, quarum unaquæque est maior alijs duobus uentriculis. hic autem uentriculus primus est sedes & organum duorum sensuum interiorum, scilicet sensus communis, & phantasie. est enim sensus communis in prima medietate secundum longum, phantasia in altera: qui sensus communis habet recipere species sensibilibus exteriorum inter ea componendo & diuidendo, non tamen per copulam uerbalem. phantasia uero habet pro paruo tempore huiusmodi species referuare. & in fine huius primi uentriculi sunt duæ substantiæ, una quæ est sicut ancha, altera sicut est uermis subterraneus, longa, subtilis, rubea, cōtrahibilis & elongabilis, & ideo uermis dicta est. nam cum elongatur, clauduntur anchæ, & clau-

ditur uentriculus secundum eius partem postremam, secundum quam coniungitur secundo uentriculo. & similiter clauditur principium secundi uentriculi, ita ut species non possint transire de uno uentriculo ad alium, quod fit cum homo uult cessare à cogitatione, & operationibus sensuum exteriorum: cum autem uermis ille contrahitur, fit harum anchorarum dilatio, ita ut species possint transire de uno uentriculo ad alium cum homo aggreditur cogitationem. uentriculus autem medius est subtilis & longus, & est sicut deilum, id est, transitus de primo uentriculo ad tertium, est enim hic uentriculus utriusque contiguus. hic autem est sedes & organum duarum uirtutum. scilicet cogitativæ, quæ habet cōponere, diuidere, etiam cum copula uerbalis, & ex uno aliud inferre: & in secunda medietate est existimatiua eliciens insensatam ex sensatis. tertius uero uentriculus est in posteriori cerebro, figure pyramidalis, latior secundum partem contiguam secundo uentriculo, gradatim se constringendo procedens usque ad originem nuchæ quod factum fuit, ut secundum extremum magis latum reciperet species & intentiones, & secundum eius strictum ipsas melius cōseruaret: est enim organum uirtutis memoratiuæ, quæ est pure cōseruatiua, & secundum hæc figuram, figuratur cerebrum posterius. & hi tres uentriculi sunt distincti per medium secundum eorum longitudinem, licet hæc distinctio sit sensui manifesta solum in primo uentriculo: imò etiam nucha eodem modo est distincta per medium usque ad eius finem: hoc autem factum fuit, ne nocumentum partis communicetur toti. sed attendendum, quod duo primi uentriculi sunt in tertius inuoluti panniculo subtilissimo dicto pia mater. ultimus autem uentriculus non, quia eius substantia est satis dura seipsa cōseruabilis, sed substantia duorum primorum, quia satis mollis indiguit cōseruante. sub fine autem primi uentriculi, & principio secundi descendendo reperitur quoddam foramen rotundum, oblongum aliquantulum, dictum lacuna siue embotus: in cuius medio est foramen strictum, quod diagonaliter tendit ad palatum, & eidem occurrit uia directa, quæ à medio uentriculo directe descendit ad colatorium, quod est foramen in medio ossis basilaris, ordinatum ad expurgationem superfluitatum cerebri. & circa hoc foramen sunt carnes eminentiæ magnæ, rotundæ, ordinatæ ad sustentandum uenas uel arterias ascendentes a rete mirabili ad uentriculos dictos, & ideo in basi eius apparent glandulæ, quæ sunt iuxta rete mirabile eminentes, & per istam lacunam uentriculi anteriores & cerebrum quantum ad modum eius, expurgant suas superfluitates, licet quantum ad partes anteriores magis purget suas superfluitates per colatoria narium. istud autem foramen, quia latum est superius, inferius uero strictum, ab Haliaba uocatur embotus. Caput autem rosæ est meatus quidam expulsiua superfluitatum cerebri amplius superius, strictus inferius, ideo caput rosæ dictus est, & hic est unus ex meatibus terminatis à lacunam. Torcular autem sunt duæ uenæ grossæ, circa principium lacunæ, à quibus ramificantur uenæ parue per lacunam. Tres autem sunt uia expulsiua superfluitatum à cerebro. Una est, ossa narium in extremitatibus suis perforata, tum ad expulsiuonem à parte anteriori cerebri, tum ad receptionem specierum rerum odorabilium, necnon fumalis euaporationis ordinata. Secunda, terminatur ad finem primi uentriculi, & principium secundi. Tertia, ad finem secundi uentriculi, & principium tertij, per quas cerebrum secundum eius partes medias, suas purgat superfluitates, quæ terminantur ad lacunam iam dictam, & ideo oblonga creata fuit. Cerebrum autem secundum eius partem anteriorem habet duo additamenta, quæ sunt sicut duæ papillæ mamillares, quæ uocantur caruncule mamillares, & sunt circumuolutæ panniculo subtili, scilicet pia matre, & terminantur ad ossa narium & sunt organum olfactus. Et à cerebro oriuntur septem paria neruorum. Primum est nerui optici grossiores quam reliqui nerui, ortu habentes à uentriculo anteriori, & procedentes uersus oculos, & antequam egrediantur piæ matrem, uniuntur ad inuicem, & in loco unionis sunt perforati, & cōmuniter tenentur quod non cruciatur, imò post unionem dexter tendit ad dextrum, & sinister ad sinistrum. Horum autem sunt tria iuamenta, primum deferre spiritus uisibiles ad oculos secundum species uisibiles ab oculo ad sensum communem, & ideo uniuntur, ut species delatæ à duobus oculis uniuntur, ne una res appareant duæ: tertium, quia ex ipsis generatur retina, & tela aranea, ut

ut infra dicitur in anatomia oculorum. Secundum autem par neruorum, quod est post istud ueniens ad oculos, concurrat ad compositionem musculorum oculi, propterea dat oculis motum uoluntarium. Tertium uero par, diuiditur in plures partes, quarum una uadit ad partes faciei, ad dandum sensum & motum illis partibus. Et huius etiam una pars tendit ad linguam, ad dandum illi gustum secundum Auic. Reliqua pars miscetur cum quarto pari, & descendens per foramen ingressionis uenae subethicæ per ceruicem, ad diaphragma & stomachum, dat sensum uisceribus. Et inde, secundum Mundinum, oriuntur nerui reuerfui, licet apud Auicem, à tertia parte sexti paris orientur, qui sunt proprii nerui uocis. Reliqua uero pars quarti paris tedit ad palatum, ad dandum ei sensum. Post quod est quintum par, quod tendit ad ossa petrosa, quæ sunt prope aures, & ex ipsis in foraminibus eorum generantur pāniculi, qui sunt instrumēta auditus. Postea est sextum par diuisum in tres partes, quarum una uadit ad musculos gula, secundum ad musculos spatulæ, tertia maior cæteris, ad uiscera descendit in ascensione uenæ subethicæ, & est illi annexa, ex qua in rectitudine epiglottis separantur rami, qui ad musculos ueniunt epiglottales, quorum capita sunt ad superiora, qui epiglottim, & ipsius aleuant cartilagine. Cumq; epiglottim pertranseunt ex eis ascendunt rami, qui ad musculos cymbalarem fistulam claudentes ueniunt, & dicuntur nerui reuerfui, & sunt proprie nerui uocis. Reliquum uero huius rami spargitur in diaphragmate, pectore, corde & pulmone, & associatur ei quod ex parte tertia tertii paris descendit ad uiscera. Postea est septimum par quod oritur à postremo cerebri ueniens ad linguam, & dat illi motum uoluntarium: dicit autē Auic. quod oritur à termino communi inter cerebrum & nucham hominis, & per eum prima duo paria oriuntur à cerebro anteriori, tertium à termino communi inter cerebrum anterior & posterior, reliqua quatuor à cerebro posteriori: sic enim in anatomia nuchæ secundum plurimum uisum est. A posteriori autem cerebro oritur nucha diuisa in duas medietates per panniculum subtilissimum, ne nocumētum unius partis communicetur alteri, & propterea accidit paralyfis in una parte, altera non læsa. Ab hac autem descendente per foramina. 30. spondilium, oriuntur. 30. paria neruorum, & quia à cauda oritur unum impar, erunt. 30. paria neruorum, & unum impar, quæ tendunt ad diuersa membra, ad dandum sensum, & motum uoluntarium. Sub cerebro sunt duo panniculi proportionati duræ matri, & pia matri, de quibus ante: ita ut hi panniculi undique cerebrum inuoluant. Eleuatis autem his occurrit rete mirabile, quod est in medio ossis basilaris è directo colatorii contextum textura fortissima, & miraculose duplicata ex arteriis subtilissimis, & adinuicem contextis, quæ sunt rami apoplecticarum ascenduntium, & in isto rete, siue in uenis ipsius continetur spiritus uitalis ascendens à corde ad cerebrum, ad hoc, ut fiat animalis, qui ut melius cōuertatur, est hoc modo ad minima diuisus in his arteriis subtilissimis: ipse tamen in uentriculis postea magis perficitur. Et hæc est una ex causis, quare rete mirabile positum fuit sub cerebro: est & alia causa, quia est dignum multa custodia, quapropter natura locauit ipsum in loco tutissimo: est & tertia causa, ut humiditates aliquæ à cerebro condensatæ ex uaporibus ad ipsum ascendentes, & cadentes super hoc rete, aliquam oppilationem causarent, quæ esset causa somni: & istud rete sustentant duæ carnes glādosæ factæ principaliter ad ipsum sustentandum, & replendum uacuitates, & ad sustentandum duas uenas ascendentes ad cerebrum, aut duas arterias ascendentes ad uentriculos cerebri. Ex his potes comprehendere unum modum apoplexiæ prouenientem, scilicet ex oppilatione huius retis, & arteriarum apoplecticarum ascenduntium, præter illam, qui cōmuniter euenit ex oppilatione uentriculorum cerebri, inter quos est difficile distinguere, sed de his in capite de apoplexia. Postea sequitur os basilare, quod est durius cæteris, tum quia debuit alia sustinere, tum ne putrescat cum submissum sit humiditatibus, à capite descendentibus. Hoc autem est diuisum in ossa petrosa, & narium, & oculorum, & duo ossa lateralia, quæ uocantur ossa paris. Et his liquet caput esse cōplexionis frigida, temperatæ in passiuus, propter cōplexionem humidam cerebri, contra operantē siccitati osium &

panniculorum, & quod potest pati omne genus agritudinis simplicis & cōpositæ. Hæc de anatomia capitis & neruorum sufficiant. Iam reliquum absoluamus.

De cephalæa.

Cap. I.

Irea hæc rubricam primo notandum, quod cephalæa, cephalalgia, sōda, & dolor capitis sunt termini synony mi significantes hanc dispositionem, de qua diuersi auctores sub his diuersis nominibus determinant. Ab Auic. namq; Io. Serapione, & Mesue uocatur sōda. Ab Alexandro uocatur cephalalgia. A Rasis, Haliabate, Conflātino, Pasionario uocatur cephalæa, quod κεφαλή græce dicitur, caput latine. Sed præter hos sunt termini dolorem specialem capitis importantes, sicut nux, ouum, passio, scilicet galeata, significantes dolorem totius, satis inseparabilem, consuetudinarium, ab omni fere causa facile excitabilem. Hemisphærica dicta ab hemi, q; est mediū & craneū, dolorē vnus laterū importat cōsuetudinariū. Et similiter hemipagia Homonopagia autem dolorē quartæ partis significat. Clausus uero est dolor fixus intensus paruam occupans partem, in profundum ad modum clauis caput penetrans. Quantum ad quid rei, dicit Auicenna, quod sōda est læsio in membris capitis, sed intelligendum est quod est læsio dolorosa in toto capite, aut partibus eius. Est enim dolor tristis sensatio tactiua rei subito & materialiter imprimētis. Et omnis talis est actio corrupta. Et hæc de quid nominis, & quid rei quantum ad rubricam.

Quando rubedo, & tensio, & grauedo in facie, et oculis cum dolore capitis affuerint, et tactus calidus sentitur, & pulsus fuerit magnus; ex cephalica facienda est phlebotomia in parte, in qua est dolor, uel in qua dolor magis infestat. deinde aqua rosata, et oleum ros. et acetum sumatur, et simul mixta agitentur, donec unum fiant: et super niuem infrigidata super caput fundantur. Aeger uero à carnibus, et uino abstineat, et comedat adesciam citrinam, (id est, cibus, qui fit de lentibus coctis, in quibus additur acetum, et parum croci) et tapfil, (id est, cibus, qui fit de lentibus coctis, cum aqua) et herbas frigidat, et fructus frigidos. Venter autem soluatur ex mirabolanis citrinis, et prunis, et tamarindis, et sacch. albissimo. quod, si ista non sufficiunt; semina maluanisci in aceto posita agitentur, quousque ad spissitudinem perueniant: de quibus emplastrum capiti superponatur ex psillio quoque, & aceto emplastrum fieri utile est.

SCHOLIA

Cum dolore capitis antiquus textus habet Cum istis; hoc est, cephalæa, & hemiprania: & rectius quidem: nam non omnis dolor capitis est cephalæa, & hemiprania teste Gal. lib. 11. med. sec. Ioca. non igitur eadem omnino causæ, signa, symptomata, & curationes. Donec unum fiant est in uetusto Rasis codice, & in Arculaui com. Donec inspuentur.

Diuiditur hoc caput in tres partes. In prima agit de cephalæa pendente à causa corporea. In secunda de cephalæa à causa primitiua. In tertia ponit quoddam remedium efficax & vltimum, ubi cætera non sufficerent: secunda ibi prope finem cap. Si autem cephalæa contingeret propter multam. tertia ibi. Si autem adhuc sōda perseverauerit. Prima adhuc in duas. In prima, agit de cephalæa per essentiam in capite. In secunda, agit de cephalæa per communitatem maxime à stomacho. secunda ibi. Quod si cephalæa quotidie. Prima iterum in quatuor. In prima, agit de cephalæa sanguinea. In secunda, de cholericæ. In tertia, de phlegmaticæ. In quarta, iterum redit ad ponendum quædam antidota conferentia, tam in sōda calida, quam frigida. secunda ibi. Si autem cum istis fuerit in pulsu velocitas. tertia ibi. Quod si cum sōda non fuerit aliquid eorum, quæ diximus. quarta ibi. In cephalæa uero, causa. Prima iterum in duas. Primo ponit signa cephalææ sanguineæ, secundo curam. secunda ibi. Ex cephalica faciendā non est phlebotomia.

Expositio literæ Rasis.

Sed nunc accedendo ad expositionem literæ Rasis. Rasis in prima parte breuitati indulgens ponit quinque signa cephalææ sanguineæ, innuens, quod quando dolenti caput affuerint hæc quinque signa, tunc lu. hæc cephalæa

Io. Arculani

A 2 pendet

pendet à sanguine. Primum rubedo in facie & oculis supple aliquid tendens ad fuscum & purpureum: talis est enim color sanguinis. Secundū tensio in eisdē partib. & oibus partibus dolentibus ppter præsentiā sanguinis illas partes replētis & extendentis. Tertiū grauedo manifesta sensata in illis partibus, pendens ab eadem causa. Quartum tactus calidus. i. manifesta caliditas in illis partibus sensata, tam ab ægro, quā à medico tāgente propter multitudinem sanguinis, & spirituum præsentiā. Quintum pulsus magnus maxime artiarum capitis, licet etiam de pulsu aliarum artiarum, qui cōmuniter sentitur, verificari possit, & hoc propter necessitatem auctam cum fortitudine virtutis, & obediētia instrumenti. Hic autem pulsus cum hoc, quod est magnus, debet esse plenus ob multi sanguinis præsentiā, & ex his literis sententia iam manifesta est. Quibus omnibus pro cōplemento addite urina rubeam, grossam, sanguini attestantem, nisi materia ad superiora moueatur, cerebrum apostematū. Item somnum longum propter multitudinem oppilationis, nisi vehementia doloris excitetur: non tamen profundum, cū materia non sit frigida viscosa, &c.

Causæ cephalæ & species.

Sequendo ordinem præmissum, in hac, vel circa hanc partem habemus inquirere tria. Primum, scilicet species & causas doloris capitis. Secundum signa. Et tertium prognosticum. Species enim & causas, Rasis breuitati indulgens breuiter pertransit, innuit enim solam vnicā distinctionem specierum dolorum capitis sumptam à causis, quia quidam dolor capitis est pendens à causa corporea, quidam à causa primitiua, sicut à sole, igne, balneo, odoribus, ebrietate, vento & frigore, & sic de singulis. Qui vero à causa corporea, est duplex, quia quidam per essentiā in capite, id est, pendens à læsione alicuius naturarum ipsius capitis, sicut complexio, compositionis, aut vnitatis: aut plurium simul, sicut est in apostemate. Et si à mala complexionē, aut simplici, aut composita, cum materia, aut sine materia, licet à mala complexionē humida sine materia non possit fieri dolor. Et si cum materia, aut sanguinea, cholericā, phlegmaticā, melancholicā, aquosā, ventosā, aut vaporosā. Et si à compositionē, aut ab una, aut pluribus specierum malæ complexionis. Et si à solutione continui, aut antiqua; aut recenti, simplici, aut composita, facta à causa intrinseca, aut extrinseca, & hæc solutio cōtinui aliquando pendet ex veribus existētib. supra stricaturam narium prope carunculas mamillares. Et si est ab apostemate, aut est sanguineum, aut cholericum, aut phlegmaticum, aut melancholicū, aut aquosum aut ventosum, aut mixtum. Et sit aut in substantia cerebri, aut in panniculis, aut uenis, aut in meatibus. Quæ uero per communatē, aut à toto, sicut in febribus, aut ab aliqua corporis particula, sicut à stomacho quod frequentius accidit, de qua Rasis in litera, aut ab intestinis, aut ab hepate, splene, renibus, uesica, matrice, aut à membris spiritalibus, aut mirach, aut partibus extremis. Quæ autē est per communatē, quandoque est cū periodis & paroxysmis, secundum periodos & paroxysmos causæ, quæ est in membro communicatē, sicut, quæ fit cum communatē stomachi, est propter effusio nem materierum cholicarum, & aliarum ad ipsum cum periodis, & sicut quæ fit cum periodis febrium. Circa quam distinctionem pulcherrimē notandum quod duplex est communitas. s. absoluta, & non absoluta. Cōitatem absolutam definit Auicē. prima tertij, tractatu secundo, cap. de speciebus sodæ per communatē, & est ut ad partem cerebri ex membro communicante nihil perueniat corporeum nisi ipsum nocuentum. Communitas uero non absoluta est, ut ad cerebrum ex membro communicante aliquid perueniat corporeum, ut materia, uapor, uentositas, aut spiritus. Exemplum primi, sicut dolor capitis pendens ex spasma, dolore iuncturarum, punctura, & similibus. In quibus ad caput non transit aliquid corporeum, id est, compositum ex materia & forma: ita quod neque vapores, neque spiritus, sed sola qualitas manifesta, aut occulta, sicut uenositas. Aut forte solū species intentionales, secundum aliquos, quibus male consentio, quia licet species intentionales doloris representent dolorem sensu cōi, aut uirtuti cognitui, attamen dolorem non faciūt, ut patet ex diffinitione doloris, in qua sumitur q

res materialiter imprimi. Aut forte nihil ad cerebrum peruenit, quod potest esse, primo, quia anima eadem existens in qualibet parte, dolens in una parte, dolebit etiā in altera parte ualde sensibili, cuius pars læsa facile cōmunicet, sicut etiā sentiuntur delitiæ in coitu, in toto corpore solū propter causam deliciarum existentem in capite virgæ: secundo, ut imaginemur spiritus, & membra alterari per partem, post partē, per species obiecti, seu causas doloris, dato quod nulla qualitas tangibilis in cerebro recipiatur, cui imaginationi difficulter assentio: unde stat hoc modo, in membro distante fieri per communatē dolorem per maximam sensibilitatem, licet non fiat in partibus intermedijs, quia forte non sunt ita sensibiles, aut ita colligatæ. Et nota quod membrum læsum per communatē etiam absolutam, frequēter tandem læditur per essentiā, aut quia membrum longo dolore debilitatum facile recipit superfluitates aliorum membrorum, aut quia per dolorem spiritibus resolutis debilitatur digestiua & expulsiua, unde nō bene conuertit nutrimentum, nec superfluitates, quæ in qualibet digestionē refecantur, debite expellit, & sic sequitur læsio alicuius suarum naturarum, & ex his inferitur esse dolorem in aliqua parte corporis, in qua non sit solutio continui, nec mala complexio. Sed circa causas notatē, quod causa immediata doloris est mala complexio, aut solutio continui, aut utraque, sicut in apostemate, licet secundum Auer. 3. coll. sola mala complexio sit causa doloris: qualibet autem mala complexio, siue simplex, siue composita, est causa doloris præterquam mala complexio humida, ipsa enim non facit dolorē, nisi sit cum materia mota ad solutionem, prima tertij, tract. 2. cap. 1. Causæ autem malæ complexionis calidæ sunt sanguis, cholera, phlegma salsum, humor factus calidus per putredinem, aut ebullitionem, & uapores ab his eleuati: similiter causæ primitiue calefacientes sunt sicut sol, ignis, unum potens, crapula, & similia. Causæ autem malæ complexionis frigidæ, sunt humores frigidi, & uapores inde eleuati, quibus non acciderit caliditas accidentalis. Malæ autem complexionis sicæ, sunt exiccantia sicut dies caniculares, motus corporei & animales, exuberans coitus, fluxus uentris. Causæ autem solutæ continuitatis sunt uapores, aut uentositates sui multitudinē extendentes, aut sui acuitate mordicantes, similiter materia multa replens extēdens, humor corrosiuus, percussio, aut casus, uermes generati supra stricaturam narium. Itē apostema in aliqua parte sensibili cerebri, siue calidum, siue frigidum, aut mixtum. Sed hic nota quod uapores qui frequēter causant dolorem capitis, quandoq; ascendunt per uias amplas, sicut per meri, aut cannam pulmonis: quandoq; per uias stricatas, sicut per uenas, arterias & neruos, unde in fine primi cap. de soda. Soda enim plurimum fit, propterea quia arteriæ afferunt capiti uapores fraudulentos. Et dolores isti per uenas deferentes uapores, facti sunt multum fortes & profundi, & magna aduertentia digni. Et notatē ex Auicē. quod omnia aromata calida siue frigida faciunt sodam, licet aromata calida curent sodam frigidam: & contra, frigida calidam cum succedunt sodæ, quod est uerum, nisi multiplicetur. Tunc enim replendo caput, & extēdendo faciunt sodā. Amplius secundo nota quod modi colligantiarum sunt sex sumpti ex Auicē. 2. primi ca. de cōplendis dispositionibus, & prima tertij tracta. ca. 2. de speciebus sodæ. Primus est ratione membri utriusq; communicatis & intermedijs, ut ostomachi cerebro mediantibus neruis reuerfius. Secundus, quia est uia & transitus de uno mēbro ad reliquum sicut inguem ab hepate in apostematibus cruris. Tertius, ratione uicinitatis sicut pulmo cerebro, & mamilla cordi. Quartus, quia unum est principium & radix operationis alterius sicut diaphragma pulmonis. Quintus quia unum seruit alteri, ut nerui cerebro. Sextus, quia colligantur uni tertio, ut renes & cerebrum hepatis, ideo inter se colligantur, similiter matrix, & diaphragma mediantibus neruis, cor, hepar, & splē communicant cerebro, mediantibus neruis, uenis & arteriis, &c. Soda autem facta à causa primitiua est multiplex secundum multiplicatē & multitudinē causarū primitiuarū, sicut soda ex uentis, & ex radijs solaribus, & soda ex odoribus bonis & malis, calidis & frigidis, & soda ex ebrietate, & ex percussione &c. Secunda di. sumitur penes intensiōē doloris,

loris, quia quidam intensus: de quo dicit Aue. q. obuias incipiti infantis leuia habentis ossa separat, & frangit cōmissurā, quidam medius, quidam paruos, ut in lethargia. Tertia sumitur à perseverantia, quia quidam continuus, quidam interpolatus. Quarta ab accidentibus, quia quidam perducit ad accidia mala, ut apostematā, spasmus, singultum, & quidam non. Quinta penes locum, quia quidam in substantia cerebri, quidam in panniculis intrinsecis, quidam in almodi, quidam in uenis, quidam in meatibus. Sexta penes facilitatem motus ipsius, aut difficultatem. His enim facile uenit sōda, qui habent debilitatem cerebri, & multam sensibilitatem, & mēbra digestiua debilia: cōtrariis cōtra. Septima quādā est sōda tēporalis, id est, chronica, quādā pauci temporis. Temporalis, fit pp phlegma, aut melācholia, aut debilitatē cerebri, aut apostematā incipiente indurari, aut iam indurata, & illud sepe uidi & ferē semper male tādē terminatur. Octaua, quia quādā coniuncta cum rheumatismis, quādā non. Et ex his iam primum absolutum fit, scilicet species, & causa doloris capitis, &c. Omīto dolores capitis, qui sumitur ab ipsa doloris essentia, quia de his agitur in sequētibz capitulis, qui dolores capitis sunt secundum plurimum grauatiui, extensui, pulsatiui, pūgtiui, aut perforatiui secundū diuersitates causarum ipsos facientium.

De signis cephalæ.

Signa quādā prognostica sunt. Primum signum est uirna sublingualis, aut liuida: si enim mingitur turbida, & remanet turbida, significat magnam ebullitionē à calore putredinali factam, & tunc dolor est, aut fit: si uero mingitur clara, & statim turbidatur, significat dolorem capitis futurum: si aut mingitur turbida, & postea clara fit, minoris est malitiæ, imò frequenter accedit vitio renū & vesicæ, & proprie cum fecerit residētiam, & fit turbida aliqñ via crisis, & est bonum signū, & maxime in pueris est signū infallibile super salūtē, ut ex longa practica uidi. Hęc oīa discutienda sunt 4. aphor. aphor. illo, Quibus in febribz uirna turbidat. Secundum signum est uirna alba, subtilis in feb. & maxime continuis, nō quidem in principio paroxysmi, sed post augmentum, & non sumpta imediate post cibū: significat enim raptū materiæ ad caput, & fortasse phrenesim, & hoc, nisi fit oppilatio, aut nisi materia ad aliud canale permutetur, sicut ad intestina factura fluxum ventris, aut ad cutim factura uariolas, aut ad aliud membrum apostemandum, sed secundū plurimum repit ad cerebrū. Vltimum signum cōe oī sōdæ materialis est fæx inuenta in naribus diuersos humores significās secundū varietatē coloris. Citrina quidem, aut uiridis significat choleram. Alba uero, phlegma, præcipue si fuerit sine pūctiōe & mordicatione. Siccatas aut narium sine grauedine capitis significat priuationē humois in capite superflui. Cum grauedine aut significat aut oppilationē in stricture narium, quod facile cognoscitur cū non possit per nares sufflare, aut raptum materiæ, & sic dolorem præsentem, aut futurū, aut impotentiam expellendi. Sed ueniendo ad signa causarū. Si fuerit à causa primitiua cognoscitur per præsentia, aut præcensionē ipsarum, & per effectus uerisimiliter ab ipsis derelictos, ut prima quarti de feb. ephemeris. Cognoscitur aut esse per essentia in capite, quia dolor est magis cōtinuus, & cōprehenditur latio alicuius naturarum cerebri, aut plurium, & erit cum reliquis operationibz cerebri nocumentū & tenebrositas in oculo, & nocumentū in alijs sensibus cum bonitate dispositionis reliquorū membrorum. Cognoscitur uero esse per communitatem, quia non ita continuus, & augetur & minuitur sē augmentū & decrementum nocumenti mēbri cōcantis. In quo signo est considerandū, cuius mēbri nocumentū primo incipit, & quod subsequutum est: primo. n. incipiens agrotare uerisimiliter alteri nocumentū cōicat. Cognoscitur aut pendere à mala cōplexione calida aut frigida sine materia, cū sensus manifesta caliditas aut frigiditas, &c. sine aliqua capitis grauedine, & est cū siccitate. f. narium, & si ibi est caliditas fortasse est rubedo oculi, & iuuatur frigidis. In frigida uero res est econtrario, & nō est in faciebz eorū extenuatio, neq; rubedo coloris, neq; dolor f. multus. Sic cam aut significat præcensio causarum exccantium, & augetur cum iteratione earum. Materiæ cōprehenduntur per hæc signa: Siquidem fuerit sanguis in causa, sunt quinque signa in li-

tera posita à Rasi, & superius declarata, quibus addendus est somnus, qui est longus propter vaporum multitudinem, nisi à uoluntate doloris impediatur: nō tamen grauis, aut profundus cū uapores non sint crassi, aut frigidi multum opprimentes, uirna crassa, rubea, purpurea, quæ oīa intelligenda sunt sanguine peccante magis in quanto quā in quali, &c. si uero peccaret in quali, hæc signa essent refracta sē inclinatio sanguinis ad aliquē aliorū humorū, & frequentius erit dolor in parte anteriori. Si uero cholera fuerit in causa, erit dolor acutus, mordacitius, pūctio narium, uigilia, color citrinus, parua grauitas, tactus calidus cum mordicitate, pulsus uelox, & non dixit magnus, quia uirtus debilior ceteris paribus, instrumentiq; magis inobediens, non in oculis, aut facie erit tensio, & sitis aderit, & frequentius erit dolor in parte dextra: Si fuerit à phlegmate, erit frigiditas tēporū, color albus, dolor obtusus, & magis pſeuerās, sēsus hebes, somnus pfundus, pigritia, destructio appetitus, uel debilitas, nauetia uia fatietas, quæ omnia facit phlegma sua frigiditate, humiditate, crassitie, uiscositate, & frequentius erit dolor in parte posteriori. Si fuerit melācholica: erit liuiditas faciei, siue plūbeitas, corruptio sensuum interiorū, perseverantia doloris, obtusus dolor, & frequentius erit dolor in parte sinistra. Itē signa uniuersalia sumpta ab ætate, cōplexione, sexu, regione, temporibus anni, consuetudine, arte, uel exercitio & similibz, uidentur secunda primi. In uentosa autem, & uaporosa minoratur dolor, aut non est grauitas, multiplicatur extensio, & fortasse est cum pūctiōe, aut corrosione, & quandoque est cum sonitu, aut tinnitu, & fortasse crescunt cum ea quidē multum. Et quandoque multiplicatur cum ea permutatio doloris de loco ad locum, & cum multiplicatur uapor, fit pulsatio fortior capitis, & imaginatur imaginationes corruptas & associatur ei scoromia & uertigo, & uidetur ismo quod eleuetur ad alta, & somniabit se uolare. Si uero sōda fit à solutione continui, declaratur per ipsam solutionem si extrinsecus apparet, & per causam primitiuam soluentem: Si uero non apparet exterius, declaratur per sanguinem, aut sanie egredientem. Si uero pēdeat à mala compositione, ipsa seipsam declarat, si exterius appareat: si uero non, redi ad signa cuiuscunque malæ compositionis, & cognoscitur per exclusionem aliarum causarū. Si uero sit ab apostematē, adfunt signa carabiti, aut lethargia, & ceterorum suo loco dicenda. Et dolor quandoque communicat usque ad radices oculorū propter motum neruorum oporiorum perforantium panniculos, & intensus dolent propter motum. & si nocumentum est in panniculis intrinsecis, tunc dolor est fortior: si uero in substantia, tūc dolor est obtusior grauius, aut extensius: si uero in panniculo extrinsecō, tunc magis dolet exterius. Signa autē facta ex uermibus in capite sunt corrosio fortis, & fætor oris, & fit sōda fortior cū motu, & sedatur in quiete, erit etiam aliquando pruritus in naso propter motū uermium. Si uero sōda fit per cōmunitatem à toto, sicut in febribz & crisis, crescit ipsis excrecētibus, decrescitq; ipsis decrescētibus, & remouetur cum remotione earum. Facta autem cum communitate stomachi significat angustia, nauetia, paucitas desyderij, malitia digestionis, & cetera nocumenta stomachi. & cum est per effusionem materiæ ad stomachum, est fortior, & cū uacuitas adest, & super somnum; & dolor stomachi si est ex cholera, excitatur cū uacuitas adest. & si est ex humore frigido est secundum plurimum minor in uacuitatē, & sedat ipsum fames, humor autem peccās in stomacho distinguitur per uomitum, & ructationē. Et multi quidem homines sunt qui cum comedunt, sedatur sōda, & illud significat effusionē cholerae ad stomachū, cuius signum, quia si cholera euomit sedatur dolor. Significatur etiā communitas ex parte doloris: dolor enim in ea quæ fit ex stomacho secundū plurimū incipit ab interiori parte scincipitis, & declinat ad medium scincipitis: deinde remouetur, & quandoq; est in parte posteriori propter situm meri posteriorē iuxta dorsum. Et illa quæ fit ex hepate declinat ad latus dextrum, & adfunt ægritudines epatis. Et illa quæ fit ex splene declinat ad latus sinistrum. Et illa quæ fit ex mirach declinat ad anteriora capitis ualde & quæ est causa marticis existit in margine scincipitis, & fit plurimū prius partum, aut post abortum, aut paucitatem menstruorum, aut retetionem

Io. Arculani

A

3

& ad-

& ad sunt signa ægritudinum matricis . quæ autem ex dorso , aut renibus , declinat ad posteriora ualde . Et uniuersaliter quæ est ex nocumeto alicuius membri excitatur , & augetur cum nocumeto illius membri , & decrescit cum decremto illius . Illa uero quæ fit à debilitate capitis , significat eius excitatione cū parua , uel qualibet causa , & est cū perturbatione sensuum , tam interiorum q̄ exteriorum , & inuentione nocumeti in operationibus cerebri , & cito repletur caput humidatibus . Et illa quæ fit ab acuitate sensus cerebri significat uelocitatem patendi etiam à parua causa , scilicet uocibus , odoribus , & reliquis : & cum hoc sensus sunt boni , & meatus mudi , & operationes cerebri non læsæ , & hæc cerebra sunt communiter cholerica , aut sicca tamen . Vltimo signa uiarum , per quas fit communicatio , sumuntur à loco materię & membro communicante . Nam uapores eleuati à materia existēte in stomacho transeunt per meria , à membris spiritalibus per Cannam pulmonis . Si materia contineatur in uenis , ut in febribus cōtinuis , communicatur per uenas & arterias : si materia sit in corde , magis p arterias si in hepate magis per uenas , si in diaphragmate & reliquis panniculis , & membris nervosis , communicatur magis per neruos & nucham , &c . Qui , nuchis siue galeatę pansionis species , & causę ex præcedentibus patere possunt , pendet enim ab humore malo , calido , aut frigido frequenter apostemantes : imò frequenter ab apostemate melancholico , aut duro , in panniculo intrinseco aut extrinseco . Et multoties causa remotior sunt ægritudines antecedentes , quæ debilitarunt cerebrum , & uelamina intrinseca & extrinseca , ut ledantur ex omni causa , uidelicet ex motibus paruis , qui sunt ex motibus corporis , cibalibus & uaporibus , & motibus extrinsecis . Et in summa , cā dispositiua est duplex . scilicet debilitas capitis , & acuitas sensus eius . Causa autē factiua sunt , quæ dicta sunt . Signa eius sunt , quia præter hoc q̄ dolor sit continuus , excitatur ab omni parua causa : ut motu , potatione uini , & receptione uaporum , & cum uoce forti , aut media : ita ut patiens odio habeat uocē , lumen , conuersionem cum hominibus , diligat solitudinem , tenebras , quietem , & resupinationem . & cum est in panniculo extrinseco , tangendo sentitur , sed in intrinseco tangendo non sentitur , & cōmatur usq̄ ad oculum , quoniam panniculus ille cōprehendit sup neruos opticos cōmunicantes oculo , cū ex ipsis generetur retina , & tela aranea . PROGNOSTICVM perducit frequenter ad mortem , aut cæcitatem . Hemisphærica & homonopagia sunt species , causę , signa , prognostica , sicut cephalæ , de qua superius actum est . Et grauitas existēs infra dolorem pēdet ab humoribus præcipue sanguineo , phlegmatico , melancholico . Soda phlegmatica sanguinea , cholerica , melancholica multiplicatur sū proportionem ad quatuor tempora anni . Quando autē fuerit meridionalis , pluuiosus , multiplicatur soda in hyeme . Soda continua prolongata frequenter perducit ad apostema cerebri , aut cæcitatem . Soda multoties resoluitur , si contingat ut egrediat in aure siue per aurē , sanies aut materia aquosa : soda in febribus cōtinuis , quæ nō allentur cū alleuatione febris , minatur phrenesim . Similiter soda cōtinua ad quam sequitur febris , cum prius non fuerit , transit in phrenesim .

De cura cephalæ .

Postis quid nominis , & quid rei , speciebus , & causis . Signis & pronosticis , &c . Iam ad quintum ueniendum est , scilicet ad curam . Rasis ergo breuitati indulgens , pro cura cephalæ sanguineæ , primo phlebotomat uenam cephalicam , ex parte ex qua est dolor , uel in qua dolor magis infestatur . ut si dolor magis infestatur in parte dextra , in manu dextra faciendū est phlebotomia , scilicet aut in curuatura brachii in parte superiori , aut inter pollicem & indicē licet hic sit ramus uenę communis & nō cephalicæ , ex Auicenna prima primi , doctrina quinta , scilicet de anatomia uenarū manuū . Et extrahitur sex aut octo uncie sanguinis , plures aut pauciores secundum exigentiam circumstantiarum consentiēte uirtute , ætate , & ceteris huiusmodi . Si autem sit in parte sinistra capitis , phlebotometur ex cephalica sinistra . Et si in ambabus phlebotometur ex ambabus . Secundo , super parte dolente , & partibus adiacentibus docet apponi medicamentum factum ex aqua rosacea , oleo rosaceo & aceto , similiter optime agitur & cōcusis ita , ut inspissentur , & super niuē ,

id est , ualde actu infrigidatis , in qua mixtura sit acetum sub quadruplum ad aquam rosaceam , & oleum . Ita ut exempli gratia sit aceti . 3 . s . aquę rosacę , olei rosacę ana . 3 . i . prius tamen capillis cū forfice abscessis applicetur petiæ lineę ueteres in hoc medicamine infusę , sepiusq̄ secundum exigentiam applicentur . Possent tamen aceti quantitas augeri , ubi quæratur maior repercussio . Tertio , docet debitum regimen , ut abstineat à carne , uino , & ceteris calidis , & sanguinem multiplicantes & uaporantes , & comedat ad esiam citrinam , id est , cibum qui fit ex lēribus coctis cum aqua , quibus additur acetum , & parum croci : & taphil , id est cibum ex lentibus solum in aqua coctis . Ponat autē in primo cibo acetum ad infrigidandum , & crocus ad cōfortanda uirtutes & spiritus & ut uirtus huius cibi ad caput dirigatur : est . n . huiusmodi materię digestiua , ita ut sit cibis & medicina modi , sed melius est , ut loco lentium ponatur kist ipsarū abiectis corticibus per expressionem in stamine . Et comedat olera frigida sicut lactucam , endiuia , & spinachia , & huiusmodi : & fructus frigidos , sicut poma , & pyra , & cidonia cocta , & proprie in fine mensę condita cū coriandris semicōfectis . Quarto , docet uentrem soluere , educendo materias communes , & etiam choleram , quæ possent esse causa inflammationis sanguinis & fluxus ipsius ad cerebrum cū mirobolanis citrinis , prunis , & tamarindis , & saccharo , quæ recepta sit secundum hunc modum . R . prunorum numero decem , tamar . 3 . i . mirob . citr . 3 . i . aut 3 . i . s . bulliat tamarindi , aut pruna in una lib . aquę ad consumptionē medietatis , & coletur . in qua aqua debite colata & calida mirobolani satis subtiliter absq̄ tamisatione contusi , infundantur per unam noctem : deinde fiat debita colatio & expressio , & cum medietate 3 . sacchari albi dulcoretur , & in matutinis exhibeatur : saccharum enim debet esse album trium coctarum cum saccharum rub . calidius sit melle , & exhibeatur iam celebrata digestionē cibi præcedentis . ubi autem quæratur maior lenificatio , diminutis , aut remotis mirobolanis possent poni mane 3 . i . aut amplius aut minus secundum exigentiam , & similiter casia . Quinto , docet apponere medicamentum infrigidantium partim repercussiuum , partim resolutiuum , ac doloris sedatiuum , quod committitur ex semine althę . i . malua uicif aut branca uisina , aut malua syluestris , quę idem sunt . Cuius de scriptio erit hæc R . seminis althę calidi cum æqualitate declinatīs ad siccitatem , quantum uolumus : uerbi gratia 3 . 4 . contundantur optime femina in mortario , & cum aceto debite incorporando fiat emplastrum aliquantulum liquidum , & super petiā extendatur , & parti dolenti frigidum applicetur : aut aliquantulum tepidum . Si quæratur maiorē resolutionē , & subdit quod ex semine psilli , & aceto possent fieri medicamentum simile . Sed aduerte , quod de bemus accipere mucilaginem psilli exeuntem siue tractam ex cortice non ex medulla , quia medulla est ulceratiua existens calida & sicca in quarto , pars uero exterior frigida , & humida in secundo . debet ergo poni in aqua calida , donec mucilago separetur per debitam confrictionem absque forti confrictione , quæ mucilaginem cum aceto misceatur , & administretur : sed hoc medicamentum magis conuenit in principio , & ubi magna infrigidatione opus sit . Ex his dictis Rasis quinq̄ elicimus intentiones curatiuas . Prima est sanguinis hunc dolorem facientis euacuatio ac diuersio . Secunda est malę complexionis calidę in cerebro infrigidatio ac sanguinis ad ipsum fluentis repercussio . Tertia est cholærę sanguinem acuentis & fluere facientis euacuatio . Quarta est infrigidatio & repercussio cum resolutione mixta tandem perueniens ad resolutiuam puram . Quinta est debita sex rerum non naturalium administratio . Et sexta subdit potest , scilicet accidentium correctio . Euacuatio quidem sanguinis debet esse prima , duabus conditionibus obseruatis . Prima , quod uenter non sit stipticus ac facibus repletus , in quo casu primo cum clysteri infrigidante , ac lenitiuo educende sunt . Secunda , quod dolor non sit fortissimus adeo quod ordinem curationis præuaricet . In quo casu si sedatione doloris inchoandum est iuxta can . quartę primi . Cumq̄ ad diuersum trahere uolueris , dolorem illius membri prius sedare . Quod faciendum est secundum præcepta Auicennę , quarta primi capite tertio , aut cum remouentibus causam , scilicet malam complexionem cal . cum infrigidantibus , sicut oleis , & succis , de quibus

bus inferius. aut si sit propter solutionem cōtinui à sanguine mordicante aut extendente, ponatur ea quæ leniant, dilatet, poros aperiant resoluendo, ut materia non in loco angusto concludatur fortius soluens continuum; non tamen eū multa caliditate: sicut mucilago malua uisci, seminis lini, & psyllii cum oleo rosaceo, & chamæmelino, & similibus debite tepefactis. Aut si hæc non ualeant, fiat cum anodinis secundū plurimum; sunt enim dilatantia poros, & confortantia calorem naturalem ratione suæ similitudinis: qui est principalis & efficax curator omnium ægritudinū. Et tertio, si hæc duo genera non sufficerent, fiat sedatio cum stupefacientibus, sed cum timore & cautela, incipiendo à leuioribus, & magis exterius applicitis, quàm in caput purgiis, aut interius sumptis aut in aures distillatis. Potare autē ea inter cætera deterius est, licet exterius applicita magis partem oppilent, & materiam amplius in uno loco concludant. Sed circa phlebotomiam aduerte. Si corpus fuerit plenum, scilicet sanguine, secundum ambitum totius, & eū hoc notabiliter fluat ad caput, aut in causa fuerit retēcio mentiuorum, aut hæmorrhoidarum, ex saphenis primo faciendā est phlebotomia: deinde si sanguis fuerit adhuc calidus & multus ex basilica lateris eiusdem partis, aut uena communi: tertio ex cephalica: quarto ex uena frontis dolore existente magis posterius: aut loco ipsius sanguis ex naribus prouocetur, aut naribus sanguis fuga applicetur. Si uero dolor fuerit magis anterior fiat phlebotomia ex uenis nuchæ ubi collum capiti cōiungitur: aut ventosatio ibidem, aut in spatulis: aut sanguifugarum in his locis applicatio. Et si magis declinat ad dextram, phlebotomentur uenæ post aurem sinistram: & contra, si declinat ad sinistram: phlebotomiam autem uenæ nasi credo magis conferre ad euacuandum sanguinem contentum in parte anteriori, & similiter phlebotomiam uenarum labiorum: licet aliter diuertat. Phlebotomia autem paruorum uenarum in cute capitis existentium euacuat sanguinem cōiunctum sibi proximum. Verum, si illæ phlebotomiæ fieri nō possunt propter ætatem & alia huiusmodi, sanguisuga in locis ipsarū apponantur, quamquam Auenzoar non dubitauerit phlebotomare puerum suum triennem, qui phlebotomia illa euasit. Phlebotomiam autem uenarum guidem, nunquam ausus sum facere, uerum in magna plethoria capitis, & in casibus extremis, sicut in apoplexia sanguinea, & in apostemate sanguineo, credo, quod nulla phlebotomia sit magis prompta ad succurrendum. Si autem magna sanguinis repletio sit in toto, sed tamen non in fluxu ad caput: phlebotomia uenæ communis est inchoandum, aut eiusdem lateris, aut contrarij sibi maiorem aut minorem plethoriam, aut sibi quod queritur maior aut minor diuersio. Deinde ad cephalicam & cæteras per ordinem, ut supra, ueniendum est: imò nota, quod etiam in cephalæ immateriali corpore existēte plethorico, phlebotomia cōuenit. Rasis autem præcipiens phlebotomiam cephalicæ eiusdem lateris loquitur in casibus cōmuniter contingentibus, in quibus non est magna repletio. Ceteræ autē diuersiones continuari debent, maxime facta phlebotomia, de qua dictum est, sicut frictions, ventosationes, si ne scarificatione, ligaturæ, quæ omnia fiant descendendo, incipiendo à partibus propinquis tendendo ad remotas. sed inter cætera memor esto lotionis crurium cum aqua calida. diuersiones autem, quæ sunt cum euacuatione, e contra incipiunt à remotis, & redunt ad propinqua. Memora etiā uniuersales euacuationes semper debere præcedere particulares, nisi ubi non adesset repletio in toto, neque in aliquo membro sibi materiam communicare potente, &c. Secunda autē intentio perficitur cum medicinis, quas Rasis superius posuit, ex aqua rosacea, oleo rosaceo, & aceto: cui intentioni accommodatur postrema eius medicina ex psyllio & aceto, cum magis opus esset infrigidare. & loco supralcripto, si nō habeatur, applicetur succus plantaginis, succus uirgæ pastoris cum modico aceto: & succus lactuæ, si adesset uigiliæ, & si opus sit magis infrigidare, succus solatri, semper uiuæ, & huiusmodi. Hæc tamen conueniunt obseruatis quibusdam conditionibus. Prima, quod capilli cum forficibus præabscindantur. Secunda, quod applicentur super cerebro anteriori, & in loco commissurarum, non autem posteriori, quia multum frigidum est, & est locus originis nuchæ. Sed po-

ne quod materia calida sit ibidem, quid sciendum? Dico quod debemus stare contenti uniuersalibus, & si opus est aliquid applicare, applicetur oleum rosaceum, aut aliud simile non multum frigidum, & tamen super parte anteriori applicentur, quæ dicta sunt. Inuabunt enim ad remotionem caliditatis in parte posteriori. Tertia, est gradus medicinæ, ut sit proportionatus gradui ægritudinis, uirtuti, naturæ membri secundum ipsius situm, dignitatem, &c. quarta primi colligenda, capite. 1. Quarta, ut sit mēbris secundum omnes suas uirtutes confortatiua, etiam proprietate sua occulta, siue forma specifica. Quinta, ut stipticitate saltem in principio participet. Sexta, ne modus substantiæ poros oppilet resolutionem prohibens, sicut lac. Ex quibus inferitur huiusmodi medicinas nō semper actū frigidas applicandas, ut cum uirtus est debilis, calor naturalis paucus: imò sunt aliquando cum aliquo permiscenda, sicut cum pauco croci aut uini odoriferi. Sunt tamen casus tres, in quibus non conueniunt huiusmodi frigida. Primus casus ubi multi uapores, & crassi essent in capite siue à toto communicati, sicut in febris materia libus, & præcipue pendentes à materia crassa. Sodā enim calidam in febris multiplicat usus epithematum uapores exire non permittentium. prima tertii. ubi tamen uapores essent subtiles, acuti, sicut in tertianis puris; inueni huiusmodi frigida optimè conferre: in hoc autem casu sunt frigida odoranda, & per nares trahenda, sicut acetum, aqua rosacea, & similia. Similiter quā ab aliquo mēbro huiusmodi uapores capiti communicarentur, & similiter quādo essent incapite cōgelati. In quo casu cum medicinis anodinis facientibus ipsos euaporare esset procedendum, sicut decoctione anethi, florum chamæmeli, rosarum, & similia. Secundus casus ubi soda cōiungeretur rheumatismo. In quo casu euacuationibus, & diuersionibus, de quibus supra esset procedendum, & cum odoratis contrariis discrasia. Tertius casus, ubi caput esset repletum, ipsius enim euacuatio hæc localia debet præcedere. Tertia autem intentio, scilicet euacuatio cholæræ permixtæ cum sanguine completur cum his, quæ superius dicta sunt: qui canon ampliandus est ad euacuationem phlegmatis, melancholiæ, aquositate, aut plurium, si sanguini permixti forent cum his, de quibus infra dicitur. Quarta autem intentio complicans repercussionem, & resolutionem complenda est cum his, quæ in textu dicta sunt, & quanto magis ad statum proceditur, resolutiua super repercussiuā augenda sunt: in declinatione autem sint pura sicut in apostematibus præcipitur. Et ex his, quæ optimè ualent ad resolutionem uaporum, & materiæ siue apostematis siue non, est pulmo agni uel arietis incisus & aquatus secundum exigentiam partis cui applicatur: qui ita calidus sicut extrahitur ab animali euiscerato applicetur, aut infundatur in aqua calida, & expressus capiti applicetur. Sed melius est ut infundatur in aqua calida decoctionis florum chamæmeli, meliloti, rosarum, uolarum, anethi, & similia, & applicetur ut supra: cum hoc enim quod resoluere est doloris sedatiuus. & ad hanc intentionem laudantur catuli, & pulli columbarū per mediū incisi, & ita calidi caliditate sua naturali applicati: in quo casu huiusmodi remedia essent frequenter permutanda, facile enim putrescunt & olent, & tunc magis nocerent, quàm prodesse. Sed melius fuisset, ut ex secunda & quarta intentione una fuisset facta ambas completēs. Quinta autem intentio, scilicet debita administratio sex rerum non naturalium, licet debeat sequi iuxta textus seriem, cæteris tamen postponenda est, cum ipsa ordinanda sit secundum exigentiam aliarum. & propterea melius est, ut Correctio accidentium sit in ordine quinta, quæ completur curadō præsentia ab imminentiis præseruando, ut si adsit inflatiō uigiliarum & similia, curentur, & si timeantur futura, præferuntur, sicut aduentus apostematis, cæcitas, & similia sibi ea, de quibus in sequentibus capitulis ageatur. Sexta autem intentio, scilicet debita administratio sex rerum non naturalium completur sic. Eligatur aer moderatè frigidus, & temperatus in passiuis, aut declinans pariter ad siccū, boni odoris, priuatus uentis, fumis, & uaporibus extraneis: sit autem eius frigiditas maior & minor sibi gradum ægritudinis, cui debet apponi, cui etiam uirtus consentiat. & sit magis aut minus luminosus, sibi dispositionem uirtutis, & spirituum, &

Io. Arculani A 4 uarie-

uarietatem accidentium consequentiū. Si enim sit pronitas in suberh, debet esse luminosus: si uero in uigilias, obscurus: neque in loco habitationis sit hominum frequentia, neq; strepitus. Potus eius sit diminutus, & similiter cibus. bibat aquā coctam aut simplicem, aut cum pauco saccharo, aut cum pauco uino granatorum: uinum enim non conuenit nisi in declinatione, & sit pauciferum, cisiolum, aut album, optimè lymphatum: cibi autem sint frigidi saltem potètia, & melius est, ut ad sicum declinent, sed econtrario in cholerica ad humidum, & sint pauci nutrimenti, & boni, & non sint uaporosi, quapropter sint facili digestiōis. Verum ubi timeretur rapidus materiæ cholericæ ad stomachū, sint stipici, neq; in hoc casu ager sit famelicus. Ex conuenientibus autem in sanguinea, & cholerica sunt endiuiā, portulaca, lactuca, atriplex, spinachia, ferculum ex cresta, panicum, & milium, panis lotus, prāsana hordeacea, & huiusmodi abstineat a carnibus & ouis, nisi in declinatione. Et tunc pulli parui, & cetera huiusmodi maximè cū cresta, & uino granatorum poterunt exhiberi, cum quibus etiam & uino limonium, citrium, aranciorum, & c. etiam sua cibaria poterunt condiri. & in fine mensæ conuenit aliquid pyri, aut cotonea, cocta aut confecta, aut coriandra confecta, & hoc idem regimē conuenit in cholerica, sed magis declinet ad humidum. Multitudo somni cōmunitur cōfert in sōda, & maior sit in cholerica & melancholica, quā in sanguinea, aut phlegmatica, & sit capite eleuato, & non supinè iacendo, & dormiat bene coopertus sū partes inferiores. Caput uerò non teneatur multum calidū, ut humores, & uapores nō repant ab inferioribus ad superiora. Circa inanitionem, intellige generaliter in omni capitis dispositione uentrem debere esse lenem propter educationē materierum communium, quæ suis uaporibus nocumentum inferunt: secundo, quia paratur uia naturæ ad expulsionem superfluitatum: tertio, quia melius perficiuntur operationes naturales: similiter uix urinales teneantur apertæ cum seminibus communibus, aut alijs calidioribus in alijs materiis, secundum exigentiam ipsarum. Et similiter frictions descendendo conferunt ad uaporum diuersionem, & resolutionem, & etiā euacuationes omnium superfluitatum capitis per nares & palatum, modo fiant cum facilitate, & c. Frictions tamen fortes capitis nitentur, leuis pectinatio comperit, uomitum multum nocet in omnibus passionibus capitis, nisi adsit ægritudo per præsentiam materiæ in stomacho. Coitus similiter secundum plurimum nocet, nisi in corporibus coitui assuetis sit præsentia multi spermatis, nam tunc posset cōcedi, sed fiat raro & cum facilitate. Exercitentur membra inferiora, caput autem quiescat: frictions autem corporis descendendo, quarum quidem secūda sit fortior prima, optimè cōferunt præcedētibz euacuationibus uniuersalibus, de quibus supra, & feb. non existente forti, similiter effusio aquæ calidæ super extrema. Sit quietus quantum est possibile secundum omnia animi accidentia, unde caueat a furore, ira, uoce clamosa, sonis fortibus, fulgoribus, & huiusmodi.

De cura Cephalæ prouenientis à cholera.

Si autem cum istis fuerit in pulsu uelocitas, & in tactu sentitur caliditas; sed neq; in facie, neq; in oculis fuerit rubedo, nec tensio: in principio soluitur uenter: deinde fiant ea, quæ diximus. naris autem oleum iniiciatur uiolatum, uel oleum cucurbitæ dulcis, aut nenupharis oleum, aut oleum de floribus salicis: quorum quodlibet super niuem in frigidum capiti superfundatur. & nutriatur, ut diximus. Ager uerò odoret camphoram, & aquam rosarum, & salices, & uioles, & his similia. quod, si ægritudo multum inualescat, sumatur ꝑ opij, & camphoræ uniuscuiusq; quātum ponderant duo grana bordei: quæ dissoluta in oleo de salicibus mittantur in nares, & aures.

SCHOLIION

Opij jñ codicibus nuper impressis mēdoza est ut (Herculanus ipse, & Rā sū exemplar testatur) lectio: opij enim loco habetur oleum.

In hac parte ponit curam cephalæ prouenientis à cholera. Et primo, ponit signa, scilicet uelocitatē pulsus & caliditatem in loco doloroso sensatam cū priuatione rubedinis, tensionis, & aliorum san. significantium, de quibus longo ser-

mone superius actum est. Secundo, ponit curam: primo, per solutiua iam superius posita & declarata: secundo, per ea quæ in nares iniiciuntur, sicut oleum uiolaceum, frigidū & humidum in primo, oleum cucurbitæ dulcis, frigidum & humidum in secundo, oleum de floribus nenupharis, frigidum & humidum in tertio, oleum de floribus salicis, frigidum & humidum in primo, quorum quodlibet singulariter aut etiam plura simul mixta possunt iniici in naris, cuius simile est de auribus est intelligendum. Hæc namq; sunt frigida & humida, caliditatem & siccitatem à cholera impressam remouentia. Et hæc eadem actu ualde frigida super parte dolente applicanda sunt, licet in auribus & naris iniecta debeant esse tepida. Tertio, curat per odores frigidos: docet enim odorare camphoram, aquam rosaceam, salices & uioles, quorum fumalis euaporatio singulariter aut mixtim sua frigiditate & humiditate discrasiam calidam & siccam remouet, licet camphora sicca sit. Quarto, his non sufficientibus docet accipere opij, camphoræ, añ. gra. 2. quæ dissoluta in oleo de salicibus in aures & in nares iniiciantur, ut dolor per membra stuporem remoueat: hæc namq; frigida sunt, opium in quarto camphora in tertio, doloremq; stupefaciēdo tollunt. Ex quibus duas elicimus intentiones curatiuas. Prima choleram euacuat aut diuertit. quæ intentio complenda est cum his de quibus actum est superius. Sed pone simul cholera & sanguinem esse in causa, aut alium humorem cholera permixtum. Quid agendum est? Dico quod si sanguis, aut cholera, aut alius humor æqualiter concurrunt: aut si sanguis dominetur, à phlebotomia tunc incipiendum, postea cholera euacuanda. Si uero cholera dominetur, aut alius humor, tunc aut sunt permixti cum sanguine apti educi cum sanguine, & tunc à phlebotomia est incipiendum. Si uero nō sunt permixti nec apti educi cum sanguine ab euacuatione humoris dominantis cum pharmacia est incipiendum, deinde sanguis inueniatur, præterq; in apostemate, in eo enim à phlebotomia saltem diuersua secundum plurimum est inchoadum. Ita dico de quo cumq; humore cum sanguine peccante. Si uero alius humor cum cholera peccet, ambo simul euacuandi, & ille magis qui dominatur. Si uero cholera æqualiter cum aliis dominetur, magis cholera euacuanda est: quia de ea habetur maior suspitio & est ceteris paribus euacuationi paratior. Idem dico de alijs humoribus inuicem permixtis: semper magis dominas & digestior, & de quo magis timetur, est magis euacuandus. Digestiua tamen melius est præmittere saltem euacuationi eradiciuæ, licet euacuatio minoratiua, & maxime cum lenientibus præmittenda sit: postquam debent sequi digestiua qualia sunt syrupus uiolaceus, de endiuiā, de portulaca, de nenuphare, de papauere, oxyfaccchara, syr. de granatis, de limone de citro. Sed hæc cū aquis frigidis & humidis temperanda sunt, & maxime ducentibus uirtutem eorum ad caput, sicut aqua uioacea, nenupha lupulorum, licet non sint humida. Potest autem unum ualde proprium sic componi. & sem. cōmunium frigid. 5. 2. florum uiol. ros. nenupha. añ. 3. 1. endiuiæ scariolæ, lactucæ añ. M. 1. summitatum papa. al. 3. s. uini grana. 3. 4. cum sac. albissimi lib. 1. fiat syr. decoquendo supra scripta in aqua lib. 4. donec medieta consumatur, postea colet debite exprimendo, & addatur saccharum & uinum grana. & fiat syr. longus pro duabus uicibus. Reliquū abbrevietur. & postquam abbreviatum est, postea cum aquis distemperatum, de quibus dictum est, sumatur. Si uero cholera crassa fuerit, syr. sint oxyfaccchara, acetosus simplex, endi. bysantinus, acetosus cōpositus sumpti cū aquis endi. lupulorū, cicchorii & huiusmodi. Solutiua autem sunt suprascripta, quibus sū opportunitate addi possunt electarium suc. ros. diaprunis solutium, electarium de pli. Et si pilulas maluerit sine custodia, sint pilulæ alseiaret, minoratis tamen masti. & hiera, & confectis cum aqua rosacea, aut electarium suc. ros. Cum euastodia uero, sint pilulæ aureæ. Secunda intentio malam complexionem calidam & siccam in cerebro corrigit, caput confortat, ac cholera repercutit cū his, quæ dicta sunt ꝑ Rasim, quæ frigida actu fronti, tēporibus, & cōmissuræ coronali applicentur. Et præter hæc sunt succus lactucæ, sēperuiui, solatri, & harū decoctiones addēdo papauer, flores nenupharis, & mucilaginé pilii, usq; ad se. hyoscy. alb. cū adeit infatitia uigiliari. Et tūc nō ponatur acētū, nisi forte modicissimū ad penetrandum.

penetrandum. Si vero non adfit instantia vigiliari, addatur acetum pro sexta parte, aut salte octaua. Et hec intentio perficitur cum odoramentis, de quibus Rasis. Et quoru est hec descriptio. R. florum violaru, florum nenupharis, foliorum salicis. ana .j. s. ros. rub. .3. 2. camphoræ .j. s. Fiat magdaleon cum aqua rosacea, & sepe odoretur. Aut bulliant in aqua rosacea, & in aliquo vase reponantur. Aut his puluerizatis & cum dragagaro mixtis, aut gummi arabico fiat sicut pomum. Et vltimo, his non valentibus, sedetur dolor, & vigilia, cum stupefacientibus, de quibus Rasis in litera. Et debet duæ gutte illius liquoris tepidi pro quacunque aure imponi, et aliquid huiusmodi naribus fugatur. Sed nõ diu in auribus permaneant, ne suo stupore nocumentum auribus inferat. Et ad hoc valet præcipue cum adesset instantia vigiliarum, requies, descriptio Nicolai, & alia huiusmodi. Sed si stupor induceretur, dissoluatur casia lignea, & crocus cum oleo de costo, & in aure stupida aliquid ponatur, aut naribus fugatur. Cui parum vini optimi addi possit. Callorem vero, theriaca antiqua, & uinum potens corrigit nocumenta narcoticorum. Sed à minus calidis inchoandum est. Tertia autem intentio. f. accidentium correctio perficiatur secundum ipsorum exigentiam, ut puta uigiliæ, cum his, quæ dicta sunt. A reliquis aut præseruetur, ut inferius in propriis capitulis. Quarta autem intentio. f. regimen sex rerum non naturalium perficiatur, ut supra in sode sanguinea. Sed in cholerica, frigidiora & humidiora conueniunt, & somnus prolixior. Et hæc duæ intentiones duabus primis ex textu eliciendis adduntur pro complemento cure.

De cura cephalææ prouenientis à phlegmate.

Quod, si cum prædictis ægritudinibus nihil eorum, quæ diximus affuerit de rubedine in facie: & fuerit ægritudo antiqua; in principio venter cum pilulis cochis solvatur, quas ego feci. Confectio pilularum cochiarum. Rec. pulueris picæ drach. 10. colcyntidis drach. 3. et tertiâ, scammonie drach. 2. s. turbit, stœcados an. drach. 5. fiant pilule ex istis. & sint doses. 10. postquæ verò venter solutus fuerit, infundatur caput ex oleo sambacino, et oleo de ben, & mittatur in nares. Aeger quoque odor et algidiam, & insusfleuerit muscus naribus. quod, si ægritudo multum infestauerit, sumatur euphorbium, et castoreum amborum an. 6. pars drach. 1. & dissoluta in pauco oleo sambacino mittatur in nares, & aurem.

Ponit curam cephalææ phlegmaticæ. Et primo per medicinas educentes phlegma, secundo cum alterantibus malam complexionem, frigidam, & humidam cerebri, & phlegma resoluētibus, cum medicinis localibus loco dolenti applicatis odoratis, & in nares, & in aures iniectis. Prima medicina solutiva est pilula cochis: cuius est hæc descriptio. Rec. pulueris hierapii. scilicet simplicis Gal. compositæ ex mastiches, spicæ nar. carpobalsami, assari, croci, xilobalsami, castiæ lig. an. 3. vna, aloes duplum ponderis omnium, de hac hierapii. accipiantur drach. 10. Est enim calida & sicca circa secundum gradum, & posset fieri liquida in modum electarij addendo mellis quantum sufficit, ut pura, pro. 2. j. pulu. & dimidia lib. vna mellis: & sic ea frequenter vimur, maxime in clysteribus, & posset ea exhiberi p. os. j. p. vice, & euacuat phlegma & cholera. Secunda medicina ingrediens hanc receptam est colocynthis, calida & sicca in tertio, euacuans phlegma crassum à cerebro & nervis, & locis remotis, licet etiâ cholera pro parte euacuet, cuius ingrediuntur. 3. tres & vna tertia. Tertia est scammonia calida, & sicca in tertio, attrahens cholera cum fortitudine, cuius ingrediuntur. 3. ij. & s. Quarta est turbit calidum in tertio, euacuans si confortatum sit cum zingibere & similibus, phlegma crassum à capite & nervis & iuncturis. Si vero non confortatum sit phlegma aquosum, cuius simul cum stœcade calido in primo, sicco in secundo, euacuante phlegma & cholera, debiliter tamen, & secundum aliquos melancholia accipitur ana. 3. v. Ex quibus hæc medicina phlegma à prædominio, & cholera subdominater euacuare comprehenditur. De quo forte quis mirabitur cum sit propria in sode mixta ex phlegmate & cholera quomodo conueniat in pura phlegmatica. Præterea propter admixtio-

nem scammonie acceleratur operatio eius antequam medicina tarde euacuantes phleg. compleant operationem, euacuabunt itaq; chole. & non phleg. Et hoc manifeste est contra præceptum Auicennæ quarta primi capituli, de quando et qualiter euacuari oportet, dicentis quod non sunt admiscenda medicina diuersa in uelocitate, & tarditate diuersos humores euacuantes, una enim complebit operationem antequam altera incipiat. Ad quod dicitur primo Rasis hoc fecisse, quia humores peccantes cum ad aliquod locum defluunt siue apostemandum, siue non, raro sunt puri, imò plurimū adinuicem permixti, sicut & in uenis sunt permixti, præcipue cholera cum alijs miscetur, cum sit ad fluxum paratissima, imò sit aliorum uehiculum. Et propterea semper, uel fere semper est ipsius euacuationi intendendum, eito quod ipsam manifeste peccare non uideamus. Et credo quod hæc sit melior responsio ea, quā communiter dant expositores, dicentes, quod hæc posita est, ut sit calcar aliarum medicinarum, nõ enim in tanta quantitate deberet poni. Et ad obiectionem simul cum autoritate Auicennæ dicitur: quod ipsa scammonia nõ complet operationem suam antequam aliq. imò accelerat operationem aliarum, cū aliæ notabiliter sint dominantes, & proprie, si illæ medicina diu steterint adinuicem, & sint aliquantuliter fermentatæ, & proprie cum etiâ aliæ medicina satis cito suam uelocitatem operationem. Et dicit quod sunt doses decem. Ex quo comprehendere potes hoc solutiuum pro quaq; uice esse forte ualde, quia si bene cõputes, erit unaqueq; dosis. 2. 3. & fere dimidia, cum tamen experiamur. 1. 3. notabiliter operari. Quare ibi consulo, ut sis contentus communiter. 3. 1. Homines. n. suæ regionis sunt robustiores nostris. Secundo, docet remouere malam complexionem frigidam, & phlegma resolueret, caput infundendo ex oleo sambacino. Et est oleum iusfamin, & non est factum ex floribus sambucis, secundum quod arbitrantur expositores. Sambacus. n. est nomen deductum ex Arabico sambac. Sambac autem, apud Arabes præcipue est semen iusfamin, & est arbutum quoddam quod semper uirescit, calidum & siccum in tertio. Ben uero est semen rub. calidum & siccum in secundo, & oleum eius dicitur oleum muscellinum, & Dio. uocat hoc granum balanus. Ben uero sunt radices cordiales, unde in receptis scribitur been albū & rubeum. Et ex his oleis est aliquid in aures & nares iniiciendum, quod saltem bis in die debet permurari ne putreat primum sufficienter extrahendo. Deinde docet odorare algidiam, aliter galliam medicinam ualde redolentem, quia cum ipsa miscetur ambra & muscus. Sed odoratur pauca quantitas, quia multa uidetur foetere, & propterea naribus muscus insufflatus sit in modicissima quantitate. Et tandem ægro multum infestato, dissoluatur euphorbij, & castorei. an. sexta. 3. 1. in oleo sambacino, & iniiciatur in aures & nares, quod intelligatur de aures sequente dolore, & in parua quantitate, est enim medicina calida in quarto, ualde alterans, non ergo conuenit, nisi mala complexio frigida multum excedat. Nec mireris, organum. n. auditus fortes sit stinet medicinas, sicut testatur Gal. 6. de interioribus in capite fractura crani, & docet experientia. Ex his possumus elicere quinque intentiones curatiuas sode phlegmaticæ. Prima euacuat phlegma. Secunda diuertit. Tertia malam complexionem frigidam corrigit. f. phlegma à quo dependet resol-uendo & caput confortando. Quarta corrigit accidentia. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum nõ naturalium. Prima quidā integranda est ex minoratiuo digestiuo & eradiciatiuo. Minoratiuum à quo inchoandum est, materia existere multa, est sicut pilula ex hiera simplici, alephaging, quibus pro medietate potest addi agaricus in oxymelle scyllitico præparatus, ita ut ex his exhibeatur drachma una cum uadit dormitū. Et si uellet medicinas liquidas, exhibeatur hieræ simplicis G. j. 1. aut hieræ cõpositæ eiusdē. j. s. aut. 3. tres, diaphinicon, aut tantundem electarij indi, quæ distemperari possunt cum aqua decoctionis, aut distillationis betonice, aut hyssopi, aut maioranæ, aut stœcados arabici & similibus, ut amplius uirtus ad caput dirigatur. Digestiuum autem sit duplex secundum materiam phlegmaticam facientem sode. Quædam enim est crassa, uiscosa. Quædam subtilis facile rheumatizans. Pro digestionem primæ, conuenit oxymel simplex, oxymel compositum, oxymel scylliticum. f. de stœca-

dos,

dos, distēperata cū aquis decoctionis aut destillationis, steca dos arabici, hyssō, betonicæ, maioranæ & similiū. Sed cōponi potest syr. ad hāc intētiōē secūdū hūc modū. R. acori, ciperi an. 3. unā, aristolochiæ rot. 3. 2. interioris scyllæ. 3. 1. utriusq; saluic, cētauræ minoris, foliorū lauri, betonicæ. an. M. 1. anī si marathri, sem. silecos, basiliconis, an. 3. s. liquiritiæ, passul. mīdatarū ab arillis, utriusq; stecados, florū anthos, id est, roris marini. an. 3. 2. al. 3. 1. mellis, sacchari, ana. lib. s. fiat syrupus secundum artem. Et si materia fuerit multum frigida, possunt addi species cubebæ, garioph. piperis an. 3. 2. & fiet calidior & delectabilior, & potest fieri syr. lōgus pro tribus uicibus reliquum abbreviari, & sumatur cū aquis supra scriptis: si uero phlegma sit subtile rheumatizans, utatur hoc syrupo. R. foliorum cupressi, saluicæ. an. M. 3. mastichis, olibanī. ana. 3. 1. nucis musc. nucis cupressi, ana. 3. s. ligni aloes 3. duas, mellis, sacchari. ana. lib. s. fiat syrupus longus ut supra pro tribus uicibus reliquū abbrevietur his & similia magis aut minus calida à te poteris comprehendere. Eradicatīna autem sine pilulæ cochīæ, de quibus Rasis in litera, quarum communiter exhibetur. 3. 1. cū dimidia hiera composita G. hieralogodion & his similia. Turbith uero non confortatum edicit magis materiam aquosam siue phlegma subtile. Secūda intentio præter diuersiones communes cum frictionibus uetofationibus, ligaturis, lotionibus, completur quatuor generibus diuersionum, primo clysteribus, secundo caput purgiis, tertio masticatoriis, quarto gargarismatibus. Clysteria uero sint huiusmodi. R. saluicæ, hyssopi, maioranæ, stecados arab. ana. M. 1. centa. minori. 3. 3. colloquin. 3. 1. s. agarici in petia ligati. 3. s. salis gemmæ. 3. s. bulliant in sex lib. aquæ ad consumptionem medietatis, post eorum debitam cōfusiōē, cuius decoctionis accipiat lib. una, olei communis. 3. 3. fiat clystere, & si opus est ipsum fortificare addatur hiera cōposita. G. hieralogodion, aut huiusmodi. Secundus modus diuersionis perficitur per caput purgia, sicut aqua siue succus sampuci, & est leuis, & expertus. Et fortior est si huic addatur succus artanitæ pro medietate, aut tertia parte, & adhuc fortius, si addatur tantundem succi cucumeris asinini. Et ad hoc, propriū est oleum de cucumere asinino. Nigella quoq; die ac nocte infusa i aceto, deinde siccata & trita, cuius odor cū aliqua eius parte subtilissima p nares fit tractus, est enim ad hoc propria. Ea tamen quæ sunt ultima, in hoc casu sunt si supra scriptis addatur aliquid euphorbi, aut castorei, aut elebori, aut fellis alicuius & similia. Ardori autem his succedēti succuratur cum iteratione attractionis aquæ tepide per nares, aut aquæ uioleæ. Tertium genus diuersionis per masticatoria completur, quorum leue est mastic. Fortius autem si prædicto addatur radix capparis. Et iterum fortius si addatur piper aut pirethrum aut istaphisagria. Quæ omnia secundum necessitatem incorporantur cū aliquo uiloso, sicut cera, pix, resina aut similia. Et possunt aromatizari cum paucō garioph. galliæ musc. Quartum genus diuersionis est cum gargarismat. quorū leue est oxymel simplex aut scilliticū cū decoctione corticum radi. capparis. hyssopi, & stecados arabici. Et fortius est, si in hac decoctione ponatur piper, pirethrum, aut sinapis. Sed ordo medicinalis exigit, ut à leuioribus inchoetur. Neq; fiant huiusmodi cum fluxus rheumatismatis ad membra subiecta timeatur. Hæc quidem genera diuersionum non uno die omnia faciendū sunt, sed cum interpolatione, ut una die unum, secūda die aliud, & sic deinceps, aut interdum duo interponantur dies. Tertia autem intentio perficitur cum alterantibus malam complexionem frigidam, caput confortantibus ac causam coniunctam resoluentibus, applicitis parti dolenti in nares, & in aures iniectis ac odoratis. Ex quibus maxime sunt quæ in litera per Rasin tradita sunt, & quæ etiam trader parum infra. Ex domesticis in foda frigida sunt cubebæ cōtritæ, & aqua rosacea aspersa, loco dolenti superpositæ. Sed ex conferentibus in foda frigida & uetosa est, ut milium cum sale mixtum, quantum ipsum est calefiat super regula aspersa uino albo, & aceto acuto. ex quibus ita calefactis, imō aliquoties torrefactis, sacculi impleantur, & ita calidi sæpe applicentur. Grana quoq; sinapis, & grana nasturtii infusa modicum in aceto, optime conferūt si ex eis sacculi impleantur & applicentur. Theriaca quoq; uel mithridatum cum succo mentæ permixtum, loco dolenti ap-

positum, egregie confert. His aliquid opii apud magnam necessitatem addi posset, aut addatur aliquid philonii rom. in quo opium correctū est, aut apud urgentē necessitatem distil lentur. 2. gran. opii cum oleo liliorū, aut castorei, aut euphorpii, & debite tepidum, in aurem sequentem dolorem iniicitur. Sed raro accidit ex humore frigidus, ingentem fieri dolorem, & propterea secundum plurimum. non est usus opiatorum necessarius. Pomum odoriferum ad confortationem cerebri frigidi. R. laudani, ligni aloes, styracis calamitæ. an. drach. 1. garioph. nucis musc. sem. basiliconis. an. 3. s. cum aqua rosacea in qua sit aliquid de musco fiat pomum, & si aliquid ambre addatur, est præstantius.

Quarta intentio est correctio accidentium, ex quibus frequenter corrigendus est subeth cum frictionibus fortibus & aliis generibus diuersionum, & odore aceti cutissimi. A cæteris uero præseruetur & corrigatur, ut propria exigunt capitula. Quinta intentio, exigit aerem calidum & siccum. & secundum plurimum luminosum. Potus sit uinum uetus mediocri uinositate, aut multæ aliquando, sed in parua quantitate, sed præstantior est aqua mellis, cui aliquid modicum piperis addi possit. Fercula sint facili digestionis, paucarū superfluitatum ad calidum & siccum declinantia, carnes autū laudabilium concedi possunt. Et in fine mensæ parum diadoniten cū speciebus, aut aliquid pyri, aut cidoniorū confecti. Somnus debet esse minor quam in aliis speciebus sode. Et dormiat capite leuato, & super latere sano. Et sit bene panis coopertus tam secundum caput, quam secundum corporis residuū. Sollicite purget omnes corporis superfluitates per regiones conuenientes, sicut superius in foda sanguinea dictum fuit. Vomitus tamen summo opere fugiendus, nisi adesset in stomacho materia dolorem fouens. Exercitium autem fugiendum. Verum frictions suppleant uicem exercitii. Vitet accidētia animæ excessiua, licet ira leuis, & huiusmodi accidētia caliditatem naturalem aliquoties excitātia liberius concedi possunt.

Complementum curæ cephalæ calidæ.

In cephalæ uerò calida emplastrum hoc fronti, & temporibus est imponendum. cuius hæc est confectio. Recipe sem. lactucarum, sief memithe sandalum album, & rubrum, faufel, rosas, opium, fiat ex eis emplastrum, postquam aceto, et aqua rosacea cōpersa fuerit, fronti imponatur, super quod mittatur pannus aceto, & aqua rosacea infusus, qui cū tepescat fuerit, iterū infundatur, & desuper ponatur.

Reuertitur ad complendam curam tam cephalæ calidæ quam frigidæ, inchoans à calida, pro cuius cura conficit hoc emplastrum ultimum & efficacissimum ad tollendam malam complexionem calidam, tum etiam ad stupefaciendū. Cuius descriptio est talis. R. sem. lactucarum, quod est frigidum & humidum in secundo, sief memithe, id est, succi memithe per decoctionem inspissati, uel ad solem, frigidi & sicci in primo & est herba similis papaueri, aliter dicta glaucium, & est species chelidonæ. Ille autem succus sic inspissatus dicitur sief, licet sief proprie sumpta sit medicina ocularis existens formæ pyramidalis ad similitudinem nuclej dactyli. Sādalus est ligum triplex, album, rubrum, & citrinum cæteris duobus magis odoriferum, frigidum & siccum in tertio. Faufel est auellana Indæ, frigida in secundo, & sicca in tertio. Rosæ frigide & sicce in primo. Opium frigidum in quarto, siccum in secundo. Hæc omnia debet aggregari in modum emplastri, postquam aceto & aqua rosacea cōpersa fuerint. Et possunt poni omnia in æquali dosi præter opium, quod oportet subduplari, aut saltem subquadruplari ad quodlibet illorum: ubi tamē esset mala complexio calida, & sicca, possemus augere humidum. Hoc autem emplastrum super aliqua petia subtili extensum, parti dolenti superponatur. & super ipsum imponatur petia infusa in aqua rosacea & aceto sæpe replicata, ut frigiditas actualis & potētiālis conferetur, & propterea non multum tepescere dimittantur.

Complet curam cephalæ frigidæ.

Inimentum uerò cephalæ frigidæ. Recipe castoreum, euphorbium, piper, sinapis, styracem, rutam, marrubium: quæ siccata, & pulverizata, & etiam cicotrizonizata

conizata misceantur, & conspergantur in uino ueteris, qui bus fiant trochisci, & desiccantur. cumq; necesse fuerit, ex uino in uino ueteris, aut oleo castano, uel chamæmelino dissolu to, frons multoties liniatur: hoc enim linimentum omni anti quæ cephalæa confert non solum superpositum; sed etiam auri iniectum, quæ sequitur illud tempus; postq; in aliquo de prædictis oleis resolutum fuerit. Aegro uero uinum uetus, et forte dandum est. cum autem cephalæa per hebdomadam unâ perseuerauerit; æger in balneum mittendus est, atq; sup caput eius aqua, in qua chamæmelum, & samfuchus, & nie mæ, et stæcas arabicus cocta fuerint; simul aut singulatim fun denda est.

Hic complet curam cephalæa frigide cum materia phleg matica. Licet etiam mala complexio frigida pura his curan da sit. Primo ponit hoc linimentum, cuius est hæc descriptio. R. castorei, euphorbij, piperis, sinapis, quæ oia calida sunt in quarto, styracis sicca & calida in secundo, rutæ calidæ & sic cæ in tertio, marrubij calidi & sicci in secundo. Quæ omnia in æquali dosi posita, aut forte calidorum in quarto posset do sis ad cætera subduplari, siccata, puluerizata, & cicotriconi zata, id est, tamisifata, commisceantur cū uino ueteri, ex qui bus sic mixtis fiant trochisci, & desiccant, & usui referuent. Trochiscus dicitur forma rotunda ex duabus partibus leuiter cō pressa, & dicitur a trochos græcè, rota latinè, in quâ formam rē ducuntur pulueres cum aliquo liquore permixti, ut eorum uirtus diutius conferuetur, quorum trochiscorum accipia tur unus uel plures necessitate urgente, & dissolutus cum uino ueteri, aut aliquo oleo, scilicet chamæmelino, aut casti no parti dolenti applicetur, aut aliquid eius in aurem parti dolenti proximam iniicitur. Secundo, complet huius ce phalæa curam per uinum uetus & potes exhibendum in mo dica quantitate, siue uia medicina, siue uia cibi exhibeatur. In magna enim quantitate nimis euaporando, aut in stoma cho, seu acetosado ex indigestione posset magis nocere quā iuuare. Demum docet curare per balneum siue igneum ali ter dictum pyreum, sicut est furnus pane extracto, aut aeruū factis notum, aut aqueum siue naturale sicut thermarum, aut artificiale sicut ex decoctione rutæ, betonicæ, calamenthi, sal uis, hyssopi stœcados arabici, maioranæ & similibus: quibus potest addi sulphur, & alia notabiliter calefacientia sibi frigiditatem resistentia. Ultimo docet curare cum embroca fa cta cū decoctione rerū similibus his de quibus supra. Est aut embroca casus liquorum ex alto super aliquod mēbrum, nā propter casum fortius imprimit, & magis uirtus eius pfundatur. Nemen, id est, serpillum, & non sissimbrium.

Cura cephalæa per comunitatem ad stomachum.

Quod si cephalæa quotidie ante comestionem inuadat, et post comestionem recedat, succurrendum est infirmo ante ho ram, qua uenire consuevit, dando eis buccellas panis in suc co granati, aut uisæ acerbæ, aut horum similibus infusas.

Ponit curam cephalæa per comunitatem ad stomachū, tradens solum curationē illius, quæ fit propter raptum mate riæ cholericæ ad stomachum. Cuius signum est, quia ante comestionē inuadit, post comestionem uero recedit. Cum enim stomachus est uacuuus fit facile materierum suscepti uus, & maxime earū, quæ facile ad ipsum fluunt sicut mate riæ cholericæ. Facile autem sedatur hic dolor per comestio nem, cholera ad fundum stomachi repressa, & forte in ali quibus egrediente pilorū, aut forte per uomitum educta.

Si autem materia esset phlegmatica aut melancholica non sic propter suam crassitiem & uiscositatem facile reprime retur. Et esto quod in principio aliquantulum sedaretur parū post magis augetur, cum ipse cibus corrumpatur à mate ria cui admiscetur, & etiā propter indigestionem cedat in materiam. Curat ergo dando buccellam panis in uino grana torum, aut acressæ, aut alio similibus, sicut succus cydoniorū, & huiusmodi, ante raptum materię cholericæ ad stomachū, uel saltē ante aduentum cephalæa, quæ sua frigiditate aut stipticitate cholera reprimunt, aut ipsum aduentum ad sto machum prohibent. Ex his datur intelligi cura reliquarum specierū cephalæa per comunitatem, siue à toto, siue à mem

bro determinato communicetur, quæ si à membro determi nato communicetur, quinque exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat quod de humore malo in membro suscipien te & mittente continetur. Secunda diuertit, quod est aptū communicari cum frictionibus, uentosis, ligaturis, lotio nibus, & clysterijs, trahendo ipsum ad partes oppositas membro, cui fit comunicatio nec non rubificationibus, uessifi cantibus, & tandem cauterizantibus factis super ipso mem bro communicante. Tertia confortat membrum mittens ipsius malas complexiones & dispositiones corrigendo, ut neque talem humorem multiplicet, neq; aliunde suscipiat, sed fiat minera laudabilis chymi. Quarta claudit uios me dias inter membrum mittens & suscipiens. Quinta mem brum suscipiens confortat, ne huiusmodi transmissum reci piat. Prima intentio est euacuatio humoris. Si ergo sto machus, uel hepar, uel splen, uel matrix, uel membra spiri talia communicent capiti phlegma, uel cholera, uel alium humorem, aut uapores ab his eleuatos, primo præmittenda est euacuatio humoris, tam in membro suscipiente, quā in mēbro mittente, siue sit sanguis cum phlebotomia, siue alius humor cum pharmacia integrata ex minoratiuo, digestiui, & eradicatiui, etiam sæpius iteratis secundum exigentiam. Secunda intentio est diuersio: si fit sine euacuatione incipit à membro læso, aut prope ipsum, & trahit ad partes oppo sitas distantes, tam à membro mittente, quam suscipiente. Et ex fortibus & proprijs in attractione materiæ sodæ in uigi lante ex sodæ, est frictio pedum, multoties. n. dormit super ipsam, patiens sodam, & quandoq; fit eius assiduatio in pedi bus donec resoluatur soda, & lotiones pedum conferunt: si autem cum euacuatione incipit à remotis ueniens ad propinqua, rubificatiua, aut uescicatoria, & cauteria siue actualia, siue potentialia fiant super ipso membro mittente, aut in lo co sibi proximo. Et ulcera diu, ut per unum mensem, aut am plius teneantur aperta, ut materiæ integra fiat consumptio: ut in stomacho, si ratione fundi fiat per duos digitos supra umbilicum, si in ore stomachi fiat posterius circa decimā ter tiam spōdylem, aut antierius parum intra malum granatum, si in splene in latere sinistro circa ipsius regionem, si in hepa te in latere dextro, si in matrice circa alchatum, eodem mo do in reliquis. Fiant autem illa magis aut minus profunda secundum situm membri mittentis, & cæteras naturas com positionales, & membi ipsius nobilitatem, & secundū quod opus est, ut ulcus longo aut breui tempore teneatur apertū, & secundum has considerationes etiam opus est, ut fiat magis, aut minus latum. Hæc tamē sunt de his quæ postponen da sunt & non fienda, nisi cum cætera non cōtulerint, magis tamen ob uulgi infamiam quā quod res in se fit periculo sa, imò existimo si medici essent audaciores multa mirabilia facerent cum his cauterijs, sicut Albucasis.

Tertia autem intentio perficitur cum his, quæ à proprie tate, & etiam à qualitate manifesta confortant membrū mit tens, ipsius dispositiones corrigendo: siue sit malitia cōple xionis, siue unitatis, siue compositionis taliter, ut fiat mine ra laudabilis chymi. Quæ omnia qualiter compleri debeant in proprijs uidendum est capitulis de quibus infra.

Quarta autem intentio, scilicet clausio uiarum intermediarum, completur quandoq; cum stipticis & confortantibus, sum ptis per os in sine mensæ, ut cidonij, pyris, coriandris & hu iusmodi: quandoq; cum medicinis & ligaturis, sicut si com munitatis sit à pede cum iusticiis notabiliter strictis circa to tum crus, nec non si oportuerit medicinarum stipticarum ap plicationem etiam desuper stringendo cum ligatura. Et simi liter hæc eadē circa collum fieri possunt, materijs aut uapo ribus ad caput ascendentibus per cannam pulmonis, meri, uenas aut arterias colli, quod idem est, & circa tempora me dicinis & ligaturis compleri potest. Quandoq; uero com pletur uenarum & arteriarum laqueatione postquam com prehensum fuerat, quæ sit illa per tumorem, caliditatem, pul sum, dolorem, & huiusmodi. Si ergo sit de paruis, fiat altero duorum modorum, aut sciendo super ipsam, & postea ip sam cum filo ignito, aut cauterio punctali cauterizādo, aut curem simul cum uena urendo, & tādē escara remota con solidando. Quod etiam cauterio potenciali perfici potest, actuale tamē melius est & tutius. Si uero sit de magnis, scin datur

datur uel utatur cutis super ipsa, qua scissa uel amota ligetur uena in duobus locis satis sibi inuicem proximis, & scindatur in medio, & utraq; extremitas cauterizetur. Nota tamē quod si materia factura cecitatem, descenderet ad oculos p uias intrinsecas, hæc uenarum laqueatio nullius esset proficiui, sed in hoc casu esset ponendum sedaginum in parte posteriori capitis in locis, ubi collum capiti coniungitur, aut essent facienda cauteria in duobus cornibus posterioribus, scilicet iuxta loca mendosa, aut esset apponendū cauterium in commissura coronali.

Vltima uero intentio, scilicet capitis confortatio, completur cū applicitis extra circa frōtem & tempora, ut oleo rosaceo & aceto, quæ materia existente calida cōtinuentur, frigida uero existente cum mixtione calidorum temperentur. Conforteturq; caput cum sumptis interius, ut diamusco, diambra in discrasia frigida, inlebe ros. & similibus in calida, & ex proprijs sunt cerebella hœdorum & gallinarum. Confortatur etiam caput ne recipiat, & ipsius frigiditas & humiditas corrigat cum cauterijs sex, aut aliquo istorum. Vno in commissura coronali. Alio in medio sagittalis. scilicet circa summitatem capitis. Tercio in lambda. Duobus alijs circa tēpora, & maxime ubi sunt commissuræ mendosæ: & ubi timeretur nocumentum in nucha. Sextū fiat in parte posteriori ubi caput principio colli iungitur, & fiat ad similitudinem osis oliuæ, & penetraret usq; ad os, aut saltem ad almochari: & diu conferuentur aperta, sultra mensē. Et quamuis posita sint sex cauteria prædicta pro confortatione capitis & correctione dispositionum eius, non tamen semper oportet hæc omnia facere, sed plerunq; sufficit unum aut plura secundum unam aut plures cerebri particulas corrigendas, quodlibet enim corrigit particulam sibi proximam. Et Deum testor, quod nulla alia est melior hac medicina, & magis efficax in confortando cerebrū, & corrigendo eius prauas dispositiones cuiuscunque generis sint, & quomodocunq; enenerint siue per essentiam siue per communitatem, sed præcipue ualet in corrigendo dispositiones chronicas frigidas & humiditas cerebri ac ortum ab eo, necnon membrorum suppositorum quibus cerebrum mittendo superfluitates communicet.

Cura cephalæa prouenientis à causa primitiua.

SI autem cephalæa contingat propter multam in sole moram; sufficiens ex oleo rosaceo, & aceto in frigida tibi curari poterit: quæ tamen si ex hoc non quieuerit; ex alijs in frigidantibus curanda erit.

Docet remouere cephalæam pendente à causa primitiua, utputa à sole cū frigidis capiti applicitis. f. oleo rosaceo, subquaduplo ad acetum, & sint actu in frigidata, & capiti cū petijs lineis applicentur. Quæ si nō suffecerint docet ad alia frigidiora esse procedendum, quæ ex præcedētibz satis possunt esse nota, sicut sunt succi lactuæ, semperniæ & similiū. Quibus semper aliquid aquæ rosacæ pro confortatione, & aceti pro penetratione est addendum. Et tu pro complemento habes duas intentiones curatiuas. Prima est, remouere causam primitiuam. Secunda, nocumentum ab ipsa in capite impressum. Ergo si causa primitiua fuerit sol, aut alia causa calefaciens, pone ægrum in umbra, & in loco frigido. Si uero fuerit uentus aut res in frigidans pone ipsum in loco calido. Nocumentum autem impressum remoue cum contrarijs capiti applicitis, quorum copia ex dictis & dicendis tibi erit manifesta. Si uero ex sōda per liquefactionē humorum à causa calida, aut expressionem à causa materiali frigida fuerit, procede sicut superius in sōda materiali est ostensum.

Vltimum remedium ne sequatur amissio uisus.

SI autem sōda adhuc perseverauerit, et fortior fiat, neque ullo modo remoueat, & timeatur, ne ager uisum amittat, & aqua ad oculos descendat; temporum arteriæ sunt incidendæ, & extrahendæ. hoc tamen, quod nunc loquimur, est præter nostram intentionem in hoc libro.

In hac parte ultima præsentis capituli ponit ultimum remedium multoties necessarium, ne sequatur amissio uisus. scilicet incisionem siue laqueationem uenarum, & arteriarum, temporum, per quas uias materia ad oculum defertur factura cecitatem, quæ laqueandæ sunt modo superius dicto. Primo

cognito per tumorem, dolorem, & pulsationem, quæ sit illa, scilicet per quam materia ad oculum defertur. Nota tamen laqueationem arteriarum magnarum satis esse suspectam. Et propterea si potes cum defensus prohibere materiam ad oculum fluentem. Subdit tamen ea, quæ nunc dicit esse præter intentionem suam in præsentī opere. Cum non fuerit intentio sua in hoc libro ad tertium instrumentum medicinarum, scilicet chirurgiam procedere. Ex his iam manifestæ sunt tibi curationes specierum cephalæa pendente à mala complexionē sine materia, cum in ea non exigantur nisi tres de intentionibus superscriptis. scilicet alteratio, accidentium correctio, & debitum regimen sex rerum non naturalium. Et etiam cum materia sanguinea, cholericæ, phlegmaticæ, non autē melancholicæ, sed eam statim subiungam. Similiter posita est cura cephalæa per communitatem a membris determinatis, non autem à toto, sicut in febribus & crisi, quam nunc subiungam. Et cum hoc subiungam curationes multas aliarum specierum, quæ mihi uidebuntur magis necessariæ ex quibus reliquæ possunt innoscere. Spiritus autem sanctus tibi nobis auxiliū amen.

Cura cephalæa prouenientis à melancholia.

Cura sōdæ melancholicæ, sex exigit intentiones curatiuas. Prima digerit. Secunda euacuat. Tertia diuertit. Quarta malam complexionem alterat caput confortando. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Digestiua debent esse humida, aliquando calida, aliquando frigida, sicut quod melancholia est naturalis, aut adusta. Et debent esse incisua & subtiliatiua, magis aut minus, sicut maiorem uel minorem crassitiem, aut uiscositate: et per tertiam & quartam uirtutem respicientia determinatum humorem & membrum ex proprijs ergo est fyr. de epithymo descriptione Mesuæ in antidotario. Item alius eiusdem intentionis sublimis & expertus est hic. R. capillorum ueneris, radicū buglossæ domesticæ & syluestris, & florum earū, polipodij, ana. 3. i. epithymi. 3. i. folliculorum fenæ, chamæpicheos, stœcadod, ana. 3. 7. chamædryos, quinanti, ellebori nigri, ana. 3. 3. fumiteræ. 3. 8. eupatorij. 3. 4. succi pomorum bullicum. 3. 8. oia præter epithymum, & succum pomorum bulliant in lib. 4. aquæ usq; ad consumptionem medietatis, deinde bulliat in ea epithymum ebullitione una, & coletur, & cum succo pomorum & sacchari. lib. tribus fiat syrupus, cuius dosis est drach. decem, usque ad duas uncias cum aqua buglossæ, lupulorum, endiuæ & similibus.

Euacuantia debent habere tres condiciones. Prima, ut non sint multum fortia, ne subito magnā solutionem faciant. Secunda, ut non multum recedant à gradu temperamento. Tertia, ut sint mixta cum lenientibus & humectantibus, & cum hoc secum aliqua cordialia misceantur. Quæ conditio in omnibus medicinis, ac omni regimine ægritudinū melancholicarum seruanda est. Ex proprijs simplicibus est fenæ, epithymum & polipodij, & similia: & ex compositis pilulæ Indæ, de lapide armeno, & de lapide lazuli: & ex electarijs diafena, confectio amech, maxime in melancholia adusta. Diuersiones autem communes & propriæ cum euacuatione & sine, faciendæ sunt quemadmodum in præcedētibz dictum est in alijs speciebus sōdæ. Applicanda autem capiti debent esse humida, calida, aut frigida, sicut quod melancholia est adusta, aut nō adusta, plurimum tamen debet ad calidum declinare, sicut decoctio facta ex buglossa, boragine, fenæ, epithymo, & similibus, cum capite caltrati in decoctione dissoluendo: & ex oleis, est oleum sesaminum, amigdalārū dulcium & similia. Accidētia autem sicut uigilia, alienatio &c. corrigantur quemadmodum dictum est, & inferius in proprijs dicitur cap. Regimen autem sit humectatiuum & inpinguatium, non tamen oppilatiuum, sit autem declinās ad calidum, aut frigidum, secundum humoris exigentiam, & aliarum circumstantiarum, sicut dicitur in capite de melancholia. Si uero in causa sint humores adulti, totum regimen medicinale, necnon sex rerum non naturalium declinet ad frigiditatem & humiditatem, & humores adulti euacuentur cum pilulis de fumoterræ, electario amech, & similibus. Et ex his potes elicere curam sōdæ pendente ab humoribus mixtis. Digestiua enim, & euacuatia debent esse mixta secundum humorum

humorum exigentiam.

Cura autem sodæ per coitatem à toto, sicut in febribus, est. Ut consideres, an sit solum in causa, mala complexio calida & sicca. Et tunc sola refrigeratione & humectatione opus est cum his, quæ superius dicta sunt. Si uero materia reparat ad caput, ipsum forte apostemat, procedatur sicut superius dictum est in soda humoralis, & dicitur in capite de phrenesi. Si uero in causa sint uapores febriles, sicut est secundum plurimum, communicari à toto, aut à minera putredinis, considerentur an sint pauci & subtiles, & tunc duæ sunt intentiones. Prima diuertere, sicut dictum est superius. Deinde infringere & humectare & confortare caput cum sibi applicitis & his, quæ dicta sunt superius, non tamen multum oppilanti bus. Si uero uapores sint multi & crassi, diuersionibus intendatur omni ingenio. Secundo, ipsum in capite contentorum euaporationi & resolutioni, sicut cum decoctione rosarum, uolarum, meliloti, chamæmeli, seminis althææ, anethi & similibus: & si refrigeratione opus sit, quædam frigida, sicut dictum est superius, per nares trahantur, & in aures iniiciantur, sint tamen actus tepida. Et quandoque apud necessitatem urgentem utaris narcoticis, aut ex eis aliquid in aures distillando, sicut dixit Rasis in textu, aut aliquid per os fumendo. Nō autem capiti applicentur, ne oppilando magis uapores concludantur & incrascentur, & deinde fortior sequatur dolor.

In cura autem sodæ cretica sit prima intentio, ut natura inueniatur, per quamcumque uiam expulsionem tentauerit, modo sit conueniens. Ut si senserit dolorem, & rugitum circa in testina, cum suppositoriis, aut clysteribus adiuuetur. Si uero nauseam, & tubersionem, cum impositione digiti uomitus adiuuetur. Similiter cum impositione pennæ in ore, in oleo intinctæ, aut sumptione oxymellis cum succo raphani, & similibus. Si uero senserit grauitatem & tensionem circa renes, prouocetur urina cum decoctione seminum communium frigidorum, & similibus. Si uero senserit cutem humidam, & pulsus undosum, sudore adiuuetur, egrum bene pannis cooperiendo, & anhelitum continendo. Et si apparuerit rubedo in oculis, radii, imaginationes citrinæ, tunc sanguis ex naribus prouocetur cum impositione digiti, aut setis porcinis, & similibus sanguinem ex naribus prouocantibus. Si uero in subcella, aut inguine, aut post aures dolore senserit, illic emplastra attractiua ponantur, & etiam uentose si oportuerit. Secunda intentio, quæ uapores reprimunt in fine mensæ sumantur, sicut cidonia, aut coriandra, & obseruentur reliqua in crisi seruanda.

Cura sodæ apostematosa ex cursu phrenesis inferius intel ligetur. In cura sodæ ex oppilatione. Primo, intendendum est ad deoppilationem educendo humorem oppilatam. Euacuatione, tam communi integrata ex minoratiuo, digesti uo, & eradicatiuo, quæ propria, sicut in curatione sodæ materialis superius dictum est. Secundo, intendendum est ad alterationem malæ complexionis ex oppilatione derelictæ cum contrariis ex his, quæ dicta sunt colligendis. Accidit autem, ut dicit Auic. in proprio capite in cura huius sodæ contrarietas, cum aliquando oporteat de oppilari cum calidis, tam digestiuis, quam euacuariis humore existente crasso, ex quibus augetur mala complexio calida ex oppilatione derelicta: in hoc ergo casu iuxta sententiam Auic. nunc fiat de oppilationem cum huiusmodi calidis, ex quibus augetur mala complexio calida fiat, postea ipsis dimissis alteratio cum frigidis. Et postea iterum redi ad deoppilandum cum calidis, ita ut hæ intentiones sint sibi inuicem mutuo succedentes toties, donec cura compleatur.

In cura sodæ ex percussione, si fuerit solum contusio absque uulnere manifesto. Prima intentio est prohibere apostema, scilicet approximando loco contuso faldellas stupeas infusas primo in aqua rosacea, & aceto subtriplo ad ipsam, & postea ipsas bene expressas, iterum infundas in oleo rosaceo, & albumine oui debite adinuicem conuassatis comprimendo, aut ligando desuper cum ligatura conueniente. Et faciendo phlebotomiam ex cephalica, aut uena communi eiusdem partis, aut contrariæ, secundum multitudinem repletionis. Apud quam necesse est reiterare phlebotomiam, ut ante dictum fuit. Si uero albumen oui non habeatur, accipiat aqua, aut succi stiptici, & permixti cum pulueribus constrictiuis loco

percusso applicetur. Aut etiam sola aqua communis applicetur. Sed non prætermittatur debita strictura cum ligatura facta secundum artem, hæc enim est radix curæ. Et debet esse strictura super loco contuso, & super parte distante magis gradatim relaxata. Deinde gradatim debemus permiscere repercussiuam cum resolutiuis, donec ueniamus ad resolutionem puram. Et ex propriis est myrtus, absinthium, cyminum, calamamentum, & huiusmodi. Si uero sit uulnus manifestum cum fluxu sanguinis, intendatur ad ipsius restrictionem, ac etiam apostematis prohibitionem cum faldellis stupeis infusis in albumine oui, cum pulueribus constrictiuis debite conuassatis, ex quibus uulnus repleatur. Ac etiam fiat phlebotomia modo iam dicto. Et tandem uulnus curetur, ut ex propriis capitulis, quarta primi, & quinta sexti est uidendum. Et si propter commotionem cerebri homo fiat sine uoce, ac forte cum paucis & debili sensu & motu, & steterit sic usque ad tertiam, & non additur, neque minuitur, tunc laudatur in tertio, ut expectetur usque ad septimum, & non moueatur ante illud cum aliquo, quarta quartis, capite de casu & offensione. Quod in intelligendum est, ægrum non esse mouendum cum aliqua forti operatione, sicut esset secare cutim, os fractum euellere.

Tamen debemus facere phlebotomiam uirtute uitali stante & totum caput infundere cum oleo ro aceto omphacino, & cum aliis medicinis localibus supra scriptis secundum exigentiam. Digna autem in primis casibus debet esse tenuis, sed cum his accidentibus tenuissima. Postea ad confortationem cerebri ægritudine aliquantulum declinate, præcipue ubi multus sanguis exiuerit, iubet Auicenna prima tertii, capite proprio cerebella gallinarum dari, sunt enim tunc propria, & tunc in quantitate multa exhibeantur. Rasis autem sexto Almanforis ultimo capite, post principium conficit emplastrum in his dispositionibus propriis, maxime in contusione, factum, scilicet ex foliis myrthi, balauistiis & corticibus granatorum, in aqua & aceto usquequo dissoluatur coctis, parum musci, galli & xilaloos, & calami aromatici admiscendo. Ex quibus omnibus cum aceto & aqua & uino ueteri ac stiptico coniunctis quasi emplastrum conficiat, & loco superponatur. Venter autem in his casibus ex aqua fructuum, aut leui enemate soluatur.

In curatione sodæ pendens ex debilitate capitis. Prima intentio post euacuationem est malam complexionem capitis remouere. Secunda caput confortare, Tertia debitum regimen uitæ, excludens omnem causam debilitantem tam exterius occurrentem quam interius sumptam. Mala autem capitis complexio remouetur cum contrariis, tam interius sumptis quam exterius applicitis, de quibus supra.

Caput autem confortatur cum his, quæ dicta sunt propria capiti per tertiam uirtutem, & quæ sunt subtilia cum stipticitate quadam odorifera. Ex frigidis sunt rosæ & camphora, ex calidis, ambra, muscus, maiorana, cinnamomum cubebe &c. Ex compositis, diambuscus, aromaticum ros. ex frigidis saccharum rosatum compositum, confortans omne membrum est theriaca. Et simplex confortans omne membrum est terra sigillata: & oleum rosaceum temperando complexionem confortat omne membrum.

Tertia autem intentio perficitur commensurando cibum & potum in quantitate & qualitate uirtuti digestiue, & non sit uaporosus nec nocens cerebro, sicut allium, crocus, orobus faba, phaeoli, hyoscyamus, lac, lætes, nuges, oliuæ, raphanus, & similes, debite proportionando reliquis sex res non naturales.

Cura sodæ ex acuitate sensus perficitur cum his, quæ præbent nutrimentum grossum & uiscosum, sicut sunt capita, & pedes animalium, & partes uiscosæ, similiter pisces, & caseus frumentum, hordeum, tritum, far fabæ, & similia digestiua constante. Si uero sit debilis detur horum granorum chist, & partes uiscosæ horum animalium iuuenum, & similiter pisces parui in specie sua. Narcotica quoque sicut papauer, lactuca, & similia ad hoc egregie conferunt præcipue in complexione calida aut sicca, sicut plurimum est. Quandoque tamē necessarium est leuiter stupefacere etiam cum medicinis, tam interius sumptis, quam exterius applicitis, sicut syr. de papauere, & unctionibus, & decoctionibus exterius applicitis, & intendatur capitis & corporis humectationi. humiditas namque spirituum obundat sensum.

Io. Arculani B In

In cura sodæ ex uermibus existentibus supra stricturâ narium oportet, ut purgatio fiat corporis, & cerebri maxime educens phlegma. Deinde fiat caputpurgium cû hierapicra distemperata cum succo foliorum perfici, aut radices mori. Semetina quoq; naribus insufflata, aut cû aliquo humore at tracta confert, & similiter omnia, quæ necant uermes. Et in summa iuuatur sternutatoriis, & caputpurgiis purgantibus cerebrum, & uermes necantibus.

In cura oui sunt eadem obseruandæ intentiones: Et eius cura eisdem medicinis perficitur: de quibus actû est superius. Quæ diuersificandæ sunt secundum exigentiam causarum à quibus pender. Sed præter hæc aduertendum est, quod cum ouum similiter, & hemicranea, aut dolor alius antiquatur, præter intentiones communiter habendas indigemus spiritali capitis confortatione cum his, quæ dicta sunt in sodæ ex capitis debilitate. Item ouo, hemicranea, & quocunq; dolore uehementer intenso frequenter indigemus stupefacientibus, natura tamen nequeute dolorem tolerare. Et tertio cû dolores antiquantur frequenter indigemus operatione manuali, sicut uenarû laqueatione, cauterizatione, & similibus, est enim radix curæ sodæ huiusmodi.

In cura hemicranea, & homonopagiæ præter intentiones communes euacuationis, & diuersionis, & præterea, quæ obseruanda sunt in dolore chronico, & forti de confortatione cerebri, stupefactione, & operatione manuali, medici inueniunt quædam medicinas proprias, tam in calida, quam in frigida. Ex propriis ergo in calida est emplastrum ex facie atramenti sicca, quæ dissoluatur cum aceto multæ fortitudinis & loco dolenti applicetur, & apud uehementem dolorē octaua pars opii secum misceatur optime incorporando per longû spacium, & super locum stringatur, est enim expertum & crocus est conueniens, & similiter emplastrum ex ruta, mēta cum uino, oleo rosaceo, & pauco aceti. Aliud in calida proprium. Rec. succi agrestis, mirrhæ, ana partem unam, fœcis encaustri scriptoris partes duas, aluminis, iameni, croci, ana partis unius quartam, confice conterendo cum aceto uini, & liniatur super tempora, siue loco dolenti, & stringatur, strictura enim multum confert, ita ut lignum, aut plumbum deceter possum super loco dolenti, & notabiliter cōstrictum sedet dolorem fortem pulsatiuum. Caputpurgium quoq; ex lacte mulieris cum pauco camphoræ, cui etiam apud necessitatem addatur tantundem opii quantum camphoræ, optime confert: de quo etiam aliquid modicum in aure sequente dolorem distilletur. In hemicranea autem frigida, quæ ex longitudine temporis deprehenditur: ægritudo enim cuius tempus prolongatur est frigida secundum omnem dispositionem, & indiget resolutione, quod calefaciat cum fortitudine. Medicamen expertum acceptum à muliere decoquantur radices cucumeris asinini, & absinthium in oleo, & aqua, donec dissoluantur, & embrocetur pars dolorosa ex aqua, & oleo calidis, & fiat emplastrum ex facie: confert enim hemicranæ frigida cum febre, & sine febre. Et emplastrum de sinapi ad hanc intentionem resoluens humorem frigidû rubificans, & uescans. Item unguentum factum ex gummi rutæ agrestis, cortibus radicum capparum, scylla & euphorbio tritis, & commixtis cum uino odorifero. Et ex sedatibus dolorem illico est, ut ingrediatur balneum, & multiplicetur inclinationes super aquam calidam, deinde fiat caputpurgium ex oleo fisticino. Medicamen magnum conferens hemicranæ difficili & chronica, & non est quod confortet sicut ipsum. Accipe ex emplastro sinapino. ʒ. 2. & commisce cum eo scylla. ʒ. 5. costi, radicum cappa. euphorbii. ana. ʒ. 3. omnia trita cum aceto & uino odorifero, ana. quantum sufficit, aggregabis, & emplastra super locum. Caputpurgium expertum ad hemicranæ difficultem ex humore frigido. ʒ. euphorbii, castorei, ana. partes æquales, fiat ex eis sies, & apud necessitate fricetur cum uno eorum super cutem cum aqua calida, aut oleo costino, aut nardino, & distilletur ex eo in nares, & aurem, quæ est ex parte doloris, deinde balneetur, & adhuc ex medicamine distilletur, & hoc uicissim. cito hemicranea soluetur. huic adde apud necessitate parum opii, &c. Et sic est finis huius capituli, Deo gratias.

De scotomia & uertigine. Cap. 2.

Ireca rubricam inquirenda sunt, quid nominis, & quid rei. Vnde dicitur scotomia à scotos Græcè quod est tenebra, inde scotomia quasi tenebra, siue obtenebratio. Et hoc est secundum Isidorum, & Simonem Ianuensem. Vnde Isidorus quarto ethimologiarum cap. 9. dicit: Scotomia uero nomen sumpsit ab accidente, quod est representans tenebras cum uertigine. Et non dicitur à scoto, quod est uisio & mya musca, sicut quidam sunt arbitrati. Dicitur autem uertigo à uerto, uertis, quia apparent res super patientem uerti, aut quod cerebrum ipsius & corpus reuoluatur. Pro notitia autem quid rei præmittendum est, quod uertigo capitur quadupliciter. Primo pro quacunq; gyratione, siue circumuolutione, quæ integratur ex duobus motibus, motu. scilicet pulsus & tractus, & sic accipitur septimo physycorum, qui modus non est ad propositum. Secundo modo accipitur pro comprehensione huius motus, siue naturali, siue præternaturali, qui etiam non est ad propositum. Tertio modo accipitur pro comprehensione præter naturam huiusmodi circumuolutionis, aut alterius motus cum dispositione ad casum. Quarto pro comprehensione præter naturam huiusmodi circumuolutionis, aut alterius motus cum dispositione ad casum corrupta uisione, & uisus obtenebratione. Et hoc quarto modo accepta proprie dicitur scotomia, differens à uertigine: tertio modo accepta, non connotante uisus corruptionem, & obtenebrationem. unde omnis scotomia est uertigo, non e contrario. Sed taliter uertigo accepta diffinitur ea, quæ ponitur in descriptione uertiginis, addit, cum corruptione uirtutis, uel actionis uirtutis uisus ipsiusq; obtenebratione, quemadmodum quid nominis scotomiae bene sonat. Quidam uero dicunt inter uertiginem, & scotomiam hoc interesse, quia scotomia & uertigo important corruptam uisionem, sed scotomia superaddit solum uisus obtenebrationem. Quod uidetur satis consonum sententiæ Isidori capitulo superius allegato, cuius sunt hæc uerba: Vertigo est quotiescunq; uentus confurgit, & terram in circuitu mittit. sic & humectatione hominis uenæ, & arteriæ uenositatem ex resoluta humectatione gignunt, & in oculis gyrum faciunt. Vnde & uertigo nuncupata est. Superius autem dictum est ex eius sententia scotomiam tenebram importare cum uertigine, &c. Diffinitio autem Auicennæ magis consonat sententiæ primæ, dicit enim, Vertigo est, ut habens ipsam imaginetur corpus suum, aut res super ipsum reuolui: quare non regit se, ita ut firmetur. imò cadit, nullam in diffinitione de corrupta uisione, aut obtenebratione mentionem faciens. Licet parum infra ponendo differentiam inter uertiginem, & epilepsiam dicat, Vertigo autem est, ut cū homo stat, obtenebrent oculi eius, & excitatur ad hoc, ut cadat, ibi enim sumit uertiginem contractam ad scotomiam, & secundum utraq; uiam scotomia sub uertigine continetur. Secundum tamen Rasim primo continentis capite secundo, uertigo est dispositio in qua apparet res reuolui: & tamen homo non cadit, sed regit se. Sed in scotomia homo cadit, & uocatur sidre secundum glossam cōtentā in Almanforis cap. de scotomia. Et hoc modo una sub altera non continetur. Tu uero dic ut libet, nomina sunt ad placitum. Et in harum diffinitione ly actio corrupta ponitur loco generis: quod uerum est, cum nulli indiuiduo de specie humana naturaliter conueniat. Dicitur autem sensus communis, cum ipsius sit in mente post operationem sensuum exteriorum comprehendere omnia sensibilia, tam propria, quam communia. Et per hoc differt ab imaginationibus oculis appropriatis, & cæteris corruptis actionibus, tam sensuum exteriorum, quā interiorum. Reliquæ autem particule sunt ad exprimendas ipsarum quidditates: Et quanquam hæc dispositio sit actio corrupta, potest tamē morbus dici; cū immediate, & p se sedat operationes sensibilibus: facit enim errare cogitantiā, & quādoq; uirtutē uisuiam. unde nō est uerū quod dicit Gerardus de Solo, quod principium eius est error uirtutis uisuiæ, cum frequenter contingat oculis clausis, & sine lumine. Lædit etiam operationes uirtutis motuæ saltem mediate: ideo in carente uisu, licet possit esse uertigo, non tamen scotomia.

nia. Ex iam dictis possumus habere solutionem questionis communiter solite moueri. Cum autem contingat sensum commune errare circa obiectum sensus auditus, & aliorum sensuum, quare non dicitur in uertigine, aut scotomia, ita fieri corruptionem operationum aliorum sensuum, sicut sensus uisus? Ad quod respondet Gerardus d. primam causam esse, quia organum uisus est propinquissimum organo sensus communis. Quare ratio nulla est, cum æque propinquum sit organum auditus, cum neruus auditus sit proximus pñiculo cerebri, & ualde proximum est organum olfactus, scilicet caruncula mamillares. Dixit secundum causam esse, quia organum uisus est maxime inter cetera organa spirituosum, huius autem dispositionis causa immediata est motus inordinatus spirituum. Sed hæc ratio solum concludit quod rarius debet complicari aliorum sensuum corruptio.

Sed ratio ceteris melior est, quia in uertigine sensus communis errat in comprehensione motus: non est autem motus ita aptus sentiri alio sensu, sicut uisu. Et quanquam actio sensus communis possit corrumpi circa comprehensionem sensibilibus aliorum sensuum, non deberet dici uertigo, aut scotomia, sed alio nomine nuncupari. Tam ad capitulum accedamus.

Cum aliquis illud, quod ante cum est, circulariter moueri uiderit: & oculi tenebrescunt: & cadere uoluerit: facies, & oculi in eadem hora rubuerint: uenæ quoque, quæ sunt post aures, grossæ apparuerint: ex ipsis uenis facienda est phlebotomia: & uentose in collo, & tibij sunt ponendæ. quod, si prædictæ non apparuerint uenæ, & facies fuerit rubea: & sanguis ex cephalica, uel basilica erit minuendus: & uentose in tibij sunt ponendæ. in hac præterea scotomia specie, & in ea, quam ante diximus, caput ex oleo rosaceo, et aceto est infundendum. [cui confert, ut æger acetosa comedat, & siptica. & est, quando prouenit siccitas cum uapore, qui ab aliquo eleuatur membro: cui confert, ut aliqua ex medicinis cutem aduercitibus illi superponatur membro.] Ager quoque calida cibaria uirare debet. Venter quoque ex apozemate mirobala, citri, quod in cap. de cephalæa diximus, est soluendus.

S C H O L I A .

Sanguis ex cephalica, uel basilica erit minuendus: uel ut uisum Rasis textus tantummodo sanguinem ex basilica minuendum iubet. Cui confert lege uis: ad uerbum Membro huius orationis neque; Arculani expositio, neque; ipsius Rasis liber uel iam facit mentionem.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. Primo ponit curam scotomiae, & uertiginis pendens à materia calida. Secundo à materia frigida. secunda ibi. Cum autem neque in facie. Prima iterum in duas. Primo ponit curam scotomiae, & uertiginis pendens à materia sanguinea: aut saltem à prædominio sanguinis existentis in cerebro. Secundo ponit curam earundem pendens à simili materia cerebro à membris inferioribus communicata. secunda ibi. Quod si prædictæ non apparuerint uenæ. Et ut legam ambas partes simul dicit. Cum aliquis uiderit ea, quæ sunt ante ipsum circulariter moueri, aut alio motu, licet non moueantur, & oculi obtenebrescunt, & cadere uoluerit, hæc sunt signa communia, licet secundum approprietur scotomiae. Et facies, & oculi rubuerint in eadem hora, & uenæ, quæ sunt post aures grossæ apparuerint: hæc duo ultima scotomiae, & uertigini sanguineæ, aut saltem à prædominio sanguinis appropriantur: & uos supplete alia signa. si grauedinem capitis, tensionem, tamen profundum, urinam rubeam, grossam, & similia sanguinis significantia: tunc ex illis uenis, quæ sunt post aures facienda est phlebotomia: præmissa tamen phlebotomia cephalicæ. Et uentose in collo, & tibij sunt ponendæ. Incipiendo à parte superiori colli, & descendendo ad nates, & coxas si fiat sine scarificatione: sin autem cum scarificatione, procedatur e contrario à partibus distalibus ad propinquas. Quod si prædictæ uenæ non apparuerint grossæ, quæ sunt post aures, & in alijs locis capitis, quod significat sanguinis repletionem non adesse in capite: fuerit tamen facies rubea, quod significat præsentiam sanguinis multam in hepate, &

membris inferioribus, quæ cerebro communicantur: aut saltem uapores eius, tunc ex basilica facienda est phlebotomia, consentiente uirtute, & alijs indicantibus de phlebotomia, præmissa clysteri lenitino si oportuerit. Et uentosa in tibij erunt ponendæ, id est, in locis inferioribus infra hepar: non autem in collo, ne sanguis uersus caput trahatur. Et in hac, & suprascripta conuenit caput episthemari ex aceto, & oleo rosaceo subteriplo ad acetum, ad infrigidandum, repercutiendum, & caput confortandum, & uitanda sunt cibaria calida. Et uenter ex apozemate. id est, decoctione, siue infusione mirobalarum, citrinorum, prunorum, & tamarindorum, sicut in capitulo præcedenti dictum fuit, est soluendus ad educendum materiam cholicam cum sanguine mixtam: quæ facit ipsum euaporare, & amplius ad superiora moueri.

Cum autem neque in facie rubedo, neque feb. cum scotomia fuerit: attendendum est, an sit stomachi subuersio, et nausea. quæ si affuerit: prius uomere cogendus est. deinde de pilulis cochij dosim unam sumat. et à frigidis abstineat cibis.

Ponit curam scotomiae pendens à materia phlegmatica. Et primo existente in stomacho, & communicante uapores capiti. Secundo existente in cerebro. secunda ibi. Si autem nec subuersio, &c. De ambabus partibus simul dicit, quod cum non fuerit in facie rubedo, nec affuerit febris, siue febris propriè intelligas, siue caliditatem in partibus faciei, & capitis sensatam, supple nec alia signa significantia materias calidas, tunc considerandum est, an stomachi sit subuersio. id est, inclinatio ad uomitum cum motu stomachi ad ipsum absque hoc, quod sequatur uomitus aut nausea, & inclinatio ad uomitum absque motu ad ipsum, & supple alia signa significantia stomachi læsionem, unde uerisimiliter cerebrum stomacho compatitur: tunc æger prius cogendus est uomere, aut sponte, si natura ad ipsum complendum sit sufficiens, aut artificialiter faciendo ægium prius comedere quadam uiscosa, sicut alaganas, res salsas, raphanum, & huiusmodi, & notabiliter potare: tandem post horam ipso prius motu motibus inordinatis exhibere uomitiuum, sicut hanc decoctionem. R. radicis raphani syluestris. ʒ. i. sem. atriplicis, asari, an. ʒ. s. bulliant in octo. ʒ. aquæ usque ad consumptionem medietatis, & coletur: cum qua colatura distemperetur oxymellis simplicis, aut scyllitici. ʒ. i. s. croci. ʒ. s. olei. ʒ. i. & tepidum in potu exhibeatur. post cuius sumptionem per horam, aut cum iniecerit nauicare, æger procuret sibi uomitum digito imposito in ore, aut penna intincta in oleo sape, ac sape cum iteratione, ut exquisita fiat euacuatio. Deinde uno, aut duobus diebus medijs sumat unam drac. pilularum cochiarum, aut. s. ʒ. hieræ compositæ Gale. debita seruata custodia. Et hæc medicina exsoluentes conueniunt, ubi non solum in stomacho, sed in partibus circumstantibus fuerit huiusmodi materie repletio: Si uero sola repletio fuerit in stomacho, sufficiens pilulæ stomachicæ, aut alephanginæ, & abstineat à cibis frigidis ne phlegma augmentetur.

Si autem neque anima subuersio, neque nausea affuerit, neque caliditatis signa apparuerint: uenter ex pilulis cochij multoties soluat. cibaria quoque frigida omnino uitet. & gargarismus fiat, quo phlegma deponatur. & in naribus quoque post illud ponatur aliquid de his, quæ narrauimus, quo caput calefiat.

Ponit curam scotomiae, & uertiginis pendens à phlegmate per essentiam in capite, quam primo complet euacuatione iterata cum pilulis cochij, & integrata ex minoratiuo, digestiui, & eradicatiui. Est enim difficile materias grossas à capite educere. Secundo uitando cibaria frigida, & utendo calidis. Tertio diuertendo cum gargarismatibus phlegma ex capite deponentibus. Quod etiam de caputurgijs, & masticatorijs est intelligendum, omniq; genere diuersionum usque ad ipsam cauterizationem factam in commissura coronali, cum cetera non cõtulerint. Cum quibus autem debeant fieri hæc gargarismata, caputurgia, masticatoria, sufficiens dictum est in capitulo præcedenti. Hic uero commemorabo gargarisma satis huic proposito conueniens. R. masticis, acori, liquiritiæ, passulari. an. ʒ. ʒ. s. ireos, hyssopi an. ʒ. 3. Io. Arculani.

B 2 2. pire-

2. pithris, staphisagris. 3. 3. sinapis an. 3. i. contundatur grosso modo, & bulliant in 4. lib. aquæ ad consumptionem medicatis, & coletur. Et colatura misceatur cum oximelle simplici, aut scyllitico: quo gargarismate utatur stomacho ieiuno. Ultimo docet naribus immitti aliquid, quo caput calefiat, & confortetur, ac phlegma deponatur, siue resoluatur, sicut gallia muscata, species diabræ, muscus, nux muscata, & huiusmodi. Dans per hæc intelligi cætera quæ iuuat ad has intentiones cõplendas, sicut epithemata odorata, & naribus insufflata. Ex odoribus autem conuenientibus est odor superscriptus, aut suffumigium ex aui culis cipri, aut cortice citri, aut thure, nuce muscata, & similibus. Iam superest declaratis quid nominis, & quid rei, & textu exposito, reliqua absoluiamus, scilicet causas, species, signa, prognostica, & curâ. Prima distinctio. Species scotomiarum, & uertiginis sunt duplices, scilicet per essentiam, & per communitatem, siue absolutam, siue non absolutam. Quæ uero sunt per communitatem, quandoque sunt per communitatem à toto sicut in crisi & febribus, quandoque à membro determinato: & potest esse quodcumque membrum sed inter cætera maxime cerebro communicans est stomachus, & matrix. Secunda distinctio, uertigo, siue scotomia, quædam est intensa existens cum corrupta uisione, obtenebratione, & casu, quædam remissa sine aliquo istorum, quædam media. Et iterum, quædam frequens, quædam rara, & quædam media inter has. Pro notitia uero causarum sciendum quod causa coniuncta uertiginis est inordinatus motus spirituum, & uaporum qui spiritibus sunt permixti in uenis, arteriis, & nervis, ac uentriculis, maxime anterioribus cerebri, qui spiritus inordinate moti repræsentant sensui communi species motus qui non est, & sic faciunt sensum commune errare, qui error est actio ipsius non diminuta, non ablata, sed corrupta. Et similiter quandoque errat uirtus uisua propter motum inordinatum spirituum uisibilium deferentium species obiectorum exteriorum quiescentium, ac si mouerentur: unde uisui apparent res extrinsecas moueri, & similiter apparet caput, & corpus ipsius patientis reuolui. Nam æquale est secundum Auicem, cum diuersificatur proportio partium spiritus ad partes mundi, siue diuersificetur ex parte ipsius, siue ex parte mundi: idem enim sequitur effectus, scilicet, ut iudicetur res uisibilis moueri, siue moueatur, siue quiescat. Sed forte quis istabit, quia uertiginosus non errat circa aliquod obiectum, nisi illius species ad sensum commune per oculum deferatur, aut delatæ sint, sed cum nemo possit uidere caput suum nisi forte per species reflexas in speculo, species capitis sui non deferentur per uisum ad sensum commune: non ergo errabit circa caput suum apprehendendo ipsum moueri quando quiescat. Ad quod dicitur, concedendo illud ad quod argumentum deducit, & quod non apprehendit caput suum moueri. Sed solum apprehendit partes corporis sui ab ipso uisibiles moueri, & consequenter fit idem iudicium de capite. Causa uero remotior uertiginis est duplex, primitiua, & corporea. Primitiua quidem sicut si homo moueret se circulariter, spiritus eius similiter moti etiam post quietem corporis repræsentarent res uisibiles similiter moueri, & erit dispositus ad casum, uel forte cadet cum spiritus non figantur in membris taliter, ut possint regere membra. Secunda causa, si homo aspiciat res circulariter motas, aut aliter uelociter motas, sicut aquas currentes aut equos currentes: forma enim rerum uisibilium sic motarum in spiritibus impressæ, similem motum causant in spiritibus: quare disponitur ad casum. Similiter prospectus ex alto loco. Tertia causa est, aspectus rerum radiosarum, & uoluntate lucentium sicut solis, & similibus: mouetur enim spiritus inordinate propter ipsorum excellentiam. Quarta causa, sunt uoces, aut soni excedentes, sicut tonitrua, aut sonus bombardæ: conuulsant enim totum corpus, & spiritus inordinate mouentur. Quinta causa, est percussio capitis faciens motum undosum in spiritibus, sicut mouet aqua ex proiectione rei grauis in ea. Sexta causa, est percussio circa dorsum, agitur enim sanguis, & spiritus in uena chilia, & consequenter in uenis ad caput inde ramificatis ab arteria adorti. Septima causa est, furor, timor, & huiusmodi accidentia spiritus inordinate mouentia: similiter crapula, & ebrietas, somnus multus, & proprie super repletionem, longæ uigilia, & sic de rebus reliquis non naturalibus. Causæ uero corporeæ, quædam sunt

in capite, quædam aliunde communicatæ. Primæ sunt sicut uapores diu quiescentes in capite, postea aliqua occasione commoti. Secunda uapores nouiter geniti ab humoribus, qui sunt in capite ab aliqua mala complexionis forti inducta, aut à causis primitiuis, aut corporeis. Tertia causa, præsentia malorum humorum in capite cuiuscunque generis, aut motorum in ipso capite, aut saltem euaporantium: fortis enim caliditas adueniens capiti mouet humores tam naturales, quàm præternaturales in ipso comprehensos, & facit ipsos euaporare, sicut exemplo Auicem, ignis mouet aquam motu inordinato. Causæ uero communicatæ quodque sunt communicatæ à toto, sicut in febrii crisi, aut alia euacuatione artificiali, per quas sunt plurimum uapores, aliquando tamen humores ad cerebrum deferuntur. Quandoque sunt communicatæ à membro particulari quocunque, frequentius tamen à stomacho, & à matrice. Et hi uapores, siue sint proprii capiti, siue communicati: quandoque sunt tenebrosi grossi, & tunc magis causant scotomiam: quandoque pauciores minus grossi & opaci, & tunc magis uertiginem contra scotomiam distinctam. Et qui communicantur capiti: quandoque per uias amplas communicantur, scilicet meri, & cannam pulmonis: quandoque per uias strictas sicut nervos, uenas, & arterias extrinsecas, aut intrinsecas. Iam superest agere de signis. Signa uertiginis, & scotomiarum absoluta nota sunt ex relatu ipsius ægri. Et forte ex casu, aut dispositione ad casum quæ cernimus in ipso ægro. Et cum hoc ex relatu ægri habemus, utrum sit solum uertigo aut cum hoc scotomia per corruptionem uisus, & obtenebrationem. Interest autem inter uertiginem, & epilepsiam: quia epilepsia est cum motibus spasmodicis sine sensu, aut locutione parum durans: uertigo se habet e contrario, quàmuis ambæ conueniunt in casu. Signa uero uertiginis à causa primitiua est præcessio illius causæ, & nocumentum ex illa causa derelictum. Si uero causa fuerit corporea per communitatem. Primum signum est præcessio nocumenti totius, aut membri alicuius, & quod uertigo crescit, et decrescit cum cremento, aut decremento nocumenti totius, aut membri comunicantis, & quod etiam remouetur cum remotione illius, ut si sit à nocumento totius, tunc præcessit febris, aut crisis, aut aliquid huiusmodi: Similiter si pendeat à stomacho, præcessit mala digestio, deiectio appetitus, grauitas nausea, vomitus, conturbatio, & anxietas stomachi, & quod dolor aliquis est in anteriori parte cerebri usque ad medium propter communitatem neruorum reuersuorum, & fortasse dolor est in collo propter communitatem meri: & si sit à matrice, præcesserunt, aut sunt præsentia ægritudines matricis, & similiter de aliis. Secundum signum, quia uertigo non est ita frequens, aut continua, sicut quado est per essentiam in capite. Tertium signum, quia operationes sensuum non sunt ita læsæ quando, est per communitatem sicut quado per essentiam: quæ autem materie peccant in membris comunicantibus ex dictis superius, & dicendis inferius satis fiet manifestum. Si uero communitas sit absoluta non apparent signa materierum, aut alicuius corporis rei in toto, aut membro communicante, quod tamen rarissimum est. Signa uero uertiginis per essentiam sunt signa his tribus iam dictis contraria. Si uero sit à mala complexionis sine materia, in cerebro erit leuitas capitis, & ferè subitus peruentus illius malæ complexionis notabiliter intensa secundum plurimum ab aliqua causa primitiua. Si uero sit in causa multitudine uaporum, tunc aderit, & etiam præcessit sonitus, & tinnitus aurium, & cuiusdam fragoris in capite, & est caput sine grauitate saltem notabiliter. Si uero sit præsentia materie in capite euaporantis, tunc adest grauitas in capite, perturbatio sensuum tam interiorum, quam exteriorum, & est uertigo ualde frequens, & fortasse adest in capite dolor ferè continuus. Signa cuiuscunque materie in capite peccantis ex præcedenti capite nota sunt. Signa uero uariarum per quas sit communicatio sunt, quia si sit communicatio per uenas, & arterias extrinsecas sentitur ipsarum tumor, & tensio, & pulsatio maior solito. Si uero per uenas, & arterias intrinsecas non apparet tumor, licet magis intra sentiat extensio quædam, & pulsatio maior solito, & in his casibus non est dolor de quo sit curandū. Si uero fiat cõcatio per neruos, adest in collo dolor notabilis magis intra, & nullū signū ex superscriptis apparet. Et etiā quado sit cõcatio per uias intrinsecas, cõpressio super uenis

uenis exterioribus, & stipticorum approximatō non confert uertigini. Prognostica. Primum, uertigo frequens intensa cum perturbatione sensuum nūciat apoplexiā maxime in decrepitis. Secundum, uertigo sequens stuporem nūciat apoplexiā. Tertium, sōda sequens uertiginem soluit ipsam, aut propter calefactionem cerebri ex sōda, unde uapores resoluuntur, aut propter fixationem materiæ in cerebro, unde facit sōdam, & non uertiginem cum prius dum esset in motu fecerit uertiginem sine sōda.

In cura scotomiae & uertiginis si pendeat à causa primitiua, sicut si homo se mouerit in gyrum, & aspexerit res uelociter motas, aut radiolas, aut audierit sonos ingentes, & huiusmodi præterquam à percussione, & crapula. Prima intentio est remotio causæ primitiuae, & uicariæ eius. Vnde æger se remoueat à uisione huiusmodi & auditu sonorū, &c. Remoueat uicariā eius, scilicet commotio spirituum, & eorum disgregatio quiescendo animo & corpore in loco obscuro. Et si causa uicariā derelicta fuerit, mala complexio in cerebro curetur cum contrariis interius & exterius applicitis secundum opportunitatem. Secunda intentio, si humores fuerint in motu propter quantitatem, aut eorum qualitatem, aut modum substantiæ, euacuetur, & diuertantur secundum exigentiam: & cum phlebotomia, & alijs generibus euacuatiuum, secundum exigentiam cuiuscunque humoris, quæ tamen corpus non præter modum agitent, & humores amplius in motu ponant. Et propterea sint coniuncta cum quibusdam stipticis, & confortantibus, sicut sunt mirbalani. Et intendatur cæteris generibus diuersionum. Eam humores, si noceant qualitate & modo substantiæ, alterentur, & ad medium reducantur sibi conueniens donec fiant benigni, aut sint euacuationi præparati. Ingrossatio tamen plus iuuat, & prohibet motum quam subtilitatio. Tertia intentio est respectu accidentium, sicut ut tenebrositas derelicta corrigatur cum clarificantibus, de quibus infra. Accidentia etiā imminetia prohibeantur. Vnde non stent super scalis, nec super aquis, nec prope ignem, nec prope flumina, aut alias res periculosas in quas facile præcipitari possunt. Quod præceptum multo magis in epilepticis est seruandum. Quarta intentio est debitum regimen uitæ. Debet enim locari in aere temperato, & aliquantulum obscuro, & sine cibi, & potus communiter frigidi, acres, & stiptici, sicut succus citioris, granatorum, in quibus buccellæ panis infundantur, nec sint uapores, aut uentofabiles, imò humorum repressiui, dormiat notabiliter, moderatè inaniatur, quiescat, mente & corpore sit tranquillius. Si uero pendeat à solutione continui, curetur cura solutionis continui dicta in cap. de sōda. Quod si post curam solutionis continui remaneat uertigo, curetur per remotionem causæ eius, sicut in sequentibus dicitur. Similiter si pendeat à crapula, aut ebrietate, curetur cura satietatis nauetatiuæ, & ebrietatis infra ponenda: inter cætera prouocetur uomitus, diu abstineat à cibo, & potu, nisi forte in ebrietate biberit aquam, multum dormiat, residuum satietatis nauetatiuæ cum soluentibus leuibus deponatur, & cum confortantibus stomachum, sicut diatrion pipereon, procedatur, maxime in corruptione ad acetosum: & quæ uapores reprimunt. in fine mensæ exhibeantur semen caulis post ebrietatem exhibitum, sedat ipsam.

Cura uero scotomiae per communiter, siue à toto, siue à determinato membro perficitur, sicut superius in cura sōdæ dictum est longo sermone, qui huic capitulo est accommodandus, cum non sit bonum idem toties replicare inter cætera cauendo à uaporosis, & uentosis, & sumendo in fine mensæ, quæ uapores reprimunt.

Cura scotomiae per essentiam, si fuerit mala complexio sine materia, curanda est cum contrariis, tam interius, quam exterius applicitis, & cum hoc, caput confortantibus, de quibus in præcedenti capitulo actum est.

Si uero pendeat à uaporibus prius in capite quiescentibus, nunc uero propter agitationem facientibus scotomiam iam causa à qua generati sunt, remota. Prima intentio est diuertere uapores, & uentofitates, quæ facile possent illos uapores fouere, & augere cum clysteribus, frictionibus, lotionibus, & cum omni genere diuersionum. Secunda intentio est illos uapores in capite existentes resolvere cum fri-

ctione capitis, scalpione, pectinatione, & tandem cum medicinis ipsos resoluentibus, interius & exterius applicitis. Ex quibus sunt sacculi ex milio, & sale in sartagine cum uino, & pauco aceti torrefactis. Interius autem sumenda sunt theriaca, mithridatum, diamusculum, diambra, diaciminum, coriandrum, anisum, ameos, & huiusmodi uentositatem carminantia: magis tamen, aut minus calefacientia secundum ipsorum uaporum naturam. Tertia est confortatio cerebri, & etiam aliquorum instrumentorum sensuum, si debilia fuerint, cum theriaca, mithridato, diamusculo, diambra, foeniculo, & similibus, cum sacculis supra scriptis. Quibus possunt addi cortices citri, nux muscata, maiorana. Sed hæc intentio etiam simul cum secunda compleri posset. Quarta est correctio accidentium, ut sonitus & tinnitus cum impositione olei amygdalarum amarum in auribus: et cum præseruatione ab accidentibus imminetibus. Quinta autem, cum debita administratione sex rerum non naturalium compleretur, unde uidentur uaporosa, & uentosa, & caput grauantia, sicut phaleoli, fabæ, cicera alba, pilces uiscoli, cancri, ostraca, & genera conchilium, caules caputij, fructus humidi, auellanae recentes, &c. ex libro simplicium cognoscenda.

Vinum potens in modica quantitate ualet, procuretur bona stomachi, & hepatis digestio, exercitium supra famē, similiter somnus supra uacuitatem, confert ad resolutionem uaporum, & uentositatum. Accidentia animi caput moderate calefacientia iuuant similiter.

Cura uertiginis materialis quinq; exigit intentiones curatiuas, prima euacuat, secunda diuertit, tertia malam complexionem alterat, & materiam uehemētē repercutit: existentem autem in capite resoluit & extrahit, caput confortando, quarta corrigit accidentia, quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima intentio siquidem materia fuerit sanguinea, & peccet solo quanto non solum in capite, sed in hepate, & alijs membris, materiam capiti communicatibus fiat phlebotomia, primo de sapenis, uel basilica, uel comuni, aut pluribus secundum quod tibi uidetur magis expediens, deinde fiat phlebotomia ex cephalica, & demum phlebotomietur uena post aures, cuius iuuamentum ferè est commune ad omnes scotomias materiales: diuertit enim pro parte, & pro parte materiam in capite coniunctam eradicat. Confert etiam stomachicæ per communiter si cau terizetur, aut laqueetur prohibendo transitum uaporum, aut materiæ ad cerebrum anterius. Si autem peccat sanguinis fuerit in solo capite, sufficit sola phlebotomia cephalicæ, & postea uenæ post aures, aut frontis, aut uenarum nasi, aut uenarum, quæ sunt in cute capitis, aut in his locis sanguisugæ apponantur, postponendo semper, quæ causam coniunctam euacuant. Si autem peccet in quali propter admixtionem aliquis humoris cum sanguine, ille euacuetur cum propriis secundum ipsius naturam, & ingrossetur, & subtilietur secundum opportunitatem. Secunda intentio diuerso fiat cum clysteribus, uentofationibus, frictionibus, ligaturis, & cum omni genere diuersionum usque ad cauterium. Iuuamentum commune huic, & omnibus speciebus uertiginis materialis, est, si comprehenderit ipsam prouenire a retentione menstruum, aut sanguinis hæmorrhoidalis, aut saniei ex auribus, aut alterius euacuationis consuetæ, illa solita euacuatione remouetur. Tertia autem intentio, perficitur cum applicitis ad extra infrigidantibus, & repercutientibus, si opus est, sicut ex oleo rosaceo, & aceto subtriplo ad ipsum. Et in fine cum resoluentibus puris, sicut oleo chamæmelino in medio mixtis. Et potest fieri cum emplastris, fomentis, embrocis calidis, aut frigidis secundum materiam exigentiam ex capitulo de sōda colligendis. Quarta intentio correctio accidentium fiat secundum accidentia præsentia, & imminetia, sicut dictum est. Quinta intentio debitum regimen feruetur sicut in sōda sanguinea dictum fuit. Curatio autem reliquarum specierum uertiginis materialis, sicut cholericæ, phlegmaticæ, & melancholicæ completur iuxta quinq; intentiones dictas, sicut dictum fuit, & ferè cum eisdem remediis, quorum rememoratio præcessit in sōda à simili causa pendente, huic ergo capitulo accommodantur. Si enim in singulis capitulis fieret dictorum superius iteratio, nimium uolumen excreceret. Et hæc de hoc capitulo sufficiant.

Io. Arculani B 3 De

Cura uertiginis

De phrenesi.

Cap. 3.

Phrenesis, karabitus, sirsén, sunt nomina synonyma significancia apostema, scilicet calidum, in panniculis cerebri, de quo diuersi authores sub his diuersis nominibus determinant. Phrenesis autem est uocabulum græcum, licet sit sumptum ab accidente consequente hoc apostema, quod accidens est rabies cum alienatione, attamen apud authores medicinæ significat hoc apostema. Karabitus uero est nomen arabicum sumptum ab accidente, quod est alienatio; propriè. n. in lingua arabica importat alienationem, sed tran sumptum est ad significandum apostema, ad quod sequitur huiusmodi alienatio. Sirsén uero est dictio persica à sir, quod est caput, et sen apostema, quasi capitis apostema, sicut birsén dicitur à bir, quod est pectus, & sen apostema, quasi pectoris apostema. Et ex his patet quid rei. Est. n. apostema calidum per essentiam in panniculis cerebri, ad quod significandum sunt hi tres termini contracti. Verum aliquando ampliat ad significandum apostema calidum in substantia cerebri, quod est deterius, & ut plurimum interficiens in quarto, licet apostema panniculorum sit magis dolorosum. Et cū tran seunt quartum, secundum plurimum sanantur. Est. n. ægritudo peracuta. Et si quis quæreret, quis panniculorum cerebri frequentius apostemetur. Dicendum hoc esse difficile scire, sed dura mater citius debet apostemari, ex eo quod natura est minus de ipsa sollicita, & forte à causis extrinsecus occurrentibus. Sed pia mater frequentius, quia mollior, & plena uenis, & à causis intrinsecus occurrentibus magis apta apostemari. Compara ergo hæc adinuicè: sed in pia matre est deterius. Neq; habeas pro inconuenienti substantiam cerebri posse apostemari; licet Serap. opinatus sit contrarium, nam oia membra, siue dura, sicut ossa, siue molliora, sicut cerebrum, & pulmo, possunt apostemari: omnia. n. membra, quæ possunt extendi cū nutrimento, & augeri, possunt etiam extendi cum superfluitate, & sic apostemari. Notate tamè membra dura, sicut ossa, & panniculi, frequentius apostemari à materia calida subtili: si apostementur per uiam defluxus. Et contrario membra rara molliora à materia frigida, & grossa. Vbi uero per uiam paulatinæ cōgestionis, tunc apostematam em naturam sui nutrimenti, & superfluitatis inde deciscit.

Cum aliquē febris conclusa continuata inuaserit cum forti capitis, & oculorum grauedine, et in facie, atq; in oculis uehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, et horror luminis affuerit, & in pulsi uelocitas, & frequentia superfluitas inueniantur; signa phrenesis certissima iudicantur. quod si lingua nigra, aut citrina fiat, & permisceatur intellectus, & multum fuerit alienatus, & uigilauerit multum; iam phrenesis perfecta est.

Diuiditur præsens capitulum in duas partes. Primo agit de phrenesi theoricè: secundo practicè. secunda ibi. Aegro itaq; antequā. Prima in duas. Nam primo ponit signa phrenesis inchoantis, siue nondum confirmatæ. Secundo ponit signa phrenesis confirmatæ. secunda ibi. Quod si lingua nigra. In prima parte Rasis ponit sex signa phrenesis inchoantis: siue prognostica phrenesis ex proximo secuturæ. Primum est febris continua conclusa, idest, in qua non sunt excrecentiæ, aut decrecentiæ, quod est proprium febris sanguinæ ex sua forma specifica, ut nō crescat de die in diem, nec de tertio in tertium, aut de quarto in quartū. Vbi uero phrenesis esset cholericæ febris, sequēs esset causosus, aut tertiana continua. Secundum signum est fortis grauedo capitis, & oculorum propter multitudinem sanguinis in his partibus grauitantis, licet hoc signum sit commune phlegmati, & melancholice, & non sit cholera. Tertium signum est uehemens rubedo in facie & oculis, quod est proprium signum sanguinis si rubedo illa fuerit purpurea tendens in obscurum. Vbi aut fuerit purpurea tendens in citrinum, magis attestatur cholera. Verum tensio uenarum facit differre inter sanguinem & choleram, cum in sanguine sit ualde maior. Quartū signum est capitis dolor proueniens immediate à mala complexionē, & solutione continui. Est tamen differens in proueniente à sanguine, aut à cholera, quando proueniens à sanguine sit extensius, à cholera uero mordacitius, & pun-

gitius. Quintum est horror luminis, quia lumen nimium calefacit, disgregat, & dilatat amplius sanguinem, & spiritus ipsos magis ad partes faciei, & oculorum trahit, unde æger ex lumine læditur, propterea se conuertit ad tenebras effectus contrarios iam dictis producentes. Verum horror luminis posset ex alijs causis contingere, sicut ex spiritibus paucis, & subtilibus, & cæteris causis noctilopæ, sicut ex ulcere corneæ. Sextum signum est uelocitas, & magna frequentia in pulsu propter necessitatem adauctam, cui non potest per solam magnitudinem satisfieri, aut forte debilitata uirtute, aut instrumēto factio inobediente pulsus est paruus. Verum in proueniente à sanguine pulsus est maior, & magis plenus q̄ in proueniente à cholera. In secunda parte ponit signa demonstratiua phrenesis præsentis, & iam confirmatæ. Primum est lingua nigra, aut citrina: citrina quidem si proueniat à cholera, & tandē efficitur nigra & arida aduersione continuata. Si uero à sanguine efficitur nigra per aduersionē non tamen præcedente citrinitate. Secundum signum est permixtio intellectus, idest, corruptio cogitatio, & existimatio, & multa alienatio, idest corruptio, & magna læsio sensus cōmunis, quæ etiam imaginatiua dici posset: potest. n. & recte, & corruptè imaginari, quod multo magis potest cogitatio, quod prouenit ex phrenesi in organis harum uirtutum facta: nam si fuerit in primo uentriculo, magis læditur sensus cōmunis: si in secundo, magis cogitatio, & existimatio: si in posteriori, magis memoratio. Tertiū & ultimū signum est superflua uigilia proueniens ex uehementi caliditate, & siccitate, sicut ad somnū magis facit frigiditas, & humiditas.

Iam opus est pro complemento huius partis theoricæ, ut ponamus species, & causas, & secūdo supplicemus signa, quæ omisa sunt à Rasi, & ultimo prognostica iuxta morem consuetum. Phrenesis est duplex, uera, & non uera. Vera est apostema calidum per essentiam in panniculis cerebri. Et est duplex. Quædam parua lædens unum uentriculum tantum pendens à pauca materia. Quædam est magna ualde pendens à multa materia apostemate fere omnes partes panniculorū, & lædente fere omnes operationes sensuum interiorum. Imò quandoq; adeo excrefcēs est, ut propter multitudinem extensionis dilatet commissuras, & tumor partibus extrinsecis communicetur. Quædam est media inter has. In parte tamen posteriori raro fit phrenesis propter frigiditatem eius, sed secundum plurimum lethargia. Phrenesis autem nō uera, quæ dicitur paraphrenesis, idest, iuxta phrenesim non est apostema, sed aduert accidentia ueram phrenesim cōsequentia, sicut dolor, alienatio, & uigilia, & huiusmodi: hæc autem pendet à materia, siue à uaporibus à toto communicatis calidis, imprimētibus nocumentum in cerebro, sicut in febris acutis, & crisi. Et aliquando per simplicem alterationem acuendo spiritus & sanguinem. Secunda causa est humores acuti in ore stomachi, uel in fundo cōmunicantes nocumentum cerebro. Tertia causa est apostema stomachi, aut dolor uehemens in eo, similiter apostemata cholericæ, uel sanguinea in alijs membris communicantia fumos, uel nocumentum ab olutē, sicut apostema almoachi, diaphragma, pleuresis mediastini, pulmonis, lacertorum, pectoris, uesicæ, renum, matricis, intestinorum, iuncturarum, & membrorū ner uorum. Veræ autem phrenesis, causæ primitiue sunt oia exacuentia choleram, uel sanguinem, & cerebrum multum calefacientia, sicut sol, aeris caliditas, cibi, & potus nimis calidi, & multi, motus fortes, & huiusmodi. Causæ corporeæ sunt duplices, antecedentes, & coniunctæ. Antecedentes sunt humores subtile, acuti, apti penetrare in panniculos, sicut sanguis cholericus, cholera rubea, cholera citrina, & quædoque humores adulti subtile, sicut sanguis, & cholera adulti: frequentius tamen euenit à sanguine, & est benignior, deinde à cholera, siue rubea, siue citrina, & est malignior: deinde ab humoribus adultis, & est malignissima cui associat dæmonium. Placuit tamen Auenzoar ipsam posse prouenire à melancholia foecali tertio theisr. Et subdit quod licet humores calidi sint frequentius in causa, sicut cholera, & sanguis: ipsi tamen non sunt puri, sed aquoso phlegmati permixti à quo cerebrum non denudatur. Causæ autem coniunctæ sunt idem humores actu facientes apostema.

Signa ueræ phrenesis quædam sunt prognostica, quædam sunt

sunt demonstratiua, & quædam rememoriatiua. Primum signum prognosticum phrenesis sunt febres acutæ, cõtinae, maximè cum dolore capitis. Secundum, stipticitas uentris in eis, & subtilitas urinae, materia cholerica petente superiora. Tertiũ obliuio rei nouiter factæ sine causa exteriori, quia significat materiam iam opprimere cerebrum. Quartum, somnia mala terribilia, & procliuas ad iram, & odium sine causa, quia arguit materiam calidam petere cerebrum. Quintum, dolor capitis cum repletionem, & extensionem uenarum faciei, & oculorum. Sextum, facies citrina præter solitum. Septimum, uigiliæ proluxæ. Octauum, somnus inquietus cum furore, & clamore. Nonum, stridor dentium non consuetus in somno, & in uigiliis.

Signa autem prognostica phrenesis iam inchoantis sunt illa sex, quæ posuit Rasis in textu, superius exposita, scilicet, febris continua conclusa, magna capitis, & oculorum grauedo, uehemens in facie, & oculis rubedo, dolor capitis, horrior luminis, uelocitas in pulsu, & magna frequentia. Et ex prognosticis est corporum præparatio. Corpora autem præparatiua ad phrenesim sunt sanguinea, & cholerica, & magis iuuenes quam senes. Ex qua cõmuniter senes nõ euadunt. Iuuenes autem ceteris paribus magis euadunt. Sed pueri maximè inter oēs.

Signa uero demonstratiua phrenesis præsentis sunt tria, posita à Rasi, & superius exposita, scilicet lingua nigra, aut citrina, permixtio intellectus, & multa alienatio, nec nõ multæ uigiliæ. Hæc namque signa simul cum præcedentibus, & cū his quæ sequuntur præcise distinguunt ueram à non uera, & cum his, quæ significant partes cerebri læsas, & cum significatiuis causis cõiunctas ipsius phrenesis, sunt certa signa demonstratiua phrenesis præsentis.

Signa distinctiua inter phrenesim ueram, & nõ uerã sunt, quia cum dolor capitis perseuerat & alienatio, & uigiliæ, & febris continua conclusa, & cetera signa phrenesis iam dicta tunc est phrenesis uera. Si uero hæc accidentia interpollentur & crescant febre, aut alia ægitudine, quæ præcessit, crescant & illa decrescant decrescant, & illa recedente etiã recedat, tunc est phrenesis nõ uera, sicut in paroxysmis febris acutæ frequenter accidit, & non est aliqua phrenesis per cõtatem, quæ ita appareat continua, & faciat medicum quandoque errare, sicut quæ sequitur apostema diaphragmatis. Secundo, phrenesis uera non fit subito, sed paulatim, & semper augendo procedit, non uera fit subito, & quandoque augetur, & quandoque minuitur. Tercio, in non uera præcessit nocumentum totius, aut alicuius membri, sed in uera non est hoc necessarium.

Signa uero causarum phrenesis sunt, quia incipit cum rubedine oculorum, uenarum tensione, & plenitudine, & ceteris signis atrescantibus sanguini, ex ætate, complexionem, habitudine, tempore, regimine, &c. tunc illa phrenesis est sanguinea. Præterea est cum risu. Tercio, est uniformis propter motum sanguinis esse uniformem. Alij autem humores hñt motus determinatos, quibus mouentur, aut de die in diem, aut de tertio in tertium, aut de quarto in quartum. Quarto, distillatio sanguinis ex naribus. Quinto, oculi pleni lippa. Sexto somnus longus. Septimo, imaginationes rubæ. Octauo, lingua rubea postea nigra per adustionem. Si uero sit cum rixa rapacitate & audacia, inquietudine, & facies & oculi fuerint citrini & ficci, & multæ uigiliæ, linguæ citrinitas, deinde nigredo cum asperitate & alia signa significatiua cholerae, tunc phrenesis est cholerica, quibus addas imaginationes citrinas attenuationes narium, tractionem frontis ad superiora, spasmatis musculus frontis. Si uero sit cum rixa cõtina, maxima inquietudine permixta melancholia, cum continua uigiliarum infantia, febri acutissima, cū nigredine linguæ & asperitate & ceteris signis significantibus humores adustos, tunc pendet ab humoribus adustis, & sunt oculi turbati ex directo pupillæ, uaporibus adustis spiritibus permixtis. Et cum his duabus speciebus frequenter coniungitur demonium, ita ut sint cum furore maximo omnes percutientes, nec possunt teneri nisi difficulter. Et si non tenerent proicerent se ex fenestris. Si uero sint nunc cū fletu, nunc cū risu, & ceteris significantibus humores mixtos, tunc pendet ab eisdem. Signa uero significantia partes cerebri læsas sumuntur maxime à læsione operationum. Nam si lædatur sensus communis, ut quia nõ cognoscat sensibilia extrinseca sibi prius nota, nec inter ea

ponat conuenientiam & differentiam, & colligant uillos, & sciscitentur species sensorum, quæ nõ sunt, & corrupte imaginentur tam in luce quam in tenebris, tam oculis apertis quam clausis, tunc læsio est in parte anteriori cerebri, & in primo uentriculo: quod confirmatur si nocumentum oculis communicet, ut quia fiant ophthalmaci, & similiter, si dolor suus fuerit in parte anteriore. Si uero dolor fuerit in medio capitis, & læsa fuerit cogitativa, ut quæ male discurrat, male componat, & diuidat & similiter existimatiua, ut quia eliciat amicitiam, ubi debet elicere inimicitiam, aut e contrario, & alia similia, tunc phrenesis est in secundo uentriculo, & hic turbatur, in eo quod audiat, quia nerui auditus. Quintum pars, cor respondet medio uentriculo, licet sit uerisimilius neruos omnium sensuum ad primum uentriculum. scilicet organum sensus cõis terminari, & loquitur cum alienatione plurima, quia cogitativa est domina sermonis. Si uero fuerit obliuiosus nec reseruauerit spēs, aut intentiones, quas merito debuisset seruare, ut quia petit urinale, & obliuiscitur propter quod petit, tunc phrenesis est in posteriori cerebro, & præcipue si dolor fuerit in parte posteriori. Si uero fuerint læsæ plures uirtutes cum febre maxima, & dolor fuerit in pluribus partibus, uerisimile est phrenesim multis partibus communicari, sed hoc attendendũ est in principio non in statu, quia forte tunc posset nocumentum unius partis toti communicari.

Signa uero distinguunt inter apostema cerebri, & panniculorum sumuntur ex dolore. Quia non est dolor nisi obitus ex apostemate cerebri, & adeit rubedo, aut citrinitas in oculis, ita ut appareat ophthalmici, & pulsus est undolus. Contraria signa sunt in apostemate panniculorum, & apparent oculi in apostemate cerebri, quasi exētes propter impressionem à neruis opticis apostematis, & oculis illius lateris in quo est apostema sibi magis cõpatitur. Verum apostemate existente magno quandoque dolor ultra modum excrescit propter extensionem panniculorum, sed quomodocumque sit, ceteris paribus, magis communicatur nocumentum oculis in apostemate sanguineo, & cholerico cerebri, quam panniculorũ, & est maior ægitudine secundum plurimum interficiens in tertio propter nobilitatem mēbris: & si non moriuntur usque ad quartum, euadunt.

Signa temporum phrenesis. Primum, quia subscripta accidentia remissa cū inchoant significant principium. Cū manifeste augentur, augmentum. Cum stant in sua maxima intentione, statum. Cum uero manifeste declinant, declinationem, licet raro declinent, cum secundum plurimum moriantur. Secundum, dolor cõicatus parti posteriori, quoniam solū prius fuerit inincipite, significat phrenesim factam, & materiam in panniculis fixam, & hoc uniuersaliter significat exiccatio oculorum à forti flamma, & postea fluxus lachrymæ inuolutariæ maximæ ex oculo correspondente parti læsæ propter defectum contentiua, & est mortale. i. prognostico. cõ. 14. & Gale. 4. apho. confirmat: etiam significat fluxus sanguinis narium guttatim, natura nequeunte multum expellere.

Signa uero rememoriatiua sunt accidentia ex phrenesi derelicta. Signa permutationis phrenesim sunt hæc. Si permutat in lethargiam, primo remittuntur oīa accidentia sequentia feruorem. Secundo profundatur oculi magis quam in lethargia non consequente phrenesim, magis consumpta humiditate ex phrenesi præcedente, & materia magis deriuata uersus posteriorem uentriculum. Tercio ad sunt magis lachrymæ, materia ad naturam phlegmatis uersa. Quarto currit salua, siue superfluitas humida. Quinto pulsus tardus diminuta necessitate: & lenis, & undolus remota siccitate. Signa permutationis in aschachilos sumēda sunt prima tertij tract. 3. cap. de signis karabiti circa finem. Primo occultatur nigredo oculorum oculis tractis uersus cerebrum, sicut in appropinquantibus morti, & apparet albedo oculorum uersus cerebrum. secundo dormit lupinus uirtute debilitata. tertio inflat etiã uenter eius propter defectum caloris uapores grossos exiccantis, & nõ resoluendis, unde retinetur. quarto extenduntur ossa pectoris anhelitu magnificato ob phrenesim augmentum. quinto multiplicatur tremor mēbrorũ ob defectum uirtutis motiua, uel tremor, id est, iectigatio propter uapores communicatos musculis & neruis. Sexto apparent testiculi albi sanguine, & spiritu tractis ad caput. Si uero per

Io. Arculani. B 4 mutetur

mutetur in hecticam, sit pulsus durus, paruus, frequens, secundum habitudinem unam, oculi profundantur ob resolutionem humiditatis, corpus denigratur ex arefactione, & multa alia signa hecticorum. Si mutetur ad spasmus, erunt signa spasmii, de quibus infra dicitur in capitulo de melancholia. Si uero ad substantiam cerebri, signa patent ex dictis superius.

Prognostica. Quando phrenesis adeo excreuerit, ut separetur commissuras, & tumor partibus extrinsecis sit communicatus, tunc est mortalis. Secundum, permixtio rationis cum fletu & risu ex quo significatur permixtio sanguinis, & melancholia est ualde mala. Tertium, phrenesis facta ex permutatione peripneumoniz ad ipsam, ut septimo aphorif. 12. aphorif. In peripneumonia phrenesis mali, quod intelligendum est, tam de non uera phrenesi significante calorem intensum, & fumos malignos caput petentes, quam de uera phrenesi permutata materia symptomatice ad cerebrum, quæ permutatio est praua, & mortalis, ut post tantam ægritudinem apostemetur cerebrum membrum principale; non uera autem significat malitiam peripneumoniz, quæ secundum plurimum est mortalis. Similiter, si phrenesis uera permutetur ad non ueram, est malum ualde, sicut si materia apostematis panniculorum cerebri permutetur ad pulmonem, aut diaphragma, & sic cordi uicinetur. Similiter si tapta sit, ut communicet nocuum abolutum illis membris, ut quia doleant, & impediatur in operationibus suis, est uehementer malum, &c. Similiter si permutetur ad substantiam cerebri est cito perimens. Si uero permutetur ad loca emunctoria cerebri, aut aliquod membrum ignobile, permutatio illa, salubris est. Quartum, spasmus sequens phrenesim mortalis, præcipue de inanitione. Quintum, uomitus cholera rubra, aut citrina præcipue ad quem non sequitur aluatiuium malum, sed uomitus cholerae zinariæ prædicat festinam mortem. Sextum, urine limpida, clara, significantes deriuatiuium materiz ad cerebrum, & uirtutis impotentiam ad expellendum ad uias urinæ, ut quarto aphorif. Quibus urine limpida, clara, pronunciant mortem. Vnde Auicenna, nullus uisus est habens apostema in partibus cerebri, cuius uisina fuerit aquosa, qui euaserit. Septimum, phrenesis in qua habetur fiducia, est, in qua æger recordatur alienationum suarum: non enim est cerebrum ultime oppressum. Octauum, sperandum est in ea, in qua est risus continuus, ut sexto aphorif. Desipientia, quæ cum risu sunt, securiores. Significant enim materiam sanguineam benigniorem. Nonum, fluxus hemorrhoidalis sequens ad phrenesim bonum, cum per illum quandoque etiam causa coniuncta educatur, aut saltem causa antecedens fouens coniunctam, unde potest redditor uirtus fortior super coniunctam ad eam resoluentem. Decimum, phrenesis in lethargia permutata secundum plurimum bonum: si uero ad demonium, perniciosum, materia facta adusta, & magis acuta, & maligna: si uero ad hecticam materia communicata toti, aut resoluta, caliditate urina remanente, bonum, dat enim inducias: permutata autem in alchachilos mortem festinam, materia putrefaciens panniculos cerebri. Vnde septimo aphorif. Quicumque in cerebro schachilon patiuntur, in tribus diebus pereunt. Vnde decimum, fluxus sanguinis narium frequenter soluit phren.

Duodecimum, sudor superueniens non diaphoreticus frequenter est salubris terminans ipsam. Si uero fuerit diaphoreticus, mors festina sequitur. Decimumtertium, rixa fortis, continua inquietudo, saltare super parietes in phrenesi uera, mortale: significat enim demonium esse coniunctum. Et si queratur, unde est, quod sunt ita fortes secundum uirtutem motiuam, & ita debiles secundum sensitiuam. Dicendum quod apparent fortiores secundum uirtutem motiuam quam ipsi sani, quod tamen non est uerum, sed hoc prouenit, quia mouentur secundum ultimum conatum parendo menti læse, quod non faciunt dum sunt sani, nisi forte fugientes pericula, sicut ignem, aut a uolentibus ipsos occidere: uirtus autem sensitiua diminuta est, quia exccatio proueniens a phrenesi magis lædit neruos sensitiuos quam motiuos; cum nerui sensitiui operationes suas magis humiditate perficiant, & etiā ex alio, quia mente ægotante non debite sentiunt etiam res dolorosas, iuxta aphorifimum secundæ part. Quicumque do-

lentes aliquid corporis plurimum dolorem non sentiunt, his mens ægotat. Decimumquartum, si bibunt aquam, & stragulantur, de proximo moriuntur, anhelitu impedito, aut forte meri spasmato, & præcipue si in strangulatione illa spuma circa os appareat: nigrescunt enim eorum facies propter caloris innati suffocationem, & quia spiritus & sanguis ad loca ita uehementer læsa conuertuntur, & oculi sunt congelati, non moti propter spasmus, & fit frequenter strangulatio cum propter necessitatem magnam non possint tanto tempore continere anhelitum donec bibant. Decimumquintum, quando currunt infania ducti, agerens secundum ultimum conatum, deinde cadunt statim, moriuntur spiritibus resolutis. Decimumsextum est sumptum ex libro Hippo. Si infirmo pollice infirmi apparuerit similitudo fabæ citrinæ, duræ, & infirmus soluatur superius & inferius, moritur in fexto: nam per illam apparens in pollice scilicet manus, & ante signa digestionis significatur soluta mala uenenosa, scilicet stimulan uirtutem, & uirtus significatur impotens cum non possit expellere ad extra, sed solum cretice per uiam permutationis, & partem ualde paruam, & hoc confirmat, quia natura symptomatice operans soluit uentrem, uel prouocat uomitum, ideo moritur in fexta, quæ assimilatur feno tyranno, si non moritur ante. Decimumseptimum, inquisitio extremitatum, & festuacum est mortale, primo prognosticorum cō. 27. ad finem, quia significat ultimam corruptionem uirtutum interiorum, & frequenter fit cum clausione oculorum. Decimumoctauum, est frigus perseverans extremorum propter conuersionem sanguinis, & spirituum ad caput apostematum, ut 4. aphorif. cōmen. 48. In non deficientibus febribus, si quæ extra frigida fuerint, &c. 7. aphorif. In morbis acutis frigiditas extremitatum malum. Decimumnonum, anhelitus diuersus, & inordinatus aliquando interceptus propter fortem dolorem, aut quia anima est ad aliud officium conuersa, unde obliuiscitur anhelare, malum. Vigefimum, extensio osium pectoris necessitate cogente ad multum dilatandum pectus, licet hoc amplius appareat in phren. ab apostemate diaphragmatis, malum. Vigefimum primum, tremor membrorum nocuum hepati communicato, malum, aut forte soluit ægritudinem. Vigefimumsecundum, abscissio uocis, aut propter spasmus, aut quia obliuiscitur loqui, mortale. Vigefimumtertium, si desyderant aquas, sed parum bibunt, quia continue uariis imaginationibus distrahantur, malum. Vigefimumquartum, pulsus durus ferrinus est propter apostema esse in membro fisco, scilicet panniculis: si uero esset in substantia cerebri esset undosus: si in utraque erit mixtus. Et est uelox, ut satisfaciatur necessitati: & tandem ægritudine procedente fiet frequens, tum quia uirtus debilis non poterit ipsum magnificare, aut uelocitare, tum quia instrumentum fiet inobediens, arteria præter modum exccata: diuersus & inordinatus propter uirtutis debilitatem, & fortem pugnam: tremulus propter uirtutis subleuantis impotentiam, aut propter resistentiam ex duritie arteriz, aut quia sequitur tremorem cordis ad quem sequitur syncopis: spasmiosus, quia arteria reperitur tensa ad modum chordæ, & significat phren. factam, & spasmus de inanitione, aut non proportionatum ad materiam. Et si erit calida & sicca magis quam frigida & humida significat ægritudinem factam, & secundum plurimum mortem. Vigefimumquintum, quiescere in maiori parte corporis, & non in manibus arguit uirtutem prostratam, quæ prius deficit in pedibus quam in manibus. Vigefimumsextum, pigre loqui, & submisce cum alienatione mortem portendit significans uirtutis oppressionem. secunda quarti, alienatio cum alguaza, id est, uoce submissa, & taciturnitate est mortale. Vigefimumseptimum, distillatio urine inuoluntariæ, malum. Vigefimumoctauum, obliuio doloris, nisi absint causæ doloris, mortale.

Ægro igitur, antequam prædicta compleantur accidentia; est subueniendum ex sanguinis detractione, & uentris solutione cum succo fructuum.

In hac parte Rasis ponit curam phrenesis. Et diuiditur hæc pars in quatuor. Primo curat phren. per euacuationem, secundo per diætam, tertio cum medicinis capiti applicitis, quarto iterum

iterum redit ad complendum sermonem de phlebotomia. secunda ibi. Nutrimetur uero. tertia ibi. Caput autem. quarta ibi iuxta finem capituli. Cum autem eger. De prima parte dicit Rasis phreneticum esse curandum cum sanguinis extractione antequam prædicta accidentia compleantur. Pro quo notate festinandum esse in cura phrenesis, & similiter in cura cuiuscunque ægritudinis non dantis inducias: nam si in phrene si expectetur quod materia sit fixa, cura erit cassa & uana, uerum antequam figatur, cura est possibilis, sed non apud negligentes, & stolidos, ergo quamprimum occurrere præmissa uel tris lenitione, aut natura, aut arte cum clysteri leniente, fac phlebotomiam uirtute, & ætate, & cæteris consentientibus, quæ phlebotomia sit copiosa usque ad syncope excludit, si oportuerit, multo sanguine peccare, & fiat ex cephalica eiusdem lateris: post hæc si cholera fuerit permixta sanguini cum succo fructuum euacuetur, quæ medicina superius posita fuit in cap. de phalæra.

Nutrimetur uero eius sit aqua hordei, semel, aut bis in die sumpta secundum consuetudinem, quam in tempore sanitati habuerit.

In hac parte curat per dietam exhibendo aquam hordei semel, aut bis secundum consuetudinem, quam æger in sanitate habuit. Pro quo notate duplicem aquam hordei. Vnam quæ est potus medicinalis, altera uero potus tantum. Quando est potus medicinalis sit hoc modo. R. hordei excorticati, & bene fricati cum panno aspero lib. i. aquæ claræ lib. 20. bulliant in uase uitreato bene mundo, lento igne, & sine fumo ad consumptionem medietatis, & coletur. Hæc quidem cum hoc, quod est potus, est etiam medicina: lenit enim uirtute medullæ hordei, & abstergit per corticem eius. Secunda uero, quæ est potus tantum, recipit, ut supra hordei conditionati lib. i. laua ipsum pluries cum aqua calida, deinde cum 10. lib. aquæ facias ipsum bullire una ebullitione, postea aquam proice, deinde ponas super ipsum aquam lib. 20. & decoquas usque ad consumptionem medietatis. Hæc enim aqua sicim, & asperitatem sedat, inflammationem extinguit, ueterem lubricum reddit, præcordia humectat, & non est abstersiva. Si uero hæc aqua ulteriorem decoctionem recipiat infundendo in eam parum post circa lib. 10. aquæ calidæ efficitur cibus & potus, quæ quibusdam colata, quibusdam uero non colata secundum necessitatis exigentiam ab Hippocrate dari præcipitur. Colata tamen est minus nutritia. Et quando adhuc ulterius recipit decoctionem usque adeo, ut habuerit mediocritatem inter spissum iustum, & liquidum, est cibus laudabilis habens bonitatem solines. Si ergo phrenesis acutissima fuerit stabimus contenti aqua hordei, quæ est potus medicinalis, aut potus tantum. Si uero fuerit paucæ acuitatis dabimus pristinam habentem mediocritatem inter spissum iustum, & liquidum. Si uero phrenesis fuerit media, dabimus mediam inter has, quæ est cibus & potus. Verum moderni ex farina hordei faciunt pristinam, quæ est cibus satis conueniens si bene decoquatur, & moderni etiam non ita tenuiter dixerant sicut antiqui, cum homines nostri temporis magis gulæ indulgeant. Si autem uolueris esse contentus aqua hordei consulo, ut saltem quater in die naturali exhibeas, scilicet quinq; aut sex uncias pro uice.

Caput autem ex oxyrhodino infundendum erit. quod si multa affuerint uigilie, sumantur uiolarum siccarum, corticum papaueris albi, hordei excorticati, sem. lactucarum, radicis mandragoræ, omnium. ana. m. i. quæ omnia in curcuma plena aqua tandiu coquantur, donec aqua rubefiat, deinde aqua illa dum est tepida, ab alto super caput fundatur. & sit caput super ciminile, in quo aqua colligatur: quæ in curcuma posita iterum super caput fundatur. hoc autem omni die multoties fieri conuenit, caput præterea ex oleo uiolato muliebri lacte admixto inungendum erit: quod etiam in cotto positum capiti est supponendum.

In hac tertia parte iubet quasdam medicinas capiti apponi ad infirmitatem caput, & confortandum, & materiam ad ipsum ueniens repercutiendam. Prima est oxyrhodinum id est, ex aceto & rosæ compositum, uel in quo est uirtus ro-

farū. istud est medicamen supra descriptum in cura sode sanguinis, in quo acetū est subquaduplū ad aquā rosaceā, & oleū rosaceū. uerū melius est, ut sit tertia pars si intēdas magis repercutere, & sit oleū omphacinum factū ex oliuiis imaturis, & rosæ sint albæ syluestres non maturæ. Secunda medicina administranda est, ubi multæ fuerint uigilie, cuius est hæc descriptio. R. uiol. sicca. quæ sunt frigida & humida in primo, hordei excorticati frigidi & sicci in primo, corticis papaueris albi, frigidi in tertio, sicci in primo, semi. lactucarum, frigidi & humidi in secundo, radicis mandragoræ frigida in tertio, sicca in secundo, omnium. ana. M. i. quæ omnia in curcuma (& est uas satis notum) plena aqua donec aqua rubea fiat, decoquantur usque ad consumptionem medietatis. Viola tamen ponantur in fine decoctionis. Hæc autem aqua super caput ex alto fundat embrocando, & sit caput super concha, in qua aqua colligatur, quæ aqua in curcuma posita iterum super caput fundatur, quod in die multoties fieri conuenit, ut uirtus medicinae ad profundum penetret: forti. n. ægritudini fortis medicina opponitur. Et hæc aqua debet esse tepida, aut actū frigida, magis, aut minus secundum fortitudinem uirtutis, consuetudinem ægri, & gradū ægritudinis, cui apponitur. Tertia medicina conficitur ex oleo uiolaceo, lacte muliebri admixto ex quo caput est iungendum, & cotū, siue peciæ lineæ in eo infusa sunt supponenda, & multoties reiteranda ad tollendam malam complexionem calidam.

Cum autē æger in principio huius ægritudinis in uirium fortitudine permanere inuenit fuerit, phlebotomādus est, nisi super infirmum timueris. postquam uerō eius ægritudo minui cæperit, nequaquam phlebotometur. quod, si eius iam soluta uirtus est; ex alio præseruetur regimine, donec euadat.

In hac parte ultima dicit phlebotomiam esse faciendā duabus conditionibus obseruatis. Prima quod ægritudo sit in principio, aut saltem non sit in statu tota materia iam fluxa.

Secunda, quod uirtus sit constans, adde ætatem, & reliqua à quibus sumitur indicatio de phlebotomia. Ultimo dicit, quod cum ægritudo declinare inciperit, nequaquam fiat phlebotomia, imò si tunc temporis uirtus fuerit dissoluta, regatur alio regimine magis ingrossante, exhibendo aliquid carniū tenuium conditarum cum uino granatorum, aqua rosacea, succo arancij, acetositate citri, & etiam aliquid uini pauciferi optime lymphati donec ad sanitatem redeat.

Cura phrenesis quinq; exigit intentiones curatiuas: prima euacuat, secunda diuertit, tertia repercutit malam complexionem alterando, in fine resoluit, in medio simul repercutiens & resoluens, quarta corrigit accidentia, quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima intentio. Mihi non occurrit nisi unus casus in quo non competit phlebotomia. scilicet quando phrenesis pendet à sola cholera nullo sanguini permixta, corpore etiam existente pauci sanguinis. In hoc. n. casu sola pharmacia opus est. Tūc ergo exhibeatur aqua fructuum. R. prunorum. 3. s. tamarindorum. 3. 2. uiol. 3. 2. mirobalanorum citri. 3. 1. cōtundantur grosso modo mirobalani, reliqua fuciantur præter uiolas, & bulliant in 10. 3. aquæ ad consumptionem medietatis, sed uiolæ ponantur in fine decoctionis. coletur, & clarificetur, & in potu tepida exhibeatur. Si uero uenter esset nimis stipticus posset addi aliquid mānæ, aut aliquid parum electarij de succo rosæ aut electarij de psillio, & similibus, &c. Si autem medicinam sumere nō posset, fiat clystere ex decoctione maluarum, matrum uiolarum, lactucarum, florum nenupharis, & existente magno caumate, semper uiuæ, solatri, de qua decoctione accipiantur. 1. 5. 3. olei uiolati 3. 3. salis. 3. s. & tepidū imponatur. Si uenter esset nimis stipticus possunt addi. 3. aut. 4. 3. electarij succi rosæ, quæ clystera in hoc casu, & in alijs de quibus statim sunt frequentanda, ut uenter maneat lenis, & ad inferiora fiat diuersio. In oibus alijs casibus inchoandum est à phlebotomia consentiente uirtute, ætate, & alijs à quibus queritur licentia de phlebotomando. Sed sunt tres casus in quibus opus est incipere à phlebotomia uenarum pedum. scilicet. phrenarū, aut aliarum. Primus casus est, ubi in toto esset sanguinis plethora, tunc phlebotomandæ sunt saphenæ ambæ, si materia ambabus partibus capitis communicetur. Si autē soli

foli dextra, phlebotometur saphena dextra: si foli sinistra, saphena sinistra, secundo per duodecim horas, aut circa, post phlebotometur basilica eiusdem lateris: & tertio post phlebotometur cephalica in manu: si queris maiorem diuersione & in brachio, si queris maiorem euacuatione. Postea phlebotometur uenæ frons, aut leporis nass, aut eisdem locis sanguisugæ applicentur, & etiam intra nares, quæ etiam applicentur faucibus, scilicet parum infra aures optime diuertunt, & euacuant. Similiter uenæ post aures, & labij superioris phlebotomata conferunt, aut si in eis sanguisugæ applicentur. Vltimo, si opus est, phlebotometur uenæ per cutim capitis dissecinatæ, aut sanguisugæ applicentur: euacuant enim causam coniunctam. Secundus casus est, ubi phrenesis acciderit propter retentionem sanguinis menstrualis, aut hæmorrhoidalis, post quarum saphenarum phlebotomiam in his casibus applicentur sanguisugæ ano in locis consuetis hæmorrhoidarum, 3. aut 4. aut plures secundum exigentiam: ad prouocandum tamen menstrua phlebotomia uenarum, quæ sunt sub curuatura poplitæ efficacius operatur. Et si non possunt phlebotomari, uentosa cum scarificatione, aut sanguisugæ in his locis applicentur, deinde phlebotometur alia uenæ si oportuerit, sicut in primo casu. Tertius casus, ubi phrenesis succederet ad alium morbum, scilicet ad synocham, causonem, tertianam continuam & in omnibus his in quibus materia permutatetur ad membris inferioribus, & proprie infra hepar ad superiora, post quam phlebotomia phlebotometur alia uenæ si oportet, ut in aliis casibus. Si uero materia phrenesis coëctur ab hepate aut membris spiritalibus, phlebotomanda est basilica, aut dextra, aut sinistra, aut utraq; secundum loci apostematum, post quam succedat phlebotomia cephalica, & aliarum uenarum secundum exigentiam. Si uero materia contineatur a furcula supra, phlebotometur cephalica eiusdem partis cum parte læsa, sed in manu ubi queratur maior diuersio, & proprie in manu opposita, post quam, si oportet reiterare, phlebotometur cephalica brachij eiusdem lateris, sed tutius est ambas cephalicas i brachijs, uel etiã manibus phlebotomare, & proprie in manibus, deinde reliquæ uenæ particulares secundum exigentiam: aut in locis iam dictis sanguisugæ applicentur. Sed memora quod illa phlebotomia debet esse copiosa, ita ut perueniatur ad syncopim exclusiue, quod comprehenditur ex pulsu, quapropter oportet in his casibus, ut pulsus semper tangatur, nam cum tremat & descendit, & diuersificatur absq; ordine, ita ut inuenias unam pulsationem magnam, aliam paruam, significat propinquitatem syncopis quare oportet ut sanguis resingatur. Et oportet ut sit cautela in ligatione uitæ super uenâ, & ut sit firmata, quam motus ipsius, & agitatio irrationalis non soluant. Quandoq; enim soluit eam, & deficit per seipsum propter imaginationem corruptam ducentem eum ad illud. Quod si uirtus, & dispositiones non consentiunt, ut fiat phlebotomia uniuersalis ex manibus, aut pedibus, aut non est tibi possibile tenere eos propter inquietudinem, & rixam fortem, tunc phlebotoma eum in fronte, aut sanguinem ex naribus prouoca, aut sanguisugas in locis iam dictis applica: quæ etiam particulares extractiones sanguinis sine uniuersalibus fieri debent si tota materia iam fluxerit. Post hæc si cholera fuerit in causa, eam euacua bis cum medicina leniente superius descripta, aut sibi simili, quæ etiam maxime digesta materia, erit reiteranda. Digestiua autem sunt syrupus uiolatus, de nenuphare, de portulaca, de papauere, oxysacchara, de citro, de limonibus, & similes, distemperandi cum aqua endiuizæ, acetosæ, nenupharis, sempiniuzæ, solatri, & similibus. Sed syrupus de papauere est præstans in hac re. Secunda intentio perficitur cum clysteribus de quibus supra, ligaturis, nectationibus, prouocatione sanguinis hæmorrhoidalis, & menstrualis. Sed melius est, ut diuersiones sint cum euacuatione, sicut uentofactiones in tibijs sub genu, in coxis, in natibus, in spatulis: lotiones tamen brachiorum, & crurium cum aqua decoctionis papaueris, lactucarum, se, hyoscyami, florum nenupharis, et similibus, optime conferunt diuertendo, & somnum inducendo. Tertia uero intentio perficitur cum repercussiuis applicitis fronti, temporibus, parti anteriori colli ferè usq; ad nucham cum oleo rosato, aceto, aqua rosata, & si opus est cum magis infrigidatiuis addendo his succum plantaginis, sempiniuzæ, solatri, nisi

tumor cõmunicet exterius, tunc non oportet incipere ab eo, in quo fit parum mollificationis, & sedationis doloris sicut muci la. se. filii, & semi. malua uisci: deinde stiprica applica collo, & temporibus non tumentibus, & si opus est somni inductione ponantur circa frontem, & tempora, & commissuram coronalem, semen papaueris, hyoscyami albi usq; ad ipsum opium cum aliquo liquore permixta: & cholericæ iuuatur ualde si fiat emplastrum ex folijs senticis, id est, rubi. Sed in cholericæ, aut pendente à materia adusta, sint frigida, aut humida. In sanguinea frigida & sicca, magis proportionantur, & magis frigida in cholericæ adusta, quam in sanguinea. In augmento autem usq; ad medium status repercussiuæ cum resolutiuis misceatur, sicut si oxyrodino adderetur aliquid meliloti, & postea in statu magis augendo melilotum. In his temporibus confert pulmo arietis madefactus in aqua decoctionis rosarum, uiol. florum nenupharis, chamæmeli, meliloti, quibus pro inducendo somnum potest addi papauer, & semen hyoscyami albi. Eodem modo potes applicare columbam aut catulum uiuentem per medium scillum, ita quod in summa, in principio approximentur repercussiuæ iam dicta. In augmento repercussiuæ cum resolutiuis uincantur repercussiuæ. Sed in statu usq; ad medium eius uincantur resolutiuæ. Sed post medium status per totam usq; declinationem sint resolutiuæ pura, sicut decoctio facta ex meliloto, & similibus, quæ non multum transcendunt primum gradum, & sint omnia hæc iuxta posse capitis confortatiua, tam stipricitate quadam, quam forma specifica, sicut flores anthos, id est, rosmarini, fol. lauri, sed cum uiolis possent temperari. Quarta autem intentio corrigit accidentia, scilicet uigiliarum instantiam cum iam dictis, & ex propriis sedantibus dolorem est columba, uel catulus uiuus scissus per medium, & aspersus semine hyoscyami albi subtilissime puluerizati appositus loco dolenti. Aliud fortius illo. Recipe casie lignæ. ʒ. i. opii. ʒ. ii. croci. ʒ. s. puluerizentur, & cum aqua rosacea, & pauco aceti albi liniantur frons, & tempora. Experimentum Gerardi. R. terræ sigillatæ, quantum uis malaxetur cum aqua rosacea, & aceto, & tepidum soleis pedum applicetur. Stupefactiuum domesticum satis. R. confertur uiolarum, confertur nenupharis, ana. ʒ. s. sem. pap. albi. ʒ. i. se. hyoscyami. ʒ. i. saccha. q. s. de hoc quilibet die poterit exhiberi, & quando cætera non conferunt, detur requies descriptio Nicolai à media. ʒ. usq; ad. i. Cautamen opiata maxime sumpta per os, & naribus applicita uirtute existente debili, quoniam perimunt. Sitis autem sedatur cum aqua decoctionis tamarindorum, & retentione eorum, & similibus in ore. Urina autem prouocetur si obliuiscatur urinare, scalpando inter anum, & uirgam, ubi est collum uesciæ, aut etiam cunicem, aut sexcupedem in orificio uirgæ imponendo. Et tandem cum hæc non suffecerint regione uesciæ cõprimendo, & fomentando sicut cum oleo parietariæ, & similibus. Caueant etiam altantes ne saliat ex fenestris, & ne se, aut ipsos percutiat. Si uero transierit in aschachilos, cura uana est, & Auic. mortem pronunciat. Si uero permutaretur ad substantiam cerebri cura est etiam uana secundum plurimum. Auic. tñ laudat phlebotomiam uenarum, quæ sunt sub lingua. Si uero in lethargiam, curetur cura lethargiæ.

Vltima intentio est debitum regimen sex rerum non naturalium. Vnde aer declinet ad frigidum, & sit redolens ex asperione pomorū, florum, & foliorū redolentium, necn q̄ asperione aquæ rosacæ. uidentur calefacientia, ut ignis, sol, flatus hominū, luciditas aeris multa, strepitus & formæ, id est picturæ. Cibus sit aqua hordei, uel pitana subtilis à principio usq; ad statum inclusiue cum emulsione seminum communium frigidorum, & papaueris albi, de aqua tamen hordei est superius sufficienter dictum. Similiter panis simulæ iufusus & lotus in aqua frigida. Similiter lactuca, & acetosa condita cum agresta, uel uino granatorum mazorum, uel acetosorum. Bibat autem aquam coctam cum pauco saccharo, quæ permisceatur cum uino granatorum secundum libitum, aut bibat aquam hordei, aut aquam prunorum aut tamarindorum. Debent enim tam cibaria, quam medicinalia ad frigidum declinare: magis tamen, aut minus, secundum tempus morbi, & tempora anni, necn materiam, quia in materia adusta

adusta competunt frigidiore, & humidiora, & similiter in cholerica, quam in sanguinea. Nota tamen quod huiusmodi potus in his apostematibus non debent esse ualde frigidi actus, imò aliquando tepidi, ut puta tempore hyemis, qui canon tamen magis obseruandus est in apostematibus membrorum spiritalium, & naturalium. Et graduatur dicta ita, ut à principio usque ad finem, uel statum potius, sit ualde tenuis, sed in declinatione minus, & tunc magis conuenit ferculum ex simula, & magis in declinatione parum uini pauciferi optime lymphati, & carniū cum acibus alteratarū. Et in cholerica sint frigida, & humida. In sanguinea frigida & sicca. Prouocetur somnus, ut dictum est omni ingenio possibili. Ingenietur etiam ad quietem quantum est possibile cum praesentia amicorum quos uereantur, & omni blandicia possibili. quibus non ualentibus ligentur, & detineantur, non tamen uerberentur, sicut in mania non apostemosa. Venter teneatur lenis, si non naturaliter, saltem cum clysteribus de quibus supra, declinent ad iucunditatem, & animi, & corporis quietem. Phlegmon & erysipila sunt apostemata in substantia cerebri, scilicet phlegmon à sanguine, erysipila à cholerica, quae distinguuntur à phrenesi sanguinea & cholerica per signa superius dicta. ipsa autem inter se distinguuntur per similia illis quibus distinguuntur phrenesis sanguinea à cholerica, & eodem modo curatur, sicut phrenesis dicta. Erysipila enim in cerebro curatur, sicut phre. à materia cholerica cum asperionibus, & succis frigidis, & humidis, & proprie sumptis ex corticibus melonis, cucurbitae, & cucumeris, quibus etiam secundum necessitatem frigidiore addantur, & eadem intentiones accommodandae sunt, quae dictae sunt in phre. cholerica. Et similiter phlegmon in cerebro curatur, sicut phrenesis sanguinea, appropriat tamen ei Auic. phlebotomia uenarum, quae sunt sub lingua post phlebotomias uniuersales. Sibile est demonium superfluum accidens cum sisen calido cholerico ita, quod homo cum hoc quod habeat sisen, alienetur propter demonium agitatium, est enim cum furore & rabie modum excedente. Demonium enim siue mania lupina non dicit in quiditate sua nisi alienationem cum rabie & furore ad differentiam maniae caninae, quae est alienatio nunc cum rixa & furore, nunc cum iocis, & applausione sicut est natura canum. & prouenit ab humore benigniori, sicut à sanguine cholerico aut adusto: sed sibile dicitur aggregatum ex demonio & apostemate, cuius causa est cholera rubra, pura, aut adusta. Cum karabito enim puro fit alienatio ac rationis permixtio, & non est in ipso demonium, si autem est cum in ipso demonium est sibile. Et multoties quidem antecedit demonium cum cholera ipsa, & cerebri impellitur in principio suae applicationis, deinde sequitur apostema ipsa fixa. In karabito demonium accidit ab apostemate, in sibile demonium & apostemata simul proueniunt à materia, nec unum est causa ex qua aliud inueniatur, & si quandoque fiat unumquodque causa additionis alterius. Species autem & causa sibile patent ex dictis.

Signa prognostica, demonstratiua & rememoriatiua, similiter modi terminationis, & prognostica sumuntur ab eisdem, & eodem modo sicut dictum fuit in phrenesi, & maxime cholerica. Ipsius etiam cura, est cura phrenesis cholericae cum additione & humectatione multa, inductione somni omnibus auxiliis & oportet ut extremorum ligatio assiduatur cum ceteris generibus diuersionum materiam cholericae, & uapores acutos à capite diuertentium.

De lethargia. Cap. 4.

Gratia complementi doctrinae, hoc subdam caput de lethargia. Et iuxta morem consuetum lethargia, sisen frigidum sunt termini synonymi significantes hanc aegritudinem, quae diffinitiuè est apostema frigidum ad intra cranium. Et hoc apostema nomen sumptis ab accidente, scilicet obliuione, quae sequitur ad ipsum. Lethargia enim apud Graecos obliuionem importat. Prima distinctio. Lethargia est duplex. Quaedam phlegmatica, ut plurimum eueniens, & propterea Auic. diffinit ipsam apostema esse phlegmaticum. Quaedam est melancholica raro eueniens, nec ita proprie dicta lethargia cum sit non ita factiua obliuionis. Secunda distinctio. Quaedam fit in panniculis cerebri, & hoc ra-

ro, cum raro accidat humorem grossum, uiscosum, in substantiam densam penetrare. Aliquando fit in substantia cerebri, & hoc etiam raro, licet frequentius quam in panniculis, quia raro contingit uiscosum in uiscosum penetrare. Aliquando fit in uentriculis, sed raro, & tunc lethargia coniungitur apoplexie uel epilepsiae. Imò maiorem aut minorem oppilationem, licet aliae sint differentiae. Aliquando & raro accidit in origine nuchae, & neruorum, & in ipsis neruis, & tunc lethargia coniungitur paralyti, aut spastico. Frequenter autem imò Auic. accidit in meatibus, anfractibus seu porositatibus cerebri, qui meatus sunt plurimi, ut patere potest in anatomia. Sed forte quis instabit. Si humores colligantur in meatibus cerebri, & non in substantiam cerebri intrent, neque in panniculis, non fiet solutio continui, & sic non erit apostema. Dicunt quidam, quod aliqua pars subtilior intrabit in substantiam, & sic fiet solutio continui, & apostema: sed certe isti falluntur male loquentes ad mentem Auic. Si enim dum lethargia fit in meatibus, oporteret aliquam particulam humoris ingredi substantiam cerebri, aut panniculi, frustra dixisset Auic. quod raro fit in substantia cerebri, aut panniculis, imò semper imò hac responsionem esset in aliqua parte. Ex dictis ergo aliter dicendum est, quod imò plurimum humor colligitur in meatibus, non intrans imò aliquod sui in aliquam cerebri partem. Et cum infertur, ergo non facit solutionem continui, neganda est consequentia, nam ille humor facit extensionem in partibus cerebri, cum à lateribus illius meatus sit in substantia cerebri in fundo, similiter in parte superiori panniculi. Ad magnam autem extensionem in partibus cerebri sequitur quaedam solutio continui consuncta malae compositioni sequenti extensionem, & malae complexionem sequenti naturam humoris: quae fortasse frigida est, & etiam alteri malae complexionem sequenti coelcationem humorum in eo loco, & prohibitam transpirationem, quae fortasse calida est. Et hi tres morbi apostema constituunt. Et ne miretur quis de hac responsione, legat Auic. 3. quarti tract. 2. cap. de apostematibus uentosis. Et forte percutit percussione manus, & proprie quando inuenit spatium ad quod aggreget, sicut stomachus, & intestina, & quod est inter panniculos circumdantes ossa, & inter ossa circumdata lacertis, & inter lacertos similiter. & quod circumdat chordas, & fortasse non resouit spatia, imò subtiliat membra coniuncta, & etiam resouit ea, & generat in eis, quod facit necessarium dirumpere eas, & uetustas remanet propter spissitudinem suam, & propter crassitiam, & spissitudinem eius, quod continet ea contractionem pororum. Unde patet quod in his uerbis uult uentositatem tam in stomacho, quam in intestinis quam inter ossa contentam, extendendo membra illa facere apostema uentosum, absque quod intret alicuius membri substantiam. Iterum lethargia aliquando est in cerebro anteriori faciens obliuionem communicando nocumetum uentriculo, scilicet posteriori: quandoque uero est in cerebro posteriori, quae uerius debet dici lethargia, & est plurimum contingens.

Causae lethargiae primitiae sunt multa, frigiditas aeris multum imprimens in cerebra debilia, uinum uinosum, scilicet multum, usus caparum, & omnium multum euaporantium ad caput, & proprie uapores uiscosos. Item somnus multus & proprie supra repletionem, supine dormire, & de die, repletio nauseatiua, & multitudo comestitionis fructuum, & cuiuslibet in quo est euaporatio, & putrefactio. Causae antecedentes sunt humores. scilicet phlegmatici frequentius, & melancholici rarius, & mixti ex his. Causae uero coniunctae sunt idem humores in cerebro iam comprehenssi, sicut & materia scoromiae, sed haec est uehementius confirmata, utraq; enim ab eadem materia potest pendere, licet materia scoromiae sit magis uaporosa.

Signa lethargiae. Primo prognostica sunt tremor capitis, grauitas eius, & proprie partis posterioris, frequenter cum dolore paruo, pigritia ad motus corporeos. Significat enim materiam frigidam oppressuram cerebrum. Item signa praescripta permutationis phre. in lethargia demonstratiua. Primum, dolor leuis, sed continuus, quia substantia cerebri non sentit, non est. n. dolor nisi per communitatem ad panniculum cooperientem anfractus, & sic debet esse extensius, & grauatiuus. Secundum, febris lenta, in apostemate. n. principalis

capialis necessaria est feb. propter magnam communitatem cum corde sed est lenta ratione phlegmatis, imò quandoque non sentitur, id est, uix sentitur, phleg. leuiter putrescente. Tertium, subeth grauis, id est, somnus profundus propter fortem oppilationē ab humore multo crasso & uiscofo. Quartum, obliuio, apostemate ledente uentriculum posteriorem, aut per essentiam, aut per communitatem. Quintum, anhelitus tardus, diminuta necessitate, & debilis ob debilitatem musculorum pectoris, & diaphragmatis ob nocumentum cerebri, cum strictura propter aggregationē materie, & quia obliuiscitur anhelare: cum spūto propter catarrhum, imò est aliquando tanta obliuio, ut os clausum obliuiscatur aperire, & apertum claudere. Sextum, singultus communicato nocumento stomacho per neruos reuersiuos. Et albedo lingue frigiditate & humi. dealbante, & phleg. super asperso. Pigritia respondendi quasi non intelligat aggrauatis sensibus interioribus, & communicato nocumento lingue per nocumentum in. 7. pari neruorum cerebri, ortum habente à termino communi inter nuchā, & cerebrum. Permixtio intellectus, & amentia lafo uentriculo medio per essentia, aut per communitatem. Egestio humida deriuato phleg. ad intestina iuxta apho. Quibus spūmosi egestiones in diarrhæa his phlegma à capite defluit. Vrina sicut afinorum phlegmate, aut uaporibus eius cum urina permixtis. Tacent præcipitati in letho e contrario habentibus karabitu, quia cum quiete sine furore & motu. Pulsus magnus uirtute satis constante, & instrumento obediēte cum necessitate, nec obstat anhelitus paruus, qui secundum plurimum est in istis, quamuis anhelitus & pulsus proportionentur, anhelitus. n. currit cursu pulsus, nam pulsus & anhelitus, licet sint proportionabiles non tamen æquales, id est eundem situm detinentes in suis latitudinibus, sed melius sunt proportionabiles in sanis, sed nō in ægris cum possint aliquando impediri instrumenta. Anhelitus, & non pulsus, & e contrario, similiter in lethargia impediuntur magis instrumenta anhelitus quam pulsus magis læsis neruis quam arterijs. Sunt pulsus rari, quia satisfit necessitati per magnitudinem. Et per idem tardi. Sunt tremuli, & undosi debilitata uirtute. Et quia apost. est molle, & in membro molli, assimilatur pulsibus peripneumonicorum in molitie, non tamen in uelocitate, & frequentia, maiori existente necessitate in peripneumonia. Sunt etiam in peripneumonia longiores, & latiores, ut melius sufficiant necessitati. Et quia arteria à phleg. in peripneumonia amplius remolita, & dilatationi paratior, pulsus sunt cadentes in medio. Pro quo nota quod reperitur pulsus cadens. Et est pulsus cuius quies est ualde longa inter duas pulsationes, ita. quod alia pulsatio fieri potuisset. Est enim ille pulsus cadens lethargicorum. Alius est pulsus intercidens, ut in cōmento pulsū de pulsū peripneumonicorum, & est cū deficit alia pars motus, est. n. geminans motum quasi bis pulsans, ut est anhelitus puerorum stentium. Et ille accidit in peripneumonicis, & fit propter defectum uirtutis, ideo peripneumonia est mortaliior lethargia cap. allegato. Ex quibus uides, quod aliter hic sumitur cadens in medio, aliter secūda primi. Vnum signum commune omnibus speciebus lethargiæ est retentio urinae, aut quia obliuiscitur urinare, aut propter debilitatem lacerti colli uesticæ. Signa autem materierum, & maxime melancholiæ, nam signa prædicta phlegmaticæ magis appropriant. In melancholia. n. dolor est fortior, quia frigiditas siccitati coniuncta est actiuior: est etiam longioris durationis, cū melancholia tardius resoluitur. secundo est rixa, & alienatio, materia magis stimulantē. tertio sunt oculi aperti sicut congelati, in unum locum intuentes, siccitate melancholiæ magis musculos palpebrarum contrahente: & ad sunt cætera signa melancholiæ: sunt etiam signa sumpta à complexione, habitudine, & huiusmodi: & non est subeth sicut in lethargia, licet forte addit impotentia uigilandi. Signa uero loci aposte. sunt hæc. Nam si est in substantia cerebri subeth est fortior, quia materia est magis opprimens, & per idem difficultas maior ad motū: albedo lingue maior, ipsa amplius phleg. aspersa: oculi sunt eminentes relaxatis, & compressis neruis opticis. Si uero sit in panniculis dolor est fortior, motus leuior, maior sensuum oppressio. Prognostica. Cū multiplicatur accidentia lethargiæ, & sudor, est perimens, ut si

multiplicetur tremor membrorum, sudor diaphoreticus, & anhelitus fiat paruus, sed frequens, cum strictura, & oregmone. Et e conuerso si dilatetur anhelitus, & fiat fortis, minora tur subeth, habetudo sensuum, & tremor membrorum, speratur salus, & maxime si appareat aliqua bona crisis, ut apostema post aures, uel in cute capitis. Cura lethargiæ quinque exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia in principio repercutit, in medio simul repercutiens & resoluens, in fine solum resoluens, & causam coniunctam educens. Quarta corrigit accidentia. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum nō naturalium. Pro prima intentione. Si phlegma, aut melancholia fuerint peccantes cum sanguine, & cum ipso educibiles, præmissa uentris lenitione, reliquis consentientibus phlebotomiæ, inchoetur à phlebotomia, & secundum plurimum fiat de cephalica sinistra, aut dextra, secundū quod in dextra, aut sinistra parte materia continetur, & hauriantur communiter. 6. 5. sanguinis, uel circa. Si uero humores iam dicti non fuerint educibiles cum sanguine, sanguine tamen peccante, ab euacuatione humorum est inchoandum, post quā sequi debet phlebotomia. Si uero sanguis nullo modo peccauerit, sufficiet aliorum humorum euacuatio, uerum aliquando oportet in prima phlebotomare uenas saphenas, secundum quod dictum fuit in phren. & aliquando basilicam dextram aut sinistram, si splen, aut hepar miserint materiam. Euacuantur autem humores phlegmatici cum hiera pica simplici & cōposita, pilulis cochij, & his, quæ dicta sunt superius in sōda phlegmatica præmissa digestionē saltem ante eradicationem cum oxymelle simplici & cōposito, scyllitico, syr. de stœcados, & aquis ruta, saluig, betonicæ, stœcados, hyssopi, maioranæ, & ceteris supra scriptis in sōda phlegmatica. Melancholia uero digeratur cum syr. de epithymo, syr. de pomis dulcibus, & aquis bu glosæ, boraginis, stœcados, & ceteris superius dictis in sōda melancholica, & soluiatur cum educentibus melancholiam supra scriptis, & inferius in cap. de melancholia describendis. Sed inter omnia clysteria obtinent principatum, & sunt radix curæ, quapropter duo saltē in die naturali faciendū sunt, ubi eadem die nō fiat alia euacuatio. Descriptio clysteris in phlegmatica est illa. 5. saluig, maioranæ, ruta, betonicæ, rosmarin, affari, siue bacchar, hyssopi, stœcados arabici. ana M. x. contundantur crasso modo, & bulliāt in octo lib. aquæ ad cōsumptionem dimidij, & coletur, de qua decoctione accipiantur. 1. 5. 3. & cum tribus. 3. olei communis, & 2. 5. mellis ros. & pauco salis fiat clystere: & si opus est facere clystere acutius addatur hiera simplex, uel composita, uel electarium indum, & similia: decoctio possit fortificari, si supra scriptis adderetur centaureæ minoris. M. i. & similiter colocyntidis. 3. 2. carthami. 3. 1. corticum radicū capparis, sem. urticæ. ana. 3. s. clystere conferens lethargiæ melancholicæ, quæ raro aduenit, & si accidit raro eradicatur. Rx. epithymi. 3. 1. colocyntidis interioris. 3. 2. polipodij. 3. s. calamethi. M. i. coquantur in. 4. lib. aquæ ad dimidij consumptionē. Galeni clystere efficax, & sublime ad apoplexiam, paralyfim, lethargiam, tam phlegmaticam, quam melancholicam. Rx. radicis cyclaminis, colocyntidis. an. 3. 1. s. carthami. 3. 1. centaureæ minoris. 3. s. ellebori nigri. 3. 1. affari. 3. 8. coquantur omnia in aqua sufficienti, & fiat clystere. His autem clysteribus in phlegmatica addi potest sal gemma ad acuedum, & sal indum in melancholica. Et debes clysteria acutius magis, aut minus secundum maiorem aut minorem stuporem, & secundum ægri toleratiam, & feb. acuitatem. Incipere tamen debes à leuioribus gradatim procedēs ad fortiora. Et si eger non potest tenere clysteria, facias minus stimulantia, subtrahendo sal & mel. Vomitus aliquando confert stomacho multum repleto, & ipso communicante uapores, aut materias capiti, secundum plurimū tamen nocet: ubi ergo conueniat accipiantur. 2. 5. oxymellis simplicis, aut scyllitici cum. 4. 5. decoctionis raphani, in quo si uolueris fortius uomitiuum, steterint infusi in eo fustes ellebori per unā noctem, aut accipe dictum succum cum oxymelle iam dicto. Secunda intentio completur cum uentilationibus, & frictionibus, ligaturis, lotionibus, quæ cum fiant sine euacuatione, incipiant à nucha, & collo, & gradatim descendendo procedant, quæ frequenter reiterentur, & ante cibum, & post cibum, ut materia

teria in capite non figatur. Confert etiam prouocatio hæmorrhoidarum & menstruorum, maxime si ex eorum retentione prouenerit, necnon quæcunq; euacuatio consueta renouet, gargarismata uero, masticatoria, & sternutatoria non ita à principio administrentur, & non nisi uniuersalibus premisissis, & reiteratis, præcipuè sternutatoria, multum enim inquietant, & materiam dilatant, ita ut quandoque perducant ad apoplexiam materia ad uentriculos delata. Tertia intentio completur cum his, quæ repellunt materiam in principio, sicut oleum rosaceum tripliciter ad acetum, aut duplum appropinquandum fronti, temporibus, & collo. Et si apparet nimis frigidum, adde aliquid stipiticum calidum, sicut oleum de mastiche, aut menta. Et in augmento misceantur resolutiua cum repercussiuus usque ad medium statum, gradatim uersus statum augendo resolutiua, sicut si superscriptis adderes parum castorei, fit autem hoc oleum factum ex oleo completis, & rosæ rubecis completis. In phrenesi autem fit omphacium ex rosæ rubecis non completis. Et post medium statum usque ad totam declinationem ponatur resolutiua purè, sicut acetum scylliticum conuassatum cum oleo rosaceo, in quo distemperatum sit castoreum: confert in augmento, & euigilare facit, & quandoq; in statu pro oleo rosaceo fiat permutatio ad oleum irinum, & de narcisco. Et quandoque permiscetur capilli hominis adusti triti multum cum aceto usque dum fiat sicut unguentum, & est medicina rationalis in lethargia, & subeth, excitatis cito à somni profunditate. Et quandoq; miscetur eis castoreum magis in statu uel prope. Emplastrum ex inuentione Mesuæ conferens lethargia in statu, & declinatione, faciens euigilare, est hoc. R. pyrethri, sinapis, scyllæ. ana. 3. i. castorei, euphor. ana. 3. s. omnia cum succo alphonseorum, & succo sampruci misce, & epithemetur pars posterior capitis, & est acutum rubificans, imò forte uescias. Scylla quoq; cum oleo rosaceo, & aceto trita addendo castoreum, est medicina efficax, & experta. Si autem diuturna efficitur hæc passio, grana tria castorei cum uncia. s. oxymellis in potu exhibita est medicina experta. Similiter theriaca, mithridatum, diamusculus, diambra optime conferunt confortando, & resoluendo. Ad resoluendum etiam possunt fieri fomenta ex ruta, decoctione maioranæ, calamenthi, stecados, usque ad sinapim, & scyllam in aqua cum paucis acutissimis, infundendo spongiam in hac decoctione, & optime expressam superpone loco apostemato, & bis aut ter itera. post cuius amotionem sequatur iunctio cum aliquo ex superscriptis. Quarta uero intentio sedat subeth, & obliuionem loquendi, urinandi, & egerendi, & aliorum, incitando eos ad loquendum, & euigilandum cum clamore, & extirpando pilos, maxime ex membris inferioribus, & ligando fortiter membra inferiora, & comprimendo uescias, & pecten ad hoc, ut urinent, & cæteris ingenijs in phrenesi dictis. Si tamen permittatur ad paralysem non est prohibendum, imò cum frictionibus eiusdem partis adiuuandum, cum paralytis sit minor morbus quàm lethargia, & proprie quando times permutacione ad apoplexiam. Quinta intentio completur locando eos in aere lucido, pleno imaginibus ad calidum, & sic tendente cum accensione ignis ex lignis iuniperi, lauri, rorismarini, & similibus redolectibus. Cibus autem sit aqua ciceris, siue brodium cicerum, uel lupinorum, & potus sit aqua mellis, cui possunt addi dum coquitur tria aut quatuor grana piperis. Et si opus fuerit crassiori dicta, dentur uicelli ouorum, & uinum uino-fum ualde in modica quantitate cœdendi potus: brodium quoq; carniū cum paucis cinnamomi, aut piperis, & panata subtilis est ad hanc intentionem, sed dicta sit subtilis usque ad medium statum, deinde incrassetur iuxta canones uniuersales. Abstineat ab aqua frigida. Parum dormiat, unde excitef de media hora in media horam, & dormiat capite leuato, & post cibum stet uigil per unam horam. Sit ueter eius inanitus cum clysteribus, ut supra, & oēs euacuationes naturales procurentur. Frictiones fortes uicem suppleant exercitij, prouocetur ad iram & tristitiam, & coram eo stent clamantes, & strepitus facientes, ut non profundetur in somno, imò gratia huius semper odoret, & in naribus ponatur acetum acutissimum.

De subeth sahara, siue dormitatione uigilatiua.

Subeth sahara dormitatio uigilatiua sunt termini synonymi significantes apostema mixtum ex phlegmate, & cholera

intra craneum. Et sumpsit hoc apostema nomen ab accidentibus, scilicet à somno & uigilia. Subeth enim apud Arabes somnum importat, sahara uigiliam: inde subeth sahara idem sonat apud Arabes, quod dormitatio uigilatiua apud Latinos. In hoc autem apostemate aliquando phlegma uincit cholera. Et tunc dominante somno malo supra uigilias malas, uocatur subeth sahara, idest, dormitatio uigilatiua. Vincente autem cholera supra phlegma, maior est uigilia mala, quàm somnus malus, & tunc dicitur sahara subeth, idest, uigilatio dormitatiua: unde sicut apostema est mixtum ex phlegmate & cholera, ita accidentia sequentia hoc apostema sunt mixta. Et si dominetur cholera, magis dominantur accidentia cholera, & tunc magis proportionatur phrenesi. Et si magis dominatur phlegma, magis dominantur accidentia phlegmatis, & tunc magis proportionatur lethargia. & si humores æquantur, accidentia æquantur. Cura exigit eandem intentiones, quæ dicta sunt in phrenesi, & lethargia. Sunt tamen complèdè medicinis mixtis euacuationibus, & diuertentibus phlegma & cholera, & eisdem repercutientibus, & resoluentibus, & similiter sedantibus accidentia mixta. Et regimen similiter sit medium inter regimen phrenesis, & lethargia. Et phlebotomia est multum in hac necessaria, cum mixto humorum arguat repletionem.

De apoplexia.

Cap. 5.

Apoplexia græcè idem sonat, quod percussio latine, cadit enim apoplecticus ac si esset percussus. Est autem diffinitio secundum Auic. ociositas membrorum à sensu, & motu propter oppilationem contingentem in uentriculis cerebri, & in cursibus spiritus sensibilis, & motui. Ociositas à sensu & motu ponitur loco generis, & non est nisi ablatio sensus & motus. Quod intelligendum est de omni sensu, tam interiori, quàm exteriori in apoplexia forti, sed in debili creditur aliquam esse operationem sensus interioris, licet non exterioris. Est enim possibile esse oppilationem in origine nuchæ, & etiam in origine neruorum orientium à cerebro anteriori, licet uentriculus medius non sit multum oppilatus, & sic de uentriculo anteriori, qui est multum latior: operabuntur ergo aliquantulum uirtutes eorum sicut in epilepsia operantur. Auferitur etiam omnis motus merè uoluntarius, non autem omnis naturalis, aut mixtus, cum sit ad uitam necessarius motus cordis, & motus aliquis pectoris, quorum primus est naturalis, reliquus mixtus. Verum in forti apoplexia etiam aliqui motus mixti auferuntur, sicut motus deglutitionis, licet respiratio non auferatur. Et hi auferuntur à membris qui conlueuerunt sentire, & uoluntarie moueri. Additur postea propter oppilationem ad exprimendum causam apoplexiæ in uentriculis cerebri, scilicet primo, secundum & tertio: & in cursibus spiritus sensibilis, & motui, idest in meatibus cerebri, qui sunt multi in ipsa cerebri substantia, per quos meatus ipsi spiritus mouentur. Et per cursus intelligamus origines, siue meatus nuchæ, & neruorum, per quos spiritus sensibiles, & motui ad membra deferuntur. Ex quibus inferitur apoplexiam esse accidens sequens oppilationem, licet etiam sit morbus, cum per eam impediatur cordis, & membrorum, & anhelitus operationes: fuit autem conuenientius ponere in diffinitione eius ociositatem pro genere quàm oppilationem, cum illa sit nobis notior, & hæc quidem de intentione medicorum dicta sunt. Arist. & philosophi dicerent apoplexiam esse potius passionem cordis, quàm cerebri, quia ponunt cor esse principium sensus & motus, à quo nerui habent originem. Verum medici, licet concederent apoplexiam esse per communitatem à corde (unde dicit A. 1. 1. tertij. 2. cap. iuxta finem. Aegritudines melancholicæ, & epilepticæ non euacuantur à communitate cordis) tamen uoluit apoplexiam appropriari cerebro, & non cordi, & cerebrum esse principium sensus, & motus, & neruorum. Verum cum medici simus, sequamur medicos. Vtrum autem in apoplexia auferantur operationes intellectus, cum intellectus sit uirtus non operans per organum, & etiam à corpore separata intelligat per species referuatas, est dubium non paruum, cum oporteat. 3. de Anima, intelligentes phantasmatum speculari. & sic requiritur uirtus cogitatiua, quæ per uentriculū medium operatur. Credo quod huius quoniam utraque pars potest defendi sicut accidit in rebus dubijs, licet nisi una sit ueritas. Et ex

Io. Arculaui

C diffini-

diffinitione superius posita manifeste patet solum diffinitam esse apoplexiam per essentiam in cerebro, & non per communiter, cum in apoplexia per communiter, similiter propter nocumentum cordis, aut oppilationem arteriarum apoplexia non sit oppilatio in uentriculis cerebri.

Qum aliquis quasi dormiens iacet, & sine somno stertit, & cum pungitur, non sentit, tunc iam patitur apoplexiam, est autem huius ægritudinis quantitas secundum quod fortiter, aut debilitate stertit. Si autem spuma ab ore exierit, non est ei medicandum. Cum autem parum stertuerit, ægritudo est leuior. Hæc quidem passio, aut interficit cito, aut in paralyfim transit.

Capitulum istud diuidit in duas partes. Primo determinat de apoplexia theoricè, secundo practicè. secunda ibi. Cui ergo ista. Prima in tres. Primo ponit signa apoplexiæ absolute, secundo innuens diffinitionem quandam apoplexiæ ponit signa fortis apoplexiæ, & debilis. in tertia modum terminationis ipsius. secunda ibi. Est autem huius ægritudinis &c. tertia ibi. Hæc autem passio &c. De prima parte dicit, quod cum aliquis iacet quasi dormiens, & stertit in modum dormientis, non tamen dormit, & cum pungitur, aut infertur ipsi aliquis dolor etiam fortis, non sentit, tunc ille patitur apoplexiam: ita quod hæc duo signa, scilicet iacere in modum dormientis cum stertore, licet non dormiat, & non sentire, neque etiam moueri præcipue cum pungitur, aut infertur ipsi fortis dolor, significat apoplexiam. De secunda parte dicit, quod huius ægritudinis quantitas. i. apoplexia iudicat fortior, aut debilior secundum fortem, aut debilem stertorem. Si. n. ipso fortiter stertente spuma ab ore exierit, non est ei medicandum: in eam. propter ipsius fortitudinem non est spes liberationis. Si autem parum stertat, & spuma ab ore non exierit, tunc est leuior, in qua spes liberationis haberi possit, licet difficile. Ultimo dicit quod hæc ægritudo, aut cito interficit cum est multum opprimens cerebrum, ex eo quod prohibita debita respiratione cor suffocatur, aut si debet liberari transit in paralyfim, materia permutata à uentriculis cerebri ad neruos, aut ad originem nucha. Ista autem paralyfis, aut est unius lateris tantum, licet fin plurimum dextri: aut est amborum, & tunc homo remanet sine sensu, & motu in omnibus partibus præterquam in partibus faciei, quibus datur sensus, & motus per septimum par neruorum ab ipso cerebro immediate ortu habentium. Si. n. esset paralyfis in omnibus partibus, tunc esset apoplexia. Sed circa spumam intellige, quod spuma est congeries multarum ampullarum in humiditate quadam repertarum, quarum causa immediate est aer, aut uapor, aut uentositas sub humiditate illa reclusa, eleuans illam in altum retinetur tamen propter humiditatis uiscositatem. Cum ergo in apoplexia anhelitus est strictus, & fit suffocatio, tunc calor ebulliens conuertit aliquid illius humiditatis in uapores qui retenti sub humiditate uiscosa, in cuppum eleuata faciunt ampullas, & spumam. Secundus modus est, quia anhelitu stricto aer egrediens permiscetur cum humiditate cui obuiat, & ipsum eleuat in ampullas: & hi duo modi mortem significant, significando uehementiam constrictionis anhelitus. Est autem tertia spuma non perniciofa, facta ex retentione humiditatis in ore, unde aer permiscetur cum illa humiditate, aut propter longam moram, aut propter multam locutionem &c. Stertor autem fit propter aerem inspiratum, & expiratum per loca angusta, & per pulmonem, & canam eius. Coangulatur autem propter impotentiam uirtutis dilatantis pectus, aut propter multam humiditatem in uis anhelitus contentam, quorum utrumque arguit anhelitus suffocationem: quanto autem aer transit per loca magis angusta, tanto est maior stertor, & maior suffocatio: quanto autem per minus angusta, minor stertor, & minor suffocatio, & per consequens apoplexia debilior, & hoc fin plurimum. Est enim possibile paruo, uel multo stertore existere anhelitum esse strictissimum: & hoc, quia nullus, uel minimus aer penetrabit per ea loca, & tamè apoplexia erit fortissima, imò sic est intendente ad mortem ex apoplexia, stertor enim continuè remittendo procedit. Nota tertio apoplexiam non semper interficere, aut in paralyfim terminari, imò quandoque materia cretice expellitur iuxta apho. 10. sex. & particulè Caput dolenti aut circudolenti, sanies, aut aqua,

aut sanguis fluens, per nares, aut aures, aut os, soluit ægritudinem. Verum hæc crisis rarissime fit in apoplexia, cum uirtus sit debilis, & multum oppressa à tanta materia: cuius signum, quia si uirtus fuisset fortis, non permisisset tantam materiam congeri. Et hæc intelligenda sunt de apoplexia materiali per essentiam in cerebro, de reliquis minimè.

Iuxta ordinem præmissum ad species, & causas ueniendum est. Prima diffinitio. Aliqua apoplexia est fortis, aliqua debilis, aliqua media. Fortis in qua uix apparet anhelitus, & est sine stertore, & spuma. Media in qua anhelitus est debilis, licet manifestus, & est cum stertore, & spuma. Debilis in qua anhelitus est satis fortis, & ordinatus sine spuma, & stertore. Et horum accidentium causa superius reddita est. Et ex his habetur. 2. diffinitio, quod aliqua est mortalis, aliqua salubris. Primæ duæ interficiunt, sed prima uelocius secunda. tertia autem est salubris, quia possibilis est liberatio, licet cum difficultate iuxta apho. 4. 2. secundæ particulæ. Soluere apoplexiam fortem &c. Tertia diffinitio. Aliqua est apoplexia per essentiam in capite, aliqua per communiter, sicut cum oppilantur uenæ, siue arteriæ apoplecticæ, aut coarctatoriæ à sanguine, phlegmate, aut melancholia, aut attenuatoriæ à frigidityte forti, aut spasticitate, aut ab aliqua re exterius fortiter comprimente. & aliquando fit causa cordis propter oppilationem, malam complexionem, aut debilitatem. Vnde in his duobus casibus spiritus uitaes non transmittuntur ad cerebrum, ex quibus debent fieri spiritus animales, & quia etiam debent concurrere ad quasque operationes sentitiuas, & motinas. Tertius casus quando in aliquo membro esset fortis dolor propter quem cerebrum contraheretur, unde fieret spasmus uniuersalis in toto, sed hoc forte magis debet dici epilepsia quam apoplexia. Quartus casus ubi a toto sicut in febribus communicaretur uapores capiti uentriculos oppilantes, ita ut fierent sine sensu, & motu, & hoc idem eisdem uaporibus ab aliquo particulari membro communicatis. Aliquando apoplexia est per essentiam in cerebro propter oppilationem, aut attenuationem sicut à frigore forti extrinseco occurrente, aut ex approximatione aliquius rei uenenofo, unde cerebrum contrahitur, aut à percussione, aut casu comprimente os super cerebrum, aut sanguine, aut alia materia retenta inter os, & cerebrum, aut à simili materia in meatibus cerebri existente. Aliquando oppilatio est coarctatoria propter sanguinem, phlegma, melancholiam in uentriculis cerebri contentam: & aliquando propter fortem dolorem cerebri ipsum contrahitur taliter, ut fiat huiusmodi oppilatio. Causæ autem sumptæ ex rebus non naturalibus sunt sicut aer fetidus, uehementer frigidus, & humidus, & uaporosus, & sicut nimius potus. 5. apho. Si inebriatus quis repente sine uoce &c. Nec non crapula multa, uisus longus rerum frigidarum caput repletum, aut stupefactum, somnus multus, & proprie de die, & resupine, retentio euacuationum consuetarum, nimia quies, aut nimis forte exercitium, subito occurrens timor multus, aut tristitia. Et ex his sequitur quarta diffinitio, quod aliqua apoplexia est materialis, quedam immaterialis propter fortem constrictionem cerebri, aut contractionem, propter aliquam causam intrinsecam, aut extrinsecam, sicut à dolore, aut accidentibus animi. Plures tamen istarum magis merentur nominari epilepsia quam apoplexia, cum epilepsia sit spasmus uniuersalis, sicut apoplexia est paralyfis uniuersalis. apoplexia uero nunquam fit à causis exicantibus cum cerebrum non possit tantum exicari, ut homo fiat apoplecticus.

Signa uero quedam sunt prognostica. Ex quibus est diffinitio corporum ad apoplexiam. Et ista sunt frigida, & humida, maximè secundum cerebrum complexionaliter, & ætatiuè, ut. 2. apho. Epileptico iuuenibus in com. aph. 6. Apoplectici maximè fiunt his ætatibus à 40. an. usque ad 60. Et in hac ætate magis ab humore melancholico, licet in decrepitis magis à phlegmate, pueri uero magis incurrit epilepsiam propter fortitudinem caloris uapores excitatis, quæ sunt magis immediata causa epilepsie sicut humores frequètius apoplexiæ, & cum hoc pueri habent uirtutem fortem non finentem multam materiam congregari. Horum oppositum est in senibus, & proprie decrepitis. Iste habentia capita parua, & stricta sunt ad apoplexiam parata. Vertigo perseuerans in senibus cum debilitate sensuum, incubus, iectigatio, stupor, pigritia ad motus

motus corporeos, grauis & lōgus somnus cum repletionē, tremor in toto proprie in capite, cōcussio dentiū in somno, urina nigra. i. liuida, obfcura, crassa, cineritia, uaporosa. i. cū multa spuma tenaci, cum multo sedimine serino, siue fursureo, idest, diuiso in paruas partes tamen cōpactas, ut sunt feraturæ ligni, aut ferinum. i. simile sero lactis, uel fermento in aqua dissoluto, inflatio uenarum guidez arguens multam materiam oppilaturam arterias subethicas, aut cerebri uentriculos, hæc quidem apoplexiam prognostificantur.

Signa inchoantis apoplexiæ sunt clamor, deinde anhelitus mugitui similis, deinde uox sicut strangulati, & hæc sunt cum apoplexia inceperit, sed nondum multum impresserit, postea ipsa iam multum imprimēte fit stertor, postea spuma, & fit ablatio sensus, & motus ad modum superius expositi. Et hæc ueritatem habent in apoplexia media communiter contingente, in fortissima autem fortasse non procedēt ista propter subitum aduentum eius, neq; etiam apparet stertor modico aere, & tardē inspirato: in debili etiam non est stertor, nec uox strangulati, nec forte anhelitus mugitui similis, licet clamor frequenter præcedat.

Signa autem significantia materiam sanguineam sunt facies, & oculi rubei, & calore multum suffocato tendit illa rubedo in uiride, & tandem in nigrum, tensio uenarum, idest guidez, uenarum faciei, oculorum, frontis, temporum, & uenarum, quæ sunt post aures, & plenitudo uenarum, quæ sunt sub lingua, & fit subito ualde, & si præcessit casus, uel percussio est illud manifestius, & pulsus plenus. Phlegma uero significat color albus, oculi pleni lippa, nares humidae, humiditas ex ore profluens, oregmon. Melancholiam autem significat color tendens in fulcum, priuatio huiusmodi humiditatum à capite profluentium, & sunt signa cōmunia significantia speciem materiæ sumpta à complexione, habitudine, ætate, sexu, regione, arte, & regimine, de quibus supra. Spuma quoq; significat speciem humoris suo colore albo, plumbeo, citrino, rubeo &c.

Signa apoplexiæ apostemose est feb. cōtinua secum coniuncta. Aliquando tamen apostema præcedit, & tunc sunt signa apostematis, de quibus supra: aliquādo subsequitur, materia fixa & solente continuum. Signa distinguētia inter apoplexiā, & subeth sunt, quia in subeth remanet auditus, & uisus, & operationes aliquæ sensuum interiorū, & exteriorū & fit magis paulatim. Differt à syncopi, quia in syncopi facies est sicut mortui reuocato sanguine, & spiritu ad cor, in apoplexia facies est sicut consuetudinem. Et in syncopi pulsus est submersus, debilis ualde, interdum uermicularis, sed in apoplexia est ferè pulsus cōfuetus. Et in syncopi secundum plurimū casus in terram est uelocior. Differt ab epilepsia, quia si in ea sunt motus spasmodici, in apoplexia nō, licet quandoq; sit cum spasmus in facto esse, & epilepsia est cū periódici apoplexia nō. Differt à prefocatione matricis, quia prefocata audit, & sentit, & adsunt ei operationes sensuum interiorū.

Apoplexia per colligantiam cognoscitur, quia præcesserunt nocumenta totius, uel membri comunicatis. Si uero sit per essentiam non est necessariū talia præcessisse &c. Oppilatio aut arteriarum subethicarum cognoscitur secundum plurimum per inflationem uenarum collis, & cum abundantia nocumentorum cerebri. Illa autem, quæ à corde est, cognoscitur, quia secundū plurimum est facies sicut mortui, est .n. secundū plurimum syncopi cōiuncta. Vltimo distinguitur apoplecticus fortissima apoplexia à mortuo per quatuor signa. Primum est, ut in aere quieto aperiantur os, & nares cotto subtilissime carminato. Aut candela accensa cum flamma ex opposito narium ponatur. Aut cyathus plenus aqua super extremitate pectoris ipsius resupini ponatur, tunc si non uideatur aliquod istorum moueri, certum est ipsum esse mortuum. Quod si contra in ipsis aliquis motus comprehendatur adhuc uiuit. Simile experimentum est de speculo tersissimo opposito ori, & naribus, nam si non maculetur est mortuus. Si uero maculetur quod non est nisi propter flatum anhelitus uiuis, sed hoc signum est ceteris minus certum. Pro quo nota q; anima potest mouere pectus motu dilatationis, & cōstrictionis solo concursu spiritus uitalis sine animali. Vnde hic motus erit dicendus merè naturalis non mixtus, ut uult Gal. 2. aphor. 42. com. Et etiam cōfirmatur autoritate Hip.

allegata per Auic. 21. tertij cap. de generatione embrionis. Dicit enim q; cor est primū quod uiuit, & ultimum quod moritur, ergo mortuum est cerebrum uiuente corde, sed corde non potest uiuere nisi per respirationem enētur, ergo erit respiratio cum non erit spiritus animalis. Ex quo sequitur, ut supra, aliquem anhelitus esse merè naturalē, licet tamen Gal. sexto interiorum uoluerit aliqua animalia frigida per aliquod tempus non anhelare, sed sufficere eis euentationē, quæ fit ab extrinseco per porositates corporis. illud tamen tempus est paruum, sed de homine habente cor ualde calidum non est uerisimile. Non apparentibus tamen signis aliqui anhelitus neque pulsus, authores prohibent huiusmodi corpora, quæ sunt, uel fuerunt apoplectica, sepeliri usq; ad tres dies, cuius triplex ratio redditur. Prima est sumpta à motu humorum, omnis .n. motus humorū in triduo finitur, unde in hoc tempore si quid uitæ supersit debet declarari, cū propter motū nouum cuiuscunq; humoris in triduo debeat fieri aliquis motus in ægro, sicut euentatio, aut crisis. Secunda causa est, quia luna, saltem uelociter mota, peragrat mediam quartā circuli signorū ex qua confurgit aspectus sextilis uirtutem confortans, peragrat .n. uelociter mota singulo die quindecim gradus: hæc autem ratio nō est generalis, sed solū est ualida, dū luna uelociter mouetur. Tertia causa, quia in hoc tempore incipit aliquis foetor mortis declarari, & propterea resuscitatio Lazari quatruiduani iam scētis fuit miraculosa nō naturalis, ergo q; primum incipit foetere, etiā si esset prima dies sicut in zlate est sepeliendū præcipue factis experimentis superscriptis. Gentilis tamē addit q; tertia dies est dies ultimi, & acutissimi conatus, in qua si nullū signum uitæ apparebit nunquā deinceps est sperandum. 7. aph. Quibusq; spheclatum est cerebrum &c. Prognostica. Primum, apoplexia fortis, aut media est secundū plurimum mortalis, uidi .n. quosdā, sed paucos apoplecticos media apoplexia cū forti stertore, & spuma saluatos fuisse. Secundum, omnis apoplexia per cōitatem, aut immaterialis salubris, saluatur absq; transitu in paralyfim sē plurimum. Tertium, apoplexia per essentiam materialis salubris, per transitum in paralyfim secundum plurimum saluatur. Quartum, cum applicant naribus apoplectici potēter cōmouentia sternutationē & non sternutat nec sentit impressionem, mortale. Cura.

Cum ergo ista accidentia uisa fuerint, attendendum erit an patientis facies multum rubere, aut denigrari, aut uiridis fieri uideatur: quemadmodum contingit, cum sanguinis in aliquo membro ex coarctatione retinetur: tunc enim sanguis ex duabus guidez ilico extrahendus erit, aut ex duabus cephalicis.

Hic Rasis ponit curā apoplexiæ. Et diuiditur in tres partes. In prima ponit curam apoplexiæ sanguineæ. In secunda phlegmaticæ. In tertia iterum redit ad complendam curam sanguineæ. secunda ibi. Quod si ita non fuerit, tertia ibi. In prima autem huius passionis. De prima parte Rasis ponens signa apoplexiæ sanguineæ & curā, dicit, q; cum signa apoplexiæ absolute uisa fuerint, erit attendendū an patientis facies multum rubere, aut denigrari, aut uiridis fieri uideatur, sicut contingit cum sanguis in aliquo membro retinetur ex coarctatione, idest, propter constrictionem: & tūc in hoc casu faciēda est phlebotomia, aut ex duabus guidez, aut duabus cephalicis. Et uos supplete alia signa sanguinis, scilicet tensionem uenarum, tactum calidum &c. de quibus supra.

Notandum primo sanguinem quatuor ex causis posse uiridem fieri, & tādē denigrari, primo per adustionem, quia calidum agens in humidum denigrat. prima primi. secundo per congelationē spiritus calorem naturalem mortificādo, spiritibus corruptis, qui sunt lucidi penes Auic. in lib. de uiribus cordis. tertio per exitum sanguinis à uena in aliquo loco conclusi sicut in contusione. quarto per constrictionē sanguinis etiā ad intra uenas non debite euentati spiritibus corruptis qui ei admiscētur. Et hic ultimus modus est ad propositum, nam propter anhelitus constrictionem in apoplexia, sanguis qui primo erat rubeus prohibita ipsius, & spirituum debita trāspiratione & euentatione prius uirescit, deinde nigrescit, amplius euentatione prohibita per ulteriores suffocationem. Est .n. uiriditas quasi transitus à rubeo in nigrum.

Io. Arculani

C 2 Notan-

Ponit curam apoplexiæ phlegmaticæ dicens: Quòd si
 fuerint signa supralcripta sanguinis, imò cum respirat audi-
 tur oregon in pectore, idest sonitus quidã sicut in propin-
 quis mortui, proueniens ex humiditate multa in càna pulmo-
 nis, cui aer respiratus obuiat, & tu supple faciem albam, &
 cætera signa phlegmatis, tunc clysterizandus erit hoc clyste-
 r. educante phlegma à locis remotis, imò interdum sangui-
 nem propter sui acuitatem. Colocynthis calid. & sic. in ter-
 tio. Buchuromariem, idest, pisanus porcinus, uue cyclamen, fœ-
 me malum terræ cali. & sic. in tertio. Centauræ minoris, quæ
 est efficax ad euacuandum phlegma à capite quàm cetau-
 rea maior calid. & sic. in tertio, alias in secundo. Hætanita,
 quæ est una species buchurumarii similiter calid. & sic. in
 tertio. Ellebori albi induciui fauorum acciditum, quod
 natura huniana moderno tempore si exhibeatur per os non
 tolerat, licet toleraret elleborum nigrum, & est calid. & sic.
 In tertio. Ex his quinq; clysteribus M. i. bulliat in tribus lib.
 aquæ donec redeat ad unam, & ex media libra huius apoze-
 matis, idest, decoctionis, siue infusiois fiat clystere: poten-
 ter enim euacuat phlegma, & diuertit à partibus longinquis,
 omnia enim hæc phlegma potenter euacuant, imò hætanita,
 & buchurumarii extra applicata stomacho & uentri solu-
 unt, & uomere faciunt. Si autem uelimus clystere minus
 calidum, posset his in decoctione matrum uiolarum. M. i.
 addi: & non imponitur in hac decoctione nisi. s. lib. propter
 ipsius acuitatem: & hæc clysteria sunt multoties replicanda
 bis, aut ter in die, ut ita notabilis huius phlegmatis euacua-
 tio & diuersio, ita ut ferè totum tempus occupet, nunc in
 clysteribus, nunc in cæteris diuersionibus. Aliud Gerardi de
 Solo. R. centaur. minoris, utrifolij, saluæ, ruæ, abrotani, cala-
 menthi, origani. ana. M. i. anisi, marathri, sileæ, fœ. basilico-
 nis. ana. ʒ. s. florum stecados arabici ʒ. i. pulpæ colocynthi-

Redit ad complendam curam apoplexiæ sanguineæ, & in primis iubet phlebotomiam pedum, postea uenas extremitatis nafi, & iubet post phlebotomiam, fortiter adiu toria frangi parum super coniunctionem, & similiter tibias parum supra genu, & capiti infundi acetum, & oleum rosæ. iuxta phlegmæ doctrinam. Per hanc enim phlebotomiam pedum intendit euacuare, & diuertere, & similiter intendit diuertere per ligaturas dolorosas, & ægrum excitare, & per oxirrhodinû materiam ad caput uenientè repercutere, quod cõuenit materia existente in fluxu ad caput per uenas extrinsecas. per phlebotomiam extremitatis nafi intendit sanguinem actû facientem apoplexiam eradicare, sed ante phlebotomiam nafi phlebotomemur cephalicæ uel guidez. Et ex his quæ dicta sunt potes elicere quinque intentiones curatiuas. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia localia applicat secundû exigentiam tẽporum. Quarta corrigit acceitua. Quinta ordinat debitum regimen sex rerû non naturaliu. Prima aut in sanguinea, & phlegmatica cõpletur, ut dictum est supra:

pra: clysteria tamen in sanguinea debent esse minus calida, & aliquando fiant suppositoria fortia, ut ex falgēma solo, sed cum filo suspendantur, ut liberè possint extrahi, & potest fieri ex melle cui addi potest falgemma, & illa quæ ponuntur in clysteribus. Verum in melancholica ponantur in clysteribus, & suppositorijs elleb. niger, & cætera, quæ potētius euacuant melancholiam: nec hic opus est digestiuis, cum non det inducias nisi forte in declinatione. Secunda autem intentio completur omni genere diuersionum, quæ sunt assiduandæ, & proprie fortiores earum, sicut ligaturæ, & uentofationes, & debent sæpe mutari, sic enim melius diuertunt, & ægrum excitant, & fiant sternutationes iteratæ cum his, quæ dicta sunt. Tertia est ex dictis manifesta. Quarta uero intentio completur prouocando urinam cum his, quæ superius dicta sunt in capite de phrenesi, & alia accidentia corrigantur secundum exigentiâ. Quinta autem similiter completur locando ægrum in aere calido, & sicco si fuerit phlegmatica: si uero sanguinea in aere sicco temperato in actiuis, aut leuiter declinante ad calidum: & si fuerit melancholica in aere declinante ad temperiem in actiuis, & passiujs, aut leuiter declinet ad calidum. Dicta autem sit nihil dare usque ad declinationem, & tunc potest dari hydromel, & oxymel. In phlegmatica, & melancholica acetosus simplex, & aqua hordei in sanguinea, & gradatim postea ascendere ad dictam crassiores, & conformem humori peccanti. Somnus autem cum declinat concedatur, sed multoties interruptus: sollicitè intèdatur ad euacuationem omnium superfluitatum: motus in declinatione conuenit, & si non potest fieri, frictions fortes uicem suppleant exercitij. Prouocentur ad iram, & tristitiam. Duo tamen præcepta maxime hic attende. Primum quod est commune huic, & omnibus ualde acutis passionibus, ut scilicet subito festines ad curam, nam post duodecim horas si tardetur secundum plurimum cura erit irrita, & uana. Secundum est, in apoplexia per essentiam in cerebro materiali labores in prouocando paralytism cum frictionibus fortibus maxime in ea parte in quam natura repit, & omnibus alijs auxilijs. Si uero fuerit per communitatem, cura sicut in capitulo de foda dictum fuit cum illis quinque intentionibus, quæ huic loco applicandæ sunt. Si uero pendeat à causâ primitiua ipsam remoue, & nocumentum per ipsam immediatè impressum. Virtutem excita, & humores à lapsu prohibe omni genere diuersioni. Si uero à mala cõplexione sine materia pendeat, altera cum contrarijs, humores à lapsu prohibe, uirtutem sopitam excita cum omni genere diuersionum.

De Subeth. Cap. 6

Subeth apud Arabes importat somnum longum: & profundum, qui diffinitiuè, secundum Auic. est somnus superfluous, scilicet in longitudine, & grauis, id est, profundus à quo difficilis fit excitatio, pendens à causâ præter naturam. Dicitur autem superfluous, & grauis ad differentiam somni naturalis, & dicitur pendens à causâ præter naturam ad differentiam somni non naturalis, de quo infra. Somnus autem diffinitiuè secundum Auic. est reditus spiritus animalis ab instrumentis sensuum & motus ad suum principium, cum quo priuantur ipsorum instrumenta ab exitu operationis in ipsis, nisi quæ necessaria sunt ad hoc, ut uita permaneat, & illa sunt infra spiritus. i. anhelitus. Dicitur primo reditus spiritus animalis, quamuis etiam redeat spiritus uitalis & naturalis ad sua principia, principaliter tamen animalis, cum propter eum magis somnus inductus sit, quam propter alios spiritus, ipso in uigilijs magis laborante in operationibus sensus & motus, & per consequens magis resolutio. Dicitur ab instrumentis sensus & motus, quia propter ea principaliter factus est somnus, ut quiescant. Dicitur ad principium, quia scilicet ad cerebrum, quod est principium spiritus animalis, licet etiam in somno spiritus uitalis redeat ad cor, & naturalis ad hepar, non est tamen negandum quin omne genus spiritus redeat ad unumquodque membrorum principalium, sed plus de animali redit ad cerebrum quam de uitali ad cor, & de naturali ad hepar. Dicitur postea quod priuantur instrumenta sensuum & motus, non quidem cõpletè, sed diminutè, cum in somno instrumenta sensuum sentiant obiecta fortiter imprimantur, & moueantur, ut est manifestum. Vltimo additur, præter ea, quæ sunt necessaria ad uitam, scilicet instrumenta anhelitus,

nam ista scilicet diaphragma, & pectus nullo modo in operationibus suis diminuuntur. Causæ autem reditus spiritus ad sua principia est primo inclinatio ipsorum spirituum ad redeundum ad sua principia cum sunt lassati, & resoluti, ut in suis principijs fortificentur, & restaurentur, nõ quia spiritus nutrantur cum sint inanimati, sed fouentur, & alij de nouo re generantur: ideo Auerrois secundo colliget capite de opere somni, comparat spiritus militibus qui fracti redeunt ad ducem exercitus, & ad signa, ut inde fortificati aciores redeant ad pugnam. Trahuntur etiam spiritus à suis principijs imprimantibus in ipsos proprietatem, qua ad ipsos moueantur, licet etiam moueantur ad ipsa ne detur uacuum, sicut accidit in corporibus subtilibus permixtis, cum una pars mouetur reliqua sublequitur: licet posset dici quod membra principalia attrahant spiritus nihil imprimendo per solâ subordinationem. Vtilitas quæ sequitur ex parte ipsorum principalium, & deseruicium eis, maxime stomachi est, quod eorum digestionem fortificantur, ideo dicitur quod somnus est quies operationum animalium cum fortificatione naturalium: sed intellige quod hæc diffinitio est causalis, quia data per causam efficientem, quæ est reditus spiritus; si autem uelles formalem, dic quod somnus est quies operationum animalium cum fortificatione naturalium propter reditum spiritus animalis. Ex his quidem possent elici tres causæ somni. efficiens quæ est ipse reditus spiritus animalis, causa autem remotior efficiens est ipsa forma impressa in spiritibus à principalibus, aut naturalis subordinatio ipsorum, aut propria inclinatio ipsorum, aut ne detur uacuum, quæ omnes sunt causæ reditus. Causa autem efficiens cõseruans est oppilatio in rete mirabili & in neruis, uenis, & arterijs, per quas spiritus redeunt ad instrumenta sensus & motus, quæ oppilatio fit à uaporibus ascendentibus ad cerebrum in prima, secunda, & tertia digestionem qui uapores ingrossati à frigiditate & humiditate cerebri oppilat huiusmodi uias de quibus sermo præcessit, licet in somno præter naturam fiat oppilatio ab humoribus & uaporibus grossis. Causa autem formalis est quies operationum animalium. Finis autem est fortificatio ipsorum spirituum, & digestionis stomachi & membrorum principalium, licet non sit finis ultimus, nam finis ultimus omnium operationum humanarum est felicitas &c. Causa autem materialis nõ est assignanda, quia neque somnus, neque aliud accidens habet causam materialem ex qua. Et si Auerrois dicit loco allegato uapores esse causam materialem somni, intellige causam materialem cum qua, non ex qua, quæ nihil aliud est quam causa efficiens. Ex his habemus quod calor in somno fortificatur interiorius, minuitur exteriorius. quapropter in somno indigemus pluribus operimentis quam in uigilijs: & notate quod cum spiritus sint fortificati in somno etiam resoluta oppilatione redeunt exteriorius, & tunc animal expergefit, & non credatis quod semper redeant ad extra idem numero, qui prius fuerat ingressi, cum fere in unaquaque cibatione fiat nouorum spirituum regeneratio sicut continue fit ipsorum corruptio. Notate etiam quod spiritus redeunt ad principalia à membris omnibus, ut ab ossibus, carne, & huiusmodi quæ non sunt instrumenta, licet non ita sicut ab instrumentalibus, & etiam ab instrumentis anhelitus, sed pauci, ita ut non diminuuntur in operationibus suis & hoc propter causas & fines assignatos & ex his manifestum est quod somnus est passio anterioris cerebri, & proprie primi uentriculi, cū in eo magis impediatur sensus cõis quæ aliquis aliorum sensuum interiorum, & inter exteriores, magis uisus & auditus, quæ tactus, quia sunt propter neruos ab interiori cerebro ortum habentes, sicut tactus per neruos orientes à nucha & cerebro posteriori. Somnus triplex est, naturalis, non naturalis, & præter naturam. naturalis qui fit à causis naturalibus non lædentibus sensibilibus neque insensibilibus sicut à resolutione moderata spirituum à uigilijs & laboribus, & oppilatione moderata à uaporibus primæ & secundæ & tertiæ digestionis. Non naturalis qui fit à causis non naturalibus insensibilibus lædentibus, sicut ab exercitio & uigilijs modum excedentibus & præter modum spiritus resoluentibus & à medicina soluente, & sicut à crapula & ebrietate non tamen modum excedente, & assumptione rerum moderate stupefacientium, & sicut fit in neutris cõalescentiæ, & hic somnus est longus & profundus, aut quia spiritus sunt

Io. Arculani C. 3. nimium

nimum paucifcati, unde non superfunt ut poffent exire, aut nimis ingroffati, unde funt facti tardiores ad motum & forte nimia oppreffio facta eft, nulla tamen exiftente læfione fenfibili. Præter naturalis autem eft quid fit à caufis fenfibiliter lædentibus ficut eft fubeth de quo nunc agit Rafis. Et fic patet quid eft fubeth, quid fomnus naturalis, & quid nō naturalis.

Cum aliquis quasi dormiens iacet, & tamen sentit, & mouetur; sed oculos secundum plurimum habet clau-
sos, quos tamen dum uocatur cum clamore, aperit, li-
cet iterum statim claudat; iam patitur subeth.

Diuiditur præfens capitulum in duas partes. Primo Ra-
fis agit de fubeth theorie, fecundo præfice, fecunda ibi. Qui
cum clyfteribus. De prima parte dicit cum aliquis quafi do-
miens iacet, & tamen fenfit, & monetur ad differentiam apo-
plectici & fyncopezati: & fecundum plurimum tenet oculos
claufos, ad differentiam congelati, de quo in frequenti capi-
te, qui fecundum plurimum itat oculis apertis: quos tamen
dum uocatur cum clamore aperit, licet statim claudat, ad dif-
ferentiam præfocæ, que non aperit oculos, licet audiat &
fenfiet. Et quia fubeth fit paulatim & poft fomnum & diu du-
rat, præfocatio eft his contraria, hic patitur fubeth.

Qui clysteribus acutis, quæ paulo ante nominauimus, curandus est. In os quoque ipsius mittendum hydromel, & labioribus, ut descendat; ipsius uero nutrimentum exilit eius. Caput præterea lasci; ad diatrium primum oxyrodino infundendum. post tertium autem diem sternutationem provocabimus ex his, quæ nominabimus; & rademus caput, & leuiemus ex sinapi, & castoreo, & aceto.

Hic ponit curam subethici quinq; remedijs. Primo curat
ipſum cum clyſteribus acutis dictis in capitulo de apoplexia
quorum duo aut plura aut ſaltem unum imponatur in die ad
dinertendum & euacuandum materiam phlegmaticam à capi-
te. Clyſteria tamen poſſunt eſſe leuiora quàm illa quæ di-
cta ſunt in cap. de apoplexia, cum ſubeth fit minor ægritudo
quàm apoplexia, ut faciendo decoctionem ex hyſſopo, cala-
mento, ſtoace arabico, agarico, quibus apud neceſſitatem
addatur centaurea, colocynthis, & alia quæ ponuntur in clyſ-
teri deſcripto in capitulo de apoplexia. Secundo curat
cum hydromelle pluris aut paucioris aquæ. Commune au-
tem hydromel recipit. 8. partes aquæ, & unam mellis, & bul-
lit uſque ad tertiam partis conſumptionem continue deſu-
mando, & elaborandum eſt, ut deſcendat ad ſtomachũ, quia
cum difficultate deglutit. eſt enim cibus medicinalis. Et ſi
uis ipſum magis nutritivum pone ſex partes aquæ & unam
mellis, & ſi ipſum minus nutritivum pone. 12. partes aquæ,
& unam mellis, ſemper deſumando & bulliendo, donec
pars tertia fit conſumpta, uerum declinante ſubeth oportet
ingroſſare dictam dando brodium cicerum, & tandem alii
quid carnum & uini. Tercio applicat capiti oxyrodinum
ſuperius deſcriptum, & hoc fronti & temporibus materia
fluente per partes extrinſecas uſque ad diatrium primum,
ideſt, ſpaciũ trium dierum, donec materia fit fluxa. Quarto,
materiam ſecundum maiorem partem fluxam euacuat à
capite cum ſternutatorijs dictis in capitulo de apoplexia, le-
uiora tamen poſſunt eſſe. Sufficit enim forte ſuccus artani-
ci. Vltimo ponit medicinas reſoluentes ex ſinapi, caſtoreo
& aceto, dictas in capitulo de apoplexia. Eſt tamen gra-
tiam procedendum. primo addendo caſtorem oxyrodino
ſupraſcripto, tandem componendũ caſtorem calidum uſq;
ad finem tertij, & ſinapi calidam in quarto cum aceto for-
ti ad maiorem penetrationem. Iuxta modum conſuetum po-
nendũ ſunt ſpecies & cauſæ, ſigna, prognoflica, & tandem
cura. Subeth eſt duplex, quoddam longum pendens à ſan-
guine, quoddam graue ſeu profundum pendens à phlegma-
te. Item, quoddam materiale, quoddam immateriale. Item
quoddam per eſſentiam, quoddam per communicatiem, aut à
toto, aut à membro particulari: & quodcumq; horum fuerit,
aut eſt intenuſum, aut remiſſum, aut medium, &c.

Causę primitiuę sunt, sicut casus & percussio in capite maxime comprimes os: percussio in temporibus, ubi sunt arteriæ apoplectica; colli laqueatio & compressio super arterijs apoplecticis, frigus aeris & humiditas superflua; crapula &

ebrietas, narcotica sumpta per os, aut exterius applicita, quorum quædam oppilât oppilatione attenuatoria, quædam coarctatoria, quædam utroq; modo.

Causæ corporeæ per communitatem sunt sicut febris, & propter frigida & maxime phlegmaticæ in suis principiis, nec non multa spirituum resolutio à quacunque causa fiat siue corporeæ, siue incorporeæ, similiter coitu, fame, uigilijs, aut exercitio, aut mora in balneo: resolutio, aut aliud quodcumque extenuans & resoluens sicut ægri tudines acutæ & prolixæ, & similia. Item, communicatio à quocunque membro mittente uapores ad caput, sicut à stomacho, intestinis, & uernis aut materia eorum, & sic de singulis: qui uapores propter sui multitudinem faciunt oppilationem coarctatoria. Et si propter malitiam complexionis fiat cōtractoria, tunc oppilatio est attenuatoria, & quandoq; est coarctatoria in arterijs subethicis à sanguine aut phlegmate prohibente transitum spiritus uitalis. Et si est completa, sequitur apoplexia. Si diminuta sequitur subeth. Per essentiam autē in cerebro potest esse à mala complexionē frigida, scōstringente, aut à mala complexionē humida relaxante, ita ut paries cadat supra parietem, & utraq; est oppilatio attenuatoria. Aliquando est à materia sanguinea aut phlegmatica, quæ si sit in meatibus transitus spiritus, oppilat coarctatoria: si uero extra eos sicut inter cranium & cerebrum, aut in ipsis anfractibus & substantia cerebri, siue apostemæ, siue non, facit subeth oppilando attenuatoria. Caliditas autem & siccitas non faciunt subeth nisi per accidens, caliditas attrahendo, siccitas corrugando, & inter omnes qualitates frigiditas est potentior in causando subeth. Signa autē subeth. Est primo prognostica. Primum est debilitas capitis à frigidityte, humilitate, repletionē & ipsius paruitate. Secundum est grauius capitis cum hebetudine sensuum & tarditate ad motum.

Signa distinctiua inter febrem, apoplexiam, syncope[m], praefocationem matricis, & congelationem sunt ex dictis nani festis. Differt autem a lethargia, quia lethargia e[st] cum febre, cum alienatione & obliuione, huc uero n[on], & est lethargia secundum plurimum in cerebro posteriori, hic uero in anteriori, & proprie in primo uentriculo. Signa causarum primitiuarum sunt praefatio earum & nocumenta ex ipsis derelicta. Signa febrem per communitatem suae a toto, suae a parte, sunt praefatio nocumenti totius aut partis, & q[uo]d augeat febrem cum augmento illius, & decreuit cum decremeto illius, aut auferat cum ablatione illius, & per communitatem interdum fit subito, per essentia[m] uero fit magis paulatine. Signa febrem a frigide[m] sine materia erit color uiridis, tendens in nigrum propter mortificatione[m] spirituum, pulsus durus propter congelationem arteriarum, tardus dimigrit a necessitate, & non erit inflatio in facie nec in palpebris.

Et si fit ab humiditate sine materia etiam non erit inflatio, nec rubor significans sanguinem, nec grauitas capitis, sed erit mollietas in toto & in pulsu. Si fuerit à phlegmate, apparebit eius multitudo in egestione, urina, ore, naribus & oculis. Secundo, latet aetate nauicula plurima præcedens regimen proportionale, complexio naturalis & ætatis frigida & humida, pulsus mollis, paruus, latus, quasi cadente superiori latere arteriæ cum quadâ fluctuatione leue undositate. Subeth maxime profundum signat albedo in facie & oculo, linguae limositas, grauitas capitis, ocofities, ponderositas, inflatio palpebrarum. Si uero fuerit à sanguine, erit inflatio uenarum colli, lingue, faciei, oculorum, frontis, temporum, postea uenas rubedo faciei, & oculorum caliditas percepta circa caput & non erit somnus tã fixus, nec tãtî periculi. Si uero sanguis & phlegma simul sint in causa, signa sunt mixta: & si apostemata, aderunt signa mixta apostematibus querenda ex his quæ superius dicta sunt in signis apostematû. Prognosticû subeth non apostemosum secundum plurimû curatur, sed apostemosum rarissime. Cura, si fuerit à percussione, colli laqueatione, casu, offensione, constrictione, ut causa primitiua remoueat: & nocumentum ab ipso derelictum, siue sit uulnus, siue contusio, corrigatur, sicut dictum est in cap. de sôda ex percussione, ad quod recurrit. Et si pendeat à frigidityte sine materia, remoueat causa infirmandas, si qua sit, & secundo frigiditytas inducta alteretur cum calefactantibus exterius applicitis ficut unctio[n]ibus, fomentis, embrocis ex oleo laurino, sambacino, de

lilio.

lilio, de costo. &c. & cum fomētis ex maiorana, stoeade, calametho, foliis lauri; & cū interius sumptis, scilicet, diamusco dulci, diambra, mithridato, theriaca, confectione anacardina, & aqua uitæ, quæ sunt ultima in calefaciendo interius sumpta sicut exterius applicata. & sunt aliqua cal. in quarto sicut sinapis, castoreum, euphorbium, & huiusmodi permixta cum paucis aceti ad maiorem penetrationem, & eligatur medicina secundum gradum ægritudinis cui opponuntur. & tertio omnia hæc sint capitis confortatiua siccitate quadam, aromaticitate, & subtilitate substantiæ & forma occulta. Et lapsus humorum prohibeatur cum digerentibus, euacuantibus, & diuertentibus secundum opportunitatem, & similibus intentionibus. mala complexio humida corrigatur, sed sunt sicca actus & potentia. Si uero subeth pendeat a uenenis sumptis, subito ipsorum uomitus procuretur, & etiam eductio per uentrem maxime cum lauandis & liniendis cor & cerebrum & spiritus confortentur. Et bezahartica propria contra illa uenena exhibeantur, & nouemena per illa uenena induta corrigantur: si uero subeth pendeat a crapula & ebrietate, curetur cum uomitu exquisito, longa abstinentia & somno, & cum educantibus per inferius & cum confortantibus, sicut dictum fuit in capite de foda ex ebrietate & nausætiua sarietate. Si uero subeth pendeat a materia sanguinea uel phlegmatica per essentiam in cerebro, procede sicut dictum fuit in apoplexia sanguinea, & phlegmatica, præter hoc quod subeth non indiget tanta festinatione sicut apoplexia, nec ita fortibus & extremis curationibus cum sit ægritudo minus acuta, & in qua saltem ante eradicationem potest permitti digestio. nec hic est opus tenuissima diæta sicut in apoplexia, sed detur aqua mellis & brodium cicerum. horum etiam cura in foda sanguinea & phlegmatica est perquirenda. Subeth uero a multa resolutione spirituum curatur, restauratione eorum cum debito regimine & delicato ex his, quorum parum, multum nutrit, & cum confortatione membrorum principalium & stomachi: nec his opus est euacuatione aut diuersione, sed tantum aliqui a somni profunditate excitatione. Subeth uero per communitatem curatur illis quinque intentionibus quæ posite sunt in cura fode per communitatem, quæ huic loco accommodandæ sunt. Duo tamen præcepta sunt obseruanda in curatione subeth & similium ægritudinum. Primum, ut in approximatione localium uereamur actualē humiditatem, ex qua interdum plus nocetur, quam iuuatur per potentialem siccitatem aut caliditatem. Et propterea in diffractione frigida & humida præstantiora sunt quæ sunt calida & sicca actus & potentia, sicut faculi ex rebus calefacientibus & exiccantibus. Secundo, ut timeamus oppilationem quæ ex oleagineis frequenter derelinquitur, nisi sit acetum secum mixtum, & propterea post approximationem oleorum & uiscosorum subsequatur ipsorum conueniens absterfio, & lauatiua præstantiora sunt quam olea.

De congelatione. Cap. 8.

Congelatio sumitur quinque modis. Primo prout diffinitur contra condensationem & taliter accepta sic diffinitur ab Aristotele. 4. metheo. quod est passio humidæ aquei a frigidityte forti per quod humidum aqueum, quod est terminabile termino alieno per frigiditytatem induratur, & fit terminabile termino proprio. Condensatio uero nihil aliud dicit nisi minorationem quantitatis materia non diminuta. Est enim densum cuius partes propinquæ iacent, & taliter non sumitur hic. Secundo accipitur ab Auicenna. pro tetano siue pro congelatione materiæ humidæ in neruis sicut accidit itinerantibus per loca frigida ex qua nerui tetanantur, & taliter non sumitur hic. Tertio accipitur a Galieno. 2. interiorum ca. 2. pro impedimento operationis, & taliter non sumitur hic. Quarto sumitur ab eodem quarto de accidenti & morbo pro stupore, & taliter non sumitur hic. Quinto, ut hic, sumitur pro ægritudine partis posterioris cerebri, quæ est mala complexio frigida & sic per quam spiritus sunt immobiles, & nerui inflexibiles auferens sensum & motum uoluntarium, aut notabiliter impediens. Licet Io. Serap. dicat hanc esse oppilationem in posteriori uentriculo cerebri, ex qua aufertur sensus & motus uoluntarius, & hoc modo erit morbus officialis dicitur libet. Habet enim nomina multa. A Rasis hic dicitur congelatio ab Auicenna. Prima terti dicitur suchosus

est enim species congelationis. 2. Aphor. com. 3. dicitur cataleptis græce, quod est detentio latine. A Sera. cap. allegato dicitur cathatas. Et quarto interiorum uocatur catechios. Ex his manifesta sunt quid nominis & quid rei congelationis.

Cum aliquis quasi dormiens iacet, & non mouetur, et licet sint oculi aperti; palpebras tamen non mouet; congelatus est, siue rigidus. Curandus est uero ex medicinis subeth. hoc tamen addito, ut oleum sambacinum super caput fundatur, et in omni lib. eius sit uncia una euphor. ipsum quoque caput ex castoreo, & euphorbio, & oleo sambacino liniatur.

Diuiditur præsens ca. in duas partes. Primo Rasis determinat de congelatione theorice. Secundo præctice, secunda ibi. Curandus uero erit. De prima parte dicit. Cum aliquis iacet quasi dormiens & non mouetur, & supple, neque sentit, & licet oculi sint aperti, palpebras tamen non mouet, neque etiam oculos, sunt enim eius oculi fixi quasi intueres in unum locum, hic est congelatus siue rigidus. De secunda parte dicit, quod hic curandus est ex medicinis subeth cum oporteat ipsum fortiter calefieri, licet non adeo exiccari. Et propterea uiter acetum quod concedebatur in subeth. Et laudat oleum sambacinum. i. ieu feminum calidum & siccum in. 2. cui pro unaquaque lib. admisceatur euphorbit. 3. quod est calidum in quarto: euphorbium quoque & castoreum permixta cum oleo sambacino est medicina propria attingens fere usque ad quartum gradum, quæ in modum linimenti capiti est applicanda, aut si uis maiorem impressionem infundantur petreæ lineæ in ea, applicentur maxime cerebro posteriori.

Duplex est congelatio. Debilis, in qua non aufertur omnino sensus & motus uoluntarius, de qua dicit Sera. cap. allegato, quod habens eam dolet in cerebro anteriori. Alia fortis omnino auferens sensus interiores & exteriores & omnem motum uoluntarium. Credo tertiam speciem in qua aufertur aut minuitur sensus & motus uoluntarius omnium partium corporis præterquam partium faciei, cum nocumentum per essentiam sit frequenter solum in uentriculo posteriori.

Causæ primitiue sunt frigiditas aeris excessiua sicut tempore hyemali, & maxime cum statu uentorum septentrionalium, Et pluuia frigida cum impetu obuians capiti, proprie parti posteriori, nec non potius aquæ frigidissimæ grossæ latentis in puteis profundis in quantitate sumptæ, & proprie stomacho ieiuno, & maxime post coitum. Exercitium aut balneum necnon usus ciborum præbentium nutrimentum grossum, frigidum, multiplicantium melancholiam naturalem, aut per congelationem genitam, aut phlegma uitreum, sicut sunt fungi, melongiana, lentes, pisces nominatus torpedos, imo hic congelat manus piscatorum solo tactu. Et forte odor argenti uiui, cerussæ aut opii, & similia causaret hanc passionem. Et forte poetæ fingentes homines uidentes caput Medusæ saxificari uolebant ipsos incurrere hanc passionem ex qua sunt immobiles. Et extasis quam quandoque incurrunt homines circa aliquod obiectum attentissime speculantes, est dispositio huic similis, sunt enim immobiles semiclausis oculis in unum locum intuentes, licet non uideant, neque audiant propter animæ fortem conuersionem ad aliquid speculandum. Nam attente fortibus imaginationibus delata sub oculis non uidemus. Secundo de anima.

Causæ corporeæ per communitatem sunt uapores frigidi melancholici, aut a phlegmate uitreo eleuati, aut a toto sicut in epiala & liparia, aut in febre syncopali humorosa, aut in quareana: & hi uapores non sunt putridi, licet forte a caliditate putredinali sint eleuati. Aut eleuantur ab aliquo membro particulari, sicut splene, mirach, stomacho, intestinis, quæ ad caput uenientes, & proprie ad partem posteriorem quæ frigidior est, spiritus congelat & neruos reddunt inflexibiles.

Causæ uero corporeæ per essentiam in cerebro sunt melancholia naturalis, aut genita per congelationem, & similiter phlegma uitreum congelans spiritus, oppilans, uentriculum posteriorem, aut forte mala complexio fortis frigida & sicca sine materia impressa ab alia causa primitiua cum dispositione cerebri ad huiusmodi passionem.

Signa uero prognostica sunt dispositio passio, quia est corpus exangue melancholicum frigidum tam complexionaliter

Io. Arculani C 4 ter

ter q̄ ex ætate. Signa uero demonstratiua sunt q̄a est sine sensu & motu uoluntario, uel multum in his diminutus propter spirituum congelationem, uentriculi posterioris oppilationē stat oculis apertis, palpebris contractis humido ipsarum exiccatō, in cæteris mēbris stat sicut erat cū incurrit palsionem, quia nerui sunt congelati facti inflexibiles, ideo totū corpus est frigidum & inflexibile, unde stat oculis apertis fixis, ac si in unum locum intueretur. Et ex his patet differentia inter ipsam & apoplexiā, quia licet ambæ priuentur sensu & motu uoluntario, tamē apoplecticus stat oculis clausis nec mēbra ipsius sunt frigida immobilia, & facies apoplectici est magis similis suæ naturali faciei; congelati uero magis tēdit in pallorem cum nigredine propter calidi extinctionem. Differt ab epileptico, quia epilepsia est cum motibus spasmodicis, hic sine motu, nec stat cū oculis apertis. Differt etiam a syncope, quia in syncope est facies sicut mortui, sed non in congelatione, & in syncope pulsus est cadens, diuersus, inordinatus, hic uero satis æqualis: & in syncope non stat oculis apertis, neq; corpus est frigidū sicut in congelatione. Differt a præfocatione, quia præfocata audit & sentit & stat oculis clausis, & est facies sibi consueta, neq; corpus est rigidum, sed in congelatione sunt his contraria. Differt a subeth & lethargia quia subethicus & lethargicus stat oculis clausis, quos tamē aperiri si cum clamore uocentur, sentiunt, mouentur, & loquuntur. Et in lethargico est feb. hic uero adsunt istorum cōtraria: & in subethico & lethargico pulsus est magnus undosus, mollis, latus: hic uero non multum magnus, strictus & durus. Differt a tetano, quia tetanus audit & uidet, & exercet sensus interiores, hic uero nō. Signa causarij ex dictis superius in foda, aut apoplexia sunt satis nota & manifesta.

Prognostica. Si cōgelatio est fortis, cura est impossibilis. Si debilis cura est possibilis, sed non apud negligentes.

Cura. Prima, si pendeat a frigiditate rerum exterius occurrentium, tunc illæ amoueantur. Secundo, nocumentum per illas impressum a cōtrarijs abijciatur tam interius quā exterius applicitis. unde exterius capiti & toti corpori obuiet aer calidus, & panni calidi & capiti, & toti corpori applicentur, nec non medicina in textu descripta, & interius, si fieri possit, detur aqua uitæ, aut cōfectio anacardina, aut theriaca, mithridatum, diambra, diamusculum, & similia. Tertio excitetur cum diuersionibus & clamore, quæ etiam iuuant, ne fiat materialis. Si uero sint interius sumpta sicut fungi, primo ipsorū uomitus exquisitè prouocent. Et si quid super est cum lenientibus & lauatiuis educat: fiant quoq; clysteria satis acuta horum educatiua. Secundo cerebrum & membra nobilia confortentur cum theriaca & mithridato, & similibus. Tertio, bezahartica propria contra unumquodq; uenenum exhibeantur. Si uero fuerit per communitatem, procedatur cum intentionibus quinque; curatiuis dictis in capitulo de foda. Si uero pendeat a materia existente in cerebro melancholica, aut phlegmatica uitrea, quinque; requiruntur intentiones, scilicet, euacuatio, diuersio, approximatio localium, correctio accidentium, & regimen non naturalium. Si materia fuerit phlegmatica euacuatur cū clysteribus & medicinis dictis in capitulo de apoplexia. Et similiter fiant eodem modo diuersiones quæ in apoplexia phlegmatica præcipiuntur. Si uero sit melancholica sicut est secundum plurimum, fiant clysteria acuta cum decoctione huiusmodi. R. polipodij, epithymi. ana. ʒ. i. ellebori nigri. ʒ. s. stecados arabici. ʒ. 2. senæ. ʒ. s. falis indi. ʒ. s. aliās. ʒ. i. bulliant in 4 lib. aque ad consumptionem medietatis. Sed epithymum ponatur in fine, & de hac colatura imponatur. ʒ. ʒ. quibus si opus est acuire magis, addatur hieralogodon, aut hiera diacolocynchidos, aut hiera hermetis, alicuius istorum. ʒ. i. uel. ʒ. s. Medicinæ quoque digestiue & euacuatue sumantur sicut dicitur in capitulo de melancholia, & dictum fuit in capitulo de foda melanco. & fiant diuersiones, quæ præcipiuntur in apoplexia, & præcipue fiat sternutatio cum elleboro nigro. Tertia uero intentio perficitur cum medicinis localibus dictis in textu. Aut si uis facere fomentum, aut embrocā, decoque stecadē arabicum, senā, assarum, buglossam usque ad euphorbium & sinapim, in aqua, & spongia in hac decoctione infusa, & optime expressa saepe capiti applicetur, aut permittatur ex alto cadere super commissuram posteriorem. Et in his medicinis semper adde folia & flores ieuemini, sunt enim propria: nec hic competunt reperculsiua, quia humor est nimis grossus & indigens multa calefactione. Siquod accidens est, sicut urinae retentio, corrigatur sicut saepe dictum est. Regimen autem non naturale declinet ad calidum & siccum in phlegmatica, sed in melancholica ad calidum & humidum, quæ ex dictis superius & dicens in cap. de melancholia facile comprehendi possunt.

De paralyfi. Cap. 9.

Paralyfis Græce, resolutio Latine. Et quandoq; sumitur communissime pro nocumento in sensu & motu, scilicet ablatione, aut diminutione, undecunq; proueniat, & non hic ita sumitur. Sic enim accepta dicitur de apoplexia & congelatione & similibus. Communiter uero accepta conuertitur cum mollificatione, de qua est sermo apud Auicē. cap. de paralyfi, quæ est ablatio aut diminutio in sensu & motu uoluntario, aut mixto, aut saltem in motu in aliqua corporis parte, non in toto. Si enim esset in toto, esset apoplexia. Et ex his patet quod mollificatio siue mollities nō sumitur hic pro qualitate secunda insequente humiditate. Paralyfis autē proprie sumpta est ablatio aut diminutio in sensu aut motu uoluntario, aut mixto secundum alteram medietatem corporis dextram aut sinistram.

Cum aliquis se mouere non ualet, aut unum, uel plura ex membris mouere non potest, atque eorum sensum amisit; ipsum paralyfim ipsius membri, aut ipsorum membrorum incurrisse pronunciamus.

Diuiditur præsens capitulum in duas partes. Primo ponit signa paralyfis. Secundo curam. secunda ibi. cuius curam. De prima parte quid dicat satis est ex dictis manifestum, maxime ex diffinitione paralyfis.

Iam ad species ueniendū. Prima distinctio. Paralyfis communiter accepta quadruplex est. Quandoque enim est in toto exceptis partibus faciei quæ habent sensum & motum à neruis orientibus à cerebro & non à nucha. Quandoque est in omnibus partibus faciei. Quandoque solum in altera medietate, dextra. s. aut sinistra. Quandoque in mēbro particulari intrinseco aut extrinseco. Paralyfis autem proprie accepta quæ est in altera medietate, quādoq; est in tota medietate. s. à medietate uerticis capitis usque ad pedem. Quandoque solum à ceruice infra nullo existente nocumento in partibus faciei. Secunda diuisio. Paralyfis aut est cum totali ablatione sensus & motus in parte laesa. Aut sola diminutione ipsorum. Aut tertio cum nocumento solum motus. Tertia diuisio. Quælibet istorum, aut fit incipiendo, aut permutando ex alia ægritudine, sicut ex apoplexia, epilepsia, cholica, febribus, pleuresi, & similibus. Quarta diuisio paralyfis, quædam est materialis, quædam immaterialis, sicut pendens à frigiditate, humiditate, solutione continui, dislocatione.

Causa paralyfis immediata, aut est mala complexio partis paralyticæ lapsa per calidū, siccū, frigidū, aut humidū. Licet mala complexio calida & sicca, nisi multū excesserit, raro impediatur sensum aut motū, cum uideamus hæcicos nō impediri in sensu aut motu: uerū omnis mala complexio cum excedit deijcit actum propriæ uirtutis. Sed mala complexio frigida & humida facile sensum & motum impedit, cum per frigiditatem sit contraria spiritui, & sensum stupefaciat, & per humiditatem neruos relaxet, unde sunt impotentes ad motum. Aut aliquando causa immediata est nocumentum in spiritu uitali aut animali, aut quia nimis crassus aut mala qualitate affectus manifesta uel occulta, aut nimis paucus unde est ineptum instrumentum ad sensum & motum: aut quia non transit ad membra propter nocumentū in uis transitus. Hoc autem nocumentum aut est solutio continui maxime secundum latitudinem, quia secundum longitudinem raro impedit transitum spiritus. Aut est consolidatio post solutionē auferens porositate nerui in loco consolidationis, aut arteriæ, non enim hæc membra spermatica restaurantur per uiam primæ intentionis & omnino sicut erant, nisi forte in infantibus. Secunda causa prohibens transitum spiritus est oppilatio, q̄ si est in cerebro, aut est in tota medietate dextra triū uentriculorū, & sic fiet paralyfis à uertice capitis usq; ad pedem dextrū, & tunc erit impedimentum in locutione. Aut erit in

erit in tota medietate sinistra, & fiet paralysis totius lateris sinistri. Aut erit oppilatio solum in uentriculo posteriori secundum partem dextram aut sinistram, & fiet paralysis lateris dextri aut sinistri à ceruice infra cū incolumitate partium faciei, quia oppilatio comunicat solū uni medietati nuchæ, quæ diuisa est in duas medietates sū longitudinem usque ad caudam mediante pinniculo subtilissimo male per uisum discernibili, quod rationale est, quia oritur à duabus medietatibus cerebri sic diuisi. Si uero oppilatio erit in toto uentriculo posteriori absq; oppilatione anteriorū uentriculorum, uel solum erit in ambabus partibus principij nuchæ, tunc paralysis erit in ambabus partibus, dextra & sinistra cū incolumitate partium faciei, licet cutis capitis sit stupida cum recipiat sensum à neruis orientibus à ceruice. Similiter si fuerit oppilatio in cerebro anteriori & medio sū partem dextrā aut sinistram, erit paralysis in parte dextra aut sinistra faciei cum incolumitate residui corporis. Rarissime tamen cōtingit qd sit oppilatio in oibus originibus septem parū neruorū à cerebro orientium quin comitetur alia ægritudo, sicut epilepsia & similis. Si uero oppilatio est in nucha non in origine sua, sicut in dislocatione spondilis cum attritione nuchæ aut rupturā, ita ut dislocatio sit quasi angularis, non secundum figuram femicirculi sicut in gibbis, tunc fiet ablatio sensus & motus & paralysis fortissima in omnibus membris infra dislocationem. Et si erit una ex spondilibus colli satis cito morietur prohibita pectoris dilatatione. Et si est ex spondilibus infra pectus aderit impotentia retinendi urinam & feces, & ipsas expellendi. Si uero oppilatio sit in neruo pariculari impeditur sensus & motus illius membri cui deferuit. Et similiter si fuerit à materia deferente spiritu uitalem.

Causæ uero remotiores primitiue sunt sicut percussio, casus, & offensio super capite, unde craneū super cerebrū comprimitur, nec non spondiles dislocantur, & nerui scinduntur aut rumpuntur. Similiter arteriæ deferentes spiritum uitale, cuius absentia non solū est causa paralysis, imò etiam mortis membri. Similiter frigiditas extrema aeris obuians capiti congelans spiritum, aut oppilans oppilatione attenuatoria. Similiter humiditas multa remolliens, faciens cadere unum parietem super alterum. Similiter crapula, ebrietas replens caput, & cerebrum debilitans, uinum, n. potes multum transiens indigestū ad neruos acetosatur in eis, acetū quoq; acuitate nocet, potus aquæ congelatæ, somnus super repletionē, retentio euacuationum consuetarum, multus coitus, nimia quies, motus laboriosus, sicut extensio, contractio & similia accidentia animæ molesta sicut timor & tristitia.

Causæ uero corporeæ antecedentes & etiam coniunctæ sunt humores superflui phlegmatici, sanguinei, licet phlegmatici ut plurimū sint in causa. Signa uero prognostica sunt ista. Primum dispositio corporum frigidorum & humidorum, nec nō calidorum & humidorum, cum plurimū repleta sunt, & proprie in etate decrepita, & maxime in hyeme, aut in uere multum humido. Secundum prognosticum. Urina infantis uiridis prognosticatur paralyim, aut spasmus. Arguit. n. frigiditatem & phlegmatis abundantiam, uerisimiliter læsuri neruos infantū debiles. Tertium. Stupor & tremor perseuerans prognosticatur spasmus uel paralyim secundum plurimum secundum differentiam materiæ crassæ, magis factiue spasmū, aut subtilis magis factiue paralyim. Quartum. Laxitas membrorum, diminutio in sensu & motu, sunt uia in paralyim. Signa demonstratiua sunt signa Rasis posita in textu, & superius expostita, scilicet nocumētum diminutionis aut ablationis sensus & motus solius. Pulsus paruus, tardus & rarus, sed uirtute debilitata sit frequens. Et eueniunt ei uicissitudines sine ordine, id est, quod aliquando frequens est magis, aliquando minus secundum uariū uirtutis conatum. Et urina secundum plurimum fit in eis alba, materia repente ad locum paralyticum. Et quandoque fit ualde rubra propter renū debilitatem in discernendo sanguinem ab aquositate, aut propter paucitatem eius, aut debilitatem uenarum quæ sunt post hepar ab attractione sanguinis, aut propter dolorem, aut aliam ægritudinem, quapropter non oportet ut ex rubedine urinæ arguatur dominiū sanguinis, & phlebotomiam esse faciendam. Signa autem causarum sunt, quia si est à casu, percussione, contractione, ipsa eam

significant, & nocumētum ex ipsa derelictum. Quandoq; tamen occultatur cum neruus est profundus. Ipsam ergo significat quod subito accidit, & non confert ei curatio. Signa uero distinctiua causarum extrinsecarum habentur ex narratione infirmi uel astantium. Si uero causæ fuerint intrinsecæ, tunc si fuerit mala complexio, signa habentur ex tactu, quia representatur tactui caliditas, frigiditas, mollietas uel asperitas, quod etiam æger percipit. Cognoscitur etiam ex iunantibus & nocētibz, & quod facilis est curatio, & ex præcessionē causarum imprimētium illam malam complexionem. Ad hoc etiam adiuuat complexio mēbri ægri, complexio totius, habitudo, regio, ætas, tempus, regimen præcedens. Signa uero humorum peccantium sunt hæc eadem & quæ superius dicta sunt in capitulo de foda. Si uero fuerit ab apostemate adsunt signa apostematū calidorum aut frigidorū aut mixtorū. Paralysis uero cretica succedens alijs ægritudinibus cognoscitur per præcessionem illarum, & qd diminuuntur aut auferuntur facta huiusmodi permutatione.

Prognostica. Primum paralysis ex frigiditate & humiditate sine materia, est ex his, quibus facile est succurrere cum calefactione. Secundum. Quodcumq; membrorum molliciatorum sū colorem reliqui corporis existens, aut sibi naturalis non minoratur nec extenuatur, est, de quo maior fiducia est habenda, sed in contrario contrarium iudica. Tertium. Paralysis subito eueniens à dislocatione spondilium, & proprie ad interiora, aut à solutione continui secundum latum non recipit curam, quæ uero fit à solutione secundum lōgum, aut ab ictu non contentente neruos uehementer quandoque sanatur. Quartum. Paralysis fortis est quasi curæ impossibilis, debilis uero non facile sanatur. Quintum. Tremor & dolor in paralyi superius, bonum. Sextum. Cum paralysis tran sit annum, secundum plurimum nō recipit curam. Septimum. Ex prohibitione spiritus eueniens est difficilioris curæ quā proueniens à mala dispositione spiritus, licet illa quæ fit à corruptione spiritus si multa sit uix recipiat curam. Et quæ fit ex prohibitione spiritus uitalis est deterior, cum aufert uitam simul cum motu, & à fortiori causa prouenit, quia uix sunt latiores scilicet arteriæ quā nerui. Octauum. Paralyticatur unum membrum magis qd aliud, quia magis debile, aut quia uias habet latiores, aut quia suppositum parti cerebri, aut nuchæ quæ magis patitur, est. Nonum. Latus paralyticum si est frigidissimum, & sanum calidissimum, malum, significat enim conuersionem omnium spirituum ad latus sanum, & ipsorum paucificationem in latere ægro. Vnde partes aqueæ & terreæ dominantes in mole deducunt se ad frigiditatem actuale, & ex hac causa macrescit latus paralyticum, & uariatur pulsus in eo à pulsu lateris sani, secundum frigiditatis dominium. Et oculus lateris paralytici minoratur ex eadem causa, scilicet debilitatis uirtutibus naturalibus. Ex his patet quare aliquando aufertur motus & non sensus, aliquando econtrario, nam spiritibus paucificatis citius aufertur motus quā sensus. Et si fiant per diuersos neruos fiat unum legdi sine altero. Et tertio hoc fiat secundum quod temperamentum pro uno magis corrumpitur quā pro alio, sicut la plius ad humidum magis imperficit motum, & econtrario la plius ad siccum magis impedit sensum. Cura.

Cuius curam incipiemus pilulas setid. quas composui, dando: quæ recipiunt pulueris picre drac. 1 o. colocynthidis interioris drac. 5. euphor. drach. 2. & semis, castorei, piperis, assæ fetidæ, sagapeni, opopan. scitaragi indi, smapis, omniū ana drac. 1. cetauræ mino. elaterij, ambarum ana drac. 5. gummi in succo ruta dissoluantur, et alia ex eis con ficiantur, & sunt pilule: & sunt ex eis decem potiones.

Diuiditur præsens pars in duas partes. In prima ponit curam paralysis phlegmaticæ. In secunda curam paralysis ex percussione & casu. secunda ibi. Quod si paralysis. Prima in quinq; Primo ponit curam per uentris solutionem. Secundo per dietā. Tertio per medicinas locales. Quarto per medicinam sumptā per os resoluentem. confectioem anacar dinam. Quinto ponit quid faciendum sit si hæc non sufficerent. secunda ibi. Quarum una postquam. tertia ibi. Membra quoq; eius. quarta ibi. Diebus uero quibus. quinta ibi. Quod si sumptū. De prima parte dicit, qd tu debeas incipere curam exhibendo

exhibendo pilulas foetidas, quas ipse composuit &c. &c. pul-
veris picrae, idest, amaræ, & est hiera simplex, de qua superius
dictum, cali. & sic. in secundo, solvens magis phlegma q̄ cho-
leram, & proprie à capite & satis leuiter. 3. 10. euphorbij, co-
locynthis, castorei, affræ, q̄ superius dicta & declarata sunt.

Sagapeni, cali. in secundo, sic. in tertio. Gumi satis notum,
& est in medicina cataraçæ. Opopanacis cali. & sic. in ter-
tio. Sceitaragi, idest, thapsiæ, & est herba similis nasturtio
cali. & sic. in fine secundi, omnium ana. 3. 1. Centauræ mi-
noris. Elaterij, & est succus cucumeris asinini, cali. & sic. in
tertio, & multum ualet in ascite sublimatum, & in pilulas re-
dactum cum correctiuis suis, est enim potentissimum ad edu-
cendam aquam. Gummi dissoluantur in succo rutæ quæ est
calida & sicca in secundo, proprius in ægritudinibus capitis
& neruorum, & subdit quod sunt decē potiones. Sed notate
q̄ unaquaq; potio erit. 3. drach. cum dimidia, & temporibus
nostris est nimis excessiua medicina, quā corpora nequeunt
tolerare. Sufficeret enim drach. 1. est enim euphorbium for-
tissima medicina, cuius dosis ē kirat. 1. usq; ad. 3. & kirat est.
4. gran. hordei. Et pro unaquaq; potione de hoc, sola ingre-
diuntur grana quindecim. Similiter de colocynthide cali. &
sic. in tertio ingrediuntur in unaquaq; potione gran. 30. cu-
ius tamen dosis est à kirat. 6. usq; ad decē. Assa nerō est cali.
in principio quarti, sicca in secundo. Et Galenus existimauit
ipsam aliquantulum solutiuam, sed certum est q̄ ipsa confert so-
lutioni antiquæ frigida. opopanax cali. & sic. in tertio &
solutiu phlegma. Similiter sagapeni soluit phlegma & aquo-
sitate. unde si fiat cōputatio sufficeret. 3. 1. huius potionis.

Quarum unam postquam æger sumpserit; per tres dies
quiescat. et nutriatur tunc cū aqua ciceris, et oleo, et sinapi.
& deinde bibat aliā potionem quod postquā ter fecerit; per
aliquot dies quiescat. et nutriatur carne frustatim incisa, et
in sartagine frixa, et mutagenath, in quibus sunt species ca-
lidæ; ut piper, et his similia. in potu nerō sumat hydromel.

Hic curat per dietam, dicens q̄ postquam æger sumpserit
unam istarum potionum quiescat per tres dies ab omni alia
medicina solente nisi forte acciperet aliquid clystere. Et
interim nutriatur aqua ciceris condita cum oleo. Est enim
mos regionis suæ omnia cibaria fere condire cum oleo. Et
parum sinapis posset admisceri loco aromatum ut cibus sit
calidior magis proprius cōtra phlegma. Et in fine trium die-
rum sumat aliam potionem ex supra scriptis. Et sic post tri-
dium fumat aliā & interim nutriatur, ut supra. Deinde post
quiescat à medicinis solutiuis per aliquot dies, ut uerbi gra-
tia, per hebdomadam. & interim nutriatur carne frustatim
incisa & in sartagine frixa, sed sit caro leuis ut auium, & mu-
tagenath qui sunt cibi ex carnibus minutissime incisis, & cū
speciebus conditis. Sed species in hoc casu sint piper, zing-
ib. nux muscata & similes, quia nutrimentum debet esse ca-
lidum & siccum actu & potentia. quapropter uitentur bro-
dialia & quæ declinant ad frigidum & humidum actu & po-
tentia, nisi aliqua de quibus infra. In potu uero sumat hydro-
mel. Cuius hæc est descriptio, ut octo partes aque admisceā-
tur uni mellis, & bulliant ad consumptionem tertiæ partis,
& colectur. Cuius laudes sunt eximie in omnibus ægritudi-
nibus frigidis capitis & neruorum.

Membra quoque eius ex oleo costino inungat. quod reci-
pit costi unciam unam, castorei unciam mediam, piperis,
euphorbij, pyrethri, omnium trium ana tertiam unciam unius.
dissoluantur omnia in mediam libram olei keiri, aut de nar-
cisco, & utere eo.

In hac tertia parte docet mēbra paralytica inūgi, sed mul-
to magis originēs neruorum, scilicet, posterius cerebrum, & totā
nucham cum oleo costino. Cuius hæc est descriptio. Recipe
costi. 3. 1. piperis, pyrethri, euphorbij, ana tertiam. 5. 1. casto-
rei. 3. 1. & dissoluantur omnia in media lib. olei de Keiri aut
narcisco. Keiri secundū quosdam est uiola omnis mensis, &
apud Auic. nō est capitulū de ipsa, sed apud Serapionem est.
& Dioscorides uocat eam leucoion calidam & siccam in se-
cundo, & est resolutiua tumorū, prouocat menstrua, sanat ra-
gadias, & ualet podagricis &c. apud Simonem est planta cu-
ius sunt tres spēs, una habet flores albos, altera purpureos, al-

tera citrinos q̄ est similiter cali. & sic. Narciscus s̄m Dioσκο-
ridē est bulb⁹ hemicus, siue ut latini bulbū domesticū, mul-
tillū dixerūt, folia s̄m porro habet, sed minora, hastā duarū
palmarū, sine folijs, flos est illi albus in gyro, & in medio cro-
ceus aut purpureus, radicē habet rotundam calid. siccā in se-
cundo, proprius in passionibus neruorū. Reliqua nota sunt.

Diebus nerō, quibus quiescit, danda sunt quaq; die drac.
2. de anacardino: quod recipit zingib. pyrethri, nigellæ, co-
sti, melanopiperis, macropiperis. i. oggi, omnium ana 1 drac.
10. myrrhæ, rutæ siccæ, assæ fetidæ, aristolochiæ, baccarū
lauri, castorei, sceitaragi indi, sinapis, gentianæ, omnium ana
drac. 5. mellis anacardi, drac. 5. unguantur cum oleo nucum,
et cū melle cocto conficiantur; hoc. n. medicamen ualde con-
fert paralyti, apoplexiæ, torturæ, tremori, morphæ, mor-
sib. scorpionis, & omnibus passionibus frigidis, & spasmo
humido. q̄ cū sumitur ilico prouocat sudorem, et infert febrē.

S O L I A.

Oggi nonnulli legunt Oegi: quod est Acorus qui spasmo, paralyti, om-
niq; neruorum affectioni admodum confert. Drach. 2. textus Rasis anti-
quus connumerat drach. xx.

In hac quarta parte administrat quaq; die. 2. 3. anacardine
cōfectionis, quæ recipit zingib. pyrethri, costi, nigellæ, mela-
nopiperis. i. nigri piperis, macropiperis. i. longi piperis, quæ
omnia sunt superius declarata, oggi alias ozi. i. sem. petroseli-
ni, cali. & sic. in secundo, omnium ana. 3. 10. myrrhæ, rutæ sic-
cæ, assæ foetidæ quæ supra fuerunt declarata, aristolochiæ ca-
lidæ in tertio siccæ in secundo, castorei cali. & sic. in quarto,
sceitaragi. i. thapsiæ similis nasturtio, acutæ, aperitiuæ, calidæ
similiter in fine secundi, sinapis calidi in quarto, gentianæ ca-
lidæ in tertio, sic. in secundo, ana. 3. 5. mellis anacardi cali. &
sic. in quarto. Anacardus est fruct⁹ arboris qui pediculus ele-
phantis à quibusdam uocatur, unguatur cum oleo nucum, cal.
in tertio, sic. in secundo, & cū melle cocto conficiantur. Hoc
n. medicamen ualde confert paralyti, apoplexiæ, torturæ. f.
oris, tremori, albaras, & est species morphæ, morfib. scor-
pionis, & omnibus passionibus frigidis, & spasmo humido.
Quando aut sumitur, ilico prouocat sudorem, & ilico infer-
febrem. quapropter ualet ad resolutionem causæ coniunctæ
paralyti. Et debet sumi cum. 1. aut. 2. 3. hydromellis.

Quod, si sumptum non affert sanitatem; æger ab omni
medicamine per decem dies abstinere, excepta diæta: dein-
de ad ipsius curam redeundum.

Ponit in hac quinta parte quid faciendum est cum supra-
scripta non suffecerint ad curam. dicit esse abstinentium ab
omni medicamine per decem dies excepta diæta. deinde ad
ipsius curam redeundū. s. ordinate sicut dictū est. Ex quo collige
in omni ægritudine maxime in chronicis esse faciendū
interpollationem medicinarum, ne ægrum tedeat, & abomi-
nationem incurrat ex tam continuo usu medicinarum.

Quod, si paralyti ex percussione, aut casu euenerit, et ac-
cidit subito, [ita q̄ nerui æqualiter contundantur] taliter
permanebit; nunquam. n. sanabitur. quod, si non repente ex
prædictis; sed paulatim, et molliter inuaserit; loco percus-
sionis emplastrum hoc est apponendū, quod recipit farinam
senugrei, semen behen, semen mahaleb, semen reusini,
bdellium, ammoniacum, adipem anatis, ceram, oleum de li-
lio. ex his fiat emplastrum, & superponatur.

S C H O L I O N.

Ita quod nerui æqualiter contundantur] ualde miror sententiam hanc
in omnibus Rasis codicibus desiderari, neque eiusdem Arculanum ipsam
ullam fecisse mentionem. sunt & in primo cap. duæ, quas parenthesis cir-
cumscribit adiecit.

Hic docet curare paralytim ex percussione, dicens, q̄ si su-
bito accideret, taliter permanebit, & nunq̄ sanabitur. qua-
propter uanum est laborare in eius curatione. Licet in etate
infantili cura sit possibilis, cum membra spermatica possint
in ea etate, secundum quod erant primo, restaurari. Quod si
non repente, sed paulatim inuaserit cura est possibilis, cum
tunc proueniat ex decursu humorū ad locum, qui deinceps
possit resolui. Applicat ergo loco percussionis emplastrum
quod

quod etiam origini nervorum est applicandum, cuius est hæc descriptio. R. farinam fœnugræci, calid. & sic. in primo, exempli gratia. 3. 2. se. behen calid. in primo, sic. in secundo, se. mahaleb, idest, medulla cerasi sylvestris cali. & sic. in primo, se. reusini, idest, pentadactili, quæ est cataputia maior, siue spongia folis calid. & sic. in tertio, licet alia species minor sit calida & sicca in quarto, an. 3. 2. bdellij cali. in primo & sic. in primo ammoniaci calidi in fine tertij, & sic. in primo, ana drach. s. adipis anatis, olei de lilio, ana quantum sufficit ad bene impinguandum, ceræ quantum sufficit ad debite inuiscandum, misce. Sed nota hæc medicinam debere administrari nullo re iam consolidato, aut cõfusione remota, paralyti remanente, licet etiam stante contusione conferat.

Cura paralytis. Ante omnia tria sunt consideranda, & at tendenda in cura paralytis, spasmus, stupor, tremor & salus. Primum, ut non propter rem in principio ad usum medicinarum fortium, digerentium, euacuantium, & diuertentium. Sed incipiamus à leuibus, gradatim ad fortiora procedendo. Quæ fortia non sunt applicanda in paralyti leui nisi post quartum. In media post septimum. In forti post. 14. Secundum, ut medicinz quæ applicantur sint propriæ in huiusmodi dispositionibus confortantes cerebrum & nervos per uirtutem primam, secundam, tertiam, & quartam. Et similiter iuxta posse sint cibaria. Tertium, ut medicinz locales applicentur origini nervorum scilicet nuchæ, & inde orientibus. Si uero fuerit in partibus faciei applicentur circa secundum, aut primum uentriculum. Et similiter applicentur membris paralyticis &c. Si ergo paralytis pendeat à causa primitiua, aut à frigore, & similibus præterquam à percussione; prima intentio sit remotio causæ primitiue, & nocuenti eius.

Secunda prohibitio humorum à lapsu. Tertia correctio accidentium. Quarta debitum regimen sex rerum non naturalium, quæ ordinate infra ponentur. Si uero paralytis sit phlegmatica sicut est ut plurimum, sex requiruntur intentiones. Prima digerit. Secunda euacuat. Tertia diuertit. Quarta causam coniunctam resoluit. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium.

Et ego docebo simul plures istarum intentionum perficere. Ponamus ergo quod hæc paralytis sit fortis, ut sit exemplum alijs. Prima die paralyti nihil medicinale faciendum est. Nisi forte clystere leue ex brodio pulli cum uncia una sacchari rubei, & pauco sale, si uenter strictus sit. Aut fiat suppositorium, & eadem die non comedat, neque bibat, nisi forte apud necessitatem fumeret aliquid hydromellis. Secunda die sumat pro digestiuo, & partim cedat loco cibi hydromel bis aut ter exhibitum in quantitate quatuor unciarum pro uice, & nihil aliud comedat, nisi forte si esset puer, aut assuetus multæ confectioni, posset dari aliquid modicum panatæ subtilis, in qua esset saluia, scilicet minutim incisa, & cocta, & hoc semel tantum in die naturali. Et nihil aliud fiat medicinale, nisi forte clystere, de quo supra, aut suppositorium.

In tertia die sumat pro digestiuo aquam saluæ cum melle ros. aut cum æquali quantitate hydromellis. Aut hydromel in quo decocta sit saluia, stæcas arabicum, rosmarinus. Aut similes non multum calidæ, aut aperientes non multum. Et eadem die nihil aliud comedat, aut bibat nisi panatæ de qua supra, aut ouum unum cum saluia mixtum, semel, aut bis. Et post sex, aut octo, aut decem grana pini præparata, & fiat clystere, de quo supra. In quarta die similiter regatur, ut in tertia, sed in quinta, & septima sit idem regimen cibi & potus, de quo supra. In his diebus singula die fiat clystere, si opus sit, ex decoctione saluæ, hyssopi, stæcados arabici ana M. unum, agarici, unciam semis, salis gêmæ drachmas duas. decoquantur in quatuor lib. aquæ ad consumptionem medietatis, & ex una lib. huius decoctionis cum tribus uncis olei fiat clystere. Digestiuum uero sit hydromel, de quo supra, posset tamen addi aliquid oxymellis simplicis aut compositi: ubi uero esset assuetus multiplici confectioni, sicut pueri, interdum detur aliquid huius confectionis, cuius est hæc descriptio. R. sacchari. 3. 4. liquefiat cum aqua saluæ, infusionis cinnamomi, nucis muscatæ, & zingib. & fiat manus christi, uel detur parum huius electarij. R. saluæ recetis minutim incisa, & cum melle quantum sufficit, fiat electarium optime despumando mel. Octauo uero die sumat. 3. pilu-

larum de hiera simplici cum. 3. 1. agarici præparati in oxymelle scyllitico, ex quibus fiant pilulæ septem, & exhibeantur in mane, & tardet prandium per sex horas post. Et si uideretur debilis posset dari aliquid carnis, aut aues paruæ assatæ, aut aliquid simile in parua quantitate. Et semper in fine mensæ dentur grana pini præparata, aut confecta. Et hoc regimen uitæ continuetur usque ad quartumdecimum diem, dando in cibo ea, quæ dicta sunt, & in potu solum hydromel, & abstinere super famem & sitim est propria cura huius ægritudinis. Sed pro digestiuo in hoc tempore sumat hydromel, de quo supra, cui in decoctione potest addi aliquid modicum cinnamomi, zingiberis, aut nucis muscatæ, ut. Recipe saluæ, iuæ, stæcados arabici, ana manipulum unum, rutæ, maioranæ ana M. s. mellis, lib. s. aquæ, lib. 4. cinnamomi. 3. duos, zingib. nucis muscatæ, ana scrupulum unum, bulliant ad consumptionem tertiæ partis despumando, & colentur. Et posset etiam addi oxymellis compositi uncia una, & proprie si materia uideretur crassa, licet ut plurimum sit subtilis & in hoc tempore clystera fortificentur addendo suprascripto clysteri. 3. s. uel unam hieræ compositæ G. aut hieralogodion, aut similia, aut addendo suprascriptis herbis in decoctione centauream, aut colocynthidem & similia. Sed in quintodecimo die exhibeantur. 3. 2. aut. 3. 1. pilularum fœtidarum, quarum descriptionem ponit Rasis in textu seruata debita custodia. Et deinceps usque ad decimum & octauum uel uiginti diem continuetur idem regimen uitæ, aliquantulum tamen si oportuerit paulatim incrassando. Et pro digestiuo in his diebus detur oxymellis scyllitici, syrupi de stæcados, ana drach. 6. cum tribus. 5. digestiui suprascripti. Postea sumpro digestiuo in his diebus quater aut quinque detur drachma una, aut. 3. quatuor pilularum fœtidarum, de quibus in textu, seruata debita custodia. Et clystera in hoc tempore fortificentur multiplicando in hoc tempore centauream, colocynthidem, & addendo artanitam de quibus in apoplexia, aut multiplicando electaria solutiuæ, de quibus supra, deinde sequenti die detur. 3. duo theriacæ dilemperatæ cum uncia una hydromellis suprascripti, & 3. 1. uini potentis, et detur in mane, & dormiat post eam, & tardet cibum per septem horas, & sudet si possit. Et in hoc tempore conueniunt diuersiones fortiores sicut masticatoria, & caputpurgia, & sternutatoria, de quibus supra in alijs capitulis. Et ante ista fortiora conueniunt leuiora, sicut frictiones super parte sana: frictiones enim super parte ægra non fiunt, nisi cum opus est resolueri facta bina aut trina purgatione: post hoc conueniunt resolutiuæ applicanda parti læsæ, & origini nervorum incipiendo à leuioribus, sicut est oleum de costo descriptione Mesuæ, uulpinum, de ruta, de spica, & similia gradatim ascendendo ad oleum de costo positum in litera à Rasi, oleum de castoreo, de piperibus, de euphorbio, postea ad aquam uitæ factam ex optimo uino, est enim optima & ultima in resoluendo. Postea ad emplastra rubificantia, & desiccantia ex sinapi, & similibus circa nucham, & partem posteriorem cerebri: sed attendatur ne nimis profunde ulcerent, aut apostoment, & propterea locus sæpe uideatur. Et in hoc tempore competunt uentosæ super parte paralytica, aliâs, prætractæ, et proprie in capitibus lacertorum: & in hoc tempore conuenit confectio anacardina, sed incipiatur primo à. 3. 1. gradatim ascendendo usque ad duas. Et detur alternis diebus cū. 3. 1. aut. 2. hydromellis debite calefacti, & detur in mane stomacho ieiuno, dormiat post eam, & sudet. quod si non curatus fuerit, quiescat per decem dies debito regimine seruato, deinde iteretur medicinz fortes, scilicet digestiuæ, euacuatiuæ, resolutiuæ, rubificantia, & confectio anacardina. Et si cū his non liberetur uadat ad balnea sulphurea, ænea, & aluminosa, uel lutosa, & ærea, siue fumosa, & sumat aquam super nucham, & partem posteriorem cerebri debito regimine in balneis seruato. Si uero paralytis phlegmatica esset leuior, citius posset incrassare dixtam, citius deuenire ad digestiuæ fortia, resolutiuæ, rubificantia, & confectionem anacardinam. Procedente tempore, potest bibere parum uini boni cum hydromelle lymphati, & dixta magis incrassetur, quæ semper declinet ad calida, & sicca, & uidentur brodia nisi brodium cicerum, & galli antiquissimi, & brodium serpentis non uegenosi, & confert cerebrum leporum assatum, & her-

bx aliquæ in hac di positione, sicut quæ dictæ sunt, acorus, & propriè conditus cum melle, & diacorus. Et ex aromatibus cinnamomum, zingib. nux muscata, galanga, & piper, & ex fructibus grana pini &c.

Aer declinet ad calidum & siccum, cuius caliditas gradatim intendatur. Somnus sit communiter sex horarum, & nō dormiat super cibū. Omnes superfluitates follicite per conueniētes regiones purgentur. Exercitetur fortibus frictiōnibus, suppleant enim frictiōnes loco exercitij factæ primo super parte sana, deinde super ægra ad spirituum attractiōnem, & calidi uiuificationem. Ante illud tempus neque fricetur, neque exercitetur. Accidentia animæ calore exiccantia sicut ira conueniunt. Ordinetur diætā sicut dictū fuit subtilior in principio, quæ gradatim increassando procedat, & cum proprijs sicut hydromel, saluia, rosmarinus, acorus, menta, maiorana, ruta, iua, hyssopus, cappares, brodium cicerum, galli antiqui, ius serpentis nō uenenosi, aues parue, carnes leporis, & propriè cerebrum assatum, grana pini præparata &c. Vitetur uinum nisi paucum ægritudine iam declinante, & mediocriter uinosum. Vitetur acetum ex aqua frigida: sit famelicus, & sitibundus.

Sequitur de paralyfi sanguinea.

Si uero sit paralyfis sanguinea sē communem opinionē, tunc ab ipso initio fiat phlebotomia ex parte contraria loco paralytico, & sitis copiosa, præmissio clysteri si oportet, licet nunquam uiderim phleb. iuuare in paralyfi nisi fuerit à percussione, contusione, & similibus. Et detur aqua hordei, & aqua saccharata. Et obseruetur reliquum regimen suprascriptum in phlegmatica si phlegma fuerit sanguini permixtum sicut est ut plurimum. Sed localia sint parum calida. unde sufficeret oleum chamæmelinum, de spica, aut ruta, quibus etiā oleum ros. posset addi, imò calida augmentant ægritudinē. Et ita proportionale regimē seruetur in reliquis. Ex his potes concipere quid faciendum sit in reliquis speciebus paralyfis humoralis si contingit. Si uero pendeat à uulnere, contusione, aut laqueatione, dislocatione; primo huiusmodi curentur cura sibi propria. Deinde paralyfis, si non subito euenierit, quia subito eueniente liberatio est impossibilis secundum plurimū. Curetur ergo cum euacuantibus, & diuertentibus. Primo si humores sint in fluxu, & in hoc casu conuenit phlebot. postea super loco paralytico, & loco originis neruorum approximantur medicinæ mollificantes, resoluētes, poros dilatantes, ut spiritus penetrare possint, & cum hoc proprie in passionibus neruorum sicut est emplastrū descriptū à Rasi. Et potes facere balneū, uel decoctionē ex uulpe cum quibusdā mollificantibus, & resoluētibus, sicut fœnugræco, althæa, iua, saluia, stœcade arabico, hypericone. Et permittatur uulpes excoriata primo, & fracta sē ossa sua bullire usq; ad carniū separationē. In qua decoctione æger ipse, & membrum paralyticum balneet fricando, stœcædo, reflectēdo, & postea ungatur cum oleo uulpino, aut ex unguēto Rasis, & loca bene calida cū pelle uulpis teneantur. Syrupus proprius in paralyfi phlegmatica. Recipe saluia, rosmarini, stœcados, ana. M. i. radicis acori. ʒ. i. gariophilatæ, melissæ, herbæ paralyfis, rutæ, satyreæ, hyssopi, betonicæ, baccarum lauri, ana. M. semis, bulliant cum. s. lib. mellis in. 4. lib. aquæ usq; ad consumptionē medietatis, & aromatizetur cum cinnamomo, nucē muscata, zingib. pipere, pyrethro, hoc. n. conuenit factis huiusmodi purgationibus. Sed magis in processu addatur oxymel scylliticum. Syrupus de stœcade descriptione Mesue. Vna. 3. stœcados arabici in pilulas redacta cū oxymelle scyllitico pluribus diebus successiue exhibita liberat à paralyfi. Vna. 3. pilularum de hiera simplici cum. i. 3. piperis, cum oxymelle scyllitico in pilulas redacta pluribus diebus exhibita potenter liberat. Ex euacuantibus proprie sunt pilulæ de euphorbio, de opoponaco, de sagapeno, de sar cocolla, de hiera magna, sed uomitiua cōueniunt ubi stomachus suggeret materiam, cum hoc etiam quod calefaciūt cerebrum. Vnus. ʒ. assæ fetidæ sumptus in pilulis pluribus diebus est efficax medicina: oleum balsaminū, de lateribus fortia sunt in hac dispositione. Vnguentum efficax. Recipe car pobalsami, euphorbij, an. 3. i. bdellij, sagapeni, ana. 3. 2. salis nitri, castorei, ana. ʒ. 2. pulueris anacardi, sinapis, aristolochiæ rotundæ, spicæ, costi, seminis agni casti, staphisagriæ, py.

rethri, aphodylorum, radicis ireos, an. 3. i. cucumeris asini, uini. 3. 2. balsami drac. semis, mellis anacardi. 3. 1. terebinthinæ. 3. 6. olei de costo, & de ireos, an. ʒ. i. olei de spica. ʒ. 2. anethini. ʒ. i. semis, pinguedinis ursi, cassi, uulpis, uulturis, ana. ʒ. semis. dissoluantur gummi in aceto scyllitico, deinde cū cera citrina fiat unguentum molle. Fiant etiam unguenta alia decoquendo anserem, in cuius uentre sit aliquod cati, aut uulpis. Et alia ad hoc propositum, quæ omitto credens hæc sufficere. Et hæc de paralyfi dicta sufficiant.

De stupore. Cap. 10.

Hoc est decimum capitulum, in quo agit Rasi de stupore, & tremore. Et primo præmittenda sunt quid nominis, & quid rei stuporis. Stupor enim deriuatur à stupeo, quod quandoq; admirationem importat, quandoque stuporem mentis, id est diminutionem, aut ablationem uirtutum interiorum cerebri, quādoq; significat cuiuscunq; operationis diminutionem. Sed apud Auicennam hæc dictio stupor aliqui apud quosdā est synonyma paralyfi, quorū modorum nullus est ad propositum. Hic uero sumitur stupor pro ægritudine neruorum, quæ sic diffinitur ab Auic. Stupor est morbus officialis, id est membri organici, faciēs euenire nocumētum in sensu tactus. Cedit frictiōnem, aut diminutionē, non aut corruptionem ad differētiā doloris, aut cuiuscunq; alterius tactus corrupti, sicut etiam sentire delicosum pro doloroso, aut e contrario, aut calidum pro frigido.

Quam aliquis sentit aliquod suorum membrorum, sicut est dispositio pedis, cum sit stupidus; dicimus in illo membro stuporem esse, quapropter eius cura non est differenda; quando enim prolongatur tempus huius ægritudinis; perducit ad paralyfim.

Diuiditur præfens capitulum in duas partes. Primo agit Rasi de stupore. Secundo de tremore. secunda ibi. Tremor aut. Prima in duas. Primo notificat tremorē. Secunda ostendit necessitatem festinantis curæ. secunda ibi. Quapropter. De prima parte dicit. Cū aliquis sentit aliquod suorum membrorum, aut etiam totum corpus, sicut est pes quādo est dormiens, siue obdormitatus, tunc illud membrum patitur stuporem, id est, diminutionem, aut ablationem tactus. De secunda parte dicit curā non esse differendam cum transeat in paralyfim ipsi nō differētibz nisi secūdm magis & minus.

Species stuporis sumuntur sicut species paralyfis. Prima distinctio. Est enim quædam uniuersalis, quædam particularis, ut in altera medietate corporis dextræ, aut sinistræ, aut in aliquo, uel pluribus membris particularibus. Secunda distinctio. Aliquis stupor sit incipiendo, aliquis permutādo ex apoplexia, epilepsia, dolore capitis, pleuresi, & colica, & sic de alijs dispositionibus, quibus quandoque succedit stupor. Tertia distinctio. Aliquis stupor est materialis, aliquis immaterialis: aliquis intensus, aliquis remissus, intensus auferens totaliter tactum, remissus ipsum diminuens. Aliquis est chronicus, aliquis interpolatus, aliquis continuus &c.

Causæ stuporis sumuntur à quatuor, aut enim à principijs, scilicet ab anima, & duobus membris principalibus, corde scilicet & cerebro, aut à deferentibus, scilicet nucha, neruis, & arterijs, aut à spiritu, aut à membro stupido. Siquidem à principijs, ut ab anima erit, quia ipsa cōuersa ad aliquod speculandum non sentit obiecta extrinseca. Vnde. 2. de Anima. Attenti fortibus imaginationibus delata sub oculis nō uidemus. Aut ex parte cordis, nam cum ipsum est de proximo incursum syncopim fit homo uniuersaliter stupidus, spiritibus ad cor retractis. Consimiliter propter oppilationem cordis, aut aliam ægritudinem spiritibus uitalibus non potentibus exire ad membra fit homo stupidus, nam hoc modo accidit apoplexia ut supra. Aliquando est propter defectum in cerebro, ut in dolore uehementi, propter quem omnes spiritus animales conuertuntur ad ipsum. Aliquando, propter oppilationem in cerebro coarctatoriam ex humoribus collectis in uentriculis, aut in origine nuchæ, & neruorum, aut attenuatoria ex similibus humoribus, cū apostemate, aut sine apostemate. Aliquādo est in deferentibus sicut in nucha, aut neruis aut arterijs cum scinduntur, stringuntur, aut aliter oppilantur, sicut nucha oppilat, aut scindit propter dislocationem spondilis, ut supra in paralyfi. & similiter est in arterijs.

arteriis. Aliquando prouenit stupor ex defectu spiritus, aut quia paucus, aut frigidus crassius, aut affectus alia qualitate manifesta uel occulta, quapropter non est conueniens instrumentum animæ ad sensum tactus. Aliquando est ex parte membri, cum nimis calefactum sit, infrigidatum, humectatum, aut exiccatum, licet mala complexio frigida & humida aliquando sit in causa, ut plurimum. Aliquando est ex parte qualitatum secundarum, ut quia nimis crassa substantia, & propterea cutis pedis potest quodammodo propter suam crassitatem reputari stupida respectu cutis manus, & simile huic potest præternaturale accidere alicui membro. Et propterea medium inter platum pedum & calcaneum est magis sensitiuum, & magis titillatione incurrit. 35. pblematū, pblemate secudo.

Causæ autem remotiores quædam sunt primitiue sicut percussio, casus, dislocatio, constrictio, uiolenta extensio, & similes, in capite, neruis, aut arteriis, & sicut morsus scorpionis aquatici, aut tactus piscis nominatus barile, uel miracha, nec non medicinz sumptus interius, aut exterius applicitz, nec non quidam serpentes calidi corrumpentes complexionem spiritus, & membri: ac etiam frigidus, nimia crepula, uina potentia, sunt causæ longinquæ stuporis, nimius somnus, superflua uigilia, retentio superfluatorum consuetorum expelli, nimia quies, accidentia animæ excedentia, præcipue nimius timor qui primo facit tremorem, & tandem autem aufert sensum tactus.

Causæ autem corporeæ antecedentes sunt humores mali, aut malæ complexiones totius, aut membrorum communicauium neruis, sicut in febribus fortibus accidit stupor diffractato spiritui, & neruorum complexione. Et eadem, uel similes possunt esse causæ coniunctæ. Humores autem facientes stuporem sunt phlegma secundum plurimum. Aliquando sanguis sicut etiam in paralyti.

Signa stuporis sunt diminutio, aut ablatio sensus tactus, aut totius, aut partis cuius plurimum aliquid nocuentum, in motu coniungitur. Signa causarum primitiuarum sunt ipsæmet causæ, & documenta ex ipsis derelicta. Signa causarum corporearum, scilicet malæ complexionis, & humoris facientis stuporem sunt dicta superius in paralyti, & in plerisque aliis capitulis. Signa stuporis facti permutando sunt præcessio aliarum ægritudinum, & ipsius successio, quo succedente præcedentes ægritudines minuantur, aut auferuntur, materia ad neruos, uel ad origines neruorum permutata, licet sit possibile succedere stuporem præcedente ægritudine non diminuta, imò potius aucta.

Prognostica. Stupor perseverans pronunciat aliquam ægritudinem cerebri, aut neruorum. Causa enim diminuta faciens stuporem si augeatur, aliquam maiorem faciet ægritudinem cerebri, aut neruorum. Secundum, omnis stupor membri particularis cum perseverat transit in paralytim, cum paralytis & stupor non differant nisi in magis, aut minus. Tertium, stupor facit nunciat torturam oris. Quartum, stupor fortis cum uertigine perseverans nunciat apoplexiam. Quintum, stupor uniuersalis perseverans, mortem prænnunciat. Ex iam dictis inferri potest pedes aptiores esse stupori, primo breuiarii capite proprio, & secundo prognost. cum sint distantiores à fronte caloris, & ab influxu sensus & motus, & magis deputati ad motum quam ad sensum, & materiæ frigida pluries præcipitantur ad pedes. In manibus uero sunt omnia ista opposita. Patet secundo quare pes factus stupidus ex compressione, aut ligatura, apparet ualde magnus, & grauis præter solitum, non enim est ob aliud, nisi quia uirtus motiua facta debilis ex prohibitione spirituum facit arbitrari pedem maiorem, & grauiorem, sicut debili homini apparet paruum pondus esse magnum & graue. Et tertio patet, quare in membro dormitante fit quædam sensatio sicut fornicarum per illud membrum discurrentium. Hoc enim non est aliud nisi crassi uapores, & partes sanguinis & spirituum per meatus illius membri adhuc strictos discurrentium, quod non apparet dum membrum est sanum, illis discurrentibus per meatus membri latiores quam sint post constrictiorem, aut compressionem. Alia causa est, quia uirtus tactiua in sano non immutatur ex horum discursum per membrum propter similitudinem membri cum eisdem, sed membro infrigidato per complexionem ob absentiam

tiam spirituum postea ab ipsis spiritibus sanguine & uaporibus euenientibus immutatur propter dissimilitudinem. Nec causa huius est, ut nonnulli arbitrantur, quod uirtus tactiua debilis percipiat obiecta, quæ fortis non percipit. Credendum est enim quod uirtus tactiua fortis si æqualiter ab obiectis immutetur, sicut tactiua debilis, melius sentiat ea, sicut & cæteræ potestates sensitiuæ. Aliter tactiua temperati fortissima non melius sentiret obiecta etiam minima quam tactiua distemperati.

Curatur autem hæc passio ex aliqua parte medicinarum paralytis, & cum diætâ, & unctione ex oleo costino, quod si inueterauerit passio, æger ex pilulis fetidis purgandus est, & complexio æquanda ex anacardino, & diætâ.

Hic Rasis ponens curam dicit, quod stupor curatur ex aliqua parte medicinarum paralytis, & cum diætâ, & cum unctione ex oleo costino, & hoc intelligitur cum fuerit recens & debilis, & immaterialis, aut pendens à pauca materia, & frigida, ad cuius complexionis immutationem, & pauca materiæ resolutionem sufficiet diætâ, & unctio, absque purgatione, & medicinis fortibus &c. Quod si inueterauerit, & supple, fuerit fortis, auferent sensum, cum cuius oblatione etiam motus secundum plurimum diminuitur, tunc æger erit purgandus cum pilulis fetidis, scilicet supra scriptis in paralyti, & complexio erit æquanda, id est, ad medium reducenda proportionatum membro cum anacardino, & diætâ superius positis in paralyti, cum plurimum stupor, & paralytis pendeant à causa frigida, & materiali. Curatur enim cum fortis est ferè eisdem medicinis, quibus curatur paralytis, sed aliquantulum leuioribus, cum etiam fortis stupor sit leuior quam paralytis.

Cura uero stuporis ordinanda est omnino, sicut cura paralytis à causa proportionali procedens. Et omnes intentiones supra positz in cura paralytis, & omnes medicinz, atque omnia instrumenta illas perficientia ad hunc locum adducantur. Verum non oportet, ut sint ita fortes, nec dicta ita tenuis sicut in paralyti, cum stupor sit minor morbus quam paralytis. Auicenna tamen præcipit in stupore à sanguine pendente phlebotomiam copiosam cum diætâ tenui, quæ omnia in paralyti sanguinea etiam sunt attendenda.

Quid nominis tremoris satis manifestum est. Describitur autem ab Auicenna secunda tertii, capite proprio, & est morbus officialis eueniens propter defectum uirtutis motiue à motu lacertorum secundum continuitatem comparis grauitati corporis intromittenti sua motione motionem uoluntariam, quare commiscetur motus uoluntarij cum motibus non uoluntariis. Subdit postea ad declarationem descriptionis, quod tremor est nocuentum in uirtute motiua, sicut stupor est læsio in sensibili. Dicitur primo morbus, quia per se, & immediate est læsius operationis duplicis uirtutis motiue, quarum una est mouere quando oportet, & qualiter oportet, & ad omnem differentiam positionis secundum humanam necessitatem: alia autem operatio est stabilire membrum & figere: quapropter tremor est morbus in situ, siue capiatur situs pro loco siue pro societate. Officialis, si sit casus nominatiui, id est, compositionis, siue morbus in compositione: si uero sit casus genitiui, id est, membri organici, siue instrumentalis, nam quamuis tremor sit etiam neruorum, est tamen principaliter organicorum quibus motus principaliter attribuitur. Eueniens propter defectum uirtutis motiue, qui defectus est diminutio non corruptio, cum tremor eueniat hominibus naturaliter dispositis ex decursu ætatiuo, nec ablatiuo, à motu lacertorum, expressit principale instrumentum corporeum motus uoluntarij, secundum continuitatem, quia in tremore fit motus intereptus. Comparis, id est, æqualis, grauitati corporis, scilicet membri intromittenti sua motionem motionem uoluntariam factam à uirtute. Quare commiscetur motus uoluntarij cum motibus non uoluntariis, medianzibus tamen quietibus inter utroque. Sed contra, tremor in decrepitis ex decursu ætatiuo non est morbus, igitur diffinitio insufficiens. Dicitur concedendo antecedens, & qd Auicenna non diffinit hic nisi tremorem præter naturam. Secundo Io. Arculani. D arguitur,

arguitur, tremor nunquam est, igitur antecedens patet, quia quando est motus sursum non est, nec quando est motus deorsum, nec est quando est quies. Ad hoc negatur antecedens, & dicitur q̄ tremor est in quocunq; motu, & quiete, ex quibus componitur, sicut & tēpus est quando aliquid ipsius est, licet non totum simul. Tercio, tremor non lædit operationem uirtutis motiuz nec aliam, ergo non est morbus. Antecedens probatur, quia tremor est actio læsa uirtutis motiuz, sed ipsa actio læsa nō lædit seipsam, quare &c. Dicitur q̄ tremor est compositum ex duplici motione, scilicet, facta à uirtute, & gravitate: nunc autem licet facta à uirtute non lædat seipsam, læditur tamen ab illa, quæ facta est à gravitate. Quarto, si membrum positum in igne fugiens contrariū concutitur, tunc iste est tremor, & tamen non fit à gravitate aliquo modo, ergo, &c. Dicitur q̄ iste non est tremor, cum non sit aliqua eius pars uoluntaria, sicut etiam rigor in febribus non est tremor, cum nulla pars eius sit uoluntaria: est tamen motus præter naturam si fiat à causa ægræ: si uero non, nō est præter naturam.

Quinto, non semper tremor fit ex defectu uirtutis motiuz à motu lacertorum, cum aliquis sit tremor in quo uirtus motiua intendit figere lacertos, & non mouere. Dicitur em Gal. in lib. de tremore, & rigore, q̄ quantūcunq; uirtus intendit stabilire membrum, & lacertos eius, tamē ibi est aliquis motus, sicut in aue uolante alis extensis, quæ tamen non cōcutit alas, est ibi aliquis motus, licet non multū manifestus. Et ita est in membro quod uirtus intendit quietare. Ego credo tamen, quicquid dicat Galenus, in aue iam dicta esse aliquem motum alarum, quia aliter caderet: non tamen sic est necessariū in brachio hominis, q̄ uirtus teneat extensum, cum illud inhæreat alicui fixo. Credo ergo descriptionem potius esse supplendam à motu lacertorum uel fixatione. Sexto, tremor debilitat uirtutem, ergo non, causatur ex debilitate uirtutis, tenet consequentia, cum idem non sit causa & causatum. Dicitur, q̄ idem est causa & causatum, sed diuersis modis, tremor quidem debilitat uirtutem fatigando, eā, uirtus uero debilis ipsum producendo: sunt tamen ambæ de genere efficientium. Septimo, tremor est totaliter à natura, nam motio sursum est à natura, quia à uirtute membri est, motio deorsum est à natura, siue naturalis, quia est à gravitate, quæ est naturalis ipsi membro. Dicitur, quod est à natura non tamen naturalis, cum uirtus præternaturaliter disposita ipsum efficiat, unde est præternaturalis, licet sit aliquo modo naturalis distinguendo naturale contra uolentum. Octauo, nunquam uirtus est compar gravitati, igitur, &c. Assumptum patet, quia in motione sursum uirtus superat gravitatem, in motione deorsum superatur. Dicitur, q̄ est compar ad hunc intellectum, q̄ ferè toties natura superat gravitatem, quoties ab ea superatur, tamen tenendum est uirtutem esse aliquando parem ipsi gravitati, quia uirtus superans gravitatem successiue remittitur, donec à gravitate superetur: ergo cum non sit transitus ab extremo ad extremum sine medio, erit aliquando uirtus compar grauicati, & hoc erit in primo esse quietis. Et sequitur consequenter, quod inter hos motus contrarios mediabit quies instantanea. Tenendo sicut ueritas est, quod omnis proportio maioris inæqualitatis sufficiat ad motum deducendo etiam resistentiam extrinsecam, scilicet medii. Nono, si augetur resistentia, aut minuitur potentia, non fit motus contrarius, sed tardatur: ergo motus sursum debilitata uirtute debet tardari, & non fieri motus deorsum. Dicitur, quod si augetur resistentia, aut tantum minuitur potentia, quod resistentia se habeat ad potentiam in proportionem maioris inæqualitatis, quod tunc fit motus contrarius. Si uero resistentia ad potentiam sit semper proportio minoris inæqualitatis, esto quod resistentia augetur, aut potentia minuatur, motus tardabitur, & non fiet motus contrarius. Ex quo sequitur motum sursum factum à uirtute continue remitti usque ad non gradum: motum autem deorsum factum à gravitate continue intendi, cum motus deorsum factus à gravitate sit uelocior in fine quàm in principio. Ex quo sequitur ista conclusio, q̄ motus per totam horam intenditur, & in fine horæ erit sub non gradu: quæ conclusio licet sit possibilis, tamen in hoc casu est neganda, cum uirtus antea sufficiat tardare motum deorsum: quàm ipsum totaliter impedire, imò ueri similis est hunc motum remitti paulatim ad non gradum, licet forte à principio usque ad aliquod tempus intendatur. Decimo, uelocius mouetur membrum sursum quàm uirtus exigat, & similiter deorsum, quàm exigat grauitas membri, ergo præter has sunt aliæ causæ horum motuum assignandæ. Dicitur negando assumptum, mouetur enim membrum ita uelociter sursum, sicut uirtus motiua cum illo conatu mouet ipsum: mouetur tamen uelocius saltem in principio, quàm appetitus cognoscitiuus intendat ipsum mouere. Ex quo sequitur, quod motiua & proprie debilis non est appetitui cognoscitiuo omnino subordinanda, membrum tamen deorsum ita uelociter mouetur, sicut grauitas cum his circumstantiis mouet ipsum. Tamen credo ad omnem operationem uirtutis motiuz debilis, siue intendat stabilire membrum tremens, siue ad quamcunq; differentiam mouere, præter membri grauitatem concurrentem solum ad motum deorsum ipsam uirtutem motiuam debilem cum conatu concurrere. In tremore nanque ad oppositas differentias etiam hæc experientia satis facile probari potest. Ex his patet differentia inter stuporem & tremorem, cum stupor sit passio sensitiua, tremor autem motiua. Secundo patet differentia inter tremorem & iestigationem, cum tremor sit partim uoluntarius, iestigatio autem omnino inuoluntaria. Et tremor est alicuius membri organici. Iestigatio musculorum, quæ sunt partes ipsorum organicorum. Tercio patet differentia inter tremorem & pulsus cordis & artierarum, quia pulsus cordis & artierarum est mere naturalis, tremor autem mixtus. Et quia inter contrarios motus pulsus, percipitur quies media. Sed inter contrarios motus tremoris non percipitur quies media, non quia instantanea, sed quia breuissima. Quarto patet differentia inter tremorem & rigorem, quia rigor est mere naturalis, & in ipso totum corpus concutitur, licet tamen causa faciens concussionem non sit in toto. Tremor autem est motus mixtus, & non est in toto necessarius, sed aliquando solum in uno particulari membro.

Prima distinctio. Species tremoris sunt sicut stuporis, aut enim est in toto, aut in parte sicut in capite, aut alio membro particulari. Secunda, aut est chronicus, aut nouus, aut materialis, aut immaterialis, &c. Accidit autem ut caput moueatur ante & retro, propter nocumentum in musculis anterioribus & posterioribus, sicut aliquando tremat à latera propter nocumentum musculorum lateralium. Et quandoque fit tremor in utrisque manibus & non in pedibus, ut quia causa non est in origine nuchæ, sed in ramis neruorum pene trantibus ad manus: aut si causa fuerit in origine nuchæ expellit eam natura ad loca propinquiora propter minus malum: aut quando spiritus motiuis in inferioribus corporis est fortior, & magis uincens em necessitatem illorum membrorum, quia sunt ad motum magis deputata q̄ manus, quare non patiuntur à causis, quæ non sunt ualde fortes, propterea frequentius accidit tremor in manibus q̄ in pedibus, & cum liberatur paralyticus, citius redit motus in manibus q̄ in pedibus, &c. Causæ summuntur aut à uirtute, id est, à spiritu, aut à membro, si à spiritu, aut quia paucus in toto propter nimias uigilias, aut exercitia fortia, aut famem, coitum, aut balnea, aut alia euacuantia sensibilibus, aut insensibilibus, aut quia est paucus in membro propter retractionem ipsius ad principale, sicut in timore propter aspectum ex alto, aut propter ambulare super pontem, de cuius præcipitio timetur, aut propter orare coram principibus, aut propter disputare, aut propter uelle inire pugnam, & quomodolibet aliter, aut quia spiritus motu inordinato mouentur sicut in angustia, tribulatione, gaudio, desiderio, passione dicta ilen, in qua spiritus simul ad oppositas differentias mouentur. Aliquando est defectus ex parte qualitatis spiritus, quia crassus, frigidus, aut putridus, aut alia qualitate occulta uel manifestata affectus. Quandoque est ex parte membri male cōplexionati. Est enim complexio potissimum & immediatum instrumentum animæ ad suas operationes perficiendas. Hoc autem erit si membrum sit nimis humectatum propter crapulas & mollificationem, aut uidelicet multitudinē uini, aut propter potum aquæ plurimè non in sua hora, sicut post coitum, balneum exercitium, & ieiuniū, aut est mala cōplexio sicca

sicca faciens membrum non bene obediens flexioni, aut erit oppilatio in membro ex causis repletionis multiplican-
tibus humores crassos aut viscosos, aut aliis causis oppilan-
tibus coarctatorie, aut attenuatorie, aut carnosae, unde non
penetrabit spiritus sufficiens ad debitum motum, quo prohibi-
to fieret paralysis & diminutio sensus, tremor, aut solutio co-
tinui membra debilitans. & quandoq; membro & spiritui si-
mul accidit impedimentum, sicut ex morfu animalis uene-
nosi simul nocente spiritibus, & membro, aut forte duplex
nocumentum unicuique proprium simul coniungetur. Cau-
sa autem tremoris frequentior est frigiditas superflua, aut
humiditas remolliens, minor tamen humiditate paralyfim
faciente. Signa tremoris absolute sunt manifesta ex motu
ipsius membri tremantis. Signa causarum sunt ipsae causae.
Signa autem ipsarum propter defectum uirtutis & spirituum
sunt, quia patiens deficit ex quocunq; labore & motu, & si-
militer à quocunq; nutrimenti facile releuatur & non potest
pati famem diuturnam, quoniam syncopezaret. Signa uero su-
perfluae frigiditatis aut humiditatis, & ceterarum causarum
sunt ex saepe dictis manifesta.

Prognostica. Tremor magis peruersus est qui incipit à si-
nistro. Secundum, tremor in sensibus medicatione non est re-
mouibilis. Tertium, Tremor est uia in spasum aut paraly-
sim secundum materiam diuersitatem subtilis aut crassae. Quartum, Tre-
mor in labio inferiori significat uomitum. Quintum, Alienatio
superueniens tremori in causone, ut dicit Hipp. soluitur
sum propter calorem intensum praeter modum calefaciente
cerebrum & nervos, unde sequitur alienatio, & causa tremo-
ris resoluitur, sicut interdum e contrario soluitur permixtio
mentis & causon materia ad nervos permutata, propter cuius
permutationem sequitur tremor.

Tremor autem ex eisdem curatur, ex quibus sanatur stu-
por. sed, si ex superfluo uini potu euenerit; aeger ab ipso
erit abstinendus, similiter, si aquam, quae ex niue dissoluitur,
bibendo hanc incurrit passionem; ab ipsa abstineat, & bal-
neum calidissimum ingredietur, in quo tam diu moram fa-
ciat, donec sudet [à quo cum egressus fuerit] in sole assi-
due moretur.

SCHOLION.

A quo cum egressus fuerit cum uerba haec non negligenda sint; pla-
cuit uos esse animaduertendos: nam ipsius Rasis textus, ipsaq; explicatio
Arcul. aliter leguntur: inquit enim textus. Donec sudet, & assidue in so-
le moretur.

Hic ponit curam tremoris. Et habet tres partes. Primo
ponit curam tremoris absolute. Secundo, quando prouenit
ex potu uini. Tertio, quando prouenit ex potu aquae frigi-
dae, partes parent. De prima dicit, quod tremor curatur cum
illis, cum quibus sanatur stupor, de cuius cura sermo praecessit.
Stupor autem & tremor curantur cura paralysis, uerum
leuiore exigunt medicinas sicut sunt morbi leuiore paraly-
si. De secunda parte dicit, quod si tremor prouenit ex super-
fluo potu uini, aeger ab ipso abstineat, & bibat aquam saccha-
ratam, uel aquam mellis. De tertia parte dicit, quod si pro-
uenit ex potu aquae, quae ex niue dissoluitur, uel aliter frigi-
da ualde, aeger ab ipsa abstineat, loco cuius utatur uino pau-
co mediocri potentiae, uel aqua mellis cum pauco saluiae &
piperis, & ingredietur balneum calidissimum, in quo tantum
stet donec sudet, siue illud balneum sit aereum sicut itusa, uel
igneum sicut furnus, ex quo extractus est panis, uel sit aqueum
calidum & siccum & actu & potentia, siue sit naturale, sicut
thermae sulphureae, aut alia huiusmodi, aut artificiale. Et ad
hoc confert sepeliri in arena sicca à sole uehementer calefa-
cta, & statio sub sole confert &c.

Cura tremoris perficitur omnino sicut dictum est in para-
lysi. Verum sunt aliqua propria tremori sicut oleum de an-
dachocho. id est, flore trifolii, quod in hoc habet mirabilem
proprietaem applicitum super originem nervorum & me-
bro tremulo cum frictione bona. Similiter emplastrum fa-
ctum ex foliis iisdem trifolii, cerebrum quoque leporis assa-
tum ad hoc mirabiliter confert, & propterea frequenter co-
medatur. Et si tremor est in capite expertum est si thecas sum-
ptum singulis diebus pondere drach. i. aut. 2. cum unc. i. hy-

dromellis, aut sine potu in forma pilularum. Ex nocentibus
autem ualde in eo & omni aegritudine neruosa est multitudo
phlebotomiae, & nimis usus uini & acetii, & coitus, & aqua-
rum frigidarum: aqua tamen pluuialis est eis melior & mino-
ris nocimenti, & in omni aegritudine neruosa. Callorem
quoque & oleum de cucumere asinino sunt propria tremori
à causa frigida proueniente, siue callorem sit exterius appli-
citum, siue interius sumptum.

De tortura oris.

Cap. 11.

Tortura quae apud Serapionem uocatur acanis à qui-
busdam sic describitur. Tortura est morbus officia-
lis figuram siue formam naturalem faciei corrumpens,
ab Auicenna uero completius describitur secunda tertii, quod est
morbus officialis in facie propter quem trahitur pars faciei
ad partem non naturalem, & alteratur forma eius naturalis
& remouetur bonitas obuiationis utrorumq; labiorum &
ambarum palpebrarum ex parte. Officialis, id est, composi-
tionalis. Est enim morbus in figura & etiam in situ, siue situs
accipitur pro loco, siue accipitur pro societate, ut patebit
ex dicendis. Alter officialis, id est, membri officialis, id est,
instrumentalis & organici. In facie ad differentiam torturae
alterius membri. Propter quem trahitur pars faciei ad par-
tem non naturalem, id est, contrahitur aliqua pars faciei ad
suum non naturalem. Et alteratur forma, id est, figura eius
naturalis. Et remouetur bonitas obuiationis utrorumq; la-
biorum, & ambarum palpebrarum ex parte. In his uerbis spe-
cificat modum torturae, & membra torta secundum plurimum in fa-
cie, ut sit nobis magis manifesta. Subdit autem ex parte, cum
secundum aliquam partem sit bonitas obuiationis, & labiorum, &
palpebrarum, scilicet, secundum partem uicinam parti sanae.

Utrum hominis os contorquetur, & unum de oculis suis
claudere non ualet, & si praecipitur ei ut sufflet, fla-
tus ab una tantum parte exire uidetur; ipsum tunc
contorsionem pati dicimus.

Diuiditur praesens capitulum in partes duas, primo deter-
minat de tortura theorice. secundo practice. secunda ibi. Cu-
ius curam. In prima parte ponit tria signa. Primum, quod os, id
est, facies, uel os, id est, labia oris torquentur. Secundum, quod
oculus partis egrae claudi non potest, id est, ob spasmus, aut
paralyfim palpebrarum non potentium se ex toto continge-
re. Tertium, quia non potest sufflare nisi ex parte una, scilicet
sana, altera non potente, scilicet debite moueri ob spasmus,
aut paralyfim, & similiter nec per eam potest expuere. Spe-
cies torturae sunt istae, nam aliqua est chronica ualde, transiens
sex menses. Quaedam est magis recens siue paucioris tempo-
ris. Iterum quaedam est intensa fortis, quaedam debilis & re-
missa uix comprehensibilis. Causae torturae coniunctae sunt
duae scilicet spasmus aut paralyfis partium faciei, unde fit par-
tium faciei contractio, ad quem sequitur tortura. Spasmus
tunc secundum plurimum est in causa, cum partes faciei sint
laesae, ad quas materiae etiam crassae facile possunt praecipita-
ri. Causae autem paralyfis sunt dictae superius. Causae spasm-
i dicuntur in capitulo sequenti. Duas tamen memorabo.
Una est apostema in collo quod facit torturam, aut causan-
do spasmus, quod est secundum plurimum in nervis danti-
bus motum mandibulae inferiori, quae scilicet oriuntur à pri-
ma spondyli, aut paralyticis eisdem uernos prohibendo
transitum spirituum, & proprie si fuerit apostema molle, ner-
ui enim dantes sensum & motum partibus superioribus fa-
ciei ramificantur à tertio pari nervorum cerebri. Secunda
est uulnus in eadem parte aut in partibus faciei, per quod fit
paralyfis solutis neruis, aut musculis mouentibus partes illas:
aut forte fit spasmus neruis & musculis non totaliter sectis:
aut propter apostema, quod sequitur ad uulnus replens &
contrahens partes illas, quae sic deinceps perpetuo reman-
ent contractae.

Signa prognostica sunt dolor profundus in partibus fa-
ciei & stupor in cute, & multitudo saltus, siue ictigationis
in eisdem partibus prolongati, quodlibet namque istorum arguit
praesentiam materiae in his partibus. quae si ampliata fuerit, aut
uirtus debilitata, fiet spasmus aut paralyfis, & consequenter
Io. Arculani D 2 tortura.

tortura. Signa demonstratiua torturæ cum aliquando propter eius paruitatē occultatur, est risus aut prolatio dictionum in quibus est. O. Ex his enim tortura quātūcūq; occulta manifestatur. Signa uero partis læsæ plerūque occultantur, quia interdum pars sana apparet ita torta sicut egra, quia aliquando pars spasmata contrahit partem sanam, ita ut ipsa uideatur torta: & aliquando paralytica multum grauittans & defluens attrahit partem sanam, ita ut etiam uideatur torta: aliquando si parum paralytica sit, contrahitur à parte sana, ita ut scilicet aliquando nulla appareat tortura, aut si apparet, eque bene apparet in parte sana sicut in ægra. Signa ergo propria & distinguenda sunt, infra scripta. Primum, quia oculus partis læsæ est aliquid aliter discoopertus, cum palpebræ non possunt bene uniri, oculus autem sanus totaliter à palpebris potest cooperiri. Secundum est, quia non potest expirare nec sufflare per latus ægrum nec per medium oris, sed solum per latus sanum. Tertiū est, ut præcipiatur, ut moueat genas & labia contrahendo, & elongando, & manifeste tunc patebit, quia non poterit latus ægrum sed bene sanum. Signa uero q̄ tortura sit à spasmō, est quia pars spasmata extendi non possit, pars uero paralytica facile ducitur ad omnē differentiam. Secundum, quia cum spasmosa coniungitur sorda, & dolor aliquis, cum paralytica uero non. Tertiū, quia in tortura ex paralyysi sensus sunt magis turbati, & sentitur in cute leuitas, & in lacertis, & stupor quidam, & humiditas profluit ex ore, & est palpebra inferior demersa, et medietas panniculi, quæ est super palatum ex parte illa est mollificata, stupida, humida, laxa, & apparet q̄ meditetur homo & aspiciat ad inferiora, quia palpebra superior multū cadit, & magnam partem oculi claudit. In spasmosa sunt signa his contraria. Signa autem spasmī sic. & hu. aut non proportionati ad materiam, uidebuntur in capite sequenti. Et signa causarū paralytis in proprio cap. fuerunt posita.

Prognostica. Timor est mortis in tortura usq; ad quatuor dies, quia materia facile potest conuerti ad cerebrum ipsum oppilando uel apostemando. Secundum, torturæ extensæ usq; ad sex menses fortasse non speratur rectificatio.

Tortura in decrepitis raro recipit salutem. Tortura sequens ægri tudines fortes sicut apostema cerebri & similes, & spasmus de inanitione, quod signatur & scitur per euentum eius paulatim factum, non recipit curationem.

Cura.

Cuius curam incipimus cum solutione uentris ex pilulis fetidis. Nutrimētum uero eius atque ipsius potum dicimus, ut in capitulo de paralyysi diximus. Aegro præterea quotidie in mane antequam comedat, sinapim cum syrupo acetoso gargarizare faciemus, & mittimus eum in domum obscuram, et præcipimus ut unam nucem muscatam in parte oris, quæ torta est retineat. Naribus quoque sufflabimus conditi, ut sternutatio prouocetur. Spondyles quoque colli eius, & faciem eius, & frontem ex oleo costino innungere conuenit, & est quotidie de anacardino aur. 1. pondus sumendum. Et si passio hoc modo soluta non fuerit ad uentris solutiones, & ægri sedationem redeundum est. De tortura uero quæ non repente, sed paulatim accedit non loquimur, ipsa nanque non contingit nisi in phrenesi pernitiosa morte iam imminente, & est ex siccitate.

SCHOLIION.

Ad ægri sedationem Iessi res est parua; tamen, ut diuersos cognoscas extus, legitur Ad ægri præseruationem.

Hic ponit curam torturæ pendens à paralyysi aut spasmō humido. secundo dicit se non uelle ponere curam torturæ factæ paulatim ex spasmō de inanitione cū ipsa sit pernitiosa. secunda ibi. De tortura uero. In prima parte docet Rafis euacuare. Primo cum pilulis fetidis. Secundo docet q̄ diēta eius sit sicut dictum fuit in paralyysi.

Tertio præcipit gargarisma, ut hoc. R. sinapis. ʒ. s. bulliat in lib. una aquæ ad consumptionem medietatis & coletur, cum qua colatura misceantur syrui acetosi simplicis. ʒ. 2. & gargarizetur stomacho ieiuno. Quarto locat torum in lo-

co obscuro per quatuor dies uel sex, ne materia ampliatur & dilatetur per multi luminis præsentiam. Quinto teneat nucem muscatam in parte oris quæ torta est. Sexto prouocet sternutationem cum cōditi superius declarato, uel loco eius prouocetur cum elleboro, & similibus. Septimo ungantur spondyles colli, quia ab ipsis ramificantur nerui uenientes ad faciem. Et similiter ungantur partes frontis & faciei ex oleo costino superius descripto. Ultimo sumant quæque die aur. 1. confect. anacar. ut supra in paralyysi. Et si cum his nō curatur quiescat per decem dies solo regimine bono obseruato, deinde iterum redeat ad ea quæ iam dicta sunt. Cura torturæ exigit easdem intentiones quæ dictæ fuerunt in paralyysi. Et hic esto memores sicut ibi, non properare ad usum medicinarum fortium in principio digestiuarum aut solutiuarum, sed expecta usque ad quartum & septimum & decimum quartum diem, sicut dictum fuit. Neque aliquo modo soluas cum debili aut forti solutio, nisi præmissa digestionē, sed solum sit contentus phlysteribus lenientibus. Secundo in tortura ex spasmō primo mollifica, deinde resolue, sed in tortura ex paralyysi solummodo resolue. Ex expertis est ut sumantur. ʒ. 2. hieræ Hermetis per mensem continuum: secū dum expertum est zingib. & acorus confecta cum melle, siue diacorus sumptus mane & uespere ad quantitatem nucis.

Phlebotomia uenarum linguæ in tortura sanguinea optime confert. Alsiduatio abluionis faciei cum aceto in quo decocta est sinapis est mirabil. prospicere in speculo sepe iuuat ad rectificationem torturæ. Cauterium super uenam quæ est post aurē, est ultimū, si per plures dies dimittatur apertum. Sirupus proprius in causa frigida. R. acori lib. s. zing. nucis musca. ana. ʒ. 1. mellis lib. 1. fiat syrupus clarificatus bulliendo supralcripta in sufficienti quantitate aquæ, & administretur cum aqua decoctionis saluic, sed non administretur nisi post septimum, & præcedente alia euacuatione. Solutiuū proprium post hunc syrupum est hoc. R. pilularum cochiarum, scetidarum an. ʒ. 3. s. fiat pilulæ. ʒ. 5. & exhibeantur in mane seruata debita diæta & custodia.

Gargarisma. R. nucis musc. ʒ. s. acori. ʒ. 2. pyrethri, sinapis, zing. ana. ʒ. s. aceti. ʒ. 1. mellis. ʒ. 2. bulliant in lib. 3. aquæ ad consumptionem duarum partium, sed non fiat gargarisma neque sternutatorium nisi præcedentibus purgationibus. Succus auriculæ muris cum nuce muscata in eo infusa est proprius per nares attractus. Est autem auricula muris anagallis, pro ea tamen sumimus maioranam. Oleum proprium in tortura. R. rad. acori. ʒ. 2. zing. nucis. musca. ana. ʒ. 2. olei cost. ʒ. 4. uini al. potentis tantumdem, bulliant super cineres usque ad consumptionem uini, & cum pauco ceræ fiat unguentum. Esto tamen memor in tortura à spasmō præponere mollificantia, deinde resolutiua succedant. Mollificatiuū proprium. R. mucil. foenugraci, sem. lini, butyri, & xungia anatis, olei amygdalarum dul. medullæ cruris utuli. an. ʒ. s. olei de lilio. ʒ. 1. nucis musc. ʒ. 1. ceræ quantum sufficit, fiat unguentum molle, aut misceantur mollificantia cum resolutiuis. Et hæc de tortura.

De spasmō.

Cap. 12.

Spasmus à græco deriuatum idem significat quod cōtractio. Et describitur ab Auicē. secunda tertiū cap. proprio, q̄ est egritudo neruosa, qua mouentur lacerti ad sua principia, & inobedientes fiunt in dilatatione. Est quidē ægri tudine, quia sensibiliter ledens. Et est ægri tudine quæ est cōpositio præternaturalis in figura, quia membrum in spasmō male figuratur contra uoluntatis imperium. & est morbus in situ, capiendi situm tam pro positione siue loco, q̄ pro focietate, cum membrum neque in debito loco remaneat, neque possit associari cui debet sū humanam necessitatē. Neruosa, quia licet in omni spasmō membrum organicum lædatur sū se totum, læditur tamen principaliter sū partem neruofam ipsius, qua mouentur lacerti. expressit instrumentum principale motus uolūtarii, unde in hoc differt spasmus à singultu, cum in singultu non sit motus lacertorum, ad sua principia, scilicet ad nucham, à qua 31. paria neruorum & unum impar originantur, dantia motum & sensum fere toti corpori à ceruice infra. Et à cerebro originatur septē paria, ut supra in anatomia, quia omnes concurrentes ad cōpositionem

nem omnium musculorum sunt causa ut ipsi musculi spasmentur, & moueantur uersus nucham aut cerebrum. Et inobedientes sunt in dilatazione, quia non possunt dilatari nisi uoluntatis imperium, nisi aegritudo remoueatur.

Nota primo quod duplex est spasmus proportionatus ad materiam, & non proportionatus. Non proportionatus est ille cuius causa immediata effectiua est uirtus siue anima, stimulatam tamen à re præter naturam, sicut est dolor, solutio continui & huiusmodi. Proportionatus ad materiam est duplex, de repletionem & inanitionem. Spasmus de repletionem est ille cuius causa immediata effectiua est ipsa materia existens in nervo siue apostemet, siue non, nam dilatando membrum & extendendo in latitudinem & profunditatem est causa, quod abbrevietur in longitudinem, quare fit contractio. Spasmus de inanitionem est, cuius principium effectuum immediatum est siccitas ignea & terrea in eo crescens & dominans propter consumptionem humiditatis substantificæ, unde humidum, æreum & aqueum euaporat: Et inter hos est differentia, quia in spasmō humido abbreviatur nervus in longitudinem, & in crassatur in latitudine & profunditate, sed in spasmō de inanitionem in omnem dimensionem, fit abbreviatio & contractio. Ex quibus sequitur istas conclusiones esse concedendas. Prima conclusio, aliquis est spasmus immaterialis, qui tamen est morbus materialis, quia spasmus non proportionatus ad materiam pendens, exempli gratia, ex cholera erugiosa in stomacho est spasmus immaterialis, quia non proportionatus ad materiam, est tamen morbus materialis curandus per euacuationem. Secunda conclusio. Aliquis est morbus siue spasmus materialis, ut puta spasmus de inanitionem qui est proportionatus ad materiam: & tamen est morbus immaterialis cum non sit ibi materia euacuanda, aut ad benignum perducenda per distinctionem. Dicitur autem spasmus materialis, quia in eius quiditate exprimitur materia, scilicet ipsius consumptio. Tertia conclusio, Aliquis est spasmus proportionatus ad materiam, & non proportionatus ad materiam, patet de spasmō, cuius causa effectiua immediata sit non solum materia, sed etiam uirtus stimulata. Et si magis uirtus concurrat, à prædominio dicitur non proportionatus ad materiam, & e contrario si materia à prædominio dicitur spasmus proportionatus ad materiam. Et si ambe æqualiter concurrant, ab utroque æqualiter denominabitur, scilicet ubi quilibet per se esset sufficiens ad illum producendum, ubi autem neutra esset per se sufficiens, sed ambe simul, dicitur proportionatus ad materiam, & non proportionatus de copulato extremo, & non copulatiue. Nec ualet hoc argumentum, est spasmus non proportionatus ad materiam, ergo non est proportionatus ad materiam, nec ibi arguitur ab affirmatiua de prædicato infinito ad negatiua de prædicato finito.

Quarta conclusio. Aliquis spasmus est de repletionem & inanitionem. Quinta conclusio. Aliquis est spasmus non proportionatus ad materiam de repletionem & de inanitionem, quia rē deductio facilius patere posset. Ex his patet, quod spasmus de inanitionem habet unā causam primitiuam, scilicet consumptionem humiditatis, & positiuam alteram immediatam crementum siccitatis. Contra, si per siccitatem fieret spasmus, tunc hædici tertie speciei omnes spasmerentur, cum in ipsis sit facta ultimata exiccatio qua deducuntur ad mortem. Ad hoc dicitur multum interesse inter siccitatem quæ facit spasmus, & quæ facit hædici tertie speciei, nam ista est uniformis fere equalis per totam nervi substantiam ex eo quod inducta est paulatim. Illa uero quæ facit spasmus non est uniformis per totum, nec equalis in toto nervo, ex eo quod ab agente uiolento in paruo tempore inducta est, unde magis exiccatur una pars nervi quā altera. Fit ergo contractio & applicatio in parte, scilicet minus exiccata, sicut in corio proiecto super prunas fit contractio una parte magis exiccata quā altera, ubi si in sole aut in loco calido diu stetit, & multum fuisset exiccata, non fuisset contractum, sicut & lateres cum coquantur in fornace ab igne dulci non torquentur, sed ab igne nimis forti contorquentur. Sed contra, nervus est æqualiter dispositus per totum, agens forte, ut puta calor caufonis, potest omnibus partibus æqualiter applicari, ergo non spasmerentur. Præterea, si in hædici est per totum uniformis

exiccatio totum deberet æqualiter contrahi, & sic fieri tetanus. Dicitur causas resistentes exiccationi nervi in causone non esse æquales, cum pars nervi aliqui sit circumuoluta membris humidioribus, siue iuxta posita: alia pars membris siccioribus, quare non æqualiter resistit per totum, neque etiam uapores febriles æqualiter omnibus partibus applicantur. Ad id dicitur, quod si fieret contractio in hædico, tunc spasmus ille esset de inanitionem, & similiter si corpus extensum & inflexibile humido fere uniformiter in omnibus partibus nervosis exiccato, tunc esset tetanus. Sed dico nullā fieri contractionem notabilem, neque extensionem ad spasmandū sufficienter, aut ad tetandū.

Secunda distinctio est, aliquis spasmus est in fieri, ut quod actualiter fit contractio, aliquis est in facto esse, ut quod membrum post contractionem remanet contractum, tunc enim est quies ubi dum fiebat erat motus. Et ex hac distinctione sequuntur istæ conclusiones. Prima, Aliquis est spasmus fiens, qui tamen est morbus factus, ut puta spasmus de inanitionem cum est in fieri, & complebitur etiam remota omni causa conferuante ipsum sicut febre, fluxu, & similibus. Est enim morbus factus, quia independens. Est tamen spasmus fiens cum actualiter fiat contractio. Secundo, quod aliquis est spasmus factus, qui tamen est morbus fiens cum ad remotionem causarum sit aptus remoueri, neque à seipso conferuabilis sit, ut patet in spasmō de repletionem facto & curabili. Tertia distinctio. Aliquis est spasmus proprius sicut est superius descriptus. Alius improprius, scilicet singultus, quia in stomacho non est musculus, aut aliud principium motus uoluntarii. Quarta distinctio. Aliquis est spasmus fortis adeo, ut ceruix contorqueatur & stridat dentes. Aliquis debilis sicut oscitatio, & aliquis uniuersalis in toto qui non differt ab epilepsia, nisi qui a est cum sensu intrinseco & extrinseco. Aliquis est particularis, & in una medietate, aut aliquo membro particulari. Aliquis est spasmus ad posteriora, & dicitur opisthotonus. Aliquis est ad interiora, & dicitur emprosthotonus. Aliquis ad utrumque & dicitur tetanus. Ad latera autem rarissime euenit, cum in lateribus pauciores musculi & nervi sint situati. Et harum diuersitatum causa est in quod causa spasmī est in diuersis locis sicut dictum fuit in paralyti. Et quicunque istorum aut est initias, aut succedens ad alias aegritudines sicut ad synachen, pleuresim, sifren, & similia.

Causæ spasmī non proportionati ad materiam sunt accidentia animæ sicut timor & tristitia, solutio continui, frigus nervi ex uulnere discooperti, putredo, dolor, punctura animalis uenenosi, comestio & applicatio rerum uenenosarum, & communicatio facta nervis ab aliis membris, siue absoluta, siue non absoluta, dummodo nervi non lædantur per essentiam, & magis spasmerentur nervi ex communitate stomachi & matricis quod propter alia membra.

Spasmī de repletionem causæ sunt phlegma, ut in pluribus, deinde melancholia uel sanguis, rarissime cholera, siue humores apostement nervum siue non. Et aliquando est uento fitas, & est ex his quæ ueniunt in hora & remouentur in hora, & uulgariter uocatur granfo. Causæ antecedentes sunt idem humores non actu imbibiti, aut apostemantes nervos. Causæ primitiue sunt crapula, ebrietates, somnus super satietatem. Exercitium forte corpore pleno, retentio euacuationum etiam consuetarum, ingredi etiam balneum corpore pleno, liquefactio humiditatum à febre, & similes. Causæ spasmī de inanitionem sunt febres fortes, ieiunia, uigilia, accidentia animi fortiter exiccantia, fluxus uentris, & alie euacuationes fortes, & cætera præter modum exiccantia.

Signa distinctiua inter spasmus & epilepsiam sunt, quia epilepsia est communis toti, & resoluitur uelociter, & est cum periodicis & non fit ex inanitionem & aufert sensum. Spasmus uero in his ipsi opponitur, licet tamen spasmus dicatur epilepsia membri, sicut epilepsia est spasmus totius corporis & simulantur in motibus contractiuis, &c.

Signa prognostica sunt dispositiones corporum. Primum, pueri sunt ad omnes spasmos maxime dispositi. Et etiam ab omnibus maxime releuabiles. Iuuenes ad spasmus non proportionatum sunt proniores quam senes. Corpora sanguinea & cholericum sunt proniora ad spasmus quod phlegmaticum aut melancholicum. Secundum, tremor & dolor circa collum

Io. Arculani D 3 &

& iuncturas nunciat spasmus, pulsus chordosus, & proprie cum diuersitate est nuncius spasmii.

Tertium oculi contorsio & facies in modum ridentis est nuncius spasmii: fit enim ex contractione partium faciei. tremor manus ægri occultus, qui aliquando percipitur à medico solerti dum tangit pulsus pronunciat spasmus. anhelitus difficilis interfectus, suspiriosus, quia non potest dilatari pectus propter contractionem diaphragmatis & musculorum, & huiusmodi nunciat spasmus. Signa cõcordantia habes. 6. aphor. aphor. 54. In acutis passionibus cum febre luctuosa suspiria malum. Scepticitas uentris propter contractionem musculorum ani aut matricis ad superiora deriuatis. Retentio urinae aliquando, & aliquando emittitur cum sanguine mixta propter debilitatem renum, aut fortem expressionem singulorum. Soda, tremor & dolor prænunciant spasmus, stridor dentium, contractio cutis capitis. Signa demonstratiua est ipsa actualis contractio uel contractum esse, pulsus tensus diuersus in modum sagittæ ascendens in medio sui motus, & descendens in fine, & humilis in principio, in quo non apparet manifesta diastole propter nimiam tensionem, unde oportet fieri pulsus uelociore & frequentiores. Item arteria est calidior aliis membris calido spumoso ignito propter prohibitam transpirationem. Differt autem hic pulsus à pulsu principii paroxysmi, cum hic sit tensor & magis manifestus.

Signa spasmii non proportionati ad materiam sunt causæ ipsæ, de quibus præcessit sermo. Signa uero spasmii de repletionem sunt eius causæ. Distinguitur inter sanguineâ & phlegmaticam per signa sæpius dicta. Et causæ primitiue seipsam significant. Signa spasmii de inanitione, est quia paulatim fit & præcesserunt causæ, scilicet inanientes. Prognostica. Primum, omnis spasmus uniuersalis ex uulnere est mortalis. Secundum, spasmus de inanitione cui in principio non resistitur est mortalis. Tertium, spasmus ad posteriora est ceteris deterior. Quartum, habetur quarto aphor. In feb. non deficiente si labium, aut oculus, aut supercilium, aut nasus distortus, aut non uideat iam debili existente corpore, quodcumque horum fiat, iam est prope mors. Quintum, Ventositas multiplicata cum tremore uentris, mortem significat. Sextum, Salus superflua arguens multitudinem uentositatis malum. Septimum, Spasmus non proportionatus ad materiam, nisi sit uniuersalis ex uulnere secundum plurimum est salubre.

De tetano. Cap. 13.

Tetanus, quasi totum tenens à tetano græco nomine deriuatus. Est fm Aui. secunda tertii cap. proprio, ægritudo officialis prohibens uirtutem motiuam à contractione membrorum, de quorum aptitudine est, ut contrahantur propter nocumentum in lacertis & neruis. Est enim tetanus morbus in situ & in figura, & propterea officialis, id est, compositio, uel membri officialis, id est, organici. Nam licet sit falsio neruorum, est tamen principaliter organorum, quia principaliter & immediatius sunt ad motum ordinata fm humanam necessitatem, nec unquam est in neruis quin sit in organicis. Dicitur prohibens uirtutem motiuam à contractione membrorum, ad differentiam spasmii, cuius est membra contrahere: & subditur propter nocumentum in lacertis & neruis, &c. ad differentiam priapismi in quo non est læsio neruorum nec lacertorum uirgæ, sed sola ipsa tenditur ex multitudine uentositatis crassæ repletis uenas & arterias.

Contra sequitur quod tetanus non differt à paralyfi. Dicitur, quod tetanus prohibet uirtutem motiuam à contractione membrorum cum ipsorum extensione, paralyfi uero cum ipsorum mollificatione, propterea diffinitio est supplenda. Et propter hoc etiam differt à spasmio in facto esse. Alcuzez uero dictio arabica uariis modis accipitur, ut uult Aui. in cap. de tetano. Quandoque pro spasmio masculorum furculæ. Quandoque pro spasmio oculi. Quandoque conuertitur cum tetano. Sed proprie acceptus. Alcuzez est tetanus à causa frigida, & à uentositate proueniens, licet Aui. in cap. proprio, & similiter ceteri auctores sint multum uarij in usu horum terminorum accipientes frequenter unum pro altero.

Species tetani sumuntur, sicut species spasmii. Est enim quidam non proportionatus ad materiam pendens ex eisdem causis, ex quibus pendet spasmus non proportionatus ad materiam. Et quidam tetanus est proportionatus ad

materiam duplex existens, de repletionem, & de inanitionem.

Et causæ sunt eadem, nisi quia in tetano sunt duo spasmii diuersorum musculorum & neruorum ad oppositas partes siue differentias trahentium, imo duo tetani per quorum extensionem membrum remanet rectum & extensum ad nullam differentiam contractum, sicut si esset nocumentum in musculis anterioribus & posterioribus: aut si solum unus neruus aut musculus sit læsus, ille est læsus uniformiter per totum. exempli gratia, materia penetrante per riuulos nerui in totum neruum, unde non magis contrahibilis est ad unam partem quàm ad aliam, sed in spasmio erit in una parte incrassans illam, & per consequens trahit ad se reliquam partem.

Sed contra, si materia existens in una parte nerui dilatans illam est causa abbreviationis nerui fm longitudinem, multo magis existens in toto neruo & dilatans illum erit causa abbreviationis eius. Ad hoc dicitur negando consequentiam, quia omnis pars erit æqualiter extensa, sicut in marisupio undique æqualiter extenso fm longitudinem & latitudinem, non magis contrahetur fm longitudinem quàm latitudinem, sed fm omnem differentiam extendetur, & maiorabitur, & secundum hunc modum membra undique apostemata ut non flecti possint dicuntur tetanata, sunt enim fm omnem differentiam magnificata. Et similiter potest esse tetanus de inanitione membro uniformiter exiccato & non contracto, cuius causæ sunt eadem quæ spasmii. Et sic aliquando uidemus brachium aut crus arefactum inextensibile. Et similiter erit tetanus non proportionatus ad materiam ex similibus causis contingens, ex quibus prouenit spasmus, sicut ex causis primitiuis, ut cum homo dormit super rem dura, aut in fomno unum membrum comprimit alterum, aut aliquod membrum tunc extenditur, aut percutitur taliter ut membrum non possit flecti, sicut aliquando ex similibus causis membrum spasmatum, & non potest extendi. Alcuzez autem proprie sumptus prouenit, aut ex frigidity sine materia congelante, aut ex materia frigida crassa undique æqualiter membrum extendente, siue apostemet, siue non, & similiter à uentositate: unde si materia paralyfis congeletur, aut resolutis partibus subtilibus incrassetur, taliter, ut membrum remaneat extensum, ex paralyfi fiet tetanus, siue alcuzez. Tetanus etiam aliquando fit incipiendo, aliquando succedit aliis ægritudinibus, sicut synanchæ & pleuresi, quemadmodum dictum est de spasmio.

Signa sumuntur eodem modo sicut dictum est in spasmio. Veruntamen ex signis prognosticis tetani est saltus plurimus, grauitas sermonis, durities in lacertis, & dolor in partibus spondylium usque ad alios, & difficultas deglutitiæ, & cum scalpitur non delectatur. Secundum, urina sicut putredo & uirtus cum horripilatione & tenebrositate in uisu sudore in capite & ceruice significat extensionem in utrifque lateribus futuram. Tertium, cum tetanus communis incipit clauditur os, rubescit facies, fit dolor fortior & non potest forbere, multiplicatur palpitatio, & lachrymantur oculi. Et differentia inter tetanum & spasmus in principio sui est, quod spasmus in lacertis incipit cum motu: tetani uero principium est in lacertis cum quiete. Cetera signa demonstratiua specierum eius & suarum causarum sunt similia his quæ dicta sunt in spasmio.

Prognostica. Primum, tetanus est ægritudo acutior ceteris partibus quàm sit spasmus, & magis perniciofa cum sint duo spasmii, unde iuxta aphorismum quintæ particule. Quicunque à tetano apprehenduntur, in quatuor diebus pereunt. Verum spasmus de inanitione est deterior quàm tetanus, quia contrahit fm omnem dimensionem. Secundum, ille tetanus est malus quem præcedunt febres inseparabiles cum inquietudine fletu & alienatione, & fit color citrinus propter eas, & exiccatur os & labium, denigratur lingua & exasperatur cutis, & extenditur: est enim ex inanitione. Tertium, Omnis tetanus à percussione cui associatur singultus & permixtio rationis est mortalis. Sed circa dicta in litera dubitatur, quare spasmus non est ita periodicus sicut epilepsia, cum tam epilepsia sit spasmus uniuersalis. Respondetur quod aliquando sunt spasmii particulares periodici, ut quædam mulieres spasmanur in manibus fm periodos aggregationis materierum in matrice, ut Gal. in libello de spermate, cap. 2. Secundo potest aggre-

gari

gari in alio membro materia per congestionem, uel quod ipsa recipiatur ab alio membro in determinato tempore quæ erit factiua spasmû periodicæ. Dico tamen quod epilepsia per essentiam est periodica frequētius quàm spasmus, quia fit ex defectu cerebri, & multa malitia ipsius cuius defectus nō corrigitur nisi à corde & hepate, cū cerebrum sit membrū principale, neq; potest recipere correctionem per exterius applicita, sicut membra particularia extrinseca, propter profunditatem & distantiam ipsius cerebri, & proprie secundū uentriculos eius in quibus hæc materia continetur. Alia uero membra facilius corriguntur tam in membris principalibus quàm non principalibus. Et uirtutes medicinarū melius in membris particularibus penetrant ad profundum, Epilepsia etiam per communatatem est frequētius periodica, cum læsio cerebri etiam non ualde magna sit factiua epilepsie, in qua cerebrum contrahetur. Aequalis tamen læsio perueniens ad neruos, non faciet ipsorum contractionem. Est enim natura quæ facit huiusmodi contractionem tam in neruis, quàm in cerebro, ut expellat à se nocumētum magis sollicita de cerebro, quàm de neruis: non est enim negandum aliquem spasmus particularem esse magis periodicum certa epilepsia per communatatem.

Cum aliquod membrum alicuius contrahitur, & ad suam redit originem, aut plura ex membris sic disponuntur, ipsa spasmata esse pronuntiabimus. spasmus aut subito, aut paulatim inuadit. spasmus aut subito euenienti eadem preparanda est cura, quàm in paralyysi cōferre diximus. in eo tamen frictione manuum, et inunctione ex oleo costino plus utimur. spasmus uero, qui non repente, sed suauiter accidit post febrem, aut post multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut sanguinis fluxum, malus est, & uix curabilis. quicquid tamē accidit, ei mederi incipimus. ægro nāq; bordei aquam, & iura unctuosā, & mollia ministrabimus. & in aquam dulcem tepidam ipsum mittemus, & uigemus ex oleo uiolaceo tepido, & oleo de seminibus cucurbitæ, & præcipue neruorū radices, in quibus spasmus existit. in tina quoq; diu moretur, & ex oleo uiolaceo inungatur. de uino bibat patiens parum, quod tamen multam habeat aque admixtionē. & cibis nutriatur humidis.

Diuiditur hoc capitulum de spasma in tres partes. In prima ponit signa spasmû sumpta ex quiditate ipsius. In secunda ibi, scilicet. spasmus autem. Ponens unam distinctionem spasmû curat spasmû de repletionem. In tertia ibi. spasmus uero, &c. Curat ipsum spasmum de inanitione. Prima pars est manifesta ex dictis. In secunda parte primo ponit hanc distinctionem. spasmus autem accidit subito, & est de repletionem; aut paulatim & est de inanitione. Sed ipsi spasma subito euenienti eadem properanda est cura, quæ superius dicta est in paralyysi, cum sit de repletionem. Est tamen hæc differētia, quia in spasma indigemus amplius frictione & inunctione cum manu ex oleo costino superius descripto in paralyysi, cum humor sit crassior. Debemus etiam flectere ipsum membrū ad oppositum illi differētiæ ad quam contrahitur. In tertia parte dicit, quod spasmus qui non repente, sed paulatim accidit post febrem, aut multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut sanguinis fluxum est malus & uix curabilis, imo non potest curari nisi in principio. Curat autem ipsum cum rebus humectantibus interius & exterius applicitis, quæ qualitatiue & substantifice humectant. Et hæc secundum plurimam debent esse frig. minus tamen frig. quàm hum. Et omnia quæ dicit sunt manifesta. Concedit tamen uinum multæ aquæ admixtum, quod debet esse nouum, nutriendo enim humectat substantifice. Et cum hoc facit aquam multam, quæ ei admiscetur, ad extrema corporis penetrare, quæ ppter humectat etiam qualitatiue. In spasma tã de repletionem debet esse uetus iuuans ad materiæ resolutionem.

Cura spasmû de repletionem quatuor exigit intentiones curatiuas. Prima ordinat debitum regimen. Secunda euacuat materias communes & causam antecedentem etiam diuertēdo. Tertia resoluit causam coniunctam membra confortando. Quarta corrigit accidentia. Aer ergo iuxta primam inten-

tionem declinet ad calidum & siccum. Dixit similiter declinet ad siccum, & sit ualde tenuis præcipue in spasma uniuersali, sita ut sint contenti aqua mellis aut sacchari, aut pro cibo sumant panatam cum pauco saluæ minutim incisæ, aut ouū unum cum saluæ, aut brodium cicerum cum saluæ, & similibus. Caueat à carnibus & uino, nisi forte parum uini antiqui concederetur ad materiæ resolutionem euacuatione iam præcedente. Declinante tamen ægritudine utatur carnibus facili digestionis declinantibus ad siccum sicut perdicibus, & similibus. Et reliquum regimen seruetur, ut supra in paralyysi. Secunda intentio, scilicet euacuatio perficitur cum phlebotomia, si sanguis aut humorum multitudo sit in causa. Quæ phlebotomia iuxta sententiam Auicennæ non sit multum copiosa tum ut calor innatus non debilitetur qui est principale resoluens, tum etiam quia nerui sunt frigidi. Et fiant alie euacuationes secundum exigentiam humorum peccantium, sicut dictum fuit in paralyysi. Attende tamē quod in spasma uniuersali est necessaria festinatio, nec oportet præmittere digestionem, neq; tardare sicut tardatur in paralyysi. Interficit enim frequēter a prima die usq; ad quartam. Euacuatio autem fiat cū clysteriis leuibus aut acutis, & cæteris generibus euacuationum sicut dictum fuit in paralyysi. Vbi autem daret in ducias ante digeratur materia, & seruentur canones superius dicti in paralyysi. Ad fortiora tamen digerentia & euacuantia est cæteris paribus citius procedendum, quàm in paralyysi, cū materia sit crassior. Digestiua & euacuantia illic requiratur in cap. de paralyysi. Tertia intentio, scilicet causæ coniunctæ resolutio & membrorū confortatio, maxime cerebri & neruorum perficitur cum interius & exterius applicitis. Sed attende quod quantum ad exterius applicita differt cura spasmû à cura paralyysi, quia in spasma debet esse aliquantulum molificatiua, quia materia est crassa, & membra indigent erectio ne uersus figuram naturalem. Primum, ex conuenientibus propriis est rem contritus cum pinguedine sua, sed proprie uulpis aut lupi, & applicitus debite calidus origini neruorū & loco spasmato. Secundum, est pellis uulpis & lupi, ex qua cum calore suo actuali dū nouiter facta est excoctio æger circumdatur, similiter inunctio cum adipe luporum & uulpium. Item fessio in aquis decoctionis luporum, uulpium & sigillatim, & coniunctim, præcipue si cum eis decocta fuerint aliqua propria, sicut abrotanum, anethum, folia lauri, hyssopus, stœcas arabicæ, & similia. Oleum quoq; de lilio est ad hoc præcipuū. Lana quoq; succida super locis spasmatis præcedentibus prius unctionibus est conueniens. Vnguentum quoq; factum ex styrace liquida. 3. i. olei de lilio. 3. 2. euphorbiæ castorei, ana. 3. i. ceræ quantum sufficit, est conueniens. Similiter oleum uulpium, & oleum de costio, descriptione Mesuæ. Fortius autem iam dictis est oleum de costio, descriptione Rasis. Balnea quoq; & proprie sulphurea sunt ad hanc intentionem. Sed ex interius sumptis sunt diamuscum, diam bratheriacum, mithridatum, acori conditi, & diacorum. &c. Vltimum uero est confectio anacardina febrem prouocans, de qua superius in paralyysi. Quarta autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur educendo fæces, aut urinā si fuerint retentæ, cum eis quæ dicuntur in propriis capitulis: & subueniatur in difficultate anhelitus cum unctionibus dilatantibus musculos, & positione ægri si oportuerit in balneo olei, cuius mandibulæ etiam uiolenter aperiantur si strictæ fuerint.

Et reliqua accidentia curentur secundum propria capitula. Cura spasmû de inanitione perficitur cū frigidis & humidis secundum totum regimen sex rerum non naturalium, præcipue aeris tam inspirati quàm circumdati. Sed tamen secundum plurimum maius studium debet esse in humectando quàm in frigidando. Hæc autem applicentur extra & intus secundum omnem modum, & sint humectantia quæ intus approximantur tam qualitatiue quàm substantifice. Vnde conuenit balneum ex lacte aut ex aquis in quibus cocta sint folia salicis, hordeum fractum, uiola, nenfar, cucurbita, citruli, aut fiat tota tina ex succo cucurbitæ, aut ex aqua rosæ in qua decoctum sit aliquod horum, aut ex aqua melonis indi, & similibus. Et fiant clysteria ex rebus similibus additis quibusdam impinguantibus, sicut oleum uiolaceum, nenfarinum, aut pinguedo porci lota pluries cū aqua frigida. Et ex oleo uiolaceo.

Io. Arculani. D 4 laceo

laceo inungantur iuncturae & totum dorsum, aut ex oleo nenupharino, aut falicis, & cum istis per misceri potest pinguedo porci recens, lora plurics cum aqua frigida, & infirmo detur lac recens secundum mensuram convenientem, quam possit digerere febre non existente. Sed praesente febre detur aqua hordei, aqua cucurbitae, aqua melonis indici cum uileb uiolaceo, aut simili. Et si cum istis misceatur parum uini albi subtilis unius anni tantum, dulcis aliquid, aut saltem non acris erit enacuans, & quiescat & multum dormiat, & non fiant enacuationes nisi naturales, & leues, & gaudeat, & maximum studium etiam habeatur in humectatione cerebri embrocando & ungendo commissuras capitis, & totum caput, & instillando huiusmodi in auribus, & naribus, & utatur contuso & brodio consumpto in quo cocta sit cucurbita, lactuca, & similia, & si qua accidentia superuenerint, corrigantur secundum exigentiam. Cura spasmi non proportio nati ad materiam. Si fuit a uulnere sedetur dolor, & procuretur sanies, ad quod optime ualet emplastrum de maluausco cum oleo rosae, exterius applicitum, & terebenthina lora cum uitello oui in uulnere applicita, & tota nucha ungatur & fomentetur cum humectantibus temperatis in actiuis, sicut est oleum amigdalarum dulcium. Et si fuerit febris addatur parum olei uini. Et si fuerit a punctura uulnus aperiatur, & cum incisione donec uirus transpiret, & in punctura instilletur sulphur, aut parum euphorbii dissolutum cum oleo rosaceo & terebenthina, & sit actum notabiliter calidum. Et caratim siue uermes terrestres cocti in oleo rosaceo, & appliciti optime conferunt: & si fuerint a putredine alicuius membri uulnerati, optimum remedium est cauterium actuale super parte putrida. Et si fuerit a frigidityte loci uulnerati, locus, & partes circumstantes fomententur cum pannis infusis in oleis calidis ad hoc propriis, sicut oleo de costo, & de croco. Et si fuerit ab apostemate, curetur apostema secundum quod oportet semper mitigando dolorem cum unctionibus & emplastris, & infundendo membrum in oleo, & similibus. Et in omnibus his attendendum est origini neruorum cum humectantibus secundum plurimum temperatis in actiuis: imo frequentius oportet ponere aegrum in tina ex oleo communi, & cum exit a tina induere ipsum camisia, & caligis suffultu laena succida. Et si fuerit a ueneno aut a punctura uenenosorum, cura requiritur sexta quarti, & a Rasis. 2. huius. & origines neruorum fomententur cum humidis declinantibus ad calidum aut ad frigidum secundum exigentiam rei uenenosae. Et si fuerit a cholera prasinia in stomacho, aut alio humore, uomitu aut secessu ducatur: & si fuerit a communitate aliorum membrorum, sicut matricis, aegritudines illius membri curentur secundum quod oportet. Dieta autem debet esse tenuis & declinans ad calidum, aut ad frigidum secundum exigentiam causa, & accidentia curentur secundum quod oportet.

Cura tetani est eadem quae spasmi a simili causa. Verum in diget ut magis festinetur, quoniam est acutior quam spasmus. Et ex his quae ualde conueniunt est ut ferueat succus anethi, & mittatur in ipso catulus talda, id est, catulus canis aut uulpis, & decoquatur donec dissoluatur, infundatur aeger in decoctione eius bis, aut quantum uel quoties oportet. Et si non haberetur tanta quantitas succi, ut in ea posset aeger infundi, habeantur petrae quae in tali decoctione infundantur, & loco nuchae aut membro tetanato superponatur. Et sic est finis huius cap. de spasma & tetano.

De epilepsia.

Cap. 14.

Epilepsia graece quasi captio dicitur uel captiuitas latine, ex eo quod secundum Alexandrum tenet omnem sensibilitatem captiuam. Dicitur morbus caducus, ex eo quod cadit patiens ob eam. Dicitur morbus comitialis, eo quod si aliquis hoc morbo in comitiis caderet, comitia ad aliam diem transferebantur. Comitia uero dicebantur conuentus uniuersi populi Romani, calendis Ianuarii in capto Martio ad magistratus creandos. Dicitur morbus lunaticus ex eo quod secundum motum lunae commoueri uidetur. Haec alii uocant *λεπάριον*, id est, sacrum morbum, eo quod sacram partem corporis possideat, scilicet cerebrum in quo animam habitare dicunt. Alii *ἡρμαν*, id est, herculeum uocant eo quod fortis sit, & non facile illidatur: & Herculeum ferunt hoc morbo laborasse, uel quia sit fortis in pro-

sternendo homines sicut Hercules. Dicitur etiam commessalis, quia commestationes, crapulae, ebrietates sint ipsius causae. Et *παιδικός*, eo quod facile pueris accidit: nam *παις* graece, puer latine dicitur. Et propter hoc a quibusdam infantilis uocatur. Ab Auicena uero cap. proprio. mater puerorum. Epilepsia ab Auice. sic describitur est enim aegritudo prohibens membra animata ab operatione sensus & motus, & erectione non integre propter oppilationem contingentem. Est quidem aegritudo in figura, & in situ tam pro positione quam pro societate. Prohibens membra animata, id est in quibus uiget uirtus sensibilis, aut motiua. Ab operatione sensus & motus, & erectione non integre, eo quod si fortis sit, tollit omnem sensum interiorem & exteriorem, licet non omnem motum, prohibet tamen ut corpus possit erigi, imo si sit rectum stare non potest, sed in terram cadit. Si uero sit debilis remanet aliquid sensus interioris, scilicet cogitationis & memoriae, ex eo quod minus laeduntur quam sensus communis, cum magis laedatur uentriculus anterior quam duo posteriores, cuius oppositum est in apoplexia. Et additur propter oppilationem contingentem, scilicet incerebro. non enim absoluitur epilepsia ab oppilatione cerebri, & propterea etiam dicitur morbus in uia.

Cum aliquis cadit in terram, & torquetur, & commouetur, & intellectum amittit, dicimus ipsum epilepticum esse quod, si spuma exit per os, aut se commingit, aut sperma egreditur, aut egestio, passio tunc est grauior & uehementior.

Diuiditur praesens capitulum in duas partes. In prima ponit signa epilepsiae. Secundo curam, secunda ibi. Si autem aeger. Prima in duas. Primo ponit signa epilepsiae in generali. Secundo signa fortitudinis eius, secunda ibi. Quod si spuma. In prima parte ponit tria signa. Primum est, quod cadit epilepticus si rectus sit. Secundum est, quod post casum commouetur, scilicet motibus quibusdam spasmodicis. Tertium est quod intellectum amittit, id est, omnem sensationem interiorum uel maiorem partem, & similiter omnem sensum exteriorem praecipue auditum & uisum, licet forte aliquid tactus in parua epilepsia possit remanere. Haec enim omnia fiunt spiritu sensibili & motiui non debite potestate transire per uentriculos, neque deferri ad membrum propter oppilationem. In secunda parte ponit signum fortitudinis epilepsiae, quod est exitus spumae per os, uel urinae egredi, aut sperma, aut egestionem, & suppleat alias euacuationes, scilicet sanguinis per os aut nares. Haec enim omnia arguunt fortem spasmus propter quem pectus non potest dilatari, & calore succenso in spiritalibus prohibita euacuatione fit spuma, de qua in apoplexia sufficienter dictum fuit. Alii similiter euacuationes sunt propter fortem spasmus, & compressionem musculorum uentris super intestina, & uescam ad quam sequitur expressio urinae & faecum. Similiter ad fortem contractionem uasorum spermatis fit ipsius effusio, & ad fortem contractionem cerebri sequitur expressio sanguinis per nares, & colatorium: non tamen haec omnia in omnibus fiunt, sed quaedam in quibusdam secundum corporum dispositiones.

Quia epilepsia est spasmus uniuersalis secundum plurimum, uel non fit sine eo, sicut spasmus particularis est epilepsia membri particularis, propterea species epilepsiae sunt fere eadem cum speciebus spasmi. Prima diuisio, est enim quaedam species non proportionata ad materiam, & est secundum plurimum. Et quaedam proportionata ad materiam. Et haec est de repletionem, & non de inanitionem, quia epilepsia non potest fieri a siccitate cerebri tantum, primo quia fit subito, sed spasmus siccus non fit subito. Secundo, quia cerebrum non posset tantam siccitatem tolerare ut multum spasmetur quin moriatur corpus prius, cum cerebrum sit membrum principale. Secunda diuisio est, quia alia est a principis generationis, alia ex tempore, & haec est antiqua, aut noua. Item alia est fortis, alia debilis, alia materialis, alia immaterialis. Aliqua fit incipiendo, aliqua permutando ex aliis aegritudinibus, ut melancholia, incubo, & similibus. Item aliqua non periodica, aliqua periodica & cum periodis ordinatis aut non ordinatis, alia cum motibus spasmodicis, alia sine.

Causae epilepsiae quaedam sunt primitivae sicut percussio,

aut

aut in capite, aut in aliquo membro nervoso, aut morfus aëialis uenens, aut sūptio aut applicatio medicing uenenosæ. Siñt ex sex rebus nō naturalibus aer nimis frigidus, aut putridus, aut plenus fumis malis sicut aer plenus fumis eleuatis à carbonibus non potentibus transpirare, lumen intensum subito occurrens, auditus sonorum ingentium & horrendorum, crapulæ, ebrietates, & nimia fames, somnus nimius, retentio euacuationum consuetarum, nimia quies, nimius motus & proprie postrepletionem. Coitus plurimus & nimia abstinentia ab eo, timor nimius, nimiaque tristitia. Sunt etiam quæ dā quæ à proprietate excitant epilepsiam, aut si epilepsia sit occulta ipsam manifestant sicut comestio apii & hepatis hircini, mirra quoque & suffumigiū cornu caprini detegit epilepsiam. Induit quoque pelle hirci nouiter excocti, aut que aliquanto tempore steret infusa in aqua excitat epilepsiam.

Causæ corporeæ per essentiam in cerebro sunt dolor fortis aut mala complexio fiens fortis, aut solutio continui. Causa autē immediata omnis epilepsie est oppilatio coarctatoria, aut ex uapore uentriculos impletæ, & origines ipsius nuchæ & neruorum, aut ex materia phlegmatica secundum plurimum, secundo melancholica, tertio sanguinea, rarissime uero cholericæ. Verum semper oppilatio est causa immediata. Remotior secundum plurimum uapor aut uentositas. Et adhuc remotior sunt humores à quibus uapores & uentositates eleuantur. Oppilatio uero attenuatoria fit ab eisdem causis in meatibus, non in uentriculis. Im plurimum uero fit ab ipsa uirtute contrahente cerebrum stimulatā à re præter naturam, siue sit per essentiam in cerebro, siue aliunde cōmunicatam. Et propterea secundum plurimum epilepsia est cum motibus spasmus, quia ad contractionem cerebri, sequitur etiam contractio neruorum. Et propterea secundum plurimum non est proportionata ad materiam. Epilepsia uero facta ab oppilatione coarctatoria, non concurrente uirtute ad cōtrahendum cerebrum, est secundum plurimum sine motibus spasmus. Causæ autem epilepsie per cōmunitatem sunt, aut à toto sicut in febribus, aut crisi: aut à stomacho propter fortē dolorem, aut fortem famem, & est cōmunitas absolute: aut propter præsentiam humoris calidi aut frigidi in eo cōmunicatis uapores cerebro cōmunitate non absoluta: aut est ab hepate, aut splene, aut ab intestinis, sicut in uermibus, aut dolore forti: aut à mirach, aut à renibus, aut à uesica, aut à matrice & est frequenter, aut à quocunque alio membro particulari, ita ut à pollice pedis per sæpe eleuentur uapores uenenosi, qui dum attingunt caput faciunt epilepsiam. Verum à matrice frequenter fit dispositio mixta ex syncopi & epilepsia, ipsi uaporibus nunc magis cordi, nunc magis cerebro cōmunicatis, & quandoque equaliter. Vapores tamē spermatici sunt deteriores quā mensitrua, & quandoque à uasis spermaticis uiri, cognoui eleuari uapores à spermate alterato facientes epilepsiam fortem sine motibus spasmus, qui tādē cū debitis auxiliis sanitati restitutus est. Signa quidem quibus differt spasmus ab epilepsia superius dicta sunt.

Differt autem apoplexia ab epilepsia, quia epilepsia est cū motibus spasmus secundum plurimum qui non sunt in apoplexia. Differt autem epilepsia sine motibus spasmus ab apoplexia, quia epilepsia im plurimum cito soluitur, & est cum paroxysmis, & rarissime terminatur ad paralyfim. Apoplexia si fortis sit interficit, si debilis terminatur ad paralyfim ferē semper. Differentia uero inter epilepsiam fortē sine contractionibus spasmus quæ terminatur in paralyfim, & apoplexiam debilem, quæ etiam terminatur in paralyfim non est perceptibilis, sunt enim fere eadem, & ab eisdem causis pronunciantes. Et si est signum distinctiū illud sumitur ab ætate.

Signa uero prognostica sunt grauitas capitis, incubus uertigo, & reliqua superius posita in apoplexia: si enim hæc ueniunt in senē, prognosticantur apoplexiam, si in pueris epilepsiam. Si in mediis inter hos, nunc epilepsiam nunc apoplexiam secundum corporis dispositiones.

Signa demonstratiua sunt quæ dicta sunt in textu. Item uiriditas uenarum quæ sunt sub lingua, cum hoc quod est prognosticum, est etiam signum demonstratiuum.

Signa uero epilepsie per cōmunitatem sunt nomenclatura aliorum membrorum præcedentia, cum quorum augmento

multiplicatur, diminutione diminuitur, ablatione aufertur, & etiam quia non fit subito, & æger sentit paulatim aduentum eius, & est cerebrum incolume in suis operationibus nisi tempore paroxysmi. Quando uero est per essentiam sunt signa his contraria. Membrum autem his communicans cognoscitur per ipsius nocumenta. Quæ autē sint materiæ peccantes in capite cognoscitur per signa domini phlegmatis, melancholice, sanguinis, cholere, uentositatis, & uaporum, quæ sæpe dicta sunt superius, præcipue in cephalæa. Causæ autem primitiue sunt sibi signa.

Prognostica. Primum. Epilepsia à generatione rarissime curatur. Secundum, Epilepsia accidens pueris usque ad quatuor annos ut plurimum interficit propter multitudinem materiæ & striditum uiarum. Oportet enim si epilepsia debet curari, ut causæ ipsius remoueantur, si sit materia per expulsionē ad nares, uel per colatorium, aut quod permittetur ad exterius, aut in paralyfim transeat: si sint uapores aut uentositates quod resoluantur: si dolor quod mitigetur, si mala complexio quod æquetur. Tertium, Epilepsia accidens pueris post quartum annum frequenter curatur circa 14. aut. 25. calore facti acutiori, & materiis paucificatis. Si autem his temporibus non curatur, deinceps nō curabitur. Quartum, Epilepsia melancholica est ceteris deterior, licet rarius euenies quā phlegmatica. Quintum, Epilepsia est fortissima cum qua sunt fortes spasmus, deinde quies longa cū prologatione paroxysmi, nec etiam reminiscitur casus, & præcipue si cum ea fuerit expressio alicuius superfluitatis. Sextum, Epilepsia per cōmunitatem secundum plurimum sanatur. Septimum Alaphathi morphæa, aut alia huiusmodi apparatus in cute capitis, aut partibus adiacentibus sunt terminus epilepsie. Octauum, Quando paroxysmi epilepsie continuantur in omni dispositione interficit.

Cura.

Si autem æger ante accessionem sentit quasi aliquid ex aliquo suorum membrorum eleuari, & ascendendo caput petere: & deinde syncopizatur, & cadit, tunc oportet in hora, qua sentit illud, antequam illud accidat, membrum, à quo procedit fortiter ligare: prohibebit namque hoc accessionem euenire. in tempore uero quietis corpus multoties erit euacuandum cum pilulis cochiis. & locus, à quo exoritur passio ex sinapi, & pipere, & euphorbio, ac melle anacardino erit epithymandus, & epithyma dimittendum erit, donec uescitur, & uescia rumpantur, & aqua, quæ in eis est collecta, effluat, ipsæ quoque non cito sunt consolidandæ, quinimo dimittenda, ut quod in eis colligitur, emanet, deinde consolidentur hoc enim huius ægritudinis omnino existit salus, ad ultimum uero uetose cum parua scarificatione superponere utile est.

Hic ponit curam epilepsie. Et primo per cōmunitatem secundo per essentiam in cerebro, secunda ibi. Quod si cum epilepsia. Prima pars in duas. Primo ponit curam epilepsie per cōmunitatem à membris exterioribus. Secundo per cōmunitatem à stomacho, secunda ibi. Aeger uero. Prima iterum in duas. Primo ponit curam epilepsie per cōmunitatem à membris exterioribus inchoantē paroxysmo. Secundo tempore quietis, secunda ibi. In tempore uero quietis, &c. De prima parte dicit, quod æger ante accessionem sentit aliquid eleuari ab aliquo suorum membrorum & paulatim ascendendo caput petere, deinde syncopizat cum illud ad caput peruenit, tunc pro cura oportet, ut, quamprimum sentit illud eleuari, liget membrum à quo illud eleuatur, forti ligatura. scilicet aliqua aluta fortiter stringendo membrum illud supra locū, à quo ille uapor incipit eleuari. Hæc namque ligatura aut omnino prohibet paroxysmum epilepsie, prohibendo scilicet trāscum uaporis uenenosi, aut saltem minuet prohibendo ne totus uapor ad superiora feratur. unde, si uapor à manu eleuatur, ligetur brachium: si à cubito, adiutorium ligetur: si à pedestibus: si à genu: uel infra, ligetur coxa. dicunt etiam, quod si fiat ligatura infra locum, à quo eleuatur, confert diuertendo ad inferiora. de secunda parte dicit, quod tempore quietis inter unum paroxysmum, & alterum erit multoties euacuandum cum pilulis cochiis. sed hic nota duo. Primum, quod euacuatiua debent habere duas condiciones. prima, ut respiciant

spiciat membrum determinatum, a quo debet fieri euacuatio unde forte in casibus iam dictis esset melius euacuare cum pilulis de hermodactilis euacuantibus à locis distantibus, & à iuncturis, aut si simul à cerebro, & locis iam dictis bonum esset has pilulas adinuicem permiscere, sed, ut euacuetur humor determinatus peccans; pilula cochiae à prae dominio euacuat phlegma, si autem peccaret melancholia; oporteret etiam pilulas indas cum istis permiscere, & aliquando aureas, aut sibi similes cholera secum peccante.

Secundum est, ut ante istas euacuationes praecedant digestiones; non enim posset humori euacuari, & praecipue ineptus euacuati, & proprie à locis distantibus, nisi praecedente digestionem: quae etiam digestio debet respicere tam humores peccantes, quam etiam membra, in quibus peccant.

Secundo debet super loco, à quo morbus exoritur apponi uesicatorium ex sinapi, pipere, euphorbio, ana. ʒ. i. mellis ana. card. omnium calida in quarto, quantum sufficit ad incorporandum. & hoc unguentum dimittatur super loco ab octo horis usque ad duodecim, scilicet donec locus notabiliter uescitur; deinde uescit cum acurumpantur, ut aqua in eis collecta effluat, & sic conseruetur ulceratio in loco saltem per uiginti dies aut plures. & iam reiterando uesicatorium, donec materia, quae est radix aegritudinis sit eradicata, postea permittatur consolidari. uentosa quoque cum pauca scarificatione ad hoc sunt proficua trahendo materiam ad exteriora; aut ergo utrumque fiat, aut alterum tantum secundum materiae exigentiam; sed materia existente sanguinea, fortasse uentosa plus conferret. uesicatorium, quo communiter utor, sit ex catharidibus, & fermento permixtis adinuicem cum aceto fortissimo, & loco superponatur ad quantitatem castaneae. & pes coruinus contritus ad hoc ualet, similiter ruta agrestis, sed est leuior. & quando haec non sufficerent propter materiae distantiam à membri superficie, & proprie ubi non essent membra suspecta; sicut in coxa, natibus, spatulis applicetur cauterium potentiale, & permittatur profundari secundum exigentiam, & teneatur apertum per 40. dies.

Aeger uero si ante accessionem nauis, aut tristitiam, aut cordis tremorem sentit: & deinde aegritudinis accessio sequitur; cogendus est multoties vomere ex aliquo vomitu. deinde picram in potu sepe accipere conuenit. stomacho quoque emplastrum ex spica, & rosis, & mastiche, & cortice thuris cum uino odorifero ponendum est. nutrimentum uero eius totum taliter statuendum est, ut paucarum sit superfluitatum, sicut caro frixa in sartagine, & caro cocta in cazoliis, & cibis qui sit de aue quadam, quae habet in palato dentes, et uocatur taguid, & caro de uolatilibus, et hedi.

Ponit curam epilepsiae per communitatem à stomacho dicens, quod si aeger ante accessionem, id est, paroxysmum sentit nauis, id est, inclinationem ad uomitum, aut tristitiam, id est, conturbationem, aut anxietatem stomachicam, aut cordis tremorem, id est, oris stomachi, quod antiqui cor appellauere, aut tremorem cordis per communitatem à stomacho deinde sequit paroxysmus epilepsiae, debemus prouocare uomitum aut cum impositione digiti in ore, aut pene, aut cum aliquo uomitui; sicut ex succo, uel decoctione raphani, in quo steterit infusus elleborus per aliquot dies; sufficit tamen communiter dies una ita, ut de illo succo extracto elleboro sumatur ʒ. 3. cum ʒ. 2. oxymellis simplicis, & sumatur tepidum prius per horam praecedente comestione alagatorum, aut huiusmodi rerum uiscosarum, et incidentium, et exquisitus fiat uomitus. Secundo hoc non sufficiente fumant hieram picram simplicem, aut compositam, ut si quid remansit euacuetur. Tercio confortetur stomachus, ut bene digerat, & ne materiam aliunde recipiat cum hoc emplastro, uel unguento. Recipe spicae calae, & sic in primo, rosarum frigidae, & sic in primo, masticis, calae, & sic in secundo, corticum thuris calae, & sic in secundo, cum uino odorifero aggregetur, & si opus est oleo; addatur masticinum, uel de spica uel cidoniorum: est tamen melius in modum fomenti absque oleo, & cera cum phyllo infuso in uino, & bene expresso, in quo superscripta bene decocta fuerint equaliter de ipsis sumendo. Quarto nutrimentum eius sit bonum,

paucarum superfluitatum, declinans ad siccum, & proprie humore existente phlegmatico, & propterea carnes comedantur assatae, aut frixae in sartagine, aut in cazoliis, quae sunt magis cupae, aliis concauae, quam sartagine; & sint facili digestio; sicut auis uocata taguid quae habet dentes in palato; quae non est in regionibus nostris; sed loco ipsius sint perdicis, turdi, franguelini, phasiani, turtures, quae augmentum faciunt in cerebro, & augent intellectum, similiter caro hodierna, & leporum iuuenum est adhuc conueniens.

Quod si cum epilepsia sensuum affuerit tenebrositas, & debilitas, nec aliqua de praedictis significationibus inueniatur; aegro pilula cochiae multoties sunt tribuenda, & eius conservatio subtilianda, & cibaria, quae diximus danda, gargarismus quoque fieri debet, & sternutatio ex his, quae diximus, prouocanda, ac naribus paeoniae pulvis subtilissimus, qui similiter alcohol, insufflandus.

In hac parte ponit curam epilepsiae per essentiam primam phlegmaticam, secundam sanguineam, tertio ponit electarium. quarto redit ad complendum curam sanguineam, secundum ibi. Si quis autem, tertio ibi. Electarium, quarta ibi. Electarium hoc de prima parte dicit, quod si cum epilepsia fuerint tenebrositas sensuum, id est, corruptio, & debilitas, id est, diminutio sensuum, scilicet tam interiorum quam exteriorum, nec aliqua significatio de praedictis inueniatur, quae nobis significet epilepsiam fieri per communitatem ab aliis membris, & hoc maxime quia sentit accessionem eius; tunc aegro sunt multoties danda pilulae cochiae, quia materia secundum plurimum est phlegmatica, sed attende ut supra, quod digestionem praecedant, secundum conseruationem, id est, diata est subtilianda sicut dicitur, & cibaria iam dicta sunt danda. Tercio fiat etiam gargarismus & sternutatio, & supple etiam masticatio cum his, quae saepe dicta sunt in capitulis praecedentibus. Quarto pulvis paeoniae, scilicet radices, aut seminis eius calae, & sic in secundo, & proprie in epilepsia subtilissimus, sicut alcohol, id est, pulvis, qui in radiis solis apparet, est insufflandus naribus.

Si quis autem cum epilepsia in facie, & oculis rubedinem habuerit, & uenarum crassitiam; phlebotomandus erit ex saphena sanguis, & ex carnositate tibiaram cum uentosis erit extrahendus. capiti praeterea oleum rosae, & acetum superinfundatur, & abstineat à uino, & à cæpis, & alijs, ac sinapi, & porris, & apio, & fabis, & canabith, & postremo ab omnibus sumum caput ascendentem, & repletem generantibus.

Ponit curam epilepsiae pendens à sanguine, & cerebro, & à toto communicata, quae cognoscitur per rubedinem oculorum, & faciei, crassitiam uenarum, & alia signa, de quibus supra. tunc in primis facienda est phlebotomia de uena saphena, sed melius ex ambabus; deinde (ut legatur ultima pars huius capituli) ex uena basilica, & supple, aut cephalica, & postea, si oportuerit, ex uenis magis propriis, sicut ex uenis, quae sunt sub lingua, post aures, in fronte, in cute capitis, non dico in omnibus, sed in quibus uidebitur magis expedire: quod cognoscetur ex ipsarum tensione & crassitie, & etiam ad diuersionem docet ex carnositate tibiaram fieri cum uentosis scarificationem, cuius simile, si oportuerit, faciendum est in natibus & in spatulis. tertio frontis, temporibus, aut parti anteriori apponi oleum rosaceum triplum ad acetum ad infrigidandum, & repercutiendum. Quarto aeger caueat à uino, carnibus omnibus sanguinem multiplicantibus, necnon à cæpis, alijs, sinapi, porris, apio, à proprietate excitante epilepsiam, fabis, canabith, quae est caulis imperialis scilicet capitium, & ab omnibus ad caput euaporantibus: sed comedat ea, quae sanguinem infrigidant, sicut panicum, endiuia, acetosam, & similes, & bibat rob. id est, succum per decoctionem inspissatum ad solem, fructuum acetosorum, sicut agrestis granati, & similia.

Electuarium quod omni epilepsiae speciei remedium affert. Recipe piretrubri, sileos, staezados, omnium ana drach.

10. agarici drach. 3. cordumeni recentis, & acuti, affæ op-
tima, aristolochie, omnium ana drach. 1. & mediam: deinde
extrahatur succus ex scilla mixtis cū pari quantitate mel-
lis. coquatur, & conficiantur ex eo species, & fiat electariū,
ex quo patiens quotidie sumat, & caueat sibi à cibis crassis.
electarium hoc omnibus epilepsie speciebus excepta una san-
guinea, quam Gal. nominauit, & nos etiam iam fecimus mē-
tionem, opitulatur. cui uidi conferre phlebotomiam ex sa-
phena prius, et postea ex basilica: deinde eius regimen sit ex
his quæ sanguinem in corpore minuunt, & ipsum infrigi-
dant, à carne præterea, & uino abstineat. & bibat rob ace-
tosorum fructuum. capiti quoque superponantur ea, quæ ip-
sum infrigidant.

Hic ponit electarium conferens omni epilepsie præter-
quam sanguineæ, & cholerice, cuius descriptio est hæc. Reci-
pe pirethri cali. & sic. in tertio, aperitui oppilationum, colā
torit, & narium extrahentis phlegmatis seleos, id est, sileris
montani cali. & sic. in secundo multum ualentis in foda, & ad
impregnationem mirabilis, confortatiui stomachi, & uiscer-
um: itocados capitalis, maxime solutiui phlegmatis & cho-
leræ, mundificatiui cerebri, & neruorum ana. 3. 10. agarici:
quod est medicina domestica euacuans à cerebro, & neruis.
3. 5. cordumeni, id est, carui agrestis, uel cardamomi cali. &
sic. affæ cali. in quarto, sic. in secundo resoluētis uentositatē,
& propriæ in epilepsia: aristolochiæ rotundæ cali. & sic. in se-
cundo resoluētis uentositatem. ana. drach. 1. s. de his accipia-
tur secundum dosim prædictam descriptam in textu, & cum
succo scilicet scillæ multum incisuo, & solutiuo phleg. &
melle ana quantum sufficit fiat electarium, primo bulliēdo
succum scillæ cum melle, donec sufficienter despumetur: po-
stea addatur pulueris suprascripti pro unaquaq; lib. 3. 1. &
s. & de hoc accipiat in mane ad quantitatē nucis, & possit
accipere de eo in sero, cum itur dormitū saltem per duas horas,
aut tres post cenam leuem.

Cura epilepsie est duplex, quædam enim administranda tē-
pore paroxysmi, diuertendo cum frictionibus, ligaturis for-
tibus, iteratis, & sternutationibus, & suffumigiū ex assa ci-
to remouet paroxysmū. & uocetur uocibus fortibus, & eius
facies aqua frigida aspergatur, nec non digiti cōtorqueātur
uerum in hoc differt à cura apoplexiæ; quia non oportet ut
faciamus in paroxysmo eius euacuationes, quæ percipiūtur
in apoplexia, cū sit breuis terminationis. neq; in apoplexia
sunt sternutationes, quæ hic præcipiuntur, cum propter mul-
titudinem materiæ sit ibi timor de ei' agitatione maiori, quā
in epilepsia cum à pluri materia pendeat. hi etiam uersus in
aure dicti subito releuant à paroxysmo.

Gaspar fert myrrham, thus Melchior, Balthasar aurum.

Hæc tria, qui secum portabit nomina regum,

Soluitur à morbo Christi pietate caduco.

Qui etiam secum hæc portat, liberantur ab epilepsia. Vbi
uero paroxysmi epilepsie essent continui, oporteret phlebo-
tomare, & euacuare secundum exigentiam materiæ: sicut in
apoplexia. Et extrinseca fortia applicare sicut uescantia cau-
teria, & etiam sartagine ferream ut in apoplexia &c. cura
epilepsie à uulnere capitis, si eueniat propter compressionē
ossis supra cerebrum, aut retentionem materiæ, tunc ipsum
os subleuetur aut amoueatur. & procuretur, ut materia tran-
spiret. & si cerebrum sit apostematū, curetur cura aposte-
matis superius dicta, & uidenda quinta quarti ab Auic. Si
uero pendeat à uulnere membri neruosi, sicut à punctura ex
cæcata, aperiat uulnus: ut materia trāspiret, & interior im-
ponatur oleum rosaceum calidum cum pauco sulphuris. &
ad apertum dolorem membrum in oleo calido teneatur, &
desuper lumbrici terranei in oleo costi superponantur, &
curetur uulnus, & apostema eius, si fuerit secundum, quod o-
porteret: si autem curato uulnere epilepsia remaneat: curetur
sicut epilepsia materialis, de qua infra, prouenit enim pro-
pter aggregationem materiæ determinatis periodis, uirtute
digestiua, & expulsiua cerebri debilitatis. Si uero pendeat à
morsu animalis uenenoſi, fricetur locus morsus, ut sanguis
exeat, aut uentosa cum scarificatione superponatur, & em-
plastra attractiua, & propria contra genus animalis mordē-

tis, & inter cætera applicatio animalium nouiter interfecto-
rum apertorum cum calore actuali confert trahendo ad se
uenenū, etiā ipsa uiua cum ano applicata conferunt, & locus
superior defendatur cum aceto, & forti stricture per magnā
partem eius, & membra principalia confortentur cum inte-
rius, & exterius applicitis, præcipue cum theriaca, & beza-
hartica cōtra illud uenenum exhibeantur: nec in his casibus
competunt solutiua saltem fortia, neq; phlebotomia. Si uero
sumpserit uenenum; procuretur ipsius uomitus exquisitus. &
si quid superest cum lenientibus educatur; sicut cum multo
oleo calido sumpto, aut casia & clysteri. Tertiō mēbra prin-
cipalia confortentur, & dentur bezahartica contra ista uene-
na. & in hoc casu non competit phlebotomia. Si uero pen-
deat ex labore, aut ex aspectu luminosorum, aut ex auditu so-
norum terribilium, aut ex timore, & cæteris animæ acciden-
tibus; primō causæ primitiue remoueantur: secundō induca-
tur somnus, & quies, & reliquum regimen secundum quod
oportet, ordinetur. & si humores positi sint in fluxu; diuer-
tantur, & quietentur.

Si uero pendeat ab aere malo uenenoſo, aut foetenti, aut
putrido, aut pleno uaporibus malis, sicut carbonum, causæ
primitiue remoueantur: sicut frictiones, & reliquæ diuersio-
nes. & procuretur uaporis in capite contenti resolutio cum
frictione aliquali capitis, & pectinatione. exhibeanturq; illa
quæ cerebrum, & cor confortant interius, & exterius appli-
cata, & odorata. non tamen stiptica, & ualde oppilantia sup
capite ponantur. ex his potest elici cura epilepsie penden-
tis à reliquis primitiuis.

Cura epilepsie per communitatem septem completur in-
tentionibus, prima euacuat. secunda diuertit tam à membro
mittente, quā à cerebro. tertia dispositionem membri mit-
tentis corrigit, ipsum confortando. quarta uis transitus ad ce-
rebrum claudit, & intercipit. quinta cerebrum confortat, ne
recipiat. Sexta accidentia corrigit. Septima ordinat debitū
regimen sex rerum non naturalium. unde, si pender à mēbro
exteriori, ut puta à uapore eleuato, à coxa, uel genu, primō
materia proportionalis illi euacuetur. Secundō uapores di-
uertantur fricando & ligando partem illam inferiorem. scilicet
biam. Tertiō materia ex loco eradicetur apponendo super
loco uescitā, aut cauteria. Quartō locus superior stringat
forti stricture. ut uapores non possint ad superiora penetra-
re. Quintō confortetur cerebrum cum interius, & exterius
applicitis; ne huiusmodi materiam recipiat. Sextō, curentur
accidentia. Septimō regimen ordinetur secundum quod dic-
tetur, & plures harum intentionum simul sunt perficiendæ
similiter, si pēdeat à stomacho, aut à matrice, aut à uasis sper-
maticis, & cæteris membris; procedat, ut iam dictum est.
& ego ponam exemplum de epilepsia per communitatem à
matrice. primō ergo fiat euacuatio proportionalis materiæ,
peccanti, ut si pendeat à phlegmate, euacuetur. Secundō ma-
teria, & uapores diuertantur frictionibus, ligaturis, apposi-
tionibus uentosarum in coxis, & tibiis descendendo. Tertiō
materia ex matrice eradicetur prouocando menstrua cum
phlebotomia saphenarum, aut uenæ, quæ in curuatura popli-
tis, & cum nastalibus prouocantibus, inter quæ principatum
obtinet farina gith cum mercuriali supposita in matrice, &
cæteris remediis mēstrua prouocantibus, & materias in ma-
trice contentas eradicantibus: & si esset spermatica; coitu
educat si fieri posset, aut sibi proportionali, aut cū exiccanti-
bus sperma procedat. Quartō uix intermediæ claudant cum
stipticis applicitis circa regionē renū, & umbilici, & debi-
ta stricture. Quintō caput confortetur, ne recipiat, cum inte-
rius, & exterius applicitis. Sextō accidentia curentur. Sep-
timō regimen ordinetur, secundū quod dicitur in epilepsia
per essentiam. Cura epilepsie per essentiam sex exigit in-
tentiones curatiuas. prima digerit, secunda euacuat. tertia di-
uertit, quarta causam coniunctam resoluit, & eradicat: quin-
ta corrigit accidentia, sexta ordinat debitū regimen sex rerū
non naturalium. & in omnibus his semper sit intentio ad ce-
rebrum confortationem. Digestio uero in phlegmatica per-
ficatur cum melle ros. oxymelle simplici, oxymelle compo-
sito scyllitico, syrupo de itocade: & fumantur cum decoctio-
nibus propriis, scilicet hyssopi, pæoniæ, itocados, pyrethri
assæ, acori, organi, sileos, aristolochiæ rotundæ. si uero sit
melancholica,

melancholica, tunc detur syrupus de epithymo cum oxymel scyllitico cum decoctione epithymi detur. syrupus de pomis dulcibus superius descriptus in soda melancholica cum decoctione iam dicta. tamen multa inferius ponetur in cura melancholicæ, quæ huic capitulo accommodanda sunt.

Secunda intentio in phlegmatica perficitur cum pilulis cochiis, hiera composita Gal. hiera diacolocynthidos & similibus; sed in mixta ex phlegmate, & melancholia est hoc proprium. Recipe siseleos, aristolochiæ rotundæ castorei, salis indi. ana. 3. 4. radicis pœoniæ, trochiscorum de scylla ana. 3. 6. pul. hieræ pic. stecados, epithymi ana. 3. 10. polypodij. 3. 8. agarici. 3. 12. colocynthidis. 3. 11. turbith. 3. 15. mirobala. nigrorum, belliricorum, emblicorum ana. 3. 3. lap. lazuli. 3. 13. & mirobalanorum citrinorū, ellebori nigri, chamæpitos, chamædryos ana. 3. 8. & confice pilulas cum melle scyllitico, dosis est à drach. 1. usq; ad 3. 1. semis. sed ad materiam melancholicam est hoc proprium. Recipe hieræ picæ. 3. 5. epithymi. 3. 10. lapidis lazuli loti. 3. 7. scammonæ. 3. 1. colocynthidis, ellebori nigri, spicæ ana. 3. 2. confice pilulas cum aqua mellis, dosis est 3. 1. sed post eas sumant tres uncias decoctionis epithymi, & passularum. In epilepsia cholerica, quæ rarissime accidit, digestiua, & euacuatua accipiantur, quæ superius dicta fuerunt in soda cholerica. In sanguinea uerò fiat phlebotomia, aut ex saphenis multa existente phlethoria, aut si retenta sunt menstrua, aut sanguis hæmorrhoidalis, & postea procedatur ad phlebotomiam cephalicæ. Si uerò hepar fuerit in causa phlebotometur basilica: deinde cephalica secundum plurimum, tamen sufficit phlebotomia cephalicæ, postea phlebotometur uenæ sub lingua, & aliæ uenæ particulares, ut supra in soda & karabito. Tertia uerò intentio scilicet diuersio perficitur cum frictionibus primò leuioribus, deinde fortioribus, & lotionibus crurum, & brachiorum cum rebus propriis superius nominatis. materia etiam diuertatur cum clysterijs, quorum hæc est descriptio scilicet, R. alafæ, hyssopi, absinthij, ana. 3. 5. pulpæ colocynthidis. 3. 2. cetauræ, minoris drac. 4. carthami. 3. 1. s. bulliant in quatuor lib. aquæ ad consumptionem dimidij, de qua accipiantur. 5. 15. & cū 3. 5. olei de kerua, fiat clystere. Clysteria quoque in apoplex. dicta in hoc conueniunt; diuersificentur tamē secundū materiæ exigentiam.

Quarta intentio, scilicet eradicatione materiæ coniunctæ perficitur cum sternutatorijs, masticatorijs, gargarismatibus sæpe superius dictis, & ex proprijs est pyrethum, mastix, & cubebe, quibus potest fieri gargarisma, & masticatorium. secundò cum iniectionibus in narib. sicut pulvis pœoniæ subtilissimus, & cum iniectionibus in aurib. sicut pulvis spicæ nardis; nam curat per se. & ad hoc ualent sacculi capiti appliciti, & proprie super commissura coronali, & sagittali, & itocæs, ruta, pœonia, maiorana, nux muscata, & similes. similiter ualet pulvis mustelæ, & sanguinis eius & pulvis, & pulvis hirundinum, & pulvis iecoris milui injiciatur in aurib. & narib. balsamus et si iniectus, & sub lingua, uel palato positus est proprius. odorata etiam conferuntur ruta, nigella, maiorana, & etiā comesta sicut theriaca, mithridatum, diamusculus, diapliris arcticon & similes. sed inter cætera duo sunt ultima curantia epilepsiam cerebralem; si manu humana potest curari, unum est ut fiat contractio materierum de profundo capitis ad cutim ita, quod in cute fiat alfafati: ad quod faciendum ponatur super magnam partem capitis, & proprie super commissura coronali, & sagittali hoc emplastrum capite rasō. R. amoniaci dissoluti cum pinguedine anatis, aut milui quæ est magis propria. 3. 2. fermenti. 3. 1. sina. subtiliter puluerizati. 3. s. cantharid. 3. s. pœoniæ. 3. 2. fiat emplastrum, & dimittatur super loco, donec rubescat, & uestigas faciat, & crustas: deinde remoueat, & cum pinguedine milui fiat inunctio: postea iterum emplastrum apponatur, & sic toties fiat nunc cū uno, nunc cum altero, donec crustæ, & alfafati in capite accendant, & sic per longum tempus usq; ad duos menses, aut plures conferuentur. reliquum est, ut fiat cauterium actuale aut potentiale in commissura coronali usq; ad ossis superficiem, & ita ulcus per duos menses, aut plures cōseruetur apertū.

Quinta intentio corrigit spasmus, & dolorem ex ipso accidens inungendo spondiles cum oleo liliorum alborum,

uulpino, & de costo descriptione Mesuæ. præseruetur autem ab iminentibus periculis, ne ster super aquis, aut prope ignem, & similia. Sexta autem intentio est, ut ordinetur aer in phlegmatica, & melancholica, ut sit declinans ad cal. & sic in phlegmatica, & sit temperatum in passiuus in melancholica: in sanguinea aut, & in cholerica ad temperamentū; permuetur quoque regio iuxta aphorif. secundæ particula. Epilepticorum uerò iuuenibus. & sit boni odoris artificialiter cum sparsione foliorum lauri, rutæ, iuniperi, & cum aulculis cipri, gallia muscata, iadano, & puluere pœoniæ & c. salata sit ediuia, ruta, cichorea, foeniculus, asparagus, cappares cum aceto parum acuto, item menta, maiorana, rosmarinus, pentaphyllon, de quo Auicenna scribit, quod bibitum cum uino triginta diebus sanat. euitet erucam, allium, & cætera euaporantia.

Aromatizet cibaria sua cum nuce muscata, cinnamomo, gariophyllis, mace, sifeli, & semine pœoniæ. potus eius sit uinum pauciferum medijs coloris non uinosum nec antiquum, sed unius anni bene depuratum: nam ut dicit Auic. parum ex ipso sumptum dilatat animam, & excusat à multitudine aque, nam ipsius multiplicatio est nociua ualde. summè etiam ualent uina artificata cum salina, & rore marino, iuxta doctrinam Diosc. & Arnoldi. sed aqua mellis, & proprie cum paucis piperis, cinamomi & gariophyllorum est præstantior in phlegmatica. carnes sint faciles digestionis, boni nutrimenti, paucarum superfluitatum: & aues sæpius dictæ sunt præstantiores, quàm quadrupedes, & proprie cures, quæ augmētum faciunt in cerebro, & intellectu, secundum canon. capite de duragi: & proprie cerebra debite preparata conueniunt, & sint carnes istæ prius leuiter elixæ, deinde affæ, uel fixæ similiter carnes musculosæ conueniunt, pingues uero euitentur. euitet etiam omnia dantia nutrimentum crassum, ac superflue humidum: oua forbilis conueniunt in fine mensæ comedat pyrum assum, uel conditum. sit coena leuior prandio, nec etiam comedat nisi celebrata digestionem cibi præcedentis, & ieiunet semel aut bis in hebdomanda, non tamen tolleretur multum famem. non bibat extra horas cibationum, nō multiplicet cibaria in mensa una. exercitetur stomacho ieiuno intensius, & exterius notabiliter secundum tolerantiam uirtutis. non tamen exercitium sit nimis intensum, imo potius longum quàm intensum & monet Auic. quod cum infirmus mouet superiora, moueat etiam inferiora. & induatur secundum tempora leuibus non grauantibus, ut pellibus agnorum, dorforum uarij, luporum, ceruinorum & similiū. & in æstate sint suffulti cendalo de grana, & similibus. studeat quantum potest stare rectus, & capite leuato, nec iaceat nisi tempore somni. somnus non sit meridianus, nec nimis longus, nec nimis breuis, nec supra repletionem. & dormiat super altero laterum, & non supinus. studeat euacuare superfluitates omnes per conuenientes regiones. & leuis frictio capitis, & peccinatio confert sacibus expulsiis. nec coeat, nisi præter modum stimulatus fuerit. Accidentia sint quæta de clinando ad lætitiā. sunt etiam quædam laudata ab autoribus in epilepsia, quorum quædam subiungam ex magis proprijs, quibus in toto processu, aut aliquo eorum utendum est. primum est uestica apri immediate cum abstracta est cum urina sua, quia nunquam est uestica in animali sine urina: hæc cū rota urina posita in furno aut alio modo ad ignem excicata, donec possit puluerizari exhibita in quantitate fabæ cum 3. 1. oxymellis, aut media, singulo die stomacho ieiuno sanat, autoritate Alexadri, quia refert se uidisse quosdam sanatos in tertio die assumptionis. Secundum est pyrethrum conditū, sicut cōditur zingib. autoritate Hip. in singulo die exhibitū est medicina fidelis. pœonia secundum omnem modum administrationis, scilicet radix & semen ita, quod etiam appensa collo ualet autoritate Gal. sed sumat à stipite habere florem album. coagulum leporis bibitum in quantitate parua scilicet à sex granis usq; ad decem cum aqua mellis, aut maiorana, aut ruta. hepar asinum affatum & comestum ualet autoritate Diosc. cerebrum cameli & mustelæ excicata & potata perfecte curant Gal. in libello de theriaca. item pulvis mustelæ, hirundinum combustorum, hepata etiam milui, cornu cerui, bibita aut singulariter, aut coniunctim liberant.

ruta

ruta syluestris contrita, naribus imposita alleuat paroxysmum, & eū retardat. uiscus quercinus interius sumptus, uel collo suspensus. item ben, betonica, aut folia trifolii & semē cum aqua bibita, aut assa cum sagapeno mixta; uel putā affa. 3. s. sagapeni. 3. i. hęc mixta cum aqua & uino potu sumpta ualent. antimonium à proprietate confert. ossa capitis hominis combusta, & cum uino subtili bibita singulo die. 3. i. galbanum suffumigatum reuiuiscere facit epilepsiam. ungula asina combusta, & trita, & in potu data, ualet. britonia si sumatur. 3. i. aut. 2. præseruat ab epilepsia per totum annum, si semel sumatur auctoritate Dioscori. lapides, qui reperiuntur in uentre hirundinis primò natæ apud augmentum lunæ, ualent auctoritate Azarui, si ponantur in subscella sinistra, aut puluerizati & bibiti. Smaragdus collo suspensus, & similiter potatus, optime ualet. similiter caput cuculli collo suspensum præseruat ab epilepsia, attrahit ipsam ad se cum singulo mense patiatur epilepsiam sicut magnes attrahit ferrum. & hęc dicta sufficiant de epilepsia.

De incubo.

Cap. 15.

Incubus ab incubando dictus, eo scilicet quod appareat phantasma graue incubare homini, in somniis, ac si cum eo cubaret. Quod phantasma homines dormientes se eundem plurimum reputant esse dæmonem. Quod forte aliquando est uerum. Sed minus post aduentum Christi, cum antea cum hominibus magis conuersarentur. Propter quod sciendum de intentione Augustini. 15. de ciuitate Dei & sancti Thomæ in prima parte suæ theologiæ q̄ reperiuntur dæmones qui dicuntur incubi & succubi imò unus & idē est incubus postea succubus. Vnde dæmon aliquando suscipit formam quam ex aere conficit, colorem enim suscipit per multam condensationem sicut aqua per congelationem. Assumit ergo formam alicuius mulieris cum aliquo uiro cōfuetæ, & cum illo succubo uir coit putans se coire cum muliere cuius formam dæmon assumpsit, cum dæmon sit succubans in modum mulieris: & recipit sperma quod cōseruat. Et factus postea incubus accipiens formam uiri alicui mulieri cōfueti, & secum coiens interdum ipsam impregnat. Nec est dicendum inde genitum esse filium dæmonis, sed uiri cuius sperma recipit, quod postea in matricem iniecit, sicut nec impregnata in Lauello secundum quod recitat Auerrois, peperit filium Lauelli, sed eius qui spermatizauerat in Lauello. Et hoc modo affirmant doctores fuisse genitos gigantes, quorum maior copia fuit ante diluuium quàm post. Describitur autem ab Auic. prima terti, tractatu. 5. capite proprio sic: Incubus est ægritudo in qua homo sentit cum somnum ingreditur phantasma graue super se cadens & comprimens ipsum & angustiat eius spiritus, & interfecatur uox ipsius & motus eius, & fortasse præfocatur propter pororum oppilationes, & cum ab ipso separatur excitatur eum subito. Est quidem ægritudo quia sensibiliter lædens operationes. Si enim incubus accipiat pro oppilatione est ægritudo in uia. Si uero accipiat pro istis actionibus læsis, scilicet motu, anhelitu, & uoce. quamuis sit actio uel actiones læsæ, & per consequens accidens ægritudinis, est tamen ægritudo ex eo quod motus impeditur impedit anhelitus, & anhelitus impedit uocem. Sentit autem homo cum somnum ingreditur phantasma graue cadens super se & comprimens se, quod phantasma secundum plurimum existimat esse dæmonem propter opinionem uulgariam, quod dæmones de nocte ambulent, & cum hominibus coniungantur ipsos lædentes. Illud enim nocumentū perceptum in somno facit hominem sic iudicare. Si uero non esset opinio de huiusmodi dæmonibus, existimarent esse aliud graue alterius generis. Primum autem quod impeditur est motus, prohibito debito transitu spirituum ad membra mouenda propter oppilationem diminutam secundum plurimum in priori uentriculo, & ad motus impedimentum sequitur impedimentum anhelitus & uocis, & hoc propter oppilationem pororum, id est, uiarum spiritus. Et cum ab eo supple incubus separatur excitatur hominem subito, erat enim forte excitatus uel leuiter dormiens, licet propter hoc nocumentum uel hęc nocumenta non posset exire in operationes. Ex quo inferitur huiusmodi oppilationem sic

ri à leui causa. Virgilius tamen. 12. Aeneidos loquēs de Turno optime incubum describit in his uersibus.

Ac ueluti, in somnus oculos ubi languida prelsit

Noctē quies, nequicquam uidos extendere cursus

Velle uidemur, & in mediis conatibus egri

Succidimus, non lingua ualet non corpore notæ

Sufficiunt uires, nec uox nec uerba sequuntur.

Sed instatur quia etiam deberet fieri incubus in uigiliis, quia causa oppilans potest esse in uigiliis & etiam in uigiliis contingit oppilare. Ad quod dicendum incubum rarissime inueniri in uigiliis cum uapor qui est causa cōiuncta sit multo magis aptus resolui in uigiliis & motibus quàm in quiete & somno, non tamen neganda est possibilitas. Secundo instatur, quia deberet etiam impedire sensus, sicut motus impedito transitu spirituum. Ad quod dicitur leuem oppilationem posse impedire motum, non sensum, cum plures spiritus ad motum q̄ ad sensum requirantur. Et si impediret etiā sensum tunc esset epilepsia.

Ex quo apparet differentia inter incubum, epilepsiam, & apoplexiam tam ex parte causæ quàm accidentium. Incubus est duplex, quidam fortis & frequens, quidam debilis & rarus. Item quidam materialis, quidam immaterialis: quidā per essentiam, quidam per communitatem.

Causa immediata eius, qui per essentiam est, est oppilatio in priori uentriculo uel in origine nuchæ à uapore crasso, aut paucissimo humore facile resolubili. Causa antecedens est sanguis, phleg. aut melanch. à quibus huiusmodi uapores eleuantur.

Causæ primitiue sunt omnes quæ possunt huiusmodi uapores excitare. Aliquando uero fit à frigore extrinseco oppilante originem neruorum attenuatorie, nec est negandum quin possit fieri à dæmone. Somnus etiam resipiscens est multoties causa eius, tertia primi, cap. de somno & uigilia, materie in uentriculo posteriori congregata, ad quem non terminantur uix expulsiōis, sicut ad primum & secundum.

Causæ autem per cōmunitatem sunt oppilatio in corde: aut in arteriis apoplecticis à simili uapore aut à similibus causis primitiuis &c.

Signa incubi absolute habentur ex relatu ægri. Signa causarum primitiuarum sunt ipsæmet causæ. Verum difficile esset cognoscere esse dæmonem, nisi per signum sumptum à cōferentibus, ut quia falsio recederet per coniurationes & similia quæ non pertinent ad medicum. Signa autem causarum antecedentium possunt esse nota ex sæpe dictis. Sed quod sit per essentiam cognoscitur propter aliquam ægritudinem capitis, aut dolorem, antecedentes, aut subsequentes, nec non ex uertigine & tinnitu. Si uero sit per communitatem nihil horum adest, sed forte nocumenta aliorum membrorum antecedunt. Item si prouenerit propter decubitus resupinum significatur esse per essentiam.

Prognosticum. Primum, incubus est antecessor unius trium ægritudinum, apoplexiæ, epilepsiæ, aut manie siue melancholiæ. Secundum prognosticum. Habentes corpus debile secundum cerebrum sicut conualescentes aut habentes malitiam complexionis cerebri sunt aptiores ad incubum, & apti magis ab ipso lædi.

Cum quis in somno quasi graue aliquid super se cadere senserit; incubum pati nuntiandus est. in ipsius itaque cura non est tardandum; ipse enim epilepsiæ præambulus est: ipsa namque præcedit. æger ergo si in colore rubeus fuerit, & uenas habuerit plenas; ex saphena erit minuendus. & uentose in carnositate tibiæ ponendæ sunt. æger præterea potu uini, & rerum dulcium comestione abstinendus erit, & præcipue ab omni re, quæ multum generat sanguinem. quod, si huic contrarium accidit; uenter ex pilulis cochij multoties erit soluendus, & eius regimen subiliandum, exercitio quoque utendum erit, & mēbra inferiora erunt fricanda.

Rasis determinans de incubo, primo notificat ipsum, secundo ostendit festinandū esse ad curam cū sit præambulus epilepsiæ.

Io. Arculani.

E

lepsiæ.

lepsiæ, tertio curans ipsum, si pendeat à sanguine multo, phlebotomat saphenas, & uentosas docet apponere in carnositate tibiæ ad diuersionem, prohibet uinum, res dulces & omnia generantia multum sanguinem. Si uero contrarium acciderit, id est, quod pendeat à phlegmate, uenter multotiens erit soluendus cum pilulis cochiis, & eius regimē subtiliandum quod declinet ad calidum & siccum. Et æger exercitandus est ad materiæ & uaporum resolutionem, & mēbra inferiora erunt fricanda gratia diuersionis. Cura omnino perficitur sicut in epilepsia: & propterea omnes intentiones ibi posite, & ea quæ illas perficiunt sunt huic cap. accommodanda. Ex eis tamen quæ optime conferunt, sunt grana pœoniæ in potu secundum continuitatem sumpta. Incubus etiam melancholicus curetur secundum ibidem dicta, & in cap. de melancholia dicenda.

De melancholia.

Cap. 16.

Melancholia dicta æqui uoce, de melancholia humore, & melancholia ægritudine, dicitur à melan. Græce, nigrum Latine, & choli fel siue cholera. Vnde melancholia quasi nigrum fel siue nigra cholera. Describitur ab Auic. prima tertiū tract. 4. cap. proprio, quod est mutatio existimationum & cognitionum à cursu naturali ad corruptionem & timorem & malitiam propter complexionem melanch. facientem syluestrem spiritum cerebri, facientem ipsum timidum propter tenebras ipsius sicut tenebræ extrinsecæ sollicitant, & timere faciunt, sicut quod complexio frigida & sicca contraria est spiritui debilitans ipsum, sicut complexio calida & humida ut complexio uini est conueniens & confortans. Dicitur mutatio existimationum & cogitationum, & supple, etiam imaginationum aliquando ad corruptionem & timorem & malitiam, id est iudiciū peruersum, cum indicent melancholici recta & honesta, inhonesta & non recta, eliciantque inimicitiam pro amicitia. Et frequenter etiam imaginantur ea quæ non sunt ut latrones esse in domo aut dæmones. non autem corrumpitur memoria cum sit in cerebro posteriori, sed uirtutes iam dictæ sunt in anteriori, licet lædatur reminiscencia quæ perficitur per actum cogitatiuæ. Et per hoc differt à corruptione imaginatiuæ, siue cogitatiuæ, cum melanch. dicat corruptionem duarum uirtutum. Differt etiam à stoliditate & amentia, quia stoliditas est diminutio uirtutis cogitatiuæ: Amentia uero, quasi sine mente, cogitatiuæ ablatio quantum ad principalem actum eius, qui est discursus; non enim magis discuntur quæ infantes: propterea dicitur infantilitas: posset tamen dici, & forte conformius communi opinioni quod ly & tenetur diuisione. Subditur causa harum corruptionum cum dicitur propter complexionem melancholicam, ipsa enim siue cum materia siue sine materia facit spiritum cerebri syluestrem, id est, non domesticum, sed solitarium. Interius, id est in parte interiori. Et facit ipsum timidum, id est, timorem representantem, uel timidum, quia fugientem in modum timidi, propter tenebras ipsius melanch. uel ipsius spiritus: nam sicut tenebræ extrinsecæ sollicitant hominem, & timere faciunt, sic tenebræ intrinsecæ sollicitant spiritum, & timidum reddunt. & probat. Istud est, quia complexio melanch. frigida & sicca est contraria spiritui, quemadmodum complexio calida & humida, ut complexio uini, est conueniens & confortans ipsum spiritum. Ex quibus inferunt melancholiam corrumpere existimationes & cogitationes; & primo propter complexionem, secundo propter nigredinem & tenebrositatem, tertio quidem propter id quod sequitur ex his propter formam specificam occultam siue complexionem insequentem materiam, quæ forte plus ad hoc concurrat quam complexio aut tenebrositas. Sed in hoc utrum nigredo siue tenebrositas melancholiz aut spiritus, aut substantiæ uentriculorum concurrant ad corruptiones harum uirtutum est magna differentia, & altercatio inter Auerroem tertio colligit iuxta finem & sequaces eius & modernos medicos. Auerrois namque opinatur nigredinem siue in humore, siue in spiritu, siue in cerebro nullo modo esse causam harum corruptionum, & timoris, aut tristitiæ, quia tunc sequeretur colorem esse ægritudinem, cum immediate & per se lædat operationes, scilicet debitam receptionem specierum cogitabilium in spiritu & eas indebite representent uirtuti

cogitatiuæ, quia sub ratione horridi & tristis, consequens tamen est falsum cum nunquam distincta, sint genera ægritudinum nisi in malam complexionem, & compositionem, & solutionem continui. Econtrariò uerò medici contrariam Auerrois instant. Quia cuius temperies est sanitas, eius intemperies est ægritudo per locum à contrariis: sed luciditas spiritus, & cerebri est causa, quod species recipiantur sub ratione conuenientis, si obiectum tale sit: ergo tenebrositas erit causa, quod recipiantur sub ratione horridi, tristis, & disconuenientis, & per consequens nigredo in spiritu, siue tenebrositas erit ægritudo. & confirmatur, quia color corneæ, & crystalloidis est ægritudo impediens debitam receptionem specierum uisibilium. secundò quantitas aucta, aut diminuta est ægritudo, & mediocritas est sanitas: ergo ita erit in colore, & luciditate, tenet consequentia, cum quantitas sit minus actiua, quam color, & assumptum concedit ipse Auer. & ex his inferunt secundum medicos melancholiam esse causam corruptionum harum uirtutum sicut complexionem, formam specificam, & nigredinem. Secundò inferunt, quod homines magis timent in tenebris, quam in luce, quia cum in tenebris non possint ponere differentiam inter obiecta per uisum, omnia reputantur sensui communi, & uirtutibus interioribus sub ratione nigri, tristis, & horridi, & phantasiantur dæmones, & his similia. medici autem soluunt rationem Auerrois concedendo ad quod deducit, scilicet, quod sanitas, & ægritudo consistunt in colore, luce, & tenebrositate: uerò dicunt aliqui ex medicis, quod neque tenebrositas spiritus, neque nigredo humoris, & similiter luciditas spirituum est sanitas, neque ægritudo; cum huiusmodi debeantur animatis, & non inanimatis. sed Iacobus de Forliuio diceret, quod inanimata sicut spiritus, & humor bene possunt esse subiecta sanitatis & ægritudinis; licet non debeant denominari formaliter sana, aut ægra: concederet tamen, quod tenebrositas uentriculorum cerebri est ægritudo; sicut eorum luciditas est sanitas, & ipsos esse denominandos formaliter sanos, & ægros, cum sint animati. & cum inferunt contra medicos, quod plura essent genera ægritudinum, quæ tria; responderet colorem ad complexionem reduci; quia insequitur complexionem. uel melius dic, quod medici posuerunt tantum tria genera ægritudinum omnibus membris communia, malam scilicet complexionem, malam compositionem, & solutionem continui; non tamen negarent alia esse particularia genera ægritudinum; sicut diaphaneitatem, luciditatem, & huiusmodi, quæ non debentur omnibus membris; sed solum oculis, & cerebro. Secundò instant pro parte Auerrois Color non potest lædere per se operationem alicuius membri, nisi illud membrum per colorem, lucem, aut diaphaneitatem suam exerceat operationes: sed solum oculi sunt huiusmodi: igitur. ad hoc respondent medici, quod cerebrum per luciditatem tam propriam suorum uentriculorum, quam spirituum animalium suas exerceat operationes; sicut & oculus. Tertiò instant contra medicos. Nullus color potest immutare aliquem sensum interiore cerebri, nisi ille prius fuerit sensatus per oculum: sed color melancholiz existens in cerebro, & tenebrositas spiritus animalis nunquam fuit sensata per oculum, ergo non possunt immutare aliquem sensum interiore cerebri. consequentia nota cum minori, & maior arguitur; quia ita est de obiectis sensus uisus, sicut aliorum sensuum: sed obiecta aliorum sensuum, sicut odor, non possunt immutare sensus interiores, nisi prius immutauerint suos sensus exteriores: ergo &c. ad hoc respondent medici, quod color melancholiz, aut opacitas spiritus non sentiuntur ab aliquo sensu interiori; sunt tamen causa, ut omnia obiecta represententur sensibus interioribus sub specie opaci, & tenebrosi. & per consequens timendi, horridi, sicut etiam color existens in cornea, non uidetur à crystalloide: uerum est causa, ut omnia uisibilia represententur sicut naturam illius coloris. unde, si est niger, omnia uidebuntur nigra: si citrinus, citrina, & sic de aliis, sicut radii solares transeuntes per uirtutum citrinum apparent citrini, & per nigrum nigri. Quartò instantur contra medicos, quia si color melanch. immutaret sensus interiores, cum hoc faciat sine lumine, etiā potest immutare uisum sine lumine. cōsequens est falsum, igitur. ad hoc rident medici, quod neque color existens in cerebro, neque color existens

existens in oculo immutatur uirtutem uisum, aut aliquē sensum interiore: sunt tamen causa, quod obiecta corrupte comprehenduntur. & dicitur secundum, quod ad comprehensionem obiectorum per sensus interiores sufficit lumen intrinsecum spiritus animalis, & uentriculorum cerebri; non tamen lumen intrinsecum oculi sufficit ad uisionem; quia species obiectorum suorum non sunt ita depuratæ, sicut postea cum immutant sensus interiores. Quinto instatur contra medicos. Si tenebra spiritus animalis esset causa timoris; sequeretur, quod aliquis effectus positiui, ad quatuor causa esset pura priuatio, scilicet tenebra respectu timoris. ad hoc respondent medici, quod non solum tenebra est causa timoris; sed etiam ipsi spiritus, qui representant, & etiam ipsa melancholia est causa huius per suam complexionem, & proprietatem occultam. Sexto instatur contra medicos: Si melancholia per suam proprietatem, uel etiam opacitatem esset factiua timoris; ergo sanguis propter suam claritatem esset factiua lætitiæ. respondetur, quod sanguis clarus, aut nitidus per suam claritatem, complexionem, & proprietatem esset factiua lætitiæ, & audaciæ, sicut e contrario melancholia per omnia hæc est factiua timoris, & tristitiæ. Septimo instatur, quia melancholia neque per colorem solum potest immutare sensus interiores, neque per species eius, cum ibi non sit lumen, quod color, & eius species actuantur. ad quod respondent, ut supra. & ad autoritatem Auer. qui dicit, quod color non est causa substantialis ad corruptionem uirtutes animæ; sed hæc causa provenit ab una specie malæ complexionis, sicut & alia ægitudines: & tu scis, quia habitus animæ sequuntur complexionem corporis in hac coniunctione. & qui dicunt, quod anima terretur propter humorem melancholici nigri, sicut terretur homo in obscuro, dicunt uerba cationum, id est, fabularum; quia aliqua læsio non aduenit animæ in obscuro, nisi priuatio sensati sensui uisibili: quia non uidet anima in corpore, ut possit dici quod sentiat terrorem nigredinis. & magis foedum est dicere, quod uideat extra; quia anima non est extra neque intus. sed est sciendum, quod de natura huius humoris melancholici est, ut ipsum sequatur hæc accidentia; sicut de natura sanguinis est, ut ipsum sequatur læticia, & gaudium. & propterea dicimus, quod sanguis dat lumen animæ, & hoc manifestum est ei, qui gustauit aliquantulum de natura. non uult ergo Auer. quod melancholia per suam nigredinem sit causa terroris, & timoris; sed solum per suam complexionem primam, aut insequentem materiam. uerum nigredo magis cedit loco signi, quam causæ, sicut in rheubarbo citrinis non est causa soluendi cholera; sed solum sua complexio, siue forma specifica: uerum citrinis est signum rheubarbo inesse bonam proprietatem in soluendo cholera. nos autem cum medici simus, sequamur medicos; licet rationes medicorum superscriptæ non sint demonstrationes.

Cum aliqui cogitationes malæ sine causa acciderint: & timor, & tristitia in eo præualuerint; melancholia principium in eo est. cum autem res ad hoc peruenit, ut etiam ea, quæ cogitare cepit, ore promat, uerba sua, atque actus permisceat; iam melancholia perfecta est. Cui ergo hæc malæ cogitationes, & tristitia, & tribulatio accidunt, antequam præualere incipiat; succurrendum est: quia, si præualuerint; cura est difficilis.

S CHOLION.

Sine causa legunt alij sine causa manifesta.

Diuiditur præsens cap. in partes duas. in prima agit Rasis de melancholia theoricæ. in secunda practice. secunda ibi. quod si cum melancholia fuerit dolor &c.

Prima in tres. primo agit ponendo signa initiantis melancholiam: secundo perfectæ, & iam completæ. tertio ostendit festinandum esse ad curam antequam perficiatur. secunda ibi. Cum autem res. tertia ibi. Cum ergo male. de prima parte dicit, quod cum aliqui malæ cogitationes acciderint, supplete uos, & existimationes malæ, ut quia existimat amicos, inimicos, inhonesti pro honestis, aut phantasetur aliqua, quæ non sunt, neque possint esse, aut non sunt uerisimilia, cum timore, & tristitia sine causa; tunc hic incipit esse melancholicus.

credunt enim semper se decipi, semper insidiari sibi. de secunda parte ponit signa melancholice perfectæ dicens, quod, quando ad hoc peruenit, ut quæ cogitat ore promat, uerbaque sua, & actus permisceat, uerbi gratia, dicens se esse factum regem, aut esse dæmonem, aut quia timeat casum cœli; tunc melancholia perfecta est. ultimo dicit properandum esse ad curam melancholice initiantis; nam, si perficietur; cura erit difficilis, cum omnes ægitudines pendentes ab humore melancholico terreno, aut à complexione frigida, & sicca difficulter soluantur: est enim inimica principis uitæ, & spiritui, qui est instrumentum animæ ad suas operationes, ut supra ostensum fuit.

Melancholia dupliciter sumitur communiter, & proprie. accepta proprie est superius diffinita de intentione Aui & est corruptio existimationum, & cogitationum à complexione melancholica frigida, & sicca cum materia, aut sine materia. & est sine rixa, saltu, & agitatione; imo cum quiete. & in hoc differt à mania proprie sumpta, quæ est cum rixa, & agitatione, & provenit à mala complexione calida, & sicca, & humoribus adustis. sed communiter accepta est communis tam ad melancholiam proprie sumptam, quæ ad maniam: est enim corruptio existimationum, & cogitationum à quacunque causa provenit. & forte hoc modo accipit eam Aui. in cap. de cutubuth, cum dicit, quod cutubuth est species melancholice. & tamen dicit ibidem, quod provenit à melancholia genita per aduersionem cholerae, uel melancholice: quod est satis uerisimile, cum sit semper in motu: & propterea dicta est cutubuth; licet Ger. de Solo diceret, quod cutubuth est species melancholice proprie dictæ. & sic uidetur ex ordine capitulorum Aui. nec ualeat hoc argumentum. Generatur ex melancholia adusta, ergo est mania. nam dicit ipse, quod in quadam melancholia adusta referuatur caliditas adurens, in quadam uero non. paribus subtilibus resolutis. melancholia ergo proprie sumpta potest generari ex melancholia adusta quæcunque sit illa, si in ipsa non referuatur caliditas adurens, & talis est materia cutubuth. & propterea cutubuth non est cum rixa. tu uero dic, ut libet, hæc non sunt demonstrationes. communiter ergo melancholia accepta diuiditur in maniam, & melancholia proprie sumptam superius diffinitam. Mania uero est duplex una lupina, aliter dicta dæmonium lupinum; uidentur enim non homines sed dæmones, & lupi, qui patiuntur hanc maniam. alia dicitur mania canina ad canum similitudinem. & dicitur à quibusdam, quod in urina patientis maniam caninam appareant. quedam sicut formæ, & figuræ catulorum paruorum, sicut apparent etiam in morfu à cane rabido. sed causa mania lupina est melancholia genita per aduersionem cholerae, aut melancholice; & est deterior; quia difficilioris curationis, cum humor genitus per aduersionem melancholice sit magis crassus, ineptior digestionem, & resolutionem, & euacuationem. & signa eius sunt agitatio, saltus, inquisitio, lupinofitas, id est mores luporum, & aspectus, cui non assimilatur aspectus hominis; imo est sicut luporum. differt etiam ab una specie karabiti, quæ est cum dæmonio; quoniam cum hac mania non est feb. sed karab. est cum fe. canina autem est species mania existens cum ira permixta tripudio, & inquisitione corrupta permixta petitioni, quemadmodum est ex natura canum. & in hac est associatio uehemens, & amicitia cum obedientia, & conuenientia simul; licet aliquando sit cum ira, & rixa. & ista generatur per aduersionem sanguinis, cui aliquid cholerae adustæ, aut melancholice ex ea genitæ permixtum est. est autem alia species mania, quæ uocatur scintillaris, in qua lucent oculi ad modum scintillarum ignis, & imaginantur scintillas, & ignes. & hæc provenit à uaporibus adustis melancholicis eleuatis à melancholia genita per aduersionem sanguinis, & cholerae.

Melancholia uero, licet habeat infinitas species innominatas: nam quidam timent casum cœli super se, quidam, quod terra absorbeat eos, quidam timent latrones, quidam ne lupus, aut dæmones ingrediantur ad eos. & oēs hi errant in cogitatione: licet fugientes non errent in existimatione. quidam uero imaginantur res coram oculis, quæ non sunt. & quæ imaginantur se esse factos reges, aut lupos, aut dæmones, aut aues, aut instrumenta artificialia, & hi errant in sensu cœli, & imaginatiua. & sunt quidam eorum, qui diligunt mortem, quidam eam abhorrent. &c.

Io. Arculani

E 2 sunt

sunt quidam, qui ridet, quorum melancholia est sanguinea, imaginantur enim, quod placeat, & delectat eos. quidam sunt qui plorant, & imaginantur res tristes, quarum causa est melancholia pura. Sed melancholia habet duas species famosas: una dicitur cutubus. Et nomen sumptum à quadam specie aranæ, quæ mouetur super aqua diuersis motibus sine ordine. alia autem dicitur ilisci, siue heros. Cutubus autem est species melancholiæ plurimum eueniens in februario, non expectans usque ad uer propter subtilitatem humoris melancholici secundum plurimum. generatur enim à melancholia genita per aduersionem cholæræ, aut melancholiæ, in qua forte caliditas adurens non multum remansit. & propterea licet sit cum motu plurimo, tamen non est cum rixa, imo cum timore. hæc enim diligit fugere ab hominibus uiuis, & appropinquare mortuis, & sepulchris cum malitia furoris repente aduenientis ei. & est eius processio nocturna, & occultatio diurna. & totum istud facit diligendo solitudinem, & elongationem ab hominibus. & cum hoc non quiescit in uno loco plus una hora; imo non cessat discurre, & ambulare in celsione diuersa ignorans, quo uadit cauendo sibi ab hominibus. quandoque tamen non cauet sibi ab eis, parum discernens istud quod uidet, & sit ei præsens. & citrinus est color faciei, & lingua sicut sitientis. & super crura ipsius sunt ulcera, quæ non consolidantur, quorum causa est corruptio materiei melancholicæ effusæ ad crura, & multitudo motus pedum, quarum materiei ad ipsa descendunt. & præcipue quia occurrunt cruribus eius frequenter aliquod offendens, aut canes interdum mordent eum: quare sunt in eis ulcera, quæ difficulter consolidantur, & propter motum, & quia cancrofa. & oculi eius sunt siccis, debiles, submersi, non lachrymantes propter siccitatem cerebri, & oculorum. Causa autem suæ uariæ in celsionis sine ordine, nunc ad unam differrentiam, nunc ad aliam, sicut facit ista aranea, quæ dicitur cutubus, est, quia fugiens est ab omni indiuiduo apparente ei ipsum timens; nam ipse propter paucitatem suæ cōseruationis, & defectum rectificationis consilii sui incipit in parte una moueri, & obuius alii indiuiduo iterum fugit ad partem aliam.

Ilisci uerò, siue heros, aliter passio diuina; quia quidam putauerunt à deo fieri. 1. prognosticorum, commet. 7. uel quia accidit istis sicut contemplantibus diuina, qui omnem suum spiritum, & cogitationem in illa conferunt. & hæc passio est sollicitudo melancholica, in qua homo inducit omnem cogitationem suam super pulchritudinem quarundam formarum, & figurarum cum uehementi desyderio ad illa persequendum; licet non sequatur.

Et signa eius sunt profunditas oculorum, siccitas ipsorum, & priuatio lacrymarum, nisi cum fletus adest, & motus continuus palpebrarum risibilis, quasi aspiciat aliquod pulchrum, & delectabile, aut audiat rumorem, aut iucunditatem: quod prouenit ex apprehensione alicuius sub ratione iucundi. & anhelitus eius est plurimæ interfectionis, & multæ eleuationis interdum cum suspiriis. & nunc alteratur ad risum, & letitiam, nunc ad tristitiam, & fletum præcipue cum audit cantilenas amoris, & proprie cum sit memoria tripudii, & elongationis à re amata, & sunt omnia membra eius arefacta præter oculos; ipsi enim licet sint profundi, palpebræ tamen sunt graues, & grassæ propter uigilias eius & ploratus, propter quos ad palpebras sæpe aliquid rheumatizat. & in figuris eius siue scrib. non est ordo, quasi in nullo situ inueniat requiem. & pulsus est diuersus absque ordine, sicut pulsus habentium tædium. & eius quidem pulsus, color, & dispositio alteratur; cum sit rememoratio eius, quod diligitur, aut cum præsentatur ei. unde possibile est, ut medicus prudens cognoscat, & sit illud quod diligit, cum non conficitur ipsum: cognitio enim eius, quod diligitur, non parum confert ad curam: & propterea medicus semper tangens pulsum patientis faciat rememorari nomina eorum circa, quæ est suspitio, necnon figuras, domus, artes, genus, regiones, & comparatur unumquodque ad nomen eius, quod diligitur: nam, cum rememorabitur illud, quod diligitur, fiet pulsus diuersus, & interfectio, necnō color eius mutabitur, & similiter anhelitus. Confert autem scire istud; quoniam interdum nullum regimen medicinale prodest nisi regimen coniun-

ctionis inter eos; si lex, & fides permittat. & iam sunt uis quidam, qui post tolerantiam febrium, & prauarum ægritudinum, & post debilitatem uirtutis ex amore ingenti sanitati restituti sunt; cum obtinuerint, quod summopere optabant, ex quo significamus mirabilem obedientiam naturæ meditationibus animi. Causa itaque primaria huius passionis est amor præter modum; uerum postea humores aduruntur, & ad melancholiam conuertuntur, quibus amplius hæc passio figitur.

Melancholiæ præterea communiter sumptæ dantur alie distinctiones. prima quædam est per essentiam in cerebro, quædam per cōmunitatem. secunda, quædam est materialis, quædam immaterialis. tertia, quædam fit incipiendo, quædam succedit alteri ægritudini. item quædam est periodica, quædam non periodica. item quædam antiqua, quædam noua.

Causæ autem melancholiæ per essentiam in cerebro sunt aut mala complexio frigida, & sicca sine materia, quæ permittendo complexionem cerebri, & spiritus animalis, & similiter eorum substantiam, excludendo scilicet partes subtiles, calidas, luminosas, facit eorum substantiam tenebrosam. hoc idem facit mala complexio calida, & sic. nam adurendo denigrat, & tenebrosam facit ipsorum substantiam. aliquando sunt hæc malæ complexiones cum materia, aut melanch. naturalis, aut genita per congelationem: & hæc faciunt melanch. distinctam contra maniam. & aliquando pendunt à melanch. genita per aduersionem sanguinis, aut phleg. in quibus non reseruatur multa caliditas adurens. Mania autem proprie generatur ex melanch. genita per aduersionem cholæræ, aut melanch. aut si melancholiæ sanguineæ, aut phlegmaticæ aliquid cholæræ aduultæ permisceretur.

Et hi humores quandoque sunt in uenis cerebri, quandoque in meatibus, quandoque in uentriculis, siue apostemem siue non. & hi humores quandoque sunt geniti in ipso cerebro, siue per propriam eius complexionem, siue per malam qualitatem à residuo corporis, uel ab extrinseco sibi communicatam. melanch. uerò per colligantiam quandoque est à roto; sicut in quartana feb. & in fine morborum materialium acutorum, scilicet in quibus generantur melancholiæ per aduersionem: & ideo isti phantasiantur circa mortuos: quædam per cōmunitatem à splene, aut quia splen non debite mundificat sanguinem, aut quia est apostematus, aut quia uenæ oppilatae sunt per quas melanch. transit ab hepate ad ipsum, aut uia sunt oppilatae, quæ transeunt ab ipso ad intestina, aut uia, quæ transeunt ab ipso ad os stomachi: & sic non potest expellere melancholiam superfluum. aut quia debilitata est expulsua eius, aut attractiua. unde neque expellit saltem ad loca conuenientia, aut non debite attrahit.

Quædam est mirachia id est à mirach, per mirach intelligendo mesenterium, in quo sunt meseraicæ, quæ primò fit per congregationem superfluitatum crassarum chilosorum, quæ per aduersionem transeunt in melancholiam, & euaporando ad caput faciunt melancholiam. similiter fieri potest ab oppilatione, uel apostemate meseraicarum hepatis; quia nutrimento non penetrante putret. & quandoque fit à matrice sanguine menstruo per putrefactionem, aduersionem, uel congelationem in melancholiam uerso. & quædam fit à spermate diu retento modis similibus corrupto. & nota, secundum plurimum non fit melancholia absque cōmunitate cordis; imo fortasse magnitudo ipsius erit ex corde. & forte principium eius secundum plurimum est ex corde; licet confirmetur in cerebro: & est in hoc circuitus quia ad corruptionem complexionis in corde corrumpitur complexio cerebri, & e contrario. huius autem potissima causa est spiritus animalis; quia spiritus animalis est continuus spiritui uitali in arteriis apoplecticis, & rete mirabili, & ex ipso generatur, & si sanguis cordis esset subtilis, tersus, & clarus; resisteret corruptioni cerebri, & ipsum rectificaret: & ex ipso etiam generaretur spiritus uitalis clarus, qui est materia spiritus animalis. quapropter raro, aut nunquā fit melancholia absque cōmunitate cordis; licet non confirmetur hæc ægritudo nisi in cerebro. & quandoque fit per cōmunitatem ab hepate, aut quia sanguinem adurit, aut quia non debite separatur melancholiam à sanguine, nec expellit ipsam ad splenē. & uniuersaliter à quocumque membro potest fieri melancholia per colligantiam.

colligantiam, aut quia aduritur nutrimentum ipsius, aut quia non expellit superfluitatem nutrimenti, quæ retenta partibus subtilibus resolutis uertitur in melanch. Cause uero primitiuæ sunt aer turbulentus frigidus, & sic, aut calidus, & sic. adurans, sicut aer æstatis, & dierum canicularium: & autumnus est huic ægritudini proportionatus. uerò uero, licet sit disproportionatum, quantum ad causæ generationem; tamen proportionatum est ad monendam causam latentem iam genitam. unde, 3. apho. illo, Vere, & autumnus manix mouentur, & melancholiz. Hyems uero est disproportionata nisi forte per congelationem melanch. multiplicet. Secundo cibi melancholici, ut lentes, caro uaccina, caprina antiqua, panis cum, uinum turbidum, crassum, exercitium forte exiccantium, superflua uigilia, timor, tristitia fortis, studium uehementis, longi carceres. Cause autem corporeæ remotæ sunt retentio hæmorrhoidarum, & fluxus menstrui consueti. & quandoque fit à dæmone corruptente complexionem cerebri: agit enim per media naturalia siue semper ibi assit, siue post hanc operationem recedat.

Signa uero melancholiz quædam sunt prognostica, quædam demonstratiua. Ex prognosticis sunt primò dispositiones corporum, sicut sunt corpora bruna, pilosa, extenuata, & contrariò parum disposita ad melancholiam sunt corpora alba, & pingua. Secundo corpora habentia cor uehementer calidum, & cerebrum humidum sunt disposita ad melancholiam; quia caliditas cordis est generatiua cholerae nigrae in ipso, & humiditas cerebri est susceptiua impressionis eius, quod generatur in corde, quapropter trahit, id est, syllabam multoties repetentes, antequam dictionem proferat; sunt ad ipsam parati, & proprie si linguas habuerint lenes, oculos mobiles, & quorum facies est uehementis rubedinis, & cum hoc sunt bruni, pilosi, & proprie cum in pectoribus eorum sunt pilis nigri, crassi, & amplas habent uenas, & labia crassa; quoniam quædam istorum significant caliditatem cordis sicut pilositas, amplitudo uenarum, rubedo faciei, oculorum mobilitas: quædam significant humiditatem cerebri, scilicet trahitas, mollietis lingue, crassities labiorum. Tertiò magis dispositi sunt ad melancholiam uiri, quam mulieres; licet in mulieribus sit deterior cum proueniat à fortiori causa: & similiter magis dispositi sunt iuuenes, & senes, & pueri. Secundum prognosticum sumitur ex aphor. 23. sextæ particulæ. Si timor, & pusillanimitas multum tempus habent; melancholicum perficiunt: sunt enim melancholiz simul signum, & causa.

Signa uero initiantis melancholiz sunt, quæ dicta sunt in textu. item uelocitas iræ, si materia fuerit adusta. tertiò dilectio solitudinis: quia non conuersatur propter timorem aut tristitiam. Signa uero perfectæ melancholiz sunt ea, quæ dicta sunt in textu. Signa uero causarum immediatarum infinitarum specierum ipsius melancholiz male possunt sciri, sicut neque causæ distinctæ sciuntur. uerum non reducuntur nisi in speciales modos mixtionis melancholiz, & speciales conditiones indiuiduales, sicut dicimus, quod uenenum canis rabidi inducit ad timorem aquæ: ideo etiam in propostio secundum uarias impressiones specierum uariarum, uarios modos melancholiz, & secundum uariam dispositionem passorum fit uariatio in phantasia, & iudiciis corruptis. quapropter ipsarum specierum esse infinitas, aut saltem indefinitas facile concedi potest.

Signa uero melancholiz per essentiam in cerebro est superfluitas cogitationis, & assiduatio solitudinis melancholice, id est, attinentium melancholiz, & assiduus aspectus ad rem unam, ut ad terram. item color niger capitis, faciei, & oculorum, & nigredo pilorum capitis, & crassities. item antecessio infomnetatis, & cogitationum, & longa mora in sole, quæ primò cerebro nocet. item egritudines cerebri antecedentes, sicut epilepsia. item parum iuuamentum ex medella, & in summa sunt accidentia maiora, & magis continua; quando est per essentiam in cerebro. item non præcesserunt, nec forte concomitantur eum aliqua malæ dispositiones corporis uerisimiliter factiæ melancholiz. Signa uero eius, quæ est per communitatem à toto, sunt nigredo corporis, & eius arefactio, & retentio eius, quod solebat euacuari ex splene, & stomacho, & ex ano, aut matrice, scilicet sanguinis hæ-

morrhoidalis, & menstrualis. item multitudo pilorum crassorum, & nigrorum. item antecessio ciborum melancholicorum, necnon antecessio ægritudinum, quibus succedit melancholia; sicut sunt febres chronice, & maxime permixtæ.

Signa uero eius, quæ est ex splene, sunt multitudo appetitus propter effusionem cholerae nigrae ad stomachum cum paucitate digestionis propter frigiditatem complexionis, multitudo rugitus lateris sinistri, & quandoque inflatio splenis. si enim splen non attrahat melanch. propter aliquam ex causis supradictis; tunc splen attenuatur. si uero attrahat, & non expellat per causas suprascriptas; tunc splen est tumidus.

Signa uero eius, quæ est à stomacho, sunt nocumenta stomachi antecedentia, aut concomitantia, quibus auctis augetur melancholia, & diminutis minuitur.

Signa uero mirachiz sunt nausea, & frequens grauitas in mirach, malitia animæ, corruptio digestionis, & eructuatio acetosa, rugitus, & exitus uentositatis, & inflatio, & inuehit dolorem inter utraque spatulas, usquequo cibus digeratur. euomit phlegma permixtum cholerae, aut melancholiz, & quandoque præcedit apostema in mirach, aut oppilatio in meseraicis, & apparet fluxus chilofus chilo non potente transire ad hæpar.

Signa uero, quod fit per communitatem à corde, aut à matrice, aut membris aliis sunt præcessio nocumentorum huiusmodi membrorum, & proprie cum non uidetur ab aliis causis pendere uerisimiliter.

Signa uero humoris melancholici sunt ista; nam, quando est à sanguine, est cum risu siue uerò, siue non uero, & non est in eo tristitia uehementis. Si autem est à phlegmate est cum pigritia & quiete & dominio frigiditatis. & si à cholera est cum agitatione, rixa, & dæmonio. Et si est per aduersionem uehementem melancholiz, est etiam cum rixa & dæmonio magis perseverante. & si fuerit à cholera pura nigra, tunc cogitatio in ipsa erit plurima, & audacia minor nisi moueatur & rixetur, & habet odium cuius non obliuiscitur.

Signa uero causarum primitiuarum sunt ipsæmet causæ. signa uero dæmonis nulla sunt nisi, quæ dicat aliqua, quæ ante nesciebat, sicut si loqueretur literaliter, aut theuronicè, aut secundum aliud idioma, quod prius nesciebat, aut sciat aliqua occultata, quæ uerisimiliter scire non debet, quanquam Ari. problematum. 19. problem. 1. hæc omnia resoluat in melancholiam. Inquit enim, quod ex melancholia quidam facti sunt sicut diuini prædicentes futura, & exemplificat de Sybilla & Bacchide. & quidam facti sunt poetæ; sicut Melanthius Syracusanus. Ego uero adhaerens ueritati fidei Christianæ credo Sybillam Erythream esse prophetissam, & de Christo prophetizasse, & Melanthium Syracusanum, qui post maniam numeratus est inter poetas, credo ante maniam non fuisse expertem poesis: uerum post maniam subtiliorem factum esse, humiditatis cerebri eius ingenium hebetantibus resolutionis: non enim credo sola melancholia huiusmodi posse contingere; sed ex coniunctione angeli, uel dæmonis cum anima humana &c.

Prognostica. Primum. melanch. cum risu est salubrior ceteris. Secundum. hæmorrhoides, elephantia, uarices superuenientes soluunt melancholiam. Tertium. Melancholia periodica debito seruato regimine curatur: ex indebito uero regimine efficitur continua non curabilis. quartum. melancholia per essentiam in cerebro multum antiqua non est curabilis; per communitatem uero antiquata frequenter curatur. Quintum. euacuatio cholerae nigrae uomitu, & lecessu, & similiter eius apparitio in cute; sicut in panno & lentiginibus, soluit melancholiam.

Quod, si cum melancholia fuerit dolor uentris, & inflatio, & malus color, & digestionis corruptio, & uomitus accessus, & excretionis multitudo;

S C H O L I O N.

Vomitus accessus est in aliis codicibus Vomitus acetosus.

Hic Rasis agit de cura melancholiz. habet autem hæc pars. 2. partes. in prima ponit curam melanch. splenetice. in secunda ibi, Si autem cum melancholia. ponit curam melancholicæ per essentiam in cerebro. prima iterum in duas: nam in prima parte ponit signa melancholiz splenetice. in secunda ibi, Arculani. E 3 ibi,

ibi. Incipienda est cura. ponit ipsius curam. in prima parte ponit. 6. signa. primum est dolor uentris scilicet stomachi, & intestinorum. secundum est ipsius uentris inflatio propter uentositatem genitam à melanch. est enim melancholia plurimum uentosa. 19. problematum problemate. 1. uentositas etiam multiplicatur propter indigestionem, phlegmate multiplicato, & uentofato. tertium est malus color. quartum corruptio digestionis, scilicet ad acetosum sem plurimum, & propterea fit malus color. quintum est uomitus acetosus, scilicet aut melanch. ad stomachum deriuata, quæ est acris cum ponticitate, aut forte fit uomitus acetosus, id est, phleg. acetosi per corruptam digestionem multiplicati. sextum est multitudo excretionis, id est, sputi per communitatem à stoma cho. deinde cum dicit.

Incipienda est cura cum phlebotomia ex basilica, aut saluarella sinistra manus. & si sanguis uisus fuerit niger; dimittatur egredi in multa quantitate: subtilis autem, & rubeus si fuerit; restringendus erit ilico.

Habet hæc pars sex partes. in prima ponit curam per phlebotomiam. in secunda ibi, Ager uero ex rebus. ponit curam per nutrientia. in tertia parte, scilicet ibi, mittendus est in balneo. ponit curam per balneum. in quarta ibi, Post hoc autem decoctione. ponit curam per medicinas soluentes. in quinta ibi, In his autem diebus. complet regimen per diætã. & reliquum regimen sex rerum non naturalium. in sexta. Et studendum est, docet rectificare splenem, & stomachum. De prima parte dicit incipiendam esse curam cum phlebotomia basilicæ, quæ est in curuatura brachii in parte inferiori; quando intentio est magis euacuare: aut in saluarella eiusdem manus sinistra, quando intentio est cum hoc diuertere. & hæc saluarella reperitur in manu inter anularem, & auricularem, & est ramus basilicæ. & subdit, quod sanguis egrediens est considerandus: si enim fuerit subtilis, & rubeus; ilico stringendus est: si uero fuerit niger, & crassus; dimittatur egredi in quantitate multa, cum ipso enim humor melancholicus educitur. & propterea præcipiat medicus phlebotomanti, ut faciat foramen latum, ut sanguis crassus possit egredi. nota tamen sicut dicit Auic. in cap. huic proportionato, quamuis sanguis subtilis appareat in principio. non tamen ita subito est restringendus; sed permittantur egredi duæ. 3. uel circa, quia aliquando post subtilem egreditur crassus, & niger.

Ager uero rebus lenientibus est nutriendus: ut sunt alesfidebegi, quæ sunt ex carne hœdina & arietina.

Ponit curam per nutrientia, & dicit, quod nutriendus est ager ex rebus lenientibus, id est, humidis, & etiam uentrem molliciantibus; sicut sunt alesfidebegi, id est, iura, quæ sunt ex carne hœdina parum distante à natiuitate, & arietina unius anni, uel circa. & sic intellige de reliquis carnibus humidis boni nutrimenti paucarum superfluitatum; sicut capones, phasiani: & proprie multum impinguati.

Et mittendus est in balneum, in quo non diu moretur.

Iubet ager poni in balneo aquæ dulcis, aut in decoctione rerum humectantium, in quo tamen non multum moretur, ut non debilitetur, neque partes subtiles resoluantur. & ideo balneum debet esse satis temperatum conforme calori nostro, & debet etiam aqua balnei proici super caput ægri. & per hunc usum balnei multos à quartana liberaui: digne enim humorem melancholicum ipsum reducendo ad benignum, uel ad expulsionem præparando.

Post hoc autem decoctione de epithymo, quam ego composui, utatur. Recipe mirabolanorum indorum drach. 10. polypodii drach. 5. senæ drach. 8. turbit. drach. 4. stœcad. drach. 10. passularum enucleatarum drach. 10. epithymi cretensis drach. 10. omnia excepto epithymo in 4. lib. aqua coquenda sunt, donec ad lib. 1. & se redeant. quædòque hoc factum fuerit, addatur epithymum, & ilico ab igne remoueantur, & dimittantur, donec infrigidari ceperint. quumque infrigidata fuerint, manibus fricata colètur. deinde sumantur agarici. 2. tertie drach. 1. aloes drach. 1. salis ind. drach. semis. elleb. nigri quartam drach. 1. & conficiantur.

tur cum melle, aut cum iuleb, & fiant ex eis pilule, quæ per tres horas ante decoctionis acceptionem sumende sunt. postea sumatur decoctio. deinde tribus diebus quiescat. In his autem diebus quibus quiescit, nutriatur ex eis quæ præcepimus. & in potu sumat uinum subtile, & clarum, & bene odoriferum. post hoc quoque iterum soluendus est, ut prius. hoc uero ita, ut prædiximus, tertio iterandum est quarta quoque potio ei danda est. æger uero ab omnibus, quæ choleram generant nigram, abstinendus est; ut sunt carnes syluestres omnes, & caro uaccina, & hircina, & magnarum caprarum, & fabæ, & caro salita, & caseus uetus, & lentesc, & omnia olera nisi humefacientia. uinum præterea grossum, labores, & uigilias euitet. nec patiatur famem, nec sitim: uino uero subtili in potu utatur, & præcipiendum est ei, ut dormiat.

SCHOLIA.

Senæ drach. octo. Jantiquus habet drach. viii. In quatuor lib. aquæ. Textus Rasis tres solum enumerat. Et lites] & proprie lites ut nonnulli uolunt: generant enim plurimum sanguinem melancholicum.

In hac quarta parte curat per solutua dando decoctionem de epithymo. 12. mirabolanorum indorum & nigrorum, qui sunt frig. & sic melancholiam soluentes. 3. 10. polypodii cal. & sic in secundo soluentis melancholiam, & phleg. falsum. 3. 5. senæ cal. & sic in secundo soluentis melancholiam drach. 8. turbit. cal. & sic in secundo soluentis phlegma. 3. 4. stœcad. cal. in primo. sic in secundo soluentis melancholiam & phlegma à capite. 3. 10. passularum enucleatarum cal. & hu. 3. 10. epithymi cretensis cal. & sic in secundo optime soluentis melancholiam. 3. 10. omnia excepto epithymo coquenda sunt in tribus lib. aquæ ad consumptionem medietatis; & cum quasi facta fuerit huiusmodi consumptio; addatur epithymum; & ilico ab igne remoueatur; quia epithymum parum sustinet de decoctione. & hæc sic bullita dimittantur infrigidari, & refrigerari, & cum aliquantulum infrigidata fuerint; bene exprimantur, & colentur, & colatura referuetur, quam debet æger accipere in quatuor uicibus debite calidam. & inter unam assumptionem, & alteram medietas tres dies, & sumatur unaquæque potio in mane celebrata digestionem cœnæ præcedentis; sed per tres horas ante unamquamque istarum potionum detur quarta pars istarum pilularum: 12. agarici cal. & sic euacuantis phlegma, choleram, & melancholiam. 3. 2. aloes cal. & sic euacuantis phlegma, & choleram, & rectificantis, scilicet alia solutua. 3. 1. salis ind. cal. & sic in secundo soluentis melancholiam. 3. selleb. nigri cal. & sic in tertio soluentis melancholiam gran. 15. fiant pilule. 20. cum melle, aut iuleb uiol. aut simili, quæ pilule in quatuor uicibus debent sumi, sicut decoctio prædicta; sed per tres horas ante decoctionem: hoc autem fit ut pilule sint primo actuatæ, deinde decoctio succedat per tres horas, ut adiuet operationem pilularum superscriptarum, ut etiam humectet, & æquet humores, uel humoris substantiam. Si tamen uenter esset facilis; sufficeret sola decoctio, & esset præstantior, quam pilule, causis inferius assignandis. tempore intermedio æger quiescat animo, & corpore, & nutriatur his brodiis, & carnibus, quæ dicta sunt superius. & bibat uinum subtile, clarum, odoriferum, participans aliqua dulcedine, & sit unius anni tantum. & æger abstineat ab omnibus, quæ choleram nigram multiplicant; sicut carnes syluestres, leporum, cuniculorum, ceruorum, & huiusmodi. uitet carnem uaccinam, hircinam, magnarum caprarum, fabas, carnem salitam, caseum ueterem, lentes, & omnia olera præbentia nutrimentum siccum, sicut ruta, crucca, & similes. sed cucurbitæ, spinachie, & cætera humida concedi possunt. uitet etiam uinum crassum, laborem multum, uigilias multas; imo multum dormiat, nec patiatur longam famem, aut sitim.

Et studendum in splenis curatione ex his quæ in sequentibus cap. de splenis curatione, qui augmentatur, dicturi sumus. os quoque stomachi confortandum est, & proprie ex me dicimur.

dicinis, quarum mentionem in sequentibus facturi sumus, cum agitudines stomachi nominabimus.

In hac sexta parte, & ultima dicit Rasis splenem esse curā dum, & proprie cum tumidus est, secundum quod inferius dicitur, ubi agetur de curatione splenis, quando tumescit. est tamen regula generalis in omni agitudine, quæ fit per communitatem ab aliquo membro, membrum istud esse rectificandum. Similiter dicit esse confortandum os stomachi in melancholia splenetica: cum stomachus per os eius recipiat melancholiam, quæ præter modum fluens ad ipsum corrumpit ipsius digestionem.

Si autem cum melancholia ea, quæ nominauimus, non fuerint, & acciderit post longam moram sub sole, aut phrenesim, aut percussione in capite, phlebotomia ex cephalica facienda est. Et capiti studium adhibendum ex reliquo regimine, quod diximus proprie. aqua præterea tepida ab alto loco super caput fundenda est. deinde oleum ros. cum aceto uini capiti infundatur, & lac muliebre desuper mulgeatur. naribus etiam oleum de seminibus cucurbitæ dulcis & lac muliebre iniiciatur in balneum quoque, sæpe mittendus est, & multum ex aqua tepida capiti est superinfundendum. æger etiam omnia odorifera, quæ frigida sunt, odoret.

In hac secunda parte principali curat melancholiam per essentiam in capite. habet hæc pars duas partes. in prima curat melancholiam quæ est in mania. in secunda ibi. Si autem melancholia curat melancholiam proprie sumptam, distinctam contra maniam. de prima parte dicit, quod si cum melancholia non fuerint ista quæ nominauimus, idest, illa sex signa melancholiæ splenetice; imo acciderit post phrenesim, aut longam moram in sole: quæ arguunt ipsam pendere à melancholia adulta aut acciderit post percussione in capite, per quam humores calidi ad caput attrahuntur, qui postea adusti faciunt maniam. in his ergo casibus in principio faciendū est phlebotomia ex cephalica, quæ est in curuatura brachii in parte superiori tum ad diuertendum materiam fluentem, tum ad euacuandum materiam iam fluxam. Secundo est capiti studium adhibendum in reliquo regimine superius dicto per euacuationem humoris melancholici. Tertiò aqua tepida est capiti ab alto infundenda ad humectandum, & infrigidandum: postquam embrocationem oleum ros. mixtum cum quarta parte aceti, ut magis penetret capiti infundendum: hæc enim infrigidant, confortant & repercutiunt, & de super lac muliebre infundatur ad humectandum & infrigidandum. oleum etiam de semine cucurbitæ, lac muliebre singulariter, aut coniunctim naribus iniiciatur. Vltimò ad infrigidandum, & humectandum debet poni in balneo aquæ tepidæ multum de ea capiti infundendo, & odoret ea, quæ frigida sunt, & humida, sicut aquam ros. & uiol. & similes.

Si autem cum melancholia nihil fuerit eorum, quæ diximus in principio; matrix uena dextri brachij aperienda erit & sanguis considerandus et ut prædiximus, faciendum erit & regendum. & postquam hoc regimen infirmo adhibueris per aliquot dies quiescere dimittendus est. deinde ut prius in cura eius incipiendum, donec sanitas fiat restitutio.

Docet curare melancholiam distinctam contra maniam, quæ provenit à cholera nigra non adulta, aut à melancholia phlegmatica, uel sanguinea, in qua non remanet multa caliditas, & etiam quæ provenit à melancholia genita per congelationem. Sed maxime hoc regimen est proprium melancholiz naturalis, & sanguineæ; sed maxime quado fouetur à mala cordis, & membrorum spiritalium dispositione. & habet hæc pars quatuor partes. In prima ponit curam per phlebotomiam. In secunda ibi. Studium uero totum. Ponit curam per debitum regimen sex rerum non naturalium. In tertia parte ponit curam per solutiuā ibi. Pilulæ quæ cholera nigram. In quarta ibi. In duobus uero, ponit curam per electarium laxificans. de prima parte dicit, quod, si cum melancholia non fuerit aliquod eorum quæ diximus, scilicet signa ipsius melancholiæ splenetice, & supple neque fuerint signa maniz; matrix uena, idest, communis dextri brachij erit aperiē

da, & sanguis considerandus; nam, si fuerit subtilis, clarus; non permittatur exire nisi in parua quantitate, ut dictum est. Si uero crassus, & niger permittatur exire secundum uirtutis tolerantiam, & ceteras circumstantias. deinde reliquum regimen scilicet balneum, embrocatio, euacuatio capitis obseruandum est, ut superius dictum fuit, interponendo inter unā euacuationē, & aliam tps sufficiens ad uirtutis restorationē.

Studium uero totum quod erga melancholicos est obseruandum, est ut impingentur, & carnosi fiant; ex quo enim pingues, & carnosi fuerint illico sani erunt. Cibi autem, qui illis congruunt sunt caro arietina, & hœdina, & gallinacea & panis de simula. oppyrus autem panis nullo modo est eis congruus. uinum quoque; subtile, & clarum eis conueniens est uinum uero crassum non est eis bonum, nec nigrum. lac autem recenter ab uberibus extractum, dum adhuc calet, eis confert, pisces recentes. & sesami de saccharo facti, & oleum amygdalium. præterea audire canticenas, & gaudere, & habere ante se res deliciosas, & dormire plurimum confert eis. econtrariò uero cogitare, & solos morari, & uigilare maxime nocet eis.

In hac parte ponit ipsorum debitum regimen. Est enim studendum, ut impingentur, & carnosi fiant. ex quo enim pingues, & carnosi fuerint, illico sani erunt. cauendum tamē ne cadant in oppilationes, & propterea caro arietina, hœdina, gallinacea, & similes boni nutrimenti, & humidi, & brodia ipsarum conueniunt, & panis de simula, idest, optima farina, panis autem oppyrus, idest, crassus, & azimus sicut est panis rusticorum non conuenit. & similiter conuenit uinum subtile clarum, album, unius anni: nigrum uero crassum, aut antiquum non conuenit lac recenter multum ab uberibus, ut non corrumpatur, confert. & similiter pisces recentes, & sesami cal. & hum. conditi cum saccharo, & oleum amig. cal. & hum. conferunt. & similiter audire canticenas, gaudere, habere res deliciosas conferunt, sicut econtrariò superflue cogitationes, solos morari, multum uigilare & omnia exiccata plurimum nocent.

Pilulæ, quæ cholera nigram expellunt, de quibus datur his, qui decoctionem sumere nequeunt. Rec. epithymi cretensis, drach. 20. polypodii, agarici, amborum, an. drach. 10. eleb. ni. salis indi amborum, an. drach. 5. stœcados drach. 7. pulueris hieræ pic. drach. 15. bibat ex eis drach. 3. in diebus uero, quibus quiescit æger, debet sumere elect. quod uocatur. laxificans. quod recipit melissæ, cortic. citri, garioph. galiz musc. mastichis, croci orientalis, cinnamomi, nucis muscate, cardamomi, neheremisch, been al. & ru. zedoarie, dromig. sem. ozimi, gariophilatæ, omnium an. partes æquales, musci quantum est. 10. pars unius. 1. deinde sumantur chebuli. 20. et emblici. 20. et terantur, & in tribus lib. aquæ coquantur donec ad unam redeant, & colentur in colatura uero addatur mellis lib. deinde bulliant donec aqua consumpta sit. post hoc ex hoc melle conficiantur species prædictæ, quod tamen in pondere sit triplum ad species, de quo cum necesse sit, ad magnitudinem auellane sumendum est. hoc enim medicamen letitiam, & coloris pulchritudinem, & digestionis bonitatem operatur, & retardat canos.

SCHOLI ON.

Sem. ozimi, gariophilatæ. Manuscriptus textus sem. ozimi maioris, & seminis gariophilati refert.

Ponit descriptionem pilularum, quæ debent dari his, qui non possunt sumere decoctionem. R. epithymi, & c. hæc descriptio superius declarata est sufficienter, tamen, 3. 1. s. pro uice dari potest, licet ipse iubeat dare. 3. 3. In diebus uero in quibus. hic Rasis describit electarium laxificans, in quo ponitur melissa dicta ranzata & citraria, & secundo. cañ. bedere segen. cal. & sic. in secundo, laxificatiua cordis auferens tremorem. cortices subriles citri aromatici, cordiales cal. & sic. in secundo. Gariophili maxime cordiales cal. & sic. in tertio galia musc. cuius plures sunt descriptiones in Seruitore, & Io. Arculani E 4 Melsuz.

Mesue, mastix medicina stomachalis. theriaca stomachica cal. & sic. in secundo. crocus maxime lxtificans scilicet, ut. 3. aur. interficiant lxtificando faciēdo spiritus exhalare cal. in secundo, sic. in primo. nux musc. cal. & sic. in secundo stomachalis & cerebralis. cinnamomum cordiale præsuerans à putredine cal. & sic. in tertio. & præsuerans, quā casia lignea ad corrigendam putrefactionem, & restificandum complexionem, ad mundificandum uirus malum, ad resistendum medicinis mortiferis, & uenenosis, sicut uult Auic. 1. 4. tertii c. de cura debilitatis hepatis. & iste duq. excedunt omnes alias medicinas in effectibus iam dictis. cardamomum cal. & sic. in tertio, stomachale. neheremith. id est, pœonia, de qua supra. been al. & rub. radices cordiales cal. & sic. in secundo. zedoaria ualens contra uenena habens duas species, scilicet zorumbeth cal. & sic. in tertio: alia est zedoar, quæ est præstior prima. 2. can. cap. de zorumbeth. doronigi cal. & sic. in tertio, confortans cor. Seminis ozimi grariophilati, id est, basiliconis minoris habentis folia parua, & redolentis bene ad differentiam magni, maiora habentis folia, quod calidius, & siccus est, quā maius scilicet circa secundum gradum, & aliter dicitur bedoragi. de istis. 15. accipiantur. ana. 3. 2. musci gran. 1. 2. & est cali. & sic. in secundo. hæc omnia subtiliter pulverizentur: deinde fumantur chebuli numero. 20. emblici numero. 30. & terantur crasso modo, & bulliant in lib. 3. aquæ, donec redeat ad. 1. (uerum mihi uidetur nimis magna quantitas mirobalanorum in comparatione ad aquas sufficeret enim medietas) & coletur, & colatura ista bulliat in lib. 1. mellis, donec sufficienter spumetur, & aqua consumpta sit. deinde species supra scriptæ cum hoc melle misceantur ita ut mel sit triplum ad species; quanuis mos communis apud apothecarios est, ut pro. 1. lib. mellis ponantur. 3. 2. & s. pulueris: sed hoc modo est uirtuosius. ponunt etiam communiter pro. 1. sachari. s. 3. pulueris, licet 3. 1. possit poni. hoc enim electarium sumptum ad magnitudinem auellane in mane cum retardatione cibi saltem per quatuor horas inducit lætitiā, coloris pulchritudinem, digestionis bonitatem & tardat canitiem sed nota hoc electar. conuenire in melancholia phlegmatica, aut pendente ab humore melancholico, genito per congelationem, & non per aduersionem; est enim notabiliter cali. & sic. & si uelles ipsum conuenire in melancholia à cholera nig. & à cholera naturali; addas. 3. 3. passulorum enucleat. pro unaquaq. lib. ipsius.

Primo ponam curam eius, quæ est per essentiam in cerebro: secundo eius quæ est per communitatem, tertio eius, quæ pender à causis primitiuis. Cura itaq. illius, quæ est per essentiam in cerebro, si sit mala complexio sine materia; exigat. 4. intentiones curatiuas. prima alterat malam complexiōnem cum contrariis cerebrum in omni dispositione confortantibus, & etiam cor. secunda prohibet humores à fluxu ad cerebrum, si fuerint proni ad fluxum. tertia corrigit accidētia. quarta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima completur cum notabiliter humectantibus: sed sint aliquando cal. aliquando frig. secundum discretā exigētiā, & cum hoc propria, & cerebri, & cordis confortatiua: necnon spiritus confortantia, & illustrantia: quæ confortatio & spirituum illustratio in toto curæ processu debet attendi, & in quacunque specie. & propterea pro completa notitia bonum est, ut hic describam nouem modos confortationis spirituum, & per consequens membrorum principalium, & sibi deferuentium; deinde medicinas in hac dispositione proprias, quibus poteris uti fm accessitatē. nouē modi confortandi spiritus. Primo confortatur spiritus per restaurationē, ad quod ualent cerebella hoedorum, aprorum, uitulorum, galinarū frequenter comesta. & uinum album aromaticum subtile, & alia generatiua boni sanguinis, & clari, & uicelli ouorum, aqua carnis, & similia. Secundo per splendidiā spiritum, & reddentiā ipsum illustrem, & clarum, ut faciunt margarita. Tertiō per congregantiā, & prohibentiā resolutionem, eius sicut karabe, & mirobalani emblici. Quartō corrigendo lapsum complexionale eius, ut frigidum cum calidis propriis sicut melissa, doronigi, muscus: & calidum cum frigidis; sicut rosa, acetosa, & camphora. Quinto per occultam proprietatem; ut hiacynthus, & calcendonius. Sexto separando contraria; ut buglossa, & cætera quæ separant ua-

pores melancholicos à spiritu, & melancholiam à sanguine. & sicut omnia clarificantia, siue mundificantia sanguinem, faciētia ipsum illustrū; sicut capillus uen. fumus ter. lupulus. Septimō per exercitantia spiritus exercitio suauis & sibi proportionatos; sicut cogitationes, aspectus, auditus rerum gratarum, & desyderatarum; ut cantilenæ, & soni. Octauo confortando, & conseruando calidum complexionale spirituum sicut faciunt omnia aromatica habentia substantiam subtilē, aromaticam conformen substantiæ spiritus; sicut crocus, & quorum copiam subiungam statim. Nonō, & ultimō defendendo spiritus à uenenosis, & ab his, quæ sunt sibi contraria tam per qualitates manifestas, quā occultas, & propter modum mixtionis, & alia insequentia materiā; sicut faciunt zedoaria, lapis smaragdus, & similia. & plures harum intentionum si diligēter aduertas, tu inuenies in dia musco, & in electario de gemmis descriptione Mesue, & in lxtificatē Almā. in hoc ca. & in similibus cōpositis, & de nouo cōponēdis ad hoc propositum. in quibus nihil debet poni nisi propter aliquam specialem intentionem proposito deferuentem. nunc uerō subiungam medicinas simplices & compositas alteratiuas, & euacuatias in hac dispositione proprias, ex quibus sunt infra scriptæ. Frigida sunt primō acetum, quod aliquādo debet esse scilliticum propter humoris crassitiem, & uiscositatem, lactuca, endiua, lac, cucurbita, flores nenuparis, acetosa, rosa, uiola, coralli, margaritæ, coriandrum præparatum, flores prunorum, amigdalorum, flores citoniorum, pirorum, & proprie odorare perfica, pirapoma aromatica. Composita, saccharum ros. saccharum uiu. syrupus de pomis Mesue, olea ex aliquibus supra scriptis. Calida sunt aqua lactis, basilicon gariophilatum, calamus arom. gariophili, melissa, muscus, os de corde cerui, ambrabeen utrunq. cortices citri, crocus, cubugi, id est, caro perdicis, doronigi, enula, galia, macis, mēta, nuxa muscata, rosmarinus, xilaoles, passulæ. Composita sunt diamuscum diambra, mithridatum, pliris arcoricon, rosata magna Nicolai, electarium de gemmis Mesue, lxtificans Alman. aromaticum ros. muscatum, gariophilatum Gabrielis, Mesue Confectio Kefmes, Mes. conditum de citro. Galia muscata. theriaca, &c. Temperata & agentia à proprietate sunt; sicut aurum buglossa, & flores eius, calcedonius lapis collo suspensus, chrysolithus lapis sinistro brachio ligatus, borago, & flores eius, hiacynthus, saccharum buglossatum, saccharum boraginatum, lapis bezahar. Solutiua simplicia sunt agaricus, aloes, aqua lactis, colocynthis, eleborus niger, epithymum, escula, lapis lazuli, lapis armenus & mirobolani chebuli, & nigri, sal indus, sena. Composita sunt confectio hamech, dialene, pilulæ indę, pilulæ de lapide lazuli, pilulæ de lapide armeno, hiera Rafis Mesue, de coctio epithymi Mesue. his ergo pro complenda prima intentione quæ est malæ complexionis alteratio utere simplicibus, aut compositis exterius applicitis, aut interius sumptis secundū quod expedit tuo proposito. prohibentur autem humores à fluxu iuxta secundam intentionem euacuando, & diuertēdo secundum quod dicitur in sequentibus. corrigantur autem accidentia præsentia secundum quod expedit iuxta tertiam intentionem, ut puta uigilia cum somniferis exterius applicitis inungendo, embrocando, auribus, & naribus instillando, etiam interius sumptis incipiendo à leuioribus, & gradatim ad fortiora procedendo. & similiter cætera accidentia præsentia corrigantur secundum opportunitatem. cauendum est etiam ab imminētibus periculis ægris, & astantibus, ne se ex alto præcipitent, & ne se percutiant, neq. alios. quia propter oportet quod aliquando teneantur in compedibus & uerberentur. Et sint deputati eorum custodes aliqui quos uereantur & timant: nisi enim sic fiat nec permittent se medicari secundum quod oportet, & magna interdum faciunt scandala, & cura omnis erit uana. Regimen autem sex rerū non naturalium iuxta quartam intentionem declinet ad humidum semper, sed aliquando ad cal. aliquando ad frig. secundum discretā exigētiā, & totum regimen sit impinguium, præterquam quod non faciat cadere in oppilationes, & inter cætera fomnus sit prolixus, & omnia animi accidentia ad iucunditatē declinent. Si uero mania & melancholia pendeat à mala complexionē capitis, aut sit ualde antiqua, aut ex generatione cōtracta, aut sequens alias egritudines, quarum

quarum impossibilis sit eradicatione sicut quæ sequitur epilepsia. cura secundum plurimum est impossibilis, sed lenienda & accidentia mitiganda quantum est possibile.

Cura uero manie & melancholice pendendum à mala complexione cum præsentia materie melancholicæ in cerebro non aliunde communicata sex exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat euacuatione integra ex minoratione, digestionem, & eradicatione etiam iterata, si oportuerit. secunda diuerit. tertia causam coniunctam resoluit & euacuat. quarta malam complexionem in cerebro derelictam corrigit, & cerebrum, & cor confortat. quinta accidentia corrigit. sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Pro prima intentione, si melancholia fuerit sanguinea, aut aliud genus melancholice cum sanguine peccauerit, fiat phlebotomia ex cephalica dextra aut sinistra, scilicet secundum eam partem in qua maior capitis grauedo appareat, & fiat foramen latum & sanguine existente nigro hauriantur. 5. ant. 6. 3. sanguinis secundum exigentiam circumstantiarum. Si uerum sanguis fuerit subtilis aut tendens in album, non hauriantur ultra. 2. aut. 3. 3. Et si causa huius melancholice fuerit hepar, aut splen, phlebotomies basilica dextra aut sinistra: & si retentio menstruum aut hemorrhoidarum fuerit in causa, phlebotometur saphena. Mesue autem corpore existente pleno sanguine phlebotomatur primo ex uena nigra, deinde ex basilica in melancholia: incipit enim à phlebotomia magis conueniunt: Sed in mania incipit à basilica existimans hepar esse causam aduersionis & conuersionis sanguinis in melancholia. Et etiam post has si oportuerit phlebotomanda est uena frons ad eradicationem causæ coniunctæ. Si uero aliud genus melancholice peccauerit distans à natura sanguinis, si multum fuerit, minoretur cum. 1. 3. fenæ & gran. 5. zing. permixtis cum. 5. 3. feri caprini, uel sumatur serum caprinum cum. 3. 2. epithymi. & zing. salis gemmæ ana. gran. 2. uel minoretur cum pilulis istis. R. fenæ, epithymi, pisularum indarum. ana. 3. 1. zing. salis gemmæ ana. gran. 2. aloes hepatici. 3. 1. cum aqua buglosse formetur pilulæ. 1. 5. de quibus possunt sumi quinque uel septem pro minoratione. Deinde digeratur materia cum syrupo de pomis descriptione Sabor apud Mesue in capitulo de cura manie aut melancholice, aut cum syrupo de epithymo, aut de bisantiis, aut uiolis, aut de fumo terre cum aqua buglosse, boraginis, endiuie, nenufaris, melisse, & similibus quæ declinent ad calidum & frigidum secundum exigentiam melancholice & aliarum circumstantiarum. Et possunt syrups distemperari cum sero caprino, & esset ualde conueniens. Eradicetur autem materia si fuerit adusta in mania cum electario hamech distemperato cum sero caprino, in quo bullierit epithymum, fenæ, sal indum, zingib. & flores buglosse. Si uero melancholia non fuerit adusta loco electarii hamech ponatur diaphana Nicolai, aut eradicetur cum pilulis indis de lapide lazuli, & lapide armeno, & similibus. Multa etiam solutua per te componere potes obseruatis quatuor regulis Mesue. Prima, ut non semel multam & laboriosam facias euacuationem, sed per interualla parum pro uice educendo, quo euacuatio reiteranda est. Secunda, ut medicinæ exsoluentes non recedant multum à gradu medicinarum incolumium, quod intelligendum est tam quo ad qualitates manifestas, quæ quo ad occultas. Tertia, ut solutua semper sint mixta cum humectantibus & lenientibus, propterea præstantiores sunt medicinæ in forma liquida quam sicca. Quarta, ut nunquam denudentur à medicinis confortantibus membra principalia & spiritus. Similiter multa digestiua componere potes cal. aut frig. secundum quod expedit, sed semper sint humida non op pilantia, imo oppilationem remouentia. possunt enim aliqua ex simplicibus supra enumeratis bullire cum aqua lactis, & postea facta debita colatione, potest decoctio syrupizari cum sacch. est enim aqua lactis optimum uehiculum in huiusmodi passionibus. Et nota quod bonum est huiusmodi digestiuis & euacuatiuis ponere aliquid dirigens talem medicinam ad caput, sicut uiolæ, stœcas, & similia. Secunda uero intentio, scilicet, diuersio perficitur cum clysteribus, quæ per te potes componere frictionibus, uentilationibus, descendendo, locutionibus extremitatum, quæ cum hoc quod diuertunt, sunt etiam ad somnum inducendum inuatiua si expediret. Fiant etiam diuersiones cum capupurgis, masticatoriis, gargarif-

matibus, quæ tria cum hoc quod diuertunt etiam causam coniunctam eradicant, quod pertinet ad tertiam intentionem. Et ad hoc optime ualent cauteria actualia, & proprie cum auro facta in commissura coronali, sagittali, lambdæ, & duabus commissuris mendosis quæ sunt in lateribus. non dico quod omnes semper cauterizari debeant, sed una aut plures secundum quod est expediens tuo proposito, semper inspiciendo cuius partis cerebri operatio magis lædatur, & fiat in commissura illi parti pertinenti. Et huiusmodi cauteria non solum conferunt in ea quæ est per essentiam, sed etiam per communitatem confortando cerebrum ne recipiat, ut apparuit in cap. de soda per communitatem & de intentione Auic. Tertia autem intentio quæ est causæ coniunctæ eradicatione completur cum iam dictis in secunda intentione, & partim cum complementibus quartam, quæ est cerebri & cordis confortatio & malæ complexionis derelictæ correctio. Et completur ambo cum quibusdam localibus, ut embroca ros. foliorum salicis, florum nenufaris, uiol. boraginis, buglosse. ana. M. 1. fenæ. 5. 3. stœcas arabici. 5. 1. capitis castrati numero. 1. Caput castrati confractum bulliat in sufficienti quantitate aquæ cum suprascriptis usque ad decoctionem. deinde cum aqua illa tepida caput lauatur & embrocetur alternis diebus, etiam omni die, & pluries in die si expedierit. Et si non posset dormire, huic decoctioni possunt addi cortices papaueris & laëtua. Balnea etiam ex similibus humectantibus facta, tori corpori sunt in hac dispositione conuenientia. & in fine posset inungi caput, & maxime in mania cum oleo ros. uiol. de floribus salicis, de nenufare, & etiam myrtino ad confortationem & malæ complexionis derelictæ correctionem. Et confortetur etiam cor cum epithymatibus in hac dispositione propriis quæ ex suprascriptis eligantur. saccharum quoque ros. buglosse, uiol. boraginatam cum gemmis, margaritis, pilulis transmarinis, succo pomorum dulcium, & huiusmodi ualent iuxta quartam intentionem ad cerebri & cordis confortationem. Et si mala complexio derelicta esset frigida sicut in melancholia procedatur cum calidis exterius applicitis & interius sumptis. Suprascriptæ enim embroca & unctiones magis conferunt in mania quam in melancholia, imo in melancholia augeantur cal. & minuantur frigida: semper tamen in quacunque specie declinent ad humidum. Corriganter accidentia & proprie uigiliarum instantia cum syrupo de papauere, sumpto hora somni, cum lacte sem. papaueris. Et si potentioribus non erit, detur requies descriptione Nicolai aut aliqua ex pilulis de cynoglossa, siue alcaiber apud Mesue cap. de catarrho ex inuentione Alexandri, & etiam inducatur somnus cum his quæ applicantur fronti & temporibus sicut cum populeone, cui apud necessitatem addatur parum opii, aut cum embrocis de quibus sermo præcessit, & cum balneis humectantibus. Et si aliquando cibus in stomacho corrumperetur, uomitu educatur, & postea stomachus confortetur cum aromatico ros. & etiam exterius applicitis, & omnia accidentia secundum quod oportet corriganter recurrere ad illorum capita propria. Sexta autem intentio scilicet, debitum regimen, ordinetur ut fuit dictum de intentione Rasis in expositione textus. Declinet enim aer ad humidum & sit aliquantulum calidus aut temperatus in actiuis in melancholia, sed in mania declinet ad frigidum. unde habitet in terreno, sed sit clarus & lucidus. Et domus habitationis sit sine picturis, & similiter sit regimen in cibo & potu, ut dictum est de aere, & sit impinguatium præter hoc quod oppilet. Sed declinet ad frigidum in mania & ad calidum in melancholia. Et dentur omnia quæ generent bonum sanguinem, subtilem, clarum, & cum hoc cerebrum & spiritus confortent. Quapropter uinum album uel medii coloris, subtile, unius anni tantum, aliquantulum dulce, & debite lymphatum secundum exigentiam est huic proposito conueniens. Et sit somnus prolixus, & procureretur euacuationes à natura institutæ: caueat à coitu nisi natura præter modum stimuletur, moderate exercitetur, & tempore debito: & frictiones leues diuertunt, & impinguant & uicem suppleant exercitii. Et omnia iucunda administrentur ei cauendo à tristitia, ira, solitudine, cogitationibus profundis & prolixis. Sit tamē deputatus eius custodiæ aliquis quæ timeat & uereatur, & a quo secundum opportunitatem uerberetur, ut sit obediens.

Cura

Cura autem mania & melancholice per communitatem.

Cura autem mania & melach. per communitatem duplex exigit regimen unum circa membrum recipiens, scilicet cerebrum, alterum circa membrum mittens. Membra autem mittentia quorum communitate frequenter leditur cerebrum & incurrit melacholiam, sunt sex, cor, stomachus, sple, mesenterium, quod est causa melancholice mirachie, licet etiam mirach proprie acceptum potest esse causa eius, hepar, & matrix. Primum autem regimen cerebro adhibendum, quod debet obseruari in toto cure processu, est, ut confortetur & prohibeatur ne a membro sibi communicare recipiat vapores, aut humores, aut malam qualitatem per quam ipsi complexio distemperetur. Hoc autem fit cum interius sumptis & exterius applicitis ipsum confortantibus ne recipiat huiusmodi causas nocuentorum, & ne labatur in aliquam aegritudinem, in quam merito membri sibi communicantis esset aptum labi. Ergo in omni dispositione cerebrum debet humectari, debet autem aliquando calefieri & proprie in melancholia, aliquando frigescere & proprie in mania secundum exigentiam nocuenti sibi a membro mittente communicati, aut communicandi. Debet etiam confortari cum his quae propria sunt, calidis aut frig. secundum exigentiam. Quae autem sint ista patere possunt ex iam dictis: sunt enim enumeratae fere omnes medicinae famosae simplices aut compositae cal. & frig. hu. & sic. & temperatae in hac dispositione proprie. tamen utere his quae tibi magis deseruiunt. Secundum autem regimen respiciens membrum mittens quatuor exigit intentiones. Prima, quia ista nocumenta horum membrorum secundum plurimum sunt materialia, est euacuatio integrata ex minoratione, digestionem, & eradicationem etiam iterata secundum exigentiam. secunda est diuersio tam a membro mittente quam a cerebro recipiente. tertia est causae coniunctae facientis nocuentum in membro mittente resolutio & remotio. quarta est huiusmodi membri confortatio, rectificatio ipsius complexionem ut huiusmodi materias non generet, sed fiat minima materiae laudabilis. Quae autem sunt digestionem & euacuatio materias horum membrorum iuxta primam intentionem ex dictis, & dicendis manifestum erit. Oportet enim aliquando phlebotomare aliquando electiue euacuare alios humores cum his quae sunt propria materiae peccati & membro laeso. Et aliquando uomitu, & aliquando secesu, & aliquando per alias regiones secundum naturae uariam inclinationem. Et quia hi humores communiter sunt crassi secundum plurimum erit opportunum has euacuationes iterare. Et digestio debent esse secundum plurimum humectantia, subilientia, incidentia, aperiencia, propria materiae peccanti, & membrum laesum. Sed aliquando magis ad cal. aliquando magis ad frig. declinent secundum exigentiam materiae, & accidentium, & reliquarum circumstantiarum. Diuersio autem iuxta secundam intentionem perficiatur cum clysteribus, lotionibus crurum, ligaturis, frictionibus, uentilationibus, quae descendunt a membro laeso ad partes distantes. Et etiam aliquando opus est prouocare menstrua & haemorrhoidas, & si quod ulcus antiquum fuerit consolidatum, oportet ipsum de nouo rumpere, ut materiae retentae per regiones illas diu consuetae purgentur. Tertia autem intentio scilicet causae coniunctae a membro mittente resolutio perficitur cum emplastris, & unguentis, & fomentis tam membri quam materiae propriis, & aliquando cum uentosis cum scarificatione & sine: & aliquando cum cauteriis tam actualibus quam potentialibus in membro mittente, licet actualia sint praestantiora quae diu teneantur aperta: sunt enim efficacia in multis passionibus. Et haec omnia cum hoc quod euacuant causam coniunctam, etiam a cerebro diuertunt. Istorum autem membrorum confortatio & malitiae complexionis rectificatio iuxta quartam intentionem perficitur cum interius applicitis suis discretis contrariis aliquantulum stipticis, & per uirtutem quartam ipsa confortantibus, quae omnia patere possunt in propriis capitulis dispositionum singulorum membrorum. Accidentia autem corrigantur & ordinetur debitum regimen sex rerum non naturalium secundum quod dictum fuit in cura melancholice per essentiam in cerebro, &c.

De cura cuthubuth.

Cura cuthubuth quae est una species famosa melancholice

exigit illas sex intentiones curatiuas superius dictas in cura melancholice per essentiam in cerebro. Verum Auic. appropriat aliqua huic dispositioni. Primum ut multum dormiat & totum regimen notabiliter declinet ad hum. & aliquantulum ad frig. cum pendeat a melancholia genita per adustionem cholerae, aut melancholice. Secundum ut fiat cauterium in syncope, scilicet in commissura coronali. Tercium ut fiat phlebotomia fere usque ad syncopem, de qua non paruum est dubium, quando Auic. in nulla specie melancholice aut maniae perceperit tantam phlebotomiam, cum tamen in melancholia sanguinea competat copiosior phlebotomia. Praeterea multa extractio sanguinis qui melancholice opponitur, uidetur esse causa augmenti melancholice. Sed ego credo in intentionem Auic. fuisse hanc melancholiam esse coniunctam multitudini humorum & sanguinis: cuius signum, quia accidit in principio ueris, scilicet in februario, & ob istam causam tantam praecipit phlebotomiam ad euacuandam multitudinem. Et ex hoc potest facilius patere solutio ad duas instantias adductas in contrarium. Quartum est ut uerberetur cum hic sit multum inobediens.

De cura ilisci.

Cura autem Ilisci quae est una species melancholice pendens a causa primitiua scilicet ex amore duplex regimen exigit. Primum ut amor & appetitus rei amatae deleatur aut remittatur. Secundum si primum non sufficeret quia forte iam pendet a causa corporea fixa in cerebro, est, ut curetur cura melancholice per essentiam de qua sermo praecessit. Primum autem regimen duobus perficitur modis. Primus est ut patiens potius re amata si fieri potest: & est ex illis quae lex permittit, nam habitibus praesentibus in materia cessat motus. Si uero istud fieri non potest, aut lex non permittit, tunc secundus modus est ut amor aut appetitus illi deleatur, aut remittatur tum faciendo, ut ipse abominetur rem amatam memorando turpissima illius, & quod illa potius amabat alium quam ipsum, imo plures: & persuadendo ei quod haec est tentatio demonis, & in praedicium animae suae. secundum conuertendo animum eius ad alia, tum scilicet ad dignitates ad quas exaltetur, tum ad uenationes iocos, & ludos, tum ad amorem aliarum, quibus potius corrumpitur corruptio enim puellarum, & plures concubitus ipsarum, & ipsarum renouatio, & delectatio cum ipsis maxime iuuant ad delendum amorem primum. & si per hoc non deleatur species tristitiae magna, & dolores ingentes fortasse inducent obliuionem primi amoris. & ex his patere potest cura melancholice a quacunque alia causa primitiua.

De catarrho.

Cap. 17.

Catarrhus graece, fluxus latine: rheuma graece, fluctuatio, siue inundatio latine. quauis in libro de doctrina graeca catarrhus sumitur tripliciter: communissime, & est fluxus materiae de uno membro ad reliquum: communiter, & est fluxus materiae a capite ad membra supposita: proprie est fluxus materiae a capite ad pectus. Branchus est fluxus materiae a cerebro ad fauces, aut ad amygdalas quae sunt parui infra aures. & branchi possunt dici pharynges graecae: fauces latine. Coryza uero, latine grauedo est fluxus humiditatis ad nares, & nomen sumpsit a sonitu in ossibus narium, & cartilaginibus sensatum. Et Gerardus de Solo his duobus uers. haec perstrinxit.

Dum fluat ad pectus, dicitur rheuma catarrhus,

Ad fauces branchus, ad nares dico coryzam.

Ex his patet quid nominis, & quid rei. Catarrhus uero ad omnes aegritudines corporis disponit: fluens enim ad nernos, & originem nuchae potest causare spasmus, paralytum, & ceteras neruorum passiones. fluens ad oculos causat ophthalmiam, caecitatem, & ceteras oculorum passiones. fluens ad aures, surditatem: ad carunculas mamillares, impedit olfactum: ad cutem capitis, facit alshafati, tineam, & similes: ad dentes, dolorem eorum, & corruptionem: ad linguam, & partes oris, alchola, & ceteras aegritudines: ad guttur, synanche, ad cannam pulmonis, impedit uocem: ad pulmonem, apostema eius, & phthisim: ad pectus, pleuresim: & interdum fluens ad partes spirituales subito suffocat: ad meri, impedit deglutitionem: ad stomachum, dolorem in eo, & ceteras aegritudines.

nes: ad intestina, fluxum, & cholicam, descendens etiam per nervos, & uenas ad loca longinqua causat podagram, & ceteros dolores arteticos: ad cor, causat tremorem in eo, & ceteras passiones: & ad uenas apoplecticas, apoplexiā. & per uenas fluens ad hepar, causat nocumenta in ipso: & ad renes, & ad uesicam, quandoque excoarationem. & ut unico uerbo omnia complectar, potest esse causa quarumcunque aegritudinum cuiuscunque membri saltem in genere.

Cum caput alicuius in egressione balnei discoopertum fuerit, aut post exercitium, aut post aliud, fueritque aer frigidus, & uentus septentrionalis, & accidit inde naribus, & palato pruritus, & commotio, & sternutatio.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas: primò ponit causas catarrhi, & signa in generali: secundo curam, secunda ibi. Pannus tunc calefaciendus, de prima dicit, quòd, dum caput alicuius in egressione balnei discoopertum fuerit, aut post exercitium, aut aliud calefaciens, sicut iram, coitum, & similia: & præcipue, si fuerit aer frigidus, & uentus septentrionalis, qui frigidus est, & siccus, tunc is incurret catarrhum, cuius signa generalia sunt hæc, titillatio, pruritus in naribus, & palato & commotio, & sternutatio: si enim materia fluat ad nares causabitur in eis pruritus & commotio propter motum illius materie, & interdum sternutatio, si uirtutem stimulauerit ad expellendum, horum autem ratio est, quia in balneo humores calefiunt, subtiliantur, pori aperiuntur. similiter in exercitio & aliis huiusmodi calefacientibus. unde aer frigidus occurrès multum penetrat ad profundum, & multo magis uentus. quapropter fiat illarum humiditatum liquefactarum per balneum expressio ad membra supposita, & fit catarrhus, signa uerò iam dicta sunt propria, cum commotio, titillatio, & pruritus quidam non absoluitur ab ipsa materia actu fluente. Prima distinctio, Catarrhus est duplex, quidam calidus, quidam frigidus. & catarrhus calidus potest à causa frigida pendere, sicut à uento exprimente humiditates calidas in capite existentes: & potest pendere à causa calida sicut à balneo liquefaciente. idem dicendum est de catarrho frigido. & propterea non te decipiat causa, nec arguas, causa est calida: ergo catarrhus calidus est: nec contra: est causa frigida: ergo catarrhus frigidus. sed uide signa inferius ponenda. uerum secundum plurimum catarrhus calidus pendet à causa calida, & frigidus à frigida.

Secunda distinctio est. Aliquis catarrhus est crassus: Aliquis subtilis. & uterque potest esse calidus, & frigidus: subtilis quidem cholericus est calidus: subtilis aquosus est frigidus. similiter crassus potest esse calidus partibus subtilibus per actionem calidi resolutus, & potest esse frigidus. & factus crassus per actionem frigidi partes subtiles exprimentis. Tertia distinctio, quidam est saluus, quidam amarus, quidam acutus, quidem foetens: & hi sunt calidi: quidam insipidus, quidam dulcis: & hi sunt frigidi.

Quarta distinctio, quidam est continuus, quidam interpositus: imò frequenter periodicus, materia in determinato tempore sub certa quantitate sufficiente ad motum aggregata, qua fluxa quies erit per tantundem temporis.

Causæ sunt triplices primitiæ, antecedentes, & coniunctæ primitiæ quædam sunt extraneæ, sicut percussio capitis cerebrum debilitans, sumptio uenenorum, aut eorum applicatio, balneum calidum, & comestio rerum calidarum, sicut aliorum, caprarum, & similibum. rosæ, & uiolæ à proprietate faciunt coryzam. ex causis primitiis non extraneis est aer frigidus, statio sub radiis lunæ, & uenti septentrionales humiditates exprimentes, similiter aer calidus, statio sub sole, & uenti meridionales caput replentes, & humiditates liquefacientes. & si uenti septentrionales succedant ad meridionales: plures catarrhos & aegritudines ab eis pendentes expectare oportet: cum primi caput replant, secundi humiditates exprimant. & multiplicentur etiam in hyeme, & proprie si præcesserit estas septentrionalis, paucæ pluiæ, & autumnus austrinus pluuiosus: & quando multiplicatur catarrhi in hyeme, & proprie in regionibus meridionalibus propter repletionem caput, item crapulæ, ebrietates, uina potentia, satietas nauseatiua sunt causa catarrhi, & proprie in regionibus meridionalibus, & omnia ad caput multum effumantia,

& difficilis digestio. somnus enim multus est causa eius, caput replendo & humectando; repletio superflua, & retentio superfluum confuetorum euacuari. Item nimia sanguinis euacuatio per phlebotomiam, aut aliter sunt causa eius: exercitium forte humores liquefaciendo, & nimia quies caput humectando: ira fortis, & cogitationes fortes, humores liquefaciendo sunt causa catarrhi. antecedentes quidem causas sunt duplices: quædam per essentiam, quædam per communitatem. primi sunt humores superflui cuiuscunque generis in capite existentes. item malæ complexionis, ut frigida, debilitans digestiuam, & humida debilitans retentiua, & calida humores subtilians, & stimulans expulsiuam. sicca uerò rarissime est in causa eius, nisi forte poros obstrueret. quibus prohiberetur uaporum resolutio. & mala complexio frigida est causa, cur branchi, & coryzæ in ualde senibus non maturantur, cum frigiditas illa ex decursu ætatiuæ acqui sita cor rigi non possit. quapropter per uiam paulatinæ congestio nis in his, & in quibus uirtus digestiua & expulsiua est debilis, sunt catarrhi, digestiua non potente sufficienter conuere re nutrimentum: & expulsiua non potente superfluitates expellere. debilitas istarum uirtutum quandoque contrahitur ex principio generationis, quandoque ex tempore propter longam cerebri aegritudines. Catarrhi autem quandoque sunt propter communitatem, aut à toto sicut in febribus: & maxime in principiis febrium uidemus fieri catarrhos materiæ eliquatis ex caliditate uaporum febrium: quandoque per communitatem à membro particulari: sicut à stomacho maxime cum debilis est in digerendo, multis uaporibus ad caput eleuatis, & proprie cum os stomachi est debile, non se corrugas super cibum. & similiter pedere possunt à reliquis. membris nostri corporis. sed notate, quòd, licet plures sint catarrhi frigidi, quàm calidi, eo quod superfluitates cerebri sunt secundum plurimum frigide magis, quàm calide: sunt tamen frequentius à causa calida, quàm à frigida, cum causæ calidæ faciunt catarrhos attrahendo, & dissoluendo, & ex eo quod magis ponunt materias in motu ipsas subtiliando. frigiditas uerò facit catarrhos debilitando uirtutem: unde paulatim congeritur materia, & aliquando incrassando uapores ad caput eleuatos: est enim caput sicut alembicus, ut uult Auicenna. quandoque uerò humiditates exprimendo. frigiditas uerò magis immobilizat, & retinet materias, quàm caliditas. huic tamen opinioni non assentior: cum sit contra experientiam, & contra Auicenna. s. tertii cap. proprio, & contra Galienum. 2. technici. notate secundo quòd caput calidum est paratum catarrhis à causa extrinseca siue calida, siue frigida propter pororum dilatationem: caput uerò frigidum, est magis paratum catarrhis à causa intrinseca: humidum uerò propter utramque causam est ad catarrhos paratissimum. tertio notate, quòd corpora habentia splenem durum non habent catarrhum: quia habentes unum membrum debile habent reliqua membra incolumia materiis ad membrum debile fluentibus: secunda causa, quia habentes splenem durum, habent humores crassos, terreos, non aptos fluxui. & similiter e contrariò habentes catarrhos non facile incurrunt duritiem splenis. ultimo nota, quòd sorda coniuncta catarrho augent ipsum tum attrahendo propter dolorem, tum uirtutes debilitando &c.

Signa prognostica catarrhi sunt causæ ipsius: & dispositio corporum, de quibus sermo præcessit. signum demonstratiuum commune catarrho, & coryzæ est titillatio, & commotio quædam sensata in naribus, uel in gutture secundum fluxum materiæ ad unam partem, uel ad alteram.

Signa catarrhi calidi & frigidi sunt hæc. primum sumptum à complexione maxime capitis, quia si calidum sit, ut quia facies erit rubra, uel citrina. erit signum catarrhi calidi. si uerò contra complexio fuerit frigida, quod significabitur per pallorem, & plumbeitatem: erit signum catarrhi frigidi. secundum signum est sumptum à caliditate uel frigiditate sensata eius, quòd fluit per nares, aut palatum. tertium signum sumptum à sapore, siue odore eius quòd fluit: nam, si fuerit saporis, aut odoris acuti, aut salis, aut amari, aut foetentis: istud est calidum, si uerò insipidi, dulcis aut acris, istud est frigidum. quartum sumitur à colore: si enim quòd fluit, fuerit citrinum aut rubeum, significat caliditatem. si uerò album, & non fuerit salum, frigiditatem. si uerò nigrum, aut uiride sine sapore

aut

aut odore forti significante caliditatem; istud est frigidum. si uerò cum dolore forti; illud est calidum. uerum nigredo à frigidityte est opaca; à caliditate est lucida. quantum signum sumitur à iuuantibus, & nocentibus. si enim iuuetur per se à febre, & calidis est frigidus, si contra, est calidus. Sextum signum sumitur à nocentibus eius. si enim fluens ad nares fecerit punitionem, ardorem, frequentem sternutationem cum oculorum rubedine, & partium adiacentium, ipse est calidus, & præcipue si ibi fuerit paucitas nascitis, id est, locutionis cum naso, neque odoratus fuerit uehementer impeditus, neque oppilatio narium multa. ex contrariis autem signis cognoscitur ipsum esse frigidum. si uerò fluat ad palatum, & guttur, & fecerit asperitatem in gutture punitionem, ardorem, mordicationem, alchola, ipse est calidus, & horum priuatione arguitur ipsum esse frigidum.

Signa uerò catarrhi crassi, uel subtilis sumuntur primo ex eo, quod expellitur. nam si fluat, & non terminetur termino proprio; subtilis est. Si uerò sit globatum, & terminetur termino proprio; crassus est. secundò sumitur ex uelocitate fluxus; nam, si fluat subito, & maxime ad partes distantes; sicut ad uias angustas ipsius pulmonis subito suffocans; est subtilis si uerò tarde fluat, & crassus: imò interdum adeo crassus est, ut uix possit euelli. uerum non te decipiat mora ipsius; nam longa mora, exempli gratia, in pulmone partibus subtilibus resolutis incrassatur, & sic, cum expellitur, apparet crassus: sed hæc ambiguitas tollitur ex uniformitate, uel difformitate eius; nam, si crassus sit; per totum hoc arguitur eius crassitatem. si uerò crassus sit in medio, subtilis in partibus circumstantibus, arguitur ipsum esse subtile: illæ enim partes circumstantes subtiles sunt, quæ nouiter adueniunt nondum incrassatæ. cæteræ autem differentiæ catarrhi facile dignoscuntur. signa uerò causarum primitiuarum sunt ipsæmet causæ primitiæ, antecedentes, uel concomitantes nocumenta ex ipsis derelicta.

Cognoscitur autem esse per communitatem à toto; ut quia ad sunt nocumenta totius; ut puta febres, in quarum paroxysmis catarrhus augetur, & ipsis recedentibus minuitur, ipsis ablatis remouetur. similiter, si præcedat, aut ad sit nocumentum membri particularis; ut stomachi, aut aliorum quorum nocumento aucto augetur catarrhus, & diminuitur diminuitur. Cognoscitur autem esse per essentiam in capite ex ipsius continuitate, & quia non ad sunt aliorum membrorum ægritudines, à quibus pendere potest. signa uerò humorum, scilicet phlegmatis, aut cholæræ, & cætera, à quibus pender, sumuntur à signis superius positis. signa uerò causarum efficietium corporearum, scilicet calid. frigid. &c. patet ex dictis in præcedentibus capitulis; ut quia caliditas capitis est cum citrinitate faciei, aut rubore, & similiter temporum, frontis, & oculorum, & cum caliditate sensata circa illas partes, & cæteris signis calid. cerebri latius uidentis prima tertii, & secundo technii. si uerò cum frigidityte; erit pallor, & albedo, color plumbeus, tactus frigidus. si uero fuerit humiditas in causa, erit multa mollities, laxitas &c. sicca uerò ex asperitate, & paucitate catarrhorum cognoscitur.

Signa uerò debilitatis siue ex tempore, siue à generatione contractæ, sumantur à diminutione operationum cerebri, & ortorum, uel corruptione, similiter à paucitate resistentiæ causis ægris &c.

Prognostica. primum. Catarrhosi sunt fere ad omnes ægritudines facile parati maxime habentes catarrhum subtilem. secundum. Catarrhus per essentiam diu inueteratus raro, uel nunquam recipit curationem. Tertium est Hippocratis. Brachi, & coryæ in ualde senibus, id est, decrepitis non maturatur. 2. aphor. ante omnia in cura catarrhi sunt tres canones obseruandi. primus. aliquando catarrhus, & causa catarrhi conueniunt; aliquando contrariantur, & si quidem conueniunt, ut quia ambo sint frigidi, cum calidis procedemus. si uerò ambo calidi; cum frigidis. si uerò contrariantur, ut quia causa sit calida, & catarrhus frigidus, aut econtrario, est diligenter considerandum, cui magis intendere debeamus. sed hic attende canones Aui. quarta primi, capite ultimo. Si enim causa catarrhi, & catarrhus eque fortes sint, aut causa fortior magis ad causam intendere debemus tum quia causa, tum quia secundum plurimum ipsa non remota catarrhus non remo-

uetur. Et propterea Rasis in catarrho proueniente à uento frigido, uel aere frigido docet caput cum panno multum calidari; etiam si catarrhus esset calidus. similiter econtrario ubi catarrhus pedit à sole, uel à caliditate impressa in caput; deberemus ipsam primo remouere cum frigidis; & si catarrhus esset frigidus. ubi uerò causa esset parua, & leuis, catarrhus autem ualde fortis, magis oportet intendere catarrho; causa tamen non omnino neglecta.

Secundus canon est, ut semper in principio caueamus ab omnibus inquietantibus, & materiam agitantibus, siue illa fuerint medicinalia, siue pertineant ad regimen sex rerum non naturalium. & proprie omnis motus, siue localis siue sternutatio, & cætera huiusmodi sunt in principio uitanda.

Tertius canon, ut demus ea, quæ confortant caput, & membrum, quod læditur per catarrhum; sicut pulmo, & huiusmodi. & caueamus à nocentibus sibi. & propterea cauedum est ab acerbis, & acetosis; & similiter à ualde stipticis, & ponticis. uel, si huiusmodi conueniant propter ipsum catarrhum, sicut acetum ad incidendum, bolus armenus ad contrahendum; hæc acetosa corrigantur cum dulcibus, stiptica cum lenientibus &c.

Cura ergo catarrhi secundum Mesue sex exigit intentiones. prima ordinat debitum regimen: secunda digerit materiam: tertia euacuat: quarta diuertit: quinta sistit ipsum: sexta corrigit accidentia. & hæc intelligenda sunt præter intentionem primam generalem, quæ est remotio causæ, quæ secundum plurimum in cura omnium catarrhorum est præmittenda. si ergo causa fuerit primitiua; sicut aer frigidus, aut calidus, crapula, ebrietas, somnus diurnus, & huiusmodi; remoueantur: & similiter nocumenta ex ipsis derelicta. si uero fuerit per communitatem à toto; sicut in febribus; attendatur curæ febrium, catarrho non neglecto: & similiter, si fuerit per communitatem à stomacho, aut à membro particulari; nocumentum illius membri corrigatur, & diuertantur uapores ad inferiora omni genere diuersionum. & semper in fine mensæ sumatur aliquod uaporum repressiuum, & oris stomachi corrugatiuum; sicut coriandrum, citonium, & huiusmodi, & iterum cura catarrhi non negligatur. si uerò causa fuerit per essentiam in capite; sicut mala complexio calida, aut frigida, aut debilitas aliam consequens dispositionem ex tempore, aut à generatione contractam; huic in primis intendatur. & si eius cura catarrho conueniat; simul amborum curæ communi intendatur. igitur iuxta primam intentionem Mesue. Si catarrhus fuerit calidus, declinet aer ad frigidum; si frigidus; ad calidum: secundum plurimum tamen ad siccum. & hoc dico, ubi catarrhus, & eius causa conueniunt. ubi uerò contrariantur; causæ secundum plurimum in principio magis attendatur: deinde catarrho. & inter cætera cauedum est ab aere fumoso, uentoso, pluuioso, & statione sub radiis solaribus, aut lunæ, & proprie per fenestram ingredientibus, & sit boni odoris. Caput uerò magis, aut minus teneatur calidum secundum temporum exigentiam ita, ut non æstuet, neque frigeat, habendo tamē respectum ad consuetudinem, quæ in hoc multum consideranda est. uerum in causa calida, & catarrho calido magis frigidum teneatur: econtrario in catarrho & causa frigida. residuum tamen corporis satis calidum teneatur, ut uapores non retineantur; imò transpirent, & resoluantur, & ad inferiora diuertantur. Potus eius sit aqua faccharata, aut aqua mellis, aut hordei, aut saltem per arenam distillata. cauedum est à uino, nisi in declinatione, potus tamen non sit nimius. uideat potum aquæ frigide, nisi catarrhus ualde calidus sit. potus aquæ calidæ maturat catarrhos. uerum in catarrho subtili calido retetio aquæ frigide in ore cōfert. Ex ferculis conueniunt far: hordeum, spelta; sed maxime horum kisch. item kisch fabarum, farina hordei, amyli, in calido; sed in frigido kisch frumenti, sicut sicca, kisch cicerum. uideantur caules, & cætera multum effumantia. uideantur etiam multum brodialia, & proprie in coenis. ex carnibus, & piscibus conueniunt, quæ sunt facili digestionis, boni nutriti pauca superfluitatum, & lac est præciosum in catarrhis maxime calidis, nisi aliud obster. sit coena leuior prædior; imò interdum omittatur. diminutio enim ciborum, & potuū est cura prima. in fine mensæ comedat corrugantia os stomachi, & fumos prohibentia; sicut coriandrum præparatum, citonium, aut

aut pirum coctum. somnus nimius nocet, & etiam superflua vigilat, magis tamen nocet somnus, & proprie immediate post crapulas, & quemcumque cibum, & maxime diurnus. dormiat capite leuato ad alterum latorum declinante. procurentur euacuaciones omnium superfluitatum per conuenientes regiones. frictio tamen capitis, & pectinatio non conueniunt in principio; sed in fine. coitus superfluus nocius est, exercitium non conuenit nisi in declinatione. uerum frictiones, & proprie partium inferiorum uicem suppleant exercitij. accidentia animi sint quieta. Secunda intentio, scilicet digestio perficitur in subtili calido cum syrupo uiolaceo, de iuiubis, de sebesten, de papauere aut cum eorum decoctionibus. & mucilago psyllij est efficax. similiter diadragantum, diapapauer, diacodion sunt ultima. cum hoc enim, quod digerunt, etiam sistant catarrhus. si uero fuerit catarrhus, calidus, crassus, cum aliquo istorum, sicut cum syrupo uiolaceo admisceatur aliquod incisum, abstersium; sicut syrupus acetosus aut oxymel simplex: & aqua hordei potius medicinalis est, & abstersua. in catarrho uero frigido crasso conuenit oxymel simplex, compositum, scilicet cum lochi de pino, diatri, & similes: & sumantur cum aqua mellis, aut hyssopi, aut passularum, & similia. si uero catarrhus fuerit subtilis frigidus aquosus; conueniunt calida, & sicca incrassantia; sicut syrupus de myrto cum melle rosato: & possit sumi cum aqua decoctionis thuris, sandaracæ, nucum cupressi, & possunt aromatizari cum mace, gariophyllis, galia mulcata, & similibus. uerum Mesue dixerit catarrhos tam calidos, quam frigidos cum balneis, & cum his, quæ capiti applicantur, & cum his, quæ injiciuntur in aures, & cum odoratis per nares calidis, aut frigidis secundum exigentiam. sed credo hæc non conuenire nisi, ubi materia fuerit ualde pauca, aut ubi fuerit minorata. Tertia autem intentio completur cum euacuantibus materiam peccantem. si ergo materia fuerit calida; educatur cum decoctione fructuum, scilicet iuiubarum, sebesten, prunorum, uiolarum, cum quarum decoctione trahatur, calix. 3. i. aut manna. 3. i. s. & exhibeatur stomacho ieiunio; & possit addi apud necessitatem a. s. 3. usque ad 1. elestatij de succo rosarum. pilulæ etiam alsciare possent exhiberi post cenam, & apud necessitatem possunt fortificari cum. 3. s. pilularum aurearum, & polypodij habet proprietatem in euacuando materiam salam. si uero fuerit phlegmatica conuenit hiera simplex, hiera composita, pilulæ cochæ, & similes. Clysteria quoque conueniunt in calida; si sint infrigidantia, & humectantia, & lenientia: & in frigida si sint calefacientia & magis acuta. Phlebotomia uero non conceditur nisi in tribus casibus. Primus, si catarrhus est calidus in corpore calido cum multa sanguinis abundantia, scilicet in quo sit oculorum rubedo, uenarum plenitudo &c. Secundus, si catarrhus fuerit calidus, & declinans ad aliquam partem figatur in ea, sicut in oculis, faucibus, pulmone, pleura, diaphragmate. Tertius casus, si catarrhus sit cum febre, & maxime continua, argente materia, uel putrescentem, uel peccantem ad intra uenas. Quarta intentio, scilicet diuersio perficitur quandoque cum communibus; sicut cum frictionibus, ligaturis, uentofationibus, lotionibus crurium, & brachiorum, quæ debent diuersificari secundum materiam diuersitatem. In catarrho quidem calido sint frigida, & in frigido calida. quandoque perficitur cum proprijs, & sunt quatuor generum, scilicet caputpurgia, gargarismata, masticatoria, & uesticantia, siue cauterizantia. Caputpurgia uero sunt ad diuertendum materiam per nares de cuius fluxu timemus ad loca nobilia. hæc enim digesta materia, & euacuata optime conferunt: ipsa uero non digesta, nec euacuata magis nocent agitando materiam, quam profint ipsam diuertendo. & hæc diuersificanda sunt. in materia quidem frigida conceduntur acuta; sicut succus artanitz, elleborus, & similia: in calida uero aqua uiol. cum succo blitis, aut pauco succo artanitz. perficitur etiam hæc intentio cum suffumigationibus, & odoramentis aperientibus nares, & deoppilantibus colatoria; sicut si in catarrho calido reciperet fumum decoctionis uiolarum, & in frigido fumum decoctionis maioranæ. Gargarismata uero sunt propter quatuor intentiones. prima ut partem nobilem per ignobilem purgent; sicut gargarisma factum ex decoctione pyrethri, zingib. & similia;

purgat. n. cerebrum per uiam oris. aliquando fit ad stringendum fluxum; sicut administratio diacodion, & decoctio rosarum, balautiarum, & similia. aliquando fit ad abstergendum illud, quod fluit; sicut administratio oxymellis simplicis, aut scillitici. aliquando fit ad alterandum, quod fluit; sicut administratio camphoræ ad calidum, & myrrhæ ad frigidum. aliquando uero plures ex his intentionibus per gargarismata complentur: & propterea gargarismata in cura catarrhi conueniunt in tribus casibus. primus, in catarrho calido subtili cum rebus incrassantibus, & infrigidantibus, ut fiat agilis ad expellendum; cum prius propter subtilitatem, & acuitatem excreari non posset, sicut syrupo de papauere cum aqua ros. secundus, in catarrho multa uiscositatis, & spissitudinis cum rebus incidentibus, & abstergentibus; sicut oxymelle simplici, aut scillitico. tertius, quando timeremus materiâ figi in faucibus, aut in gutture; sicut in synanchis gargarizamus diamaron, & similibus. Sunt autem quatuor casus in quibus gargarismata sunt suspecta. primus est timor, & suspitio catarrhi ad pectus, & ad pulmonem fluere consueri: & propterea in paratis ad asthma, & phthisim, & similes passiones propter catarrhum cauemus gargarismata. Secundus casus est, si catarrhus sit acutus, subtilis, cuius fluxus facile concitatur: in hoc enim casu melius est retinere in ore infrigidantia, & incrassantia, non gargarizando. Tertius casus est in præfocationibus, quæ sunt subito; ad has. n. parati non gargarizent. Quartus casus, si catarrhus sit multus, & uehemens quantum ad motum eius: hæc autem gargarismata, & masticatoria sunt quandoque ad diuertendam materiam fluentem ad nares, ut per uiam oris expellatur. Masticatoria enim licet conferant diuertendo ipsam materiam a naribus, & in purgando cerebrum; tamen obsunt aliquando faciendo materiam præcipitari ad guttur, ad meri, & ad cannam pulmonis: & propterea etiam in cura corycæ cautè eis utere. Quartum autem genus, scilicet rubificatio cutis capitis, & uesticatio perficitur radendo caput in commissura coronali, postea fricando cum cape acuto, aut scillitico, aut panno aspero: & deinde super commissura apponere emplastrum de sinapi. & fortius illo est fermentum cum catharidibus secum mixtis cum aceto forti, & hæc super loco dimittantur. 1. o. aut. 2. horis cum bona strictione. deinde remoueat, & uesticæ aperiantur, & super loco caules ad ignem mortificatæ cum axungia porcina ponantur; ut locus conseruetur apertus. sed oportet, ut de quinque diebus in quinque dies hæc uesticatio renouetur usque ad quadraginta dies. quod, si hæc non contulerit; cauterizetur super commissura coronali: fiat autem hæc cauterizatio cum ferro ignito candente usque ad ossis superficiem, & fiat paulatim, sepe cum stilo tentando. potest etiam fieri cauterio potenciali, sed attuale est præstantius; licet magis horrendum &c. Quinta intentio. scilicet catarrhi constrictio perficitur cum constringentibus statim dicendis. uerum Mesue reprehendit stolidos medicos, qui ante digestionem, & mundificationem communi; imo in medio agitationis huiusmodi constrictiua administrant: quæ sunt causa cumulationis catarrhi, deinde diuersionis uel hemetis. quapropter regulariter operando administrantur post intentiones suprascriptas. uerum dubitat Mesue, utrum in casibus extremis, scilicet quando ex catarrho timeremus subitam suffocationem, sicut pluries uidi in 24. horis suffocari; debeamus procedere cura regulari iam dicta, an statim a constringentibus incipere, cum ægritudo non det inducias. & in summa ipsi tutius uidetur regimen diuersum, quam constrictiuum: nam regimen diuersum licet agitet materiam, & multiplicet; tamen conuertit multiplicatum ad partem contrariam non timorofam. ego uero licet credam obsequendum esse secundum plurimum præceptis huius medicici diuini; tamen dicam, quæ in his casibus reperi utilia, & quæ nociua. Vocatus itaque ad hos casus, & inueniens ipsos cum tanta anhelitus constrictione, ut non possent loqui, neque etiam quasi bibere, & cum continuo oregmone, & cum facie liquida tendente in nigram, & cum sudore quodam ob anhelitus angustiam, ratus sum hæc tanta nocumenta, & tam subita prouenire a catarrho multo, & subtili, subito ad partes pulmonis præcipitato, aut ad aliquas partes ob quarum nocumentum anhelitus impeditur, & sic esse in continuo fluxu. quapropter eos statim in aere libero, lumine

Io. Arculani

F. fojad

fo, ad frigidum declinate, iniunxiq; dietam tenuissimā. prohibui eis omnem locutionem, & motū corporeum, situauiq; eos sedantes pectore dilatato parum pannis cooperto, cum nulla strictura pannorum circa collum, neque circa alias partes. & ipsis dedi in potu syrupum de papauere cum aqua iuiubarum, & hordei, & diapapauer, aut diacodion: & interdū apud magnam necessitatem unam ex pilulis opiatīs inferius describendis, aut parum philonij. & aliquando ad anhelitum dilatandum posui uentosam super spōdilibus pectoris. & aliquando pectore existente plethorico feci phlebotomiam; & ubi materia inciperet figi in aliquo mēbro nobili. & aliquando uentosam in pulpīs spatulæ ad diuersionem, & secundum hunc modum fere omnes euaserunt. reliqui autem, in quibus processum est cum euacuantibus, & diuertētibus, & materiam agitantibus omnes periēre: quomodo. n. sperandum est huiusmodi materiā tanto impetu ad partes illas precipitātā posse euacuari aut diuertere? imo huiusmodi materiam agitātā, amplius eam ad loca profunda fluere faciunt. Confringentia catarrhum iuxta quintā intentionē alia sunt gargarismata: alia suffumigationes: alia, quæ retinentur in ore: alia, quæ odorantur: alia, quæ deglutuntur: alia, quæ lambuntur. Ex gargarismatibus ad catarrhum calidum. R. aquæ rosæ. 3. camphoræ. 3. i. misce. similiter aqua decoctionis corticum papaueris, & ros. cui si addatur parum boli armeni, est præstantior: nō tamen fiat huiusmodi gargarizatio magno cum impetu. ad catarrhum uerō frigidum subtilem confert gargarisma cum uino decoctionis olibanī, aut uernicis: cui possunt addi nuces cupressi. Ex suffumigijs ad catarrhum calidum est semē lini prius infusum in aceto per diem naturalem, postea torrefactum, & suffumigatū. sandracha in aceto infusa est sublimis. Ad catarrhū uerō frigidum fiat suffumigia ex olibano, ligno aloes, sandracha mixtis uel diuisis. nigellæ quoq; torrefactæ, & trita suffumigatio est mirabilis. similiter odor ipsius ligatę in panno. costi, & nigellæ suffumigium est expertum, formæ sicut auellanæ ex olibano, stirace sicca, castoreo, uernice, ligno aloes an. partibus equalibus confectæ cū resina pini, aut pice, aut ladano suffumigatæ per embocum abscindunt fluxum catarrhalem. retenta in ore ad catarrhum calidum sunt diacodion & diadragaganum, diapapauer. & cuilibet istorum si addatur lutum armenum incorporando cum paucis syr. de myrto: efficitur præstantius. modicum camphoræ tentum in ore sistit catarrhū cal. Sed ad frigidum conferunt olbanum, & similiter spica in ore retenta, confectio formarum similium lupinis, quæ retenta in ore sistunt catarrhum calidum. Recipe amyli, dragaganthi, amygdalarum dulcium, sem. papaueris albi & corticum eius, gummi arabici, boli armeni ana. 3. i. confice cū mucilagine psyllij, & seminis citoniorū. & si uis ipsam dulcorari: adde diacodion. 3. i. aliæ fortiores. Recipe olibanī. 3. i. myrrhæ, croci, spicæ, tiracis siccæ ana. drac. semis, opij scrupulum unum, fiant ex eis formæ prædictæ, & teneatur una ex eis in ore, & nō deglutatur saluā. ex odoribus ad catarrhum calidum, & ad febrem aduertentem syncopalem, aut pestilētialem sunt formæ, quarum hæc est permixtio. R. faufel. i. auellanę indæ, sandalorum al. & rube. an. 3. i. rosarum. 3. 2. s. sandali maschatij, idest, citrini. 3. 3. camphoræ. 3. semis, boli armeni. 3. octo omnia præter caphoram terantur: sicut alcohol: & agitur cōterendo cū aqua rosacea per hebdomadā unam. deinde misceatur cū eis camphora, & fiant poma quatuor cum gummi arabico, & aqua rosacea. hæc odorata sistūt catarrhum, & ualent in pestilentia curando, & præseruando: sed conferuntur in uase uitreo in loco recenti, & liniantur sæpe cum aqua rosacea permixtionis camphoræ, & sandali citrini. sed ad catarrhum frigidum conferunt poma huiusmodi si odorentur. R. stiracis calamitæ. 3. 5. olibanī, mastichis, uernicis, ana. 3. 3. costi, spicæ, ana. 3. 2. ambre. 3. 1. laudani, ligni aloes, ana. 3. 4. musci. 3. s. fiat pomum unum cū dragaganto, & aqua rosata damascina. Aliud ex inuentione Mesue. R. laudani. 3. 8. ligni aloes. 3. 7. galliæ muscatę. 3. 6. ambre. 3. 2. musci. 3. s. fiat pomū unum. sunt. n. nobilia, & experta in cōfortatione cerebri, & cordis frigidi. res aut, quæ lambuntur ad catarrhū calidum, sunt diadragaganum, diapapauer, diacodion cum bolo armeno, ut supra. sed thus, & mirrha deglutitæ sistūt catarrhum frigidum. Confectio pilularum sistētium omnem ca-

tarrhum. Recipe thuris masculi. 3. i. mirrhæ, opij, croci, ana gran. 7. Succu liquiritiæ. 3. i. fiant. 7. pilulæ cum aqua rosata, & detur. i. tempore somni. pilulæ alcaiber descriptione Alexandri medici apud Mesue in fine capituli de catarrho sunt præstantissimæ: & per alcaiber intelligitur cynoglossa, siue lingua canis.

Correctio uerō accidentium catarrhalium iuxta sextam intentionem perficitur per uarietatem nocumentorum, quæ infert ipse catarrhus: de quibus in sequentibus uidebitur, si Deus uoluerit.

Pannus tunc calefaciendus est, et capiti superponendus, in quo tandiu moretur, donec æger calorem in capitis profunditate sentiat penetrasse. deinde nigellam odorare incipiat, et prouocetur sternutatio, et caueat, ne supinus iaceat: & comedat parum: a uino quoq; omnino absteineat.

Hic ponit curam: & primo catarrhi, secundo coryzæ. secūda ibi, Quod si cursus. prima in tres. nam primo ponit curam catarrhi leuis magis respicientem causam, q̄ catarrhum, secūdo ponit curam catarrhi fortis. tertio pro cura catarrhi inueterati remittit nos ad cap. de tussi. secūda ibi, Quod si passio. tertia ibi, Si uero tussis. In prima parte curat catarrhum leuem a pauca materia pendentem cum panno calefacto crasso comprehendente totum caput, collum, & partes uicinas. quod tandiu ita calidum teneatur, aut toties applicetur, donec æger sentiat caliditatem in profundum capitis penetrasse. hoc fit maxime ad remouendum nocumentum impressum ab aere frigido, & uerō, & ad resolutionem materiz, quæ pauca est. Secundo odoret nigellam ad eandē intentiones. Tertio prouocet sternutationē confidens materiam paucam per illam regionem posse diuertere. Quarto ordinat regimen cauendo, ne æger supinus iaceat: ne materia ad posteriora capitis præcipitetur: & uinum prohibet.

Quod, si passio ex appositione panni calidi alienata non fuerit, nec minuitur per ipsum; fiat phlebotomia ex cephalica: & soluaturs natura ex rebus, quæ non exasperant, sicut hæc decoctio, quā in potu sumere debet, qui tussim patitur, & in pectore asperitatem habet, & indiget uentris solutione. quæ recipit iuiubas. 20. sebesten. 30. passularū enucleatarum, drach. 10. uiolarū siccarum, drach. 4. radices liquiritiæ frictæ, drach. 5. ficus citrinas. 10. coquantur in 3. lib. aquæ donec redeant ad 1. & colentur, et in colatura dissoluantur casia fistula drach. 7. tereniabin drach. 10.

Hic curat catarrhum fortem: & primo sine febre: secūdo cum febre, & ubi timetur materiam figi in aliquo membro spiritualium. secūda ibi, Quod si nec phlebotomia, &c. in prima parte primo curat hunc catarrhum per phlebotomiam, & per medicinam soluentem leniendo, ex quibus arguitur hanc materiam euacuandam esse calidam. descriptio autem huius medicinz solutiue satis est manifesta.

Quod, si neque phlebotomia profuerit, neque uentris solutio, & inde ad pectus materia descenderit, & comoueantur tussis, & febris; ilico fiat phlebotomia de mediana. & patiens a carne abstineat, et uino: & in potu sumat aquam hordei, & muraba uiolatum, quamdiu calor fixus perseuerauerit: & tussis fuerit sicca, & aspera. sed, postquam calor quicuerit, & tussis mollificata fuerit, & scireare inceperit; hac decoctio quaque die cum muraba uiolato dāda est, donec pectus mundificetur, & tussis sedetur, & uox clara reddatur. quæ recipit ficus citrinas. 5. iuiubas. 10. sebesten. 20. passularum albarum enucleatarum drach. 10. liquiritiæ excorticatæ drach. 5. coquantur usq; ad dissolutionem, & colentur deinde, & dentur omni die uncia tres cum muraba uiolato drach. 5.

SCHOLION.

De mediana] iubet & Arcu. sanguinis missionem fieri ex communi uenā: sed Rasis uetussum exemplar neq; per hanc præcipit, neq; per aliā uenam sanguinem euacuandum designat, inquit, ilico fiat phlebotomia.

Ponit

Ponit curam cataracti cum febre, & cum incipit imprimere in aliquo membrorum spiritualium dicens, quod si nec phlebotomia cephalica, nec uentris solutio, de quibus dictum est profuerit, & materia ad pectus descenderit commouens tussim, & febrem; reiteretur ilico phlebotomia & hæc debet esse ex uena communis, ut simul à capite, & pectore euacuet, & patiens abstineat à carne, & uino; imò bibat aquam hordei cum muraba uiolato, idest condito, uel syrupo de uiolis: & hoc quandiu calor fixus, idest febris fortis perseverauerit, et tussis fuerit sicca, idest sine sputo, & aspera, materia non digesta, sed quiescente febre, & tussi mollificata, & cum æger scireare coeperit materia iam digesta; decoctio infrascripta est fumenda cum syrupo uiolato usque ad pectoris mundificationem, & uocis claritatem. descriptio autem huius decoctionis, & simplicia sunt satis manifesta.

Si uerò tussis inueterauerit, diuq; permanserit, tunc ostendimus, qualiter curanda sit, cui de tussis cura tractabimus.

Remittit nos ad cap. de tussi pro cura cataracti inueterati.

Quod, si cursus in naribus diu perseverauerit, & non fuerit calor; fluxus erit restringendus suffumigando nares per traiectorium. & si quod per nares effluit, subtile, ac acutum, & citrinum fuerit; suffumigatio fiat ex sulphure prius in aceto infuso, & postea siccato: aut ex fabis, aut hordeo excorticatis, & in aceto prius infusis, & postea siccatis: aut ex saccharo albo, & sandalo albo. quod, si neq; calor, neq; rubor in facie fuerit; suffumigatio fiat ex costo, aut thure: hæc namq; suffumigatio fluxum restringit.

Hic curat corryzam primo frigidam: cuius tamen curam complet in fine capituli suffumigando nares, calore neq; rubedine existente in facie, cum costo herba calida, & sicca in secundo, & thure calido & sicco in primo. si uerò corryza fuerit calida: quod comprehenditur ex calore, & rubedine faciei: & quia illud, quod egreditur per nares, est subtile acutum, & citrinum; tunc fiat suffumigatio ex thure prius in aceto infuso: cuius caliditas frangitur per acetum: & ex fabis, et hordeo excorticatis, prius in aceto infusis postea siccatis: remanet. n. in eis uirtus constrictiua propter acetum: aut ex saccharo albo, & sandalo albo, frigidum & sicco in secundo, saccharum autem fere est temperatum, & possunt adinuicem permisceri cum aqua rosata, aut pauco aceto faciendo formulas, ex quibus fiat suffumigatio. quando autem hæc remedia Rasis sint administranda; satis patere potest ex superius dictis.

De ophthalmia. Cap. 18.

Postquã Rasis in præcedentibus egit de passionibus cerebri, & neruorum; hic agit de passionibus oculorum incipientibus ab ophthalmia. pro quarum notitia præmittendum, quod oculus est membrum instrumentale in superiori parte corporis situatum, aequum, rotundum ex septem tunicis, & tribus humoribus compositum, sex musculis motu, uno, uel duobus, uel tribus musculis sustentatum, ad uidendum finaliter ordinatum. habet. n. primò coniunctiuam undeciq; oculum circumdantem præterquã in parte anteriori, ubi est cornea, quæ coniunctiua oritur à gigia matre. est deinde cornea undiq; circumdans oculum post coniunctiuam, quæ in parte anteriori dicitur cornea ad similitudinem cornu: in parte posteriori selirotica. i. dura, ortum habens à dui matre. & hæc in parte anteriori ex directo pupillæ crassa ex quatuor pelliculis composita: quæ tamen per anatomiam non facile distingui possunt, & in parte anteriori non est colorata, sed peruisa, & diaphana. post quã sequitur uuea ortum habens à pia matre sic dicta à similitudine grani uue, à quo capulus est euulsus, & hoc foramen uuea dicitur pupilla, posterius autem dicitur secundina. est deinde aranea posterius dicta à retina ortum habens à neruo optico, quæ non immediate sequitur uueam; sed inter eam, & uueam mediat humor albugineus, licet in parte posteriori sequatur secundina: hæc itaq; circumdat immediate humorem crystallinum, & uitreum. ex humoribus autem primum occurrit albugineus ad similitudinem albuminis oui, qui est maior cæteris in quantitate. post quem sequitur crystallinus non immediate; sed mediante tunica aranea: qui crystallinus dictus est à similitudine crystalli, &

dicitur grandineus à similitudine grandinis, aliquid durus, & rotundus, in parte anteriori, ubi recipiuntur species uisibiles: aliquid planus; in eo enim perficitur uisio: in parte posteriori figuræ pyramidalis, circumdatus secundum partem posteriorem à nitreo, à quo nutritur, sic dicto à similitudine uitri liquefacti. & sic sufficiat de anatomia oculi. qui licet dicatur componi ex septem tunicis: tñ in ueritate non sunt nisi quatuor; sed sunt septem secundum denominationem. uerum Galenus addit quartum humorem, quem dixit contineri inter uueam, & corneam: quem lucidum egerum appellauit. sed cæteri dicunt hanc esse partem albuginei per foramen uuea egredientis usq; ad corneam. Triplex est regimen oculis adhibendum, scilicet, quod debetur oculis inculpatæ sanis, siue temperati sint, siue distemperati. regimen præseruatium, quod debetur oculis culpate sanis, & neutris. primum uerò secundum Mesue completur quinque modis. primus conseruat superficiem oculi tersione decenti, & naturali: & hoc faciunt medicinae absterfivæ habentes mediocritatem, & temperiem in tersione; sicut succus fœniculi, & est proprius, & similiter collyrium ex eo, cuius est hæc descriptio. Recipe succi fœniculi depurati per residuum eius, & facilem coctionem ipsius in uase æneo cū nummis auri puri; sicut in. 1. 3. succi fœniculi ponetur quinq; folia auri: & post sufficientem colationem ipsius accipitur de ipso. 3. 1. mellis puri clari. 3. 3. & bulliant iterum ebullitione una, & coletur, ponatur in ampulla uitrea, & suspendatur in sole, & permittetur de uase in uas abijciendo super hypostasim, & distilletur ex eo in oculo secundum exigentiam. custodit enim sanitatem oculi, & abstergit ipsum, & clarificat uisum, & quandoq; depuratur tantum in sole absq; decoctione: & est expertum. & ad hoc ualeat succus memythe: & est species chelidonie, & est magis proprius in oculis calidis. & cum hoc oportet tueri oculum à fumo, puluere, flatu uentorum, nimia aeris inæqualitate, & ab his quæ faciunt oculum senescere; sicut coitus, labor plurimus, fletus excedens mensuram, ebrietas, somnus plurimus, nimie uigiliæ, somnus supra repletionem, & cauere à cibis & potibus uaporosis, turbidis, sicut caules, porri, acrimina, salsa, fabæ, lentesc, & omnia conturbantia sanguinem. & spiritum. item, fœniculus, uerbena, rosa, chelidonia, ruta. ex his fit aqua, quæ lumina reddit acuta. si hæc aqua ex his quinq; distillata conferuetur in uase æneo, acquirat ab eo absterfionem, uerum, ubi minori indigeamus absterfione; conseruetur in uase uitreo. aliud collyrium uisum acuens, & oculi sanitatem custodiens. Recipe succi fœniculi. 3. 40. succi rutæ. 3. 20. ponatur in ampulla uitrea cū. 3. 1. mellis clari. obturetur orificium eius, & dimittat in sole per tres menses, abijciendo fœcæ eius bis, uel ter in mense. si aut opus esset minori calefactione; addatur huic succi granatorum dulcium, & acetosorum, ana drach. 10. & dimittat in sole, ut supra. antimonium quoq; lotū, & thuria præparata cū aqua rosata, & aqua fœniculi permixta sanitatem oculi calidi conseruat. Secunda res cõpletur cum medicinis, quæ alterando custodiunt sanitatē oculi, scilicet, calefaciendo, infrigidando, humectando, & exiccando; sed temperatum cum similibus in gradu, & forma conseruamus: calidum uerò cum frigidis, frigidum cum calidis, humidum cum siccis, & siccum cum humidis. hæc enim sunt uirtualiter similia, & non formaliter. eligant autem ex his, quæ oculi sunt propria per uirtutem quartam; sicut est thuria in exiccando, uiola, psillium, & albumen oui in humectando, fœniculus in calefaciendo, rosa in infrigidando. Tertia res cõpletur per medicinas conseruantes sanitatem eius in compositione; licet superficies contineatur sub compositione. & hoc faciunt omnes medicinae confortantes perforationem, & concauitatem partium eius, & non finentes fieri oppilationē pupillæ, nimiam dilatationem, strabositatem, & similes: siue illæ medicinae sint euacuantes, siue resoluentes, siue confortantes cum proprietate, & stipticitate moderate. Quarta res completur cum medicinis conseruantibus unitatem, & prohibitionem oium causarum, quæ possunt soluere cõtinuum, siue primitiue sint, siue corporeæ. Quarta res cõpletur per medicinas multiplicantes spiritum uisibilem, & ipsum illustrantes; sicut sunt carnes assatæ, aut elix animalium uiuentium

Io. Arculani

F. 2. de rapi.

de rapina, & forbere iura eorum, & proprie picæ: item ius serpentum non uenenosorum, & caro ipsorum comesta confortat uisum: item cerebella hedorum, & gallinarum: item uinum album aromaticum subtile, & alia generantia sanguinem clarum. ex maxime autem splendidantibus uisum, & spiritum uisuum sunt margaritæ. Arist. instruens Alexandrum regem inquit. Frequentationes peccinis, & proprie eburnei super caput uapores uisum impediunt euerunt ad cutem, ne uisui obsint: item aspectus rerum uiridium in loco multæ temperiei uisum corroborat, & oculi fatigationem remouet. ex proprijs in hoc est smaragdus: item inuixit post oculi defatigationem ingredi domum obscuram non multæ tenebrositatis, & intueri per fenestras, in quibus sit aliquid peruium uiride, uel intueri aquam clarissimā in uase uiridi existentem, & submergere ipsos oculos in ipsa: sed hoc fiat tempore calido: & exercitatio legendi literas mediocres, pulchras, uisum corroborat, & oculi sanitatē custodit. & ex proprijs in confortatione uisus, & proprie ubi humores sint crassius, uiscosius, est usus aceti scyllitici. Item trisera magna, & trisera minor, & proprie cum quarta parte pulueris herbæ adhil: est herba habens folia similia tamarisco. & theodoricum ad hoc multū confert. item pilulæ lucis euacuando sunt propriæ: & chebuli conditi euacuando, & confortando. electarium subtile conferuans sanitatem oculorum, & confortans spiritum uisibilem in claritate sua. Recipe herbæ adhil. aut loco eius euphrasie. 3. 2. feminis fœniculi. 3. 5. macis, cubebe, cinnamomi, piperis longi, gariophili. 3. 1. puluerizentur subtilissime, & accipe mellis despumati lib. 1. succi fœniculi cocti depurati, succi rutæ depurati, ana. 5. 1. succi chelidonie. 5. 3. coquantur succi cum melle usque dum mellis tenuis habeat spissitudinem, & secum misce species, & conferuetur in uase uitreo. cuius dosis est drach. 3. alienando cœnam, uel dimittendo: & similiter sumat in mane.

Regimen præseruatuum cōpletur primo generaliter cauendo ab omnibus, quæ possunt lædere oculos secundū complexionem, cōpositionem, & unitatem, & spiritus, de quibus pro magna parte dictum est superius: & adhibendo regimen contrarium lapsui, in quæ oculus est pronus labi. hoc autem consistit in cognoscendo causam lapsus; illud. n. secundū plurimum est aut propter defectum oculi, aut totius, aut alicuius membri: oculo communicatis: & hoc propter nocumentum in cōplexione cū materia, aut sine cōpositione, aut unitate. si ergo defectus sit propter cōplexionem sine materia; alteratione indiget cum cōtrarijs, sicut superius dictum est. si uerò sit cum materia; aut ista tantū est in oculo, aut in partibus ipsi communicantibus: si sit in oculo; solum educatur, insensibiliter per resolutionem, ad quod confert succus, & aqua fœniculi, & sarco colla: aut sensibiliter per lachrymas, ad quod confert sal, & sal armoniacus, ut si in oculo iniiciatur aquæ ros. salitæ cum sale, aut sale armoniaco. si uerò sit in partibus sibi cōmunicantibus; quadruplici regimine indiget, euacuatione. s. diuersione, fluxus interceptione, & oculi confortatione. euacuatio autē fiat cum phlebotomijs, aut pharmacijs secundum exigentiam materiæ peccantis, quæ respiciant utrumque membrum mittens, & suscipiens. diuertatur et materia omni genere diuersionum, siue euacuatione, siue frictionibus, uentofactionibus, lotionibus, &c. & cum euacuatione; sicut clysteribus, masticatorijs, caput purgijs, gargarismatibus, phlebotomijs uenarū nostræ, uenarum post aures, temporum frontis, & earum, quæ sunt in cute capitis, necnō prouocatione fluxus sanguinis narium, hæmorrhoidalis, & menstrualis. & ex hoc genere sunt sedagina posita in collo, ubi coniungitur capiti: cauteria in cornibus posterioribus ex directo oculorum: cauterium in commissura coronali: interceptio aut fluxus perficitur; aut cum appositis fronti, & temporibus, aut cū laqueatione uenarū, & arteriarum, sicut quod dicitur in curatione ophthalmiæ. confortetur autem oculus cum his, quæ sunt propria tam interius, quæ exterius applicitis moderate spissitatis: de quibus in regimine conferuatiui dictum fuit. Si uerò nocumentum sit in cōpositione, & unitate; studendum est confortationi oculi cum iam dictis: & ne humores ad oculum profluant cū intentionibus: de quibus statim dictū est. nocumentū aut in spiritibus potest esse, aut propter ipsorum paucitatem, aut propter ipsorum cras-

sitiem, & turbulentiam. primo aut subueniendum est cū cibis boni nutrimenti, paucarum superfluitatū, & bono uino subtili odorifero. secundo autem nocumēto subueniatur cū his, quæ clarificant sanguinem, & spiritum, & ipsos spiritus illustrant: de quibus superius dictū est, & dicitur in sequentibus in debilitate uisus. & ne spiritus paucifiet; cauendū est à phlebotomijs, & alijs modis extrahendi sanguinē, & à coitu, labore nimio, & ab aspectu rerum radiosarū, & splendidarum, &c. tertium autem regimen patebit in sequentibus.

De ophthalmia aut præmittendum quid nominis, & quid rei. dicitur. n. ophthalmia ab ophthalmos Græcè, quod idē est, quod ocul⁹ Latine: inde ophthalmicū. i. medicamē oculare: ophthalmicū aut est medicamē faciēs sternutationem. diffinitiuē aut est apostema in oculo. s. in cōiunctiua oculi &c.

Cum ea, quæ in oculis alba sunt, in rubedinem mutata fuerint, fluxerintque; lachrymæ, et in angulis oculorū lachrymalibus lippitudo collecta fuerit, tūc dicemus ægrum pati ophthalmiam. & quantum plus symptomatū uehementia, aut ipsorū affuerit minoratio, tanto est ophthalmie fortitudo, aut ipsius debilitas. deterior autem ophthalmia est, cum alba oculorum uidetur inflata, & adeo eleuata ut oculorū cooperiant nigredinē, & palpebra inuerfentur.

Istud capitulū diuiditur in partes duas. in prima agit de ophthalmia theoricè. in secūda practicè. secūda ibi. In principio uerò. prima in tres. in prima ponit signa. In secūda ibi. Et quāto plus. ponit signa fortitudinis, & debilitatis eius. in tertia ibi. deterior aut. ponit signa ophthalmie pessimæ. Quæ dicit in oibus partibus nota sunt, & amplius notificabunt ex dicēdis. symptoma duo importat: aut accidens sequēs ægritudinem, & taliter sumitur hic: aliquādo significat motū impetuōsum naturæ contra morbū indistinctum contra crīsim laudabilem. symptoma. n. græcè periculum, & ruina latine.

De speciebus ophthalmie sciendū, quod duplex est ophthalmia, uera, & non uera ab Auic. dicta cōturbatio, quæ non est uerum apostema; sed quædam oculi rubedo pendens à causa primitiua. uera aut habet triplicem speciem secundum magis, & minus differentem. quapropter species appellandæ non sunt; quia magis, & minus non uariant speciem. una est maxima, in qua coniunctiua tantum eleuatur, ut cooperiat corneam: & palpebra inuerfatur, ne oculum tegere possit proueniens secundum plurimum ex sanguine phlegmatico, & in oculis eminentibus, qui sunt facilius materiem fusceptiui cum magna plethoria corporis, & capitis de qua Rasis in litera. & hæc Græcè uocatur chimosis: arabicè uerò alguardenigi. & hæc non solum fit à materia calida; sed phlegmatica, & melanch. existimo tamen ipsam nō fieri à materia cholericā, & plurimum accidit infantib. licet in adultis etiam uiderim. est & alia species ophthalmie, quæ est parua à paucis pendens humore. & per consequens datur tertia species inter has media. & de speciebus ophthalmie est, quæ habent periodum secundum periodum generationis materiæ, & effusionis eius. solent etiam species ophthalmie assignari sex secundum humores, à quibus pēdēt. s. sanguinea, cholericā, phlegmaticā, melancholicā, aquosa, uentosa.

Sed nunc de causis eius primo generalibus, efficiente, materiali, formali, & finali. Causa efficiēs ophthalmie tā antecedens, quā coniuncta sunt humores ipsi. & non sunt causa materiali; quia ophthalmia est accidēs, & accidēs non potest generari ex substantia tanquam ex causa materiali. Ophthalmia itaque neque aliquod apostema, neque aliquis morbus, cum sunt accidētia; habent humores pro materia sua ex qua generentur, nisi tantum morbus in numero. Causæ efficientes primitiue sunt extrinsecæ à sex rebus non naturalibus, & sibi annexis sumptæ, necnō alijs indebite occurrentibus. Cā ophthalmie materialis, in qua non ex qua, est ipsa cōiunctiua. Causa formalis est ipse tumor. Causa finalis, ut oculū destruat, &c.

Sed nunc de modo euentus ophthalmie dicendū est: potest. n. dupliciter generari. per uiam paulatim factæ cōgestionis ex superfluitate nutrimenti ipsius coniunctiue: & etiam ex nutrimento male conuerso; quæ non resoluntur; sed in dies paulatim congeruntur, ut tādē apostema faciant, quod sicut plurimum est frigidum. & generatur etiā per uiam defluxus maximè

maximè ex capite, aut per partē extrinsecam mediātibus uenis, & arterijs humores ad coniunctiuam deferentibus, aut per partem intrinsecam, scilicet per foramina orbitæ ad cerebri terminata, per quæ musculi, & nerui optici ad oculum ueniunt: & tunc humores à cerebro, & pinniculis ueniunt intrinsecis: secundū tamē plurimum est per partem extrinsecā propter colligationē coniunctiuæ cū almochati, à quo oritur. aliquando etiam materiæ ueniunt oculo ab alijs mēbris & propriè cū oculum infecuta, sicut malitia cōplexionis: & fecit eum susceptiuum materierum, & est debilis, aut ex generatione, aut ex tempore, nunc autem de signis.

Cognoscitur ophthalmia in genere per tumorem, granitatem, dolorem, & ruborem. sed species tres differentes sū magis, & minus cognoscuntur per uisum. Species uerò distinctæ sū humores cognoscuntur: quia sanguinea est notabiliter rubra cū tumore notabili, dolore grauius, & extensio magis, q̄ pūgitio, cū multitudine lachrymarū, aut mediocritate, lippitudinisq; multitudine, & cæteris signis arguentibus dominiū sanguinis in corpore, & capite. cognoscitur cholericā per rubedinē clariorem uergentem ad citrinū cum paruo tumore, dolore acuto pūgitio, effusione lachrymarū acutarum, paucō lippitudinis, paucāq; oculi glutinatione.

Cognoscitur phlegmatica per colorem rubeum uergentem ad album cum paucissimo dolore extensio, aut grauius non pūgitio, cum paucitate lachrymarum non acutarum, & multa lippitudine, & uiscola: & similiter cognoscitur aquosa, sed est tumor magis mollis, & minor uiscolitas lippitudinis, in cæteris similatur phlegmatica.

Cognoscitur melancholica per ruborem uergentem uersus fuscum cum paucō tumore, paucissimis lachrymis, paucā lippitudine, & minuta sed dura. cognoscitur uetosa, quia est sine lachrymis, sine lippitudine, sine grauitate, & per euaporantia facile remouibiles.

Signa temporum ophthalmiæ sunt. quia in principio est tumor paruus à paucō pendens humore cum paucō rubore, & est fluxus lachrymarum subtiliū sine lippitudine, paucāq; oculi inuiscatione. in augmento apparet maior tumor, & rubor, lachrymæq; in crassantur, suntq; tenaciores, & apparet notabilis lippitudo, notabilisq; oculi inuiscatio. in statu est maior tumor, qui debet esse, sed forte rubor tendit ad albedinem quanda: lachrymæ sunt crassiores, & uiscoliores, maior lippitudo, maiorq; oculi inuiscatio. in declinatione hæc omnia minuantur. sed, quia quedam lippa significat crassitiem, & uiscolitatem materiæ, quedā digestionem, inter utrāq; est quatuor signis distinguendū: nam prouenit ex crassitie materiæ fere statim apparet à principio, & cōiter in ophthalmia phlegmatica à prædominio. & apparet, cum nodum est, neque præcessit uehemētia accidentium excepta grauitate, & grana eius sunt minuta. & quare non attingit relucētiæ. & quatuor signa bis contraria sunt in illa, quæ prouenit ex digestionē materiæ: non. n. apparet nisi post processum ægritudinis, & post uehemētiā accidentium. sicut cum est, aut cum præfuit. & grana eius sunt crassa, & attingit cuidam relucētiæ. quapropter nota, q̄ lippa est superfluitas quartæ digestionis oculi: licet in oculo ophthalmico pro parte decidat ab humore faciente ophthalmia. sed cuidam forte uidebitur dubium, propter quod species ophthalmiæ frigida rubent, cū cætera apostemata ab humoribus si igidi pendencia non rubeant. cuius causa duplex est: prima sumpta à dolore. est enim oculus ualde sensibilis, & propter dolorem multus sanguis, & spiritus ad coniunctiuam trahuntur: qui ibidem cōgenti in uenis ipsius coniunctiuæ dant coniunctiuæ colorem rub. licet non apostement, ex quo fit, q̄ humor apostemans est frigidus. sit ex se per accidens tū calefit, & per consequens fit magis illuminabilis ex præsentia sang. & spirituum. secundā causa sumitur à multa albedine coniunctiuæ, in qua omnis rubedo euenit facile diffinitur. cognoscitur modus euentus eius per uenas, & arterias extrinsecas, quia inueniuntur tumentes, uel aliqua ipsarum. & si arteria est magis pulsans confusio; palpebra ipsa tumens aliquatim apparet, & similiter loca ipsi propinqua. & hoc signum est proprium. si autem materia fuit per partes intrinsecas; multoties fit frequens sternutatio, & dolor prius incipit à profundo oculi, & parte posteriori eius, quam uideatur ophthalmia.

Prognosticum. primum. Ophthalmia si recte curetur; secundum plurimum sanat, nisi quæ maxima est: frequenter. n. perducit ad putrefactionem oculi, & aliqui tandem ad mortem putrefactione ingrediēte ad cerebrum per musculos & neruos opticos: frequenter quoq; perducit ad exitum uicæ cornea dirupta per corrosionem, aut putrefactionē. Secundum. Quando prolongatur ophthalmia; secundū plurimum perducit ad ulcerationē, uel aliquod uestigium in oculo derelinquit. causa. n. prolongationis est sumpta ex duobus principaliter. Prima ex materia, quæ incessanter profuit ad oculum, aut propter multitudinē eius: aut oculi debilitatem, aut uiarum amplitudinem. Secunda causa est aliquod nocumentum iam impressum difficulter remouibile; sicut ulcus in oculo, aut sanies retro cornea, aut aliqua mala materia in tunicis inphiltrata, aut scabies, aut pili palpebrarum. Tertium. Dolor multum prolongatus in ophthalmia pessimū; significat. n. materiam, aut acutā corrodentem, aut multū extēdentem, aut maturationem, aut uaporem crassum sub tunicis reclusum: sed hoc minus malum est, & uaporationibus sedat. cuius doloris quadruplices causas distingue per species doloris aut acuti pūgitio, & mordicatiui: aut grauius extensio, aut pulsatiui sine grauitate, & pforatiui, atq; alijs signis significantibus acuitatem materiæ, & multitudinē, & signis etiam significantibus maturationem in sequenti cap. de ulceribus dicendis. Quartum. In regionib. meridianis, & temporibus calidis, & humidis frequenter accidit ophthalmia, & facile curatur: in contrarijs uerò contra. Quintum. Cum præcedit hyems septentrionalis, & sequitur uer meridionale, & similiter ætas; multiplicatur ophthalmia, & multo magis multiplicatur, si e contrario tempora se habuerint &c.

Cura ophthalmiæ non uerā à causa primitiua.

Cura cōturbationis perficitur remouēdo causam. post cuius remotionē si aliquid in oculo remanet impressum caliditatis, aut frigiditatis, aut alteri dispositionis præter naturam; cū cōtrarijs remouetur applicitis oculi, & partibus adiacentibus. & in summa curetur cura principij ophthalmiæ ueræ, de qua statim, & cum applicitis, & cū phlebotomia, si expedierit. & inter cætera somnus prolixus laudatur; quia dolorem sedat, & humorum agitationem. & si quid nocumenti impressum est; corrigitur, & maxime remedijs cōgruentibus præapplicitis. & si fuerit ex percussione, prius iniiciatur in oculo & desuper albumē oui cū aqua rosacea cōcussa, & tandē sanguis colibz, ut inferius in tarsi ad sanguinis resolutionē. & si dolor instaret præmissa phlebotomia; fiat oculi fomentatio cū filtro, aut spongia, panno subtili lineo inuoluta, & infusa in lacte, & oleo ros. debite calidis, & bene expressa oculo dolenti sepe applicita &c. de cura ophthalmiæ ueræ. cura ueræ ophthalmiæ triplex exigit regimen: unum circa causam antecedentē: alterum circa causam coniunctam actū facientem ophthalmiam. tertium est utrisque commune. Primum exigit quinque intentiones: prima est minoratio materiæ: secunda digestio: tertia eradicatione: quarta est diuersio: quinta fluxus interceptio.

Prima. s. minoratio completur sū plurimū per phlebotomiam, quæcunq; sit materia, uel per uentrosationem, uel aliquod proportiōabile; sicut sunt sanguifuge, quas inueni magis conferre, quā uentosas, si congrue applicentur. sed materia existente multa fiat prius ex cephalica cōtraria, ut docet Rasis. deinde, si materia sanguinea sit; fiat sequenti die phlebotomia cephalicæ eiusdem lateris. In hac enim sanguinea nec digestio, nec euacuatio per solutiua est multum necessaria. si tamen sanguis est multum subtilis, aut calidus; cōpetent infrigidantia, & in crassantia; sicut syr. de papauere, de iuiubis, & similes. si uerò materia sit cholericā; facta primò phlebotomia, aut ex eodem latere, aut e contrario secundum materiæ multitudinem minoretur materia cholericā cum lenitio, in quo sit plus alterationis, quā euacuationis; sicut ex decoctione fructuum, prunorum, tamarindorum, uiolarum, & mirobolanorum citrinorum: cum quia trahatur manna. 3. una. s. uel quantum sufficit, sic. etiam rosa. est in hac intentione conueniens si aliquid eius superscriptis addatur: deinde sequatur, si oportuerit propter materiæ multitudinem secunda phlebotomia ex cephalica eiusdem lateris. & in hac cholericā ophthalmia procedendum

Io. Arculani

F 3 est cum

est cum digestiuis infrigidatibus ualde, & incrassantibus materiam, sicut syr. uiol. de papauere, mucilago phlij, aqua nenupharis & similia. & iterandæ sunt euacuationes, ut materia eradicetur. si autem phlegmatica, uel melanc. uel aquosa, uel uentosa reliquis consentiētib; similiter incipiendum est à phlebotomia, quæ est aliquando reiteranda est propter materię multitudinem: minus tñ in melancholica, aquosa, & uetosa; sed in uentosa minus, q̄ in cæteris: sed in his pēdētib; ab humidis frig. possunt exhiberi solutiua exoluentia, sicut pilulę cochia, de hiera cū agarico in phlegmatica, pilulę inde in melancholica, turbith non cōfortatum in aquosa. & in uentosa est euacuandus humor, à quo uentositas eleuatur.

Digestiua autem in materia phlegma. est mel ros. oxymel simplex, & in melanch. syrupus de epythimo cum syrupo acetoso, aut oxymelle simplici. & possunt distemperari cum aqua foeniculi, aut euphragie; cū his. n. digestiuis, & euacuationis intendendum est humori facienti ophthalmia, & membrō læso tam mittenti, q̄ recipienti nec stemus contenti una euacuatione; sed iterandæ sunt, ut materia eradicetur.

Et sic iam expeditæ sunt tres intentiones, scilicet. minoratio, digestio, & eradicatio. sequitur quarta, scilicet. diuersio, quæ multiplicib; instrumentis cōplenda est. est. n. quædam diuersio sine euacuatione, & in hac incipere debemus à partibus propinquis, & tēdere ad partes remotas; sicut exempli gratia, in frictionibus debemus incipere à collo, & à spatulis, & descendere ad brachia deorsum coxas, & crura: similiter uentoso primo nocrea, deinde ad spatulas, deinde ad nates, ita in ligaturis, & lotionibus. diuersio autem cum euacuatione fit e contrario incipiens à remotis, & perueniēs ad propinqua: & cōpletur multis instrumentis. s. phlebotomijs. & primò debemus incipere à phlebo. uenarū, quæ sunt in nocrea: deinde uenarū, quæ sunt post aures: deinde uenarum, aut arteriarum tēporum: deinde uenarum frontis: deinde uenarum, quæ sunt in angulis oculorum domesticis, quæ non apparent nisi apud fortē gutturis constrictionem. istę tamen magis euacuant causam cōiunctam, q̄ diuertant. et loco istarum phlebotomiarū excusaret appositio sanguisugarū in locis eisdem. secundum genus diuersionis est laqueatio, quæ debet fieri in superiori parte colli, ubi collum ceruici cōiungitur: & sic debet teneri per triginta, uel quadraginta dies, quotidie trahendo sedaginum ad diuersionē materię. tertiū genus est cauterium, siue cauterizatio, siue actualis, siue potētiālis: & debet primò fieri in posteriori capitis ex directo oculi ophthalmici, ut non penetret nisi usq; ad almochari, cuius escarę casus procuretur, & dimittatur apertum: deinde, si oportet, fiat in cōmissura coronali, quod apud uehemētē necessitatem penetret usq; ad os, & diu teneatur apertum. hæc tamen sunt de illis, quæ postponi debent, quantum est possibile. non dico tamen, q̄ hæc diuersiones in singulis ophthalmijs sint necessariz, sed eas memoro, ut unusquisq; possit uti his, quæ suo proposito magis seruiunt. non obliuiscamini tamen phlebotomia uenarū, quæ sunt in nocrea, uel uentofactionis in eadem, si non reperiuntur uenę, aut sanguisugarum appositionis. ex hoc. n. loco sanguinis extractio est inter cæteras diuersiones præstantissima. Quinta & ultima intētio quantum ad causam antecedentē est fluxus interceptio, quæ primò completur cum medicinis constringentibus applicatis fronti, & temporibus, de quibus Rasis ponit unam descriptionem in litera. & ab hac intentione per medicinas complenda quamuis posterius posita sit in ordine; tamen ab hac uia operationis fere ab initio facta, scilicet una phlebotomia, aut duabus plus debetis inchoare. perficit secundò cum sectione uenarū, uel arteriarū, quod fieri nō debet nisi cū suprascripta ad curā non sufficiūt: quæ si sint magnę, debet prius scindi pellis, & uena in duabus partibus ligari in medio ligaturę scindi, & extrema cauterizari: ubi tñ est magna necessitas euacuationis; nō esset incōueniēs, ut extremitas uenę scissę, q̄ est uersus oculū, dimittat tñ non ligata. donec sanguinis quantitas sufficiēs fluat, in arterijs tñ hoc cēt magis suspectum. si autē sit de paruis uenis; scindatur per mediū absq; ligatura, & cauterizatione; sanguis. n. ad libitū restringi pōt. hæc tamē ultima intētio maxime cōueniens est materia fluēte per partē extrinsecā; sed materia fluente per partē extrinsecā simus solliciti in euacuationib; & diuersionib; iteratis.

Cura autem localis respiciens causam cōiunctam tribus perficitur intentionibus: primò repercussione pura conueniente in principio: secundò resolutione pura conueniente in declinatione. & postrema parte status. tertiò repercussione mixta resolutione conueniente agumento & statui ita tñ, ut gradatim procedat à repercussione puris paulatim augendo resolutionē, donec deueniamus ad resolutionē purā. si autē ophthalmia tenderet in uia exituræ; recurrendum est ad capitulum sequens de exituris, & ulceribus oculorum. restat tertium regimen duas exigens intentiones cōes tam causę antecedenti, q̄ cōiunctę. l. correctio accidentiū, ex quibus maxime corrigendus est dolor, aut cum remouentibus cām, de quibus iam dictū est: aut cū stupefacientibus leuibus, aut opiat, de quibus seriatim post expositionē textus age: aut cum anodinis, & facientibus materiam euaporare maxime præmissis ulsibus. et, ubi dolor ex concussione materię in loco proueniret; sicut cum balneis totius corporis, aut cum suffumigationibus, & fomentis applicitis oculo dolenti, & partibus adiacētibus ex decoctione uiolarū, ros. feminum citoniorū, fenugraci, florū chamemeli, meliloti, anethi, & similia, & sicut fomentū factum ex lacte, & oleo ros. spōgia, aut philtro in ipsis infuso, & oculo dolenti aliquoties applicito: non est tñ diu oculus fomentandus, ne dilatando, & calesfaciendo materia ponatur in fluxu. si uerò dolor proueniret, sicut plurimum prouenit, aut quia apostema exituraret, aut quia ulceraret oculi particulā, recurre ad capitulum sequens de ulceribus exiturarū. ultima intētio debita administrationis sex rerū non naturalium fm exigētiam intētionum præcedentiū: aliter. n. regēdus est eger in principio, aliter in augmento, & statu, aliter in declinatione, aliter cū dolor instat, aliter cū est sine dolore. de regimine tñ harum rerū non naturalium Rasis aliquid tēgit in litera. aliqua subiungā post textus expositionē. iam igitur ad expositionē quorūdam dictorum in textu ueniedū est; quia, quæ clara sunt, omittentur.

In principio uerò curationis ophthalmie cephalica est phlebotomia ex manu, uel ex brachio partis cōtrarię, quæ est oculus infirmus, nisi leuis fuerit ophthalmia. Et quanto fortior fuerit ophthalmia, tanto plus est minuendum de sanguine. deinde uerter ex mirabolanis citrinis, & tereniabin, & succo fructuū soluendus est. & eger à carne, & à uino, & à rebus dulcibus abstinere debet, & cibum minuire.

Pars practica diuiditur in sex partes. in prima docet curare principiu: in secunda quæ incipit ibi, Quod si ista nō suffecerint, docet curare augmentum. in tertia, quæ incipit ibi, & si lippitudinis, docet curare statū. in quarta ibi, Si autē oculus leuior, docet curare declinationem. in quinta ibi, Ex his autem redit ad ponendas medicinas principij. in sexta ibi, Si est album, ponit descriptionem medicinarum, quarum superius fecit mentionem. in prima parte omnia clara sunt, præterquā cum dicit, phlebotometur cephalica ex manu, uel ex brachio. pro quo sciendū, q̄ penes Auic. prima primū doctrina. s. cap. 4. de anotomia uenarū manus: hæc tamen potest dici cephalica, quia confert in passionibus capitis. sed tamen est differentia inter phlebotomiam harum uenarum; quia quæ est in pollice, & est ramus uenę communis, confert ad longinqua diuertendo: illa autem, quæ est in brachio magis multitudinem euacuando, & immediatius à parte læsa.

Quod, si ista non suffecerint; si est album in lacte puellę lactantis fricandum, & in oculis distillantandum. et, si lippitudinis multitudo affuerit in oculis collecta; radius cotto innotuatur, & madefiat in aqua, & cum ea oculus ab illa lippitudine mundetur. deinde puluis albus aspergatur, & superponendo oculis aliquid, [ut cottum] suauiter sustentetur, & ligetur. & eger in domum tenebrosam mittatur. et ingenium dum est, quantum possibile est, ut somnus prouocetur. caueat tamen, ne super oculum infirmum dormiat, et ne caput depressum sit; sed superius eleuatum. Nec uestimentorum capita sint stricta, nec in faciem se diu projiciat.

Docet

Docet administrare sief album, in cuius descriptione ponit sarcocolla: & ideo fm Mesue conuenit in agumento, nō in principio. sed, si quis forte instabit, q̄ Rafis omisit medicinas principij; dicendum est q̄ sic dat ipsas intelligi: nam, si ab hoc sief albo remoueat sarcocolla; est medicina principij. vel forte hic Rafis breuitati indulgēs uoluit hoc sief esse medicinam principij ophthalmiæ prouenientis ex materia mixta ex humoribus calidis, & frigidis. uerū consuetudo Mesue, & aliorum autorum in principio ophthalmiæ calidæ est apponere albumen oui cum aqua rosacea, uel lacte. in secunda parte principij sief album sine sarcocolla, & in augmento cum sarcocolla, & tandem addere aliquid aque fœniculi, aut aque decoctionis sem. citoniorum, aut fœnugræci, ubi quærat maior digestio, & maior sedatio dolorum. caue tamen sumopere, ne matures. Et si lippitudinis in hac tertia parte omnia clara sunt; docet enim curare statim: & ideo ponit puluerem album, qui fit ex sarcocolla, & sief memithe. caue tamen, ne pulueris subtilitas mordicat. ideo forte melius est, ut simus contenti collyrijs in forma liquida. sief, & collyrium idem sunt. medicina ocularis: et habent formam oblongam ad similitudinem ovis dactili; quanquam moderni intelligant per collyriū medicamen oculare liquidum. Collyrium aliquando accipitur pro suppositoio, quod est ad similitudinem sief, siue collyrij proprie sumpti.

Si autem oculus leuior fiat, & dolor sedetur, ac lachryma minuantur phlebotomia iam facta, & uentre soluto: balneum multoties, & frequenter ingreditur: ex hoc enim passionis reliquæ dissoluentur. quod, si in oculo humor sit, & granedo remanserint; puluis citrinus est immittendus. ex his autem, que habenti ophthalm. multum conferunt, est, ut frons, & palpebra ex hoc liniantur epithymate. Quod Rec. sief memithe, ros. aloes, litij, sandali rubi, faufel, croci orientalis, omnium ana partes æquales. fiant ex eis pilule: cumq; necesse fuerit, resoluantur una ex eis in succo coriandri, aut in succo endiuia, aut in aqua rosacea, & liniantur cum eo, & liberabitur, si deus uoluerit. Sief album. Recipe ceruse ablute drach. 1. o. sarcocollæ crassæ drach. 3. dragagan. drach. 1. opij drach. semis. fiant ex eis pilule lenti similes. puluis citrinus. Recipe sarcocollæ crassæ drach. 1. o. aloes drach. 2. croci drach. 2. myrrha drach. 1. litij drach. 2. & his optime tritis immittatur puluis cum opus fuerit. puluis albus. Recipe sarcocollam albam, et pinguem: quæ mittatur in lac mulieris: quod melius est, cum alicuius iuenculæ fuerit, & dimittatur in umbra, donec siccetur: & teratur optime, & omnibus drac. decem ipsius addatur sief memithe drach. 2. quæ iterum optime trita reponantur, & cum opus fuerit; in oculum mittantur.

In hac ultima parte ponit puluerem citrinum resolutiuū declinationi conuenientem, qui fit ex sarcocolla, aloes, croco &c. uerum applicat in hac ultima parte res conuenientes principio, ut puta confringentia intercipientia fluxum, quibus statim ab initio uti debemus, scilicet facta prima phlebotomia sief memithe, idest succus memithe inspissatus. est autem memithe plāta frigida natura, quæ dicitur glaucium; & est species chelidonis frig. & sic. in primo, cuius succus extrahatur post aliqualem exiccationem, ut partes aqueæ resoluantur, & ad formam sief reducatur, & sic in sole exiccetur. litium uerō temperatum in actiuis sicum in secundo, & sic ex folijs, granis, radice cuiusdam arboris spinosæ similis buxo, multum ualeat in ophthalmia. faufel, idest, auellana inda. croci orientalis, idest, communis, quo utimur: crocus autem hortulanus est flos chartami, & cætera nota sunt. & nota, q̄ Rafis in declinatione concedit balneum, in quod multoties æger ingredi debet ad resolutionem residui materierum; quod balneum debet esse aerium, aut aquæ dulcis. sed tempore isto hoc non utuntur; nequaquam autem conuenit in augmento, esset. n. causa maioris fluxus humorum ad oculū, & augmenti apostematis: imo neq; conuenit in statu nisi cum tota materia fluxerit. in descriptione pulueris albi ponit sarcocollam, quæ est gummi calid. in secundo, sicut in primo

multum ualens in ophthalm. ad resoluendum, & abstergendū. & est preparandū in lacte mulieris iuenculæ. aliās docet esse preparandū in lacte mulieris nutriendis puellam; quod ultimū intelligendū est ipsam peperisse illam, quā nutrit; sic. n. lac ē frig. & humidius. est aut melius, ut sit iuencula, q̄ senex; quia lac ipsius est humi. licet calidius; sed est calidius cali. uiuificat, & spirituosa oculo conueniente. cætera patent &c.

Sed, ut modus curationis ophthalmiæ pro iuuenibus clare dearticuletur; ponamus exemplum. Occurrit tibi forte plethoricus patiens ophthalmiam satis notabile, & infestantem mixtam humoribus calidis dominantibus præcipue sanguine, sicut frequenter accidit: raro enim sunt apostemata singularia, tertia quarti. in prima die ophthalmiæ fiat phlebotomia stomacho ieiuno uenæ cephalicæ in brachio contrario oculo ophthalmico, & haurietur. 5. 1. o. sanguinis, plures, & pauciores fm exigentiam uirtutis, repletionis, ætatis, temporis anni, & aliorum, a quibus quærenda est licetia in phlebotomia. & si fuerit stipticus fm uentrem; præmittatur huic phlebot. clystere lenitium. et eadem die ponatur in oculo aliquid aque ros. & proprie ex ros. syluestrib. actu frigid. nam quæ in oculis ponuntur, debent esse actu frigida fm plurimū: & q̄ in auribus, calida de sex horis in. 6. horas. et clauso oculo ponatur desuper faldella cotti lenis circūdata petia linea subtili infusa in aqua ros. quæ cooperiat oculum, & partes circumstantes, & præcipue magnā partem frontis, & aliquantulum stricte super oculo ligetur ita, ut dolor non inferat: quæ similiter de sex horis in. 6. horas cum suauitate renouetur. si aut dolor uehemēs instaret; in hoc principio permisceatur hæc aqua ros. cū aliquo leui stupefaciente; sicut est aqua papaueris, mucilago psilij, succus lactuce, solatri, aut pomorū mādragoræ, quæ mixta in oculo, & sup oculo, & partibus adiacentibus applicetur. Secūda die phlebotometur ex cephalica eiusdē brachij, & hauriantur. 5. 6. sanguinis, uel circa: quæ completa ponatur de sex horis in sex horas sief album sine sarcocolla cū aqua ros. aut lacte distemperatum, aut super cote cum eisde frictum: & sit sine opio, si dolor nō affuerit; aut cū opio, si dolor erit: & super frontem, & super tempus oculo communicans ponatur repercussiuū. descriptio sief albi. R. gummi arabici, dragaganti, amyli ana. 5. 1. ceruse lotæ. 3. 1. s. & distemperentur cū albumine oui. huic, si dolor affuerit; addatur opij grana septem. descriptio repercussiuū applicandi super frontem, & tempora. R. sief memithe, rosarum, litij, boliameni. ana. 3. 1. cū albumine oui optime incorporetur, & fiat sicut unguentū molle & extendatur super petia lata fm frōtis latitudinē, & fronti apponatur: & una alia similiter temporis, oculo cōmunicanti. & nō remouentur nisi de tertio in tertium, aut cū cadunt per se. si tñ hoc tempore infestaretur; addatur. 3. s. opij, & utere, ut prius. aliud repercussiuū, doloris uehementis sedatiuum. Recipe croci, memithe, litij, aloes, gummi arabici, acati, opij, ana partes æquales. cōfice formas similes auellanis cum succo solatri, aut rubi. & cū oportet, dissolue unam earum cum succo solatri, aut rubi, aut mucilagine seminum citoniorum, aut psilij, aut albumine oui, aut aqua rosacea fm exigentiam necessitatis. & in hoc liquore refundatur faldella cotti petia linea subtili circūdata, & ponatur, ut supra, & remittatur fm necessitatē satis frequenter, ne nimis super oculo exiccetur, & inuiscetur: remotio. n. rei multum inuiscatæ esset causa augmenti doloris, & maioris fluxus humorum. & propterea multū uiscosa nō sunt super oculo ponēda; sicut huiusmodi faldellæ infusæ in albumine oui, & similibus multū oculo adhærētibus. deinde tertia die soluat uenter, si nō fuerit nimium solutus, cum aqua decoctionis mirobalanorum citrinorū, prunorum, camarinodori, uiolarum, cū cuius uncijis tribus aut. 4. trahatur cassiæ uncia una aut. 3. 1. o. aut dissoluatur cū ea mannæ. 5. 1. semis, & portio calida exhibeatur. post cuius sumptionē taret prandium per quinque horas: & hæc euacuatio potest deinceps replicari fm exigentiā semper digerendo materiā cum syrupo de papauere, & similibus. & idē collyrium oculo imponatur & cætera fiant, ut supra usq; ad quartū diem. & in hoc quarto die gratia diuersionis phlebotometur uenæ noeræ. & si non reperiuntur; uentotetur locus iste cū scarificatione, aut sanguisugæ apponantur. deinde quinta die sief albo supra scripto addatur drach. 1. sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris, 1. o. Arculani F 4 & dist em.

& distēperentur cū lacte mulieris, & aqua ros. & quarta parte mucilaginis, sem. citoniorum, aut hoc sief addita sarcocolla super cote cum lacte fricetur. in hoc enim tempore opus est digestionē aliqua, & doloris sedatione, cum in hoc tempore uniuersaliter debeat esse augmentū: quod magis declaratur, si oculus lippitudinem habere coeperit: ante. n. hoc tempus, scilicet in toto principio nō est in oculo lippitudo, neq; inuiscatio notabilis palpebrarū: sed solū fluxus lachrymarū subtilium. & in hac quinta die, si opus fuerit propter materiam multitudinē gratia diuersionis; phlebotomentur uenæ, quæ sunt post aures ex parte oculi ægri, & dimittantur per se cōstringi, aut sanguisugæ apponantur. hoc etiā ultimum collyriū usq; in diem septimū continuetur. s. quousq; peruentum fuerit ad principiū status: quod declarabitur per multitudinem lippitudinis, & palpebrarū inuiscationem, cuius lippitudinis grana sunt crassa attinētia cuidā relucētia. deinde post septimū collyrio addatur plus sarcocollæ, & aliquid aquæ feniculi: sicq; cōtinuetur usq; in diē. 10. uel. 11. & in unaquaq; mutatione est oculus debite à lippis abstergendus cū extremitate stili cotto inuoluti: & etiā si opus fuerit, poterit cum aqua ros. tepida madesieri, & cū ea oculus lauari, & abstergeri, & post debita absterfionē medicina debet imponi. & in hoc tempore exterius super oculo ponatur cotum petia linea subtili circumdatum insulum in decoctione rosarum, & fenugraci, aut ros. & meliloti. si aut hoc tempore dolor excreuerit; signum est ulceris, aut exituræ: pro quorū curatione recurre ad capitulū sequens de ulceribus, & exituris. post. 11. aut usq; ad. 14. uel circa, in quo tempore est declinatio, quæ per signa prius posita cōprehendi debet, perueniatur ad resoluētia pura, quæ de intēctione authorum in forma pulueris, & liquida possunt applicari; licet, ut credo, tutius sit cū humidis procedere; puluis. n. frequenter, & si sit optime tritaturus, & præparatus sua asperitate dolorem cōmouet, & est aliqui causa noui fluxus humorum ad oculū. & ex conuenientibus in declinatione est: ut oculus collyrizetur cū sarcocolla nutrita cum aqua feniculi, & distemperata. cui propter humoris caliditatem aliquid thuriæ præparata posset addi, aut oculū imponatur collyrium huiusmodi descriptione Mesue. R. sarcocolla nutrita. 3. i. croci, spicæ, aloes lori. ana. gran. 6. distemperentur cū aqua feniculi. cui, si in oculo uideatur nimia caliditas; addatur aliquid aquæ ros. & si oculus toleret, in forma pulueris potest applicari. exterius aut ponatur cotum insulum in decoctione fenugraci, ros. meliloti in aqua, & uino. regimen aut sex rerum non naturalū est, ut eger locetur in aere tepurato obscuro non uetoso, neq; fumoso, aut mali odoris: teneatq; nō solum oculus latus clausum; sed et sanum: unius. n. oculi cōmotio inquirat alterū: teneatq; caput teperate calid. & in oēm euentum nihil gerat strictum, circa caput, neq; circa collum. dormiatq; capite eleuato super ceruicē, aut super latere oculi sani, & nequaquam super oculo egro, dormiatq; multū, de nocte maxime: sed non dormiat nisi distāter à cibo per. 2. horas, uel circa. habeatq; pro posse uetrem lubricum, ut affellet bis in die, aut naturaliter, aut auxilio medicinali. s. suppositorio, aut clysteribus, nullo modo exercitetur, quæ fiant satis fortes, aut mediocres incipiēdo à spatulis, aut brachijs descēdendo. & possunt fieri bis in die stomacho ieiuno, q̄ post cibum. sit sperans, & gaudens. uitet omnia animi accidentia multū excedentia, diæta eius sit tenuis: unde cibum minuat; imò coenam aliquā omittat, caueatq; à uino, carnibus, & rebus dulcibus in toto curæ processu præter quam in declinatione. ac uniuersaliter quanto accidentia sunt uehemētiora, sit diæta magis tenuis, & in omnem euentum declinet ad frigidū. caueatq; ab euaporantibus, etiam si frigida sint; sicut acetū: & etiam ab his, quæ à proprietate nocent oculis: aut à modo substantiæ, sicut lactuca, coriandrum, lentes, & inflatiua omnia. unde comedat pyssanam, panicum, & cōdiantur cum pauca agresta, aut uino granatorum, sed non sit multū acetosa: comedatq; in fine menæ aliquid repressium uaporum sicut pyrum, aut citonium coctum, uel confectum. in declinatione potest uti carnis leuibus in pauca quantitate, & uino paucifero lymphato non uaporofo: & quanto magis procedit ad finem de-

clinationis, tanto magis diæta incrassetur. hæc dixi in cura regulari, secus in cura coacta. accidētia namq; & uirtutis debilitas interdū ordinē curationis præuaricant. & ex hoc possunt elici modi curationis cæterarum specierū ophthalmiæ. & erit auxilium ad plura sequētia capitula. si. n. ophthalmia fuerit cholerica; cōmuniter una phlebotomia sufficet, & humor cholericus erit aliquoties euacuandus cū aqua fructuū de qua supra: & cæteræ intentiones respicientes causam antecedentem, ut supra compleantur. & medicina locales declinent plus ad frigidum, & minus ad siccum. si uerò fuerit phlegmatica; euacuetur humor phlegmaticus cum his, de quibus sermo præcessit: & remedia plus declinent ad calidum, & siccum. si uerò melanch. euacuetur humor melancholicus, & remedia localia sint magis humida, & satis in actiuis temperata. in aquosa euacuetur humiditas aquæ cum his, quæ dicta sunt, & remedia localia sint magis sicc. & ad calidum declinantia. in uetosa autem euacuetur humor, à quo eleuatur uentositas, & procedatur cum calidis, & siccis uentositatem carminantibus: quæ autem sint huiusmodi in quacunq; materia competentia, non dearticulate scribo; sed facile possunt elici ex dictis, & ex dicendis. si enim omnia dearticulate ponerentur: magnum uolumen excreueret, & tedium legitibus pateret: imo etiā longius processit, quā decreuerat, sed hoc erit auxilium ad sequētia, gratia tñ completoris doctrinæ describā aliqua localia fm uarias species ophthalmiæ. si ergo ophthalm. fuerit frigida, phlegmatica; utere in principio sief hoc, cū succo myrti aut aqua ros. cuius hæc est descriptio. R. sief albi descriptione Almanforis. 3. i. spicæ, croci, ana gran. 5. distemperentur cum succo myrti, aut aqua rosacea, & in processu utaris isto. R. sarcocolla. 3. i. spicæ. 3. i. rosarum. 3. i. croci. 3. i. opij, aloes, gummi arabici, amyli, dragagathi. ana. 3. s. confice cum aqua pluuiali & utere eo cum aqua feniculi, aut succo eius: sed dolore non existēte remoue opum. si aut materia fuerit melancholica, addatur cū similibus mucilago, semen citoniorum: aut utamur similibus collyrijs ad calidū declinantibus cū lacte. materia uerò existēte cholerica utamur sief albo cum opio, aut sine opio; cum aqua papaueris, aut mucilagine sem. citoniorū, & addatur in statu parum sarcocollæ, & aqua feniculi, & materia existēte aquosa utamur thutia cum sarcocolla, & similibus. sed materia existēte uetosa resoluiatur cum filtro, aut spongia infusa in aqua decoctionis ros. feniculi, cymini, meliloti, aliquoties applicita purgatione pcedente. puluis et citrinus, & similiter puluis albus Almanforis conueniētes in statu & declinatione ophthalm. cal. aut mixta etiam essent cōueniētes in principio ophthalmiæ frig. aut saltem in augmento, si misceantur cum lacte, aqua ros. mucilag. sem. citoniorum, & similibus: & cum decoctione meliloti, & sem. citoniorū, exterius aut applicādis super toto in principio ophthalm. cal. est cotū carminatum circumdatum petia lini subtili insulum in aqua ros. & si dolor esset; infundatur in aqua papaueris cum lacte, & aqua ros. & in processu conuenit pomū coctum cum aqua ros. permixtum, aut cotū superscriptum fufum in aqua decoctionis ros. meliloti & sem. citoniorum. & sic ulterius procedendo addantur calida, & minuatur frigida. sed in ophthalmia frigida in principio exterius super oculo applicetur cotū insulum in aqua decoctionis ros. & myrti. & in processu infundatur in aqua decoctionis anethi, rosarum, & malux in uino stiprico: & magis in processu in uino decoctionis meliloti, spicæ, fenugraci, & ros. ex applicandis aut fronti, & temporibus in ophthalmia calida ad repercutiēdum est istud, quo communiter utor. R. boliar. 3. i. aquæ ros. 3. i. aceti. 3. i. albuminis oui numero. 2. misce & infundantur petiæ & fronti, & temporibus applicentur. Sed in ophthalmia frigida cum hoc misce thus & mastichen. uerum apud necessitatem posset superscriptis addi. 3. s. opij aut amplius fm maiorem necessitatem sedandi dolorem. & si materia esset calida ualde cholerica; posset addi succus semperuiuæ, aut solatri, aut aqua papaueris. quod si materia faciens ophthalmiā esset corrosiua; utaris sief albo cum opio, cum albumine oui, & postea addas aliquid sief de plumbo, uel clyst. de quibus in sequenti cap. & nota, quod ea, quæ ponuntur in oculis, debent esse actū frigida, & non multū stiprica: sed ea, quæ fiōt, & tempo-

& temporibus apponuntur debent esse ualde stiptica, & continuari usque ad statum inclusive: ea autem, quæ in oculis ponuntur, uariantur secundum tempora: & similiter, quæ ponuntur super oculis.

De ulceribus oculorum. Cap. 19.

Circa rubricam intellige, quod hæc rubrica. scilicet de ulceribus oculorum multos decipit interpretes huius capituli. existimant enim, quod Rasis in hoc cap. solū agat de ulceribus oculorum, cum tñ primo agat de pustulis, siue exituris oculi, ad quas sequuntur ulcera, cū rupta sunt: postea de ulceribus. & utrorumque in presenti cap. ponit curationem. & propterea forte fuisset conuenientius, ut rubrica diceret de pustulis, & exituris oculorum. sed Rasis à fine, scilicet ab ulceribus in fine remanentibus psumpsit denominationem. premittenda sunt ergo iuxta consuetudinem quid nominis, & quid rei, pustulæ, siue exituræ, & similiter ulceris. pustula enim dicitur quasi apostema paruum. Est autem apostema, secunda primi, ægritudo composita ex tribus morbis, ex quibus cum coniungitur prouenit una ægritudo. Aldubellet uero est apostema colligens humores calidos, siue frigidos. sed exitura est dubellet colligens humores calidos: unde termini se habent sicut superius, & inferius. exitura autem fit dupliciter incipiendo, & permutando. exitura incipiendo est illa, quæ sicut incipit fieri, ita incipit colligere. sed exitura permutando est, quæ primò fit, deinde post tempus colligit. Exituræ autem, quæ sunt in oculis, & proprie in cornea, secundum plurimum sunt incipiendo. Vlcus autem est solutio continuitatis cum sanie ad differentiam uulneris, quod est solutio continuitatis sine sanie.

Cum in oculis fortis dolor, & punctio nociva, ac pulsus sentitur, & lachrymarum sinit multitudo, & cum palpebræ eleuantur, & oculi aperiuntur, loca, quæ sunt in albis ipsorum inueniuntur rubra, et si totū fuerit rubrū et unus locus magis rubere inuenitur, aut in nigredine locus aliquis albus apparet: pustula iam in oculo exorta est.

Ad hanc uero curandā passionē necessarius est medicus ualde instructus in curis oculorum. nos tamē curationes ipsius summas, et aggregationes dicemus. dicimus itaque, quod ulcera, quæ in coniunctiua nascuntur, hoc est, in albis oculorum non adeo sunt timenda, ut ea, quæ in cornea, hoc est, in oculi nigredine sunt. deterius uero ulcerum est illud, quod in nigredine sub pupilla existit, eminentia namque ad istum est uelocior.

Diuiditur autem præsens capitulum in partes. 2. in prima agit de pustulis, siue exituris corneæ theoricè. in secunda ibi. Horum autem ulcerum. agit practicè. prima in tres. nam in prima ponit signa earum. in secunda ibi. Ad hæc uero curandam. ostendit esse necessarium medicū in ægritudinibus oculorum esse eruditum pro harum dispositionum curatione. in tertia ibi. Dicimus autem quod ulcera. ponit diuisionem harum pustularum in suas species, ostendens, quæ sit deterior. pro declaratione huius partis theoricè iuxta consuetudinem nostram primò uidendæ sunt species, & causæ pustularum corneæ, & ulcerum eius: secundo signa: tertio prognostica.

Pustulæ igitur corneæ quædam sunt phleg. pendentes ab aquositate, siue phlegmate aquosa: & dicitur apud Auic. ue sicæ: & apud Azaraium ampullæ. quædam sunt cholericæ, quas Auic. appellat exituras. sed Rasis hic & Ioannes Serap. secundo breuiarij, & Ietius Ali ulcera. tertiæ sunt sanguinæ, quæ bothor ab Auic. dicitur. quartæ melanch. & proprie ex melancholia adusta. quas caneros Auic. nominauit. Rasis tamen breuitati indulgens solūmodo de cholericis, & sanguineis tractauit hic. Pustulæ uero phlegmaticæ pendentes à phlegmate aquoso; non autem crasso; quia non posset in substantiam densam nisi difficillime penetrare, distinguunt quinque modis, scilicet situ, quantitate, modo substantiæ, acuitate, & colore. Situ quidem; nam quandoque aquositas continetur inter primum, & secundū corticem corneæ: quandoque inter secundū, & tertium: quādoque inter tertium, & quartum. Ex parte quantitatis; nam quædam pendet à multa materia fere totam corneam occupante: quædam pauca, siue mediocri. Modo substantiæ; quia quædam pendet ab aquositate subtiliori: quædam crassiori. Acuitate uero; nam quædam pendet

ab aquositate magis acuta, & corrosiua: quædam ab aquositate suauis, non acuta. Colore autem; nam quædam tendunt in nigrum cum diaphaneitate: quædam sunt albæ non diaphanæ. primæ sunt illæ, quæ continentur inter primū corticem, & secundū. secundæ sunt illæ, quæ continentur inter tertium, & quartum. mediæ autem inter has sunt contentæ inter secundū, & tertium. ratio autem primarum est; quia aquositas illuminatur à lumine continentis propter propinquitatē. unde uisio aspiciētis potest penetrare per ipsam usque ad uueā: & propterea apparet coloris nigri: nam quādoque nigrū ponitur sub diaphano, apparet diaphanum coloris nigri. secunda ratio est; quia radij penetrantes per ipsam usque ad uueam reflectuntur ab uuea ad aquositatem, & propter distantiam aquositatis ab uuea radij reflexi sunt rectiores, & magis nigredinem uueæ representantes. si uero aquositas continetur inter tertium, & quartum corticem; tunc non posset sufficienter illuminari à lumine continentis, neque uisio aspicientis posset per ipsam penetrare ad uueam. quapropter apparebit sub colore suo. scilicet albo, & non apparebit diaphana. & et quia radij siqui penetrat usque ad uueam, postea reflexi non sunt recti propter propinquitatem: ipsa aquositate existente ex directo medijs pupillæ; quanto. n. radij illi reflexi sunt breuiiores, tātō sunt minus recti. & propterea minus repræsentant nigredinem uueæ. & quanto sunt distantes, sunt magis recti, & melius ipsam repræsentantes. oppositum tñ accidit respectu ipsius ægris; nam illa, quæ est interior, apparet sibi magis nigra, & tenebrosa, cum magis uisum impedit, & minus illustret à lumine continentis. e contrario exterior apparet magis alba, & minus tenebrosa propter eam oppositam. & si quis quæreret, quomodo distinguitur hæc uesica, siue pustula nigra à pustula nigra respectu humoris melancholici; dicendum, quod nigredo confurgens merito sita est cum luciditate, & paruitate: sed confurgens merito humoris est nigredo propria terminans uisum non lucida, nec diaphana. idem dicendum de his pustulis, cū pendet à cholera, aut ab alijs humoribus: quæ. n. sunt magis extra, apparet magis claræ: quæ uero magis intra, magis opacæ; semper tamen tendunt in colorem humoris, ex quo generantur. Vlcera uero, quæ Auic. exituras appellat, sunt septem specierum, & generantur fin plurimū ab humoribus acutis adultis quatuor, in superficie corneæ, & accidunt propter ipsa alperitas, cū palpebra cōprimatur supra corneam.

Prima est ulcus simile fumo, uel pulueri in colore, & tenue expansum occupans locum magnū. Secunda species est profundior, uehementius alba, & minoris quantitatis, & nominatur nubes propter similitudinem cū nube alba. Tertia dicitur coronalis; quia est super corona nigredinis, & quandoque occupat aliquid de albo coniunctiuo, & quod est super corona est album, & quod est super coniunctiuo est nigrū. Quarta species nominatur lanosa, existens in superficie corneæ, ac si lana pauca esset super ipsa. Tres aliæ sunt profundæ, quarū una nominatur anulus submersam habens profunditatem, & est ulcus profundū, strictum mundum. propterea nominatur anulus ad similitudinem gēme anuli, & penetrat usque ad ultimum corticem. Secunda nominatur ungula, & est minoris profunditatis & latioris occupationis. Tertia est ulcus, quod nominatur adustium: & est ulcus sordidum habens crustas, in cuius mūdificatione est timor. & et si non mūdificatur; est timor: quia humiditas currit per corrosionem panniculorū, & corrumpitur cum ea oculus. item ulcera, & pustulæ distinguuntur; nam quædam sunt in coniunctiua, & sunt minus mala: quædam sunt in cornea, & sunt deteriora. & deterius ex illis, quæ sunt in cornea, est factum ex directo pupillæ. Causæ pustularum sunt quatuor humores iam dicti, & quæcunque possunt illos humores mouere ad oculos, siue sint causæ primitiue, siue corporeæ. Causæ uero ulcerū sunt aut ophthalmia, aut pustulæ corneæ, de quibus sermo præcessit; ipsis. n. eruptis succedunt ulcera. & quādoque generantur à causis primitiuis; sicut gladio, & similibus, calu, & offensione. aliquando sunt ab humore paulatim superficie corrodente, & et lachrymæ acutæ diu continuatæ possunt hoc facere. & nota, quod pustulæ quādoque rūpuntur exterius, & sanies fluit extra, quādoque rūpuntur interius, & sanies continetur retro corneam, & similatur ungulæ; est enim sicut quædam lanula.

Signa pustularum sunt ea, quæ dicta sunt in textu. scilicet fortis dolor

dolor propter membri sensibilitatem. punctio nociua propter acuitatem, & mordicationem humoris, aut pustulæ rptione. & pulsus, siue dolor pulsatiuus propter uehemētē caliditatem. unde arteriæ coniunctiue pulsantur amplius solito. & multitudo lachrymarum cū multa aquositate ad oculum deriuata tam propter dolorem, q̄ propter caliditatem. quintū signum, per quod locus ulceris distinguitur, est; quia scilicet si pustulæ, uel ulcera sunt in albis oculorum; loca illa apparent rubea. & si totum fuerit rubrum; locus ulceris, uel exituræ apparebit magis rubeus, sed in nigredine oculi locus ulceratus, uel pustulatus apparebit albus. ratio primi est duplex dicta superius: una; quia in coniunctiua sunt multæ uenulæ, & propter dolorem ulceris, & calid. multum ex sanguine, & spiritu attrahitur ad coniunctiuam, & magis ad locum lesū. & propterea rubet; sicut facies sanguine ad ipsam attrahit. secunda causa est; quia in coniunctiua alba omnis rubedo est ualde manifesta. causa autem q̄ apparet albedo in cornea, est aut propter sanie ibidem existentem albam, aut si sit ulcus sine sanie, aer subingrediens representat colorem album, sicut subingrediens cornu in frusta diuisum. tertia causa; quia per pustulam, & ulcera perditur diaphaneitas corneæ: & quia color magis cōformis diaphaneitati est albedo, color apparet albus diaphaneitati in albedinem conuersa; sicut uidemus aquam diaphanam per congelationem effici albam, & uisum terminare est. n. color extremitas perspicui terminari corporis per opacū. cetera, quæ in hac parte dicit Rasius theoricæ, sunt nota. dicit tamē in parte ultima huius partis theoricæ, q̄ ulcus existit sub pupilla ex directo pupillæ, uel etiam parum infra pupillam est deterius ceteris; cum ad ipsum uelocius sequat̄ eminentia, idest, exitus uueæ. his addas sextum signum, scilicet, q̄ qui habet ulcera, aut pustillas in cornea, & proprie calidas, non pōt tolerare lumen tum. quia lumen calefacit; tum quia spiritus, & sanguinem trahit ad locum. unde fit maior inflammatio, & dolor propter motum humoris, & spiritus ad locū. & tertia causa est; quia in ulcera lūm penetrat ad crystalloide nō debite mūdificatū pulsus in cornea. quapropter nō pōt ipsum sustinere.

Prognostica, primum. Pustula, aut ulcus profundū in cornea ducit ad cecitatem, aut aliquod uestigium albū derelinquit. scicatricem, quæ non est diaphana; cum sit restaurata per uiam secundæ intentionis. Secundū, pustula, uel ulcus cancerosum sū plurimū est incurabile ducens ad destructionē oculi, & est magis dolorosum in oculo, q̄ in alia parte nostri corporis. Tertium, secundū plurimum deterior est ruptio ad interiora, q̄ ad exteriora oculi; licet eruptio utriusq̄ sit ceteris deterior.

Horum autem ulcerum curam cum phlebotomia incipere debemus, & sanguinis extrahere multitudinem, secundū quod possibile fuerit. consequenter autem uenter solendus est. & eger sibi cauere debet à carne, & uino dulci; & esse contentus herbis frigidis. & in potu sola aqua uti in oculo uerò in initio sies album cum lacte mulieris est mittendum: & si pulsus iam eleuari, & sedari uideatur; sperandum est, quod ægritudo soluatur sine sanie collectione. quod, si pulsus post sanguinis extractionem, & uentris solutionem, ac sies albi immisionem quiescere non uidetur; parua fiducia in hoc, quod diximus, est habenda: est itaque tunc sies de olibano mittendum in oculo, & pila aliqua oculo superponenda, & cum ligatura stringenda, ante uerò, quā hoc eueniat, oculus suauiter est ligandus. & sine superpositione pilæ. & non cesses in oculum sies de thure sape distillare, donec sanies in pila uideatur.

Hic ponit curam pustularum, & ulcerum corneæ. & diuiditur hac pars in duas partes. in prima parte ponit regimen uniuersale curationis istorum. in secunda ibi, In oculo uerò, ponit regimen particulare. de prima dicit esse inchoandum curam cum phlebotomia extrahendo sanguinem secundum conditionem patientis. secundū æger soluendus est cum medicina leniente frigida descripta superius in capite de ophthalmia. tertio regatur æger cauendo se a carne, & uino, & proprie dulci, sed sit contentus herbis frigidis; sicut portu-

laca, endiua, lactuca, cucurbita, & solum aquā bibat. in oculo uerò hic ponit regimen particulare: & diuiditur in quinque partes. in prima parte ponit curam istorum pustularum usq̄ ad statum: in secunda ibi, Quod si pulsus, ponit curam ipsarum in statu, usq̄ quo rumpantur: in tertia ibi, Ex quo uisum fuerit, ponit curam ulcerum remanentium post rupturam pustularum, in quarta ibi, Cum autem caro, &c. ponit curationem albedinis remanentis post curationem ulcerum. in quinta parte ibi, Sies de thure, ponit descriptionem quatuor collyriorum complementum intentiones superscriptas. de prima parte dicit, q̄ in principio sies album distemperatum cum lacte mulieris est ponendum in oculo, & si per huiusmodi impositionem simul cum remedijs uniuersalibus dolor pulsatiuus alleuari, & sedari uideretur; sperandum est, q̄ ægritudo soluetur sine collectione sanie, quod si dolor pulsatiuus post remedia superscripta non quiescat; parua fiducia habenda est, q̄ ægritudo soluetur sine collectione sanie: imo credendum est perseverante dolore pulsatiuo sanie colligi. & propterea est accelerandum ad maturationem, & sies de olibano est ponendum in oculo, & pila aliqua; sicut faldella ex cotto est superponenda oculo, & cum ligatura stringenda: quæ omnia fiunt, ne cornea rumpatur, & humores, & uuea exeant. si uerò non timeremus rptionē corneæ; nō esset necessariū pilā oculo superponere, & stringere, continē ergo sies de thure, donec pustula rupta, & sanies in pila superposita uideat̄.

Ex quo enim hoc uisum fuerit; sies de plumbo uti necesse est, usquequo profunditas fiat plana, & tota caro generetur: ea tamen, quæ diximus, tunc sunt facienda, cum pustula non est magna quoniam, cum magna fuerit, fueritq̄ iuxta pupillam, aut inferius ea; est tunc necesse, ut cum alio fir medicetur, ne oculus emineat. ad pilam quoque superpositionem, & ligaturam est redeundum. æger præterea semper supinus iacere debet, & a forti motu abstinere.

Docet curare ulcera remanentia post rupturā ponēdo in oculo sies de plumbo, usq̄quo profunditas fiat plana, & tota caro generetur. & subdit, q̄ hæc faciēda sunt, cum pustula non est magna: ipsa. n. existente magna proprie iuxta pupillam, aut infra eam ita, ut manifeste timeamus de exitu uueæ, & humorum; tunc est necesse, ut cum sies elisr posito in oculo medicetur, ne oculus emineat rupta cornea, & egrediente uuea. & in hoc casu debemus pilam superponere, & ligare, & æger debet iacere supinus, & abstinere à forti motu; imo etiā à locutione. isto autem sies elisr utimur ad alteram duarum intentionum, aut sanie emanante ad prohibendum, ne ulcus corrodatur, & amplificetur: est. n. frigidum, siccum, & stipticum, aut eo utimur ante rptionē pustulæ ad faciendum eā rumpi interius, ne oculus deformetur: & sanies interius collecta in processu poterit resolui, aut cū operatione manuali extrahi scindendo in parte inferiori, ubi collecta fuerit, sicut dicitur in curatione cataractarum.

Cum autem caro in loco uulnere per se se dē generata fuerit, uel locus apostematis carne repletus fuerit; remanebit ibi in oculo albedo. quod, si ulcus profundus fuerit; albedo est crassa: & si in superficie tantum carnis fuerit; erit subtilis. ulcus quoque si à pupilla fuerit remotum, & steterit separatim per se uestigium; illud, quod remanet, nihil mali faciet. si autem iuxta pupillam quandoq̄ fuerit post ulceris curationem uestigium remanens; prohibebit uisionem. quapropter tunc utendum est rebus, & medicinis, quibus uestigium, quod diximus, abstergi, & deleri possit.

Docet curare albedinē post consolidationem ulcerum remanentē, quæ aliqñ est crassa, & profunda, aliqñ superficialis, sū quod ulcus est profundum, aut superficiale. & hoc aliqñ nō impedit uisum, si nō fuerit ex directo pupillæ: & aliquando impedit, si fuerit ex directo. quapropter utendum est medicinis, quibus uestigium illud possit abstergi, & deleri: de his autem dicitur inferius in capite de albedine oculi.

Sies de thure. Recipe ammoniaci, sarcocollæ amborum. ana. drach. 5. thuris, drac. 1. croci, drac. 2. conficiantur ex mucila-

mucilage senugr. & fiat ex eis sief. sief de plumbo. Rec. plūbi ulsi, antimonij, thutiae ablute, calceacea menon, gummi arabici, dragag. omnium. ana. drach. 8. opij, drach. 5. terantur, & cum panno serico, qui sit subtilissimus cernantur, & cribellentur, & conspergantur ex aqua plūiali, & fiat ex eis sief. sief ex quo caro in ulceribus oculorum generatur, & uuea egressio prohibetur, & uestigium subtiliatur. Rec. cadmie ablute, thutiae ablute, cerusa, antimonij, thuris, omnium ana. drach. 2. myrrhæ drach. 1. sarcocollæ crassæ, drach. 1. & s. sang. dracon. aloes, opij, ana. drach. 1. fiat ex eis sief. elisir, quo est utendum, cum timetur, ne ex ulcere uuea sequatur egressio. Rec. antimonij, hematitis, ambrum, ana. drach. 10. acatis, drach. 3. aloes drach. 1. terantur, & fiant ex eis sief, & administrentur apud necessitatem.

Hic deferibit quatuor sief complementia quatuor intentiones suprascriptas. primum est sief de thure maturans pustulas. Rx. ammoniaci cal. in tertio, sic. i. primo, maturatiui & resolutionis, sarcocollæ, ana. 3. 5. thuris cal. & sic. in primo. 3. 10. croci. 3. 2. conficiatur sief cum mucilage, senugræci, extrahendo fm doctrinam Seruitoris. secundum est sief de plumbi carne generans in ulceribus, mundificans, & sigillans. Rx. plumbi ulsi frigi. & humidum, maxime correctiui ulcerum malignorum, antimonij frigidi in primo sic. in secundo, thutiae ablute frigi. in primo sic. in secundo, zris ulsi calidi in secundo sic. in tertio, absterfui. gummi arabici, dragagati omnium, ana. 3. 8. opij. 3. 5. terantur, & tamisuntur, & conspergantur aqua plūiali, quæ est magis subtilis, & absterfua. deinde ponit aliud sief, ex quo caro in ulceribus generatur, & prohibet egressione uueæ, & uestigium subtiliat. Rx. cadmiæ ablute, quæ est fuligo adhærens parietibus superioribus fornacis in cuiuscuq; metalli purificatione, & est diuersæ complexionis fm diuersitatem metallorum, thutiae, cerusæ, antimonij, thuris, ana. 3. 2. myrrhæ. 3. 1. sarcocollæ crassæ. 3. 1. s. sang. drac. qui est frigi. & sic. conficitur, prohibens fluxum, conglutinandans ulcera & plagas recētes: aloes, opij, ana. 3. 1. fiat ex eis sief. Sief elisir, quo utendum est, cum timetur, ne ex ulcere sequatur egressio uueæ. Rx. antimonij, lapidis hematitis frigi. in secundo, sic. in tertio, & ualet multum in ulceribus oculi. & habet proprietatem mirabilem ad gonorrhæam, & debet esse lotus, ana. 3. 10. acatis. 3. 3. fed nos non habemus acatiam, quæ fit de succo arboris, cuius gummi est dragagatum: sed loco illius utitur succo prunellorum, aloes. 3. 1. fiant ex eis sief cum albumine oui: nam hoc sief est frigidum, siccū, stipticum, consolidatiuum. triplex est harum pustularum regimen curatiuum, sicut dictum fuit in ophthalmia. primum est uniuersale respiciens causam antecedentem: secundum est particulare respiciens magis coniunctam: tertium est commune utriq; Regimen uniuersale quinque perficitur intentionibus curatiuis: prima est minoratio, secunda digestio, tertia eradicatio, quarta diuersio, & quinta fluxus interceptio. & hæc omnes perficiuntur cum phlebotomijs, euacuationibus, digestionibus, diuersionibus, & fluxus interceptionibus, sicut dictum fuit in ophthalmia à simili causa proueniente. sola est differētia, quia rarius oportet interceptio fluxum cum repercussiuus fronti, & temporibus applicitis, & cum sectione uenarum, & arteriarum in pustulis corneæ, q̄ in ophthalmia: cuius causa est, quia materiæ fluentes ad coniunctiuam frequentius fluunt per uenas, & arterias extrinsecas, q̄ per intrinsecas: eo, q̄ coniunctiuæ oritur ab almocha: ti: ecōtra uero cornea à dura matre, quæ sub craneo est, quare materiæ frequentius fluunt ad ipsam per interiora, q̄ per exteriora saltem in cōparatione ad coniunctiuā. attamē, ubi in utraq; necessarium sit interceptio fluxum: cū eisdē remedijs est illud faciendum, &c. Secundū uero regimen exigit tres intentiones curatiuas, sicut dictū fuit in ophthalmia. s. repercussionem in principio, repercussionē cum resolutione in augmento usq; ad mediū status gradatim augēdo resolutionē, à medio status deinceps resolutionē purā, si pustulæ tēdant in uia resolutionis: & hæc eisdem remedijs fere cōplen dē sunt, nisi q̄ magis sedatiua doloris, & stupefaciētia sunt necēssaria in pustulis corneæ, q̄ ophthalmiæ pp doloris magai-

tudinem. ueruntamen est differētia, quia pustulæ corneæ frequentius maturantur, q̄ ophthalmia eo, q̄ cornea est magis densa, & minus habēs de caliditate innata: & ēt quia inter cortices eius facilius materia colligitur. & propterea in principio pustularum indigemus repercussiuus fm plurimū magis frig. & stupefacientibus, & dolorem sedantibus, sicut lacte cum aqua pa. aut sicut sief albo cum opio, siue sarcocolla cum lacte: in augmento uero addatur sarcoc. & si dolor, & pulsatio, & cetera accidentia uideantur remitti: tunc sperandum est pustulam per uiam resolutionis terminari. si uero pulsatio, & reliqua accidentia augentur: suspicandum est de maturatione. & propterea iubet Rafis tunc apponi sief de thure; sed, quia hoc est nimis cal. laudo, ut in primis incipias cum magis domesticis, sicut cū mucilage sem. cit. aut sem. lini, aut fenugr. cū sief albo: & postea uenias ad sief de thure cum lacte, quod tanto tēpore continetur, donec pustula rupta fuerit, & sanies in pila uideatur. & si illa pila, siue faldella esset, infusa in lacte, aut in aliqua decoctione maturatiua, sicut sem. citoniorum, sem. lini, aut fenugr. cum pauca aqua ros. esset præstantius. hoc autem fit, ut per illam compressionem cōseruetur cornea, ne dirumpatur: & hic etiam modus esset obseruandus in ophthalmia, si ophthalmia aliquā maturaretur. rupta uero exitura intentio remanet ad ulcus triplex. s. mundificatio, carnis generatio, & consolidatio. prima perficitur cū aqua decoctionis mellis ros. aut aqua sacch. aut cū sief de plumbi cum lacte permixto: habet. n. uirtutē mundificatiuam, & est ceteris præstantius. secunda intentio perficitur cū eodē, & aqua rubi: idem etiam sigillationem perficit: sed magis proprium in sigillando est sief elisir. dicit tamen Rafis, q̄ si pustula est magna, uel ulcus magnum: loco sief de plumbo ponamus sief elisir, quod intelligi potest, ut dixi circa tex. & ante maturationem, ut sanies fluat interius, ne tota cornea dirumpatur: quod maxime uerum est, ubi pustula illa esset profunda, scilicet inter tertium & quartū corticem. posset ēt intelligi, ut administretur sief elisir in ulcere magno, & proprie corrosiuo ad prohibendum corrosione; est enim frigidum, & siccum, & stipticū. & in his casibus semper debet fieri compressio cum pila; sed, cum curantur ulcera; sit infusa in aqua ros. & esto memor nunq̄ super oculo apponere aliquod tenax, ne in remouendo dolorem faciat, si uero uulnus esset recens, factum à causa primitiua; prima intentio esset phlebotomia. & si alius humor superabundaret in corpore; educatur, & maxime cū medicina leniente. secunda intentio est prohibitio ditcurfus materierum ad oculos cum repercussiuus superius dictis fronti, & temporibus applicitis. tertia est administratio intentionis circa uulnus: in principio ponat aqua albuminis oui in oculo, & die sequenti aqua albuminis oui cū sief albo, & ita continetur usq; ad quartum. & deinceps addatur istis sief de plūbo pro tertia parte, & gradatim minuitur sief album: & augeatur sief de plumbo, donec sief de plumbo solum ponatur, & postea ad cicatrizandum ponatur sief elisir. si autem timeremus egressum uueæ; statim apponamus sief elisir cū albumine oui & semper pila in aqua ros. infusa est super oculo compriment da. tertium regimen cōmune utriq; perficitur duabus intentionibus. s. correctione accidentium, & debito regimine uitæ. accidentia uero corrigenda, sunt tria. s. dolor, aut cum remouentibus superius dictis, aut cum anodinis fomentando oculum lacte, & oleo ros. repidis, aut cum stupefacientibus tā interius, q̄ exterius applicitis. secundum est instantia uigiliarum curanda cū stupefacientibus interius, & exterius applicitis. unde omni nocte cū uadit dormitū dētur. 3. 2. syr. de papauere; cū hoc. n. q̄ digerit materias subtiles cal. ēt somnū inducit. & si non sufficeret: dētur ā. 3. s. ad. 1. requies descriptio Nicolai, aut aliqua pilula opiata, aut lac se. papauer. ponat in ferculis. regimen uero perficitur cum aere, cibo & potu, sicut dictum est superius, & dixi debet esse subtilior, q̄ in ophthalmia, & magis frigida actū, & potentia. & reliquum regimen obseruetur, nisi q̄ hic opus est pluri somno, maiori quiete animi, & corporis. si uero pustula ēēt aquosa post uniuersalia, & euacuationē sibi propriam cum turbith non confortato. s. aut eius infusione in aqua feniculi: est necessarium procedere cum his, quæ illam humiditatē exiccāt, sicut medicamine de luto cōparato ad sanie, loco cuius utimur

mur luto sigillato. R. luti sigil. & torrefacti. 3. 3. thutia præparatæ. 3. 1. cadmia lotæ, & antimonij abluti, ana. 3. 2. coriæ æris ablutæ. 3. 3. opij si dolor fuerit. 3. 3. gummi. 3. 4. teratur cū aqua pluuiali, & fiat ex eis sies, & administret cū aqua fœ nigr. aut fœniculi, & qñ multiplicat curetur cū ferro facien do foramen paruum in parte inferiori: & eodem modo, & cum eisdē medicinis extrahatur sanies contenta sub cornea. uerum de hoc latius, ubi de cura cataractarum. si uerò appareret bothor sanguineus in cupum aqualiter eleuatus, post uisā distilleretur in oculo frequenter lac, postea sanguis columbæ, aut turturis calidus, sicut exit à uena: & pomū coctum cum aqua ros. permixtū super oculo applicetur, & aqualiter cōprimatur. si uerò fuerit pustula cancerosa; tūc post uniuersalia intētio est sedatio doloris cū sies. f. albo, opiato, & lacte mulieris, & emplastrū factū ex uittelo oui, & oleo ros. exterius applicitū est conueniens. intendat ergo sedationi doloris, modis superius dictis: uera autē cura non est possibilis. & potus lactis laudatur in ea. similiter euacuatio cū sero caprino, in quo sit sena, & epithimū. uerum forte esset præstantius oculum euellere, cum non uideatur cura possibilis; fortasse. n. (sicut aliquādo uidī) cancer per partem post partem cōmunicabitur cerebro, & sequetur mors. & propterea melius esset oculum euellere, & finire multum sanguinem egredi: & deinde locum cauterizare cum cauterio actuali.

De his, quæ in oculis cadunt. Cap. 20.

Symatur resina, id est, guma pini, & per oculum trahatur, & extrahit illud, quod in oculo cecidit.

Circa istam rubricam nota, q̃ ea, quæ in oculis cadūt, si ad placitum remoueri possunt, non sunt dicenda ægritudines; licet etiā uisum impediāt: aliter sequeretur, q̃ cōpedes essent ægritudo, & q̃ indutus uestes graues esset æger: sunt. n. hi in operationibus sensibilibus impediti. si uerò illud, quod cecidit in oculo, non sit ad placitum remouibile; quia forte fixum in oculo: aut in palpebra, si impediāt operationes est morbus: aut in numero, aut in uia, si impediāt delationē specierum ad crystalloidem: aut saltem est causa oppilationis; quæ est morbus in uia. uerum hæc fuit differentia inter Gal. & Auic. quia Gal. uoluit, q̃ nihil debeat dici sanitas, aut ægritudo, si pendeat à causa primitiua. Auic. uerò uoluit omnem dispositionem immediate nocētem operationibus, aut ipsas perfectientes esse dicendam ægritudinem, aut sanitatem siue pendeat à causa primitiua, siue non; dūmodo sit in aliqua naturarum. sc. complexione, cōpositione aut unitate. mihi tamē magis placet opinio Auic. & fm nullum istorum authorum id, quod cadit in oculo ad placitum remouibile, est dicenda ægritudo. si autem non potest ad placitum remoueri; quia fixum, & incarnatum, & sensibilibus læderet operationes; fm utrunq; istorum est dicenda ægritudo. pro cura aduerte, q̃ multiplex est modus extrahendi id, quod cecidit in oculo. Primus. si fuerit illud sub palpebra superiori, aut inferiori; trahatur cum una manu palpebra superior inferius notabiliter capiēdo ipsam cū digitis in extremitate sua. & similiter trahatur cū alia manu eodem tempore palpebra inferior inferius, & præcipiatur ægro, ut uoluat oculum ad superiora, & subito, quod cecidit in oculo, exhibit. si aut prima uice nō consequaris effectum; experiaris secunda uice, & tertia. & hic modus est leuissimus omnium. Secundus modus est, ut impleas os tuum aqua, aut lacte, & dilatata palpebra, quantum fieri potest, insuffletur aqua, aut lac cum uelocitate in oculum. istud etiam aptius fit per catathir, siue iniectionum. Tertius multoties dilatata palpebra ab ubere lac in oculum inijciatur. & isti modi utiles sunt, qñ uliquid acutum; sicut sal ammoniacus, aut argentum sublimatum, aut similia ceciderint in oculū. Quartus contineatur anhelitus obturando os, & nares, donec oculi lachrymentur, & exhibit cū lachrymis, quicquid in oculo cōtinetur. Quintus in uersetur palpebra, & in extremitate sili ponatur resina, aut terbenithina, aut uiscus, & tågatur, quod cecidit in oculo, & extrahatur. Sextus fricetur carabe super panno, donec uehementer calefiat, & uicinetur illi, quod cecidit in oculo, & adhærebit ipsi. attrahit. n. festucam; sicut magnes ferrū. Septimus si illud sit infixum in oculo; aut palpebra cum molletis dentatis, aut tenacula acuta dentata extrahatur. & ex his patet litera textus.

De albedine oculorum.

Cap. 21.

Nota, q̃ albedo, albula, nubes, nebula, albugo, tela, parua aliquādo accipiuntur, ut termini synonymi significantes hanc dispositionem, quæ diffinitue est uestigiū apprens in superficie corneæ fm plurimum tendens in albedinem. uerū apud aliquos diuersa important, ut apud Auic. nebula importat uestigiū magis superficiale, albugo magis crassum: sed de his nō est curandum. sunt tñ hæc nomina sumpta à rebus, quibus hæc passio assimilatur. uerū Rasis solummodo loquitur de albedine, quæ est cicatrix ex ulcere derelicta: est autem hæc albedo, si sit coram pupilla uisum impediens; morbus in uia. si uerò sit concaua, aut eleuata, & lædat per illud; posset dici morbus in superficie, & in situ. Si autem lædat per colorem, ut quia faciat obiecta apparere citrina, aut alterius coloris, cuius non sunt; reducitur fm aliquos ad morbum in complexionē: sed fm ueriores sententiam reducitur ad morbum in colore. si uerò non lædat per colorem suum, aut quia non sit ex directo pupillæ nec aliter lædat; tunc non est ægritudo: est tamen de his, quæ cū ægritudinibus nominantur. 2. primi doctrina prima cap. 6.

ALBEDO, quæ in oculis contingit, est uestigium post ulcerum curationem remanens, quando consolidantur.

Hoc caput diuiditur in duas partes. in prima agit de albedine oculi theor. In secunda ibi, Hæc aut passio, &c. agit de ipsa practicè. prima in duas primo ponit ipsius diffinitionē, & causam. in secunda ibi, Quæ cum in oculis, &c. innuit species eius. de prima parte dicit, q̃ albedo in oculis contingens est uestigium remanens post ulceris consolidationem. cuius causa est; quia illud, quod generatur loco illius, quod deperditum est ex ulcere, generatur per uia secundæ intectionis ex nutrimento. quapropter non est homogeneum primò, cum primum deperditum fuerit membrum spermaticū, quod non potest restaurari, sicut prius, propter carentiā materiæ spermaticæ à principio generationis contractæ. uerum in infantibus propter propinquitatem temporis principijs generationis, si parua sit facta deperditio, & superficialis potest restaurari per uiam primæ intectionis omnino primo simili deperdito. ad quod etiam concurrunt, q̃ uirtutes naturales sunt fortiores in infantibus. q̃ in adultis potentes melius assimilare nutrimentum secundum naturam eius, cui apponitur.

Quæ cum in oculis puerorum fit; leuior est ad curandum, quàm cum accidit annosis: cum enim in amiosis fit; ad sanandum fortasse impossibilis existit, nisi subtilissima fuerit.

In hac secūda parte innuit, q̃ quæ generatur in oculis puerorum, est leuior ad curandum, quàm cū accidit annosis: imo forsitan in eis cura est impossibilis, nisi albedo subtilissima fuerit. huius causa patet ex iam dictis. Species albedinis sunt tres, quædam est. f. cicatrix ex ulcere derelicta, quædam est uestigiū ex humore imphiltrato in superficie oculi, quædam est uestigium ex defectu uirtutis assimilatiuæ proueniens; sicut albaras, & morphæa. & cuiuslibet istarum specierū quædam est crassa, profunda, quædam superficialis: quædam magna occupans magnam partem, quædam parua: & quædam noua, quædam antiqua. Cicatricē uero quædam cōcaua, quædam eleuata. Secundæ & tertiæ speciei, quædam alba & est phlegmat. quædam tendēs in uiriditate uel citrinitate, & est cholericæ, quædam in rubedine, & est sanguinea, quædam in fusco, & est melancholica, sed ut plurimum sunt albæ, etiam si tendant in alium colorem. Ex his patet causæ ipsarum.

Signa uero ipsarum absolute sumuntur ex uisu. Signa uero cicatricis sunt. Primum, quia aliquando est concaua, ceteræ autē albedines non sunt concauæ. Secundū signū cicatricis est ulcus præcedens, & omnia signa ulceris & pustularum ruptarum dicta superius. Tertium signum, quia frequēter nō bene tolerat lumen. Quartum signum est paruum iuuamentum à medicinis. Secundæ uero speciei sunt signa opposita, licet aliæ ægritudines præcesserint, & non ulcera. Signa uero tertiæ speciei sunt, quia illa uestigia facta sunt signa manifesta sine manifesta ægritudine præcedente, uel fuerunt à generatione contracta, & hoc secundum plurimum.

Prognostica. primū, cicatrix & pueri & in mediocris qñq; remouet, in annosis uerò nō nisi ualde superficialis & minima.

Secundum

Secundum, cum secunda species albedinis etiam crassa in infantibus facile remouetur, sed in annosis si crassa fuerit, & antiqua, non remouetur, nisi forte cum operatione manuali perficienda secundum quod dicitur in sequentibus: in medijs autem iudicia media sunt habenda. Tertia species non est curabilis, licet forte paliabilis.

Hæc autem passio ex his medicaminibus curanda est, postquam æger balneum egressus fuerit, aut faciem super uaporem aque cal. quousque rubea sit tenuerit. Si tamen ex hoc medicamine in uenis rubedo oculi, & dolor peruenerint per aliquot dies ab eo quiescendum, donec oculus quiescat, & post ad idem redeundum. Medicamen ualde utile ad albedinem remouendam & uisum clarificandum, ego quoque non uidi quod eo melius aut æquale esset ad albedinem remouendam. Rec. massaciæ, spuma maris, stercoris magni lacerti, baurach. sacchari bigeri omnium, ana. partes æquales, deinde sumantur acori, chelidonie, feniculi omnium, ana. partes. 10. coquantur in lib. 1. aquæ donec ad quartam redeat & coletur, ex hac aqua imbibantur species, quas diximus, ita quod consiciantur ex ea, & siccentur in umbra, deinde iterum terantur & conspergantur ut prius & siccentur. Quod postquam quater factum fuerit, siccentur & terantur & in oculis mittantur. Hoc medicamen nulli, ut prædiximus, compar existit in remotione albedinis: remouet enim hoc medicamen crassam albedinem, etiam ex oculis animalium.

Hæc pars diuiditur in partes duas, nam in prima parte ponit primam intentionem, quæ est albedinis mollificatio. In secunda parte ibi. Si tamen ex hoc medicamine. Ponit secundam intentionem, quæ est ipsius absterfusio. De prima parte dicit, quod æger primo debet in balneum poni, aut teneat faciem super uaporem calidum aque calide usquequo rubea sit, ad hoc, ut albedo mollificetur. De secunda parte dicit, quod si ex hoc medicamine, de quo dicitur, posito in oculo immediate post albedinis mollificationem rubedo fiat in oculo, & dolor proueniat per aliquot dies ab hoc medicamine quiescendum est, donec oculus ad naturalem redeat dispositionem. Deinde secundo, idem medicamen est imponendum, præcedente prius mollificatione, ut dictum est, & sic est procedendum, nunc ponendo medicamen, nunc interponendo mollificationem, donec albedo consumpta sit. Deinde describit istud medicamen, quod summis laudibus extollit, quod medicamen Rafis accipit à Gal. in lib. secretor. 12. massa cumiæ, & Simon 1a. credit quod sit uitrum non perfecte decoctum. Alii credunt quod sit compositio quædam, qua uasa terrea uitreantur, facta ex uitro, silice & plumbo, licet aliqui solum component ipsam ex plumbo se habente in proportionem dupla sesquialtera ad silicem, id est lapidem à quo excutitur ignis, uitrum enim secundum Auic. ca. proprio, ualet ad delendas albugines, & dicit ibi quod est inter lapides, sicut stultus inter homines: nam sicut stultus placidus est obsequens alijs hominibus, sic uitrum est obsequens recipiens quidem colorē cuiuscunque quod secum commiscetur, spuma maris cal. & sic. in tertio, absterfus uel uolens in cataracta & baurach, loco cuius accipimus sal nitrum, sacchari albisimi, ana. partes æquales, & deinde sumatur acori cal. & sic. in secundo, chelidonie cal. & sic. in tertio, feniculi cal. & sic. in secundo, añ. 3. 10. & istæ tres sunt medicinae oculares absterfusæ. Coquantur in 1. lib. aquæ & coletur, in qua aqua imbibantur species prædictæ, deinde siccentur in umbra, & iterum terantur & conspergantur eadem aqua, ut prius & exsiccentur, quod postquam factum fuerit quater siccentur & terantur subtilissime, & in oculum mittantur: delet enim non solum albuginem hominis, sed albug. crassam brutorum.

Cura duplex exigit regimen. Vnum generale habendum circa causam antecedentem si adfit, sicut in albugine pendente ab humore: si uero non adfit, caueatur tamen fluxus humorum in paratis ad hoc, quod regimen perficitur digestionem,

euacuationem, diuersionem secundum humorum exigentiam, & aliquando fluxus interceptionem cum superius dictis in cura ophthalmiæ. Secundum regimen, respiciens ipsam agritudinem iam factam, duabus perficitur intentionibus.

Prima mollificat ipsam albuginem, & oculi substantiā teneram facit cum balneo in aqua dulci toti corpori, aut cum inclinatione faciei super aquam decoctionis raparum, aut paleæ hordei, aut paleæ auenæ, aut fœnic. uerberæ, rutæ, chelidonie, & huiusmodi. Secunda intentio est post suffumigium immediate apponere aliquod absterfusum & subtiliatum, incipiendo à leuioribus, sicut sacch. al. candid. aqua distillationis mellis, aut puluis factus ex candid. farcocol. & spuma mar. aut cum osse sepiæ, aut cum urina pueri coagulata in furno in uase æneo aut cum stercore hirundinis, & est satis forte. Auic. commendat succum centaureæ min. cū succo pap. ruffi, mixto cum pauco melle, & succu lingule passæris est proprius, & est herba cum qua hirundines recuperant uisum. Vel R. stercoris hirundinum subtilissime pulueriz. 5. 1. mellis quod sufficit ad incorporandum, misceantur, & distemperentur cum aqua acori uel euphrasie, & fiat collyrium. Secretum Gerardi. Recipe aquam rosifera. quæ fit hoc modo. habeatur uitrum mundum & impleatur floribus rosifera. & fortiter obturetur & ponatur sub terra in dieb. magni ætus per. 40. dies, & aqua quæ inuenietur, in oculo imponatur. Vltimum est medicamen Raf. supra scriptum. Sed attēde tria. Primum quod incipias à leuioribus, deinde gradatim procedas ad fortiora. Secundum documentum est, quando experiris medicinas fortes, accipias stilum in cuius extremitate sit cottum, & illud infunde in aliquo liquore, deinde fac puluerem adherere, & superpone cum stilo solum loco ubi est albugo, & remoueas & reiteres semel quod tibi uidebitur expediens. Tertium si rubedo aut dolor in oculo acciderit ex huiusmodi acutorem impositione, desine per aliquot dies donec oculus ad primam redeat sanitatem. Et si aliquo auxilio opus sit, impone lac, deinde redi ad medicamen. Et propterea cum uitur itis fortis non esset malum apponere fronti & temporibus aliquod defensuum. Si uero cum medicinis auferri non potest, auferatur operatione manuali, ut infra dicitur, aut si cura uera fieri non potest cum aliquo colore palietur albugo. Regimen autem sex rerum non naturalium iam patere potest ex sapius dictis.

De scabie & pruritu oculorum. Cap. 21.

Primo agendum est de scabie. Secundo de sebel oculorum. Scabies & pruritus differunt, quia pruritus est tristis sensatio, scilicet cum punctione & acuitate in superficie intrinseca palpebræ. Scabies uero est egritudo in superficie cū asperitate & rubedine, aut pustulis in superficie intrinseca palpebræ cum pruritu. Vnde hoc modo pruritus est accidens, quia actio læsa uirtutis sensitiuæ, sed scabies proprie est egritudo in superficie intrinseca palpebræ connotando pruritus. Species scabiei semel Auic. sunt triplices. Prima est asperitas cum rubedine, quam semel plurimum præcedit pruritus, & sit asperitas propter exiccationem superficie palpebræ, & rubedo ex accensione sanguinis & aliorum humorum. Secunda species est granulosa cum rubedine & asperitate assemblata granis intrinsecis sicut immaturæ, quæ tendunt in rubedine. Illæ autem pustulæ siue grana sunt facta ex materijs leuioribus cum caliditate & acuitate, & est cum aliquali ulceratione. Tertia species est in qua sunt grana dura cū uehementia scissionis & pauca rubedine, sit aut scissio propter nimiam siccitatem discontinuant, sed durities fit propter crassum terream derelictum partibus subtilioribus euaporantibus, & propterea non est cū tanta rubedine, sicut prima & secunda species, cū per aduersionem tendat in fulcedinē. Sunt itaq; grana eius, sicut grana siccæ. Verū Ioannes Serapion. distinguit in quatuor species. Prima nominatur diffusis, & eius intentio est pruritus. Secunda curechatis, alijs tracheris, & eius intentio est asperitas. Tertia succulsis, & eius intentio est sic. Quarta tulus, & eius intentio est exiccatio durities aut soliditas, & si bene consideres non discrepat ab Auic. Cause cōiunctæ sunt quatuor, sanguis, adustus, cholera adusta, phlegma salsum, aut per aduersionem transiens in melancholiā, & melancholia adusta. A phlegmate uero & melancholia puris, non generatur scabies aut pruritus, cum oporteat eorū materiā.

Io. Aculani,

G subtilitate

subtilitate quadam participare. Verum per putrefactionem uaporib. acutis eleuatis ad cutim posset fieri pruritus, secundum plurimum tamen generantur scabies & pruritus à materia mixta. 7. quart. sicut materia sanguinea cui admiscetur cholera adulta, uel sub propria forma, uel per nimiam adustionem in melancholiam uersa. Aliquando sanguini permiscetur phlegma salsum, & baurachium & nominatur scabies humida respectu prioris, à qua fluit humiditas subtilior, & paucior. Et si hoc phlegma salsum esset conuersum in melancholiam, uel melanch. alterius generis cum sanguine misceretur, scabies esset siccor, paucior emittens humiditatem. Dicitur autem hoc phlegma nitrosum uel baurachium ad similitudinem salis nitri & baurach quæ inter genera salis sunt acta, sicut illud inter phlegmata. Causæ antecedentes sunt idem humores, cum nondum collecti sunt in loco. Et quæcunque causæ corporeæ sunt horum productiuæ.

Causæ uero primitiuæ sunt omnia exacuentia humores, & in huiusmodi conuertibilia sicut salsa, acuta, amara, uehementer dulcia, oleaginea, unctiuosa, bibita & comesta. Scabies & pruritus quandoque fiunt incipiendo, quandoque permutando, maxime ex ophthalmia, pustulis & ulceribus, licet ipsorum præsentia augeat & conseruet ophthalmiam & ulcera, suntq; ipsorum productiuæ. Pro declaratione istius materie tria sunt discutienda. Primum, ubi contineatur materia pruritus & scabiei. Secundum est, utrum eadem sit materia pruritus & scabiei. Et si differunt quæ sit crassior & acutior. Tertium utrum pruritus semper præcedat scabiem. Quantum ad primum, præmittendum quod materia pruritus est duplex, sicut scabiei, antecedens & coniuncta. Præmittendū secundo, quod pruritus quandoque est per essentiam in membro, quandoque per coitatem sine per colligantiam, sicut est de cæteris speciebus dolorum & delitiei. Quibus præmissis dicendum. Prima conclusio. Causa coniuncta scabiei & pruritus semper plurimum est inter duas cutes, scilicet hymen & uerā cutem. Patet de pruritu, quia plurimum sedatur scalpore cuius actio non profundatur. Patet hoc idem de scabie cum pustula ipsius in cute contineantur. Secundo, quia cura utriusque perficitur per abstergentia & exiccantia in cute posita. Secunda conclusio, causa coniuncta pruritus non necessario est in cute. Patet in habentibus pruritus, in quibus pustula non apparent, huiusmodi enim materia sub cute continetur pungens & stimulans superficiem intrinsecam, licet tamen pruritus posset esse à solo uapore ad cutem perueniente & hic facillime paucio scalpore sedatur. Tertia conclusio, licet sit semper pruritus in scabie non tamen necessario materia faciens pustulas scabiei est pruritiua. Patet conclusio, cum uideamus aliquando scabiosos non prurire semper partem pustulosa, sed semper superficiem cutis intrinsecam, quod prouenit, aut ex uapore ad cutem delato, aut ex materia pruritiua. Quarta conclusio, in pruritu tam per cõmunitatem absolutam, quam non absolutam, materia pruritus in parte pruriente non continetur, quæ conclusio patet satis ex notitia terminorum. Est autem pruritus per cõmunitatem absolutam cum parti prurienti nihil corporeum communicatur. Contra per cõmunitatem non absolutam, quando aliquid corporeum parti prurienti communicatur sicut uapor. Quinta conclusio, causa antecedens pruritus semper plurimum est in uenis, & aliquando in uis mediis inter uenas & cutem, &c. Pro solutione secundi dubii, nota primo, quod aliquis pruritus est intensus, aliquis est remissus, aliquis mediocris. Secundo nota, quod quanto pruritus est intensior, tanto materia est calidior & subtilior aliorum paritate supposita ex parte sensibilitatis & cæterorum. Et e contrario quando pruritus est remissior, materia est minus subtilis & acuta, patet, quanto materia pruritiua est magis stimulatua, & impressiua, tanto est calidior & subtilior. Et contra quanto minus, tanto est grossior uel frigidior & atquosior, iuxta aphorismum nonum quintæ particule. Latæ pustula non ualde pruriginosa, &c.

Contra, quia supposita paritate ex parte caliditatis, quanto materia est crassior, est magis impressiua, & per consequens magis pruritiua. Patet, quia quanto est crassior, habet plus de multitudine formæ, quam potentia rei, insequitur igitur, & confirmatur experientia, nam quanto cholera est crassior, tanto profundat magis actionem suam, sicut cholera z-

naria, unde. 13. de ingenio sanitatis, si cholera fuerit crassa, & calidissima cutem excoriabit usque ad sui interiora, sicut accidit in formica miliari in comparatione ad herisipillam. Ad hoc dicendum inhærendo sententiæ priori, quod quanto humor est crassior aliorum paritate supposita, tanto est impressiuior & actiuior. Sed dico secundo, quod si cum humore crasso fuerit iuncta multa caliditas, faciet aliud genus doloris de terioris, quam sit dolor pruritus. Et si instetur, ponamus quod quanto crassities plus imprimit, quod subtilitas, tanto caliditas in humore crasso remittatur, & sequitur quod humor subtilis & crassius minus calidus æque intensum facient pruritus. Credo concedendum esse illud ad quod deducitur. Cum hoc tamen concedendum est intensissimum gradum pruritus prouenire ab humore subtili & non crasso, licet diuturnior & non facile per scalporem sedabilis, proueniat ab humore crasso magis quam subtili. Tercio nota quod quidam pruritus scalpore sedatur, scilicet qui pendet à materia subtili & pauca. Calefit enim membrum scalpando, pori dilatantur, materia subtiliatur, unde facile exhalat. E contrario, materia existente multa & crassa, non tota resoluitur. Et si forte tota coniuncta etiam soluitur, forte noua materia antecedens transit in coniunctam. Prima conclusio. Materia pruritus intensi cito per scalporem sedabilis est subtilior, materia scabiei remissi pruritus, & non facile per scalporem sedabilis. Secunda conclusio. Materia scabiei intensi pruritus facile sedabilis est subtilior, materia pruritus remissi non facile sedabilis. Tertia conclusio. Ex paucitate pruritus tam quo ad intensiorem, quam quo ad durationem, materia pruritus arguitur, aliorum paritate supposita. Quarta conclusio. Non est necessarium materiam scabiei, & pruritus esse distinctarum specierum cum ab omnibus speciebus humoris adusti, de quibus supra posuit utraque pendere. Quinta conclusio. Pruritus & scabies consequens ipsum, secundum plurimum ab eodem pendent humore, qui cum primo cuti applicatur facit pruritus, postea magis egrediens facit scabiem. Sexta conclusio, secundum plurimum materia pruritus, quem non consequitur scabies, est subtilior. Materia scabiei patet, quia secundum plurimum facile scalpore sedatur. Oppositum quandoque contingit, cum propter materiam crassitatem nequeat exterius expelli. Causa enim pruritus sine scabie sunt aut crassities materiam aut nimia subtilitas: est enim uapor aut sicut uapor, aut densitas cutis, aut imbecillitas uirtutis sicut in senibus. Pro solutione tertii dubii pone duas conclusiones. Prima secundum plurimum pruritus præcedit scabiem, patet, quia materia scabiei secundum plurimum est pruriginosa, ergo in prima applicatione ad cutem facit pruritus, postea egrediens facit scabiem, cum quo tamen stat quod multi sunt pruritus ad quos non sequitur scabies. Secunda conclusio, impossibile est scabiem præcedere pruritus, patet, cum scabies in quiditate sua includat pruritus. Corollarium, scabies & pruritus quandoque sunt simul tempore, patet, de pustulis quæ non fiunt à materia pruriginosa, quæ postea per adustionem baurachia facta & pruriginosa simul incipit facere scabiem & pruritus, id est, illæ pustulae sunt scabies cum ante non essent scabies.

Signa uero scabiei & pruritus absolute sunt ex dictis manifesta, scilicet, ex rubore cum pruritu & asperitate, & sæpe infirmus scalpit palpebram. Signa uero specierum, de quibus supra, sunt ex dictis manifesta. In quo autem differat scabies à lepra est alibi uidendum, inter quas, & si multæ sint differentia, hæc una est potissima, quia cum lepra semper associatur defectus tertii actus uirtutis nutritiæ, scilicet assimilationis, quod non est in scabie. Signa uero causarum sunt, quia si est à sanguine, est notabilis rubor purpureus sine pustulis, aut satis diminutis, intensus pruritus, & facile sedabilis, & si aliquid emanat illud est satis subtile. Et si est à cholera, pruritus acutior & facile sedabilis, & rubedo tendit in citrinum, & pustula parua profunda, & si quid egreditur est subtile citrinum. Signa uero baurachiarum comprehenduntur ex rubedine tendente in albedinem, & ex pustulis laticioribus id quod egreditur est plurius quantitatis tendens in albedinem: & pruritus est remissus non facile sedabilis. Melancholia uero subtilis adusta comprehenditur ex rubore tendente in fuscedinem. Et ex asperitate magna cum pustulis profundis & aliquando

aliquando crustis paruis, & quod egreditur tendit in fuscum. Complexio quoque, habitudo & tempus, ætas, ars, regimē, regimen præcedens, sunt quoque coadiuuantes in cognoscendo huiusmodi dispositionum causas.

Prognostica. Pruritus & scabies primæ speciei est cū medicinis curabilibus, quæ uero est tertiz speciei, nō est curabilis nisi cum operatione manuali. Media uero rarissime curabilis nisi cum operatione manuali, &c.

De sebel. Cap. 22.

Sebel secundum Auic. est panniculus accidens oculo ex inflatione uenarum apparentium in superficie coniunctiæ & corneæ & textitur quidē in eo quod est inter ea sicut fumus. Verum sūm Rāsim non est, pāniculus, sed similitudo panniculi, cuius sententia est uerior, accipiendo panniculum proprie, quia non contextitur ex nervis & ligamentis, sicut textitur panniculus. prima primi. doctrina quinta, cap. 1. Sed quia extenditur supra coniunctiū & corneam ad modum panniculi, ideo dicitur panniculus. Repletio autem uenarum est causa sebel, & modus est, quia uenæ capillares multæ dispersæ per coniunctiū, sed pauca & subtilissimæ per corneam transeunt, intumescent, & sunt apparentes, & propter magnam propinquitatem apparent in forma panniculi. Secundo imaginamur, sicut placuit Auic. q̄ ab illis refuset sanguis subtilis, qui coagulatur in forma telæ & panniculi. Vel tertio imaginemur, sicut magis placuit Rāsi, q̄ caro coniunctiæ & corneæ tumeat aliquantulum inter illas uenas propinquissimas, unde faciunt nobis phantasmā, q̄ hoc totum apparet sicut unus panniculus, sed in uero ibi sunt naturales uenæ, ut in secunda parte cāticorum com. 87. & Zoar, lib. 8. cap. de sebel. & ex isto potest inferri differentia inter sebel & ungulam, quia ipsa est quoddam nerueum, uel sicut nerueum sine repletionē uenarum, oriens à lachrymali domestico, nec cooperit nisi in forma sagittæ, sed sebel cooperit totum oculum uel quasi totum, & habet alias circumstantias, de quibus supra. Ex quibus inferitur, q̄ sebel est ægritudo in superficie situ & uia. Et præter hæc secundum Auic. est morbus in numero. Sebel est duplex, quoddam nouum, quoddam antiquum. Item quoddam grossum, quoddam tenue. Sebel quandoque causatur per uitam defluxus materiis fluentibus ad uenas coniunctiæ & corneæ, quandoque per panniculum extrinsecum, scilicet almocharin, quandoq; per panniculos intrinsecos, scilicet, duram matrem uel piam matrem, siue uenas & arterias earum, quadoque generatur per uitam paulatim factæ congestiōis in uenis ipsius oculi ex nutrimento non debite conuerso & retento & superfluitatibus non resolutis. Causæ uero coniunctæ, sunt sanguis solus, aut alii humores cum sanguine mixti, sed alii humores sine sanguine ipsum causare non possunt, cholera enim pura ipsum causare non potest, cum propter sui subtilitatem impediat coagulationem & panniculationem, purum etiā phlegma & melancholia non faciunt sebel cum sint alba & fusca, & sebel rub. sed isti mixti cum sanguine poterunt ipsum causare, & ita erit sebel sanguineum, sanguineum cholericum, & sanguineum phlegmaticum, & sanguineum melancholicum, &c.

Signa sebel aspicienti satis manifesta sunt, cum uideat panniculum rub. tegentem coniunctiū & corneam, pro magna parte ex uenis iam dictis tumentibus, contextam.

Signa etiam causarum manifesta sunt, est enim sanguineū notabiliter rubeum, purpureum, sanguineum cholericum rub. tendens ad citrinitatem, sanguineum phlegmaticū rub. tendens in alb. sanguineum melancholicum rub. tendens in fuscum. Sunt & alia signa superius in scabie dicta, quibus materia peccans cognoscitur. Si uero descensus materiæ ad oculum per panniculum extrinsecum est exuberatio uenarū exteriorum, rubedo faciei, pullatio uehemens in fronte aut temporibus si descēdat per arterias, aliud signum fluxus materiæ per extrinsecā ponit Iesus Ali capite de sebel, q̄ te trahente palpebram inferiorem uersus te sebel eleuatur, ac si erigeretur uersus te propter maiorem colligantiam palpebræ cum exterioribus oculi, quod signum est absque calumnia. Signa uero descensus materiæ per panniculos intrinsecos sunt, quia nihil istorum, quæ dicta sunt, apparent. Signa uero q̄ materia eius paulatim congesta sit, est quia factum est

paulatim in longitudine dierum. sebel præterea consequuntur quædam accidentia, scilicet pruritus propter uapores & materias subtiles adultas retentas, lachrymæ ex oculi debilitate, aut pruritu, aut ex indebito concursu siue contractu palpebræ super oculum, nocumentum à lumine solis uel can delæ propter disgregationem materiæ attractionem, & eius dilatationem, debilitas uisus, aut ex debilitate oculi, aut quia impedit delationem specierum pupilla contracta, æstnatio oculi, tum propter dolorem, tum propter multi sanguinis & spiritui præsentiam, minoratio oculi & pupillæ retento nutrimento in uenis, & non delato ad oculum uel oculi substantiā.

Prognostica. primum. sebel est de ægritudinibus, quæ eradicantur. Secundum. Sebel est morbus contagiosus, ita ut permuteur de uno oculo ad alium, aut ad oculum aspicientis ipsum uaporibus exeuntibus inficientibus oculum aspicientis simili infectione, aut propter imaginationem, & præcipue si aspiciens sit debilius oculorum. Tertium. Sebel nouum subtile curabile est medicinis, antiquum uero & crassum non nisi operatione manuali.

Quam palpebra inueratur, & interius apparet rubea, & aspera, & scabies adest: & cum super alba oculorum & super nigredinem uidetur similitudo panniculi ex uenis rubeis & crassis texti, adest passio, quæ uocatur sebel. Hæc uero dua passiones sunt graues & chronica & uix curabiles.

Primo agit de his dispositionibus theoricæ. Secundo prædicit. secunda ibi. Patiēs tū dum sanus. Quod dicit in prima parte, satis est ex dictis manifestū. Pro cura harū dispositionum ante oīa sciendum, q̄ si scabies & ophthalmia aut ulceræ coniungantur, prius inchoandum est à curatione ophthalmiæ & ulcerum, & uniuersaliter omnium ægritudinum, quæ sunt maiores, postea ueniendū ad curationē scabiei & ægritudinum minorum. Et hoc ubi harum ægritudinū curatio perfici possit, ubi uero maiores curare non possent, non curatis minoribus, à curatione minorum inchoandū est, maioribus non neglectis iuxta canonem Auic. 4. primi, capite ultimo.

Triplex est igitur regimen harum dispositionum curationum. Primum uniuersale respiciens causam antecedentem. Secundum particulare siue locale, respiciens causam coniunctam. Tertium est commune utrique. Primum exigit quinque intentiones. Prima minorat. Secunda digerit. Tertia eradicat. Quarta diuertit. Quinta fluxum intercipit.

Prima aut intentio, s. minoratio sū plurimū in scabie & sebel, sed maxime in sebel cōplenda est per phlebotomiā, aut cephali. si materia fuerit pauca, aut basilica si hepar cōiceat mittendo materiā. Et si in causā fuerit retentio menstruorū aut hæmorrhoidarū, præmittatur phlebotomia saphenæ eius dē lateris, & postea duobus diebus intermediis, aut tribus, aut pluribus phlebotometur cephala eius dē lateris. Hauriatur autem quantitas sang. sū tenorem uirtutis & cæteras circūstantias indicantes de phlebotomia. Et penes Rāsim facta phlebotomia uniuersali, aliqui phlebotomamus uenā frōtis ad eradicandā materiā coniunctā, uel de proximo transfurā in coniunctā. Si uero non appareat dominū sang. imo aliorū humorū, quod frequēter accidit in scabie, minoretur materia peccans, aut cum pilulis de fumoterræ, quibus admisceatur parū pil. aur. aut aggrega. ut uirtus ducatur ad caput, aut cū infusione, aut decoctione polip. 3. 1. in sero caprino, cui etiā potioni addatur parū suc. rol. aut aqua lupulorū, ut uirtus ducatur ad caput. Electarium q̄q; hamech, est in hoc casu præstantissimū si. 3. 3. eius misceantur sero caprino, aut aqua lupulorū facta minoratione, à qua inchoandū est, materia existente multa. Si uero pauca, à digestione incipiendū est, & procedatur ad digeretiā sicut est syr. de fumoterræ, cū aqua lupulorum, succus quoq; fumiterræ solus depuratus p residentiam aut per mixtus cum sero caprino est præstantissimus in hac dispositione & in scabie totius, mundificās sanguis. quod maxime est attendendum. Et ex mundificantibus, est, casiasit, fumuster. capil. uen. lupuli, & epithymus confert in hoc, & in euacuando humorem melancholicum. quapropter cum melancholia est in causa, semper misceatur, & in digestiuis & euacuatiuis: habet enim antonomasiam super Io. Aculani. G 2 omnibus

omnibus euacuantibus melancholiam, licet debilitet soluat, quapropter syr. de epithymo est proprius in digerendo humorem melancholicum: si uero aliquando phlegma grossum esset in causa, sicut aliquando in sebel, misceatur in digestiuis oxymel simplex aut compositum, & petet caput per acetum. Digestiua nanque in his dispositionibus, imo in omnibus debent respicere determinatam materiam & membrum tam mitens, quod suscipiens per tertiam & quartam uirtutem, & per primam & secundam respicere discretam membrorum & materiam, necnon modum substantie ipsius humoris, & ut uix conseruentur aperta aut stricta secundum exigentiam, & respiciant reliquas species compositionis & unitatis: sic enim operatio sua foelicitatur, & in scabie, & plerisque aliis dispositionibus attendendum est mundificationi sanguinis, sicut cum illis, de quibus dictum est. Quid autem sit mundificare sanguinem, & clarificare, & per quas uirtutes hoc complectur, & quomodo fiat, & quę sunt medicinę hoc facientes, & similiter quibus modis spiritus illustrantur, pro parte dictum est in capite de cura melancholice, sed magis exquisitè dicitur in capite de cura debilitatis uisus. Digesta autem materia eradicetur, aut cum phlebotomia secundum exigentiam, & in hoc ualet phlebotomia uenę frontis, de qua Rasis in litera ait cum solutiuis, de quibus sermo præcessit, quę etiam in his dispositionibus sunt iteranda, & uniuersaliter in omnibus dispositionibus, in quibus materia difficulter eradicatur, aut propter dispositionem membri aut materie. Et non obliuiscaris, quod aloes est proprium solutiuum in scabie, septima. 4. capite proprio, ita ut solus frequenter exculet, & sic absolute sunt tres primę intentiones, scilicet minoratio, digestio, & eradicatio. Quarta intentio, scilicet, diuersio possit perfici omnibus generibus diuersionum cum euacuatione & sine, sicut dictum fuit in ophthalmia, & prouocentur menstrua & sanguis hæmorrhoidalis, si ex eorum retentione acciderint. Ex propriis autem diuersionibus sunt phlebotomie uenarum nocturnę, uenarum post aures, temporum, & frontis, præcipue illarum quę uidentur magis tumentes, aut in his aut in aliquibus ipsarum sanguisugę apponantur, phlebotomia etiam uenarum quę sunt in angulis lachrymalium domesticorum optime confert, magis eradicando materiam, quam diuertendo, sed non uidentur nisi post fortem gulę constrictionem. Quinta uero intentio, perficitur cum appositione reperculsiuorum fronti & temporibus, & secundo cum sectione uenarum & arteriarum de ferentium humorem ad oculos, sicut dictum fuit in ophthalmia, sed hæc non fiant nisi materia fluente per uenas & arterias extrinsecas. Secundo regimen locale quod perficitur cum medicinis in pruritu & scabie leui & sebel incipientes, quandoque cum operatione manuali in scabie secundę speciei, & tercię, & sebel antiquę. Operatio uero cum medicinis duas exigit intentiones, sicut in albedine. Prima perficitur da est cum mollificantibus, sicut cum balneo aquę dulcis, & cum fomentatione decoctionis raparum, & aliorum, sicut dictum fuit in albedine. Secunda intentio perficitur cum abstergentibus & exiccantibus, & interdum aliquantulum corrodentibus immediate applicandis post fomentationem prædictam in utraq; dispositione, & inchoandum est à leuioribus, gradatim procedendo ad fortiora. Ex propriis autem leuibus est pulvis factus ex sacch. candid. thuria, sarcocol. spuma maris ana. fortius autem hoc est. R. aloes partem. 1. salis ammon. partem. s. confice cum melle. aliud satis domesticum. R. carabe partem. 1. corticum granatorum partes. 2. conficiantur cum melle & applicentur. Et fortius isto est medicamentum Auic. accipiat cortex oui, & stet in aceto cal. 10. diebus uel dimittatur cum aceto in sole, & postea exiccetur in umbra & teratur subtilissime, & applicetur: est enim proprium in sebel, pulvis etiam lapidis hematitidis est proprius in utraque dispositione, & maxime in sebel. Fortius autem isto sief rub. descriptum à Rasi. R. hematitidis, colcothar usti, id est, uirrioli Romani, & est cal. in quarto, & lapis hematitidis non ablutus est cal. in primo siccus in secundo, sed ablutus frig. & minus siccus, an. 3. 3. aris usti. 3. 2. myrrhę, croci. ana. 3. 1. piper. lon. cal. & sic in quarto conspergantur uino ueteri post optimam puluerizationem, & fiant ex eis sief, & si timeres huiusmodi approximationem, permisce cum tertia parte, aut s. sief al. & tunc paulatim auge secundum necessitatem, & secun-

dum quod oculus tolerat, & lapis hematitidis solus confert, aut cum paucis mellis. Aliud Mesue satis domesticum. R. ceruse, uiridis aris, ana. tere contritione ultima, & confice contere do cum uino albo potenti, & succo rutę, & ponantur in uase æneo lymphoto per diem & noctem, postea coletur, & colatura referuetur in uase uitreo, & distilletur in oculo mane & sero. Sief conferens ulceribus & scabie oculorum cum caliditate. R. cadmię, croci, scorie aris, gummi arab. aris usti. ana. 3. 3. myrrhę, lapidis hematitidis, pic. ana. 3. 1. opii, 10. ana. 3. 1. piperis al. gran. 4. confice cum uino, & utere cum albugine oui. Sed in horum applicatione obseruentur hi canones. Primus, ut à leuioribus inchoetur gradatim ad fortiora procedendo. Secundus, ut sæpe in oculo aspiciamus si nimis aut diminue imprimant. Et si nimis imprefferint, & dolorē & ruborem præter modum fecerint, dimittemus ipsorum impositionem per aliquot dies, donec oculus sit restitutus. Et postea faciemus ut prius. Si autem mediocriter sequamur eo modo, si diminue, gradatim augebimus, donec sufficienter imprimant. Operatio uero manualis in scabie perficitur. Iaceat æger supinus super aliquam tabulam capite aliquantulum eleuato & inueretur palpebra, & sub palpebra inuerfa ponatur stilus aliquantulum latitudinis, cui palpebra cum fricatur adhæreat, deinde medicus inuoluat digitum suum indicem cum folio parietarię aut ficus, & tenendo palpebram, & stilum, cum alia manu fricet superficiem intrinsecam palpebre, donec erumpantur granula, quę sunt in eius superficie, & bene sanguinare permittatur, & post lauet palpebram, & oculum cum aqua ros. tepida. Aliquādo hæc operatio perficitur cum una lima subtilissime dentata, fricando superficiem palpebrę, ut prius & citius expeditur. Aliquando uero fricant cum huiusmodi lima, prius ponendo super superficiem palpebrę aliquem puluerem, sicut spuma maris. Credo quod secunda operatio sit ceteris expeditior. Postea mundificatio oculi, scilicet, à sanguine cum aqua ros. tepida aut aceto, aut uino forti, aut cum his mixtis simul imponunt medicinam aliquam abstergentem ex superius descriptis ad consumendum residuum illius quod remansit. Deinde claudat oculum desuper, ponendo faldellam ex cotto circumdata petia linea ueteri, & infusam in lacte & aqua ros. aut in lacte & oleo ros. si uolunt magis mitigare dolorem, & aliquando secum coniungunt uitellum oui, sed Mesue emplastrat tempore frigido cum amygdalis, & cymino, & mica panis infusa in uino cocto cum paucis croco. Sed tempore calido cum uitellis ouorum, oleo ros. & uiol. Sebel autem cum operatione manuali curatur sic. Extendant ægrum super tabulam, aut faciant ipsum sedere super una bancha equitando bancham, & ponant ministrum post ipsum, qui eleuet palpebram superiorem, & trahat inferius palpebram inferiorem ita ut oculus stet apertus, deinde medicus accipiat cum uncino, id est, paruo unco argenteo uenulam unam, & eleuet, & postea cum acu pene tret ubi eleuata est, & annectat eam cum filo de serico subtili, aut si non uult penetrare cum acu, penetret cum seta porcina, in cuius extremitate est filum de serico, & sic annectit ipsum, deinde hoc idem facient in alia parte eiusdem uenę uel alterius, & sic faciunt in uenis, id est, magnis apparentibus tam in parte syluestri, quam in parte domestica omnibus filo annectendo, ut supra. Deinde omnia huiusmodi fila eleuata totaliter extrahunt, & si uenę multam quantitatem sanguis egredi, & hanc operationem faciant in coniunctiua & non in cornea; nam per exitum sanguinis ab huiusmodi delitescent etiam uenę corneę. Deinde post hoc, oculo scilicet, mundificato à sanguine, ut supra, imponunt medicinam abstergentem, sed Mesue prius imponit aquam infusionis cymini, & post illam, puluerem citrinum & ligent oculum exterius applicando, quę dicta sunt superius in scabie. Sed bonum est ut post has operationes fronti & temporibus, applicentur defensiua, ne materia propter dolorem attrahatur ad oculum, deinde ponatur in domo obscura & quiescat, & dormiat capite eleuato, & non super latere oculi læsi, & iniungatur ei diata tenuis frigida sine carnibus, ouis & uino, neque masticent aliquid, neque loquantur nisi uoce submissa, & quanto minus est possibile moueantur, & fiant istę operationes tempore temperato, scilicet, uere, aut autumnō.

Tertium

Tertium regimen utriusque commune duas exigit intentiones, scilicet accidentium correctionem, & regimen sex rerum non naturalium. Corrigatur itaque dolor fomentando oculū cū lacte, aqua rosae, aut oleo rosae. Et sicut Aui. vitellus oui sanat dolorem sequentem operationem sebel cum incisione si oculo superponatur. & melius est, ut sit tepidus inter duas petias inuolutus, sed tāgens oculum sit subtilissima. Et si hæc non suffecerint administretur in oculo sies album cum opio. Si uero esset instantia uigiliarum sedetur, ut superius dictū est. cauendum est etiam post operationem manualementem in scabie & sebel ne palpebrae adhaereant oculo & secum inuiscentur. Ad hoc autem confert bis aut ter in die aperire palpebras, & ab oculo separare, sed melius est oculum intra palpebras aliquoties reuoluere. Vltima intentio est, ut locetur in aere satis temperato, non uentoso neque fumoso, boni odoris, aliquoties obscuro. Cibi & potus sint declinantes ad frigidum & humidum, nisi forte in sebel phlegmatica in quo declinet ad siccum, & sint præbentia nutrimentum subtile non crassum aut uiscosum. Caueat a salis acutis, amaris, dulcibus, unctuos, acetosis multum, & ab omnibus multum uaporosis. inter cætera caueat a nucibus, eruca, caulibus, & ab omnibus quæ sunt difficilis digestionis & à melle, caueat à uino uinoso & ebrietate, sit coena leuior prandio, dormiat, multum de nocte, & non incipiat dormire nisi distanter à cibo per duas horas, & capite eleuato, & nullo modo super laetere oculi læsi, nec cum facie deorsum, neque faciat aliquā operationem secundum quā oporteat caput inclinare deorsum. Caueat à coitu & ueteri iram, clamorem, rixam, nec ferat aliquid strictum circa collum, &c.

Patiens dum sanus est, phlebotomia ex brachio & fronte, & uentris solutione uti debet. Et in comestione uitare dactylos & sesamos de melle, & uiet ebrietatem.

Hic ponit curā, & primo per uniuersalia, secundo per particularia, secunda ibi. Et quando non est plenus. De prima dicit, quod patiens dum sanus est, debet uti phlebotomia ex brachio & uena frontis & uentris solutione, de quibus dictum est, & uiet dactylos & sesamos cōditos cum melle, quia præbent nutrimentum crassum & adustum. Sed uidetur includere contradictionem cum dixit: Patiens dum sanus est. Istud ergo intelligendum est de regimine præseruatiuo, patiens, id est aptus pati has dispositiones utatur phlebotomia, & cætera, ne huiusmodi dispositiones incurrat. Aliter patiens has dispositiones, id est, nullam aliam habens egritudinem, nam posset habere aliquam aliam egritudinem, quia prohiberetur huiusmodi operationes sicut phthisim.

Et quando non est plenus sepe ingredi balneum est ei utile. Et frequenter inmittere oculo sies rubeum similiter confert. Sies rub. Rec. hematitis, colcothar combusti amborum. ana. drach. 3. xris uili, drach. 2. myrrhæ, croci, ana. drach. 1. piperis long. drach. s. conspergantur ex uino ueteri & fiat sies. his præterea egritudinibus confert sies uiride, cuius descriptio in cap. de ungula continetur. Quod si passionis istæ uetus sit, scabies frictione indigebit. & sebel collectio ne, non tamen mensura huius libri conuenit, ut de his tractemus.

Primo ponit curationem localem cum medicinis: secundo cum operatione manuali. secunda ibi. Quod si passionis. De prima parte duas elicit intentiones curatiuas.

Prima est mollificare oculum cū balneo & fomentis, sicut dictum fuit. Secunda est abstergere, exicare, & resolueret, & corrodere cum sies rub. & similibus, cuius descriptionem ponit, & declaratum fuit superius, reliqua sunt manifesta, &c. Curat tertio operatione manuali, remittens nos ad aliud cap. ad suam chirurgiam, quia hic solum physice tractat.

De pruritu lachrymalium. Cap. 23.

Endiua tenera sumatur & teratur, & fiant ex ea magdaleones parui, & ex oleo uiol. inungantur, & oculis superponantur, et in hora dormiendi ligentur. Rosatum tamen melius est & citius confert. Et si hoc non suffecerit, lentes absque corticibus, et sumach, & ros. rub.

& granati carnositas sumantur, & contrita ex careno conspergantur, & more emplastri superponantur.

Hic agit de pruritu lachrymalium, de quo superius dictū est quātum est expediens. Lachrymalia enim citius pruriūt, quā cæteræ partes oculi, & proprie lachrymale domesticum, quia plures materiæ ad ipsum defluunt cum uia sint latiores. Diuiditur hoc capitulum in partes duas. Primo ponit curam per localia. in secunda ibi. Quod si non suffecerit. Ponit curam per uniuersalia. De prima parte dicit, quod fiant magdaleones parui, id est, corpora parua, scilicet, ad quantitatem orbitæ ex endiua tenera, id est, non multum antiqua, quæ scilicet, contūdatur cum oleo uiolaceo aut ros. quod est melius, quia magis confortat & repercutit, & oculis superponatur in hora dormiendi, & ligetur: ut conuenienter adhæreat, est enim hoc medicamen frigidum & humidum, repercussiuum, conueniens in principio alterans humorem iam fluxum, & remouens malam complexionem impressam, & prohibet materiam fluentem. Secundum medicamen si hoc nō solum suffecerit, est ut lentes frig. & siccæ absque corticibus, ut nō sit in eis asperitas, & sumach & ros. rub. & granati carnositas intrinseca, omnia frig. & sic. & stiptica conterantur, & post contritionem conspergantur ex careno cal. & hum. mitigatio & resolutio, & est uinum coctum, & reducatur ad formam emplastri, & superponatur ut prius, ligando: est enim medicamen augmenti usque ad medium status.

Quod si non suffecerit ex cephalica prius phlebotomia, patiens, deinde ex uena frontis & ex uenis quæ sunt in lachrymalibus angulis. Venter quoque frequenter soluat, & multoties balneum ingrediatur.

Ponit curam uniuersalem per phlebotomiā uenæ cephalicæ & uenæ frontis & uenarum, quæ sunt in angulis lachrymalibus domesticis. Venter etiam soluat, & balneum ingrediatur, de quibus omnibus sufficienter dictum est superius. Medicamen uero proprium in pruritu & in prima specie scabiei, misceatur thutia præparata subtilissime puluerizata cū uino maluatico, aut optimo uino antiquo albo, & aqua ros. & potest admisceri magis aut minus de uino secundum quod uolumus maiorem & minorem exiccationem & resolutionem, & hoc collyrium quater in die oculo imponatur. Aliud infallibile. R. sanguinis drach. aloes hepatici, sarco collæ nutritæ, ana. 3. i. zing. garioph. croci, camphoræ, ana. 3. s. thutia præparata. 3. 4. terantur pulueres subtilissime, & misceantur in uini maluatici, & aquæ ros. ana. lib. i. bulliant in uase uitreo, ponendo illud uas in una caldaria aque, per cuius bullitionem bulliat dictum collyrium existens in uase uitreo usque ad tertie partis consumptionem, & usui referuetur. Et quandocunque eo utimur conualescimus uas. melius est tamen ut ante horum applicationem fomententur oculi cum decoctione aliqua, de qua supra, & excusabit à balneo, quod Rasis præcepit fieri.

De vngula Cap. 24.

Vngula dicta ad similitudinem unguis, eo quod ipsa tegit secundum plurimum extremitatem oculi uersus lachrymale domesticum, sicut ungues tegunt extremitatem digitorum. Describitur ab Aui. 3. tertii, cap. proprio, quod est additio coniunctiua, & uelaminis continentis oculum incipiens secundum plurimum à lachrymali domestico, & currens semper super coniunctiuam. Et quicquid tegit corneam & inuadit eam, ita quod cooperit foramen. Dicitur primo additio, scilicet, præter naturā, coniunctiua, id est, uelaminis continentis oculi. Coniunctiua enim undecunq; cōtinet oculū præter ubi est cornea. Et dicitur coniunctiua, quia coniungit partes oculi adinuicem, aut quia coniungit oculū cū craneo in orbita, & currit semper super coniunctiuā, licet nō semper regat corneā. Et re uera ungula est membrū, cum sit corpus ex prima mixtione humorū genitū & non cōpositū, ergo simplex. Et nō est panniculus, quia non componitur ex uillis nerveis & ligamentis, neque est neruus, ut patet satis ex paucitate sensus: relinquitur ergo quod sit caro, quia cum nullo alio simplici tantā habet conuenientiā quantā habet cum carne. Et cum caro sit etiam quintuplex, uerisimile est ipsam esse carnem confusam præter naturalem. Ex quo inferitur ungulam esse morbum in numero. Morbum quidē, quia sensibili.

Io. Arculani.

G 3 liter

liter impedit motum oculi, & quandoque sensitiuum, faciendo dolore in numero, quia addit in numerum partium oculi. Si autem cooperiat pupillam, est etiam morbus in uia, & potest etiam dici morbus in situ & superficie. Et nota quod aliquando in ipsa apparent uenulae per substantiam eius disseminatae.

Cum aliquid panniculo simile ex angulo qui est ex parte naris oriri uidetur, & album oculi cooperire, & peruenit usque ad nigredinem, generatur passio quae dicitur ungula. Cuius nocumentum tunc solum est peius cum peruenit usque ad nigredinis partem quae est iuxta pupillam.

Hoc capitulum de ungula diuiditur in partes duas. In prima parte determinat de ipsa theorie. In secunda ibi. Hae igitur passio determinat practice. Prima pars satis ex dictis est manifesta. Et non dixi ungulam esse panniculum, sed panniculo similem, quia subtilis & lata. Et ipsam dixit esse deteriore cum peruenit ad partem nigredinis, id est, corneae, quae est iuxta pupillam, id est, ex directo pupillae, tunc enim uisum impedit. pupilla enim proprie est foramen uiae multum proxima ipsi corneae. Species quandoque sumuntur a modo substantiae, & sunt tres. Neruea, quia ad nervi similitudinem in duritie. Et carnea, quia ad carnis similitudinem quae est mollior. Adiposa, quia ad similitudinem adipis, & hanc tertiam speciem ponit Albuc. Secundo distinguuntur ex parte coloris. Nam quaedam est rubea notabiliter a sanguine proueniens. Quaedam alba a phlegmate permixto cum sanguine. Quaedam citrina siue uiridis a cholera mixta cum sanguine. Quaedam nigra a melancholia mixta cum sanguine. Semper enim sanguis concurrit ad generationem membrorum tam coniuncta generatione quam se iuncta, & similiter ad nutritionem. Vtrum autem ad generationem membri omnes humores concurrant sicut elementa ad mixti generationem, est alterius speculationis. Distinguitur etiam ex parte quantitatis. Nam quaedam est magna, occupans magnam partem coniunctivae, imo corneam ipsam. Quaedam est parua, Quaedam mediocri. Item quaedam est crassa. Quaedam subtilis.

Distinguitur quarto ex parte adhaerentiae. Nam quaedam est multum inuiscata cum coniunctiva aut cornea. Quaedam leniter est & facillime separabilis. Quinto ex parte originis. Nam quaedam oritur ex lachrymali domestico, & est secundum plurimum, quia illud propter latitudinem uiarum est plurimum materium susceptivum. Quandoque oritur a lachrymali syluestri & est rarius. Quandoque a profunditate palpebrae inferioris aut superioris, & est rarissimum. Sexto & ultimo. Quaedam antiqua. Quaedam noua. Et quaedam a generatione contracta.

Causae pro magna parte sunt manifestae. Causa enim materialis ex qua, est secundum plurimum superfluitas nutrimenti lachrymalis & coniunctivae, licet etiam aliae materiae superfluentes possint esse causae materiales ipsius. Causae primae sunt quaecumque huiusmodi humores multiplicant & ad oculos declinare faciunt. Causa efficiens est uirtus augmentatiua cum colore naturali. Formalis est forma carnis. Finalis in quantum caro ut habeat esse, sed finalis in quantum morbus ut laedat. Materia uero adiposa est phlegma aquosum cum parte unctiuola sanguini permixtum. Signa satis nota sunt, cum sensibus subiaceant.

Prognostica. Primum. Quae dura est, antiqua, crassa, magnam partem occupans, & multum inuiscata & proprie cum cornea, est incurabilis. Secundum. Adiposa mollis, parum inuiscata, subtilis, distans a cornea, est facile curabilis. In mediis dispositionibus iudicia sunt media.

Hae igitur passio dum subtilis est, cum sief uiridi, & sief de chalcantho est medicanda. Si autem uetusta fiat & crassa, cum ferro est expolienda.

Primo ponit modos curationis. Secundo ponit duplicem descriptionem sief ibi. Sief uiride. Quid dicat in prima parte satis notum est. Innuit enim duplicem modum curationis. Vnum cum medicinis. Reliquum cum operatione manuali.

Sief uiride quod confert sebel & scabici & ungula & albedini. Rec. ziniar. drach. 3. colcothar usli drach. 6. arsenici rubei, baurach, spuma maris, omnium ana drach. 1. sa-

lis ammoniaci drach. 5. ammoniaci drach. 2. ammoniacum in succo ruta dissoluatur & species ex eo conspergantur & fiat ex eis sief, est enim mirabile. Sief de chalcantho quod confert ungule. Rec. aris usli, chalcantibi amborum ana drach. 5. ziniar. drach. 2. salis ammoniaci, baurach, arsenici sublimati omnium ana drach. 1. terantur & per hebdomadam unam dimittantur, deinde fiant ex eis sief, & fricetur ungula cum eis.

Recipe ziniar, id est uiridis aeris corrosiui, cali. & sic. in quarto. 3. 3. colcothar usli, id est, uitrioli rub. usli, cal. & sic. in tertio. 3. 6. arsenici rub. cali. in tertio, sic. in secundo, baurach, spuma maris cali. & sic. in tertio, omnium ana. 3. 1. salis ammoniaci cali. & sic. in quarto. 3. 5. ammoniaci. 3. 2. ammoniacum dissoluatur in succo ruta, & ceteri pulueres conspergantur eodem suc. & simul incorporando fiat sief, quod est mirabile siue in forma pulueris, siue in forma liquida applicetur. Sief de chalcantho. Recipe eris usli, chalcantibi, id est, uitrioli uiridis ana. 3. 5. ziniar. 3. 2. salis ammoniaci, baurach, arsenici sublimati, omnium ana drach. 1. terantur & per hebdomadam unam dimittantur, interim ipsa bene puluerizando & incorporando, & fiat sief ex eis cum aliquo liquore ut sic. ruta, & cum eis ungula fricetur. Quatuor sunt species uitrioli, scilicet, colcothar quod est citrinum, chalcanthum uiride, & haec sunt calida & sicca in tertio. Chalcadis scilicet album. Assuriz rub. & haec duo sunt calid. & sic. in secundo.

Verumtamen Simon la. dicit quod colcothar est chalcanthum uiride antiquatum. Arsenici. 3. sunt species, Rub. Citrinum, quae sunt minus acuta, cali. in tertio, sic. in secundo. Album dictum realgar calid. & sic. in quarto. Sed arsenicum sublimatum est ceteris acutius & multum causticum, & eius operatio durat tribus diebus dum profunde cauterizat. Quapropter consideretur qualiter in oculo administraretur, sed de hoc statim dicetur.

Cura ungulae triplex exigit regimen. Primum uniuersale circa causam antecedentem. Secundum locale. Tertium utriusque commune. Primum completur. 5. intentionibus scilicet minoratione, digestionem, eradicationem, diuersione, & fluxus interceptione. Quae omnes qualiter debeant compleri satis potest ex suprascriptis patere cap. de scabie & ophthalmia. Secundum regimen duobus perficitur modis, primo cum medicinis, secundo cum operatione manuali. Primum uero modus conueniens in subtilibus ex mollibus & proprie quando non possunt leuiter cum operatione manuali remoueri, duobus perficitur intentionibus. Prima est mollificatio cum balneo aut fomentis suprascriptis. Secunda immediate post fomentationem apponere medicinas abstergentes & corrodescentes a leuioribus inchoando & gradatim ad fortiora procedendo. Thus solum tritum & aspersum cum aqua cali. & postea collirizatum est expertum & securum. Collyrium Ruffini descriptum a Iesu Ali. R. lapidis haematitici loti, aeris usli, cadmia argenti. an. 3. 4. pip. al. 3. 2. pip. nigri, spuma maris. an. 3. 8. aloes succocitrini, spica, garop. an. 3. 4. zing. 3. 3. amyli, mirob. belliricoru. an. 3. 2. croci, salis ammo. an. 3. 1. terantur & cribellentur subtilissime & utere. Est enim sublime & famosum. Collyrium Auic. ex testa cancerorum fricata ab ea linimento mixto cum oleo curbitae est apud eos mirabiliter laudatum. Fortiora sunt descripta per Ras. in textu. Et si uis uti fortibus sine quibus sem plurimum ista operatio compleri non potest, accipe sief descripta a Ras. & tenendo aliquod ipsorum inter digitos applica cum extremitate eius super ungulam. Et tandiu teneas donec aeger sentiat dolorem, & postea amoueas. Et pone in altera parte eiusdem ungulae & sic paulatim tota consumetur aut intingatur extremitas stili cotto inuoluta in aliquo collyrio forti ex suprascriptis, & applica super ungula ut prius, aut illi extremitati prius in aliquo liquore balneate annecte pulueres suprascripti sief. Et applica quousque sentiat dolore ut supra. Et si oculus incurreret ophthalmiam & dolorem, desiste ab huius operatione per aliquos dies. Deinde reuertere donec completa sit. Et hoc modo secure poteris uti huiusmodi medicinis fortibus. Elonga tamen hac operationem a cornea quantum potes. Et cum facis huiusmodi operationes dolorosas bonum est ponere defensionem circa frons & tamen ne humores fluant ad oculum, &

& clauso oculo pone desuper faldellam cotti infusam in lacte, & aqua ros. & oleo ros. ad doloris mitigationem. Modus aut operationis manualis in ungula est triplex. Primus si ungula non sit multum cum oculo inniscata, ut cum uncinis in extremitate eius magis separata siue minus iniscata capiat palpebra eius aperta & sic retenta per aliquem bonum ministrum eleuetur. Et si opus sit alio uncino ad meliorem eleuationem applicetur, postea cum instrumento ad modum laticetæ, sed obtuso aliquantulum excoriet ipsam ab oculo separando usque ad lachrymale cui annexa est, & ibidem incidatur cum forfice & caute ne caro lachrymalis incidatur, sic enim fiet fluxus lachrymarum perpetuus. Secundus modus est in illa quæ multum cum oculo est iniscata ut suspendatur cum uncino propter duritiem eius in parte magis eleuata & crassa, & si non potest capi cum uncino propter duritiem eius perforetur ibidem cum acu subtilissima, in cuius extremitate sit filum, & cum filo suspendatur & eleuetur quantum apte fieri potest quæ eleuata adhuc infigitur alia acus capiendo maiorem partem eius & quantum de ipsa capi potest, dummodo non lædatur oculus, & tracto filo de serico usque ad medium eius trahatur filum, nunc ad unam differentiam nunc ad aliam secundo & ipsam ab oculo separando primo uersus corneam postea uersus lachrymale, donec totaliter separetur. Et si uideretur tibi quod cum pilo caudæ æquinæ separari melius posset secundo ipsam, experire, quo melius perficiatur operatio hæc, postea iuxta lachrymale incidatur. & in hac operatione cauendum est ab incisione partium oculi, caro enim lachrymalis cognoscitur per rubedinem & molliorem, & coniunctiuam cognoscitur per duritiem, & maxime caue ne cornea lædatur. Tertius autem modus secundum Albu. proprius in ungula adiposa acceptatus à multis in curatione macularum de quibus sermo præcessit, perficitur cum rasoriis rasando siue abraddendo totum quod est in superficie oculi, illud enim apte fieri potest non radendo oculum, cum illa additio sit oculi mollior. Et post has operationes imponunt in oculo cymium masticatum cum sale ad prohibendum inuiscationem oculi cum palpebra. Ego autem credo convenientius esse immedicare post has operationes sicut album cum lacte ad sedandum dolorem & prohibendum ophthalmiam. Prohibetur autem inuiscatio, faciendo ægrum sæpe mouere oculum sub palpebra: & si non possit aperiantur aliquando palpebræ si ab oculis separentur, & postea si opus est transactis duobus diebus uel tribus aliquid ex medicinis abstergentibus, de quibus supra ad consumendum residuum in oculo ponatur. Tertium regimen duas exigens intentiones, scilicet correctionem accidentium & debitum regimen sex rerum non naturalium ex capitulis præcedentibus potest elici.

De atarfat siue sanguine effuso in oculo. Cap. 25.

Macula rubea, atarfati, tarfa, pustula, sanguis infusus in oculo sunt termini synonymi significantes hæc dispositionem, quæ diffinitiuè est sanguis in superficie oculi adhærens & inuiscatus. Et si sit ex directo pupillæ impediens uisionem est morbus in uia. Si uero sit in alia parte oculi & lædat, ad malam complexionem cum materia reducitur. Si uero non lædat non est ægritudo, sed est de his quæ non sunt ægritudines, & tamē cū ægritudinibus numeratur, ut est apud Auic. 2. primi doc. 1. cap. 6.

Species eius sunt, quia aliquando sanguis ille occupat magnam partem superficiem oculi. Aliquando paruum, existens sicut punctum rubeum, ideo atarfati dictum est. Item aliquando est recens sanguine nouiter infusus, & est coloris rub. Aliquando est antiqua, & tunc est nigra, uel tendens in nigrum resolutis ex longa mora partibus igneis & aeris, remanentibus partibus terreis tendentibus in fuscum.

Causa immediata est duplex. Una est exitus sanguinis à uena uel arteria, aut quia soluitur ipsarum continuas aut per uiam resudationis. Causa autem solutionis continui ipsarum quandoque est primitiua sicut percussio, & calidus, frictio oculi, motus laboriosus, statio sub sole & huiusmodi. Quandoque est intrinseca corporea sicut multitudo san. extendens, & ipsius ebullitio, sicut aliquando in febribus balneo, & forti exercitio unde humor ebulliens scindit uenam, & fortasse subtiliatus resudat extra uenam. Aliquando est humor corrosiuus sub-

stantiam uenæ corrodens. Secunda causa coniuncta est aliquid remanens ex materia apostematis sang. resoluti secundum maiorem partem, siue ut uerius dicam, illud remanens est ipsa macula, sed apostema præcedens uel causa immediata ipsius est causa huius maculæ. Signa sunt macula rub. aspicienti est manifesta, quod autem sit ex reliquia apostematis ex præcedente apostemate cognoscitur, quod uero sit causa primitiua ex relatu ægri habetur, quod uero sit à causa corporea cognoscitur cum nulla causa primitiua præcesserit. Vtrū autem à plenitudine uel ab acuitate, cognoscitur, quia plenitudine declarat tensio uenarum, ebullitionem uero declarat complexio calid. corporis & causæ sanguinem ebullire facientes. Sed quod sit ex resudatione cognoscitur quia tenuis & subtilis est. Et quando est ruptura uenæ, crassior est macula illa tang. crassiori fluente.

Prognosticum. Hæc dispositio est ex toto genere salubris natura aut arte curabilis. Cura triplex exigit regimen ut supra. Primum uniuersale. Secundum particulare. Tertium commune utriusque. Primum regimen uniuersale quidem completur per phlebotomiam secundum quod superius dictum fuit. Necnon medicina solutiua, quæ debet esse leniens & in frigidans sicut aqua fructuum cum casia aut manna. Diuersio etiam perficitur, tam diuersionibus communibus, quæ propriis scilicet phlebot. particularium uenarum capitis. de quibus supra. Fluxus etiam interceptio perficiatur ut supra.

Secundum regimen perficitur in principio cum repercutientibus, & in fine cum resoluentibus, & abstergentibus in medio autem commixtis. Ex conuenientibus in principio est aqua albuminis oui in oculo infusa. Aut si in ea infundatur parum boli armeni, & deinde coletur & sic colata & expressa oculo imponatur. Et deinde secunda die ponatur in oculo lac in quo bolus armen. & similia sunt infusa. Exterius autem applicetur albumen oui cum oleo ros. contusum. Deinde tertia & quarta die & quinta imponatur sanguis colubi calidus, aut turturis, extrahendus per phlebotomiam uenarum, quæ sunt sub ala, aut per decoctionem & est calidior. Et hoc tempore emplastratur oculus cum scœnugræco, & ros. coctis in aqua ros. aut emplastratur cum foliis salicis coctis cum aqua ros. deinde emplastratur cum scœnugræco, & ros. cum uino decoctis. postea cum non est timor noui fluxus uaporetur oculus cum decoctione chamamelis, meliloti, aut foliorum caulium & postea emplastratur cum foliis salicis & caulibus tritis, & coctis cum uino potenti antiquo. Et in hoc tempore ponatur in oculo collyria fortia. R. thuris. 3. i. tere ultima cōtione, & funde super ipsum ex aqua pluuiali in qua solutum sit sal cœ: & si uis ut magis imprimat dissoluatur in aqua sal ammoniacum, aut sal gemma, & cum suprascripto thure etiam misceatur, & fiat collyrium Fortius autem est illud quod à Rasi in litera describitur. Olibani quoque pars una, & salis gemmæ tertia unius partis in lacte dissoluta egregie conferunt & similiter cum aqua raphani. Si uero macula rub. fuerit reliquia apostematis, fomentes oculos, primo cum decoctione passularum, cui parum scœnugræci addi possit, deinde collyrizetur cum succo passularum sine arillis, & aqua mellis: & cum eisdem cum quibus sit fomentatio potest emplastrari, ut quod derelictum est emplastratur & mollicetur & resoluatur.

Tertium regimen commune utriusque, scilicet, cōplendū est per correctionem accidentium, & per regimen sex rerum non naturalium, parere potest ex sæpe dictis. In principio enim dum est dolor & æstus debet esse tenuis. Postea his accidentibus declinantibus potest incrassari.

Quoniam in oculo ex percussione aut ex re alia punctum rub. fieri contingit, sanguis qui ibi est dissolutus est, postquam æstus quienerit. Sumantur igitur arfenici rub. olibani, ammoniaci, myrrhe, omnium aequalibus & fiant ex eis sies, qui in suc. coriandri fricentur, in oculo distillantur quando tamen dolor perseverat albugi oui sumenda est & oleo ros. commiscenda & cottum ex eis inuolutum oculo est superponendum.

Habet hoc cap. 2. partes. In prima ponit causam huius passionis. In secunda curam. Secunda ibi. Sanguis qui ibi est. Io. Arculani G 4 Quod

Quod dicit in prima manifestum est. In secunda parte. Primo docet quid faciendum est cum ægritudo processerit, cuius causa est, quia medici secundum plurimum non uocantur in principio sed posteaquam aliquandiu processit. Secundo ponit curam quæ debetur principio. Quæ dicit in parte ista manifesta sunt. Describit enim collyrium satis forte applicandum, postquam æstus, id est, calor & dolor & fluxus humorum cessauerit. Item arsenici rub. olivani, myrrhæ, ammon. ana. partes æquales fiant ex eis sicut cum succo coriandri: qui etiam cum uis uti eis, sunt fricandi super cote in succo coriandri & collyrizandi. melius tamē est ut arsenicum saepe abluatur cū aqua rosacea aut succo iam dicto. Et forte melius est ut hoc collyrium cum extremitate stili cotto inuoluto applicetur, quia ad placitum sic potest remoueri & super macula reiterari. Hic est dubium nondum decisum. Vtrum scilicet in cornea sint uenæ & arteriæ per quarum rupturam potest fieri tarsi. Et uidetur quod sic quia nutritur & uiuit, & quia patitur febriliter quod est panniculus accidens ex inflammatione uenarum apparentium in superficie coniunctiuæ & corneæ. In oppositum arguitur. Quia quantumcumque essent minutæ adhuc apparerent, item essent plene sanguine qui non est diaphanus, & per consequens non esset perfecte diaphana, imo in aliqui. partib. colorata. Item si oculus uidet uaporem & impeditur ab eo, multo magis impeditur à præsentia sanguinis in cornea. Credo conformando me dictis. A. & cæterorum & experientie quod in ea sint uenulæ & arteriæ minutissimæ, quæ sunt diaphanæ, & non repletæ sanguine, sed humiditate prima de secundis, facta diaphana, & transparente secundum ipsius corneæ exigentiam, sed cum multus ad oculos fertur sanguis, sanguis replentur & apparent. Et ad argumenta in oppositum dico, quod si uapor impediatur uisum, istæ tamē non impediunt cū sint diaphanæ, sicut cornea, neque uidetur ab ipsa separatae cum sint minutissimæ & ei similes.

De lachrymis siue distillatione oculi. Cap. 26.

Lachrymæ, distillatio oculi sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem, quæ diffinitiuè est ægritudo secundum quam oculi semper apparet humidi humiditate aquosa, & quæ curant guttæ. Vel breuius. Lachrymæ sunt humiditas aquosa ab oculo profluens, & in alia ueritate sunt ægritudo in uia, cum uisum impediatur prohibendo debitam delationem specierum uisibilium per corneam, & hæc non sunt nisi superfluitas aquosa refecata in secunda, tertia, aut quarta digestionē. Aquositate namque genita in hepate per secundam digestionem, & postea expulsa cum sanguine, ad chilum magna pars eius tamquam superflua expellitur per uenas emulgentes ad renes, & deinde à sanguine colata expellitur per poros uritides ad uescicam & mingitur. Reliquum aut ipsius aquositatis quod remansit cum sanguine ut uehiculum sit ipsius sanguinis, penetrat cum sanguine ad extremitates uenarum quæ ad oculos terminantur & fit lachryma. Generatur secundo materia lachrymæ in tertia digestionē in extremitatibus uenarum, cum sanguis conuertitur in primam humiditatem de secundis, est enim illius tertiæ digestionis superfluitas, & hæc simul est materia lachrymarum & etiam sudorum, licet et prima aquositas sit materia sudoris. Tercio refecatur superfluitas aquosa in quarta digestionē cum prima humiditas de secundis transmutatur in secundam & tertiam, & tamen tertia, scilicet cambium transmutatur in quartam, scilicet in gluten & membrorum substantiam. Dux enim in quarta digestionē refecatur superfluitates, altera crassior, & est illa immundities quæ apparet in corporis superficie, & ex hoc genere sunt muchinarium, cerumē aurium &c. Altera subtilis quæ aliquando in uapore, aliquando in sudorem paucum & subtilem conuertitur, & delata ad oculos in lachrymas conuertitur. Dux autem sunt uia per quas hæc materia lachrymarum ad oculos deferretur. primo per uenas exteriores frontales & temporales ad oculos terminatas, secundo per uias intrinsecas peruenientes ad oculos & per foramina quæ sunt in orbita. Potest addi tertia uia quia humiditas fluens per nares quandoque per foramina ossium nasi ad oculos terminata deriuatur ad oculos, sicut e contrario collyria posita in oculis deferretur per eadem foramina narium ad os. unde

quinta tertiæ, sentitur in ore sapor alcohol posita in oculo, huius autem signum est quia multis humiditatis, defluentibus per nares oculi lachrymantur.

Species lachrymarum sunt duplices. Quædam uoluntariæ provenientes, aut ex tristitia dum fit cerebri restrictio, & consequenter humiditatis aquosæ expressio, aut ex letitia per quam fit cerebri dilatio & suor meatus, & consequenter per canales dilatatos humiditatis aquosæ effusio, & similiter sunt in ira propter caliditatem dilatantem & materiam mouentem ad exteriora, de quarum cura non est sermo in proposito. Aliquæ aut sunt inuoluntariæ. Et sunt duplices, quædam natiuæ, & quædam temporales siue accidetiales, quarum quædam sunt antiquæ, quædam nouæ. Et istarum quædam sequuntur alium morbum sicut feb. apata cerebri & his similia. Quædam uero non. Et primæ remouentur cum remotione ægritudinis quas sequuntur. Secundæ uero quoadque sunt continuæ, quandoque interpolatæ secundum differentiam causarum à quibus pender. & omnes istæ sunt duplices, quædam scilicet calidæ & quædam frigidæ. Sunt tamen quædam lachrymæ accidentales consequentes ultimam debilitatem omnium uirtutum oculi & cerebri ac residui corporis, quæ accidunt in propinquo mortis, & hæc non fiunt à uirtute expellente, sed sunt à grauitate humiditatis inclinantis deorsum, quo etiam modo fiunt oregmones in propinquo mortis. Et de his sæpe in prognosticis & in aphorismis & lib. reg. fit mentio &c.

Causæ lachrymarum in genere sunt quatuor. Defectus membri suscipiens, scilicet oculi. Defectus membri mittentis, puta capitis & cerebri. Præsentia materiæ. Et uiarum latitudo. Ex defectu quidem oculi dupliciter. Aut quia caro lachrymalis amota est, aut à generatione deficit, cuius defectus est dicendus morbus in numero diminuto. Aut est debilitas ipsius oculi, & maxime contentiuæ. Defectus autem membri mittentis quod est cerebrum, aut caput saltem mediate, licet à toto corpore ad caput possit hæc materia deriuari. Est autem in uirtute contentiuæ non potente retinere debite, aut digestiuæ superfluitates multiplicante, aut in expulsiua non potente insensibiliter resolueri, aut per loca conuenientia expellere, & hoc propter malam complexionem ipsius cerebri frigidi & humidi secundum plurimum ex tempore aut ex natiuitate contractam, aut propter malam eius complexionem, aut propter apostemata ipsius calidi & frigidi aut mixti, aliquando accidunt propter feb. maxime sanguineas facientes multas materias euaporare ad caput, quæ deinde in humiditatem aquosam condensantur, aut liquefaciunt materias ipsius cerebri, unde ad loca supposita fluunt. Præsentia autem materiæ est causa lachrymarum, aut ratione suæ multitudinis, aut ratione suæ acuitatis expulsiuæ ipsius capitis stimulantis. Latitudo autem uiarum siue intrinsecarum siue extrinsecarum ad hoc adiuuat sicut ad cæteros fluxus. Et quoadque causæ lachrymarum sunt primitiuæ, sicut frigoris forte mordicatio oculis, & exprimendo multo magis quam calor. Similiter res sternutationem inducentes &c.

Signa lachrymæ sunt uisui nota. Defectus carnis lachrymalis etiam sensui subiacet & habetur ex relatu ægri, aut aliorum, quia forte fuit abscissa ungula nimis profunde in lachryma domestico: aut quia impressit fistula in eodem quæ sua sanie corrodit carnem lachrymalem, aut quia curata est cum corrodentibus, aut causticantibus, aut quia hic defectus fuit à natiuitate contractus cum semper habuerit lachrymas.

Signa debilitatis oculi sunt quia oculus facile recipit superfluitates, unde fit frequenter ophthalmicus, aut quia naturaliter est eminens albus, cuius debilitas est à natiuitate contracta, & maxime cū parentes sui fuerint debilius oculorum est enim morbus hereditarius. Signa sumpta ex parte cerebri sunt signa debilitatis digestiuæ, contentiuæ & aliarum uirtutum, nam si absolute debilis est, uirtutes omnes ipsius & ortu ab ipso sunt diminutæ. Si uero digestiuæ debilis sit multiplicatur superfluitates in ipso. Si uero contentiuæ sit debilis quæcumque superfluitas in ipso aggregata etiam si pauca sit quæ primum fuit ad membra supposita. Sed fortasse quidam instabit, quia hoc est ex fortitudine expulsiuæ non ex debilitate contentiuæ. Ad quod dicendum, quod si hæc materiæ expellantur ab ipso per uias à natura institutas hoc arguitur fortitudinem expulsiuæ. Si uero fluant non per loca conuenientia sicut

bachara, folia lauri, & in fine cum uno cyatho uini potentis antiqui maluitici lauetur. Aqua ardens capiti applicata est in hac dispositione ultima. Confortatur et cerebrum, & mala complexio frigida & humida corrigitur cum interius sumptis, sicut theriaca, & mithridato, diabra, & electario de gemmis cum speciebus Mesue, pliris arcoticon Nicolai, & tandem cum aqua ardente, cuius parum a. 3. una usque ad 3. bibatur & teneatur os clausum. Si uero fuerit mala complexio calida corrigitur cum frigidis & sic. sicut cum facculo ex milio torrefacto & rosas. cuius si maior fuerit caliditas addatur sandali, sed forte praestantius est haec extrinseca omittere, nam si calida fuerit, cerebrum discrasiant, si frigida, humiditas exprimitur & augent lachrymas. Procedatur ergo cum interius sumptis sicut cum iuleb, ros. syrupo de papauere aut diacodion cui aliquid specierum diabre, uel diamusci ad cerebri confortationem addi potest, & cum odoribus, quos requirit in capitulo de catarrho. Quarta autem intentio, scilicet fluxus interceptio, completur si materia fluat per uias extrinsecas costrictiuis, fronti & temporibus applicitis, de quibus sermo praecessit in ophthalmia. Sed proprium in hac dispositione in materia frigida est quod ponit Mesue ex inuentione Democriti. Recipe lanam succidam non ablutam, & combure & cinerem eius diligenter tere, & ex eo cum albugine oui line frontem & tempora, mox enim materiei fluxum amputat & lachrymarum. Multa huiusmodi dicta sunt superius in ophthalmiam ualentia in causa calida, & frig. & mixta. Sed his non potentibus, intercipere fluxum, ueniendum est ad sectionem uenarum sicut in ophthalmia dictum fuit. Si uero materia fluat per partem intrinsecam haec non conferunt, sed intercipiendus est fluxus necessario cum interius sumptis, ad quod optime confert diabolibanum descriptione Nicolai, dādo ex ipso. 3. s. cum. 3. i. uini albi calidi, in quo coctum sit olibanum per tres aut quatuor horas post coenam leuem. In causa uero calida sumat unam ex pilulis his. Recipe thuris. 3. i. mirrhæ, opii, croci, ana grana quinq; fiant pilulae cum syrupo de papauere. Grana quoque thuris similiter myrrhæ deglutita ad hoc conferunt, & non est in his timor de stupore, & propterea ab ipsis & similibus non est inchoandum, & multa alia remedium genera ad hoc require in capitulo de catarrho. Quinta intentio, scilicet oculi confortatio completur cum rebus mensurate stipticis praecipue cum puluere Rasii ualente in causa mixta. Sed in causa calida remoueat piper, & ex hoc fieri collyrium cum aqua myrti confert. Et ad hoc iuuat puluis tutiae ablutus solus cum aqua myrti. Item puluis osium mirobalanorum combustorum, cum dicta aqua. Item Recipe tutiae preparatae cum aqua myrti. 3. i. coralli albi & rub. osium mirobalanorum chebulorum co-bustorum, sumach, gallarū, aloes, olibani, opii, ana. 3. s. pulueres subtiliter triti misceantur cum aqua infusionis dragaganti & gummi arabici, & est optimum. Vltimum, cui non est par per descriptionem Mesue ex inuentione Zrizes regis Medorum conferens lachrymis, ardori, asperitati oculorum & ferè omnibus aegritudinibus ex causa calida, & etiam aliquantulum in mixta & confert principio cataractæ, & qui uidet unam rem quasi duas. Recipe sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris diebus pluribus. 3. 4. dragaganti albi, olibani, scorij ferri, margaritarum non perforatarum ana. 3. i. spicæ indæ, cadmiæ, auri & argenti, acatix ana. 3. s. amyli, cerusæ ana. 3. 3. tutiæ preparatae subrubæ. 3. 3. tere omnia cum succo granatorum acetosorum, & fac siccari sicut prius, deinde cum aqua infusionis hueg, idest acori, ultimo cum aqua solatri, deinde pone camphoræ. 3. i. sacchari albi, aur. 1. deinde tere ultima contritione, & fiat ex medietate eius sies cum aqua ros. ex alia medietate alcohol subtilissimus, & possumus etiam eo uti cum albugine oui & lacte etiam mulieris, est enim optimum confortans oculum. Sed nota quod pulueres praestantiores sunt in lachrymis, quia fortius imprimunt & etiam magis oculis inuisantur & adherent si non faciant ardorem. Aqua tamē ardens, secundum quod diu expertus est quidam ex focis, confert optime ad exiccandas lachrymas in causa multum frigida & humida, si lachrymale cum hac balneetur aliquoties in die. Sed querit aliquis, quare medicamina applicanda oculo in lachrymis, imo in omni passione oculi nisi ubi sanguis fluere & ubi etiam timeretur de exitu uicæ, debent esse co-mensurata stipticitatis & non fortis. Et in aliis membris cum

uolumus confringere aut repercutere utimur fortiter stipticis. Dicendum quod oculus fortificatus est ille qui lachrymas principaliter confringit & retinet. Fortificatur autem per stiptica mensurate & non per fortia. Quod si quis instaret etiam de brachijs & cæteris membris. Repellunt enim a se uasa confortata stipticis pharmacis. Dicitur quod non est similitudo, quia in brachio & pluribus aliis membris similibus materiae fluunt per uenas super quibus stiptica fortia apte possunt applicari, imo & ligaturæ repercutientes, sed super oculo non sic, unde melius est in eo intendere omnino ad confortationem magis quam ad ultimam stipticitatem ipsum debilitantem. In materia autem fluente ad oculos, applicamus super uis scilicet fronte & temporibus extremè stiptica, imo ferè sic est in omni membro: applicamus fortiora stiptica super uis per quas materiae fluunt quam super parte recipientem. Ex his inferitur opiata esse uitanda quantum est possibile. Sexta & ultima intentio, scilicet debitum regimen perscitur ut dicimus in catarrho.

Cum lachrymales oculorum anguli semper humidi uidentur, patiens quotidie ieiunus ingrediatur balneum, & in oculum, iustum alcohol mittat. Rec. tutiæ drach. 10. coralli rub. mirobalanorum citrinorum, fricati aloes, omnium ana drachmas. 2. piperis, drach. 5. fiat ex eis puluis qui assidue mittatur in oculo.

In hoc capitulo ponit curam lachrymarum. Et primo curat per balneum de quo dictum fuit, & potest esse balneum aqueum & aerium ad exiccandum & diuertendum materiam. Secundo ponit curam per puluerem subtilissimum in oculo ponendum. Rec. tutiæ. 3. 10. corallorum rub. frig. in primis, sic. in secundo, mirobalanorum citrinorum, aloes ana. 3. 2. piperis. 3. s. fiat puluis, & ualet in causa mixta, & remoto pipere ualet in calid. & sic patet textus &c.

De debilitate uisus.

Cap. 28.

Debilitas uisus, nocumentum, defectio, tenebrositas, sunt termini synonymi huius dispositionis, de qua diuersi autores sub his diuersis uocabulis determinant, quæ debilitas uisus diffinitiuè est actio uisus diminuta corrupta uel ablata, uel læsio uisus diminute corrupte uel ablata, nam cum Rasii non faciat aliud capitulum de corruptione uisus, ab ablatione congruum est ut hoc cap. sit commune his tribus modis læsionum. Ex quibus inferitur hæc debilitatem esse accidens, licet etiam possit esse morbus, impediendo operationes uirtutum interiorum cerebri saltem per communitatem. Sed pro terminorum declaratione, sciendum est actionem tripliciter lædi, scilicet diminute, corrupte, & ablata. Actio quidem ablata est, cum omnino auferatur, sicut in uisu cæcitas, & in appetitu omnimoda ipsius priuatio & dicitur mors appetitus. Actio corrupta est actio non conueniens alicui individuo speciei humanæ naturaliter dispositio siue sibi sano, ut exempli gratia in appetitu, appetitus carbonum & similibus non conuenientium speciei humanæ, & in uisu uisus unius rei quasi duæ sunt, & uisus coloris pro altero. Actio secunda diminuta uel diminute læsa est cum minuitur operatio à perfectione operationis conueniente homini sibi sano, non tamen mutans speciem, sicut in appetitu, appetitus remissus; aut nimis intensus, ut caninus. Et in uisua, uisio remissa. Non tamen est simile, de uisua, cogitativa & aliquibus operationibus animalibus, sicut de appetitu, & multis aliis. Nam ille potest lædi diminute dupliciter, per remissionem, & intensiorem sicut in appetitu, Sed in uisua & in quibusdam aliis non credo hoc euenire, scilicet, quod lædatur per intensiorem, imo quanto est intensior, & acutior, tanto est perfectior, etiā si quis haberet uisum lyncis, licet multum ducti apparentibus rationibus opinentur contrarium. Et hæc omnia intelligenda sunt ad bonum intellectum, dico enim non esse possibile uisionem lædi per intensiorem cum fortitudine uirtutis uisua, quæ maxime arguitur ex tolerantia excellentium sensibilium, sed sine huiusmodi fortitudine potest lædi per intentionem, sicut autem in appetitu & aliis, possunt enim lædi per intentionem etiam stante fortitudine appetitu. Sed contra, uisio acuta est causa imaginationum, quarum causa non est uisio obtusa, ergo &c. Antecedens est, A. tertii tertii tractatu. 4. cap. de imaginationibus, ut cum uisua propter eius acuitatem uidet uaporem existentem intra corneam,

corneam, quæ oculus obtusi visus non comprehendit, per huiusmodi enim uisionem imaginatur homo aliquod obiectum esse in medio coram pupilla, quod tamen non est. Et confirmatur, quia huiusmodi uisio est corrupta, ergo læsa. Assumptum probatur, quia pro uapore ad intra oculum representatur obiectum extra oculum coram pupilla. De hoc autem dicitur in cap. de imaginationibus. Quum triplex sit species debilitatis uisus in dicta, uideamus subdiuisionem unius cuiusque in suas species. Visio enim diminuta duas habet species, quarum utraq; tripartitur. Sunt enim quidam male uidentes de prope, & bene de longe. Quidam e contrario, male de longe & bene de prope, Quidam male de prope & de longe. Item aliqui bene uident in claro & res claras & albas. Et male contra, scilicet res nigras, & in obscuro, quæ dispositio dicitur noctilopa. Aliqui bene in obscuro & res nigras, & male e contra, quæ dispositio dicitur aliar. Aliqui enim male uident utroque modo. Similiter uisio corrupta duas habet species, unam, circa sensibile proprium, sicut uidentes unum colorem pro alio, alteram circa sensibile commune. Et est quadruplex. Sunt enim aliqui errantes circa numerum, quibus unum apparet duo, & e contra. Aliqui circa motum & quietem, quibus res mota apparet quiescens uel e contra. Aliqui circa figuram, quibus quadrata apparet circularia & e contra. Et aliquibus istorum apparent omnia in medio perforata, & aliquibus secundum latus abscissa. Aliqui errant circa magnitudinem, quibus res magnæ apparent paruæ & e contra. Quinto aliqui errant secundum situm, licet non sit sensibile commune aut proprium, de quo forte quis mirabitur cum distantia & propinquitas plurib. sensib. possint sentiri, & istorum aliqui iudicabunt res semper magis de prope quam sint. Aliquando omnia magis distanter quam distent. Actio autem ablata non habet species nisi quod aliqui sunt uidentes aliquid luminis, licet nihil discernant. Et aliqui omnino nihil uident. Sed hæc ultima species proprie dicitur actio ablata, prima autem improprie & apud communitatem. Et istæ omnes species aliquando sunt ex tempore, aliquando sunt ex generatione contractæ.

Causæ debilitatis uisus in genere sunt duplices, quædam per communitatem, & quædam per essentiam. Per communitatem dupliciter. Aut à toto, aut à membris particularibus, scilicet, stomacho, cerebro, & ortis ab eo matrice & ceteris. Per communitatem à toto potest fieri debilitas uisus ex omni genere malæ complexionis sine materia, & cum materia communicata oculo sub forma humoris aut sub forma uaporis & fumi. Ex caliditate enim superflua totius accidit debilitas uisus, sicut in multum febrientibus, aut alio modo extreme calefactis, tum propter caliditatem resoluentem spiritum tum propter uapores ad oculos delatos. Imo in febribus non solum accidit diminutio uisus, sed aliquando corruptio cum existimant se uidere aliqua quæ non sunt, & hoc propter uapores coram ipsa chrystalloide situatos huiusmodi res representantes. Ex superflua etiam humiditate & frigidityte accidit debilitas uisus, ut in hypofarica chronica spiritibus incrassatis & paucificatis. Et ex omnibus causis addentibus repletionem corporis superflua, siue quo ad uasa, siue quo ad uirtutem potest accidere debilitas in usu. Accidit tertio ex uehementi inanitione & siccitate, de qua Rasis in litera, sicut in ethicis, aut alio modo consumptis propter spirituum uisibilibus & humorum paucificationem & tunicarum exiccationem. Et propterea in consuescentibus accidit debilitas uisus spiritibus resolutis & humido exiccato. Siccitas etiam cum materia melanch. maxime obest spiritibus uisuius tâquã sibi maxime contraria ut superius in melanch. licet frequentius uisio lædatur à phlegmatica. Est secundo debilitas uisus per communitatem à membris particularibus sicut à stomacho frequentius eueniens propter ipsius malam complexionem frigidam & humidam cum materia phlegmatica ad caput uaporis, de qua Rasis in litera. licet per præsentiam cuiusque materię in stomacho existentis potest actio oculi diminui & corrumpi. Item per communitatem à capite propter omne genus ægriudinis, scilicet complexionis, compositionis, unitatis, & propter apost. sed maxime cum hæc ægriudines sunt in parte anteriori cerebri magis oculo communicatæ. Nam partes integrantes oculum secundum magnam par-

tem à parte anteriori capitis oriuntur. Vnde propter illius partis ægriudinem actio uisus corrumpitur, diminuitur, & cum ultimatur, aufertur. Maxime autem uisus debilitas accidit per communitatem à neruis opticis ad hoc ordinatis ut deferant spiritus uisibiles à cerebro ad oculos, & e contrario ab oculis ad cerebrum, scilicet ad sensum cõmunem species uisibiles. Et propterea in medio antequam exeant, in cerebro coniuncti fuerunt, siue cruciuntur siue nõ. Propter ergo ipsorum nocumenta, ut cum spasmanur aut mollificatur, aut discontinuatur, accidit frequenter ut unum appareat duo. Cum autem oppilantur non totaliter diminuitur uisus, si totaliter, aufertur. Similiter cum patiuntur apost. aut solutione continui secundum plurimum uisus aufertur, & propterea cõrusiones & incisiones factæ in parte anteriori cerebri frequenter uisum diminuunt, cõrumpunt & auferunt. Est etiã debilitas uisus per communitatem secundi paris neruorum cerebri uenientium ad compositionem septem musculorum oculi, propter quorum nocumenta uisus magis corrumpitur quàm minuitur, aut auferatur, faciunt enim frequenter unum apparere duo, & etiam per ipsorum nocumenta oculi obliquantur. Et similiter potest uisus impediri per communitatem à matrice & ceteris membris, sicut à palpebris cum patiuntur scabiem aut alias ægriudines sibi proprias. Similiter à carne lachrymalis cum minuitur & cum lachrymale fistulam incurrit. Causæ autem primitiue sunt quæcũq; possunt huiusmodi nocumenta totius membrorum particularium aut ipsius oculi facere aut conseruare. Causæ uero debilitatis oculi per essentiam sumuntur à quatuor, scilicet, à compositione oculi, spiritibus, tunicis, & humoribus. A compositione quidem ut cum nimis magnus aut nimis eminens, nam propter eminentiam melius uidet in obscuro quàm in claro, melius de prope quàm de longe, melius res nigras quàm albas &c. E contra autem oculus profundus se habet in omnib. Licet absolute ceteris parib. oculus profundus se habeat melius in omnib. istis quàm oculus eminens, sicut & oculus paruus respectu cuiuscunq; uisibilis melius se habet q̃ oculus magnus. Secundo causæ debilitatis uisus per essentiam sumuntur à spiritibus, nam quandoq; multiplicantur, quandoq; paucificantur, quandoq; sunt crassi, quandoq; subtiles, quandoq; clari, quandoq; turbidi, quandoq; uniti, quandoq; disgregati. Causæ autem multitudinis spirituum sunt multitudo humorum & nutrimenti cum bonitate membrorum principalium & sibi deferuentium, & paucitate resolutionis ipsorum. Paucificationis uero sunt causæ contrariæ. Et coitus paucificat spiritus, & deterior est paucitas spirituum quàm multitudo eorundem. Licet multitudo quandoq; noceat, cum ipsis multiplicatis non sit liber eorum transitus per uias angustas. Et quia propter multitudinem sunt minus parui, hoc tamen rarissime accidit, propterea dixit A. quod eorum multiplicatio est melior uisus uel res &c. Causæ uero crassitie ipsorum est sanguis crassus ex quo generatur frigid. & humid. & permixtio uaporum cum eis postquam geniti sunt & e contra. Causæ subtilitatis sunt subtilitas sanguinis calid. & sic. & eorum de pñatio à uaporibus. Mediocritas tamen in crassitie & subtilitate est melior, & propterea uitanda sunt præbetia nutrimentum nimis crassum & subtile, & quæcunq; præter modum calefaciunt, in frigidant, humectant, & exiccant. Nec ualet si arguatur, quia calid. & sic. plerunq; incrassant humores resoluendo partes subtiles terreis remanentibus. & ita poterit esse in spiritibus. Dicitur quod nõ est similitudo, quia spiritus sunt subtilissimi naturæ aeris, apti facillime per calid. & sic. transire in naturam igneam, & sic magis subtiliari. Causæ autem turbulentie ipsorum est turbulentia sanguinis ex quo generatur, & turbulentia uaporum secũ permixtorum, scilicet postquam geniti sunt, sicut e contra causæ claritatis sunt claritas sanguinis, & eorum à uaporibus. depuratio. Causæ autem primitiue sunt quæcunq; generant sanguinem turbidum, & quæcunq; ipsum turbidant, sicut omnes qualitates primæ modum excedentes. Et e contra. claritatis sunt causæ contrariæ. Causæ uero unionis spirituum est aer tendens in obscurum cum debita temperie, sicut e contrario nimia luciditas & aeris calid. superflua est causa disgregationis. Et ex his possumus uidere causas sex specierum diminutionis uisus, & causas bonitatis uisionis. Nã si spiritus sunt multi clari mediocres, sit optima

tima uisio de prope & de longe in claro & in obscuro, & respectu cuiuscunq; obiecti. Habentes autem spiritus his contrarios, scilicet, paucos, obscuros, nimis crassos aut subtiles, e contrario male se habet in omnib. huiusmodi dispositionib. Habentes uero spiritus multos obscuros & crassos bene uident de longe, de prope uero male, bene res lucidas & albas male nigras, bene in claro, male in obscuro, & melius magna quam parua, & tolerant obiecta excellentia sicut aspectu solis, melius quam habentes spiritus multos & claros & mediores in substantia, e contrario se habent in omnibus oculi habentes spiritus his contrarios, scilicet paucos subtiles & claros, posset etiam esse tanta paucitas spirituum & obscuritas, quod omnino uisus auferetur, sicut in propinquis morti, & in quibus est integra oppilatio neruorum opticorum, digressio etiam spirituum minuit uisionem. Sicut e contra unio perficit, nisi modum excedant, quod rarissime accidit. Et omnes hæc causæ sunt aut à principio generationis aut ex tempore contractæ.

Tertio sumuntur causæ debilitatis uisus per essentiam à tunica oculorum. A cōiunctiua quidem cū diu passa est ophthalmia, licet aliqui ophthalmici clarius uideant quam ipsi sani. 3. 1. problematum, problemate. 9. nam multis lachrymis fluentib. depurantur humores oculi & spiritus redduntur clariore. Ex nocumento etiam corneæ debilitat uisus, corrumpitur, & auferitur, cum enim patitur exituram & ulcus, si sit in tota cornea uisus auferitur, si partem pupillæ occupet, uisus diminuitur, aut corrumpitur, & similiter cū remanet ex ulcere cicatrix aut aliud uestigium, si sit in medio apparent obiecta perforata secundum aliquam partem. Si in extremis coram pupilla, apparent obiecta diminuta secundum aliquam partem. Et quadrata quandoq; apparent rotunda propter diminutionem uisionis, quia anguli non uidentur, quod etiam accidit cum obiecta sint distantia. Si uero cornea sit colorata colore rub. propter tarphati appareret obiecta rubea. Si uero colore citrino ut in hīcteria, apparent omnia citrina & sic erit actio corrupta respectu sensibilis proprii, tunc enim accidet de speciebus ad oculum delatis, sicut accidit de radiis solis ingredientibus per uitrum citrinum aut rub. apparent enim rubei aut citrini, nonnunquam etiam cornea exicatur aut humectatur superflue, ex quibus perdit paruitatem, et est causa diminutionis uisus, aut ablationis. Et quandoq; etiam uapor existens corā pupilla siue naturalis siue accidentalis, sicut in principio cataractæ est causa corruptionis uisus secundum situm, nam aliquid iudicatur coram pupilla quod nō est. Hic autem uapor & cataracta non solum possunt esse corneæ adhaerentes, sed etiam uix & telæ aranæ & in quocunq; loco inter corneam & crystalloidem. Aliquando propter solutionem continui in cornea oculus non potest tolerare lumen, nec uidet in claro licet forte in obscuro, ex eo quod transitus luminis non gradatim sed magis subito peruenit, scilicet ad crystalloidē ut optime sentit A. cap. de debilitate uisus. Quandoq; fortasse hæc ratio dubia uidebitur, cum semper lumen subito penetret ad crystallinum, & non gradatim, neq; in tempore. Sed per gradationem illam intellexit. A. modificationem quandam luminis factam per partes oculi, quæ sunt ante crystalloidem, quæ modificatio quomodo fiat subito à potentia finita difficile est uidere. Sed credo sicut species subito multiplicantur, ita subito possunt moderari cum sint intentionales, sicut radii transientes per uitrum subito modificantur & colorantur secundum colorem ipsius quantum ad apparentiam. Et quandoq; cornea rumpitur & egrediuntur humores & uix. Ex defectu etiā uix, quæ naturaliter debet esse nigra, debilitatur uisus cū est min⁹ nigra debito, sic enim oculus efficitur albus, & si nimis nigra sic efficitur niger. Et melius uidet in claro sicut ei contrarius in obscuro. Aliquando foramen uix nimium dilatatur & dicitur alintar. Aliquando nimium constringitur, & tunc pupilla apparet parua, & dicitur constrictio pupillæ, quæ constricta naturaliter melius uidet omnia obiecta quocunq; modo situata, quā oculi pupillæ late, licet habentes pupillam latam melius uideant in obscuro quā in claro, melius magna quā parua, melius nigra quā alba, & melius de prope quā de longe, & semper iudicant obiecta minora quā sunt, pupilla uero parua e contrario se habet in omnib. Ex hoc patet causa corrup-

tionis uisionis respectu magnitudinis. Sed cōtra arguitur, quod pupilla magna magis de prope uideat quā parua. Sit obiectum æquale ita propinquum utriq; pupillæ ut à neutra uideri possit propter propinquitatem, elongetur paulatim æqualiter ab utraq; tunc manifestum est quod cōus pyramidis huius rei citius recipietur in pupillam magnam quā paruam, ergo citius & magis de prope uidebit ipsum. Ad quod dicitur q argumentū concludit de obiectis maiorib. pupilla, sed non de minorib. aut equalibus, nec ualet argumentū magis de prope uidet, ergo melius uidet. Etsi argueret q obiecta minora pupilla de æque bene secundū conū suæ pyramidis recipiuntur in pupilla magna sicut in parua, ergo æque cito ab utraq; uideri debent. Dicitur, negando consequentiam, non enim sufficit sola receptio coni pyramidis in pupillam, sed debita oculi dispositio, quæ est deterior in pupilla magna quā in parua, neq; etiam species transeunt ita unitæ in magna sicut in parua. Et si inferatur ulterius, quod quanto pupilla est minor deberet melius uidere, speciebus. transeuntibus magis unitis. Dicitur quod non sequitur, quia potest esse ita parua quod extremitas pyramidis transeuntis per pupillam prius deperderetur antequam attingat crystallinum. Et hoc tenendo quod species rei uisibilis deferantur ad crystallinum sub forma pyramidis. In tela autem aranea potest esse omne genus egritudinis, unde per nocumentum eius potest uisus diminui, corrumpi, auferri, sed tamen de nocumento eius aut res non fecerunt mentionem tam specialem, eo quod est in profundo constituta non ita subiacens uisui. aliarum uero tunicarum præter corneam, uix & telam aranæ non nocumtum non est primum sed mediatum, lædunt enim uisum communicando nocumentum his de quibus sermo præcessit. Credendum tamen est quod omnes possunt pati malā complexionem cuiuscunq; generis, malam compositionem, solutionem continui & apostematam. Quarto et ultimo læditur uisus merito humorum. Albugineus ergo uel multiplicatur nimium, & hæc est una ex causis propter quam oculi sunt nigri, aut paucificatur aut naturaliter aut propter ægritudinem chronicam uel acutam ipsum resoluente. Et hæc est una ex causis propter quā oculi sunt glauci, sicut sunt oculi multorum ægrorum & conualescentium, qui postea sanitati restituti habent oculos nigros. Et non est dubium quod isti uident melius de prope quā de longe, melius nigra quā alba, melius in obscuro quā in claro, contrarii autem contrario modo se habent. Aliquando albugineus obscuratur aut propter uapores aut aduentum alterius materiæ ipsum turbidantis, aut quia propter aliquam ægritudinem taliter mutatur in substantia eius absq; aduentu alterius materiæ, & tunc male uidet in omni dispositione, licet minus male res claras in claro imo aliquando hac causa uisus auferatur aliquando autē corrumpitur ut cum est in eo præsentia uaporis aut cataractæ diminuta, propter quod existimatur aliquid obiectum esse coram pupilla quod non est. Crystalloides uero aliquando magnificatur, aliquando situatur uersus corneam. Et hæc due causæ sunt quod oculi apparent glauci, sicut contrariè faciūt oculos nigros. Aliquando nimis subtiliatur & non tolerat splendorem neq; bene uidet res albas, sicut cum incrassatur melius uidet in claro res albas, aliquando uero obscuratur propter causas similes, quæ dictæ sunt in albugineo, & in omni dispositione male uidet, sicut cum est bene clarus est causa perfectæ uisionis, aliquando crystalloides non est situata ex directo pupillæ, & si est eleuata sursum aut deorsum magis debito unū apparet duo. Si uero ad latera sit strabositas. Nocumentum autem uitrei ut dicit A. non est primum, sed lædit uisum pro quanto communicat nutrimentum crystalloidi, qui ab ipso nutritur, si dat ipsi nutrimentum infestum aut opacum. Et propterea omnia uaporosa, inflatiua turbidatiua sanguinem & spiritus, sicut legumina, uina turbida, coepæ & huiusmodi sunt uitanda. Ex his ergo iam manifestæ sunt causæ oculorum, licet colorentur oculi frequenter secundum colorem cutis & complexionis dominium. Pro cuius rei ampliori noticia sciendum est, coniunctiuam & omnes alias tunicas præter corneam & telam aranæ esse uere coloratas, non diaphanas, non lucidas. Cornea autem & tela aranea sunt diaphanæ non coloratæ neque lucide, licet secundum G. tela aranea sit lucentissima aut infra, Albugi-

neus

gineus uero & uitreus sunt diaphani, licet albugineus magis non colorati nec lucidi. Cryſtallois autem ſola inter cæteras partes eſt diaphana non colorata, habens lucem propriam, qua cæteras partes oculi luminis ſuſceptiuas illuminat, imo in quibuſdam animalibus illuminat medium extrinſecum, ſicut in cattiſ, lupiſ, leonibus, ſerpentibus, buſſonib. Sed ſolū reſtat una cauſa ſumpta ex multitudine ſpirituū, per quorū præſentiam oculus redditur glaucus & bene uidet in omni diſpoſitiōe, ſicut per paucitatem ſpirituū oculus redditur niger & male uidet in omni diſpoſitione, quæ quidem paucitas ſpirituū accidit aut propter paucitatem nutriti, aut diſpoſitione reſoluentes, aut propter oppilationem in neruis opticiſ, aut propter longum aſpectum rerum albarum & lucentium, ſicut accidit iter agentibus per niues, & qui ſolē intuentur, aut propter longam moram in tenebris, propter quam tandem ſpirituſ pauciſcantur. Et hæc eſt una ex cauſis propter quam ſi quis diu contraxerit moram in tenebris, poſtea ueniens ad lucem magnam, ſubito excæcatur. Illi enim ſpirituſ qui pauciſcati fuerunt propter longam moram in tenebris, propter lucem ualde intenſam, reſoluūtur antequā alii ſuccedant, & ſic remanent cæci, quæ cæcitas deinceps auferri non poteſt cum de priuatione ad habitum non ſit poſſibilis regressus. Quam rem Dionyſius Syracuſanus sæpe expreſſus hunc modo excæcans multos, quos diu incarcerationis tenuerat. Iam reſtat ut circa uisionem corruptam aſſignentur cauſe propter quid ſcilicet unum appareat duo, niſi enim effectus in propriis cauſis reſolueremus, nō poſſemus ei curam debitam adminiſtrare. Sex ergo ſunt cauſe quæ unum appareat duo. Prima ſumitur ex parte uelociſ & inordinati motus, ſive fluctuoſi ſpirituū deferentium ſimulachrum rei uisæ, prius enim quā prima ſpecies recedat à ſenſu communi in quo fit iudicium, imprimitur ſecunda ſpecies eiſdem uisibilibus delata per ſpirituū ſubſequentem propter agitationem in ſpiritu uisibili deferente, ſicut appareat cum forma ſolis ſuſcipitur in aqua uelociter fluente, apparent enim duæ formæ ſolis, recepta noua forma in aqua antequam prima deſtruatur, & ſicut appareat gutta uelociter mora, quæ ſit una linea, & in baculo ignito uelociter circumducto quæ ſit circulus. Hoc autem accidit ebriis, iratis, hiſ quibus caput eſt contuſum propter caſum aut offenſionem, quibuſcumque ex quacunque cauſa ſit hic motus inordinatus & fluctuoſus ſpirituū.

Secunda cauſa ſumitur ex parte humiditatis, ſeu uaporis ſeparantis ſpirituū uisibilem in duas medietates, uel plures, quod accidit etiam habenti ſolummodo unum oculū, & hæc ſeparatio poteſt eſſe ante cryſtallinum in ipſo cryſtallino, & poſt ipſum ſicut accidit in rheumatismis & in principio aquæ. Tertia cauſa, quando unus oculus magis quæ alter cōtrahitur em reſtitutionem, aut propter ſpaſmum illius muſculi, qui eſt ad retinendum oculum, aut propter contractionem unius nerui optici magis quā alterius, aut alterius relaxationem, unde propter breuitatem uisæ ſimulachrum rei uisæ citius deſertur per unum neruum quā per alium ad ſenſū communem, & ſic primo ſimulachro non corrupto in ſenſu communi reliquum ſubſequitur. Quarta cauſa eſt diſcōtinua tio neruorum opti corum propter ſpaſmum unius duorū neruorum aut amborum; unde ſpecies non uniuntur. Quod etiā poteſt accidere à caſu aut à percuffione. Quinta cauſa ſumitur ex parte unius oculi contorti ſurſum aut deorſum ſicut in ſtrabofitate, non autem ad latera, quia in hac conuerſione unius oculi ſurſum aut deorſum ſpecies delatæ ad ſenſum communem non uniuntur in coniunctione neruorum, ſed tranſeunt ſeparatæ, non autem eſt ita in contorſione ad latera, quia in hac neruus opticus non tñ contrahitur. Et hæc eſt cauſa quam aſſignat Ariſt. 3. problematum, problemate. 7. Et G. 10. de utilitate particularum cap. penultimo, licet huiusmodi ſolutio multas patiatur inſtantias, quas gratia breuitatis omitto. Sexta cauſa dicta eſt ſuperius de intentione Ieſu Hali, quando cryſtallinus eſt ſituatus à magis ſurſum aut deorſum debito, quod credo intelligendum eſſe altero cryſtallino non ſimiliter ſituato. Super eſt dicere cauſas corruptæ uisionis reſpectu motus & quietis, reſpectu propinquitatis & diſtantie. Cauſe enim quare quieſcens appareat moueri, eſt motus fluctuoſus & inordinatus ſpirituū de cuius

cauſis dictum eſt ſuperius. Hiſ adde multitudinem uaporū permixtorum ſpirituū qui ſunt cauſe inordinati motus ſpirituū ſicut in uertigine & ſcotosia ſufficenter dictum fuit, ſpirituſ enim ſequitur motum uaporum ſecum permixtorū, ſed de hoc ſufficiant quæ dicta ſunt in uertigine. Quod autem mota appareant quieſcentia non credo contingere. Cauſe autem quæ diſtantia propinqua appareant, ſunt cauſe ſuperius dictæ, quod magna apparent parua, quia ſi res magnæ apparent parue etiam diſtancia inter oculum & rem uisam quamuis ſit etiam magna apparebit parua, & per conſequens res uisa apparebit propinqua, & cauſa quare propinqua appareat diſtantia, ſunt cauſe hiſ contrariæ. Et forte propter hanc cauſam diſtantia & propinquitas non ſunt ſextum ſenſibile commune, ſed ad magnitudinem reducuntur.

Signa debilitatis uisus absolute habentur ex relatu ægri. Quod ſi referre neſciat, aut ſi forte uelles ad excellentiam artis dicere, quas ægri tudines patitur, cōſidera oculum & omnes partes eius quantum pupilla ſit dilatata, aut conſtricta, quæ bene ſit clarus oculus, quā bene moueatur, & cōſidera diſpoſitionem membrorum, per quorum communem oculi poſſet lēdi, & nunquid parentes eius fuerunt debiliū oculorum, nam medicus exercitatus ſciat dicere, quas ægri tudines patitur, & quas uerſimiliter eſt incurſurus. Si uero oculus lædatur per communem à toto uel à parte cognoscitur, quia præceſſerunt ægri tudines totius aut alicuius membri, cum quibus oculus eſt debilitatus, & quum augetur debilitas uisus, & e contrario minuitur cum illa minuitur, & quæ debilitas em plurimum communicatur ambobus oculis, imo pluribus ſenſibus ſimul. Et ſi fuerint cauſe calefacientes & exiccantes, appareat oculi concauitas & exiccatio, & lædatur ex ieiunio, ab euacuatione, & ab aere calido & ſecco, & iuuatur à contrariis, & interdum oculi apparent albi conſumpto albugineo, cum prius fuiſſent nigri aut mediū &c. Et ſi ſint cum materia ſicut in febribus humoralibus aliquando corrumpitur uisio uaporibus delatis ad oculum facientibus exiſtimare aliquod obiectum eſſe coram oculis, quod non eſt. Contra uero ſi fuerit à frigidityte & humiditate, & proprie ſic materia aderit inflatio oculi & forte cæcexia, iuuatur à calidiſ. ieiunio, euacuatione, nocetur à contrariis. Et ſi fuerit per cōitatem à ſtomacho, aderunt nocumenta ſtomachi.

Et ſi fuerit cum præſentia materiæ phlegmaticæ, patietur oculus imaginationes albas. Et ſi in ſtomacho fuerit præſentia cholæræ, patietur imaginationes citrinas, & ſi melancholiæ, imaginationes nigras, & em plurimum magis lædatur ſtomacho pleno uisus quā uacuo. Et ſic diſcurre per matricem & alia membra. Si uero lædatur uisus per communem ad caput, hoc declarant ipſius capitis diſpoſitiones præſentes aut præteritæ, maxime in parte anteriori exiſtentes. Et etiam quia non ſolum uisus lædatur, ſed em plurimum omnis ſenſus aut plures. Ponit tamē A. caſum ſpecialeſ quæ propter nocumentum cerebri ſtat aliquando homo oculis apertis non potens claudere palpebras, nec uidens ſed audiens, quod eſt propter nocumentum communicatum neruis opticiſ & neruis mouentibus palpebras abſque hoc quæ communicetur quanto pari neruorū cerebri, quod poteſt eſſe à cauſa primitiua & à percuffione, & ſimilibus & à cauſa intrinſeca aut à mala complexionem frigidiſ. & ſic. & eſt quædam ſpecies congelationis. Si uero ſit in uisio nocumentum per læſionem neruorum opti corum, ſcilicet apoſtoma oppilationem, ſolutionem continui, eſt ſecundum plurimum uisus abſolutus, ſed ſi propter apoſt. ad eſt. feb. & ſi propter oppilationem ad eſt grauitas ſine feb. & euenit ſubito ſecundum plurimum: ſi propter ſolutionem continui ipſa ſolutio eſt ſignū. Cognoscitur tamen oppilatio neruorum opti corum fricando unum oculum & tenendo alterum compreſſum, & uidere utrum in oculo fricato poſt fricationē aperto immediate comprehendatur pupillæ illius oculi dilatatio & cōſtrictio, quibus apparentibus non eſt oppilatio cum ſpūs libere tranſeant, ipſis uero non apparentibus ad eſt oppilatio id neruis opticiſ, & tū poſtea experire in alio oculo, tenendo primitum compreſſum. Si uero lædatur oculus per cōitatem ad em par neruorum em plurimū ſpeditur motus oculi, & euenit ſtrabofitas & frequenter unū appareat duo, ſtrabofitate facta ſurſum ad deorſum. Et cū ſit ſurſū, res uisa appareat magis infra.

Io. Arculani.

H

ce

Et cum sit deorsum appareat magis desuper. Similiter si fiat ad latus dextrū, res uisa apparet magis in sinistro & e contra.

Sed nunc agamus de signis debilitatis uisus per essentia. Si ergo fuerit propter malam complexionem aut compositionem aut magnitudinem oculi aut eminentiam, sensui nota est, subtilitas uero spirituum comprehenditur quia uidet sine percrutatione sicut e contrario in habentibus spiritus crassos requiritur percrutari, aliter uehemens intuitus, & aliquandiu obiectum intueri ad bene uidendum. Similiter subtiles non tolerant longam moram uisionis nec aspectum rerum lucentium nec medium ualde luminosum, sed contra euenit habentibus spiritus crassos. Et hi non bene uident in obscuro sicut priores, & bene uident de longe, male de prope, sicut subtiles e contrario. Spiritus autem turbidi male uident sem omnem dispositionem, melius tamen in claro & res claras quam in obscuro & res nigras, & frequenter patiuntur imaginationes. Spiritus autem disgregati cognoscuntur per causas ipsos disgregantes. Ut quia iter egerunt per niues & diu aspexerunt res lucentes & albas, & immediate post illud, male uident in obscuro. Aui. uero reddens rationem huic, scilicet quod habentes spiritus crassos sicut fenēs, bene uident de longe, male de prope, & habentes subtiles e contrario, dicit, quod si uisio fiat extra mittendo, tunc radius uisualis exiens ab oculo & tendens ad rem uisam longinquam, si crassus est subtiliatur, & ad medium reducitur proportionatum uisioni. Si subtilis est, resoluitur, sed uidendo propinqua, si subtilis est in sua subtilitate conseruatur crassus autem non subtiliatur quantum est oportunum pro uisione, quare habentes spiritus subtiles melius uident de prope, sed habentes crassos melius de longe. Quare opinio nullo modo saluari potest, nam per radium uisualē aut intelligunt spiritum uisibilem, est; corpus sicut manifeste expressit Iesus Hali & Gētilis. Et tunc sequitur quod uisio non fiat in instanti, imo exigit tempus ualde magnum, scilicet, antequam spiritus transeat ad obiectum ualde distans, sicut ad cōelum, non enim postquam corpus est, possunt transire in pleno, nisi cum resistentia. Amplius hic spiritus in tanta distantia, & in tam frequentibus aspectibus debent omnino cōsumi, etiam si essent multo pluris quantitatē immensā. Præterea, cum transeant per media distemperata, ut puta per sphaeram ignis, deberent corrumpi & sic uisio impediri. Rursus quomodo hæc corpora transiret per sphaeras cōeli quæ nequaquam solui possunt nisi daretur penetratio corporum, &c. Ultimo ex statu uenti debet linea uisualis impediri uento simul impediēte aerem & spiritus. Non credo itaque quod sit possibile uisionem fieri per exitū spiritus ab oculo ad rem uisam. Si uero per radium uisualē intelligant speciem ab oculo exeuntem ad rem uisam, quod tamen non placuit Gentili, tunc stabit difficultas eadem nō soluta, quam ipsi hoc ponendo, soluere uolunt, non enim apparet quomodo spiritus crassus subtiliatur propter exitum specierum, quæ sunt intentionales nihil resoluentes, aut minuētes de substantia oculi, aut spiritus. Præterea species intentionales quomodo possunt subtiliari aut incrassari? Præterea, si species intentionales uadant ad obiectum, non propter hoc uidebitur obiectum, nisi similitudo uel species obiecti ueniat ad ipsum oculum, quare uidetur frustra in uisione tot species multiplicari. Si autem uisio fiat intus suscipiēdo, speciebus intentionalibus ab obiecto ad oculum transeūdo, tunc dicit Auic. quod obiecto existente longinquo, crystallinus multum commouetur, ex qua forti commotione si spiritus est crassus, subtiliatur & ad medium reducitur, spiritus autem subtilis nimium reloluitur, sed obiecto existente propinquo non fit glacialis motus ita fortis, & per consequens spiritus crassus non subtiliatur, sed subtilis bene uidet in sua subtilitate conseruatus, quare opinio nisi haberet Auic. & reliquos autores ipsam defendentes, multum uideretur extranea, non enim apparet qua ex causa propter aspectum ad longinqua glacialis moueatur non ab obiecto, quia eo quod distans est minus potest in glaciale imprimere quod propinquum esset, & sic ipsum minus commouere, non etiam a lumine medii, quia siue obiectum sit propinquum siue longinquum idem est lumen alterans oculum glaciale & spiritus. Forte dicitur sicut placet Iacobo Forliuensi, quod licet sit idem lumen totale mouens oculum aspicientem

de longe & oculum aspicientem de prope: non tamen uterque oculus totaliter irradiatur, quia maior multitudo radiorum rectorum peruenit ad oculum distantem quam ad propinquum. Contra sit a. oculus, spirituum crassorum uidens b. obiectum ad distantiam pedalem, et c. omnino simile b. ad distantiam bipedalem: manifestum est quod ab eadem multitudine radiorum rectorum illuminatur a. oculus simul uidens b, et c. Præterea omnes radii existentes in medio luminoso peruenientes ad oculum sub forma pyramidis perueniunt ad oculum, ergo omnes tales recti perueniunt ad oculum, ergo non maior quantitas radiorum rectorum peruenit ad oculum uidentis de longe quam de prope. Assumptum probatur, quia simile est de radiis & speciebus uisibilibus, sed stante oculo fixo sem unum situm eieciato uisibili, aut depresso, aut laterali moto: intra tamen distantiam in qua uideri possit semper species recte perueniunt ad oculum, ergo erit ita de aliis, sic etiam in speculo omnes species obiectorum quomodocumque situatarum, & omnes radii uenientes ad speculum recti perueniunt ad ipsum, ergo oculus ab equali quantitate radiorum rectorum irradiatur siue uideat de prope, siue de longe. Præterea si fieret uisio in medio obscuro, obiecto existente in claro, sicut est possibile, non apparet quod habens spiritus crassos deberet melius uidere de longe quam de prope, quia spiritus sui non subtiliarentur a lumine medii. Et in hoc casu habens spiritus subtiles debet longius uidere, quam habens spiritus crassos, quia spiritus sui subtiles in medio obscuro & frigido in sua subtilitate conseruabuntur & crassi non subtiliabuntur, imo incrassabuntur. Nec etiam potest dici quod spiritus magis subtiliatur propter obiectum longinquum, quam propinquum propter laborem, cum tantus labor & difficultas sit uidere longinqua magna sicut propinqua parua, quare ratio placuit Iacobo Forliuensi: imo equalis difficultas est uidere quæcunque obiecta nimis de prope, sicut nimis de longe, cum neque propter nimiam propinquitatem, neque propter nimiam longinquitatem possint uideri, ergo in uidendo de prope & de longe spiritus æqualiter debet subtiliari. Latitudines enim difficultatis uisionis propinqua & remota sunt æquales, cum ambe ad non gradum potentie uidendi terminentur. Ultimo si propter uisionem ad longinqua spiritus crassus subtiliaretur, sequitur quod immediate post illud cum factus est subtilis deberet bene uidere de prope, cuius oppositum experimur. Solent ergo perperetini soluere dicentes, quod quanto conus pyramidis rei uisæ est acutior, tanto magis imprimitur in uisum, & spiritum uisibilem amplius debilitat, sed conus pyramidis obiecti quanto est distantiior tanto est acutior, ergo quanto est distantiior, tanto magis imprimitur in uisum, & debilitat spiritum uisibilem. Cum ergo spiritus subtilis sit debiliior spiritu crasso magis debilitabitur ex distantia obiecti, quam spiritus crassus, quare non potest ita de longe uidere sicut spiritus crassus. Contra autem obiecto appropinquante conus pyramidis est obtusior, & per consequens minus imprimens in oculum, & propterea cum maiori propinquitate ab oculo spiritus subtilis poterit uideri, cui parua impressio sufficit ad uisionem: non autem ab oculo habentes spiritus crassos cum maiori pro causanda uisione necessaria sit impressio. Sed contra, sequeretur fieri saltum de extremo ad extremum sine medio, & latitudinem actionis subito deperdi: quod patet, quia obiecto ab oculo recedente, donec in fine horæ non uideatur, nam continue intenditur per totam horam impressio obiecti in oculum, quare tamen in fine horæ est sub non gradu. Secundo sequitur, quod habens spiritus crassos uideret obiecta minora, quam habens spiritus subtiles, cōsequens est contra experientiam. Probatur consequentia, quia quanto obiectum est minus, conus pyramidis est acutior cæteris paribus, & per consequens magis impressius iuxta responsionem hanc, ergo, &c. Præterea lucidum siue album quanto est propinquius oculo, tanto agentius imprimitur in oculum, ergo responsio falsa. Et confirmatur, quia omnis actio fit per contactum & debitam approximationem agentis ad passum. Sed quanto obiectum magis appropinquat oculo magis sibi approximat, quare, &c. Quidam clarissimus doctor res soluit hos effectus in corrugationem pupillæ, id est partis corneæ ex directo pupillæ: uel pupillæ, id est, foraminis uel

ditur

dicat q̄ in plerisq; sicut in senibus corrugatur pupilla ex consumptione humidi substantifici, quapropter minoratur em quamlibet partem sui. In his ergo conus pyramidis rei uisæ non suscipitur nisi in parte nõ corrugata, quæ, quia parua est, nõ potest suscipi nisi sit paruus: nunc autẽ quanto res uisa est distantiõr, tanto conus pyramidis est acutiõr, & per consequens melius suscipietur in parte non corrugata parua, & p consequens melius uident de longe, q̄ de prope. Cõtra, quælibet pars pupillæ siue corrugata, siue non corrugata est diaphana, ergo in qualibet parte & in tota superficie suscipitur conus pyramidis, tenet consequentia, & assumptum manifestum est ad sensum. Secundo sequeretur, q̄ deberet melius uidere obiecta parua q̄ magna. Consequens est contra experientiam, probatur consequentia, quia conus pyramidis obiecti parui est minor, & per consequens melius suscipietur in parte non corrugata. Tertio sequeretur, q̄ isti deberent curari per humectantia, consequens est contra experientiam, nam curantur per exiccantia. Quarto, q̄ hecicus senectutis, aut consumptus ex ageridine ex simili fundamento deberet melius uidere de longe q̄ de prope, consequens est contra experientiam, ergo, &c. Quinto, hæc opinio est insufficiens cum reperiantur iuuenes melius uidentes de longe q̄ de prope, & e contrario aliqui, quorum effectum causa non potest resolui in corrugationem aut non corrugationem pupillæ. Item sequitur q̄ senes deberent æque bene uidere obiecta minora sua pupilla, similiter iuuenes, quod est contra experientiam. Illorum autem error qui resoluunt hos effectus in spiritus magnos & paruos, tunicas & humores crassos & subiles facile deprehenditur. Credo igitur aliter esse dicendum. Pro cuius rei declaratione præsuppono primo uisionẽ fieri per pyramidem uenientem ab obiecto ad oculum, cuius basis est in obiecto, conus in crystalloide, hoc suppositum communiter sentiunt philosophi & perspectiui. Secundo suppono, q̄ obiectum potest esse ita distans, ut non uideatur, eo q̄ conus pyramidis non attingat ad crystalloidem in qua fit uisio. Et si attingat ita debilitate imprimit, ut non sufficiat ad uisionem, similiter obiectum potest esse ita propinquum, ut non uideatur, eo q̄ conus pyramidis, licet perueniat ad pupillam, non tamen peruenit ad crystalloidem sub forma pyramidis impeditus à foramine uisæ, aut si perueniat ita debilitate imprimit, ut non sufficiat ad cauendum uisionem. Hoc suppositum experientia probatur. Tertio suppono, q̄ respectu cuiuscunque obiecti uisibilis est signanda certa distantia in qua optime uideri potest, ita scilicet, q̄ nec sub maiori illa, nec sub minori in eodem medio ita bene uideri potest, quæ distantia non est eadem respectu omnium oculorum. Si enim respectu alicuius obiecti pedalis distantia sit optima oculo temperatissimo habenti spiritus satis multos mediocriter subiles & optime illustres cum cæteris circumstantiis facientibus ad optimam uisionem. Maior distantia requiritur habenti spiritus crassos, cum qua scilicet, maior distantia obiectum fortius imprimat in oculum, & maior distantia requiritur habenti spiritus subiles, cum qua minori debilius fiat impressio. Quarto suppono, q̄ respectu cuiuscunque obiecti est signanda certa distantia in qua illud obiectum ex natura sua fortissime imprimit in oculum impressione faciẽte ad uisionem & oculum debilitante, quod nõ provenit nisi quia respectu cuiuscunque obiecti est signandus conus suæ pyramidis determinatæ acuitatis, cum qua optime imprimat in oculum, ita q̄ maior aut minor non ita imprimeret in oculum. Hoc experientia patet, & pro parte sequitur ex secundo. Et hæc distantia non est illa, de qua dictum fuit in tertio: ista enim diuersificatur secundum diuersitatem oculorum: hæc uero est una & eadem ex natura rei & respectu omnium oculorum. His præmissis soluitur problema, nam respectu cuiuscunque uisibilis habenti spiritus crassos requiritur illa distantia in qua obiectum fortissime imprimit in oculum impressione faciẽte ad uisionem optimam illius obiecti ab oculo, quia spiritus crassus non facile patitur ab obiecto. Et hæc distantia est maior illa quæ requiritur oculo temperato ad uisionem illius, cum minor impressio ad eius optimam uisionem sufficiat. Et quæ requiritur oculo temperato est maior requisita habenti spiritus subiles, huic enim ualde parua impressio sufficit ad uisionem, & a magna oculus debilita-

retur. Cum hoc tamen stat q̄ oculus temperatus melius uideret in omni distantia quàm habens spiritus crassos, & quàm habens spiritus subiles. Et similis solutio assignanda est respectu habentium tunicas & humores crassos aut subiles. Contra sequitur q̄ oculus spirituum subtilium deberet uidere ad maiorem distantiam, quàm oculus spirituum crassorum; quia ultra distantiam, in qua oculus spirituum crassorum exigit fortissimam impressionem optime uidet, remittitur impressio usq; ad non gradum: ergo erit deuenire ad impressionem optime proportionatam oculo spirituum subtilium. ad quod dicitur, q̄ non solum sufficit determinata impressio ab obiecto ad bene uidendum; sed etiam determinata coniacuitas oculis proportionata. exigit autem oculus spirituum subtilium conum obtusorem, & oculus spirituum crassorum conum acutiorem, & temperatus medium inter hos. contra sequitur, q̄ oculus spirituum crassorum posset uidere obiecta magis parua, quàm oculus spirituum subtilium; postquã exigit conum acutiorem: nam quanto obiectum est minus cæteris paribus, conus est acutiõr, negatur ad quod deducitur; nam licet ratione coniacuitatis debeat melius uidere: tamẽ deficit impressio sufficiens, quæ debet esse fortis in oculo spirituum crassorum, & debilis in oculo spirituum subtilium: quanto enim obiectum est minus cæteris paribus, tantò minus imprimit: sed, ubi obiectum paruum ab utroque uideri posset maior distantia exigeretur oculo spirituum crassorum, quàm oculo spirituum subtilium. & ex hac opinione inferitur, q̄ non oẽ agens quanto est propinquus passo, tanto fortius agit: licet enim illud sit uerum in actione reali; non est uniuersaliter uerũ in actione spirituali, ut docet experientia. Signa debilitatis uisus propter nocumenta tunicarũ, aut humorum sumuntur, sicut statim in exemplo declarabo. occurrit tibi Sortes conquerens de mala uoletudine oculorũ: debes igitur ipsum oculum diligenter aspicere notando compositionem, quàm eminens sit, & quàm magnus. quod, si uide res eminentiam præter modum, ac magnitudinem; nunciare potes ipsum esse debiliũ oculorum, & procliuẽ in multas passionẽs de repletionẽ, & q̄ ad præsens non habet perfectum uisum. postea etiam consydera, utrum oculus sit strabosus: & si strabositas sit ad latus dextrum; tunc ipsi nuncia, q̄ res uisæ debent ei apparere magis in parte sinistra, quàm sint: et si strabositas sit ad sinistram; nuncia oppositum. si uerò sit fursum, & notabilis; res debent apparere magis deorsum, quàm sint. & si strabositas sit deorsum; nuncia contrariũ, &c. Et si strabositas sit fursum, aut deorsum notabilis in uno oculo tantum, una res apparebit duæ. post hoc consydera dispositiones singularum partium palpebrarum carnis lachrymalis coniunctiue: & si quæ erunt dispositiones præter naturales; nunciare potes nihil interroganti, cum istæ uisui subiacerent post hoc consydera corneam, nunquid habeat pustulam, uel ulcus: quæ comprehenduntur ex signis superscriptis in cap. suo. si uerò nullum istorum habuerit; consydera, nunquid sit aliquod uestigium in cornea: & etiam si est cicatrix; nuncia præcessisse ulcus. si uerò albedo alterius generis, ipse passus est defluxum humiditatis ad oculum. post cuius resolutionem hæc macula remansit: & si huius macula, quæcunque modi sit, non sit ex directo pupillæ nullo modo uisum impedit: si uerò ex directo pupillæ occupans totam pupillam; consydera, an sit peruia, aut non: si enim sit peruia; potes nunciare, quod apparet, ut uideat per quoddam uelum. & si est alba; obiecta apparent alba: & si citrina; citrina, & si rubea, ut in tarsati rubea, & sic de singulis coloribus. si uerò non sit peruia, & occupet totam pupillam; tunc nuncia, quod nihil uidet, nisi forte splendorem. si uerò macula illa in peruia occupet medium pupillæ solum dic, q̄ omnia obiecta apparent in medio perforata. si uerò sit in latere dextro pupillæ; obiecta apparebunt diminuta in latere sinistro. & si in latere sinistro; apparebunt ex opposito diminuta. & si in parte superiori, aut inferiori; obiecta similiter apparebunt diminuta in parte superiori, aut inferiori. si uerò nullum istorum fuerit; consydera, an ipsa tunica cornea sit bene peruia, an non. q̄, si non; consydera, utrum proveniat ab humiditate superflua: quod declarabitur, quia testis est, oculus plenus, & multæ humiditates profluunt à capite, & oculo, & præcesserunt causæ repletentes; tunc dic ei, q̄ diminute ui-

Io. Arculani H 2 det,

det, ac si per uelum aspiceret. & si illa imperuities multū audita sit; dic, q̄ patitur irim prouenientem ex reflexione luminis crytalloidis ad nubem oculi, id est, ad humiditatem, quæ est in cornea, aut in albugineis; sicut in maiori mundo fit iris ex reflexione radiorum solarium à nube ipsi opposita. si uerò imperuities corneæ proueniat ex siccitate; tunc appareat, sicut corrugata, oculus diminutus cum pauca effusione humiditatum ab oculo, & cerebro: & tunc nihil habet nisi, quia diminute uidet, ac si uideret per uelum, ut supra. postea confydera pupillam, id est, foramen uueæ, utrum sit dilatatum, aut constrictum præter modum. quod, si extremè pupilla dilatata sit, aut constricta; ferè nihil uidebit. si autem notabiliter dilatata, aut constricta; non tamen extremè uidebit omnia maiora quàm sint propter constrictiōem: propter dilatationem uerò omnia minora, quàm sint. post hoc cōfydera, nunquid uideatur homo oculi, id est, forma aspicientis in oculum. quod, si non uideatur, tunc istud est aut ex defectu corneæ, aut albuginei, aut crytalloidis, aut telæ araneæ. si quidem uideris corneam obfuscata non solum ex directo pupillæ, sed in aliis partibus; argue, quod sit ex nocumento eius. si autem uideris corneam bene peruiam, argue albugineum turbidatum, uel telam araneam, uel crytalloide: inter quæ distinguitur interrogando egrum, an appareat ipsi nubes prohibens uisum, & tunc est ex nocumento albuginei obfcurati: uidet enim parum, aut nihil. si autem non uiderit nebulam, & non apparet homo oculi, ut supra; tunc iudica turbidationem telæ araneæ, & crytalloidis.

Pro quo sciendum, quod homo oculi, siue idolum oculi, quod est forma aspicientis, est in tela araneæ, per quam reflectuntur species aspicientis in oculum, ut est apud Haliabatem tertio theoricæ, & apud Gal. 10. de utilitate particularum. 6. cap. cuius hæc est littera. Pupillæ idolum in hac tela araneæ uelut in speculo quodam consistit; est enim lenis, & micans super omnia specula. sed contra sequeretur uisionem non perfici in crytalloide: cuius tamen oppositum omnes arbitrantur. consequentia probatur; quia, si à tela araneæ, quæ est ante crytalloidem: reflectuntur species uisibiles, sicut in speculo: ergo aliquantulum terminat species uisibiles, sicut & speculum. ergo, cum non perfecte transeant ad crytallinum; non fiet uisio perfecte in crytallino. ad quod dicitur, q̄ in superficie crytallini, cui hæc tela araneæ tenuissima est immediata; perficitur uisus, & simul ab hac tela, & superficie crytallini reflectuntur species, & sunt causa apparitionis hominis. sed hanc Gal. appropriauit telæ araneæ tanquam parti densiori. neque etiam ualet argumentum, reflectuntur aliquantulum species per telam araneam: ergo non transeunt species sufficientes pro uisione ad crytallinum. nam à quocunque membro fiat reflexio; certum est etiam species transire per neruos opticos ad sensum communem. si autem nullum istorum nocumentorum, quæ dicta sunt appareant tibi aspicienti in oculo; tunc confydera, utrum nocumentum sit in neruis opticiis, & tunicis sequentibus crytalloidem: & tunc facias experimentum, de quo supra, an pupilla per constrictiōem, & alterius oculi compressionem dilatetur, & constringatur, an non. si non; tunc argue oppilationem in neruis opticiis, aut in tunicis posterioribus oculi, & nuncia ei ipsum non uidere. sed inter oppilationem neruorum, & tunicarum disceritur; quia, si subito euenit, & ablata sit uisio, subito est in neruis opticiis: si uero paulatim; est in tunicis posterioribus. sed in qua sit, est difficile comprehendere. cognoscitur tamen causa nocumenti, an sit mala complexio, an apostema: & etiā quæ species male complexionis, & apostematis per signa horum propria ex capitulis generalibus perquirenda. quod, si uideris oculum bene dispositum fm omnes partes apparentes, & uidet ipsius debitum motum non strabositatem, non oppilationem; iudica ipsum esse sanum, nisi forte haberet imagines per essentiam, aut per communitatem, de quarum signis infra dicitur in capitulis propriis: aut nisi forte haberet dolorem, qui per uisum à medico cognosci non potest: aut forte unum apparet duo propter aliquas ex causis superscriptis, quæ uisui non subiacent; aut nisi haberet diminutam uisionem causa spirituum, de qua supra.

Aliud ponendum in practica est, ut per signa propria distinguamus inter causas colorum oculorum, ut sciamus effe-

ctus in proprias causas resolueret, & eisdem curam adhibere, si oportuerit. si ergo occurrens tibi habeat oculos glaucos; debes confydere primò, an color cutis totius corporis, & pilorum sit similiter glaucus, id est, albus: & tunc hanc albedinem oculi debemus in dominium complexionis phlegmaticæ corporis, & humorum resolueret. si uerò non habeat similem colorem in cute, aut in pilis; debemus querere, an hæc glauco sit contracta à generatione, an ex tēpore propter aliquam dispositionem præcedentem. si sit ex tēpore, & habeat oculos aliquantulum concauos, scilicet, magis cōfucro, & exiccato; prouenit ex diminutione humoris albuginei: præcipue si non uideat ita bene res splendentes, & in claro, sicut consuevit. si uerò hæc albedo sit naturalis; quærendum est, an bene uideat in omni dispositione, an non: si bene; est illa albedo ex altera duarum causarum: aut ex multitudine spirituum, & claritate, aut ex magna relucencia crytallini: inter quæ distinguitur: nā si fuerit hō bonæ habitudinis, bene coloratus, abundans in sanguine, & spiritus; credendum est illā glaucedine prouenire ex multitudine, & claritate spirituum.

Si uerò haberet dispositiones his contrarias; prouenit ex relucencia crytallini. si uerò non bene uidet in omni dispositione, imò melius in obscuro, q̄ in claro; potest ex tribus causis cōtingere: aut ex paucitate albuginei, aut ex parua nigredine uueæ, aut ex magnitudine crytallini, siue positione eius uersus partē anteriore oculi: inter quæ distinguitur: quia, si ex paucitate albuginei oculus apparet concauus, depressus non plenus. si uerò ex pauca nigredine uueæ, aut ex defectu crytalloidis, hoc nō apparet. sed inter illa duo distinguitur, quia, cum crytallois est magna, aut posita uersus partē anteriore, apparet albedo oculi cū relucencia. si uerò sit ex defectu uueæ, apparet oculi albedo sine relucencia: sed inter magnitudinē crytallini, & positionē eius uersus superficiē oculi distinguitur: quia, q̄ est locata multū uersus superficiem: uidet nigra, bene etiā in obscuro: alba uerò male etiā in claro. sed, q̄ albedo prouenit pp magnitudinē crytallini: aqua liter bene, aut male uidet in claro, & in obscuro: sed tñ non ita bene uidet in aliqua dispositione, sicut est conueniens. & ex signis cōtrariis si cōfyderaueris: signa distinctionis carum colorū nigrorū, cōprehendere poteris. hæc dixi, quæ nunquā legi, neq; audiui. Tu autē si in aliquo est erratū, corrige & c.

Prognostica. Primum. defectus uisus per communitatem ad neruos opticos fm plurimum irremediabilis est, nisi tribus, aut quatuor diebus corrigantur. Secundum. defectus uisus propter paucitatem spirituum, & causas inanientes est deterior, quàm propter crassitiem eorum, & causas replentes. tertium. debilitas proueniens propter crytalloidem, & telā araneam est deterior ceteris, & minus corrigibilis.

Si cum debilitate uisus humiditatis signa apparuerint manifesta, quæ tempore famis, & exercitiū parumpert dissoluantur; pilule cochie multoties assidue crunt tribuendæ. nutrimentum quoque patientis desiccatum esse debet. & aeger saepe uomere cogendus est. pulueres etiā desiccatiui oculis sunt imitendi.

SCHOLION.

Dissoluantur. Manuscriptus textus habet dissolui uideantur.

Hoc capitulum diuiditur in tres partes. in prima ponit curā debilitatis uisus pp humiditatem phlegmaticā existentē in toto, aut in cerebro, aut stomacho, aut alio mēbro, oculis etiā cōcatam. sub qua est cōprehēditur cura illius, quæ est pp turbulentiā, & crassitiē spirituum. in secunda parte incipiente, q̄, si cū prædicta, ponit curā illius, quæ prouenit ex inanitione totius, & exiccatione tunicarum, & humorum oculi, nec nō ex paucitate, & subtilitate spirituum. in tertia ibi.

Confectio alcohol, reuertitur ad ponendas medicinas locales ponendas in oculo pro curatione debilitatis uisus ex repletionē. à cuius cura incipit in principio capituli.

In prima parte omnia clara sunt, nisi quod, quamuis solū ponit medicinam euacuantem humiditates phlegmaticas, scilicet pilulas cochias, & non ponat digerentia, ut breuitati indulgeat, dat tamen ea intelligi. quorū superius multiplicem posuit descriptionem, ad quæ recurre. intellige etiam dum dicit, Aeger saepe uomere cogendus est, scilicet cum facilitate, donec cibus, & materia phlegmatica stomachum

chum replens, oculis communicas sit educta: uomitus enim uolentius facit oculos exire, ipsos debilitans, & materias ad ipsos præcipitans: propterea oculi in uomitu ligandi sunt. nutrimentum patientis debet esse desiccatum; tum quia paucum, tum quia actum, & potentia siccum. quapropter à nimio potu, & brodialibus est cauendum.

Quod, si cum prædicta ægritudine assuerint siccitas, & corporis obfuscatio; nutrimentum erit augendum, & uinum in potu est tribuendum, ac super caput ipsius aqua tepida fundenda, & incuruatio super eam facienda. balneum præterea ingrediatur: in quo tamen non multum sudet. naribus quoque oleum de amygdalis dulcibus, atque auribus est immittendum. oculis uero lac mulieris adolecentis quaque die est iniiciendum: quod etiam frequenter fieri conuenit. hæc uero debilitatis uisus species fortior sit in tempore famis, & dum uenter uacius fuerit.

Ponit curam debilitatis uisus contingentis ex siccitate: ad quæ sequitur corporis obfuscatio sanguine, & spiritu paucificatis, in qua lac imponendum est oculis adolecentis debet esse, quia magis humidum, magis uiuificum, & spiritu uolamplius spiritus, & oculis confortans.

Confectio alcohol, quod ualde acuit uisum, qui à causa humoris debilitatur. Recipe tutia abluta, & siccata drach. 20. deinde extrahatur succus sampuci uiridis, & per noctem unam residere dimittatur, & coletur. ex quo tutia confersa dimittatur, quousque siccetur: postea teratur deinde sumantur zingib. piperis nigri, macropiperis, chelidonie omnium ana. drach. 2. salis ammoniaci drach. 1. cum tutia fuerit drach. 20. post hæc omnia terantur, & ex succo teneri feniculi conspergantur. & siccata iterum terantur, & reponantur: & cum necesse fuerit, oculis immittatur. ad hoc præterea ualde confert sies de fellibus.

Quod dicit in tertia parte notum est. est enim pulvis iste exiccatus, resolutius uaporum, & humiditatis turbide, & ipsius cum lachrymis eductius, & cum hoc ingreditur tutia, & chelidonia oculum confortantes. collyria etiam de fellibus, & quædam alia pro ampliori doctrina istis adiungantur, &c.

Cum debilitas uisus dupliciter eueniat per essentiam, & communitatem: ab ea scilicet, quæ per communitatem euenit, est inchoandum. & primò ab illa, cuius causa est totius corporis repletio, aut alicuius particulæ oculis communicantis maxime stomachi, cerebri, & neruorum: horum enim communitate frequentius uisus debilitatur; quia communitate aliorum membrorum maxime stomachi, cum uaporum multitudine, tum uiarum latitudine, tum quia directè respicit oculos, & partem cerebri anteriorem.

Cuius curatio quinque exigit intentiones curatiuas: prima euacuat: secunda diuertit: tertia regit membrum mittens: quarta oculum confortat: quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. prima quidem intentio, si causa repletionis fuerit sanguis, qui dominatur, perficitur cum phlebotomia, aut alia euacuatione huic proportionali: necnon prouocatione hæmorrhoidarum, & menstruorum, si eorum retentio fuerit causa: & similiter, cum euacuatione cuiuscunque humoris, cuius causa oculis debilitatur. de quibus omnibus nec non digestiuis superius sufficienter dictum fuit in plurib. causis, & si materia fuerit in stomacho, prouocetur uomitus: sed leuiter iteratis uicibus: ne uomitus impetuosis materias oculos præcipitet, & ipsos debilitet. Secunda intentio perficitur cum frictioibus, uentosis, clysteribus, crurum lotionibus. item, si expediret cum phlebotomia uenarum nocte, & quæ sunt post aures, &c. ut supra in ophthalmia, aut in his locis sanguisugæ applicentur. summo opere tamen caue à nimia sanguinis euacuatione: nam spiritus paucificantur, quorum magna copia est necessaria ad uisus fortitudinem. si uero materia fuerit phlegmatica, aut alterius generis: diuertenda caput purgiis, masticatoris, gargarismatibus. caput purgia tamen per nares postponantur, quantum possibile est. ultimò uero his non sufficientibus fiat cauteriū, aut

in occipite, aut in coronali: potentiale, aut actuale: quod melius est, de quo supra. Tertia intentio, scilicet membri communicantis regimen, & maxime stomachi, perficitur cum confortantibus digestiuis eius, & arcentibus uapores à capite præmissa euacuatione: ad quod in causa frigida optimè confert triphera minor. item chebuli conditi, & proprie in mane sumpti: in calida uero triphera descriptione Mesue in capite de debilitate uisus, cuius est hic textus. Sabor triphera mirabilis uisum confortans, cuius accedit impedimentum propter fumos ignitos cholericos, aut falsos: & est ei impressio fortis; reducit enim oculos ad formam uigoris adolefcētis. R. mirobalanorum citrinorum, chebulorum, & indorū ana. 3. 2. s. belliricorum, emblicorum. ana. 3. 2. sacchari. 3. 6. tere in uase lapideo, & funde super ipsum aquæ fontium claræ aspergendo parum post parum & hoc fac per triduum, deinde permitte exiccari, & postea sparge super ipsum distillando ex oleo rosæ & amygdalarum, & contere per alios tres, & iterum permitte exiccari: deinde accipe rosarum, sandali, cu beba, machasar, id est, sandali citrini, cordumeni, ana. 3. 2. spo dii, macis ana. 3. 1. succi galliæ miscatæ. 3. 1. s. deinde accipe sacchari albi lib. 1. & fac ex eis formulas similes auellanis, & da quolibet mane ana. 3. 2. ad 3. cum aqua calida. & in hac causa optimè confert saccharum rosæ & mirobal. citrini conditi. quarta intentio perficitur cum his, quæ in oculo ponuntur complexionem, & unitatem conseruantibus, præseruantibus, & curantibus, si quid nocuenti impressum sit, & spiritus, & humores illustrantibus. ex quibus est aqua communitalis facta ex feniculo, uerbena, rosa, chelidonia, ruta, per distillationem, aut decoctionem. & in causa frigida optimè confert collyrium ex lamine auri superius descriptum in cōseruatione oculi. aliud collyrium in causa calida descriptione Mesue: confortat enim uisum debilem, & sedat multitudinem lachrymarum. R. antimonii loti, & præparati in aqua pluuiæ circa dies uiginti, tutiæ præparatæ, climiæ, id est, spu mæ argenti, uel auri ana. 3. 6. marchasitæ. 3. 4. tere unūquodque per se, & tere benè per dies plurimos cum aqua pluuiæ multoties, donec siccetur aquæ eorum: deinde terantur cum aqua feniculi multoties cum continuitate dierum aliquorum, similiter donec exiccetur: tertio uero cum aqua sampuci: quarto cum aqua rutæ: quinto cum aqua chelidonie: deinde exiccetur, & addatur cum eis sedenegi præparati, id est, lapidis hematitis, & croci, ana. 3. 1. margaritarum non perforatarum. 3. 2. musci. 3. 1. tertiam, camphoræ. 3. s. & proice ipsa in mortario cum prædictis. deinde adde sumach. 3. s. tere, usquequo exiccetur, & fac alcohol: & administra mane, & sero; quoniam probatum est & expertum. quod, si non uolueris ipsum administrare in forma alcohol: distempera cum aqua rosata, aut feniculi, secundum quod est conueniens suo proposito, &c.

Quinta intentio complectur, ut infra. sit aer temperatus, aut parum à temperie declinans secundum exigentiam dispositionis corrigendæ. uitandus est aer fumosus, uentosus, nebulosus, ualde clarus, & nimium obscurus. habiterq; in domo non alba, neque nigra: sed coloris medii, & proprie uiridis declinantis ad obscurum, aut clarum secundum exigentiam dispositionis corrigendæ: aspectus enim rerum uiridum maxime cōfert; sicut aquæ uiridis, aut existentis in uase uiridi: in qua si oculi super elefacti teneantur aperti tempore æstiuo; confert in uisus cōfortatione. & similiter aspectus gemmarum uiridū, sicut smaragdi, similiter speculi uiridis optimè enim confortat. sit eius potus uinum cistolum benè clarum, pauciferum, aut mediocriter uinositatis lymphandum magis, aut minus cum aqua benè conditionata secundum discretiam temporis, & circumstantiarum exigentiam. non bibat tamen nisi in prandio, & cœna, & non superflue, neque bibat in fine mensæ: sed, postquam potauerit, aliquid uaporis repressiui accipiat: ut citronia, aut pyra condita, aut coriandrum confectum, aut præparatum. sit eius panis benè conditionatus, in quo aliquid feniculi, aut similiū uisum confortantium ponatur. sint eius salata cappares, ruta, uerbena, chelidonia, feniculus, endiuia, scariola, sparagi, cicorea, lupuli, uitetur lactuca. quæ salata condiantur cum aceto non multum acuto, aut cum uino granatorum, & agresta secundum dispositionis exigentiam. melius tamen est, ut coquatur, ut sint facilioris digestionis. sint eius fercu-

Io. Arculani.

H 3

la,

la, quæ ex pane, aut ouis fiant fm omnem usum communem. ex granis conueniunt hordeum, pannicum, spelta, far, rizû, & propriè ubi opus esset nutrimento crassiori. uidentur faba, phaseoli, cicera, lètes, mes, id est, bisi sit raro in usu. ex herbis conueniunt fœniculus, herba adil, quæ est similis tamari sco, petroselinum, serpillum, salua, maiorana, borago, rapa, cucurbita, in dispositione, & tempore calido amygdalata sermia. uidentur tamen fercula in coenis, & propriè in dispositione humida. uidentur anethum, ex carnibus magis cõueniunt aues, q̃ quadrupedia, & propriè quæ sunt facili digestiõis paucarum superfluitatum; sicut perdoes, phasiani, turdi, alaudæ, turturæ, columbi uolare incipientes: & passeris sunt proprii. ex quadrupedibus conueniunt uiculi, hædi, crastati annuales, lepores, capreoli, cuniculi, quæ in prandio sunt elixæ: in coenis assatæ, saltem quæ ex his sunt faciliõis digestiõis. ex piscibus minus nocui sunt petrosi, agiles, parui in specie sua, & squamosi; sicut ceualii, lucii, strili, cauedani, barbones, eorum ouis abiectis, fenetæ, scardue, marlones, & carpiones. uidentur tinche, anguilla, cancri, sturiones: pisces tamen marini minus nocui sunt. eligantur ergo ex eis conuenientes secundum speciem suam: frequens tamen usus piscium inducit cæcitatem. sapores conuenientes tempore frigido, & in dispositione multum frigida sunt piperata, & si milia cum aromatibus, & melle, & saccharo condita. uidentur alleatæ; sed tempore calido, & dispositione calida, uinum granatorum, & agrestæ, & acetum pauca acuitatis, & sapores, qui ex his sunt sicut salsa, & similes. uidentur omnes sapores, qui sunt ex coepis, porris: omnia enim hæc acrimina uitanda sunt. uidentur lac, & lacticia; licet aqua lactis conueniens sit, butyrum, & oleum conceduntur. uidentur caseni. ex fructibus conueniunt ficus, & ueræ benè maturæ: similiter ueræ siccæ, pruna, mora, pepones. sed præstantia sunt pyra, & citonia cocta in fine mensæ. item conueniunt auellana, amygdalæ, pinæ piperatæ, & filica. ex conditis conueniunt pyra, & citonia. sed zing. conditum in dispositione, & tempore frigidis. aromatica conueniunt; sicut zingib. piper, cinamomum, macis, nux muscata, gariophili, crocus in dispositione, & tempore frigidis. sed in cibatione hæc regula obseruentur, ut nunquam comedat nisi digestione celebrata. surgat a mensa cum reliquiis famis: non multiplicet cibaria in mensa una. sit coena leuior prandio; imo frequenter coenam dimittat. & in coena nitet brodiaia. sit somnus mediocris, scilicet, septem horarum, aut circa. somnus minus nocet, sed superflua uigilia magis dormiat capite eleuato, & nunquam cum oculis deorsum. neque dormire incipiat nisi distanter a cibo per duas, uel tres horas. neque dormiat in meridie nisi parum, scilicet circa horam mediam, & capite eleuato: a medio Maij usque ad medium Augusti. & hoc nisi somnum nocturnum aliqua occasione omiserit. euacuet superfluitates a natura instantas sollicitè, & per loca conuenientia. coitus multum nocet, nisi ad ipsum superfluente materia stimuletur. sed eius exercitium sit mediocre: superfluum nanque spiritum resoluit, & nimia quies spiritum in crassat. similiter eligatur exercitium oculo proprium. unde neque obiecta minima, neque multum distantia diu aspiciat, neque colores extremos, neque nimis lucida, aut obscura: sed media, & propriè colorem uiridem, ut ante neq̃ faciat aliquid exercitium, per quod teneat caput, & oculos inclinatos. neque post cibum immediatè exercitetur; sed quiescat per duas, aut tres horas. sit sperans, & gaudens. accidentia animi excelsua, & molesta fugiat. caueat a fletu longo; licet paucus aliquando uisum corroboret humores oculi depurando, & spiritus illustrando per exitum lachrymarum.

Cura autem debilitatis uisus propter exiccationem tunicarum, & consumptionem spiritus, & humorum per communitatem a toto perficitur cum humectantibus, tam qualitatiue, quam substantiæ interius, & exterius applicitis. quæ debent esse aliquando frigida; sicut in hæctica febrili. aliquando calida, aut temperata in actiuis; sicut in hæctica sen. Interius autem, quæ sunt conuenientia ad impinguandum, & humectandum tam qualitatiue, quam substantiæ, & cum hoc propria in confortatione uisus collige ex regimine præcedente, & ex capitulis hæctica senectutis, & febrilis. sed exterius applicanda, sunt balnea aquæ dulcis tepidæ, in quibus

non sudent: & illa aqua est super caput infundenda. uidentur balnea aerea, & aquarum calidarum. olea etiam humida exterius applicita; sicut amygdalinum, & uiolatum. conueniunt, & similiter in naribus, & auribus injecta. oculis autem lac & proprie humanum, uel afininum imponatur frequenter. & in summa recurratur ad capitula de hæctica senectutis, & febrili. sed inter cætera attendatur capitis humectationi cum infusione lactis super ipsum, & epithimatione ipsius cum eo, & cum infusione decoctionum humectantium laudatarum in melancholia, & mania. hanc tamen curam integrè pertractat Rasis in hoc cap. curationes agnitudinum specialium, siue communium, siue propriarum. quibus nocetur oculus, haberi possunt ex his, quæ dicta sunt superius, & ex dicendis inferius. curatio uero nocimenti uisus per communitatem ad neruos opticos, quod secundum plurimum est destructio uisus, est malè possibilis. & ideo, cum Auic. possint causas, & signa destructionis uisus; non subiungit curam, reputans eam impossibilem; quia tamen aliqui saltem duo per me curati fuerunt, quibus acciderat destructio uisus subito propter oppilationem neruorum optico-rum; curam subiungam imo me Ioan. Arcul. scribente hoc cap. Coniunx cuiusdam Veronensis, quæ ex dolore defuncti filii in una nocte cæcitatem incurrerat, humiditate propter dolorem, & cerebri constrictionem expressa ad neruos opticos, scilicet, curata est. cuius signum est; quia per frictionem oculorum secundum modum superius recitatum papillæ non dilatabantur, aut constrangebantur. subiungam itaque modum curationis per me seruatum. in primis iniunxi illis dietam ualde tennè ita, ut nihil eis concesserim nisi aquam mellis per quatuor dies & etiam q̃ nullo modo moueretur: imo q̃ non loqueretur: timens, ne motus amplius faceret fluere materias ad locum, ad quem fluere inceperant. faciebamq; ipsos dormire capite eleuato quasi sedendo. & si non habebant uentris beneficiū; cum supposito, aut clysteri leui iubebam feces educi: qui duo in quarta die sanati sunt. multos alios curauī, quos post multos dies suæ cæcitatē uisitare incepi, & nullum eorū sanauī, in quibus sic processu primò minorauī materiam cum pilulis de hiera simplici, & agarico. deinde digesti cum melle ros. & oxymelle simplici distemperatis cum aqua betonica, & fœniculi. deinde eradicaui cum pilulis cochiis. & aliquando aliquibus eorum habentibus habitudinē sanguineam cum rubedine oculorum, & timore uenarū feci phlebotomiam ex cephalica. deinde superioribus, in quibus uidebam phlegma abundare, iteratim digestium cum oxymelle scyllitico, & syrupo de stœcade cum aquis suprascriptis: & iterum eradicaui cum cochiis: deinde diuertebam cum masticatoriis, & gargarismatibus, & tandem cum caputpurgiis per nares. ultimo his non conferentibus feci cauteriū in commissura coronali usque ad ossis superficiem. quod dimisi apertum, donec os squamatum fuerat. exterius super parte anteriori capitis apponebam medicinas resoluētes, & caput confortantes. curam autem nocimenti uisus ex aliis causis per communitatem pendens hic nō subiungam, ne omnia capitula in uno perstringam, &c. cura autem debilitatis uisus per essentiam in oculis; licet ex multis causis pēdere possit, quarum cura perquirenda est ex superius dictis, & ex inferius dicendis; hic solummodo cura perstringenda est trium causarum. prima, quando prouenit propter humiditatem turbidam in tunica, & humoribus. secunda, propter turbulentiam, & nimiam crassitiem spiritus uisibilis. tertia, propter paucitatem, & nimiam subtilitatem eius. cura ergo debilitatis uisus propter humiditatem turbidam completur quatuor intentionib. prima est euacuatio integrata ex minoratione, scilicet digestione, & eradicatione, ut superius dictum fuit; licet in hoc casu magis propria oculis exhibenda sunt; sicut pro minoratione pilulæ de hiera simplici, aut cochiæ: pro eradicatione addendæ sunt pilulæ lucis. sed pro digestione cum melle ros. oxymelle simplici, aut scyllitico miscetur aqua fœniculi, rutæ, & similium. syrupus in hac causa proprius. & maioranæ, betonica, gariophila, melissa, chelidonia ana M. s. radicum fœniculi, petroselini ana ʒ. i. se. anisi, fœniculi, endiuia, rutæ ana ʒ. s. euphrasia ʒ. i. s. sacch. ʒ. i. s. & fiat syrupus, cuius dosis est ʒ. i. s. cum ʒ. ʒ. aquæ decoctionis harū rerum. & senæ, eufragiæ, sem. fœniculi, florū bo

raginis

raginis ana. 3. 5. bulliant in lib. 3. aquæ ad consumptione ter-
tiæ partis, & coletur, & hoc in autumno. sed in uere loco se-
næ ponatur acorus, & thæcas. & post purgationem ordina-
riam frequenter utatur pilulis lucis cum mirobalanis kebulis
conditis. Secunda intentio est diuersio cū masticatoriis, gar-
garismatibus, caput purgii per nares, & his nō conferētib;
fiat cauterium in commissura coronali.

Tertia intentio est materiæ turbidæ ab oculo resolutio, &
ipsum per lachrymas educio: ad quod optime cōfert puluis
Rasis in hoc cap. item collyria de fellib. magnificatur in hoc
casu. sed attende, quod fella sunt quadruplicia scilicet repti-
lium. inter quæ acutissimum est fel uiperæ, super cuius admi-
nistratione non est præsumendum nisi in modicissima quanti-
tate, & cum maxima cautela: ex eius enim impositione quo-
runda oculi sunt dissipati. in secundo gradu acuitatis sunt
fella auium: sed maxime earū, quæ uiuunt ex rapina. in tertio
gradu sunt fella quadrupedū, sed inter hæc magis acutū est
fel leopardi, & leonis: & minoris acuitatis est fel porci. in
quarto gradu sunt fella piscium, & minoris acuitatis cæteris
tu uerō incipe ab his, quæ sunt minoris acuitatis, dummodo
sint propria, & in casu laudata. uerum etiam fella in acuitate
distinguiuntur, secundum quod sunt animalis ieiuni, aut depa-
sti: quod est minus acutū. collyria autē appropriata, & appro-
bata ab authoribus in fine capituli subiungā, & cū hoc quæ-
dam electaria in hac dispositione, & in sequentibus propria.

Quarta intentio est debitum regimen sex rerum non na-
turalium superius memoratum, præcipue in cibo, & potu:
quæ in hac dispositione debet paucificari, & ad siccum decli-
nare. unde uidentur brodiaia, & oia uaporosa caput, & ocu-
lum replentia, & c. nocuum autem uisus propter super-
fluum crassitiam, & turbulentiam spirituum exigit duplicē
intentionem generalem. prima est sanguinis clari, & subtilis
generatio: quæ est materia spiritus. secunda ipsorum spirituum
clarificatio, & subtilitatio. primū duplici regimine perficitur.
primum est debitum regimen sex rerum non naturalium su-
perius memoratum, maxime in cibo, & potu. unde in hoc ca-
su sunt eligendæ carnes laudabiles generantes sanguinem sub-
tilem, & clarum: sicut auium laudatarum magis, quā quadru-
pedum. & similiter uinum subtile, cistolum, aut album, nō ua-
porosum, oia forbillia, & breuiter sanguinem crassum, & tur-
bidum generantia uidentur. secundum regimen est medicina
le, per quod sanguis iam genitus: licet sit turbidus, & crassus,
subtiliatur, & clarificatur. ad quod faciendum duo sunt gene-
ra medicinarum, secundum quod sanguis dupliciter potest fie-
ri turbidus: uno modo in substantia sua: alio modo per admix-
tionem aliorū humorum ipsum turbidantium. primi modi
turbulentia conferunt medicinæ à proprietate sanguinē cla-
rificantes: inter quas præcipui, & famosi sunt lupuli, qui uia
cibi, et medicis possunt exhiberi capillus ueneris, & humus
terre, & sunt multæ compositæ, inter quas sunt duæ præcipue,
scilicet, decoctio capillorum ueneris, & fumiteria, quarum
descriptionē require à Mesue in suo antidotario. carnes au-
tem uiperæ, secundum quod præparatur in lepra in hoc casu
& in illo, cuius statim rememoratō præcessit scilicet nocu-
mento uisus ex humiditate turbida sunt præcipue. aliud est
genus medicinarum soluentium, & separantium humores tur-
bidos à sanguine: sicut sunt fene, & epithymum in separando
melancholicos humores: & mirobalani, & agaricus in lepa-
rando cholicos, & phlegmaticos: & possumus miscere hæc
cum suprascriptis à proprietate sanguinem clarificantibus,
imo etiam quædam propria in uisus cōfortatione calida, aut
frigida, secundum quod est expediens proposito nostro. & si
quis quæreret, quæ uirtus est ista clarificatiua sanguinis; est
ne uirtus tertia? & si tertia, est ne uirtus solutina? dicendum,
quod est uirtus tertia: quia respicit determinatum humorem
scilicet sanguinem: & non est uirtus solutina: licet secundum
plurimum reperiatur in medicinis solutiuis. secunda intentio
principalis est ipsos spiritus iam genitos depurare à uapori-
bus secum commixtis, & ipsos turbidantibus, & ipsos etiam
in sui substantia subtiliare: sicut de sanguine est dictum. quæ
duo perficiuntur prohibendo uapores à stomacho, & à toto
transire ad caput cum frictionibus, & aliis generibus diuer-
sionum, & cum confortantibus stomachū, & claudentibus os
ipsum, & uapores, & reprimentibus, de quibus omnibus su-

pra. secundo perficitur cum pectinationibus, & capitis frictio-
nibus stomacho ieiuno, & celebrata digestionē integrè. ter-
tio cum his, quæ in oculo ponuntur, ipsos uapores resoluen-
tibus, de quibus partim dictum est, sed uberius dicitur infe-
rius. perficitur hæc intentio, secundo principaliter cum his,
quæ à proprietate substantiam spiritus clarificant, & subtili-
ant, & uirtutes membrorum principalium, & oculi confor-
tant, sicut sunt triseræ. de quibus actum est: & quædam etiam
electaria, de quibus agitur: & multa odorabilia, inter quæ
præcipuus est odor maioranæ sicca.

Cura autem debilitatis uisus propter spiritus paucos, &
nimium subtiles perficitur primò, per debitum regimen sex
rerum non naturalium, & præcipue cibi, & potus, quæ in hoc
casu debent esse multi nutrimenti, & humidi, & aliquoties
crassi, & compacti, non tamen turbidi sicut sunt carnes ele-
ctæ quadrupedum, & pedes uitulorum, & quædam fercula,
sicut hordei, faris, rizi frumenti, speltæ. & in hoc casu conue-
nient carnes caprinæ, & uinum mediocris potentia, cistolū
bene clarum: sed non subtile. secundo perficitur cum confor-
tantibus uirtutes membrorum principalium; sed non multū
calidis, neq; subtiliantibus: sicut sunt gemmæ, triseræ descri-
ptione Mesue capite de debilitate uisus superius posita sac-
charum ros. & si opus fuerit calidis, eligatur triseræ minor,
theriaca, mithridatu: quorum caliditas, si uideatur superflua,
alteretur cū saccharo ros. aut triseræ statim memorata. miro-
balani tamen, ut uult Mesue, in hac re sunt præcipui. regimē
autem confortandi spiritus secundum nouem modos dixi in
capite de melancholia.

Hic nunc subiungam descriptiones quorundam medica-
minum in debilitate uisus primum est uinum artificiatum, cu-
ius est hæc descriptio. & uini nouiter expressi lib. 50. euphra-
giæ M. duos, saluæ domesticæ, rutæ, maioranæ, chelidonie,
rorismarini, betonicæ, seminis anisi, fœniculi ana. M. s. cinna-
momi 3. s. misce, & permitte bullire. cum quo uino poterunt
sumi electaria, theriaca, triseræ, pulueres, & similes medici-
næ in causa frigida, & humida: Est enim uehiculum medici-
narum ad caput, & oculos. puluis ex inuentione Gentil. R.
foliorum betonicæ, rutæ euphragie, se. anisi, cinnamomi, zin-
gib. cardamomi, se. fœniculi, petroselinis, sileris montani, ori-
gani, hyssopi, cubebæ, liquiritiæ ana. 3. ij. sacchari optimi ad
podus omnium. sumatur de eo medium cholear in mane cū
paucis uini suprascripti. Sed in causa calida utendum est trise-
ræ superius descripta ex inuentione Mesue: uel utendus est hu-
iusmodi puluis. R. mirobalanorum citrinorum. 3. i. chebulo-
rum, indorum, belliricorum, emblicorum, ana. 3. i. terantur
in uase lapideo tribus diebus omni die bis. semper aspergen-
do cum aqua ros. & permittendo siccari. de quo puluere acci-
piatur. 3. i. sandali rub. coriandri præparati ana. 3. i. euphra-
giæ. 3. 2. misce. de quo puluere potest accipi mediū cholear
alternis diebus cum succo ros. aut cum paucis uini suprascri-
pti subtripli ad aquam rosaceam. hic etiam puluis potest fie-
ri solutiuus addendo turbith, & zingib. aut diagridium secun-
dum exigentiam necessitatis. & potest dulcorari cum saccha-
ro rosaceo. nūc subiungam, quædam collyria de magis exper-
tis, primum, & facile est Gentil. Recipe antimonij præparati
tutia præparata. ana cum aqua fœniculi, quatum sufficit fiat
collyrium. secundum est Gerardi de Solo. auis dicta pica exci-
cetur in furno, donec possit pulverizari: & puluis subtilissi-
mus ex ea oculo imponatur. qui si cum succo fœniculi miscea-
tur, aut aqua rosacea: erit conueniens huic proposito. tertiū
est Mesue superius memoratum ex succo fœniculi cum num-
mis auri, aut auro chalcinatum cum argento uiuo, non cum
mordicantibus: cui si addatur. 20. pars fellis galli, ut uult Me-
sue: erit magis resolutiuum, & absterfium. & ad hoc cōfert
cohol superius memoratum autoritate eiusdem; sed magis
in causa calida. aliud est Ruf. R. licium, & contere contritio-
ne multa cum succo fœniculi depurato, usq; dum fiat, sicut
mel. & reconde in uase uitreo. & quidam posterius addi-
derunt ad omnem 3. eius fellis galli, aut perdicis. 3. 2. tutia
quoq; sola primo cum aqua pluuiali lota, & exiccata: deinde
cum aqua fœniculi trita, & exiccata: tertiū cum aqua samp-
suci similiter trita, & exiccata: quarto cū aqua ialfaraxio ocu-
lis imposita optime confortat. aliud ex inuentione Mesue cō-
ferens super calefactione oculorum, & debilitati uisus causa
Io. Arculani H 4 humiditatis

humiditatis subtilis, & acutæ & mordicationi, & pruritu in oculis. R. rutie, carmenæ loræ in aqua pluuiali: deinde in aqua ros. pluries. 3. 10. fricati. mirobalanorum citrinorum cū aqua ros. 3. 6. licij. 3. 2. s. zingiberis, piperis logi an. 3. 1. aspergantur cū succo agrestæ, & conterantur cū eo: deinde excētur, & puluerizentur, & fiat alcohol. potest etiam fieri collyrium liquidum miscendo cum aqua ros. aut succo fœniculi, secundum quod tuo proposito est conueniens. aliud postū ab Auic. de quo dicitur, quod tanti exigit iuuamini, quod oculo talē efficit, ne ei noceat in solē aspicere. R. lapidis fan tici, idest, marchasitæ, lapidis magnetis, lapid. batis, idest, albuminis albi, sedinæ, idest, sedenegi, siue lapidis hamatitidis, calamenthi sicci, conditi, quod quidam elleborum dicunt, qui dam succum cucumeris asinini. sed Simon Ianuensis dicit esse quandam herbam, qua utuntur tinctores nō repertā apud nos, omnium ana. partem. 1. fellis uulturis, fellis uiperæ ana partem. 1. misce. tu de collyrio crede, quod uis. facilius est dicere, quā facere: ego in oculo humano non auderem ponere. & hoc teneas consilium in medicinis oculis imponendis, ut semper à leuioribus incipias gradatim ascendendo ad acutiora, ne sequatur nouissimus error peior priore, atamen de modo utendi felle uiperæ dicam in cap. de imaginationibus. oleum balsami in hoc casu magnificatur secundum quosdam: & dicunt, quod aut meliorat oculum, aut conseruat in eadē dispositione, quam reperit. sed sufficit una gutta: & hoc in dispositione frigida.

De tumore palpebrarum. Cap. 28.
Epit himetur ex epithimate quod in cap. de ophthal.
nominauimus.

Tumor palpebrarum, alintisar. inflatio oculi, inflatio coniunctiue sunt nomina synonyma hanc passionem significantia de qua diuersi authores sub his diuersis nominibus determinant, quæ diffinitiuē est apostema palpebrarum oculi cum in tumescencia notabili ut plurimum coniunctiue comunicans secundum Iesum Hali. & propterea ipsam appellat inflammacionē coniunctiue tractatu primo, cap. 42. & in hoc differt ab hordeolo, nodo, & pleriq; alijs apostematibus palpebrarū.

Species sumuntur à causis corporis, ex quibus generantur quæ secundum Auic. sunt quatuor; uentosa, aquosa, phlegmatica, melancholica. nō enim posuit hanc passionem à sanguine, aut à cholera prouenire, quanquam pleriq; alij dicant ipsam ab omni humore posse prouenire. quod uidetur rationalius, magis consonum menti Rasis, qui curando hanc passionē, dicit, quod epithimetur epithimate in capite de ophthalmia nominato. & certum est epithima istud magis conuenire in materia calida, quā frigida: fit enim ex sief memithe, ros. aloes, licio, sandalo rub. faufel croco orientali ana dissolutis in succo coriandri, aut endiuiz, aut aqua rosacea. respondēt tamen hunc humorem ex sanguine, aut cholera prouenientem uocari rosarium; sed hæc nomina omitamus. potest autem prouenire à causa primitiua mouente antecedentem in coniunctam.

Signa huius passionis absolutæ, quia in initio sui apparet frequenter; sicut pūctura acus, muscæ, aut cimicis cum pruritu deinde statim palpebra notabiliter tumescit. sed quæ puenit ex sanguine, est cum tumore, & duritie tensua, colore rubeo tendere ad obscurum, dolore extensiuo, & pulsatiuo, & alijs signis phlegmonis. quæ uerò ex cholera minoris est tumoris & tensionis, cū dolore magis acuto & colore rub. claro, uel ad citrinum tendente, & alijs signis herispelæ. sed quæ ex uē rositate, euenit subito secundum plurimum magis declinans ad lachrymale domesticum, sicut & cætera. & est sine grauitate, neq; mutatus est color palpebræ, & est cum tumore notabili: in quo nō remanet uestigium impressiōis, & cū paucō dolore. in phlegmatica autem, licet color non mutetur: tamē est durities minor, & remanet uestigium impressiōis per aliquod tempus cum nullo dolore. similiter in aquosa est molities maior, quā in phleg. sine dolore, in qua licet facilis fiat impressiō; tamē citius remouetur, quā in phlegmatica: & minus cito, quā in uentosa, neq; color palpebræ est mutatus, uel est mutatus ad albedinem tam in phlegmatica, quā in aquosa. in melancholica uerò est durities notabilis, non tamen sicut in cancro, & sephiros, cum ad tantam exiccationē

huius ægitudinis materia non prouenit: non enim in tā paruo tempore accideret, uidemus enim caneros & sephiros ad tantum tumorem non nisi longo tempore prouenire. unde hanc melancholiam quodammodo mixtam arbitrari debemus cum alijs humoribus augmentum uelocitantiis. & tumor hic secundum Auic. communicat superciliis, & maxillæ sed magis maxillæ; quia grauis est descendere, & cum colore fusco, & paucō dolore, &c.

Prognosticum. primum. hæc ægritudo secundum A. cōsequitur ophthal. & variolas. quod Gentil. exponēs, dicit, propter seriem textus Auic. debere intelligi de melanch. & causas assignat, quas omitto. quæ euenit secundum ipsum post curationem ophthal. & uariolarum; quod credo nequaquam conuenire intentioni A. neq; experientia: sed intelligendū est quod sequitur ophthalmiam, & uariolas, idest, quod euenit, postquam hæc passiones inchoatæ sunt: uidemus enim per sæpe inchoatæ ophthal. multa materia fluente per partem exteriorē palpebras tumescere: similiter in augmento uariolarum, & in statu uidemus palpebras esse adeo tumidas, ut nō possint aperire oculos: non obstat nisi cum materie ophthal. & uariolarum sint calidæ plurimum hoc apostema esse calidū: quod repugnat dictis A. nisi uelit hoc apostema quādoq; esse calidum: maxime quando sequitur alias ægitudines, & fit per uiam defluxus, nisi forte initiatiue sit frigidum. Prognosticum secundum. Hic tumor palpebrarum curatur secundum plurimum; si bene tractetur. si uerò imperite; perducit plerūq; ad cancerem, materia existēte multa, & calida: existente autem melanch. plerūq; ad cancerem, & sephiros, &c.

Cura tres exigit intentiones generales. prima est circa causam antecedentem complendam per euacuationem, diuersionem, fluxus interceptionem. secunda est circa causam cōiunctam complendam per percussione principio conueniente, resolutione, declinatione conueniente, percussione, & resolutione simul conuenientib. augmento, & statui: & hoc si incedat in uiam resolutionis. si autem in uiam maturationis; loco resolutionum applica maturantia. tertia intentio duas exigit intentiones particulares scilicet correctionem accidentium; & debitum regimen, quæ omnia fiant, sicut in ophthalmia. sed est dubium non paruum, an phlebotomia, & percussio conueniant in hac passione. quod non arguitur ex intentione Auic. neq; phlebot. neq; percussione conuenientem: quam intentionem approbat Gentil. in expositione capituli de alintiphac. hanc opinionem manifestē ponit Iesus Hali uetans phlebotomiā, & percussione, à quo Auic. totum huc caput accepit. in oppositum est Rasis. ex cuius dictis non explicite; sed implicite comprehendere possumus phlebot. & percussione competere; cum doceat curare hanc passionem medicamine percussiuo, posito in capitulo de ophthalmia. & confirmatur; quia in cuiuscunq; apostematis principio competunt percussio nisi in casibus exceptis. & certum est, quod hic non est ex illis, & in apostemate sanguineo omnes concedunt phlebotomiam: potest autem palpebra apostemari à quocunq; humore; sicut & oculus. pro solutione huius dubij dicendum, quod aliqua est manifesta differentia in causis huius passionis inter Aui. & Iesum Hali ex parte una, & Rasis & plerosq; alios ex parte altera. uolūt enim primi hanc passionē solum ex quatuor humoribus iam dictis prouenire. alij præter hos quatuor humores frigidos arbitrantur ex cholera, & sanguine prouenire posse. est secunda differentia, quam Iesus Hali exprimit, quod secundum plurimum non prouenit hæc passio per uiam defluxus. sed ophthalmia e contra secundum plurimum prouenit per uiam defluxus. ex quo inferitur secundum Iesum Hali, & Aui. quisequitur ipsum, scilicet neq; phlebot. neq; percussione competere, tum quia materia est frigida, non bene curabilis per phlebot. tum quia non defluit ad oculum; sed cōgeritur. phlebot. autem debetur causæ antecedenti, non coniunctæ. sed sicut alios authores ponētes ipsam prouenire ex humoribus calidis, qui secundum plurimum defluunt ad oculum, & non congeruntur, dicendum est phlebot. & percussione competere; multo minus tamen competunt percussio super loco, quā in ophthalmia; ex eo quod palpebra est membrū ignobile in comparatione ad oculum. propterea uitandū est ne percussio applicata super palpebra percutiant materiam

riam ad oculum: & eo magis; quia secundum plurimum huius passioni coniunctiva communicat præcipue secundum Iesum Hali. ergo multo etiam magis debemus esse solliciti de coniunctiva, quam de palpebris; sicut & in synanche, in qua simul materia est interius, & extra solum: interius applicamus reperculsiua, exterius autem attractiua. & forte propter hanc causam dixit Iesus Hali, generaliter siue sit factum hoc apostema per viam defluxus, siue per viam paulatim factæ coëgestionis reperculsiuonem non competere. sed nunc ad medicinas locales veniamus distinguentes modum curationis. si hoc apostema fiat à causa primitiua, ut contusione; debemus in principio administrare albumē oui confusum cum oleo rosæ. & interius albumē oui cum aqua rosæ. postea secunda die oleū rosaceum cum vitello oui, si dolor affuerit. si uero non fuerit epithimabimus cum oleo rosaceo desuper aspergēdo puluerem myrti, deinde procedere ad resolutionem sanguinis cocti, sicut exigunt canones. interius autem veniemus ad sief album, & tandem ad cetera competentia in ophthalmia secundum tempora sua. & si ibi fuerit ataracti, ut plurimum est; curabimus curatione eius, sicut superius dictum est. si autē apostema exterius redat in viam maturacionis; maturabimus & aperiemus, ut docetur in canonibus uniuersalibus. si autem promeniat à causa antecedente, scilicet, sanguine fluente ad palpebram; in principio repercutiemus cū medicamine Rasis, cuius descriptio est in capitulo de ophthalm. aut cum aqua rosæ, oleo rosæ, aceto, bolo armeno simul mixtis. & si materia fuerit cholerica; his poterimus addere aliquem succum frigidum; sicut semper uiuæ, aut solatri: quæ consilio meo magis applicanda sunt super fronte, & temporibus, quam super palpebris. procedēdibus autem temporibus resolue, aut matura, aut cum mixtis procede, sicut in phlegmone, & erisipelate auctores præcipiūt, commiscendo medicamina huic mēbro magis propria. si uero materia fuerit uentosa, cum subito fiat secundum plurimum, manifestum est reperculsiua non competere. sed secundum Iesum Hali nihil à principio faciendū est scilicet in prima die, sed in secunda si aggritudo non est curata, lauetur facies, & oculus cum aqua calida, & diata subietur. si tamen oportuerit; applica faculum ex milio, & sale & cimino torrefactis. sed Gerardus de Solo docet administrare farinam milii cum aqua foeniculi. si uero materia fuerit phleg. aut aquosa; epithimadæ sunt palpebre ex alo cum succo foeniculi. & si forti uis resolueret; applica sief rub. leue dissemperatum cum aqua foeniculi aut pluuiæ, aut aqua fabrorum, & chimolea cum pauco aceti: si uis magis resolueret cū pauco lixiuii. descriptio sief rub. Rasis in suo antidotario. *℞. floris æris usti, qui fit in minera æris. 3. 3. colcothar usti. 3. 2. æris usti 3. 5. myrrhæ. croci. ana. 3. 1. piperis. 3. s. fiant ex eis collyria cū uino albo: hoc enim est resolutiuum efficax. aliud ex inuentione nostra satis domesticum. Recipe aloes, myrrhæ, licii, acatix, sief memithæ, ciperi, croci oriētalīs, boli armeni ana. misceantur cum aceto, & succo foeniculi, aut addatur parum lixiuii, si uis magis resolueret: & in materia multū aquosa potes permiscere cū aqua fabrorū, & addere chimoleam, si autem materia fuerit melancholica; mollifica primo, deinde resolue, aut cum mixtis procede; sicut cum mucilaginis. maluanifci, foenugræci, lini, & piuguedine gallinæ, quibus, si uolueris magis resolueret adde bdelliū, aut ammoniacum in aceto dissolutum. & tu ex cura apostematū scilicet roticorū collige medicamina huic dispositioni cōuenientia addendo aliqua propria secundum exigentiam particulæ patientis, &c. tertium autē regimen ex lxxpe dictis potest esse manifestum: & textus clarus est.*

De inuersione pilorum palpebrarum. Cap. 29.
Si pilus fuerit unus, aut duos alij palpebrarum pilis cum mastiche, aut oleo sisami sunt annectendi, aut radicatus euellantur. et loca, a quibus euulsi sunt, t cum ferro acuto, aut acu adurantur. si autem multi fuerint; necesse est caro palpebræ incidatur. loqui tamen de hoc nostri libri mensuram prætergreditur.

SCHOLION

Cum ferro acuto, aut acu] corrige sic: cum ferro acuto, ut acus. ita legunt emendatissimi codices.

Pilus à pelle dicitur; quia ex pelle procedit. ethimologia-

rum capite primo; sicut capillus dicitur capitis pilus. Pilus est diffinitiuè pars corporis inanimata, tenuis, rotunda, longa, dura, flexibilis, in poris cutis secundum radicem fixa, ab exhalatione fumosa terrestri, uiscosa unctuositate participante, genita à calido adurente ad poros cutis eleuata; sed à complexione cutis, & aeris in pilum densata ad decorem, tutelamq; corporis, atq; ipsius ab huiusmodi fumosis exhalationibus mundificationem finaliter ordinata. ex qua diffinitione elicere potes causas pilorum, scilicet, materialem, efficientē tam incitatuam, quam completiuam: & causam materialem in qua & formalem, atq; finalem.

Pili autem palpebrarum quadrupliciter possunt malè disponi, aut paucificantur; quia tenues, aut curti, aut pauciores debito generantur, aut multiplicantur modis contrariis, aut inuerfantur in oculum non seruantes debitum situm. & hæc inuerfatio tamir uocatur, aut non debite colorantur; ut, quia producuntur albi, aut alterius coloris non naturalis, cum debeant esse nigri. paucificantur autem propter defectum materiæ terrestris unctuosæ, aut defectu agentis, aut paucitate calidi, aut ex defectu cutis. ex defectu quidem materiæ, quia consumitur; sicut accidit in egritudinibus exiccatis; ut phthisi, hectica, & similibus; aut, quia materia pilorum in pediculos conuertitur: quæ ab illis postquam geniti sunt etiā consumitur; aut quia materia pilorum à præsentia alterius materiæ acutæ, aut falsæ consumitur; sicut in alopecia: aut ex defectu caloris cum paucificantur; sed hoc rarissimè est causa defectus pilorum palpebrarū aliorum: aut multoties cum uideamus in omni ætate, in omni complexione pilos palpebrarum debite generari. Defectus autem ex parte cutis est aut propter oppilationem pororum cutis, & stricturam, aut nimiam dilatationem, siue ex tempore, siue generatione cōtracta sint. aliquando accidit propter ulcera, corrosiones manifestas, & pustulas in palpebris existentes: ex quibus fit pilorum casus; sicut & in cæteris membris. & ex contrariis causis tam efficienti quam materiali, ex qua, & in qua accidit pilorum multiplicatio. inuerfantur autem pili in oculum; aut quia pori exitus pilorum sunt obliquati uersus oculum directi: aut ex generatione, aut ex tempore, aut quia palpebra ipsa est cōtracta, & iam uersus oculum curuata: aut quia radix unius pili nascens in poro alterius sub radice eius non potens exire directe propter impedimentum radices alterius pili, curuatur interius uersus oculum. male autem coloratur pili, aut propter ægritudines consumentes. unde ex defectu humidi dealbantur: sicut segetes cum maturescunt, humido deficiente dealbantur: & hæc albedo incipit ab extremitate pilorum. dealbantur secundo pili propter præsentiam materiæ phlegmaticæ putrentis in radice eorum; sicut accidit in canicie, aut propter præsentiam albaras, aut morphæ in cute pilorum: secundum cuius colorationem etiam pili colorantur: & hic color incipit à radice pilorum tendens paulatim ad eorum extremitatem. sed ad propositum redeūdo, cum quatuor sint hæ dispositiones pilorum, solum una, scilicet inuerfatio dicitur ægritudo; cum sensibiliter lædat operationes: & est plerumq; causa ophthalmiæ, & paruorum ægritudinum: est enim morbus in situ. aliæ autem dispositiones non sunt ægritudines; licet per sæpe pendeant ab ægritudinib. aut causis præter naturalibus. & ex his liquet hæ dispositiones, & causæ earū. signa autem manifesta sunt, cum sensui subiaceant.

Prognosticum. Hæ dispositiones difficillimè curantur, cū malæ dispositiones pilorum non nisi à forti agenti possint rectificari: sustinent autem pili, & cutis pilorum fortes medicinas sui duritiæ, & uiscositatis multum resistentibus, &c. cura paucificationis pilorum in duobus consistit: primo in remotione causæ pilos paucificantis. secundo in contractione, uel attractione materiæ pilorum generationi proportionatæ. si ergo causa paucitatis pilorum fuerit humidi consumptio, & exiccatio cum humid. & resistentibus curanda est. si autem propter præsentiam pediculorum ipsos remoue, & interfice & materiam generationis ipsorum consume, ut docet Aui. 3. tertij trac. 3. cap. 1. & Ras. 2. contin. Si uero fuerit præsentia materiæ acutæ & falsæ in origine pilorum cura curatione alopecig. Si uero fuerit propter ulcera aut pustulas in cute pilorum consumentes materiam generationis pilorum & poros oppilantes aut ipsos corrodescentes, cura curatione alaphaati.

haphati. Si uero fuerit nimia strictura aut dilatatio pororum à generatione contracta non recipit curam. Hic autem solū modo debemus inniti circa secundum, scilicet circa attractionem materie terrestris unctuosæ subiciendæ pro generatione pilorum. Ad quod faciendum quasdam subiungam medicinas, hoc tamen præmissis quod medicinarum facientes nasci pilos sunt diuersorum modorum. Quædam enim agunt à proprietate occulta, ut lapis lazuli & lapis armenus. Quædam à caliditate, trahendo materias pilorum uersus poros, concurrēte etiam quadam proprietate, sicut spica nardi, & celtica. Quædam faciunt hoc quadam stipticitate confortatiua partiū mēbris, unde calor uigoratur, sicut laudanum, &c. Quædam faciunt hoc non generando pilos de nouo, sed ipsos genitos cōseruando, sicut medicinarum stipticæ & uiscosæ. Quædam faciunt hoc remouendo malitiam materierum corrodiētium. Et istæ sunt diuersæ secundum quod materiarum corruptæ egent rectificatione, siue exiccatione, siue absterfione aut resolutione, aut corrigendo aliquod genus malitiæ complexionis. Et istæ sub primo regimine continentur. quædam adhuc inuatiuæ sunt tenendo alias medicinas in loco, sicut medicinarum uiscosæ sui uiscositate faciētes alias medicinas palpebræ adherere sicut mel. Et si instetur, quia medicinarum uiscosæ oppilant poros, ergo prohibent generationem pilorum oppilandō, negatur cōsequentiā: non enim omne uiscosum est oppilatiuū, sicut mel & si sit aliquid oppilatiuū, maior tamen est conferentia ex parte aliorum quā hoc paruum nocumētum. Descriptio conueniens ad pilorum generationem. R. lapid. arm. lapid. lazuli. ana. cum melle incorporentur & applicentur. Secundum magis efficax, est sterco muris adustum, aut non adustum cum melle confectum. Tertium magis iuuans in causa cal. scilicet, ubi est pruritus, rubedo & corrosio, est ut granatum cum sua totalitate decoquatur in aceto donec dissoluatur, & super locum ponatur. Et hoc quidem magis confert prohibēdo calum pilorum, quā eorum nouam generationē procurando. Medicinarum autem prohibentes ortū pilorum postquā enulsi sunt, multæ, ab authoribus, recitatur. Vna est ex rubigine ferri cum salina distemperata, uel limatura ferri cocta cum aceto, uel ferrum calcinatum, siue crocus ferri coctus cum aceto. Secundum est sanguis ranæ proprie in cannetis habitantis. Tertium est tinea canis, seu lendines canis contusa & loco applicata. Quartum est cum frigidis stipticis & opiatīs claudentibus poros, & calorem naturalem debilitantibus. Quintum est cum sief de nitriolo ex inuentione Iesu Hali. confert pilul. additis, slach scabiei ungulæ, sebel. R. gūmi arabici, dragaganti, aloes succocitrini, uiridis æris. arfenici rubei, coleothar, æris uisti trium piperum, sedenegi, amyli, ruberæ tinctorum, baticuræ æris uisti, ana. 3. 2. sanguinis draconis, acatæ, ana. 3. 1. suturæ, spicæ, licii, gallæ uistæ, ana. 3. 1. cadmiæ argenti, cerulæ, mirrhæ, ana. 3. 1. salis ammoniaci, ana. 3. 4. dissoluatur arfenicum cum aqua ruscæ, & succo pomi citrini, alia bene puluerizata misce & fiat sief. Sed certe dicant omnes quicquid uelint, ego adhuc non inueni medicinā in hac re conferentem, sicut nec Galenus ut testatur. 10. de simplici medic. Nam cum plures expertus fuerit non inuenit aliquas in hac re conferentes. &c.

Cura autem inuersionis pilorum quinque modis perficitur, de quib. tres tanguntur à Rasi in præsentī cap. Primus est inuiscando pilos inuersionis cum pilis naturalibus. cum mastiche aut oleo seni, id est, de illa regione quod uiscosum est. Sed inter cætera, ut refert Auic. in hoc præstantior est gumma piscium. Sed caue ne pili inuerti superent pilos rectos, & trahant ipsos in oculum. Secundus modus est per canteriū actualē factum in modum acus curuæ, debet ergo palpebra inuersioni, & ipsius extremitatē debemus capere inter duos stilos ex utraque parte ligare, & pilos inuersionis cū moleta detata extrahere. Deinde oculum tueri cum pasta ut dicit Iesus Hali, oculo superposito, sed melius fiet cum cortio in aqua rosata in fuso, oculo superposito, & ita acum illam curuam ignitam in poros pilorum extractorum infigere semel, aut pluries & satis profundē, donec tota caro porri sit combusta, postea lacte applicito super loco, dolor mitigetur, & post mediā horam aut quartam stili soluantur, ut palpebra ad situm naturalem redeat, deinde cum prohibentibus ophthalmiam medicetur.

Tertius modus est positus à Rasi scilicet incisio, sed hoc

penes autores tripliciter potest fieri. Aliqui incidunt palpebram interius parum distanter ab origine pilorum, & secant satis profunde adhuc, ut caro orta in scissura propellatur, & inuersionem palpebræ alterius, & hic modus est satis inanis, & carens ratione. alii autem scindunt cutim palpebræ exterius, alii quam partem ipsius eleuando ad modum unius alutæ, & deinde consolidant unum labrum cum alio uniendo aut sutura, aut alio ingenio, ut palpebra post consolidationē remaneat aliquid exterius inuersionis. Modus autem capiendi pellē aptior est, ut cum picicariolis eleuetur, & comprehendatur inter duos stilos subtilissimos secundum eam quantitatem, quæ uidetur tibi necessaria adhuc, ut palpebra remaneat aliquantulum inuersionis, adeo ut pili non ingrediatur in oculum, deinde stili stringantur ex utroque capite notabiliter, & pellis ista intercepta, scilicet cum forcipe super stilis scindatur, deinde an requam stili remoueantur figuratur acus una uel plures immediate sub stilis utriusque labrum uulneris comprehendendo, deinde stili remoueantur & fiat punctum unum aut plura secundum necessitatem, quæ remaneant usque ad consolidationē perfectam. Et si remanere non possent inuiscetur unum labrum cum alio cum medicinis adhuc propriis. Et hic modus est ex inuentione nostra. Alii incidunt totaliter extremitatem palpebræ, in qua nascuntur pili inuersionis ipsa palpebra, prius in tercepta inter duos stilos, ut dictum est superius, sed non pauca apparebit deformitas. Quartus modus non tactus à Rasi est cum sutione. Et est ut ligetur primo palpebra inter duos stilos ad modum iouetæ circa mediū ipsius, & cū acu pforetur prope pilum inuersionis ad intra, ad extra, ita ut puncta acus ueniat exterius ex directo pili inuersionis in marginē aliorum pilorum, & cum acus est fixa in palpebra nodus ex toto penetrans, figuratur pilus inuersionis in foramen acus, & si non potest aliter infigi, capiatur capillus duplicatus, & figatur ita duplex in foramen acus, & cum illa duplicitate, quæ ab authoribus uocatur anas, capiatur pilus inuersionis, & attrahatur donec pilus ingrediatur foramen acus, & postquam ingressus est, trahatur acus exterius simul cū pilo inuersionis, & ibi permittatur consolidari, sed bonum est ut inuiscetur exterius cum uisco aut alio glutino, ut non possit redire, & hic est modus omnium pulcherrimus. Et sicut dixi de uno pilo ita fiat de reliquis, si plures sint. Sed caue ne per idem foramen multoties acus reitretur, est enim causa quod foramen illud fiat laru, unde pilus subtilis non remanebit laterib. adherens, & ex hoc comprehendere possumus in actu practico quod quanto acus est subtilior, tanto est aptior, dummodo hæc operationes cū ea possint perfici. Vltimus modus recitatus ab authoribus, quem non approbo, est ut euellatur pilus, deinde cum prohibentibus eius generationem procedatur, scilicet, cum medicinis supra scriptis, quarum adhuc nullam inueni, cui fidere possim. Vltima dispositio pilorum est eorum non debita coloratio, ad quam remouendam duplex est intentio. Vna remouere ægritudinem aut causas à quibus dependet illa mala coloratio, scilicet, causas canicie, aut morphæam, aut albas, si ab eis pendet, quæ faciliora sunt dictū quā factū. Sed quomodo remoueantur, require à Rasi. 5. huius, & ab Auic. 7. quarti. Quod si remouere non possunt, restat, ultima intentio scilicet coloratio illorum pilorum cum tincturis colorantibus sū exigentiam pilorum naturalium suorum, sed præstantius est, ut sint nigri quā alterius coloris, licet in plerisque dispositionibus reperiantur rubei, quas tincturas collige, ubi supra in locis allegatis, & ex iā dictis patet literæ expositio.

De aqua descendente in oculo. Cap. 30.

Quandoque aqua descendens in oculo, imaginatio, phantasia, apparitio, sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem, de qua diuersi authores sub his diuersis nominibus determinant, licet strictè uim uocabulorum cōsideranti appareat, quod hic terminus aqua descendens in oculo, sit inferior ad alios tres, cum non omnis imaginatio sit aqua descendens in oculo, sed bene contra. Sed utamur hoc uocabulo large, sicut utitur Rasi in præsentī cap. Hæc dispositio diffinitiuè est uisio corrupta oculorum, qui sentiuntur coram uisu, ac si ipsi sint mixti in aere, & hic colore accipimus large, ex quo forte infertur, quod proprie loquendo hæc dispositio non est ægritudo, sed accidens ægritudinis, loquendo de ea; quæ comparatur ad nocumētum. Est enim accidens

accidens oppilationis, quæ est morbus in uia, cuius oppilationis causa est aliquod corpusculum interpositum inter crystalloidem & res distincte uisas. Sed contra, hæc uisio corrupta siue comparatur ad nocumentum, siue non, per se & immediate lædit operationes alicuius uirtutum cerebri, quia ipsum & per se immediate corrumpitur iudiciū, quia iudicat aliquod esse in medio coram uisu quod non est, siue istud iudicium attribuamus sensui communi siue cogitatiuæ.

Ad quod respondetur, quod hæc uisio corrupta comparata ad oppilationem est accidens, sed comparata ad iudicium quod corrumpit est morbus, aut causa saltem morbi. Si autem hæc uisio corrupta sit de his, quæ non comparatur ad nocumentum, dicendum est quod non est accidens morbi, neque morbus, neque causa morbi, quamuis actio sit corrupta, sed non corrupte læsa, & corrumpit iudicium, sed non corrupte lædit. Sed contra, eodem modo & æqualiter & æque intense corrumpitur iudicium, per uisionem non corrupte læsam pendet ab acuitate sensus, sicut per uisionem corrupte læsam pendet ab oppilationem, ergo qua ratione hæc pendens ab oppilationem corrupte lædit iudicium, eadem ratione pendens ab acuitate uisus etiam corrupte lædit iudicium. Pro solutione huius dicendum, quod aliud est uisionem esse corruptam, & aliud corrupte læsam.

Ad uisionem enim corruptam sufficit quod iudicetur aliquod colorem esse coram oculis qui non sit. Sed ad uisionem corrupte læsam requiritur præter hoc ut sit error circa sensibilia communia aut propria communiter occurrentia, circa quæ cum debitis circumstantiis non debet esse error. Primum accidit in homine acutissimi uisus. Sed secundum accidit in his qui habent uapores crassos in oculis. Et ad formam argumenti cum dicitur, æqualiter & æque intense corrumpitur iudicium per uisionem non corrupte læsam pendet ab acuitate sensus. negatur, ut patet ex fundamento iam dicto, imo non ualeat hoc argumentum uisio Sor. respectu aliorum obiectorum est corrupta, & uisio Platonis sibi sani respectu nullius obiecti est corrupta, neque alio modo læsa respectu obiectorum, quæ potest uidere, ergo melior est uisio Platonis, quæ Sor. quia uisio Platonis respectu illorum obiectorum est ablata respectu quorum uisio Sor. est corrupta, quod est deterius, &c.

Species imaginationum sunt duplices. Quædam non comparata ad nocumentum, quæ non sunt nisi in oculis acutissimi uisus. Quædam comparata ad nocumentum, quæ sunt in oculis mediocriis aut obtusi uisus. Pro cuius intellectu est sciendum, quod omnium imaginationum causa immediata est obiectum aliquod non paruum, aut saltem non paruum ea paruitate, quæ est medium inter res distincte uisas, & crystalloidem, posito quod obiectum aliquoties uidetur, sed non distincte comprehenditur. Si ergo hoc obiectum sit minimum siue in oculo sit, siue in medio extrinseco non uidetur nisi a visu acutissimo, licet non distincte comprehendatur, & hoc est duplex, uel dupliciter situatur. Aliquando est in medio extrinseco coram pupilla, sicut sunt atomi, à quibus aer quantūcūq; purus non denudatur, nec etiam aqua nec alia media denudatur. Et aliquando situatur in oculo, & sunt quidam fumi siue uapores minimi ab oculis resoluti, à quocūq; enim membro fere semper aliquid resoluitur. Et hi fumi uidentur in uisa acutissimo sicut & atomi, de quibus sermo præcessit. Et hæc imaginationes provenientes ex tanta acuitate uisus non comparantur ad nocumentum, cum non sint morbus neque alia res præter naturam, nec ipse oculus est læsus in complexione, cōpositione, unitate, nec in aliquibus particulis ipsum integritatibus, nec etiam per communicatam. Et simile huic quod dictum est de uisu accidit in sensu auditus, & est apud Rasim secundo continentis, & Iesum Hali. tractatu tertio, capite primo. Fit enim aliquando tinnitus & sibilus quod est actio corrupta, non comparata ad nocumentum propter acuitate auditus audientis minimum sonitum existentem in organo auditus propter uaporem minimum in eo motum, à quo organum auditus non denudatur. Aliquando audienti sonitum minimum in aere, aut in alio medio extrinseco, à quo aer quantūcūq; quiescens non denudatur. Aliquando fit propter crassam uentositatem in organo auditus existentem, & hæc ad nocumentum comparatur. Imaginationes autem cō-

parata ad nocumentum sunt ab obiecto existente in ipso oculo cōprehensio a visu mediocri uel obtuso, siue sit uapor crassus, siue sit uestigiū alterius generis, est enim causans aliqualem oppilationem & hoc obiectum licet comprehendatur aliquo modo: non tamen distincte comprehenditur. Et hæc imaginationes sunt duplices. Quædam sunt propter nocumentum tunicarum, scilicet corneæ, aut telæ aranæ, propter aliquod uestigiū in aliqua ipsarū derelictū, aut ex aliqua causa præternaturali, quæ quantū sit in cornea, non tñ uidetur, ab homine in oculo aspicienti, licet comprehendatur ab ægro, cuius rei causa est, quia non uidetur ab oculo aspiciente propter suam paruitatē, sed comprehenditur ab ægro ex eo quod impedit debitum trāsitum spicierum uisibiliū, minimum enim existens in pupilla, quod à nullo oculo aspiciente acutissimi uisus uideri potest, potest multum impedire trāsitum specierum uisibiliū: nā ad hoc quod res & si sit maxima sicut cœlum uideatur, oportet formam eius recipi in pupillam, & tādē in crystalloidem, minimū ergo impedimentum exitus in pupilla aut in crystalloidem potest impedire uisionem magnę partis cœli. Aliquando hoc nocumentum est in humoribus, scilicet, albugine aut crystalloidem: frequentius tamen in albugineo, cum omnē impressionem sui subtilitate facilius suscipiat. Et hoc erit dupliciter aut propter rem aduenientē ipsis humorib. siue sub forma uaporis, siue sub forma humoris, qui uapor, siue humor mixtus cum albugineo & crystalloidem reddit ipsos non peruios aut non peruios ea peruiatate, qua debent esse, & qua sunt ceteræ partes eorum. Vnde si aliqua pars ipsorum fiat imperuia, & oppilet totum foramen pupillæ, tunc est cæcitas, sicut quādo cataracta perficitur. Si non oppilet partem: tunc si est in medio, res non uidetur, nisi secundum latera & non secundum medium. Si autem sint in aliquo latere, res non uidentur secundum illud latūs, imo apparent diminutæ. Si autem illa pars sit peruia, sed non peruiatate consimili primæ. tunc apparent diuersæ imaginationes secundum ipsius diuersitatem. Si enim tendat in citrinū, apparent imaginationes citrinę & obiecta omnia citrina. Si autem ad rubeum declinet, apparent rubea, & sic de aliis coloribus. Et hæc quæ ueniūt ad oculum sunt simplicia, aut uapor aut humor. Si uapor tunc provenit à toto, sicut in febribus & crissibus, aut à stomacho, aut à cerebro per uenas, & arterias & neruos, aut ipse uapor ab ipso oculo resoluitur, & coram crystalloidem situatur. Si uero sub forma humoris hoc maxime est à cerebro, sicut in rheumatismis per uias neruorum uenarum, & arteriarum. Aliquando uero hi humores alterantur & efficiuntur non bene peruii, non propter rem aduenientem, sed quia mutantur in substantia sua, aut propter caliditatem subilantem aliquam partem ipsorum, & conuertentē ad naturam aeris, unde illa pars apparet alba siue lactea: aer enim commixtus humido aqueo facit colorem album faciēdo spumam, tertio & quinto de generatione animalium, & 21. particula problematum, problemate primo. Aliquando mutantur à frigiditate congelante & incrassante, unde fit color albus aliquando ab humiditate tenebrante, aliquando à siccitate incrassante, uel inspissante.

Diuerificantur enim species imaginationum multipliciter. Aliquando secundum colorem, ut quia apparent citrinæ ipsis pendētibus à fumis cholericiis, aut à uestigiis citrinis peruiis. Aliquando apparent albæ ipsis pendētibus à uaporibus phlegmaticis, aut uestigiis albis peruiis, ita aliquando apparent rubæ aut nigre ex similib. causis. Sed hic nota quod si uestigium sit non peruium cuiuscūq; coloris sit, semper imaginatio apparebit nigra, cuius causa in sequentibus assignabitur. Aliquando distinguuntur imaginationes ratione quantitatē, quia quædam magnæ, quædam paræ secundum quantitatem uaporis aut uestigii situati inter crystalloidem & res uisas. Aliquando distinguuntur ratione crassitiei, aut subtilitatis rōne uaporis, aut uestigii crassi, aut subtilis. Aliquando distinguuntur secundū figuram, quia quædam apparet cūmicæ, quædam muscæ, quædam capillares, & sic de singulis, secundum varias figuras rei situatæ inter crystalloidem & res uisas. Aliquando apparent sursum moueri, aut deorsum, aut lateraliter secundum uaporum uariū motum.

Ad euidentiā eorum quæ dicta sunt, cadunt hic duo dubia. Primum. Vtrum res non peruia situata post crystalloidem uersus

uerlus cerebrum, possit esse causa imaginationum. Et arguitur quod sic, uapores eleuati in febribus aut crisi sunt causa imaginationum cum perueniunt ad cerebrum: causant enim aliquando phrenesim non ueram, ergo questio uera pro parte affirmatiua. Secundo, hi uapores eleuati, uel existentes in parte anteriori cerebri mouentes spiritus motu inordinato sunt causa uertiginis aut scotomiae, & per consequens imaginationum: imaginantur enim homines corpus suum moueri aut res aliqua circa corpus suum moueri, & eo magis, quia scotomia interpretatur obtenebratio uisus. Tertio, res non per uia existens in humore uitreo potest uideri per crystalloidem, sicut & res existens in albugineo, ergo cum male uideatur, poterit esse causa uisionis corrupta, & per consequens imaginationum, &c. Assumptum probatur, quia sunt omnia necessaria ad uisionem, scilicet, obiectum medium crystallois uidens lumen tam extrinsecum quam ipsius crystalloidis. Quarto, spes seruata in memoratiua, aut in aliqua uirtutum cerebri potest peruenire ab ultimo uentriculo ad medium, a medio ad primum, a primo ad crystalloidem, & sic poterit uidere per crystalloidem, ergo a fortiori aliquod corpus non per uiam existens in crystalloide, uel post crystalloidem, poterit uideri, & si male uidebitur erit causa uisionis corrupta & imaginationis, assumptum est Auer. 3. colliget. in cap. de accidentibus sensus, uisus, & in lib. de sensu & sensato. Et confirmatur, quia illa species perueniens a cerebro ad oculum obuias uaporibus existentibus, in uitreo inficietur secundum naturam uaporum, ergo perueniens ad crystalloidem, sic infecta erit causa imaginationis sicut species exteriorum obiectorum peruenientes ad crystalloidem, inficiuntur secundum colorem uaporum aut humiditatis extraneae existentis in albugineo, & sunt causa imaginationum, ut referunt omnes. In oppositum autem est Auer. dictum quod causa imaginationum est res non per uia inter crystalloidem & obiecta exteriora, non autem post crystalloidem. Pro solutione huius questionis praemittendum imaginationes esse duorum modorum, quodam enim pertinent uirtutibus cerebri, scilicet, sensui communi, imaginatiuae, quae apparent tam in luce, quam in tenebris, tam homines uidere, quam non uidere, & de istis non est questio nostra, sed questio nostra est de imaginationibus quae appropriant uisui, & non sunt nisi homine uidente. Et circa hunc modum est duplex responsio. Illi enim qui tenent uisionem fieri in crystalloide, quae est communis opinio, dicunt, quod res non per uia post crystalloidem non est causa imaginationum, tum quia non est medium inter res uisas, & crystalloidem. Sed respondendum est ad duo argumenta, scilicet ad tertium & quartum facta ante oppositum questionis. Vnum probat, quod haec res non per uia uidetur a crystallino, quia sunt quatuor requisita ad uisionem, scilicet obiectum, quod est ipsa res non per uia, medium diaphanum, scilicet, ipse humor uitreus, crystallois uidens, & lumen sufficiens. Dicitur quod non est medium sufficiens. Et si arguitur quod est medium diaphanum sicut et albugineus. Dicitur quod nec uitreus, nec albugineus sunt soli medium sufficiens ad uisionem colorum nisi concurrat medium extrinsecum, de hoc tamen clarius in sequenti questione. Ad aliud argumentum cum dicit species transiens a cerebro ad crystalloidem obuias uaporibus existentibus in uitreo, inficietur secundum naturam uaporum, quibus obuiabit, ergo sic infecta uisa a crystalloide erit causa imaginationum rubearum aut citrinarum, &c. secundum naturam rei inficientis. Ad hoc dicitur quod haec est species multum immaterialis & multo magis denudata a conditionibus materialibus, quam sint species uenientes ab obiectis exterioribus cum obuiant uaporibus existentibus in albugineo, & etiam haec species potest esse causa uisionis, quia multum est immaterialis absque hoc quod transeat per medium extrinsecum, & hoc tenendo opinionem Auerrois. Sed secundum opinionem tenentem uisionem fieri in cruciatione neruorum opticorum est duplex responsio, scilicet, una quae magis placuit. Gentili qui dicit quod haec res non per uia post crystalloidem non est causa imaginationum, ex eo quod ipsa non potest uideri, nec aliquo modo comprehenditur per uisum, cum cuiuslibet quod debeat aliquo modo uideri siue bene, siue male, oporteat species plus depurari & modificari in crystalloide, & etiam quia haec res non est medium inter cruciationem neruorum, & obiecta

exteriora, ex eo quod uisio post crystalloidem non fit secundum rectitudinem linearum, nec secundum formam pyramidis, sed fit quia species uisibiles in crystalloide iam depurate suscipiuntur in spiritibus, & deferuntur ad cruciationem neruorum in qua fit uisio. Alia responsio quae mihi magis placet, est, quod res non per uia post crystalloidem potest esse causa imaginationum, quia species obiectorum uisibilium transeunt per hanc rem non per uiam possunt infici secundum naturam huius rei, quamuis haec res per proprias species non possit uideri, ut ostendetur in sequenti questione, & quamuis etiam post crystalloidem non fiat uisio secundum rectitudinem linearum, quia spiritus deferentes speciem simul cum specie poterunt infici ab hac res non per uia, & sic erit causa imaginationum. Et ex his iam aperte liquet, quid sit in hac tota questione tenendum, & quomodo ad argumenta facta in principio questionis sit respondendum. Sed tenentes uisionem fieri in neruis opticis, male poterunt saluare uisionem fieri in instanti, scilicet, cum spiritus non moueatur in instanti a crystalloide ad cruciationem neruorum.

Secundum dubium. Vtrum res non per uia existens in oculo possit uideri. Et arguitur quod non primo. uisibile positum supra oculum non potest uideri, ergo a fortiori, positum in oculo non poterit uideri, consequentia tenet & assumptum est philosophi & commentatoris secundo de anima. Secundo ad uisionem requiritur medium extrinsecum, ut uult Auer. 2. de anima commet. 77. ergo res existens in oculo cum non multiplicet species suas per medium extrinsecum non poterit uideri. In oppositum arguitur, quia uapores in oculo existentes uidentur cum de ipsis per uisum faciamus iudicium ut quod sint citrini nel rubei, &c. Praeterea species uenientes a cerebro ad oculum sunt causa uisionis, ut fuit dictum in praecedenti questione ex intentione Auer. Et certum est quod non multiplicatur per medium extrinsecum, ergo multo magis res existens in oculo per proprias species uideri poterit. Praeterea lumen positum super oculo & in oculo uideri poterit, ut docet experientia. Imo experimur in nobis ipsis quod si coprimus oculum in lachrymali domestico uersus partem syluestrem, siue teneamus oculum clausum siue apertum uideamus aliquod lumen. In hac questione dicunt aliqui quod res non per uia in oculo existens uidetur, sed male, scilicet, diminuta aut corrupte, sicut tangibile positum supra neruum sentitur, sed diminuta aut corrupte, & causam assignant, quia sunt ipsi quatuor ad uisum necessaria, scilicet obiectum, lumen medium, intrinsecum, & crystallois uidens. Contra sequitur primo quod res non per uia existens immediate supra crystalloidem non posset uideri, nec aliquo modo comprehenditur, cum non multiplicet species suas per aliquod medium, & sic non poterit esse causa imaginationum, quod est contra Iesum Hali, tractatu tertio, cap. de accidentibus crystalloidis. Secundo sequitur quod uiaa semper deberet uideri. Consequens contra experientiam, semper enim uideremus aliquod nigrum uel caelestinum. Tertio si uapor existens in oculo, aut aliud uestigium posset uideri ab oculo in quo est, etiam posset uideri ab oculo extrinseco aspicienti, consequens est falsum, nemo enim uidet uapores oculi acri. Forte dicitur quod non est similitudo, tum quia uapor existens in oculo est multum propinquus crystalloide, & magis distans a crystalloide oculi aspicientis, cum ipse uapor est in medio aqueo in quo species multiplicatur apparent maiores, sicut experimur de oculo uidenti obiectum in aqua. Contra primum, quia aliquando imaginationes pendentes a uapore apparent sub forma cimicis, aliquando maiores, ergo licet sit minor distantia inter uaporem & crystalloidem oculi acri quam inter illum & oculum aspicientem, tamen adhuc poterit apparere oculo aspicienti, sed sub quantitate minore, ut uerbi gratia, sub forma pulicis, nec obstat secunda ratio, quia species transiens de medio desiori in rariis diuertitur a perpendiculari, & propterea si obiectum sit in aqua, & oculus uidens sit in aere, obiectum apparet maius quam si ambo sint in aqua aut in aere, uapor itaque existens in oculo deberet apparere maior oculo aspicienti quam oculo in quo est. Quarto principaliter si res existens in oculo uidetur semper debere apparere in eadem distantia, cum ipsa res uisa non moueatur, ut pono, neque crystallois, nec medium mutetur, nec lumen, sed consequens est

est falsum, quia si oculus habens imaginationes aspicit in aerem, apparet ipsi quod imaginationes sunt in aere, si in parietem, quod sint in pariete. Quinto principaliter si res existens in oculo videretur per speciem propriam, sequeretur quod vestigium album existens in cornea deberet apparere album, sed consequens est falsum, quia quanto est albius, tanto oculo in quo est apparet nigrius, ut docet experientia. Certe istae rationes sunt efficaces, & de necessitate concludunt existentem in oculo proprie videri non posse ab oculo in quo sunt. Cum ergo aliquo modo comprehendatur ab oculo in quo sunt, ut docet experientia, quia si vapores sint citrini, apparent imaginationes citrinas, & si rubei, rubear, oportet ut subiungamus modum secundum quem res existens in oculo comprehenditur. Dico ergo quod res existens in oculo, aut est per uia, aut non per uia. Si per uia, aut per uia tate simili per uia tati oculi, & tunc non uidetur, neque est causa imaginationum &c. Si autem sit per uia per uia tate non simili per uia tati oculi, tunc uidetur. Et est causa imaginationum, sed non uidetur per species proprias, sed per species obiectorum extrinsecorum, quae species delatae ad crystalloidem, transcurrentes per hanc rem, taliter per uia infiguntur secundum naturam huius rei, & sic obiecta apparent citrina aut rubea &c. secundum colorem huius rei in quocumque loco fuerit haec res, siue immediate super crystalloidem, aut tela aranea, aut albuginea, aut cornea. Et simile huius accidit sicut experimur in radiis solaribus transcurrentibus per uitrum, quia apparent calidum secundum colorem uitri. Si autem haec res sit non per uia, tunc nullo modo uidetur nec per se nec per accidens, sed bene comprehenditur per potentiam superiorem, ut sensum communem aut cogitativam eo quod obiecta extrinseca apparent nigra, aut obscura, aut perforata, aut diminuta secundum illam partem ad quam species ad partem oculi non per uiam multiplicatur. Quibus sic uisus, nunc restat ut respondeamus ad rationes adductas post oppositum questionis. Dux enim rationes ante oppositum nihil aliud probant nisi quod uisibile positum in oculo, aut super oculo non potest uideri nisi in lumine propter suam materialitatem, & hoc per species proprias, cum quo tamen stat quod per species obiectorum exteriorum color existens in oculo uideri possit. Ad primum post oppositum cum dicitur, quod per uisum iudicamus vapores citrinos aut rub. &c. ita apparet qualiter sit respondendum. Ad tertium & secundum uolo postponere responsionem in fine questionis. Tamen cum dicitur, quod lumen positum super oculo, aut in oculo potest uideri, conceditur, negatur tamen consequentia cum inferitur, ergo etiam res non per uia posita in oculo, aut super oculo etiam poterit uideri, ex eo quod lumen est multum immateriale, nec adhuc ut uidetur exigit medium extrinsecum, sed color est multum materialis, nec aliquo modo uideri potest per speciem propriam nisi species sua delata sit per medium extrinsecum, ut de materiali ad immateriale reducat, & quia tactum est in illo argumento quod nobis comprimantur. oculum in lachrymali domestico apparet aliquod lumen, oportet ut huiusmodi apparitionis causam uideamus. Dico ergo quod hoc lumen quod uidetur in compressione oculi facta in lachrymali domestico & non in aliis partibus oculi, est lumen crystalloidis reflexum ab uinea ad ipsam crystalloidem, quod lumen ideo apparet in forma circuli, quia sit reflexio ab ipsa uinea perforata, & non sit reflexio in parte in qua ipsa est perforata. Et si quis argueret contra quia semper istud lumen deberet apparere, quia semper crystallois multiplicat lumen suum ad uineam, & semper flectitur ab uinea. Dicitur quod licet semper multiplicet lumen tamen ipsa crystallois mota per compressionem fortius ipsum multiplicat, aut quia moueatur, aut quia mota magis appropinquat ipsi, scilicet uinea, unde facilius fit reflexio sicut experimur quod nobis mouentibus. enssem lucidum, apparet magis sui luminis multiplicatio, & etiam maior sui luminis reflexio. Ita & hoc apparet lumine solis cadente super aqua, quae aqua quanto magis agitur, tanto lumen magis multiplicatur, & tanto magis a parietibus circumstantibus reflectitur. Et si quis diceret etiam ex compressione aliarum partium oculi, & non solum a lachrymali domestico deberet apparere hoc lumen cum similiter moueatur ipsa crystallois. Dicitur quod non tamen mouetur, sicut si fiat compressio in lachrymali domestico, & et si moueatur ipsa crystallois per compressio-

tionem in aliis partibus tamen non mouetur uersus uinea, sicut ex compressione in lachrymali domestico. Ad quartum cum dicitur tangibile positum supra sensum siue supra organum tactus aut in organo tactus sentitur, ergo positum supra oculum aut in oculo debet uideri, tenet consequentia a simili, & assumptum est manifestum ad experientiam. Respondetur quod non est simile, quia uisus est potentia magis immaterialis quam tactus, propterea exigitur ad hoc ut color uideatur etiam ut multiplicet species suas per medium extrinsecum, ut de materiali ad minus materiale reducat, non sic est de tangibili quia tactus est potentia multum materialis, & propterea non exigitur medium extrinsecum, sed sufficit intrinsecum. Et propterea dicunt aliqui, quod si tangibile sit positum supra sensum, siue supra neruum, neruus non sentit secundum partem immediatam ipsi tangibili, sed secundum partem sequentem, & ipsa pars immediata tangibili gerit uicem medii. Ad secundum cum dicitur ex 3. collig. de accidentibus sensus uisus, quod species delatae a memoratiua ab aliqua uirtute intrinseca cerebri ad sensum communem, & a sensu communi ad uisum uel auditum est causa uisionis & auditionis &c. ergo a fortiori species multiplicata ab obiecto existente in oculo erit causa uisionis, negaretur consequentia apud uolentem sequi Auer. ex eo quod species perueniens a cerebro ad oculum est multum immaterialis non indigens medio extrinseco ad hoc scilicet ut ad immateriale reducat. Sed species rei existentis in oculo est multum materialis indigens medio extrinseco ad hoc ut ad immateriale reducat, & sit conueniens obiectum sensus uisus. Et sic secundum Auer. haberemus concedere homines uidere & audire, & exercere omnes operationes sensus in somno sicut in uigiliis. Sed contra sequitur quod sine lumine contingit uidere, consequens falsum contra philosophos & perfectiuos, consequentia probatur, quia species patris tui iam defuncti in memoratiua, aut in uirtute phantastica reueruata, aut ab aliqua potentia cerebri cognitiua comprehensa potest deferri ad crystalloidem. Et similiter species uocis eius deferri ad organum auditus, & sic fiet uisio eius, & auditus uocis eius tam in somno quam in uigilia, tam in luce quam in tenebris. Sequitur secundo quod non ens proprie & uere uidetur & auditur, quia species & simulachrum coloris & figurae patris tui existens in crystalloide, representans patrem tuum, est causa sufficiens ad ueram uisionem. Similiter species uocis eius comprehensa per auditum est causa sufficiens ad ueram auditionem, & bene, sicut si uox patris tui, aut color eius existentis coram te multiplicaretur per medium ad organum uisus & auditus. Tertio sequitur, quod color non est obiectum uisus, nec sonus, auditus, consequens falsum contra omnem scholam philosophorum. Et consequentia probatur, quia nihil est color, nec obiectum uisus, nec sonus, nec obiectum auditus nisi illud sit, sed hic color patris tui, & haec uox eius non est, nec potest esse, ergo sequitur quod color non est obiectum uisus, nec uox auditus.

In oppositum est Auer. cuius hic est textus. Sed fit modo contrario, quia motus incipit in uirtute imaginatiua propter formam receptam de foris in uigilia aliquo tempore. & illa est remota, & propterea mouet primo sensum communem, & communis particulares sensus, tunc sentiuntur res quasi essent extra, & sicut hoc fit in somno, eodem modo fit in uigilia propter multam sollicitudinem circa aliquam rem. Et per hoc confirmantur uirtutes animae, aut propter aliquam agilitudinem fixam in corpore, aut propter timorem, aut tristitiam, quia resoluitur quidam uapor & ascendit cerebrum, & in ipso imprimatur forma rei cogitata, & ascendendo superius mouet spiritum animalem, & deducitur iste motus usque ad uirtutem imaginatiua, & mediante ipsa mouetur sensus communis, & ille mouet particularem sensum, & sentitur res ac si esset extra. & uulgus credit quod hoc fiat ab angelis aut daemonibus. Et huius demonstrationes declaratae sunt ibi, & haec quidem sunt accidentia, quae superueniunt omnibus sensibus. Et forte haec est causa quod plerique homines se dicunt in uigilia uidisse & audisse mortuos loquentes, & referunt uerba audita. Et referunt aliqui se uidisse daemones. Tu in hac materia tene quod uis, pro nulla parte sunt demonstrationes. Ego tamen pro parte mea uolo credere Auer. Sed respondeamus ad rationes adductas in contrarium. Ad primum cum in

Io. Arculani I fertur

fertur q̄ sine lumine cōtingit uideri, cōceditur de lumine extrinseco, sed nō de intrinseco ipsius crystalloidis & spiritui uisibilium. Et si quis diceret, quōd si quis esset cecus aut priuatus auditu posset ne uidere aut audire per huiusmodi species delatas à cerebro ad organa istarum potentiarum. Dicit q̄ non, ad quācūq; enim sensationem requiritur potētia sentiētiens. Ad secundum cum infertur quōd non ens uidetur & auditur, vere cōceditur q̄ æque bene auditur & uidet̄, sicut si obiectū esset in præsētia, imo q̄ plus est non ens, nec potens esse, nec quōd vnq̄ fuit, nec q̄ vnquā erit proprie uidet̄ & auditur, nam quodcūq; potest per uirtutē imaginatiuam imaginari, potest etiā uideri & audiri speciebus illis delatis ab imaginatiua ad hos sensus exteriores, & p̄ ipsos cōprehēsis, per quos repræsētat̄ forma & similitudo, ac si obiecta essent in præsētia, quāuis accidat error & decipiat homo credens has res uisās & auditas esse coram ipso cum nō sint &c. Ad tertium negatur consequentia, sed bene verum est, quōd color qui non est nec potest esse, & similiter sonus qui non est &c. sunt obiecta uisus & auditus, nec ualet hoc argumentum, hoc uidetur aut est obiectum uisus, ergo hoc est, sicut non sequitur, hoc imaginat̄, ergo hoc est. Et si infertur quōd arguitur à tertio adiacente ad secundū, qui secundū logicos est optimus modus arguendi &c. Dicitur q̄ non arguitur illo modo, sed debet argui, hoc est obiectum uisus, ergo hoc potest obici uisui. Sicut non sequit̄, hoc est obiectū uirtutis imaginatiuæ, ergo hoc est, quia esse obiectū alicuius potētiæ non est nisi cōprehendi per ipsam. Sed nō sequitur, hoc comprehenditur per aliquam potentiam, ergo hoc est. Aliter dicitur q̄ à tertio adiacente ad secundū non tenet vniuersaliter argumentum cum terminis ampliatiuis. Sed forte quis instabit. Quia hæc visio de qua sermo præcelsit est corrupta quia per ipsum iudicatur obiectum esse in præsētia quod nō est, ergo non est uera & perfecta. Secundo quia hæc est differentia inter sensus exteriores & interiores, quia exteriores complent operationes suas in præsētia obiecti, interiores uero tam in præsētia quā in absētia, ut est de intentione Aristotel. 2. de anima. Ad hoc respondetur, quōd ista uisio in se non est corrupta, quia per species ad uirtutem uisuiam à cerebro delatas optime comprehenditur forma, & simulachrum rei per species illas repræsētat̄. Sed pro tanto dicitur, quōd est corrupta, quia est causa quōd imaginatio corrūpatur, iudicando aliquid esse in præsētia quod non est, nec sequitur, hæc visio est corrupta hoc modo, ergo non est uera & perfecta, sicut visio fumi per uisum acutissimum est visio corrupta, & tamen uera. Ad secundum dicitur, quōd uerum est quod ordine recto sensus exteriores sentiunt in præsētia obiecti, sed ordine retrogrado non est inconueniens, quod sentiant in absētia obiecti, sicut ordine retrogrado imaginatiua aliquando imaginatur per species delatas à memoria. Hoc enim modo fit reminiscētia. Et tamen certum est, quōd quocūq; modo imaginetur, imaginatiua est uera & perfecta imaginatio, ergo & similiter speciebus delatis à sensibus interioribus ad exteriores. Posset tamē quis oppositum determinationis sensatæ defendere, & forte probabilius & conformius opinioni communi. Et dicere quōd ad uisionem ueram requiritur præsētia obiecti. Tu uero eam partem teneto, quæ magis tibi consona erit. Hæc enim dixi nunquam audita nec lecta, tu uero in quibus erratum est corrige, &c.

Signa imaginationū absolute sunt ipsæmet imaginationes. Signa imaginationū propter acuitatem uisus quæ non comparantur ad nocumentū sunt tria. Primum, quod sunt leues & materiæ nullo modo uisui nocentes secundum quod sunt diuersorum modorum & figurarum. Secundum, quod atomi in aere existentes sunt diuersi, & secundū quid fumi in oculo existentes sunt diuersi à quibus oculus nō denudatur. Tertiū quod aliquando defunt istæ imaginationes in duob. casibus, scilicet, aut cum aer non est bene clarus, aut cum homo non aduertit, extra hos casus semp cōprehendūt̄. Signa autem imaginationū quæ cōparantur ad nocumentū, sunt his cōtraria. Signa uero imaginationū per cōitatē à toto, sicut, in febribus, aut crībus sunt ipsæ febres, aut crīses, quibus auctis augentur imaginationes, & diminutis diminuuntur, & secūdo, quia sunt communes utriusq; oculis. Signa imaginationū per cōitatem à stomacho sunt. Primum ipsa stomachi nocu-

menta, quibus auctis, augēt̄ etiam imaginationes, & diminutis diminuuntur. Secundum, quod sunt cōes utriusq; oculis. Tertiū, quod augentur tempore repletionis stomachi, & præcipue rebus uaporantibus, & propter malos motus sumpto cibo, & diminuuntur in uacuitate stomachi, & ipso inanito & famelico, nisi pendeant ex cholera, in quo casu frequenter augetur cholera tempore famis ad stomachum repēte, & per sumptionem cibi moderati frigidi stiptici sedatur. Quartum est, q̄ per euacuationem ipsius stomachi vomitu aut secessu minuuntur, & ex contrariis causis augentur, &c. Signa imaginationum per cōmunitatē à matrice aut aliis membris particularibus sunt nocumenta matricis, & aliorū, quibus auctis augentur, & diminutis diminuuntur. Et sunt communes utriusq; oculis & mēstris, & aliis humiditatibus à matrice debite fluentibus minuuntur, ipsi retentis augentur. Et similiter de superfluitatibus aliorum membrorum. Signa imaginationum per cōmunitatē à cerebro quæ secūdo plurimum minantur cataractam magis quā imaginationes per cōitatē ab aliis mēbris, sunt ipsa capitis nocumenta, quibus auctis augentur, & diminutis diminuuntur. Et sunt aliquando communes utriusq; oculis. Aliquando proprie uni oculo, secundum quod vapores aut materiæ caput replentes sunt in una parte cerebri, aut in utriusq; dextra & sinistra. Quod cognoscitur per grauedinem & alias læsiones unius partis tū, aut ambarum. Secundum signum, quia hæc imaginationes secundum plurimum augendo procedunt, & in cataracta trāsēit multo magis quā per cōitatē stomachi propter 3. causas. Prima, quia vapores seu materiæ cerebrales attinēt magis naturæ aqueæ, & conformiores sunt ipsi cataractæ quā uapores stomachales. Secūda, quia, nocumenta stomachi facilius remouent quā nocumenta cerebri. Tertia, quia materia existens in cerebro facile et fluit ad mēbra supposita, scilicet oculos cætera instrumēta sensui. Signa uero imaginationū per essētiā in oculo quibus distinguunt̄ ab illis quæ sunt per cōitatem sunt. Primū, absētia nocumentorū aliorū membrorum oculis communicantium. Secundum, præsētia nocumentorum ipsius oculi, uel quæ saltem præcesserunt. Tertiū, quod secundum plurimū sunt propriæ uni oculo. Quartum, quod sint continuæ à quibus oculus nunquam absoluit̄. Quintū q̄ nō recipiunt facilem mutationē, sed aut stant uniformiter, aut si augentur, augendo procedūt, aut si minuantur, minuendo procedūt. Signa uero propter nocumentum corneæ sunt. Primum, ægritudines in cornea præcedentes, scilicet ulcus, albugo & similes, ex quibus derelictum est aliquod uestigium occultum. Secundum, quod non recipiunt facilem mutationem, ita ut nunc augeantur, nunc minuantur. Sed aut stant uniformiter, aut si augentur, augendo procedunt, & si diminuuntur, diminuendo procedunt. Tertiū, quia sunt continuæ à quibus oculus nunquam absoluitur. Quartum, quia non perducunt ad cataractam.

Signa imaginationum per essētiā in albugineo, sunt ipsa nocumenta albuginei cum priuatione nocumentorum aliarum partium oculi, quæ nocumenta sunt aliquod genus malitiæ complexionis calid. frig. humid. uel sic. cum materia uel sine materia. Verum mala complexio sicca quæ cognoscitur ex eo quod tempore famis & inanitionis augetur & ex contrariis causis minuitur nunquam perducit ad cataractam, licet sit causa imaginationum. Mala autem complexio calid. raro perducit ad cataractam, sed tñ aliquā, scilicet cum aliqua particula humoris albuginei subtiliat̄, & in aerem conuertitur, pars aut aerea genita per calid. & mixta cū parte aquea est causa coloris albi, sicut in spuma, licet hæc proprie non erit cataracta, sed bene ualde similis cataractæ, ita ut medicus male possit distinguere inter hanc & cataractam. Et forte quod hæc per approximationem in frigiditatem tam exterioris quā interioris ipsa parte aerea in crassata, & ad naturam albuginei reducta poterit curari, & reputabitur mirabile. Mala autem cōplexio frig. & humid. est illa quæ in plurimū est causa, ut imaginationes transeant in aquam & uerā cataractam trib. modis. Primo, contrahendo aliquam partem ipsius albuginei, ita ut per congelationem acquirat albedinem & fiat non peruia, aut propter humid. obscurantem, faciendo ipsam non peruiam. Sed est difficile uidere utrum hæc proprie sit dicenda cataracta, & utrum cū acui possit deponi. Secundo,

cundo, retinendo uapores proprios & alienos, scilicet per communitatem, & ipsos in aquam conuertendo, cui concor dat glosa Alman. in hoc cap. Tertio, debilitando digestiua, & etiam expulsiua ipsius albuginei, ita ut nutrimentum eius siue uere nutriatur siue non, non debite cōuertatur in ipsum albugineum, sed generetur aliqua pars nō peruia, & erit defectus ultimi actus, qui uocatur assimilatio. Aut forte, quia superfluitates in unaquaq; digestionē refecandā debilitatā expulsiua non resoluentur, sed remanentes conuertentur in humid. aqueam, quę erit uera cataracta, genita per uiam paulatim factę congestiōis, sicut & illa quę erit per retentionem uaporis proprii incrassati in aquam, dicitur uera cataracta & genita per uiam paulatim factę cōgestiōis &c. Secundum signum, quia hę imaginationes sunt continuę a quibus oculus nunquam absoluitur. Tertium, qđ non recipiunt facilem mutationem, sed aut stant, aut si augentur in augendo procedunt, & si minuantur, minuendo procedunt. Quartum, quia apparet quidam obfuscatio in pupilla tam ipsi argro, quā oculo aspicienti, licet cornea appareat bene teris et peruia. Quintum, quia secundum plurimum perducunt ad cataract. maxime illę imaginationes quę pēdēt a mala conplexione frig. & humid. & hę semper agendo procedunt. Si uero imaginationum per essentiam in tela aranea & crystalloide sunt ipsę imaginationes absque nocumēis aliarum partium oculi. Secundum, quia non recipiunt facilem mutationē. Tertium, quia sunt continuę. Quartum, quia non perducunt ad cataract. Et in summa cataracta non est nisi in ipso albugineo, aut infra ostendunt, licet possit adherere tunici. Signa autem quibus cognoscuntur imaginationes ducētes ad cataract. ab alijs sunt, quia ducentes ad aquā sunt proprie uni oculo secundum plurimum, & sunt cōtinuę, & augmentando procedunt, & apparet oculo obfuscatio, tam ipsi argro qđ aspicienti. Et apparentes candelę duplices aut similes rei luminosę lumine extrinseco recepto in uaporibus aqueis crassis. Et aliquandū retento donec comprehendatur ad crystalloide, aut forti lumine, scilicet ipsius crystalloidis & spirituum uisibilium reflexo ab ipsis uaporibus crassis ad crystalloide, & non pertranseunt duo menses secundum Alman. qđ cataracta completur. Et secundum Rasim secundo continētis, & Iesum Hali. tract. tertio. cap. de imaginationib. non pertranseunt tres menses aut quatuor. Et secundum Auic. sex mēses qđ cataracta completur: cataractarum autem non perducunt ad aquam sunt signa contraria. Sed ne cui mirū uideatur quare authores ita diuersos terminos posuerunt, nec uidentur concordēs, quia hoc inueniunt est experientia, unde secundum quod diuersi authores diuersa tēpora experiri sunt, ita etiam diuersa tēpora scripserūt, quę diuersitas potuit accidere ratione diuersorum regiminum, diuersorum temporum, diuersarum regionum, diuersarū complexionum. Auic. uero tempus eligit longius. Sed scias qđ aliquando cataractę accidunt nullis precedentibus imaginationibus, humiditate ad albugineum delata fere subito per neruos opticos aliquādo ea die, uel secunda, quā apparent imaginationes, apparet aqua ex eadem causa, aliquādo pluribus diebus apparent imaginationes quę continue augendo procedunt, & sic fit aqua secundum plurimum ante duos menses, per uiam. s. paulatim factę congestiōis, aut quia uapores aliunde delati ad albugineum incrassantur, & in cataractam conuertuntur. Quandoq; uero pertranseunt sex menses & amplius antequam imaginationes in aquā uertantur, sed hoc est rarissimum. Attende tamen duo, qđ plures sunt imaginationes ducētes ad aquam per communitatem a cerebro quā per essentiam in oculo. Et sunt plures per essentiam in oculo qđ per cōitatem a stomacho aut ab alijs mēbris. Sed de nō perducuntibus ad aquam contrarium iudica. Vnde licet uapores stomachi aut aliorum membrorum possint ducere ad cataractam, hoc tamen rarum est, frequenter tamen faciunt imaginationes non ducentes ad aquam.

Prognostica ex iam dictis satis innotescunt. Iam enim uisum est quę imaginationes proueniunt ex acuitate uisus, quę non comparantur ad nocumentum, & quę comparantur ad nocumentum. Et inter comparatas ad nocumentū, iam notę sunt illę quę sunt male perducētes ad cataractā. Et similiter quę licet noceāt uisui, non tñ perducunt ad cataractam. Sed

quia aliquando ad imaginationes sequuntur cataractę. Et quia Rasim in presenti cap. aliquid de ipsis loquitur, ideo pro completiori doctrina de cataractis est agendum.

De cataracta.

Cataracta ergo descensus aquę, aqua descēdens in oculum, gutta, suffusio sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem. De qua diuersi authores sub his diuersis nominib. determinant. Dicitur cataracta a cataratin, quod idē est quod de critto, oculus enim cataracticus est qui de missu aquę obstrusus est. Dicitur aqua ad similitudinem aquę fluidę in principio. In processu autē dum confirmata est dicitur ad similitudinem aquę congelatę. Et ex eadem causa dicitur gutta. Dicitur enim descensus aquę siue aqua descēdens ex eo quod frequentius fit per uiam defluxus quā per uiam paulatim factę congestiōis. Et ex eadē causa dicitur a G. infusio siue suffusio. Et diffinitio est oppilatio ex aqua inter corneam & crystalloide sita uisum impediens. Licet aliqui alij aliter diffiniant, quod est macula pannicularis intra oculum coram pupilla, per quā uisus prohibetur, ex humid. extranea in oculo existente, temporis diu turnitate & frigid. oculi congelata. Et hęc diffinitio proprie diffinit cataractā iam confirmatam. Et ex prima diffinitione quę est artificialior collige, qđ cataracta est morbus in uia & non in numero ut quidam opinati sunt, non n. sensibiliter lædit operationes pro quanto est aliquid superadditum partibus oculi. Nam si illa aqua esset in profundo albuginei non coram pupilla, non læderet sensibiliter operationes, & tamē aque bene esset aliquid superadditū partibus oculi, sed quia est coram pupilla prohibens uisum, lædit operationem principalem oculi, & propterea morbus in uia, non autem in numero. Ex quo concipe qđ aqua est causa morbi, scilicet oppilationis, ipsa n. oppilatio est morbus, & læsio operationis uisus est accidens. Ipsa tamen aqua licet non sit morbus in numero, reduciatur tamen ad morbum in numero &c.

Sed circa dicta cadit dubium nondum discussum, cuius dubij solutio est multum necessaria ad curandū cataractas operatione manuali, scilicet in quo loco cataracta sitet, & per consequens ad quem locum debeat peruenire acus pro depositione cataractę. In quo dubio authores & doctores multum fuisse discordes. Aliqui namq; ut Alzaraius cap. de aqua. Haliabbas. 9. theoricę, & tertio eiusdem. Et similiter Gal. 3. techni. Et Gilbertus Cap. de aqua, uolunt aquam situari inter uueam & crystalloide, & per consequens acū, pro deponendo cataractam, debere penetrare usq; ad intra uueam. E contra uero Iesus Hali. A. Mesue, Albucasis afferunt aquam contineri inter uueam & corneā, & consequenter acū non debere perforare uueam sed solum coniunctiuam, & scleroticam coniunctiuę immediatam, & ita immediatam, ut appareat una sola, sicut & cornea manifeste apparet cū coniunctiua uniri ipsis solum differentibus secundum peruietatem & imperuietatem.

Pro cuius dubij solutione prætermittēdum cataractā dupliciter sumi, scilicet communiter & proprie. Cataracta cōmuniter sumpta est oppilatio aquosa prohibēs uisum, unde ubique potest esse oppilatio aquosa prohibens uisum ibi potest esse cataracta. Vnde nō solum ante crystalloide, sed in crystalloide & post crystalloide, scilicet in uitro, retina & secundina, sclerotica, coniunctiua neruis optici potest esse oppilatio aquosa prohibens spiritus uisibiles uenire ad crystalloide, & sic potest esse cataracta communiter sumpta, quę tamen ab oculis aspicientibus non uidetur, quā aliqui appellant guttam serenam, sed forte melius est conformando se dictis authorum appellare guttam serenam cataractam apparentem, connotando quod cum hæc sit oppilatio ultra crystalloide prohibens transitum spirituum ad oculum, sed litem de nominibus omitamus. Cataracta autem proprie sumpta est oppilatio aquosa prohibens transitum specierum uisibilium ab obiectis exterioribus ad crystalloide, & hæc ab oculis aspicientibus uideri potest. Vbiunque ergo potest esse hæc oppilatio, potest etiam esse cataracta proprie sumpta; de qua est quæstio nostra. Cum ergo hæc oppilatio aquosa possit esse in toto ambitu a cornea usque ad crystalloide, imo etiam in superficie ipsius crystalloidis, sequitur quod in toto hoc spacio potest

Io. Arculani I 2 esse

esse cataracta proprie sumpta. Et sic aliquando erit in superficie crystalloidis. Aliquando adhaerens telae araneae, siue uersus crystalloidem, siue uersus uueam. Et potest esse in qualibet parte albuginei, & in foramine uueae, & in ultima parte albuginei, adhaerens corneae. Quod autem in his omnibus partibus potest esse oppilatio aquosa, manifestum est, quia in omnibus his partibus possunt esse imaginationes aquosae, ad quas sequuntur cataractae ut supra determinatum est.

Præterea in omnibus his partibus per uiam paulatim factae congestionis potest cataracta fieri, tum ex nutrimento harum partium non bene conuerso, tum ex superfluitate nutrimenti non bene resoluta, tum etiam ex uaporibus, qui ad quamcunque harum partium communicari possunt. posset etiam in omnibus his partibus per uiam defluxus à capite cataractae generari, nam potest fluere materia ab almo chati à d. cōiunctiuam, quæ existens in coniunctiuâ potest refundare ad albugineum, & tunc colligeretur cataracta inter corneam & uueam. Et in hoc casu cum sit per uiam defluxus ab almo chati laudant authores sectionem uenarum temporalium aut frontaliū. Potest etiam materia humida deriuari à dura matre ad scleroticam, & consequenter ad corneam, & ab ipsis ad albugineum, & tunc situabitur cataracta inter corneam & uueam, potest etiam tertio materia humida in pia matre contenta deriuari ad secundam & uueam & ab ipsis refundari ad albugineum, & tunc si refundet ad intra uersus crystalloidem, cataracta situabitur inter crystalloidem & uueam. Si uero ad albugineum refundat uersus corneam, tunc cataracta situabitur inter corneam & uueam. Si uero hæc humiditas refundet ab extremitate circuli ipsius uueae, tunc directe erit in ipso foramine uueae. Si uero materia humid. sit in cerebro, & profluat ad neruos ophticos & à neruis opticiis ad retinam & telam araneam, & refundet à tela aranea uersus crystalloidem, tunc adhærebit superficiei telae araneae & crystalloidis. Si uero refundet uersus uueam, tunc situabitur in extremitate albuginei apud telam araneam, & forte adhærebit telae araneae. Ex his itaq; manifestum est in omnibus his partibus, posse generari cataractam, ipsamq; posse situari tam inter crystalloidem & uueam quam inter uueam & corneam. Ex his etiam manifestum est quomodo aliquando totus albugineus aut maior pars eius est una cataracta ipso albugineo alterato, & propter aliquam ægritudinem facta albo & imperuio, aut propter multam humiditatem ad ipsum à capite decurrentem, ipso similiter facta albo & imperuio, hinc est quod aliquando totum quod apparet de oculo est album. Sed iam restat ut solamus quidam rationes sensibiles contra utranque opinionem. Primo contra Alzarauium & ceteros, tenentes cataractam situari inter crystalloidem & uueam, & operatorem cum acu debere perforare coniunctiuam scleroticam & uueam, ut perueniat ad ipsam cataractam, nam ex hac operatione deberet sequi exitus albuginei per foramen acus, consequens est contra experientiam, ergo positio falsa. Secundo, quia cataracta non posset extrahi per sectionem corneae in parte inferiori, consequens est contra experientiam. Et A. in cap. proprio, & contra Græcos sic operantes. Sed ad hoc respondetur, sequendo opinionem istorum quæ in parte uerior est quæ opinio contraria. Ad primum quod albugineus cum sit aliquantulum uiscosus propter stricturam foraminis, acu scilicet existente subtili sicut debet esse albugineus non potest exire, quia extracta acu quamprimum foramen clauditur, etiam quia hoc argumentum æque bene procedit contra opinionem contrariam, cum acus secundum opinionem suam etiam penetret ad albugineum. Præterea hæc ratio est contra eos, quia aliquando cum punctura acus aliquid de albugineo extrahitur. Ad secundum dicitur quod non omnis cataracta curatur per sectionem corneae, sed solum illa quæ est immediata ipsi corneae, & quæ est fluida. Et forte quod in hoc casu esset melius ut illud instrumentum esset perforatum ita ut cataracta posset suggi, & hoc instrumentum esset conueniens ad extrahendum saniem existentem ad intra corneam. Sed contra opinionem A. & ceterorum sunt quinque rationes non faciles. Prima, quia si cataracta continetur intra corneam & uueam non posset apparere dilatatio & contractio uueae, quod tamen est signum semper apparens in cataracta curabili. & probatur consequentia, nam cataracta opponitur ipsi uueae uel ipsi

foramini uueae, & cooperit ipsum. Cum ergo non sit diaphana non poterit ab aspiciēte uideri ipsius dilatatio aut contractio, aliter non prohiberet uisum. Secunda, quia cataracta curabilis non deberet semper apparere ex directo pupillae, imo aliquando supra, aliquando infra, aliquando deorsum, aliquando dextrorsum, aliquando sinistrorsum secundum quod accidit aquam colligi. Consequens contra experientiam, quia cataracta curabilis semper apparet solum ex directo pupillae. Tertia ratio, quia cataracta deberet multoties apparere maior quam pupilla, imo æque magna sicut tota cornea, cum accidat aliquando multam humiditatem coagulari totam corneam occupantem. consequens contra experientiam, quia apparet fere semper ad quantitatem pupillae saltem cataracta curabilis. Quarta ratio, quia acus imposita perueniens ex directo corneae cum cornea sit diaphana in omni tempore sui deberet uideri in qualibet parte, sed consequens est falsum, quia non uidetur nisi ex directo pupillae, cuius signum est, quod operatores perforant uueam unde acus solum apparet ex directo pupillae &c. Quinta ratio sumitur ex difficultate operationis, quæ fere æquatur impossibilitati. Est enim difficillimum perforare coniunctiuam & non uueam sibi immediatam in ea parte in qua sit perforatio, cuius maxima apparet difficultas, ex eo quod aliqui sunt experti in oculis mortuis, & nunquam possunt perforare solum coniunctiuam, ita ut penetraret cum acu inter coniunctiuam & uueam ad uacuum coram pupilla, ergo multo minus in oculis uiuis, qui dolent & non ita quiescunt tempore operationis. Illæ quidem rationes ut uidetur sunt apparenter concludentes contra A. Iesum Hali, & alios hanc uiam sequentes. Et forte si multoties operati fuissent, mutassent opinionem. Credo ergo propter rationes predictas, quod secundum plurimum cataracta deponibilis est ad intra uueam, aut in circumferentia foraminis uueae, licet etiam aliquando contineatur intra corneam & uueam, ut ante probatum est. Et credo quod absolute melius sit & depositio cataractae congruentius, ut operator cum acu perforat uueam, nam hoc modo facile deponet cataractam, quæ erit intra uueam in quacunque parte fuerit, imo etiam si esset immediata telae araneae. Cauendum tamen summo opere in curatione ne moueatur & disrumpatur tela araneae, sic enim necessario uis impediretur, est enim post crystal. principalissima particula concurrens ad uisionem, nec est ut quidam somniauerunt, quod cataracta deponibilis adhæret telae araneae & simul deponitur cum tela aranea. Et dicunt quod hæc est causa propter quam semel deposita cataracta in uno oculo nunquam alia generatur in eodem, potest etiam cum hac operatione facile deponi cataractam, quæ est prope uueam uel in ipsis foramine, & quæ est ultra foramen uueae adhaerens corneae, penetrando acu per foramen uueae usque ad corneam, non autem ita facile secundum modum Iesum Hali & A. poterit deponi cataracta ea, scilicet maxime quæ est ad intra uueam ut patet consyderanti, quamquam Iesus Hali dicat, quod per foramen uueae contorquendo acum, intromittitur cuspis acus, & cataracta existens intra uueam potest trahi extra uueam, & poni sub corneam. Et dicit, quod in extractione dilatabitur foramen uueae, deinde ex se claudetur sicut in exitu foetus aperitur collum matricis, deinde post exitum clauditur. Sed facilius est dicere quam facere. Et pro opinione contra Iesum Hali, A. & ceteros, est operatio omnium modernorum, qui deponendo eas, perforant uueam, & eligunt hunc modum tanquam aptiorē & faciliorem, ad quem minor dolor & remissiora sequuntur accidētia, sicuti. n. fuissent prima, si fuisset conueniens. Artes. n. factæ sunt per additamenta, & cuiuslibet est addere quod deficit. 1. ethic. Sed tamen quia rationes contra A. & Iesum Hali concludebant, cataractam deponibilem nunquam contineri inter uueam & corneam, ideo ad rationes illas est respondendum. Ad primum, cum infertur, quod non posset uideri dilatatio & contractio pupillae, cataracta posita inter uidentem & uueam: negatur consequentia, quia cataracta deponibilis debet esse aliquantulum transparens, & à lumine irradiabilis. Unde habentes ipsam aliquantulum lumen, licet non uideant colores &c. Unde uuea mota aliquantulum poterit uideri licet difficulter. Ad secundum cum infertur, quod non deberet semper situari ex opposito pupillae, sed aliqui magis supra uel infra. Cōceditur ut plerumque accidit, unde propter hanc causam aliquando cataractae uidentur

ei uident medietatem inferiorem unius rei, aliquando superiorem, aliquando dextram, aliquando sinistram. Ad tertium, cum infertur quod aliquando deberet occupare totam corneam. Conceditur & tunc illa cataracta nullo modo est peruia nec illuminabilis, & apparet tegere totam corneam, & non est deponibilis uel raro. Si autem sit a lumine irradiabilis, tunc magis irradiatur in ea parte in qua est subtilior, sed est subtilior in circumferentijs corneae quam in medio ipsius, & ideo in medio ipsius apparet magis determinare uisum, & sic habere magis rationem cataractae, in circumferentijs autem licet sit, quia non terminant uisum, non habent rationem cataractae, & haec est causa propter quam cataracta uidetur minor in loco luculentissimo quam in loco obscuriori, sicut etiam ea quae continentur intra uueam uidetur minor, scilicet, quia propter dispersionem luminis foramen uueae constringitur & in obscuro dilatur. Ad quartum, cum infertur quod deberet uideri cuspidis acus cum est ex directo corneae & non solum pupillae, conceditur, sed non apud operantes modernos, qui perforant uisum ad uueam, uel perforant uueam, non enim uidetur nunc nisi ex directo pupillae. Ad ultimum argumentum sumptum ex difficultate operationis dicitur, quod haec operatio est difficilior, sed tamen non est impossibilis. Et si arguatur quia in oculo mortuo non potest fieri, ergo minus in uiuo dolente, & non ita bene quiescente, negatur consequentia, quia in uiuo haec tunica magis distat calore spirituum dilatante & quodammodo replente inter tunicam & tunicam, quo consumptio corrugantur, & magis sibi inuicem appropinquant. Signa autem quibus distincte comprehendere potest, an cataracta sit inter uueam & corneam, an post uueam, an in foramine, subiungam cum agetur de signis &c. Species cataractarum quandoque sumuntur a quantitate. Quia quaedam sunt magnae oppilantes totam pupillam, ut ex nulla parte remaneat discooperata, & tunc obiecta extrinseca secundum nullam eorum partem comprehendere possunt, & aliquando est ita magna ut fere occupet totum oculum albugineo toto propter aliquam æritudinem factam in peruoio, est, n. totus una cataracta, & similiter si multitudo humi. fere per totum albugineum a cerebro deriuatur. Quaedam sunt paruae oppilantes solum partem pupillae, & tunc obiecta uidentur secundum eam partem secundum quam pupilla est discooperata. Vnde obiectorum aliquando uidetur dextra pars & non sinistra. Aliquando superius & non inferius. Aliquando solum uidetur circumferentia, imo in medio existimatur sicut obscura siue perforata, licet eadem obiecta ut dicit A. quae secundum unum situm non uidetur totaliter ipsorum situ mutato totaliter uidebuntur. Aliquando species cataractae sumuntur a colore. Et sunt quatuor in genere, albus phlegmatici proportionatus, rubeus sanguinis, citrinus, aut uiridis clarus cholerae, niger melancholicus. Sub colore albo continentur sex species, scilicet cataracta. Primo, coloris aerei aut aetherei. Secundo, coloris margaritalis. Tercio, coloris albi uergentis ad citrinum siue plumbei. Quarto coloris albi tendentis ad uiridem. Quinto similes argento uiuo non solum in colore sed etiam in motu, nam ex quacunque oculi palpitatione, imo ex motu spirituum agitantur & mouentur ex eo quod illa aqua est fluida non condensata. Sexto sunt gypseae ipso phlegmate multum inspissatae. Sub colore autem rubeo attestantur sanguini continentur rubeae, clarescentes, siue aureae, non n. reperiuntur aliquae quae proprio sanguinis colori attestentur. Quaedam prudenter a sanguine sunt albæ saniosae ipso sanguine in saniem uerso, quod tamen raro accidit, nam si uertatur in saniem, sanies descendit in albugineo sua grauitate & non stat coram pupilla, aliquando sunt citrinæ aut remissæ aut intensæ. Et aliquando uirides clarescentes, & hæc pendet a cholera, aliquando sunt melancholicæ, aut nigrae aut uiolaceæ, aut uirides obscuræ, quamquam color uiridis obscurus non solum pendere possit ab humore sic colorato, sed et a multitudine aquae: aqua n. multa profunda sicut experimur in fluuijs apparet uiridis obscura. Color n. niger non semper pendet ab humore nigro, sed aliquando apparet in pupilla propter luminis diminutionem & non est uera nigredo, sed obscuritas. Tercio sumunt species cataractae a modo substantiae. Nam quaedam sunt subtiles nondum inuiscatae sicut accidit in principio cataractarum non confirmatarum. Quaedam sunt adeo incrassatae & inuiscatae ut sint quodammodo in pan-

num uersae, & multum adherentes, quaedam sunt mediæ inter has quae solae sunt cum acu deponibiles. Sumunt & quarto species cataractae. Nam quaedam sunt cum oppilatione nerui optici aut alicuius partis ultra crystalloidem. Quaedam sine oppilatione. Quinta diuisio, nam quaedam situantur inter corneam & uueam, quaedam inter uueam & crystalloidem, quaedam in circumferentia foraminis uueae, ut antea dictum fuit &c.

Signa cataractae absolutae sunt ipsæmet cataractae, quae a do mestico artis facile comprehenduntur habere uisum acutum. Differunt enim ab albugine & alijs uestigijs existentibus in cornea, quia hæc sunt in superficie corneae extrinseca cataractae ultra corneam. Differunt a sanie retro corneam, quia sanies in parte inferiori corneae apparet ad modum lunellae, & si cooperit totam corneam dicitur cataracta, similiter partem corneae ex directo pupillae. Signa cataractae quae diuersificantur secundum quantitatem nota sunt ad uisum & ex relatu ægri. Signa cataractae diuersificate secundum colores nota sunt cuiusque bene uidentur: nam & si aliquando color obscurus per priuationem luminis reputetur niger, & a non bene considerante reputetur pendere a melanch. tamen si quis exercitatus bene aspiciat comprehendet diuersitatem inter colorem nigrum uera nigredine & obscurum. Signa cataractae distinctae secundum uel penes modum substantiae sunt duo. Primum quia si quis fricat oculum cataracticum & immediate post aspiciat in oculo, & uideat aquam dilatari in tantum ut una pars appareat ab altera diuidi & separari, tunc est nimis subtilis. Si autem appareat dilatari & non separari & postea immediate ad suum situm consuetum redeat, tunc est mediocris & cum acu deponibilis. Si autem per frictionem nullo modo moueatur, est nimis indurata non curabilis. Secundo isti experimetores ponunt cottum super oculo, & fortiter sufflant, ut illud cottum motum fortiter commoueat oculum, & immediate aspicientes in oculum indicant per motum cataractae aut priuationem motus secundum quod statim dictum fuit. Sed consilio A. hæc experientia non est saepe tentanda, nam est ex eis quae conturbant aquam, & facit curam cum instrumeto difficilem. Signa distinguenda utrum sint cum oppilatione alicuius partis ultra crystalloidem, aut non sunt quia oculus alter debet claudere & comprimi, tunc si per compressionem apparebit dilatio aut contractio pupillae alterius oculi, est signum oppilationem non adesse, spiritualibus transuentibus de uno oculo ad alterum. Si uero fiat dilatio & contractio, adesse oppilatio, uel uno oculo compresso, alter oculus in quo uis experiri, fricetur, & uideatur utrum pupilla dilatetur & constringatur. Verum hoc signum fallit si cataractae crassae essent in ambobus oculis, tunc enim pupilla propter inuiscationem a cataracta non poterit moueri, & si mouebitur non comprehendetur ab aspiciente. fallit secundo, quando quis pateretur alintis, aut contractionem praeternaturalem in ambobus oculis. Secundum signum est quia secundum plurimum ubi non est oppilatio integra uidetur aliquis splendor cum oculus est in loco luculentissimo constitutus & praecipue si uenerit de obscuro loco ad clarissimum, aut si subito magnum lumen praesentatum fuerit. Signa cataractarum situatarum inter corneam & uueam sunt impedimentum uisionis uueae, nam si cataractae sint male non irradiabiles, a lumine uuea nullo modo uidetur, si uero sunt irradiabiles, foramen uueae aliquo modo uidetur & in loco clarissimo tamen cum difficultate. Secundum signum, quia apparent non solum oppilare corneam ex directo pupillae, sed interdum multo maiorem partem aut totam corneam praecipue si aspiciantur in loco tenebroso. Tercium, quia enim plurimum sunt aliquantulum laterales non in directo ipsius pupillae sed aliquando magis a dextris, aliquando a sinistris, superius uero magis aliquando, aliquando magis inferius, licet sint pupillae communicantes, quia aliter non essent cataractae. Quartum signum quia pupilla est & apparet strictior consueti ipsa cataracta impellente uueam interius sua corpulentia. Vnde foramen apparet minus. sed opposita signa sunt omnino, cum cataracta est intra uueam, quia uuea clare uidetur et in loco non multum lucet. Apparet solum ex directo pupillae & nunquam occupare maiorem partem quam sit pupilla, licet aliquando minor, & foramen uueae enim plurimum apparet maius consuetum ipsa cataracta sua corpulentia expellente uueam, unde fo-

Io. Arculani

I 3 ramen

ramen dilatatur. Signa cataractæ existentis in circumferentia foraminis sunt omnia signa iam dicta quando est intra uueam, aut maior pars eorum. Sed est unum signum distinctiuum sensibile, quia foramen uueæ apparet minus remotum ab oculo uidente quod ipsa cataracta, si ipsa cataracta sit de albis sicut ut plurimum est, nam in æquali distantia color niger apparet propinquior quam albus.

Prognostica. Primum cataracta maxima quæ fere totum occupat oculum non est curabilis. Secundum. Cataractæ aeræ, scilicet margaritales declinantes ad nigræ cineritæ sue plumbeæ sunt curabiles. Sed similes argento uiuo fm Græcos facile curant. Gypseæ uero & similes argento uiuo non sunt cum acu deponibiles. Auræ citrinæ non uehementis citrinitatis difficile curantur. Sed intensæ citrinitatis non curantur. Sed nigræ violaceæ, plumbeæ, uehementis nigredinis non curantur. Virides obcuræ non curantur. Virides claræ difficile curantur. Cataracta mediocris substantiæ cū acu deponibilis est, subtilis substantiæ nondum confirmatæ cum medicinis aliquando curantur, licet raro, non autē cum acu deponi possunt. Nimis autem incrassatæ quæ non mouentur per compressionem neque cum acu neque medicinis sunt curabiles. Cataractæ quæ sunt cum oppilatione nervi optici integre sunt incurabiles, sed sine oppilatione curabiles. Et cataractæ, quæ post casum aut ægritudinem cerebri aut propter percussionem in capite sue in oculo accidit sit difficilis curatio eius. Cura, quia imaginationes & cataractæ multum sunt affines, de ambarum cura simul agendum est hoc præmissum quod hic non intendo curare imaginationes proueniētes ex acuitate uisus, quia non comparantur ad nocumentum, nec intendendo ponere curam earum quæ pendent à siccitate, quæ remouentur per humectantia interius & exterius applicita, quia de ipsis actum est sufficienter in capite de debilitate uisus. Ad quod recurrit neque hic intendo ponere curam imaginationum proueniētiū ex uestigijs derelictis in cornea ex albugine, ulcere, & alijs ægritudinibus in ipsa præcedētib, nam de earum cura sufficienter dictum est supra. Hic ergo solum intendo ponere curam imaginationum ducentium ad aquam & ipsius aquæ initiantis aut perfectæ, siue sint per communitem sine per essentiam in oculo.

Cura itaq; harum imaginationum & aquæ initiantis per communitem à toto, aut à stomacho aut à capite & nervis optici quinq; exigit intentiones curatiuas. Prima euacuatio. Secunda diuerfit. Tertia regit membrū mittēs. Quarta oculum confortat ne materiam aliunde suscipiat, & si quid susceperit resoluit & euacuat. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium & annexorum. Prima intentio completur eisdem instrumentis, de quibus in cap. de debilitate uisus proueniēte per communitem dictum est, hoc addito quod euacuationes pro cura imaginationum & aquæ initiantis sunt multoties reiterandæ frequenter ex minoratio, digestio, & eradicatio, euacuantes diuersos humores, fm humoris exigentiam à quo pendet imaginatio siue cataracta, qui tamen ut plurimum est phlegmaticus uel aquosus, raro cholericus sanguineus aut melancholicus. Et propterea raro in hoc ca. competit phlebotomia aut alia sanguinis euacuatio. Et si materiæ peccantes fuerint in stomacho, uomitu possent euacuari, sed cum timore & magna obseruatione ne materia præcipitetur ad nervos opticos aut ad oculos, itaq; capite debet esse uomitus. Secunda intentio, scilicet, diuersio perficitur cum frictionibus, ligaturis, clysteribus, pedum lotionibus, & si materia fuerit in capite cum gargarismatib. masticatorijs, caput purgij per nares, quæ tamen postponenda sunt quantum sit possibile ne propter uicinam materiam ad oculum præcipitent. Et his non sufficientibus cum laqueatione in suprema parte colli terminata ad occiput, & cum cauterio in parte posteriori capitis, scilicet, in cornu capitis ex directo oculi patientis, & cum cauterio in commissura coronali, & si materia fuerit sanguinea, quæ raro est, cum phlebotomia uenarum nocte, & uenarū post aures, & frontaliū & temporalium si opus fuerit, imo laudat Auic. in hoc casu incisionem arteriarum temporalium: quod similiter de uenis temporalibus est intelligendum, ubi materia fluat ad oculos per partem extrinsecam quæcunque sit materia, de quibus

omnibus sufficienter actum est in capitulo de debilitate uisus, ad quod recurrit. Tertia intentio perficitur in confortando digestiuam & expulsiuam eius, ut si stomachus fuerit in causa, quod tamen raro est in imaginationibus ducētib, ad aquam, licet imaginationes non perducētes ad aquam persape causet. Debet enim confortari cū interius & exterius applicitis post sufficientem euacuationem & diuersionem, ad quod in causa frig. & hum. quæ est ut plurimum, iam laudata est triphera minor, & chebuli conditi, & multa superius nominata in debilitate uisus, in quo casu maxime os stomachi debet confortari ipsum corrugando, & claudendo in fine mense cum cytonijs aut piris conditis, aut coriandris præparatis, de quibus in cap. de debilitate uisus. Similiter caput est confortandum cum electarijs, de quibus supra ad cuius & etiam oculorum confortationem optime confert maiora sicca odorata. Quarta intentio perficitur cum collyrijs superius dictis in cura debilitatis uisus propter turbidam humiditatem in oculo, crassitiem & turbulentiam spirituum, ad quod recurrit, & accommoda huic loco siue huic cap. inferius etiam subiungētur multa collyria experta & in hoc casu laudata. Ad hoc etiam conferunt electaria & triphera, & mirbalani conditi, de quibus omnibus supra. Vltima intentio exquirit pertractatæ in cap. de debilitate uisus, sed in hoc casu amplius subtilianda est diæta, ita ut secundum Auic. solum comedant semel in die, non bibant uinum, sed aquam mellatam aut saccharatam, non comedant humida brodiaia, sed stent contenti assatis aut frixis, euitent omnia euaporatæ, & omnia præsentia nutrimentum crassum, & morentur in aere sicco, & declinante ad calidum secundum plurimum, & aspectus rerum uiridum maxime in hoc confert, & præcipue fortis & longus aspectus in oculo asini syluestris fortiter disgregat aquam subtiliat & resoluit, &c. Cura autem imaginationum & aquæ initiantis per essentiam in oculo perficitur cū eisdem intentionib. & instrumentis, de quib. ample dictum est in curatione debilitatis uisus propter humiditatem turbidam existentem in oculo, ad quod recurrit & huic cap. accommodato; inferius aut ut dixi, statim subiungētur collyria in hoc casu propria, resoluētia uapores atq; aquam in oculo iam collectam, & ipsam cū lachrymis educētia sicut etiam superius dictum fuit. Sed attende tamen quod est differentia aliqualis inter localia administrata pro cura imaginationum, & inter ea quæ administrantur pro curatione aquæ iam initiatæ. Prima enim debent esse leuiora. Secunda acutiora, quanto difficilius est resolueret aquam quam uapores, sed in omnibus tamen incipe à leuioribus, gradatim procedendo ad fortiora secundum quod ordo medicinalis exposcit, sed iam ad textus expositionem accedamus, deinde subiungemus ultra medicinas Rasis alias in hoc cap. proprias, & ultimo ponemus curam cataractæ confirmatæ cum operatione manuali, relinquētes curam cataractæ induratæ, & in paniculum solidum uersæ, quæ nullo ingenio est curabilis.

Quandoq; uidetur alicui quod ante se habeat cimices uel alia parua corpora subtilia et radiosa, quod aliquid quando causa stomachi, aliquando ex proprio nocumento ipsius oculi contingit. Ideoq; differentia inter hæc duo consideranda est. Neque pro paruo est habendum cū hoc accidens euenerit. Ex eo namq; quod causa stomachi accidit non est multum timendum quod oculo nocumentum inferat. Ex eo uero quod ex proprio uitio contingit ualde timendum est, [hoc enim aquæ principium existit.] Hæc autem passio dum recens est & in principio curabilis est. Sed cū iam ad perfectionem deuenerit sanari non potest, nisi cum incisione, & fortasse etiam incisione prodesse non poterit. Quapropter differentia inter hæc duo prædicta diligenter est inuestiganda, quæ est prout dicemus. Quando imaginationes quæ uidentur utriq; apparent oculo, existimandum est hoc contingere ex uitio stomachi, & contra, & cū imaginationes in hora fastidij, & in hora male digestionis plures solito uidentur: In hora aut famis & laboris pauciores apparent, existimandum est etiam hoc ex stomacho esse. Et si ex quo ista imaginationes acciderunt, duo præterierunt menses aut plures, & in pu

pilla

pilla non fuerit uisa conturbatio, existimandum est et hoc ex stomacho esse. Quando autem ista imaginationes tibi aggregata fuerint, pilulas cochias in potu tribue. Et si passio omnino remouetur, iam existimationes predicta certificate erunt. Si autem uno tantum oculo apparuerint, et uno modo in horis omnibus permanferint, existimandum est uitium aquae adefese, praecipue cum in pupilla non fuerit obscuratio: obscuratio namque si fuerit in pupilla, dubitatio iam tunc erit sublata.

S C H O L I A.

Hoc n. aquae principium existit. Lesio haec in uetustis codicibus Rasis non est. Haec autem passio dum recens est, et in principio curabilis est. In antiquo textu legitur. Ut in principio cum medicinis curabilis est.

Hic Rasis agit de imaginationibus, quas appellat aquam descendentem in oculo cum frequenter sint aquae initium. Diuiditur hic textus in duas partes. In prima agit de ipsis theorice. In secunda practice ibi. Cum autem haec passio. Prima in tres. In prima ponit diffinitionem imaginationum. In secunda ibi. Quod aliquando causa stomachi, ponit duas species imaginationum. In tertia ibi. Quando imaginationes. Ponit signa distinctiua inter utraque speciem. Dico quod in prima parte ponit licet non explicite diffinitionem imaginationum, quam tu supple & ordina, ut supra dictum fuit. Sunt enim imaginationes uisio corrupta, cunicum, aut rerum similitum, aut aliorum corporum subtilium, radioforum, aut non radioforum, quae scilicet, apparent coram oculis, licet non sint. Et ex his concipere potes quasdam species imaginationum sumptas a colore figura aut quantitate de quibus supra. In secunda parte ponit duas species imaginationum, unam per communitatem a stomacho, aliam per essentiam in oculo, inter quas est, ut ipse dicit follicite distinguendum, nam licet ex ea quae uenit per communitatem a stomacho non sit multum timendum, tamen multum timendum est ex ea quae prouenit per essentiam in oculo, cum haec frequenter sit aquae principium, quae in eius principio aliquando cum medicinis est curabilis: cum autem confirmata est non est curabilis nisi cum incisione. i. de positione quae fit cum acu, aut incisione quam faciunt quidam perforando corneam in parte inferiori, & extrahendo cataractam de qua infra. Et foras aliquando etiam non confert aliquid ingenium curationis, & propterea diligenter est inuestiganda differentia inter utraque imaginationem, ut ab initio cura conueniens possit adhiberi. Sed circa hanc partem nota quamuis sint multae species cataractae praeter scriptas. Rasis breuitati indulgens tetigit solummodo duas frequenter euenientes, de omnibus tamen superius actum est plene. In tertia parte ponit signa distinctiua inter utraque speciem, scilicet inter imaginationes quae sunt per communitatem a stomacho, & illas quae sunt per essentiam in oculo, ponens quatuor signa distinctiua. Primum, quia imaginationes per communitatem a stomacho sunt communes utrique oculo. Secundum, quia multiplicentur & augentur in hora fastidij. i. abominationis cibi, scilicet, nauisae lubuerionis, & uomitus, & huiusmodi nocumetorum stomachi ex repletione ipsius prouenientium. Et in hora male digestionis, id est, corruptae aut dimiutae. In hora autem famis & laboris. i. in aminationis quae labor sequitur diminuantur. Tertium signum est, quod si praeterierint duo menses aut plures, scilicet, tres aut quatuor secundum quod dicit ipse Rasis, secundo continentis, aut. 6. secundum quod dicit Auic. Et non fuerit in oculo perturbatio supple uisus, existimandum est has imaginationes esse causa stomachi. Quartum signum, quia prouenientes a causa stomachi facile sunt curabiles per exhibitionem pilularum cochiarum educentium materias, a quibus pendunt. Sed forte praestantius esset in hoc casu exhibere hieram picram simplicem aut compositam. Modus tamen curationis istarum sufficienter positus est. Et ex quatuor signis contrariis concipe quae sunt per essentiam in oculo. Existimandum est, scilicet, iudicio uerisimili non tamen certo, quamuis enim omnia signa arguentia imaginationes esse ducentes ad aquam apparuerint, non tamen certe iudicandum est nisi cum hoc obscuratio in oculis & tenebrositas affuerit: nam quandoque imaginationes istae postquam inceperunt, curantur absque hoc quod perducant ad aquam, aut naturae, aut medici beneficio, &c. Deinde cum dicit.

Cum autem haec passio in oculo propria fuerit, prohibendum est infirmo, ne cum uentosis minuat sanguinem, nec ex brachio, nec comedat pisces, nec omnia quae humectare possunt. Venter uero frequenter soluendus est ex pilulis cochij. Et ager ex calefactiuis & desiccantiis nutriendus est. Hydromel praeterea in potu est ei tribuendum. Et in oculis si de fellibus mittendus. Si de fellibus, quod proficit aquae a principio & dilationi pupillae & eis qui post occasum solis non uident, & tenebrositati uisus quae est ex humore. Recipe fellis gruis, fellis saboth, fellis hircini, fellis accipitris, fellis aquilae, fellis perdicum, omnium siccorum unum aut plura, sumanturque de omnibus drach. 10. istorum siccorum: euphorbij, colocynthidis, sagapeni, omnium ana drach. 5. trita agregentur ex suc. feniculi teneri & mittatur in oculum.

S C H O L I O N.

Omnium ana. 3. 5. Rasis exemplar drac. unam tantum profert.

Ponit curam aquae initiatas, ex cuius curatione elicere potes tres generales intentiones superius declaratas. Prima euacuatio est quam facit, non quidem phlebot. aut uentosis ex eo quod rarissime accidit in hoc casu quod sit conueniens sanguinis extractio. In quibus tamen casibus accidit, dictum est superius, sed cum euacuantibus phlegma & aquositatem, sicut sunt pilulae cochij non una uice sed saepius exhibende. Secunda intentio est regimen uitae cum calefactiuis & excitantibus facili digestionis non uaporosis nec praebentibus nutrimentum crassum, unde abstineat a uino & bibat hydromel, id est aquam mellis. Tertia intentio est cum localibus & maxime cum collyrio ex fellibus cuius descriptionem ponit scilicet. R. fellis saboth, id est, uarioli &c. hoc tamen collyrium est acutum ualde. Vnde consulo ut in primis leuiora tententur de quibus statim dicitur. Sed quia A. secundum unam expositionem Gentil. laudat fel uiperae, secundum aliam uituperat, licet credam quod intentio eius fuerit laudare & non uituperare. Attende septem condiciones obseruandas si uolueris ipsum applicare. Prima quod eligatur fel uiperae non uenenosae, saltem extremae, scilicet talis qualem comedere possemus, cuius electio tangitur quarto canon. fen. tertia, capitulo de cura leprosa. Secunda condicio est quod tale fel misceatur cum alijs medicinis fragrantibus acuitatem eius sicut dragagantum, gummi arabicum & similia: ipsum sit in parua quantitate. Tertia est quod corpus sit bene mundificatum. Quarta quod non sit puer, sed deuenierit ad complementum aetatis ut tunice eius oculi non sint multum molles aut passibiles. Quinta quod tunicae oculi non habeant aliquam ulcerationem nouam nec antiquam nec malam complexionem calidam, aut apostema nec aliam debilitatem accidentalem. Sexta quod homo non sit multum famelicus nec habeat corpus multum inanitum ut non trahatur intus aliquid fellis. Septima quod cum collyrizatur oculus, habeat os plenum aquae ut si quid per foramina narium resudet & ingreditur os non transglutietur, sed recipiatur in aqua & expuatur. Si ergo tanta sit spes in hoc felle, ut dixit A. cap. de debilitate uisus, & ut quidam referunt se expertos fuisse administra obseruatis septem conditionibus supra scriptis. Fel secundum Rasis debet esse exiccatum, non humidum, nam resolutis partibus humidis remanet in reliquo fortior impressio, unde si nolueris tantam impressionem melius est ut eligatur humidum. Sed iam praeter medicinas Rasis & eas quae dictae sunt supra in cap. de debilitate uisus ad resoluendum humiditatem turbidam in oculo subiungam quasdam in hoc capitulo proprias. Ex A. elice quatuor. Prima est succus feniculi cum melle & oleo debite incorporatis. Secunda est alcohol cum semine alkerm quod est ultimum in resolutione, uel in resoluendo aqua, alkerm existimo scilicet, aliter dictam centrum galli, siue galli crystinae & gallientum uulgariter scarlosa. Tertia est caput hirundinis adultum cum melle confectum. Quarta est oleum balsami collyrizatum. A. etiam laudat odorem simplicis, id est, maioranae & praestantius est ut sit sicca. Ex glossa Rasis oliae haec descriptionem. Recipe salis ammoniaci, opopanax, an. 3. 1. dissoluantur in lacte sicuum. Gerardus de Selo accipit fellis, balsami ana. 3. 2. ellebori albi, piperis ana. 3. 1. puluerizanda puluerizentur & misce cum aqua distillationis raphani.

Io. Arculani

I 4 Mefius

Mesue collirizat cum aqua rutæ mixta cum sagapeno aut cū succo foeniculi mixto cum felle hircino, melle & sagapeno quod est vltimum. Sabor accipit fellis hircini exiccati in vase æneo granorum lauri excorticatorum ana. ʒ. ʒ. sagapeni. ʒ. i. gummi. ʒ. s. miscentur cum melle pauco & vrina pueri non polluti. Iesus Hal. commendat fel vaccæ mixtum cum assa foetida & pauco balsami. Sed attende quòd in oculo non sit aliqua ægritudo prohibens horum acutorum approximationem sicut mala complexio calida, vlcus aut apostema. Et ex bona præparatione ad resolutionem aquæ est vt ante horū administrationem anhelet aliquis diu in oculum patientē postquam masticauerit semen foeniculi, aut piper, aut allium, aut simile acutum, post quā anhelationem immediate subsequatur collirizatio cum aliquo de superscriptis, aut fomentet primo oculum cum aqua decoctionis foeniculi, aut infundat oculum in aqua cal. decoctionis foeniculi in vase viridi. nec solum adhuc conferunt exterius applicita, sed interius sumpta, sicut sunt electaria dicta superius in debilitate uisus ex humiditate turbida & propter crassitiem spirituum, & sicut hæc trazea quam consulit Tadeus. & sem. foeniculi, anisi, ameos, sileris mōtani, zingib. gariophilorum, cubebam piperis longi, nucis muscatæ, radicem chelidonæ, euphrasie, rutæ, beconicæ, assæ regie, & similia fiat puluis miscendo cum saccharo, aut cum sufficienti quantitate mellis, fiat elect. nota tamen quòd si cataracta fuerit cholericæ aut sanguineæ conueniunt pro resolutione ipsius remissiora calida tam exterius quā interius applicita. & similiter diuersificanda sunt medicamina secundum tempora anni, & complexionem corporis, & oculorum. Et propterea posite sunt diuersæ medicinæ, tu utere his quæ magis tuo proposito feruiunt. Tam superest ut ponamus modum deponendi cataractam cum acu, quæ deponenda non est nisi sit substantiæ mediocri & boni coloris, ut antea fuit dictum. Si ergo fuerit nimis tenuis, incrassetur cum cibis & potib. præbentib. nutrimentum crassum, non tamen caput multum replentib. ne cataracta augeatur. Conceditur ergo in hoc casu pisces, carnes crassæ, rixum, frumentum, & similia incrassantia non multum uaporantia. Imo etiam in hoc casu si caput nimium repleatur, euacuandum est tam euacuationibus cōmunibus, quā proprijs, & incrassata cataracta sufficienter præmissis euacuationibus & etiam phlebotomia, scilicet, si propter multitudinem sanguinis uideatur opportuna, & patiente bene disposito, tam secundum corpus, quā secundum animam, ut quia non sit rufusculosus, aut habens aliam ægritudinem, nec iracundus, aut habens aliud accedens animi molestum. Et similiter oculo non habente aliam ægritudinem, procedatur ad operationem, postquā eger quieuerit per duos dies post euacuationes superscriptas, ipso tamen habente beneficium uentris quotidie, aut naturaliter, aut medicinali auxilio, scilicet suppositorio, aut etiam clysteri, ipso etiam interim utere die tænu, aut saltem mediocri. Et si timeatur fluxus materiæ ad oculum per partes extrinsecas, ut quia alias sit consueta fluere approximetur fronti & tēporibus aliquod stipticum ex dictis in ophthalmia. Et tunc operator præparatis necessarijs, scilicet acu argentea, cuius hæc est figura. Et faldella corti noui in albumine oui bene contuso infusa, & aliqua peitia subtili linea ueteri circumdata, quæ similiter madefacta sit, & si uideatur albumē oui esse nimis tenax, addatur parum aquæ rosacæ, quod forte melius est ne in separatione dolorem faciat, & similiter fascia sit parata. Et sit tempus temperatum sicut uer aut autumnus, aut fiat temperatum artificialiter, neq; sit uerosum aut nebulosum. Et sit luna, scilicet decrescens & non in ariete, sitq; æger ieiunus non multum famelicus in loco claro constitutus, sedens super una bancha equitando. Et operator sedeat super eadem altius aliquantulum facie sua uersa uersus faciem ægri. Et cum cruribus suis amplexetur coxas ægri, & habeat sub pedibus eius duas banchas uel duo scabella firmiter fixa, quibus tempore operationis inniti possit, & minister sit post ægrum stans rectus, ut possit uidere operationem, cuius pectori æger adhæreat & teneat palpebrā superiorem eleuatā cum indice aut medio digito, & medicus inferiorem palpebram deprimat sinistram cum manu sinistra, dextram cum manu dextra, & sic oculo aperto operator sufflet in eorum aut quater postquam masti-

cauerit foeniculum, ut cataracta motum cum calore recipiat & depositioni obediat, deinde præcipiat patienti ut uertat oculum uersus nasum & teneat ipsum firmum: & tunc in nomine Dei præmissio signo crucis intromittat acum per medium coniunctiæ distanter à cornea per medium digicum, aut plus, aut minus, secundum oculi magnitudinem intornando acum & perforando intus donec penetret uueam, & immediate cum senserit acum esse in loco uacuo uertat acum uersus foramen pupillæ, ne aliquo modo tægar crystallinam. Et caueat ne nimis intromittat acum, communis enim quantitas eius quod de acu intromittitur est quantitas digiti parui. Et propterea bonum est ut in illa parte acus usq; ad quā debeat intromitti uel parum altius, sit aliquod signū fixum, ut margarita aut simile, uel sit in ea parte deaurata, aut aliter colorata, & quando uidebis acum per corneam, aut si non uidebis credis uerisimiliter peruenisse ad cataractā, quoniam cum cataracta est in foramine uueæ, aut inter uueam & corneam non potest uideri acus, quamuis acus perueniat ex directo foraminis uueæ, licet quandoq; per motum acus uideatur umbra eius. Si autem cataracta sit post foramen uueæ uersus crystalloidem, puncta acus uideatur clare cum est ex directo foraminis, quia cadit puncta acus inter cataractam & foramen uueæ. Et tunc deponat ipsam, trahendo paulatim cum suauitate ad partem inferiorem, & eam sic depositam teneat tanto tempore quod diceret ter pater noster, aut unum miserere, deinde paululum acum trahat & uideat si reascendat, & si reascendit iterum eam deponat toties quòd inferius remaneat: faciendo tamen omnia cum suauitate, & cauendo ractum crystallinæ aut telæ aranæ, & similiter dilatationem uueæ & perforationem corneæ. Si autem cataracta non potest deponi ad partem inferiorem, quia forte adhæret parti superiori, deponat ipsam ad partem superiorem, aut scilicet, ad dextram aut sinistram, in qua parte deposita quiescit. Et propterea dixit Auic. quòd medicus ante depositionem debet experiri mouēdo cataractam cum cōpressionē ad quam partem magis declinet, & ad eam partē deponere, ad quam uisa est in motu suo declinare. Et tunc acum extrahat intornando eam sicut ipsam intromisit, & tunc ad extollendam artem ostende sibi aliquod obiectū, & interroga quid est hoc, ut circumstantes admirentur & magnificent opus tuum. & propterea bonum est, ut oculus sanus sit cooperatus ante operationem, & non solum propter hoc sed propter alia. Tutius tamen est, ut cum adhuc tenes acum in oculo & deprimis cataractam, ut ostendas obiectum, de quo dictū est, deinde clausa palpebra superpone coram quod antea præparasti, & ligentur ambo oculi ut unus alium non moueat, & educatur caute ad lectum propinquum, & præcipiatur quies, silentiū, obscuritas, & iaceat in lecto super ceruicem capite eleuato, & parum comedat & bibat aquam coctam, & comedat mollia non indigentia masticatione sicut pitana hordei, aut oua forbilia, sed non prima aut secunda die, sed tertia aut quarta, & sic deinceps. Et utatur regimine infrigidatiuo prohibente apostema, & usque ad quatuor dies nō mutetur nisi de tertio in tertium, aut saltem nisi singula die semel, & transactis quatuor aut quinq; diebus, singula die bis semper imponendo albumen oui conuassatum cum pauca aqua rosacea, & sic fiat usque ad nouem dies. Deinde paulatim redeat ad cibum & potum & operationes sibi consuetas, paulatim illuminando aerem in quo moratur, &c. Duo autem sunt accidentia quæ superuenire possunt, quibus est subueniendum, unum, scilicet cum operatio sit, alterum post operationem. Primum, cum operatio sit aliquid sanguinis potest refudare coram pupilla, quia forte pungitur uuea aut cornea, ut illum sanguinem omni tuo posse simul cum cataracta deponas aliter erit nouissimus error peior priore. Secundum quod post depositionem aliquando superuenit dolor, tum ex ophthalmia superueniente, tum ex uulnere quod malignatur.

Cura ergo ophthalmiam cum sief albo & reliquo regimine ipsius, ulcus etiam in principio cum sief albo, & deinde paulatim addendo sief de plumbo & reliquum regimē eius. Et tempore uehementis doloris nō oportet quod oculus teneatur uehementer compressus. Et si superuenierit pruritus, qui tñ sub dolore reponitur, subueniatur cum aqua rosacea tepida, qua non sufficiente aliquid thutæ præparatæ ei addatur.

Et tandem

Et tandem si multum molestat cum iam securi fuerimus ab apostemate, imponatur collyrium nostrum supra scriptum in capite de pruritu & rubedine palpebrarum. Aliqui tamē ex Græcis antiquis, ut recitat Albucasis & Auic. faciebant foramen subtus, scilicet corneam, quod forte melius est facere in coniunctiua cum acu canulata, ut sugendo extrahant cataractam, quæ operatio est inconueniens, nisi aliquibus obseruatis conditionibus. Prima, ut aqua ipsa sit citra uueā & non ultra. Secunda, q̄ illa aqua sit fluxibilis non confirmata, & q̄ hæc operatio fiat paulatim, ne simul albugineus extrahatur, & hæc est propria cura sanie retro corneam. Multa, hoc dixi in capite, quia communiter est male cognitum.

De nyctilope ac ægilope. Cap. 31.

Nyctilops, sequibare, amicalopes, suberrati, affe, tenebrositas, sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem, de qua diuersi authores sub his diuersis nominibus determinant. Ab Haliabbate. 9. theo. 13. cap. dicitur sequibare. A Rasi. 9. cōti. affe. Ab Auic. & Rasi nyctilops quasi noctis passio, siue uisus obscuritas. Et diffinitiuē est actio diminute lase, ita ut euanescat uisus in nocte, i. in obscuro, & uideat in die, id est in claro, & debilitetur in fine eius. Et contra haliar, glaucosis, ægilops, sileua, sunt termini synonymi significantes dispositionem nyctilopi contrariam, glaucosis quidem, accidit habentibus oculos glaucos: sic enim appellatur quinto de generatione animalium: secundo cap. & tertio aphorismorum, ultimo aphor. Et est actio diminute lase, ut non uideat in die sed in nocte, quod non est absolute intelligendum, ut nullo modo uideat in die, sed diminute, cum non possit tenere oculos apertos & lumen multum tolerare, nec contra q̄ uideat in nocte perfecte, sed nō ita impediuntur in nocte sicut in die in comparatione ad oculos sanos, siue temperatos, ino forte melius uident in die quam in nocte. Sicut etiam non est intelligendum de nyctilope, q̄ nullo modo uideat in nocte, sed q̄ melius i die quam in nocte in comparatione ad oculos sanos, quāquam defendi possit quod aliquis nyctilops melius uideat in loco lucentissimo, & melius toleret aspectum solis, quam oculus temperatus, & similiter aliquis haliaricus melius uideat in nocte, quam oculus temperatus. Ex quo tamen non sequitur, quod uisio absolute sumpta sit perfectior in ægro aut distemperato, quam in sibi sano aut temperato. Sed bene uisio respectu determinati obiecti aut medi, aut breuiter cum circumstantiis quibusdam limitata non absoluta. Et ex his diffinitionibus inferre possumus, q̄ hæc dispositiones, scilicet nyctilops, & haliar non sunt ægritudines, sed accidentia ægritudinum, à quibus immediate pendunt, &c. Species harū dispositionum sunt, aut quia hæc operationes sunt multum lase aut parum, id est quod istæ dispositiones præternaturales sunt remissæ aut intense, sunt recetæ aut chronicæ, sunt per essentiam in oculo aut per communitatem licet omnes istę improprie species appellandæ sint.

Causæ harum dispositionum licet plurimæ sint, ad hunc tamen modum unitatis reducuntur, quia causa immediata & adæquata nyctilops est requisitio multi luminis ad uisionē, cum hoc quod oculus potest ipsum tolerare. Et e contrario causa immediata & adæquata haliar est requisitio non multi luminis ad uisionem, cum hoc quod oculus nō potest multum lumen tolerare. Et ex hoc sequitur quod illi, qui nihil uident nisi lumen magnum, quamuis non possint nisi lumen magnum tolerare, sicut habentes ulcus in cornea, & quibus uuea egreditur, non sunt dicendi haliarici, sicut contra, neque sunt dicendi, scilicet nyctilopes, qui nihil uident nisi lumen, quamuis multum lumen tolerare possint: utraq; enim est uisio colorum, licet diminuta. Causæ autem nyctilops & haliar etiam sumuntur à tribus, scilicet, aut à tunicis oculi, scilicet, cornea uuea, & tela aranea, aut ab humoribus, scilicet albugineo & crystalloide, aut spiritibus. A cornea quidem cum est nimis crassa aut non bene peruia. Hæ enim dispositiones sunt causæ nyctilops, sicut contrariæ, sicut nimia tenuitas cū plurima peruietas sunt causæ haliar. Nimia autem crassities corneæ secundum plurimum est ex multa humiditate, siue ex tempore, siue ex generatione contracta. Et contra tenuitas corneæ est ex siccitate secundum plurimum: imperuietas autem corneæ potest sequi omne genus malæ

complexionis, & multas etiam alias ægritudines, de quibus omnibus ample dictum est in capitulo de debilitate uisus. Verum ulcus superficiale, licet faciat corneam imperuiā est quandoque causa haliar, oculo non potente multum lumen sustinere, cum hoc tamen quod non sit ita imperuia, ut non possit uidere, quod etiam fere accidit in omni ophthalmia.

Eadem causæ nyctilops & haliar, sumuntur ex dispositionibus telæ araneæ, ut de cornea dictum est ex uuea, quia aut est nimis nigra reddens totum oculum obscurum & est causa nyctilops, aut e contrario parum nigra reddens totū oculum glaucum, & est causa haliar. Similiter si foramen eius sit multum strictum, siue naturaliter, siue præternaturaliter est causa nyctilops, & e contra si nimis latum est causa haliar, quanquam constriction pupillæ naturalis sit causa, ut melius uideat in claro & obscuro, quā pupillæ dilatatio, comparando tamen uueam ad reliquam melius uidet, habens pupillæ constrictionem in claro quā in obscuro, & contra habens dilationem pupillæ. Ab albugineo uero cum est multus in quantitate aut non bene peruius est causa nyctilops, sicut contrariæ dispositiones sunt causæ haliar. Causa autem multiplicans albugineum secundum plurimum est humiditas, scilicet cum præsentia materiæ sanguineæ aut phlegmaticæ, sicut causa paucitatis est siccitas, sicut accidit conualescentibus, & qui passi sunt longas ægritudines, unde in his oculi efficiuntur glauci, & ipsi ad sanitatem redeuntibus multa humiditate reassumpta efficiuntur nigri, &c. Causæ autē imperuietatis albugineæ dictæ sunt supra in capite de debilitate uisus, & capite de imaginationibus. Ex crystalloide uero, quia si fuerit magna & multum lucēs, aut uerius superficiali oculi est causa haliar. Contrariæ dispositiones sunt causæ nyctilops. Ex spiritibus uero, quia si fuerint multi, crassi, aut turbulenti, sunt causæ nyctilops: contrariæ dispositiones, paucitas, subtilitas cū claritate sunt causæ haliar. Vnam causam nyctilops scribit Iesus hali, scilicet nimius aspectus solis, & rerum albarum, sicut accidit iter agentibus in niue, & e contrario longa mora in tenebris est causa haliar, quod totum resoluitur in crassitiem & subtilitatem, paucitatem & multitudinem, unionem & disgregationem spirituum, & etiam affuefactionem quandam, uirtutes enim naturales necessitatem aliquam assumentes fortius operantur. Et ex his iam apparet solutio multorum problematum. Primo, propter quid habentes oculos nigros sunt frequentius nyctilopes & habentes glaucos & uarios, sunt frequentius haliarici. Secundo, quare aliqui existētes in claro bene uident in obscuro, aliqui male: & e contrario aliqui existētes in obscuro bene uident in claro, aliqui male, aliqui bene utroque modo, aliqui male utroque modo, quanquam omnes existētes in obscuro, melius uideant in claro, quā existētes in claro uideant in obscuro. Tertio, quare habētes multitudinem colorum in oculis suis sunt apti ad hoc, ut fiant nyctilopes, & similiter anfractuosi in oculis suis, ut dicit Auic. per anfractuosis intellige oculos in quibus apparēt quædam profunditates obscuræ, hæc enim arguunt aut paruum peruietatem humorum, aut tunicarum, aut crassitiem & turbulentiā spirituum cum paucitate. Quarto, quare oculi eminentes sunt proni magis ad haliar, contra concaui ad nyctilopes. Causæ autem nyctilops & haliar per communitatem à stomacho capite & toto corpore sumuntur, sicut dictum est in cap. de debilitate uisus, & cap. de imaginationibus, sed certe non causant nyctilopem, neque haliar, nisi inducendo nocumentum per essentiam in oculo, de quibus sermo præcessit, aut ipsa augendo. Signa autem nyctilops & haliar & specierum & causarum earum, siue sint per essentiam siue per communitatem, siue corporeæ, siue primitiue, sumuntur eodem modo, sicut in debilitate uisus dictum est, & non immerito: hæc enim sunt species debilitatis uisus, imo fere ex eisdem causis proueniunt, ex quibus uisio de longe & non de prope, & contra proueniunt. Prognostica. Haliar consequens subtilitatem spirituum, & paucitatem, & causas inanientes secundum plurimum deterior & minus corrigibilis ceteris paribus, quā nyctilops consequens dispositiones contrarias. tam haliar quā nyctilops consequens nocumenta telæ araneæ, & crystalloidis raro uel nunquam sunt corrigibiles. Nyctilops consequens constrictionem foraminis uueæ præternaturalem,

naturalem, est magis timenda quam haliar consequens eius dilatationem præternaturalem, &c. Sed tunc circa hoc dubitatur. Vtrum homo per aliquam dispositionem naturalem, aut præternaturalem posset uidere in umbra & tenebris. Et arguitur quod non, quia sine lumine non contingit uidere, igitur quæstio falsa pro parte affirmatiua. tenet consequentia, & assumptum est philosophi & comen. 2. de anima, comen. 67. Præterea Auer. in com. de sensu & sensato dicit: lux non est in oculo per naturam oculi, sed intrat ipsum ab extra. Et si inesset ei de eius natura, tunc in obscuro uideret. In contrarium est Auic. ca. de haliar. 3. tertii, & confirmatur, quia quedam animalia vident in tenebris sicut leones, serpentes, cati, bufones, &c. ut dicunt philosophi, & docet experientia, ergo etiam homo per aliquam dispositionem poterit uidere in tenebris. tenet consequentia, quia homo quadam uirtualitate continet factiones & perfectiones omnium animalium ut inquit Arist. in lib. ad Alex. etiam quia uidemus in homine fieri mirabiles transmutationes ex multis ægritudinibus, ut Auic. 1. tertii & Gal. 3. intè. & Arist. 30. proble. prob. 1. Inquit enim quod ex melancholia quadam facti sunt quodammodo diuini uaticinantes & futura prædicentes, & explicat de Sybilla & Bacchide. Et quidam facti sunt poætæ, sicut Maltheus Stracusanus, & recitat Concl. ibidem se habuisse à medico fideli, quod quedam mulier illiterata dū esset melancholica latinum congruum loquebatur, qua sanata locutio illa literalis euauit, & multa etiā similia in nostris temporibus referuntur, quæ certe mirabilia uidentur, quod homo uideat in tenebris. Et nouissime nostris temporibus fuit Paduæ quedam mulier nominata Angariel, de qua mirabilia prædicantur. Pro solutione huius quæstionis præmittendum primo, quod medici per umbram intelligunt medium diminue illuminatum, sicut est in nocte, per tenebram uero medium omnino luce priuatum. Philosophi autem qui dicitur rerum proprias indigantes per tenebras intelligunt luminis priuationem, & per umbram tenebram remissam: tenebra enim luminis priuatiue opponitur, unde non gradus luminis est tenebra infinita, reliqui uero gradus luminis inter gradum infinitum, & non gradum habent tenebram admixtam. Ad propositum credo tenendum esse nullum animal posse uidere in medio summe illuminato: visibile enim tantæ excellentiæ cuiuscunque animalis uisum corruperet, imo etiam neq; in medio multum propinquo illi quod summe illuminatum est. Inter animalia tamen est differentia. Quedam enim sunt lumen intensum tolerantia, sicut scilicet aquilæ, uultures, & similia, & multo intensius quam homo. Et sicut tolerant lumen intensum quod homo, ita uident magis de longe, scilicet forte de prope, & obiecta minima melius uideat homo, & similiter in umbra siue in lumine remissiori melius uideret homo quam huiusmodi animalia, quod totum prouenit ex crassitie maiori spirituum uisibilibus, & humorum in his animalibus quam in homine, imo dicitur quod uultures uident cadauera distantia per quingenta miliaria. Quedam animalia sunt melius uidentia in obscuro quam homo, imo uidentia in medio omnino lumine exteriori priuato, sicut leones, serpentes, cati, lupi, bufones, licet non omnino uideant sine lumine, habent enim lumen intrinsecum, quod est lumen crystalloidis, & consequenter spirituum uisibilibus qui generantur ex spiritibus animalibus in crystalloide, quod lumen est adeo intensum, ut illuminet medium sibi propinquum & facit ut colores sibi propinqui potentia uisibiles actu uideantur. Et hæc animalia optime uident de prope, & obiecta minima sibi propinqua, & multo melius quam homo licet forte in claro, & de longe melius uideat homo, quæ hæc animalia, quod totum prouenit ex maiori subtilitate spirituum cum claritate in his animalibus, quam in homine, & similiter ex maiori peruietate humorum, & tunicarum, & maiori peruietate, & claritate crystalloidis: sunt autem quedam animalia quæ neq; in claro, neq; in medio multum obscuro uident, sicut uespertilioes quod prouenit ex paucitate spirituum cum pauca claritate ipsorum, & similiter crystalloidis licet forte satis mediocres sint in crassitie & subtilitate, & hæc male uident de longe & de prope, sicut & homines qui habent paucos spiritus uisibiles, & male claros. Ad propositum ergo cum queritur, utrum homo sine lumine exteriori

possit uidere per aliquam dispositionem naturalem, aut præternaturalem. Tenendum est quod non, ut existimo quam Gentilis contrarium arbitretur nam frustra est illa potentia, quæ nunquam reducitur ad actum, nunquam autem est auditum neque uisum, neque scriptum quod homo sine lumine exteriori uideat, & suas posset exercere operationes in tenebris, quamquam aliqui in medio multum remisse illuminato uideant, habentes, scilicet, subtilitatem spirituum & humorum cum claritate & magna peruietate, & sicut hoc habent multitudinem spirituum uisibilibus bene uident in claro & in obscuro, & bene de prope & de longe. Et si quis instaret, quid prohibet etiam similem dispositionem in oculo humano reperiri in crystalloide, scilicet ualde lucente, & consequenter spiritus uisibiles in ea genitos ita lucidos, sicut in animalibus supra scriptis, nam certum est crystalloidem humanam esse lucidam, & eius luciditatem posse intendi, & certum est quod magis & minus non uariant speciem, quamuis enim crystallois humana fieret, ita lucida sicut crystallois serpentis uel leonis, siue à natiuitate, siue ex tempore, non propter hoc desineret esse humana, neq; mutaret speciem, quia hæc dispositio non est essentialis illis speciebus quibus inest, nec forma specifica aut proprietates insequens speciem: sic enim esset propria uni speciei & non communis tot speciebus. Amplius dicit Auic. quod haliarici uident in tenebris & umbra, & nisi sit superfluum per tenebras intelligit medium omnino lumine carere. Ad hæc respondetur. Ad primum dicitur quod sicut omnium naturam constanti determinatus est numerus magnitudinis & augmenti. 2. de anima, sic omnium natura constanti determinatus est terminus intensiois, quamuis neq; magnitudo maior aut minor, neq; intensio maior, aut minor uariet speciem: & consequenter dicendum quod luminositas illa non est forma essentialis, neq; specifica improprietates uni speciei propria. Sed est forma accidentaliter insequens complexionem, & in modum multionis pluribus speciebus communicabilis, sed non speciei humanæ. Simili enim argumento posset probari odoratum hominis, posse intendi ad gradum odoratus canis, & similia, quæ satis reputantur absurda. Sed iam restat ut respondeamus ad argumenta in oppositum.

Et quia omnia argumenta tam ante oppositum, quam post adducta aequaliter tendunt contra determinationem quæstionis, ad omnia est respondendum. Ad primum igitur cum dicitur quod sine lumine non contingit uidere, conceditur, sed animalibus de quibus supra sufficit intrinsecum sine extrinsecum, homini uero præter intrinsecum requiritur extrinsecum. Et ad Auer. in com. de sensu & sensato, cum dicitur quod lux non est in oculo per naturam oculi intelligit de oculo humano, & plurimarum specierum, non de omni oculo, & intelligit de luce sufficiente ad uisionem sine lumine extrinsecum. Certum est enim quod tam in oculo humano quam cæteris in est lux, scilicet per naturam, sed quibusdam sufficit ad uisionem lumen intrinsecum, quibusdam uero non, quorum animalium diuersitas à nobis facile comprehendere potest, nam illa animalia, quorum oculi adeo in tenebris lucent, ut à nobis uideri possint, & non solum oculi, sed os & caput, & medium sibi propinquum possint in tenebris uideri. Et quanto plus de medio sibi propinquo illuminant, tanto melius in tenebris uidere possunt. Et si instetur, ergo et obiecta eorum lumine illuminata, & ad tantam distantiam deberemus uidere sicut ipsa. Dicitur quod aliqua uidentur, sed non omnia, nec ad tantam distantiam cum minima illuminatio propter suorum oculorum dispositionem sit eis sufficiens ad uisionem non homini. Ad argumenta post oppositum respondetur. Ad autoritatem Auic. in cap. de haliar, dicitur quod per tenebras intelligit medium remisse illuminatum sicut in nocte ualde obscura, sed per umbram intelligit medium obscurum magis tamen illuminatum, sicut est immediate post solis occasum. Ad secundum dicitur quod homo, scilicet uirtualitate quadam continet actiones omnium animalium, id est, quod quicquid faciunt cætera animalia naturali instinctu, homo uiribus sui intellectus, & aliarum potentiarum animæ coadiuantibus organis corporeis facere potest. Sicut enim quedam animalia in aquis natant & degunt. Similiter homines ex industria in aquis natant, & pisces

pisces capiunt, & merces nauibus hinc inde ferūt. Et si aues per aerem uolant, similiter & homines per artem columbis utuntur ad portandum literas subito ad loca, scilicet distantia. Ex his itaque & similibus concludi potest, quod homo uirtualitate quadam continet actiones omnium animalium. Ad tertiam rationem arguentem, mirabiles effectus euenire in quibusdam ægritudinibus maxime in mania & melancholia, quod ut homo uideat in tenebris. Conceditur. Sed ulterius dicitur conformiter loquendo secundum fidem, quod hi, scilicet effectus non solum in uim ægritudinis & causas resoluendi sunt naturales, sed in causas supernaturales, scilicet in demones, aut angelos, qui cum anima humana coniunguntur, Cui opinioni consentit Auicenna. 1. tertii, & quarta sexti naturalium. Et Sybilla Erithrea tenetur de Chryllo prophetizasse, sunt autem prophete ex coniunctione superioris intelligentie cum anima humana, ut Auicenna loco suprascripto, quanquam astrologi hos effectus in causas coelestes referant, ut apparet in centiloquio & tertio quadripartiti. De bachide autem multa poetice referuntur, quibus non leuiter credendum est. Et forte Aristoteles. 3. problem. probl. 1. multa de his poetice locutus est, quanquam uisus sit hos, & similes effectus, aut in melancholiam, aut in ebrietatem resoluere, ostendens per longum processum ex melancholia & ebrietate omnino similes effectus provenire. De Malatheo autem Siraculano qui postquam maniam incurrit, factus est poeta. Dicitur quod non est inconueniens aliquem propter maniam fieri acutioris intellectus, & saltem in aliqua re determinata melius speculari, quam in sanitate humiditate cerebri resoluta, quæ antea uires intellectus obtundebat. Sicut & superius de intent. Aristoteles. concessum est aliquem oculum ophthalmicum acutius uidere, quam ipsum sanum, & sic Malatheus Siraculanus factus maniacus, numeratus est inter poetas, cum ante ad poetam, scilicet hebetiorem habuerit intellectum. Licet non credendum sit ipsum ante maniam omnino poetes inexpertum fuisse. Sic. n. miraculosum fuisse, & in causas super naturales resoluendum. Eodem modo in proposito nostro concedo aliquem haliarum melius uidere in tenebris quam ipsemet antequam haliarum incurrisset, non tamen posse uidere omnino sine lumine exteriori. Et ex his iam manifestum est quid ad cætera respondendum sit. Si enim uera sunt quæ medicus fidelis retulit. petro apponensi de muliere illa quæ prius illiterata, facta mania congrue loquebatur, quia sanata locutio literalis, euauit, manifestum est ipsam fuisse demoniacā. Similiter et dico de muliere Patauina, quæ ideo Angariel nominata est à nomine demonis à quo uexabatur. Sed consulo tibi ut in similibus non facile credas, homines enim plerumque sunt mendaces ducti quadam auaritia magna & inusitata prædicandi. Ego enim cum à 25. annis & citra fuerim diligens horum inquisitor nondum uidi aliquos effectus, quos non potuerim in melancholiam referre. Et etiam Petrus Apponensis, qui fuit diligens omnium rerum inuestigator, non dicit se hæc miranda uidisse, sed audiuisse. Et forte Aristoteles. cum multa talia audiuisse, & non uidens tempore suo aliquid, quod non posset in causas naturales resolueri, ideo omnia talia in ebrietatem & melancholiam resolvebat, ut in longo processu patet. 3. problematum, problemate primo, &c. Excusamur à prosequendo curam nyctilopis & haliarum omnes earum causas propter ea, quæ dicta sunt in capite debilitatis uisus, cuius curam prosecuti fuimus secundum omnes eius causas & species. Est namque manifestum quod nyctilops & haliarum species debilitatis uisus pendentes ferè ab eisdem causis à quibus pender uisus de longe & non de prope, & similiter de prope & non de longe. unde hic perstringemus curam nyctilopis solum prouenientis propter humiditatem turbidam in humoribus, & propter spiritus crassos & turbulētos, cuius causa remotior potest esse, & est sæpe humiditas corporis superflua, aut alicuius membri oculo cõicantis, maxime stomachi, aut capitis, & ponam etiam curam nyctilopis propter longum aspectum rerum albarum & lucentium, & similiter ex paucitate spirituum & subtilitate, cuius causa remotior est siccitas corporis superflua, aut alicuius particulæ oculo

communicantis, & similiter curam haliarum scilicet propter longam moram in tenebris, &c.

Cura itaque nyctilopis propter humiditatem superflua turbidam in humoribus oculi, & propter crassitiam & turbulētiā spirituum si sit non solum per essentiam in oculo, sed et per communitatem exigit istas intentiones, de quibus dictum est in debilitate uisus, à simili causa, quas huic cap. accommoda. Vnam tamen tantum hic prosequar, scilicet, resolutionē humiditatis humores oculi turbidantis & in crassantis, nec non resolutionem uaporum spiritus in crassantium & turbidantium cum localibus huic dispositioni propriis. Et quia Rasis ponit in hoc cap. plures medicinas huic dispositioni proprias, ideo capitulum Rasis exponamus prius, deinde præter medicinas Rasis, alias subiungamus, &c.

Ad hoc utile existit hepar caprinum scindere & ponere super unam sectionem piper longum, & cooperire ipsum ex alia sectione piperis longo in medio existente, deinde ponere ipsum in furno, & dimittere ipsum donec assetur & non desiccetur, quo facto, piper longum, quod in medio erat, sumatur & bene teratur cum paucis musco, deinde ex liquore, qui ex hepate affato expressus fuerit, aspergatur & sicetur. & in oculo mittatur.

Aut fel caprinum cum melle mixtum in cucurbita super ignem misceatur, deinde radius eo illinitus immitatur in oculum. Quod autem ad hoc magis ualet est, ut si de fellibus in oculum mittatur. Si autem hæc non suffecerint uenter soluat. Et sanguis ex duabus cephalicis & ex fronte minuatur. Et regimen subtilietur.

Diuiditur hoc cap. in quatuor partes. In prima ponit unā medicinam. In secunda ibi. Aut fel caprinum ponit aliam. In tertia ibi. Quod autem ad hoc, ponit tertiā. In quarta ibi. Si autem hæc non ponit. scilicet quid agendum sit his localibus non sufficientibus. Primum est ut hepar caprinum scindatur per medium & melius est ut in eo fiant plures scissuræ, & in medio scissurarum ponatur piper longum crasso modo contusum, & bene iungantur partes adinuicem, & assetur in furno radii donec sit bene coctum: non sit tamen exiccatum. quo facto, piper longum quod erat in medio sumatur & subtilissime teratur, & misceatur cum paucis musco, quod sit subsexcuplum aut suboctuplum ad piper, deinde hic pulvis cum succo qui ex hepate affato exprimitur, misceatur optime in modum collyrii, incorporando, ex quo collyrio est aliquid in die saltem quater in oculo imponendum. Hoc quidem collirium calefacit, exiccatur, & resoluit humiditatem & uaporem, humores, & spiritus subtiliat, oculum confortat, spiritus & humores illustrat. Magis tamen conforme est menti Rasis, ut hic pulvis postquam fuerit liquore hepatis hircini confusus, sicetur, & in oculum mittatur. hepar enim caprinum siue hircinum quocumque modo administratum confert in hac dispositione sua occulta proprietate, siue postquam affatum est, aut elixatum comedatur, & præcipue cum aliquibus in hac dispositione propriis sicut est piper longum, sal induratum, euphrasia, semine feniculi, filer moranum, & similia, siue dum affatur aut elixetur nyctilopi suffumigant, pulvis siue collyrium modo suprascripto ordinatum, oculo imponatur.

Sed dicitur quod hepar hirci magis confert uiris, caprarum uero mulieribus. Et similiter, ut refert Aui. hepar leporis est in hac dispositione conueniens, similiter præparatum.

Secunda medicina Rasis est, ut fel caprinum cum melle, scilicet mixtum in cucurbita uel in aliquo uase simili super ignem misceatur, donec bona fiat mixtio, & stilus in cuius extremitate sit aliquid corti isto medicamine illinitus ponatur in oculo. Tertia medicina est collyrium de fellibus in præcedenti cap. à Rasi positum: In ultima parte dicit Rasis, quod si hæc non sufficerent, uenter soluat, & sanguis ex duabus cephalicis & fronte minuatur, & regimen subtilietur, dans per hæc uerba intelligere tria ex intentionibus positis in cap. de debilitate uisus, scilicet euacuationem perficiendam tam phlebotomia, quam pharmacia, diuersionem & debiti regiminis ordinationem. Cui autem quare aliqui sola localia ad curam sufficiunt est, quia humiditas hæc aut hi uapores sunt per essentiam in oculo, non aliunde communicati, &c. Cum autem materia

aut

aut vapores aliunde communicantur scilicet à stomacho, cerebro, aut à toto requiruntur præter localia intentiones, quæ ordinate in cap. de debilit. uisus posite sunt: & sunt quinque. Prima euacuatio complenda per phlebotomiam utriusque cephalicæ si sanguis fuerit in causa & fuerit nyctilops utriusque oculis communis, & complenda etiam per pharmaciam si alii humores fuerint in causa. Secunda est diuersio, quam Rasis per phlebot. uenæ frontis dedit intelligi. Et tu supple omnia genera diuersionum de quibus in cap. de debilitate uisus longo sermone actum est. Tertia est membri communicantis regimen, sicut ibidem dictum est, & oculi confortatio, ne recipiat. Quarta est humiditatis in oculo existentis, resolutio, quæ per angulos lachrymales educitur, ipsorumque humorum & spirituum subtiliatio & illustratio. Quinta est debitum regimen sex rerum non naturalium, & annexorum, sicut ibidem longo sermone positum est, &c.

Cura autem nyctilopis propter crassitatem spirituum & turbulentiam exigit duas intentiones generales, de quibus in debilitate uisus actum est. Quarum, una est sanguis subtilis & clari generatio, qui est materia spiritus. Altera est ipsorum spirituum subtiliatio & illustratio, quæ qualiter compleri debeant, & cum quibus ibidem sufficienter dictum est. Illuc ergo recurrit. Sed nota quod Auic. & Mesue appropriant in hac dispositione uinum uetus, purum, uinosum ante cibum, scilicet, per mediam horam, aut unam horam iam perfecta cibi præcedentis digestionem, & iam perfectis euacuationibus & diuersionibus de quibus sermo præcessit, & sit in pauca quantitate, scilicet duarum, 3. aut circa: hoc enim datur ad spiritum & humores subtiliandos. Et si exhiberetur immediate post sumptionem alicuius electarii, aut pulueris in hac dispositione proprii, de quibus in debilit. uisus propter humiditatem turbidam, & propter crassitatem & turbulentiam spirituum acetum est præstantius. Et posset exhiberi etiam per tres horas ante cibum aut pluries. dummodo esset perfecta digestio cibi præcedentis, loco huius posset exhiberi uinum artificiatum in isto cap. descriptum. Nota secundo, quod Mesue in nyctilope proueniens ex multitudine sanguinis, facta phlebotomia ex cephalica, præcipit phlebotomiam uenarum lachrymalium, id est, quæ sunt in lachrymalibus domesticis ad euacuandum causam coniunctam. Similiter sanguinem extrahi ex uenis narium, aut cum sanguifugis, aut cum instrumento facto ex setis porcinis, aut cum fistulis herbarum quæ sanguinaria uocatur. Vbi tamen hæc duo fieri debent, prius sanguis ex naribus est puocandus, deinde ex angulis lachrymalibus, ex quibus eliciuntur tres intentiones, scilicet euacuatio, diuersio, & causæ coniunctæ remotio. Quarta autem intentio, scilicet humiditatis & uaporum resolutio, & humorum, & spirituum subtiliatio & illustratio perficitur non solum cum his, quæ in oculo ponuntur, sed etiam cum interius sumptis, sicut herba adhib. id est, euphrasia, cubeba, feniculus, chebuli conditi, nux muscata condita, triphera pulueres, electaria, uinum artificiatum, hæpar hircinum comestum, carnes uiperarum præparatæ, ut in lepra & multa alia, de quibus dictum est in debilit. uisus, & plerisque aliis capitulis. Sed præter collyria superius descripta, ex intentione Rasis, est collyrium expertum ex intentione Alexandri. 3. succi feniculi depurati, partem. 1. mellis, fellis hircini, ana. partem. s. expertum est, cui si admisceatur ex stercore cocodrilli. 1. illius serpentis & stercore stellionis, ana. partis. 1. quarta pars, sanat in paucis diebus, &c. Similiter laudat coholum ex pipere longo, zingib. & spica. Cura autem haliar propter paucitatem & subtilitatem spirituum, & humorum perficitur duplici regimine. Vnum est debita administratio cibi & potus, & aliarum rerum non naturalium, quibus multum de sanguine laudabili & aliquantulum crasso, non tamen turbido generatur, qui est materia spirituum uisibilium & humorum oculi. Secundum est confortatio uirtutis naturalium, ut ex cibo bonus chylus etiam ex chilo bonus sanguis, ex sanguine multi spiritus & humores aliquantulum crassius, sed non turbidi generentur, de quibus actum est sufficienter in debilitate uisus, ad quod recurre. Et hi debent multum dormire & esse ociosi animo & corpore, & multum humectari qualitative & substantifice, & debet uti mirobalanis & triphera ex illis factis ad confortandum spiritum & uniendum, sed sint permixtæ cum aliquibus humectantibus. 3.

syropo aut saccharo uiolato. Et uestes & operimenta sua cum egrediuntur domum transeuntes per medium lucidum debent esse nigra, & locus habitatiois debet esse mediocris coloris maxime uiridis. Et in summa totius regiminis debet notabiliter ad humidum declinare: sed breuiter ad frigidum, aut ad temperiem in actiuis. Et raro conueniunt euacuaciones nisi ad sit humor præter modum spiritus subtilians, qui euacuandus est cum lenib. in quibus sint mirobalani aut eorum uirtus. Et si longum essent acturi iter per loca alba aut lucentia, portet uelum nigrum coram oculis.

Cura autem nyctilopis propter longum aspectum rerum albarum & lucentium, & similiter haliar propter longam moram in tenebris & aspectum rerum nigrarum perficitur, ut in nyctilope fiat transitus paulatim de medio claro in obscurum. Et e contrario in haliar de obscuro in clarum. Et magis successiue & paulatim, quod in nyctilope de claro in obscurum cum lumine fortius imprimat, quod tenebra. Demum hoc regimine non sufficere procedatur in haliar cum multiplicantiis, & incrassantibus spiritum & humores, & in nyctilope cum subtiliantibus spiritus & humores, & ipsos illustrantibus sicut iam dictum est, &c.

De dilatatione pupillæ. Cap. 32.

Dilatatio pupillæ, alinthifar sunt nomina synonyma significantia hanc dispositionem, de qua diuersi auctores sub his diuersis nominibus determinant. Quæ definitiua secundum Auic. est ut fiat foramen ueræ latius quam à natura. Et contra contractio est ut sit foramen ueræ strictius, quod consuetum sit, ex quibus inferitur quod utraque earum dispositionum est morbus in uia, ut quia uia delationis specierum nimis dilaturatur aut constringitur, imo aliquando uia aufertur foramine penitus obstructo, &c. Duplex est alinthifar siue pupillæ dilatatio. quædam naturalis, quædam præternaturalis, id est, reddens oculum ægrum uel neutrum. Et hæc iterum est duplex, quædam ex tempore, quædam ex generatione contracta. Quarum utraq; est duplex, quædam magna, & interdum adeo magna, ut consequatur corneam, quædam parua non multum transcendens limites sibi naturales. Eadem species & diuisiones contractionis, pupillæ possunt assignari, cum quædam similiter sit naturalis, quædam præternaturalis. Et præternaturalium, quædam ex tempore, quædam ex generatione contracta. Et utraq; duplex, nam quædam magna, & interdum ita magna, ut foramen penitus obturetur, quædam parua non multum recedens à limitibus naturalibus.

Causas dilatationis aut contractionis naturalium non oportet assignare, cum ipsi non debeant curatio, sed præseruatio uel reductio, quæ non sunt præsentis propositi. Ut plurimum tamen dilatatio naturalis insequitur humiditatem & multitudinem albuginei, & contractio causas his contrarias. Causæ autem dilatationis & contractionis præternaturalium quæque sunt per coitatem, quæque sunt per essentiam in oculo. Sed quia necessarium est in his dispositionibus uicem ladi, aut per essentiam aut per communitatem, placet nunc ordine resolutorio causas harum dispositionum inuestigare resoluendo hos effectus in causas propinquas, & propinquas in remotas & remotas in remotiores. Causæ itaque immediate harum dispositionum sunt, aut mala complexio, aut apostema, aut solutio continui, aut mala compositio, sicut malus situs est causa tam dilatationis quam contractionis, ut clarius in sequentibus. Et si mala complexio, secundum plurimum est aut humida aut sic. Et si humida, aut sine materia, & sic mollificando est causa contractionis, aut cum materia subtili paralytante, & sic etiam est causa contractionis, aut cum materia crassa spasmanente. Et tunc illa materia aut est imbibita in parte ueræ terminata ad foramen eius, & sic est causa contractionis, aut in parte ueræ terminata ad secundinam, & sic est causa dilatationis. Si uero in tota ueræ est causa contractionis. Si uero fuerit complexio sicca, aut est non proportionata ad materiam, & sic non est causa dilatationis nec contractionis, aut proportionata ad materiam, & hæc dupliciter, aut inaniter & resoluens humidum substantificum ipsius notabiliter, ita ut sit causa contractionis partium, & contractionis partium adinuicem. Et tunc si est in parte terminata ad foramen, est causa contractionis, & si est in parte terminata ad secundinam, est contrahendo causa dilatationis. Si aut sit uniformiter per totum, est causa contractionis. Si uero sit siccitas cum præsentia materiæ,

aut

aut materia est imbibita in parte terminata ad foramen, & sic est causa constrictionis, aut in parte terminata ad secundam, & sic est causa dilatationis, aut in tota, & sic est causa constrictionis. Mala autem complexio calida & frigida non faciunt in plurimum dilatationem, aut constrictionem nisi immediate, licet imaginabile sit frigiditatem immediate partes contrahere in ea parte in qua est, & sic esse mediatam causam dilatationis aut constrictionis ut supra, & si sit per totum est causa constrictionis, si uero sit apostema, aut est in parte terminata ad foramen, & sic est causa constrictionis, aut in parte terminata ad secundam, & sic est causa dilatationis, aut in tota & erit causa constrictionis. Solutio autem continui est causa harum dispositionum, & per se, soluendo uueam, unde si soluatur in parte foraminis dilatatur, cui non est cura, & si in parte posteriori constringitur, & per accidens attrahendo humores & apostemando, & dilatabitur, & constringetur in differentiam loci apostematis, ut antea. Causæ autem harum dispositionum mediatæ aut sunt in albugineo, aut sunt inter uueam & corneam. Si in albugineo, aut quia superflue humectatur & multiplicatur, & sic in quantum humectatur est mollescentia uueam causa constrictionis, licet in quantum multiplicatur est causa dilatationis extendendo eam, aut quia superflue exsiccat & paucificatur, & sic ratione siccitatis est in plurimum causa dilatationis, licet ratione paucificationis sit causa constrictionis. Si uero causa sit inter corneam, & uueam, scilicet, humiditas retenta est impellendo uueam ad interiora in plurimum est causa constrictionis. Si uero causa per communitatem sit remotior, aut est in cerebro, aut in aliis membris, licet in plurimum sit hæc communicatio à cerebro, sed à quocunque membro fiat communicatio est secundum alterum trium modorum, aut per simplicem alterationem, aut per uaporum transmissionem, aut humorum. Et quocunque modo sit, non potest uuea dilatari aut constringi nisi propter aliquod nocumentum impressum in ipsa à membris sibi, scilicet, communicantibus, quod non est aliud, nisi aut mala complexio, aut apostema, aut aliud ex nocumentis, de quibus sermo præfatus, aut saltem aliquis modus malæ compositionis sicut est in compressione uueæ ab humore contento inter corneam & uueam, aut extensio eius ab humore albugineo ipsam sui multitudine dilatante. Et si quis consideret, hæc causa reducitur ad morbum in situ, &c. est enim, malus situs immediate causa dilatationis, aut constrictionis. Causæ autem primitivæ sunt sicut percussio capitis aut oculi.

Signa dilatationis & constrictionis absolute nota sunt ad sensum. Signa naturalium & præternaturalium sumuntur ex perfectione operationum oculorum, aut ex earum læsione præcipue uisionis, quæ est principalissima eius operatio. Signa accidentalium & earum quæ sunt à generatione contracta, habentur ex relatione cognoscentium ægrum & dispositiones oculorum suorum. Signa uero causarum siue sint per communitatem, siue per essentiam, siue ab humiditate, siue à siccitate, aut à quacunque causa dependant, habentur ex his, quæ longo sermone dicta sunt in cap. de debilitate uisus. Sed circa signa distinguenda inter dilatationem & constrictionem pupillæ cadit dubitatio non parua. Vtrum dilatatio pupillæ faciat res uideri minores quàm sint, & contra, constrictione maiores. Et arguitur quod non, quia quāto res representantur sub cono maiori apparet maior, & sub cono acutiori minor, sed in dilatatione pupillæ res representantur sub cono maiori & in constrictione sub minori, ergo quæ sitio falsa pro parte affirmatiua. tenet consequentia, & maior rem declarat experientia, quia aliter non potest solui, quare res de longe uisæ apparet minores, & de prope maiores. Et hoc etiam est, sicut principium in perspectiua, minor etiam declaratur, quia lineæ uisuales peruenientes ad crystallinum per uiam latam faciunt angulum magis latum. Et contra per uiam angustam coangustantur, & faciunt angulum acutorem. Amplius species receptæ in spiritu magis disperso amplius disperguntur & dilatantur, & contra in spiritu unito constringuntur. Sed in dilatatione pupillæ spiritus est magis dispersus, & contra in constrictione unitus, ut omnes concedunt, ergo in dilatatione pupillæ res debet apparere maior, & contra minor in constrictione. In oppositum est. Auicenna. tertia terti, cap. de alinthis sic dicit. Et

quandoque est amplitudo oculi naturalis & nocet uisui, uidet enim res minores quàm oportet. Et Azaruius in cap. de dilatatione dicit de proprietate huiusmodi ægritudinis, est & eius signum, quia uidentur res minoris corporis quàm uere sint. Et in cap. de strictione dicit: Signum huius ægritudinis proprium est, quia uidentur ei res maiores quàm uere existunt. Idem scribitur pluries secundo continentis, unde auctoritate Butegni, Si pupilla sit stricta, patiens uidet res maiores quàm sint. Hic multæ assignantur solutiones, sicut est in rebus dubiis consuetudo, cum nulla sit certa ei integre satisfaciens. Prima est originaliter Iesus Hali resoluens hos effectus in fortitudinem & debilitatem uirtutis uisus, nam quia in dilatatione uirtus uisus est debiliior propter spirituum dispersionem res apparent minores. Et e contrario in constrictione, quia uirtus uisus est fortior propter spirituum unionem res apparent maiores. Sed certe hæc solutio stare non potest, non potest enim assignari causa quare ex fortitudine uirtutis conuergentis ex unione spirituum propter strictionem pupillæ debeat esse error in uisione. Absurdum enim est quod fortitudo uirtutis faciat errorem in uisione, sic enim oculo temperato deberent res apparere maiores quàm sint, & forte propter hanc causam Auicenna solum dixit amplitudinem naturalem esse causam, ut res minores appareant, nullam faciens mentionem de constrictione. Præterea cum in dilatatione & constrictione tam naturalibus, quàm præternaturalibus uirtus uisus debilitetur in comparatione ad oculum temperatum, in utrisque debent obiecta apparere minora quàm sint. Præterea potest esse tanta debilitas in oculo pupillæ strictione, sicut in oculo pupillæ late, ergo in utroque obiecta apparebunt maiora quàm sint, quod implicat, antecedens facile deduci possit. Secunda responsio est Genesii. siue recitata per eum, quod quia in dilatatione spiritus uisibilis est rarus & dispersus non potest species uisibilis in eo multiplicari multiplicatione quæ fit cum terminatione, quod requiritur ad hoc ut aliquid in alio uideatur, & ideo res potest uideri in aqua, & non in aere. Cum igitur species ibi taliter non multiplicentur, oportet quod res diminute uideantur, & sic minores quàm sint. Et e contrario quia in constrictione propter multam spirituum coadunationem species possunt multiplicari cum terminatione, ideo apparent maiores. Et huius exemplum est, quia in serenitate hyemali minutissimæ stellæ apparent, quia species earum possunt recipi terminatiue in aere crassiori, quæ stellæ non apparent in serenitate æstatis propter aeris raritatem. Sed certe hæc ratio nihil aliud concludit, nisi quod aliqua obiecta possunt uideri in constrictione pupillæ propter specierum unionem, quæ non possunt uideri in dilatatione propter diffregationem, sed tamen si ab utroque oculo eadem obiecta uidentur, potius concludit, quod obiecta in dilatatione pupillæ debeant apparere maiora, cum species magis disperse transeant ad pupillam. Et e contrario in constrictione minora cum transeant magis unitæ. Sed forte dicit Genesius hanc instantiam facere pro opinione sua, nam omne obiectum quod ab aliqua potentia definit uideri, prius uidetur sub maiori quantitate, postea sub minori donec paulatim apparenter decrescendo euanescat, ergo in proposito si propter dispersionem specierum uisibilium definit uideri, sequitur quod continue minoris, & maioris quantitatis apparebit, ergo dispersio specierum uisibilium quæ est in dilatatione pupillæ est causa, ut res minores appareant. Ad quod dicendum, quod responsio Genesii esset bona, si maior præassumpta esset uera, scilicet quod omne obiectum quod ab acuta potentia definit uideri, prius uidetur sub quantitate maiori postea sub minori, sed licet sit uera de omnibus, quæ definiunt uideri propter distantiam, non tamen est uera de omnibus quæ definiunt uideri propter diffregationem spirituum & specierum uisibilium in dilatatione pupillæ, nisi scilicet obiectum continue maneat in eadem distantia: neque de obiectis quæ definiunt uideri propter cataractam cum in dies paulatim confirmatur: nec habet ueritatem in his quæ definiunt uideri propter nimiam propinquitatem, aut propter tenebras. Et breuiter credo quod non habeat ueritatem nisi in his, quæ definiunt uideri ex eo quod conus pyramidis specierum uisibilium non potest attingere chrytallinum

Io. Arculani.

K

cum

cum prius attingeret ex eo quod ille conus continue factus est acutior, & acutior, & paulatim diminuendo processit donec deueniret ad non quantum, siue non gradum, quod non est nisi propter distantiam: aut quia obiectum continue diminuendo processit: aut quia medium paulatim fit densius, & proprie si fiat densius uniformiter, difformiter extremo densiori terminato ad crystallinam, radius enim transiens de medio rariori in densius conuertitur ad perpendicularem. Sed restat ut respondeatur ad experientiam Gentilis, quia stellæ minutissimæ non apparent in serenitate æstuali, quæ apparent in serenitate hyemali. Dico quod propter subtilitatem aeris species despersuntur, ita ut conus sue pyramidis non possit attingere chrysellinam. Dico etiam quod si aer ultra modum densaretur stante æquali diaphaneitate, conus pyramidis illarum stellarum minutissimarum non posset attingere crystallinam. Vnde ad bene uidentium requiritur, quod in medio fit commenturata densitas, raritas, non enim si totus aer esset ita densus sicut crystallum, aut uitrum, possemus uidere aliquam stellam, tamen cum toto hoc dico, quod illæ stellæ siue magnæ, siue parvæ, quæ uidentur in serenitate æstuali non apparent minores, quam ipsæmet apparent tempore hyemis, ut patet ad experientiam de stellis nobis cognitis. quod tamen deberet esse secundum Gentilem, unde apparet quod hæc experientia fit magis contra opinionem quam pro opinione. Nam neque potest Gentilis in huiusmodi causæ assignatione intelligere, quod in spiritu unito species terminatiue recipiatur per modum cuiusdam reflexionis, sicut exemplum suum de his quæ possunt uideri in aqua, & non in aere uidetur sonare, quia si uisio fiat in crystallino, uel ultra crystallinum, secundum quod tenent omnes, debent habere spirituum unionem propter terminationem speciei, & reflexionis ad extra deterius uidere, quam habentes spiritus dispersos, ipsi speciebus non ita bene potentibus transire ad locum in quo perficitur uisio. Neque potest intelligere quod illæ species terminatiue receptæ in spiritu, postea per spiritum deferantur ad crystallinum, quia exemplum suum de stellis minutissimis uisus in serenitate hyemali, &c. non esset ad propositum, quia & si illæ species melius terminatiue recipiantur in aere densiori non est in illo aere spiritus delator illarum specierum sic determinatarum ad oculum nostrum, nisi forte diceret, quod aer ille est immediatus oculo nostro in cuius superficie sunt spiritus delatores. Sed tunc oporteret concedere, quod si aer immediatus oculo nostro esset subtilitatus, tunc stellæ minutissime ita male apparent in serenitate hyemali sicut æstuali, sed omittamus, in hoc longius processu, quam statueram. Credo tamen quod hæc opinio haberet bonum intellectum, licet non fuerit clare recitata & explicata per fundatores eius. Tertia causa recitata per Gentilem est. Propter quam est præmittendum, quod habentes latitudinem pupillæ sunt debilis uisus debilitate tali, quod indigent non multo lumine, quia dispergeretur spiritus uisibilis, & egent forti motu ex parte rei uisus mouentis nam res debilitate mouens non cauaret modum motus sufficientis ad uisionem, & ideo uidemus quod dissoluti in uirtute tactiua non præcipiunt nisi fortia tangibilia.

Secundum quod præmittere oportet est quod lineæ uisuales quanto sunt magis centrales tanto sunt fortiores. Et quanto sunt magis laterales tanto sunt debiliores, sicut etiam dicimus de radio qui est centralis quoniam rectus est fortior. Ex quibus apparet quare habens pupillam latam uidet res minores quia maxime uidet res sub lineis rectis fortiter imprimantibus & non sub lineis lateralibus, & e contrario habens pupillam strictam, quia fortis est uisus, uidet sub utriusque. Sed hæc causa non potest dare modum quare in strictura pupillæ res appareat maior: imo deberet solum apparere sicut est uel secundum quod est. etiam ex hac causa habetur quod in dilatatione medium centrale rei apparet & non apparent extrema quod est contra experientiam, sic enim quadrata triangula apparent rotunda. præterea in constrictione uisua uirtus est debilis in comparatione ad pupillam comparatam, ergo in constrictione obiecta debent apparere minora, quam sint ex fundamento præsumpto & in sola temperata, aut sibi uicina debent obiecta apparere quæta sunt, quare hæc solutio licet apparens sit, est longe à ueritate distans. Hæc etiam causa & secunda præsupponunt quod in spiritu uisibili species recipiantur terminatiue, quod difficile est defendere.

Si enim est pars in oculo in qua species recipiantur terminatiue, ista est crystallinus humor & tela aranea. In spiritu autem recipitur solum delatiue, nisi quis forsan diceret quod in spiritu quia est delator proximus ad uisionem est terminatiue recipiatur. Quarta causa est propria Gentilis. sumpta ex quodam dicto Aristotelis. 3. problematum, problemate octauo, ubi quærens propter quid obtusa uidentes scribunt litteras paruas, dicunt quod scribunt litteras paruas, quia constringunt siue coadunant palpebras, unde species rerum uisibilium recipiuntur in oculo sub angulo acutiori cum foramen transitus specierum coangustetur ob clausonem palpebrarum, & simile etiam est in his, quæ habent latas pupillas. scilicet cum à lumine intenso eorum spiritus amplius disgregetur. E contrario euenit in habentibus pupillam strictam, nam dilatant palpebras, quia spiritus costrictus & densus multa luce indiget, & ideo species potest uenire ad oculum sub forma pyramidis lata, & spiritus densatus recipit illam speciem sub modo latiori, sicut recipitur species in aere crasso. Sed contra sequitur ex primo dicto quod habentibus pupillam magnam deberent res apparere minores secundum longitudinem & non secundum latitudinem, consequens est falsum, & contra experientiam, consequentia probatur, quia angustatur foramen transitus specierum secundum longitudinem & non secundum latitudinem. Sequitur ex secundo dicto, quod quia species recipiuntur in spiritu densato ex paruitate pupillæ quod res debeant apparere minores ex eo quod radius siue species transiens de medio rariori in densius conuertitur ad perpendicularem, & sic representantur sub cono acutiori, & e contrario, recepta in spiritu rariori dilatatione pupillæ deberet apparere maior quia species transiens de medio densiori in rariis diuertitur à perpendiculari, quare cum hæc solutiones quæsto non satisfaciunt, oportet alium modum soluendi inuestigare. Dico ergo quod aut comparantur oculo in sui dilatatione & costrictione naturalibus aut præternaturalibus. Siquidem primo modo cum oculus habens pupillam latam sit debilis uisus, & e contrario pupillam strictam sit fortis uisus & plurimum representantur res habenti pupillam latam minores quam sint ob uisus debilitatem, & e contrario habenti stricturam ob fortitudinem uirtutis uisus representantur res secundum quod sunt. Et propterea A. loquens de dilatatione pupillæ naturali, dixit quod in ea res apparent minores, & in cap. de constrictione pupillæ non dixit quod appareant maiores, non enim est credendum quod fortitudo uirtutis uisus sit causa erroris ipsius.

Contra, quicumque gradus potentie uisus reperitur in constrictione pupillæ, æqualis reperitur in dilatatione, ergo quantum est ex parte uirtutis nulla debet esse disparitas in uisione tenet consequentia, & antecedens est manifestum, cum tam in dilatatione quam in constrictione signanda sit latitudo potentie uisus à gradu correspondente uisus temperate usque ad non gradum, licet in dilatatione & constrictione naturalibus sit solum signanda latitudo terminata à temperamento ad certum gradum inclusiuè, qui gradus terminans latitudinem est æqualis in dilatatione & constrictione. Dicitur ad hoc, quod antecedens est uerum, attamen quia ex æquali lapsu in constrictione non ita debilitatur uirtus sicut in æquali lapsu in dilatatione, medici ascripserunt hunc defectum dilatationi & non constrictioni. Si uero comparentur oculi in sui dilatatione & constrictione præternaturalibus, cum secundum plurimum dilatio insequatur humiditatem superflua, per quam incrassantur humores, præcipue albugineus, similiter tunicæ & spiritus & e contra costrictio insequatur siccitatem per quam subtiliantur humores tunicæ & spiritus nisi illa siccitas ad ultimum perueniat per quam possent humores incrassari refo-lutis partibus subtilibus & remanentibus terreis. tenendum est secundum plurimum in dilatatione res debere apparere minores, & e contra in constrictione maiores, ex eo quod si esset transitus de medio rariori in densius conuerteretur ad perpendicularem, unde conus sue pyramidis efficitur acutior, & sic species uisibiles transientes ab aere ad oculum cuius spiritus tunicæ & humores sunt incrassati propter humiditatem superflua faciunt conum sue pyramidis acutiorum. & propterea representant res minores quæ sunt, & e contra species transientes ab aere ad oculum cuius spiritus tunicæ & humores sunt subtiliati

iliati faciunt conum suæ pyramidis latiorē, & per consequens representant res maiores q̄ sint, uel saltem concluditur q̄ & si in constrictiōe sequente siccitatem subtiliorem humores, & non semper appareat res minores q̄ sint, saltem de necessitate apparent res maiores q̄ appareant in dilatatione consequente humiditatem incrassantem & cetera. Vbi autem dilatio proveniret ex aliis causis, & similiter cōstrictio, non est necessarium problema illud verificari.

Quod aut constrictio sibi plurimum insequatur siccitatem, dicit Auic. in cap. de constrictiōe, sic inquit, & plurimum accidit hoc accidens ex siccitate. Ex quo syllogizare possumus sibi plurimum dilatationem insequi humiditatem, quod etiam clarius plurimi auctores experientia testantur. Hanc solutionem si placet accipe, aut male dicta corrige. Hæc etiā solutio posset ampliari ad dilatationem & constrictiōem naturales. Sed contra species transiens de aere ad quemcunque oculum transit de medio rariori ad densius, ergo res semper debent apparere minores. Ad hoc dicitur q̄ in oculo temperato est commensurata densitas faciens pro optima uisione, & ut obiecta appareant quantæ sunt. In reliquis aut labentibus ab hac densitate temperata, accidit ut res appareat maiores aut minores q̄ sint. Iam superest, ut respondeamus ad argumenta adducta in principio. Ad primum cum dicitur, q̄ quanto res representantur sub cono maiori, apparent maiores, & sub minori minores. Conceditur, & negatur minor, quia licet ratione dilatationis pupillæ res possit representari sub cono maiori, tñ ratione incrassationis & densitatis humorum tunicarum & spirituum conus pyramidis constringitur, & sic res illa apparet minor. Et in constrictiōe pupillæ contra euenit propter subtilitatem humorum, tunicarum & spirituum. Ad sibi dicitur, q̄ si ratione dilatationis spiritus debeat dispergi, & ratione constrictiōis pupillæ magis uniri, attamen ratione incrassationis spirituum & tunicarum & humorum in quibus spiritus continentur sunt minus apti in dilatatione pupillæ dispergi q̄ in constrictiōe. Secundo negatur consequentia. Spiritus sunt magis dispersi in pupilla lata q̄ in stricta, ergo species debent transire ad crystalloidem magis dispersæ, plurimum enim facit ad unionem specierum densitas mediū intrinseci q̄ faciat ad dilatationem dispersio spirituum. Sed ubi cū dilatatione pupillæ essent spiritus, humores, & tunice subtiliata, & e contrario cum constrictiōe in crassati sicut potest accidere, omnino contrarii effectus eueniunt, & multo magis cum duæ causæ ad eundem effectum producendum sese iuuant. Ex quo etiam concluditur, q̄ ubi dilatio pupillæ & incrassatio humorum, &c. essent æque potentes ad contrarios effectus producendum, effectus tamen producendus gradui medio corresponderet, & sic obiectum representaret sub quantitate quam habet, & idem in constrictiōe deduci posset, & tu considera.

Prognostica. Primum dilatio naturalis deterior est q̄ constrictio naturalis, imo non reputatur mala nisi modū excesserit, &c. Certum est n. mediocritatē in dilatatione & constrictiōe esse laudabile & temperamento pertinere, & e contrario extrema uiciosa & dis temperata. Aequalis tñ lapsus à temperamento in dilatatione est deterior quàm æqualis lapsus in constrictiōe. Et e contrario constrictio præternaturalis ceteris paribus est deterior quàm dilatio, & quia priorior in uisus ablatione. Et quia cōter pendet à siccitate & inanitione quibus difficillime succurritur. Et e contrario dilatio ab humid. & causis repletibus quibus facillime succurritur. Secundū prognosticū. Hæ dispositiones à natiuitate contractæ aut longi temporis, siue confirmatæ non sunt remouibiles, & minus remouibiles est dilatio quàm constrictio, cū dilatio sit morbus diminutionis consequens defectū materiæ aut uirtutis informatiue. Et e contrario constrictio sit morbus augmenti. Tertiū. Si dilatio tanta fuerit ut ad coniunctiue circumferentiā proueniat & e contra constrictio tanta fuerit ut foramen penitus oppiletur raro aut nunquā curam recipiat. Quartum. Hæ passionēs sequentes sōdā aut alias cerebri ægritudines difficillime curabiles sunt, quia ægritudines cerebri ad istas critice terminant. Quintum. Hæ passionēs pēdentes à pulsione, & similibus causis primitiuis si magne sint, difficillime curantur, aut nunquam. Si uero parue aut mediocres facillime, si enim dirūpitur uuea nō recipit curā.

Cum pupilla, hoc est, foramen quod est in nigredine oculi adeo dilatari uidetur, ut undique pertingat ad albedinem, fueritq; hoc post uehementem cephalææ dolorem, parua est habenda fiducia in eius cura. Sed si dilatio parua fuerit tunc assidua solutio uentris ex coctis multoties & sief de fellibus in oculo est mittendus. Quod si pupillam post percussione dilatari contingat, non est inde timendum, quia remouebitur, fiat itaque emplastrum ex farina fabarum & chamæmello & euisco cum uno & aqua.

Rasis in præsentī capite determinans de dilatatione pupillæ siue alinthisar, tria facit. In prima parte determinat de dilatatione pupillæ consequente cephalgiam. In secunda ibi. Sed si dilatio. Ponit curam dilatationis pupillæ non ualde magnæ propter humiditatem superfluum existentem in oculo aut propriam aut comunicatam. In tertia ibi. Quod si pupillā. Ponit curam dilatationis sequentis percussione. De prima parte dicit. Cum pupilla, id est foramen, q̄ quod est in nigredine oculi, id est, uuea adeo dilatatur, ut undiq; circum circa perueniat ad albedinem, id est, coniunctiuam, fueritq; post uehementem capitis dolorem, parua est fiducia in eius cura, tum propter eius magnitudinem, tum quia est critica, unde à capite semper noua deriuatur materia. De secunda parte dicit, q̄ dilatio pupillæ consequens humid. oculi superfluum, aut propriam aut comunicatam, curatur frequenter exhibendo pilulas cochias cum debita tñ interpolatione, ne uirtus terreatur. Secundo ponendo in oculo sief de fellibus, cuius descriptio præcessit in cap. imaginacionum. In tertia parte curat dilatationem sequentem percussione inueniens facilem eius curam cum hoc emplastro. Recipe farinæ fabarum, quæ est frigid. & sic. reperculsiua & partim resolutiua. ʒ. 2. chamæmille calid. & sic. in primo resolutiue siue attractiue. ʒ. 5. euisci, id est, althææ calid. & sic. resolutini & doloris sedatiui. ʒ. 1. cū aqua & uino nigro stiptico, in quibus chamæmilla & althæa coctæ fuerint, fiat emplastrum, quod quidem competit non statim à principio, sed post tertiā aut quartam diem cum sit partim reperculsiuum partimq; resolutiuum. Sed contra, quia Auic. 3. tertiū cap. de alinthisar, dicit q̄ alinthisar sequens percussione non habet curam. Respondetur q̄ Auic. intelligit cum dilatio est magna, & proprie si sit cum fractura uueæ, Rasis autem intelligit hic cum est parua & sine fractura uueæ.

Cura dilatationis & constrictiōis pupillæ conueniunt si pēdeant à causis similibus, unde si pēdeant ab humiditate superflua aliunde oculo comunicata sex requiruntur intentiones. Prima est euacuatio sibi humoris exigentiam. si enim fuerit sanguis in causa, fiat phlebotomia ex una cephalica, uel ambabus, si ambo oculi fuerint lēsi. Si uero pēdeant ab aliis humoribus fiat euacuatio sibi humoris exigentiam respiciens tam membrum mittens quàm recipiens integrata ex minoratiuo digestiui & eradicatiui, aliquoties reitera, nō tamen ita frequenter, ut uirtus terreatur, de quibus dictum est in cap. debilitatis uisus. Auic. tamen assignat terminū decem dierum, si inter euacuationem & euacuationē. Secunda intentio est diuersio complenda, materia existēte sanguinea cum prouocatione hæmorrhoidarum, menstruum, sanguinis narium, si eorum retentio fuerit in causa. Item cum uentilatione, phlebot. uenarum, nocere, & aliarum, de quibus sermo præcessit. Si uero alig materiæ peccauerint, fiat diuersiones aliæ conuenientes, & proprie usq; ad ipsa cauteria si oportuerit. Tertia intentio est regimen membri mittentis complendum cum euacuatione, diuersione ipsius, confortatione, ne huiusmodi materiam multiplicet, sed expellat per loca conuenientia. Quarta intentio est resolutio causæ coniunctæ, quæ sibi plurimum est humiditas phleg. quæ completur cum alcohol ex thutia. Item cum collyrio ex succo foeniculi, cui addi posset parum fellis gruis aut hædi, aut tantum dem mellis. Auic. uero laudat hoc. R. fellis hædi, fellis gruis an. aureos. 2. croci. ʒ. 1. piperis. ʒ. 70. gran. suc. liquiritiæ aur. ʒ. & tertiam, ammoniaci, aur. 2. mellis quātum sufficit, terantur terenda cum aqua foeniculi, & miscendo cum melle fiat collyrium. Ad euacuandū et causam coniunctā confert phlebot. uenarum quæ sunt in lachrymalibus domesticis. Quinta intentio.

Io. Arculani.

K 2 intentio

intentio est correctio accidentium inter quæ cauendum est ne dilatata pupilla unius oculi altera dilatetur, & propterea iubet Auic. fieri alcohol alteri oculo cum thuria præparata ne dilatetur sicut prius. Sexta intentio est debitum regimē quod debet ad siccum inclinare, & ad calidum sibi plurimū, uerum materia existente sanguinea declinet ad frigidum. inter cetera laudat Auic. aquam ciceris cum oleo sifa. Si uero pendeant hæ passionēs à siccitate, tunc adhibeatur omne regimen intrinsecum & extrinsecum humectantium qualitatiue & substantifice, & in summa regatur regimine hecetica. Et inter cetera aliquando fiat frictio oculi & partium circumstantium, ut nutrimentum trahatur ad oculum: sit tamen breuis. Si uero pendeat à percussione. Prima intentio est diuersio cum phlebotomia cephalica eiusdem lateris secundū plurimum. Et si oportuerit apponantur uentose cum scarificatione in spatulis, aut nocera, aut in his locis sanguifuge applicantur. Secunda, fiat repercussio ponendo in oculo, & super oculo aquam albuminis oui cum aqua rosacea per duos dies aut circa, deinde super oculo ponatur emplastrum Auicennæ, ex farina fabarū sine corticibus & farina hordei ana. 3. i. cum aqua foliorum salicis & endiuie, aut ponatur lana infusa in uittello oui & oleo rosaceo, cum paucis uino sctiptico, & tunc in oculo lac distilletur. Et post hoc emplastrum, oculo superponatur emplastrum Rasis magis resolutiuū & tunc in oculo distilletur sanguis turturum, columborum, aut pullorum. postremo autem cum materia amplius non fluat administrare collyrium factum ex thuria, croco & myrrha ana, cui si oportuerit addantur alie medicinæ magis resoluētes, de quibus dictum est in tarphati, & similiter exterius apponantur magis resoluētia, &c.

De fistula lachrymali. Cap. 33.

Hoc est ultimum cap. de passionibus oculorum in quo Rasis agit de fistula lachrymali. Et iuxta morem nostrum primo uidenda sunt quid nominis, & quid rei. Sed quia fistula lachrymalis ut plurimum sequitur apostema lachrymalis, ideo de ipso à nobis prius agendum est. Apostema lachrymalis penes A. dicitur bachelus, & est apostema secundum plurimum factum in lachrymali domestico. Huius enim quatuor sunt species sibi quatuor humores, phlegmaticum, sanguineum, cholicum & melancholicum. Verum Auic. de duobus tantummodo loquitur, scilicet phlegmaticum quod est de genere glandularum, siue sit cum chisti siue sine chisti, & de sanguineo. Ex eo quod ista duo sunt sibi plurimum euenientia, scilicet phlegmaticum quidem propter multa phlegmata à cerebro ad lachrymale domesticum rheumatizantia. Sanguineum etiam accidit frequenter propter uicē, quæ est in lachrymali domestico, à qua facile egreditur sanguis illius apost. factiuus. Et hoc apostema dicitur exitura bothoralis. Apost. enim quæ sunt in hoc loco sunt sibi plurimum exitura incipiendo, licet sibi plurimum sint difficilis suppuratio, & propterea ex longa mora frequenter putrefaciunt os, ut aliquam particulam, scilicet paniculum aut charitilaginem. Apostemata uero cholica & melancholica rarius accidunt in hoc loco. Et hæc exitura bothoralis existens sibi plurimum sanguinea est duplex. Est enim quædam magis superficialis subiacens uisui, quædam magis profunda non subiacens uisui, sed cum compressione sentitur, & est deterior. Arguit enim aut crassitiam materię, aut debilitatem uirtutis expulsiuæ, & est tardioris suppurationis quàm prima secundum plurimum corrumpens os, aut aliam particulam intrinsecam.

Causæ horum apostematum sunt primo quatuor causæ generales, scilicet fortitudo membri expellentis scilicet cerebri sibi plurimum, præsentia materię & latitudo uiarum, debilitas membri suscipientis cum aptitudine ad recipiendum propter carnis spongiositatem, & propterea hic locus scilicet lachrymale domesticum frequentius apostematur quàm synechialis. Causa autem efficiens est sanguis sibi plurimum, deinde phlegma, postea cholera aut melancholia, licet sibi plurimum hæc apostemata sint iuxta. Signa huius apostematis sunt tumor, durities, dolor, grauitas, ophthalmia consequens, & similiter fluxus lachrymalis. Cognoscitur autem sanguineum, aut quia rubeum purpureum cum tensione dolore ex-

tensio, & notabili tumore sibi plurimum, cuius rubedo per compressionem non dealbatur. Cognoscitur phlegmaticum, quia album cum paucis aut nullo dolore, & si est cum chisti facile impellitur de loco ad locum, & paruum est aptum terminari per suppurationem. Cognoscitur cholicum, quia rubeum clarum uel tendens ad citrinum cum pauca tensione & duritie paucis; eminentia, & dolore pungitui, cuius locus rubeus albescit per compressionem, & est cum multitudine lachrymarum, scilicet calidarum. Cognoscitur melancholicum, quia tendens infusum cum duritie multa & paucis dolore. Hæc apostemata sibi plurimum generantur per uicem defluxus per partes exteriores, & sibi plurimum suppurantur, & tandem rumpuntur, aut intra oculum, aut ad extra per cutim, aut utrinque materia existente multa & acuta, aut rumpuntur ad nares ossa putrefaciendo & perforando, ita ut interdum putredo communicetur colatorii, aliquando corrumpuntur cartilagine palpebrarum aut panniculus cooperiens eos, aliquando nullum istorum corrumpitur apostemate existente pineali, ita ut solum cutis rumpatur. Prognostica. Corruptio os & præcipue os colatorii sunt ceteris difficiliora quæ rarissime aut nunquam curantur. Pinealia autem facile curantur, mediorum iudicium est medium. Sed nunc dicamus de fistula lachrymali. Nam fistula lachrymalis & algarap sunt termini synonymi. Et secundo continetur dicitur algarap transumptiue à quodam instrumento, siue uale non habente nisi unum foramen per quod aqua infunditur, licet interius sit amplum. Sed nota quod fistula accipitur dupliciter, communiter scilicet, & proprie, fistula enim communiter sumpta dicitur de quocunque apostemate cauenoso, & taliter sumitur hic, proprie autem sumpta est ulcus, cuius fundum est amplum, & orificium strictum cum duritie & nodositate partis intrinsecæ. Hæc autem fistula dicta algarap, aliquando dicitur lachryma propter multitudinem lachrymarum. Et à Simone Ianuensi, egilops. Et ab Alzaratio abracor. Et ab haliabbate cornu uel corna. Et secundo continentis, authoritate G. egilops. Species eius sunt quæ aliquando est superficialis, aliquando profunda. Et hæc est duplex, aliquando cum corruptione ossis & panniculi, aliquando sine. Item aliquando cum duritie & abstractione, aliquando sine.

Causæ sunt apostemata iam dicta cum erumpunt. Item diuturnus fluxus lachrymarum. Signa fistulæ est resudat uirus, aut sanies. Item etiam egressio ipsius manifesta per compressionem super lachrymale. Egreditur enim aut per oculum, aut per nares, aut per aliquot foramina cutis. Item malus color, & mala dispositio illius partis nec non fluxus lachrymarum & dispositio ad ophthalmiam. Cognoscitur quod sit superficialis ex apostemate præcedente superficiali, & facile scilicet paucis diebus erupto. Et cognoscitur e contra quod sit profundum ex apostemate profundo, scilicet cui tardata est eruptio. Cognoscitur quod sit cum ostræditate ex longitudine temporis, & quia per tactum sentitur durities manifesta præter consuetudinem. Cognoscitur quod sit cum corruptione ossis per tactum cum proba argentea aut plumbea, & per uirus quod egreditur cum est subtile tendens in citrinitate. Cognoscitur aut putredinem esse communicatam colatorii, per uirus foetidum, subtile, citrinum, per os egrediens. Cognoscitur quod cartilago oculi sit corrupta per uisum. Quod autem panniculus sit corruptus cognoscitur, quia facilius proba penetrat in ipsum.

Prognostica ex dictis facile innotescunt. Hoc tamen affirmare potes, quod hæc fistulæ cõter sunt chronica, tum propter continuum defluxum ad lachrymale domesticum, tum propter motum oculi & lachrymalis, tertio quia non potest fieri ligatura conueniens in ulceribus, quarto quia medicinæ debiles non imprimunt, fortes uero nocent oculo, &c.

Cum angulus lachrymalis resudat, et cum premitur, sanies & uirus ab eo egrediatur, fistulam pati intelligitur. Quæ cum cauterio curatur. De hoc tamen loqui plus est quam huic nostro libro attineat. Nos tamen iam ei adiuuimus medicamen, quod si adhibitum fuerit, ipsam per multos menses adeo tardare facit, ut æger sanus uideatur. Medicamen autem illud est. Recipe aloes, thuris, sarcocolla

sarcocolla, sanguinis draconis, balauftia, antimonii, aluminis, omnium ana partes aequales, ziniar quantum est quarta pars unius, fiat ex eis sief. Cūque neceffe fuerit fistula in tā sū prematur, ut quicquid saniei in ea cōtinetur egrediatur.

Deinde infirmus super latus in quo non est fistula iaceat, & de predicto sief aliquid dissolvatur in aqua, de qua in angulo lachrymali tres guttae aut quatuor intimarizentur magno existente intersticio inter proiectionem unius guttae & alterius, in quo factō ager per tres sic iaceat horas. In mane quoque sequentis diei similiter fistula bene prematur, & fiat eadem cura, quod per hebdomadam unam fieri convenit, & etiam tam diu donec a fistula nihil egrediatur cum prematur. Ex hac nanque cura locus multis mensibus siccus permanebit. De curis oculorum quantum huic loco necessarium esse putavimus, iam satis dictum esse credimus. Alia vero quae sunt de curis quae per ferrum exercentur dimittimus, quia multis indigent medicaminibus. Sunt tamen quaedam ex eis quae in locis in quibus de decoratione tractabimus, et sanitatis custodia continentur.

Dividitur hoc cap. in quatuor partes. In prima parte notificat ipsam fistulam. In secunda ibi scilicet quae cum cauterio, innuit ueram curationem fistulae. In tertia parte ibi. Nos tamen adiuvenimus, ponit curationem fistulae mendosam. In quarta ibi. De curis oculorum, excusat se ab ulteriori determinatione de passionibus oculorum. Quae dicit in omnibus istis partibus, satis manifesta sunt. Verificemus solum receptam quae optime confert in exiccatione fistularum & earum consolidatione. Aloe nanque est calidum in secundo, sic in tertio, pauca mordicationis conglutinans fistulas & ulcera difficillime consolidationis sibi Serapionem, auctoritate Galeni in de simplicibus, centesimo nonagesimo sexto. Secundo est thus calidum in secundo, siccum in primo abstergens obsecritatem visus, replens vulnera profunda, & incarnat ea apud Dioscoridem libro primo simplicium. 71. Tertio est sarcocolla calida in secundo, sicca in primo corrodens carnem mortuam, & restituit corosam. Quarto est sanguis draconis frigidus, & sic in tertio sibi Serapionem, conglutinans ulcera & plagas. Quinto sunt balauftiae frigidae, & sic in primo ualde stipicae, restringentes incarnantes & consolidantes. Sexto est antimonium frigidum in primo, sic in secundo destruens carnes putridas ulcerum, mundificans fordes eorum & consolidans ea, prohibens pustulas fieri in combustione ignis, consolidans ulcera a combustionem facta mixtum cum cerula & mumia. Septimo est alumen habens multas species, hic vero sumitur alumen de rocha calidum & siccum in tertio, confringens fluxum sanguinis, desiccans ulcera. Octavo est ziniar, corrosivum, forte calidum & siccum in quarto. Ex his ergo apparet quanta sit virtus huius antidoti in huiusmodi, scilicet fistulis & aliis in quibus est humiditas, scilicet superflua. Dicit autem Rasis hoc debere imponi postquam aliquod sief ex his distemperatum est cum aqua decoctionis gallicarum, existente magno intersticio, id est, spacio inter prohibitionem unius guttae & alterius, ut optime possit ad profundum penetrare, quapropter foramen debet esse prius bene dilatatum, & ulcus bene abstersum, & servare reliqua, quae in textu dicta sunt. Apoplematas lachrymalis, & similiter fistulae eiusdem triplex est regimen, scilicet universale quod debetur causae antecedenti, & particulare proprium causae coniunctae, tertium est regimen commune utriusque. Primum exigit tres intentiones, scilicet evacuationem, diversionem, & fluxus interceptionem, quae omnes complenda sunt, secundum quod dictum fuit in ophthalmia. Secundum scilicet particulare quod debetur apoplemati si sit genitum per viam de fluxus, & terminetur per viam resolutionis exigit tres intentiones, repercussionem in principio, in medio repercussionem mixtam resolutioni, sed in fine resolutionem tantum. Repercussiva quae debentur in principio sunt leuia, sicut in materia calida, aqua rosacea, aqua albuminis oui, lac & oleum rosaceum permixtum cum aceto quod bullierit usque ad acetum consumptionem, & superponatur lachrymali petia infusa in eo, cauendo tamen, ne aliquid eius oculum ingrediat.

Si autem materia sit frigida, huic aliquid bdellii in aceto dissoluti permisceatur, & desuper ponatur, postea gradatim addatur ammoniacum, & succus foeniculi. Et si apparet durities parum mucilaginis althaeae, aut foenugraeci, & similium. tandem ammoniacum in aceto dissolutum cum decima parte atramenti, id est vitrioli, est conveniens resolutivum. nux rācida cōtrita & superposita est ultima. Si vero tendat ad maturationem adiuvetur cum diachylon, & similibus, postea rumpatur. Sed consulo tibi ut non expectes eruptionem siendā a natura, sed tu erumpe cum cauterio, aut cum sagittella, & distanter ab oculo, & si minus tarda fuerit maturatio, erumpe ante maturationem completam, ne ex longa mora partes intrinsecus corrumpantur, & fac foramen latum, ut convenienter possit perficere omnes operationes in hoc casu opportunas. De maximis enim erroribus & tardantibus curationem est paritas foraminis. Quod si fuerit ruptum cum sagittella, imponatur pro prima vice, aut etiam duabus vicibus stuellae stupei in albumine oui infusi iuxta consuetudinem. Si vero cum cauterio ponatur vitellum oui in oleo rosaceo, infusum duobus diebus. Postea quomodocumque ruptum sit, perveniatur ad mundificandum siue ad mundificantia. Et ex convenientibus est mel. ros. aut oxymel simplex. Et ex propriis est lanugo inuenta in canna prope radicem permixta cum melle rosaceo, aut oxymelle. fortius istis est unguentum Aegyptiacum remouens carnem mortuam. Et adhuc fortius est hoc. Recipe mellis, viridis aris, aluminis, ana, & misce. Et conveniens ad mundificandum, & exiccandum, & consolidandum est medicamen Rasis positum in litera, & c. Si vero os sit putrefactum necessarium est ipsum amovere, aut cum cauterio actuali quod ordinetur sibi exigentiam ossis remouendi, & orificium ulceris. communis autem modus est, ut defendatur totus oculus, & etiam labia orificii cum petiis lineis aut cotto infusis in aqua rosacea, aut albumine oui, aut in aliquo succo frigido quod semper faciendum est cum uoluerimus uti aliqua medicina caustica, & deinde instrumentum bene ignitum ponatur usque ad os, bene adhaerendo ipsi ossi, semel, bis aut pluries sibi exigentiam, & propterea sunt parata plura instrumenta taliter ignita, & semper fundum ulceris a sanie aut a sanguine abstergatur, ne operatione impediatur. post hoc albumen oui cum oleo rosaceo & vitello. oui cōcūsum ponatur intus & desuper, & in oculo ponatur, sief album cum albumine oui, lacte, aut aqua ros. ne oculus ophthalmetur, & super oculo etiam cottum petia linea circumdandum in aqua rosacea infusum, & fronti & temporibus repercussiva applicentur. Si vero ager abhorreat cauterium actuale dilatato orificio ulceris cum sectione, aut tentis de spongia, de medulla mellegae, uel sambuci, uel gentianae procedatur ad squamationem ossis, & remotionem substantiae corruptae, aut ostracosa cum medicinis incipiendo a leuioribus, sicut est alumen de rocha combustum, & peucedanum est proprium in squamatione ossis, & fortius est vitriolum combustum, & potius est euphorbium, vitriolum tamen aliquanto tempore continuatum super osse est mihi expertum. fortius autem in omnibus & infallibile est cauterium factum ex capitello, sed inueteratum ualde, ut amplius in aquam non conuertatur, si enim quantitas grani frumenti super osse ponatur potenter squamat non solum hoc os, sed etiam cetera ossa, & est mihi expertum. Auic. tamen laudat dicbardich & sibi aliquos sic hoc modo. R. bdellii, ammoniaci ana. 5. s. dissolvantur ad ignem, & proiciantur desuper viridis aris. 3. 2. plus si uolueris facere ipsum acutius. Aliter describitur a Rasi secundo continentis. R. arsenici citrini partem unam, gris uili partem. s. salis ammoniaci partes quatuor, infundantur in aqua calcis per hebdomadam & exiccantur in sole deinde sublimantur & referuntur quod sublimatum est in uase vitreo, & est multum acutum: aqua quoque separationis auri ab argento si in eo cottum in extremitate stili infundatur & applicetur. Et similiter aqua dissolutionis cauterii, & haec aquae leuiter possunt applicari cum extremitate stili in quo uis, & per foramen cannulae potes intromittere stilum, in cuius extremitate sit cottum in huiusmodi aquis infusum. Et sic perficies operationem tangendo locum corruptum & nocet bis sano. Ex his ergo omnibus collige sex intentiones curativas. Prima est dilatio orificii ulceris, secunda cauterio.

Io. Arculan.

K 3

zatio

ratio donec mortificetur caro scilicet fistulosa & os corruptum, aut alia substantia, scilicet putrida. tertia est absterfio & eleuatio partium causticarum, ad quam intentionem perficiendam ponantur mundificantes, de quibus supra, tranfactis duobus diebus, in quibus uitellum oui cum oleo rosaceo mixtum potest imponi. quarta est generatio carnis, quæ debet fieri cum notabiliter exsicantibus propter humiditatem ulceris superfluum, & propterea non denudetur à pauca quantitate uiridis aris. Et ad hoc perficiendum ualet medicamen Rasis in litera. quinta est sigillatio perficienda cum unguento de lithargirio, & quandoque cum alumine combusto, sexta est accidentium correctio, scilicet doloris & ophthalmiæ, scilicet minuendo & temperando oculum cum frigidis & circa frontem & tempora, repercussiuâ apponendo, & proprie dum sunt operationes fortes & dolorosæ, &c. Vltimum regimen commune utrique causæ respicit accidentia, de quibus dictum est. Et secundo regimen sex rerum non naturalium uariandum secundum exigentiam intentionum, de quibus supra, sed sit dieta magis tenuis & declinans ad frigidum quanto accidentia sunt fortiora, & quando perficis aliquam operationem dolorosam ex iam dictis. Cura uero mendosa in textu posita fuit & sufficienter ordinata, &c.

De passionibus aurium, & primo de anatomia. Cap. 34.

A Cum est in præcedentibus de passionibus cerebri, & neruorum, & oculorum. Hic agitur de passionibus aurium. Et iuxta consuetudinem præmittit anatomiam auris, & modum regiminis conseruatiui eiusdem, imo potius præseruatiui, deinde ad curandas eius ægritudines accedam iuxta seriem capit. Rasis. Auris dicta est ab hauriendo, eo quod per aures doctrinam haurimus. Nam per auditum maxime efficitur scientes, primo metaphysicæ, & in libro de sensu & sensato. secundum accedens uero ad prudentiam auditus plurimum confert, sermo enim audibilis existens est causa disciplinæ, quare infra concludit quod sapientes à natiuitate utroque sensu præditi sunt, priuati autem sunt cæci, muti, & surdi: licet enim sensus uisus de se magis conferat ad scientiam quod auditus, per accedens tamen magis confert auditus, & unusquisque nostrum in seipso facile potest iudicare. Auris descriptio est membrum instrumentale chartilaginosum, rotundum, subtili panno uelatum cum quibusdam eleuationibus anfractuosis, habens foramen similiter anfractuosum, non rectum perueniens usque ad extremitatem foraminis osis petrosi, in quo est neruus audituius in modum paniculi: contextus duræ matri continuus, in quo spiritus audibilis complantatus continetur, & ante ipsum sibi contiguus est aer stans, uesica quadam circumdatus ad audiendum finaliter ordinatum. Est enim membrum instrumentale & organicum ratione operationis nobilis facientis ad bene esse indiuidui, & esse compositum, fuit autem chartilaginosum, ut esset sonorum, & non fuit factum ossuosum ne casu aut percussione frangeretur, neque factum fuit carneum aut panniculare, quia non bene seruasset figuram & compositionem sibi necessariam, & fuit rotundum, ut esset bene capax aeris, & deinde sonorum, habuit autem anfractus ad similitudinem ostracilimarum, ut melius fieret aeris, & inde sonorum reuerberatio. Fuit autem uelatum panniculo duro subtilissimo, qui secundum ueriores sententiam est genitus ex uillis nerueis ortum habentibus à quinto pari neruorum cerebri, aut ex uillis ligamentalibus ortum habentibus ab osse petroso, ut auris haberet debitum sensum, & cum hoc bene resisteret exterius occurrentibus. Fuit autem foramen eius anfractuosum non rectum, ne uentus aut aer discrasiatum aut fortis sonus subito sine modificatione ad organum auditus perueniret, neruus autem audituius est pars principalissima, in qua fit auditus, sicut crystallois respectu uisus in oculo, & spiritus complantatus est instrumentum auditus, sicut spiritus uisibilis ipse uisus, & aer stans circumdatus uesica, quod torum uocatur miringa, auditus est medium intrinsecum specierum, sicut albugineus est medium intrinsecum specierum uisibilium, & foramen auris ab Auic. est appellatum affarmach, sicut foramen uueæ dicitur pupilla, in quo uniuntur species soni, sicut in foramine uueæ species uisibiles, non est autem nisi hæc differentia, quia foramen uueæ est coopertum cornea,

non autem foramen auris. Illud enim fuit necessarium in oculo, ne albugineus exiret. Similis autem necessitas non est in aure. Est autem ad audiendum ordinatum tanquam in finem, quamuis enim auris habeat alias operationes naturales ministrantes, & ministratas & uitales. Et quamuis sit deputata ad expurgandum superfluitates cholericas cerebri, ut patet in cerumine aurium, quod per eam egreditur: attamen principalissima operatio est audire, & non est cerebrum euentare, sicut quidam existimauerunt, neque etiam per aures respirare, quod Aristoteles reprobatur primo de historiis animalium.

Ex quibus patere potest anatomia auris. Fuerunt duæ, ne nocita una, auditus impediatur. patet etiam numerus partium componentium aurem, scilicet chartilago, panniculus, foramen, aer stans cum uesica sua, neruus audituius, & spiritus complantatus. Patet secundo situs, quia fuerunt in alto constitutæ, ut essent proximæ cerebro, quod propter usum debuit esse suprema pars corporis, fuerunt in lateribus constitutæ, & non ante propter oculos & instrumenta gustus & olfactus, quæ hunc locum sibi uendicarunt, & non fuerunt posita posterius, quia nimis fuissent distantes à sensu communi, quare. &c. Fuerunt autem immediatæ sub tonsura capillorum, quia si fuissent magis supra ab ipsa fuissent uelatæ, & ab his quæ in capite geruntur. Patet etiam subtilitas, quia chartilaginosa à prædominio, propterea auris est frigida & sicca complexionis quantum ad complexionem innatam, licet quantum ad influentem sit calida & humida, patet etiam quæritas & figura & iuuamentum, potest autem pati omne genus ægritudinis simplicis, & etiam apostema. Ex quibus infertur, quod ea, quæ ponuntur in aure debent esse actu tepida non frigida. Nisi forte in casu excessiue caliditatis præternaturalis quod rarissime contingit, neque multum calida. Circa hæc duo cadunt dubitationes. Prima quia uidetur quod unus sonus debet iudicare duo, cum à duabus auribus per duos neruos, qui scilicet nunquam uniuntur, species soni ad sensum communem deferantur, si uera est communis sententia quod nerui optici uniuntur, ne unum uisibile iudicaret duo. Secunda dubitatio, quoniam quantum par neruorum oritur à posteriori cerebro, imo omnia paria præter duo prima, ut est manifestum his, qui uiderunt anatomiam, ergo species soni debent deferri ad cerebrum posterius & ad memoratiuum, non autem ad sensum communem, & sic sensus communis non erit index obiectorum sensuum exteriorum. Ad primam responderetur quod unus sonus non debet apparere duo, quia duo nerui, scilicet auditui uenientes ad duas aures uniuntur in origine ipsorum, & sic fit unio specierum delatarum per ipsos neruos. Contra si illa unio neruorum in origine sua sufficeret ad unionem specierum audibilium, à pari sufficeret unio specierum uisibilium in origine neruorum optitorum, & sic frustra esset altera unio circa medium ipsorum.

Ad hoc dicitur, quod prima unio sufficeret, scilicet ad unionem specierum, secunda tamen unio non est frustra cum sit facta non solum propter unionem specierum uisibilium, sed etiam ut spiritus uisibilis possit cito deferri de uno oculo ad alium, cuius signum quia per compressionem unius oculi, pupilla, scilicet alterius dilatatur: secundum iuuamentum est, ut per illam unionem seipsos melius sustentent, ut uult Auic. prima, primi, doctrina. 5. capite de anatomia neruorum cerebri autoritate Gal. hoc autem non fuit necessarium in auditu, cum pauciores spiritus ad audiendum sufficiant. Et quia duæ aures sunt in duobus lateribus oppositis situatæ ad inuicem ualde distantes. Ad secundam dicitur, quod à loco coniunctionis neruorum audituorum transit uia, occulta tamen ad sensum communem, orti autem fuerunt à cerebro posteriori, ut essent duriores, sic enim fuit expediens pro operatione sua, & quia sunt multum expositi extrinsecus alterantibus, nec de hoc mireris, nam, & species tagibilium deferuntur à neruis manuum & pedum ad sensum cõem, non immediate, sed per multa media. Primo enim deferuntur ad nucham à qua illi nerui originantur, deinde ad cerebrum posterius, à quo nucha oritur: & inde ad sensum cõem, qui est in cerebro anteriori, non tamen prius deferuntur ad memoriam, quod ad sensum communem, ut manifestum est. Regimen autem conseruatiuum auris siue præseruatiuum est, ut tueamur auris complexionem

plexionem cauendo ab extrinsecis occurrentibus, sicut aere uento, aqua & similibus potentibus aurium eucrasim corrumpere. Conseruamusq; earum compositionem prohibendo, ne foramen oppiletur ab his quæ possunt aures ingredi, sicut aqua, lapilli, cimices, & similia. Et ne etiã ab intrinseco oppiletur sicut à cerumine, sanguine aut alia humiditate, uermibus aut carne, scilicet interius orta.

Ad hæc autem duo prohibenda, optime cõfert oleum amygdalarum amararum debite calidum, si in utraq; aure tres guttæ semel singula hebdomada imponantur ipsis auribus bene absterfis, & sine dolore à cerumine & reliquis superfluitatibus in ipsis existentibus, cuius olei extractio cum cotto, postea procuretur. Ad conseruandum autem unitatem & prohibendum apostemata & bothor in eis optime confert, si emithæ cum paucis acetis similiter instillatum. Et cauendũ est à repletionē & satietate nauisatiua, & proprie à somno super repletionē, &c.

De dolore aurium.

Cap. 35.

Hæc pars aggritudinis aurium diuiditur in sex partes, secundum quod Rasis sex facit capitula. Primum cap. est de dolore auris circa quod sunt quædam notanda iuxta morem nostrum. Quid nominis auris satis manifestũ est. Dolor autem auris est tristis sensatio tactiua cuiusdem rei subito materialiter imprimentis, &c.

Species doloris quandoq; sumuntur à particula patiente, aut quia quidam est exterius in cartilagine auris, quidam interius in foramine, aliquando communicant neruo auditivo aliquando sumuntur à dolore in se, & sic sunt quinque species doloris communiter euenientes, scilicet pungitiuus, pruritiuus, extensiuus, grauatiuus, pulsatiuus. Item quidam intensus, quidam remissus, quidam criticus, quidam non criticus. Et quilibet dolor est actio corrupta, & propterea est accidens alicuius morbi, licet etiam quandoq; sit morbus, cum quandoq; subito interficiat, sicut apoplexia apud Auic. cap. proprio. Est autem & alia actio corrupta auris, de qua infra, quãdo unus sonus pro alio apprehenditur, aut apprehenditur sonus esse in medio, qui non est, inter quas duas actiones corruptas est differentia. Prima, est enim actio corrupta tactus. Secunda, auditus, licet utraq; actio corrupta fiat in eadẽ parte organi, & cum eisdem instrumentis adequatis numero, complexione & spiritu auditivo. Et per unammet causam imprimentem in organum auditus, scilicet uentositatem & æque primo tempore, nec obstat famosum dictũ Arist. & commentatoris. 2. de generatione quod ab uno in quantum unũ nõ provenit primo nisi unũ. Isti enim duo effectus nõ proveniunt ab eisdẽ causis in quantum una est enim potentia auditiva tactiua, realiter distincta, & etiam species sonora, quæ est immediata causa unius, differt à mala complexione aut solutione continui, quæ est immediata causa alterius, &c.

Causæ doloris auris, aut sunt per essentiam, aut per communitatem, quamvis cuiuslibet doloris causa immediata sit mala complexio aut solutio continui existens in mēbro dolente, aut in membro sibi communicante, unde non est incõueniens esse dolorem in aliquo membro in quo non sit mala complexio, aut solutio continui, licet illius doloris causa immediata sit mala complexio aut solutio continui existens in altero membro sibi communicante. Mala autem complexio tactiua doloris auris plurimũ est calid. aut frig. sine materia aut cum materia cuiuscunq; generis & frequenter cum cerumine auris lædente qualitate aut quãtitate. Mala autem complexio calid. aut est à causa extrinseca sicut ab aere calid. aut aqua cali. & proprie cum succedunt causis in frigidantibus. Et similiter mala complexio frigid. est ab aere, aut à uento, aut ab aqua frigida, & similibus, & proprie cum succedunt causis calefacientibus, aliquando etiam pendet à causis corporeis sicut in febris, & aliis dispositionibus. Causæ autem solutæ continuitatis sunt, casus, offensio, aut percussio, aut aliquod animal, aut alia res ingrediens aurem, aut nata in ea, aut uentositas extendens, aut humor aliquis corrodens, aut putrefaciens & tandem uicerans aurem, aut apost. cum rumpitur & frequenter cerumen auris tam sua quantitate quàm qualitate, &c. Apostemata enim & bothor, siue pustulæ causant dolorem auris mediante tam mala complexione, quàm solutione continui, hæc autem apost. secundum plurimum sunt calida

sanguinea aut cholerica, aliquando tamen sunt frigid. phleg. & melach. Et possunt fieri tam per uiam defluxus, quàm per uiam paulatim factæ congestions. Causæ autem doloris auris per communitatem, aut sunt à toto sicut in crisi aut febris, aut à membro particulari sicut stomacho, hepate, matrice, frequentius tamen à cerebro, & à quinto pari neruorum cerebri, &c. Signa doloris auris habentur ex relatu ægri. Quod si referre nesciat, quia forte infans, tangantur loca uerisimiliter dolentia, quod si dolor erit in aure ex tactu dolor crescet & ploratus & lamentatio. Et etiam quia forte præter consuetudinem aliqua humiditas fluit ex aure, aut forte illa quæ fluere consueuit est retenta. Signa uero causerum primitiuarum tam malæ complexionis quàm solutæ continuitatis sunt ipsarum præcessio & nocumentum inde secutum causæ proportionatum, sicut exempli gratia, præcessio uentis, aeris frig. aquæ & proprie aurem ingressæ, & frigiditas inde in aure manifeste sensata. Et sicut præcessio aeris calidi, & ingressio lixiui aut alterius calidi in aurem cum manifesta eius caliditate. Et sicut præcessio percussions calis & offensions sequente fluxu sanguinis aut saniei ab aure. Cognoscitur autem dolorem pendere ab animali, aut ab alia re aurem ingressa aspiciendo in aurem sub radiis solaribus & etiam si est animal sentitur cõmotio ipsius & punctio & sonitus magnus in eius commotione. Et si est uetustitas, dolor est extensiuus, nõ grauatiuus, & auditur sonitus manifestus & clarus non qualis in apostemate, aut in materia non apostemante in quibus est sonitus, & fragor quidam cõfusus. Cognoscitur autem mala complexio calid. ex præcessione scilicet causæ calefacientis, & quia caliditas in aure sentitur, iuuatur à frigidis & in hora frigidiori diei, nocetur à cal. & in hora calidiori diei. Eccontrario sunt signa malæ complexionis frig. & si est sine materia, est sine grauitate, sine tumore, sine obturatione foraminis, & præcessit aliqua ex causis primitiuis secundum plurimum & non multum impeditur auditus. Sed cum præsentia materiæ adest grauitas & tumor, & foraminis obturatio & magis pedit à causa corporea, & impeditur auditus si sit in profundo. Soluta autem continuitas manifesta cognoscitur per exitu sanguinis aut saniei. Sed apostema cognoscitur per grauitatem, dolorem continuum, & tumorem & obturationem foraminis nisi sit in parte ualde intrinseca, & tunc dolor est ualde intensus & adest grauitas & febris continua. Et si calidũ sit sanguineum, adest magna grauitas, & tumor & durities, & rubedo tẽdens in obscurum. Et si ualde profundum sit, dolor est intensissimus cū alienatione & interdũ motibus spasmodicis, & syncopis, & frig. extremorum. Et febris est intensa & interdum cū rigore & horripilatione, in extrinseco enim febris est leuis sicut ephimera. Si autem sit cholicum adest dolor pungitiuus non ita extensiuus & grauatiuus sicut in primo cum calid. mordaci & intensa, & non est ibi tumor magnus, neq; magna foraminis obturatio, & rubedo est clara quæ per compressionem delitescit.

Phlegmaticum autem est cum paruo dolore, pauca febris neque color membri est mutatus à colore sibi consueto, & est cum leuitate. Melancholicum autem est cum duritie & cum dolore tendente in fuscum, & cum maturatur crescit febris, dolor etiam fit magis pulsatiuus, & ex accidentia crescit, sed eo maturato, omnia minuantur, & eo corrupto sanies egreditur, & multoties ex insperato cum medici multoties decipiantur non credentes esse apostema, & non est differentia inter materiam apostemantem, & non apostemantem sed solum imbibitam, nisi quia in non apostemate, est minor tumor, minor dolor, minor obturatio foraminis, minor febris, imo secundum plurimum non est febris, & cetera accidentia sunt remissiora, raro tamen accidunt, ut sit materia imbibita non apostemans. Species autem materiæ cognoscitur ex signis supra scriptis. Et iterum ex signis communibus sumptis ex ætate, complexione, forma, & tempore anni, arte regimine præcedente, & similibus. Cognoscitur autem dolorem pendere ex cerumine, quia foramen auris eo plenum est, & ex extractione eius dolor recedit. Cognoscitur autem quod sit per communitatem à toto uel à parte, ex nocumento totius uel partis præcedente, cum cuius augmento augetur, & diminutione diminuitur, & si sit per communitatem à cerebro secundum plurimum, non solum auditus læditur, sed etiã

Io. Arculani

K 4 gustus

gustus propter propinquitatem originis quinti paris' nervo rum cerebri præbetis auditum origini tertiæ & quarti paris præbetis gustum & sensum linguæ, & dolor criticus cognoscitur ex ægritudine præcedente, cum cuius doloris augmento materia permutata sedatur ægritudo præcedens sicut sedatur phrenesis materia ad aurem permutata.

Prognosticum primū Auic. peruersior dolor auris est qui fit ab apostemate profundo calid. & proprie cum est cū feb. inseparabili, perducit enim ad permixtionem intellectus, & quandoq; interficit subito sicut apoplexia, cum enim est in nervo auditivo ob fortem dolorem, fit cerebri contractio, & per cōsequens meatuum oppilatio & prohibito transitus spiritus animalis ad membra mouenda, ex quo prohibito anheliu sequitur suffocatio & mors, & hæc est potius epilepsia quàm apoplexia cum in cōtractione tanta cerebri necesse sit uniuersum corpus contrahi, secundum plurimum tamē non interficit in. 7. Prognosticum secundum, hic dolor uelocius & frequētius interficit adolefcentes quàm senes, quia in senibus est sensus obtusior, propter cuius obtusionem toleratur quousq; suppuretur. Sed in pueris ob acuitatem sensus nō potest tolerari quousq; sanietur. Si autem suppuretur cū cæteris signis laudabilis speratur euasio, nullum tamē usq; ad. 55. ætatis mæ annum uidi mori ex auris dolore, &c.

Si cū dolore qui fit in aure fuerit in facie inflatio, & pulsatio, ex cephalica sanguis erit minuendus. Et oleum rosaceum aut oleum de floribus salicis tepidum cō pauco aceto est immittendum. Lac quoq; ita calidum ut ex mammilla egreditur, erit distillantundum multoties. Vt præterea ex mirobalanis, citrinis, & scammonæ & aloë uehementer soluantur, quod hoc modo fit. Rec. mirob. citrin. drach. 20. & puluerizati in. 2. lib. aquæ coquantur, donec ad duas tertias unius lib. reddantur & colentur. Post hoc sumantur aloës drach. 1. scammonæ & 6. pars. 3. 1. aggregentur cum rob de cytonijs, & fiant ex eis pilule, quæ per duas horas ante decoctionem sumantur, deinde bibatur decoctio. Quod si dolor nō quieuerit parum opij in oleo rosaceo resoluti in aurem mittatur, & si pulsatio redierit, & tribus diebus perseuerauerit oleum sesaminum in quo anatis aut gallinæ adeps fuerit resolutus in aurem sepe mittatur, ibi nanq; est pustula, quæ maturatione indiget. Cum autem dolor quieuerit, putredo iā est collecta, ideoq; pus subito ex insperato egreditur de aure.

Diuiditur hoc cap. in partes tres. Nam in prima parte Rasis ponit curam doloris auris ab apostemate siue pustula calida licet in hac parte comprehendatur cura doloris à mala cōplexione calida sine apostemate. In secunda ibi, scilicet. Cū autem dolor in aure, ponit curam doloris auris à male complexione frigida cum materia. In tertia ibi. Si autem cum dolore, ponit curam doloris pendens à uentositate. Prima ite rum in duas, nam in prima ponit signa doloris auris ab apostemate calido, in secunda ibi. Ex cephalica. Ponit curam. In prima parte ponit duo signa apostematis calidi in aure. Primum est inflatio faciei, & maxime partis circūstantis aurem & ipsius auris propter præsentia sanguinis aut cholæræ mixtæ cum sanguine, ex quo etiā debet sequi aliquis rubor faciei. Secundum signum est pulsatio, idest dolor pulsatiuus, &c. dolor nāq; pulsatiuus est in apostemate calid. & proprie sanguineo et in sui principio, & maxime cum est præsentia arteriarum, qui dolor postea tempore maturationis multo magis augetur. Secunda pars diuiditur in tres, nam in prima ponit curam cōuenientem in principio. In secunda ibi. Quod si dolor. Ponit curam quando dolor nimium excreuit.

In tertia ibi. Et si pulsatio. Ponit curam apostematis quando maturatur. In prima parte Rasis curat apostemata in sui principio tribus generibus remediorum. Primum est phlebotomia ex cephalica cuius causa nota est. Secundum genus est applicatio localium, sicut olei rosacei aut olei de floribus salicis quod est frigidum & humidum, cum pauco aceto, scilicet quarta parte, secundum immittendum in aure est lac ita tepidum, sicut ex mammilla egreditur frigid. & humid. doloris sedatiuum, & hæc ponitur in aure, & circa ipsam. Tertiū genus remediorum est uētris solutio cū decoctione mirob.

citrinorum, quorum sumantur. 3. 20. & puluerizati crasso modo bulliant in. 2. li. aquæ ad consumptionem duarum partiū, secundum solutiuum est aloës. 3. 1. quod soluit phleg. & choleram cum. 6. parte. 3. 1. scammonæ quæ potissime soluit choleram ex his cum rob de cytonijs, idest, cum succo cytoniorum inspissato per decoctionem, fiant pilule, scilicet. 7. quæ per duas horas sumantur ante decoctionem. Hæc enim medicinæ potētissime soluunt choleram. Sed tempore moderno in regione nostra sufficeret medietas istorum solutiuorum, existimo tamen quod in regione Rasis corpora sint robustiora indigentia fortioribus solutiuis, sicut & in regione Teurorum datur magna quātitas scammonæ. 2. canone. Ratio autem Rasis, quare dat pilulas ante decoctionē per duas horas est, ut sint iā actuatæ, & inceperint iam trahere humores ad stomachum & ad intestina. Et deinde superueniente decoctione adiungetur & felicitet ipsarum operatio, tardius enim actuantur quàm medicinæ liquida. In secunda parte existente fortissimo dolore docet permiscere parum opij, ut puta. 3. s. cum. 5. s. olei rosacei de quo duæ guttæ instillantur in aure. In tertia parte redeunte & crescente dolore pulsatiuo & perseuerante aliquanto tempore docet maturare, & hæc debent apponi tam interius quàm exterius, & litera satis patet nam cum maturatur dolor excreuit, sed pustula maturata dolor sedatur iuxta aphorif. Circa generationem saniei, &c. Deinde pustula rumpitur & sanies ex aure egreditur ex insperato, quia forte nec medicus nec æger credebatur esse apostema.

Cum autē dolor in aure fit post fastidiosam satietatē, aut post uentos frigidos oleū in quo ruta aut capæ costæ fuerint, in aure distilletur. Et si hoc non suffecerit oleum in quo turbit costū fuerit distilletur. Aut oleū de lilio sumatur & cui quæ. 3. 1. ex eo misceatur, euphorbij recētis. 3. 1. & castorei 3. 1. Sed si hoc non suffecerit uenter pilulis coctis soluantur, Paties quoq; balneum ingrediatur in quo sudet. Vinū quoq; uetus & forte ei tribuatur.

In secunda parte principali ponit curā doloris auris à mala complexione frigida cū præsentia materiæ phlegmaticæ. Et posset diuidi hæc pars in quatuor partes secundū quatuor genera remediorum. Primo enim ponens signa doloris à mala complexione frigida, quæ sumuntur à causis suis, scilicet quæ euenierit post fastidiosam satietatem & uentos frigidos. Et supplere uos alias causas infrigidantes.

Ponit primo curam cum iniectione oleorum calefacientium & exiccantium, quorum quædam sunt calida in quarto gradu, sed tutius est incipere à leuioribus & proprie non facta purgatione. Secundo soluit uētreum cum pilulis coctis, à quibus regulariter operando esset incipiendum. Tercio ponit curam per balneum ad corporis exiccationē, calefactionem, & materiæ resolutionem, quod balneum potest esse tā aereū quàm aqueum, & proprie ex aquis calefacientibus, & exiccantibus siue sint naturales siue artificiales. Quarto exhibet uinum uetus ad calefaciendum, & exiccandum, resoluendum & confortandum, & debet esse in pauca quantitate. Et similiter totum regimen declinet ad calidum & siccum.

Si autem cum dolore auris sonitus & timitus fuerint, atq; uentositas panicum siue milium in sartagine torrefactū calidum multoties superponatur. Auris quoq; super uaporem aque in qua sint costæ mentastrum & stæcas arabicus & sampucus, teneatur. De castoreo præterea & euphorbio in oleo sambacino dissolutis, quorū unumquodq; quatuor grana hordei ponderet in aurem mittatur.

In hac ultima parte curat dolorem auris à uentositate, & quæ dixit sunt manifesta. Ultima tamen medicina sic perficit. R. castorei, euphorbii ana gran. 4. olei sambacini, idest, iuiui semini. 3. 2. misce & duæ aut tres guttæ in aurem instillantur & etiam partes circūstantes inungantur.

Pro curandis ægritudinibus aurium ante omnia. Sciendū est quod multis modis medicinæ possunt auribus applicari. Primo fomentando aurem cum lana, cortio, petiis, spongiis, aut filtris infusis in aliquo liquore & expressis & applicatis. Secundo modo recipiendo fumum aut uaporem cū emboto aut sine. Tercio sub forma emplastrorum & unguentorum.

Quarto

Quarto sub forma puluerum. Quinto quo frequentius utitur sub forma liquoris instillado aliquid in profundo auris, circa quem modum sunt octo canones obseruandi. Primus quod auris pro posse aequaliter premundificetur cum cotto aut re simili & leuiter ne dolor inferatur, ut medicina possit in profundum penetrare. Secundus canon, ut quæ instillantur sint ualde liquida aut liquidis admixta. Tertius ut non sint ualde calida aut frigida actualiter, sed tepida propter debilitatem miringæ, & nerui auditui non sustinentes excellentias istas qualitatuum actualium, licet medicinas potencialiter tales in quarto gradu facilius sustineant, & proprie siccissimas. Quartus est, ut ea quæ instillantur sint pauca quantitatibus, sufficiunt enim duæ aut tres guttæ propter paruitatem & stricturam foraminis. Quintus est, quod dum imponuntur, iaceat super aure, scilicet contraria aliquantulum siue aliquandiu, scilicet donec liquor ad profundum descenderit, nam propter toruositatem, stricturâ, & aliqualem distantiam non ita cito descendit. Sextus, ut instillatum non longo tempore retineatur in aure, sed procuratur frequenter ipsiuseductio ne putrescat. Et cum educitur iaceat super eadem aure, & etiam cum cotto eadem auris leuiter mundificetur. Septimus, quod quæ instillantur non sint facile putrescibilia.

Octauus, quod frequenter reiterentur, scilicet ter aut quater in die naturali. nam postquam pauca quantitas debet imponi & paucio tempore debet impositum remanere iuxta canones superscriptos, sequitur quod aut non fiet actio, aut oportet medicinas frequenter instillare.

Cura doloris auris ab animali ingresso auræ uel nato in ea, & lapide, aqua, & similibus cadetibus in aure, & a casu, offensione, ulceribus. & a uentositate patebit ex capite sequenti. Cura autem doloris auris a mala complexionem calida aut frigida sine materia, siue pendeat a causa primitiua sine corporea est, ut primo causa remoueat. Secundo nocumetum ex ipso derelictum cum contrariis sicut frigida cum applicatione pannorum calidorum necnon medicinarum calidarum tam interius quam exterius. Et similiter calidis cum frigidis interius & exterius applicitis semper aurem confortando. Tertio prohibeantur humores à fluxu si timeatur ne fluant ad auræ cum euacuantibus & diuerstentibus. Quarto corrigantur accidentia si qua corrigenda sint, sicut instantia uigiliarum, & similia secundum ipsorum exigentiam. Quinto ordinetur debium regimen secundum exigentiam malæ complexionis si bi impressa, & accidentium. Quæ autem sint medicinae calefacientes aut infrigidantes proprie in dispositionibus auris, et quæ sint medicinae solutiuæ opportune in his dispositionibus, apparebit in sequentibus.

Cura doloris auris pendens ab humore apostemate, aut non apostemante, est uarianda secundum quod dolor est criticus aut non criticus, & secundum quod extrinsecus aut intrinsecus, & secundum quod est intensus aut remissus. Si iste dolor fuerit non criticus & intrinsecus pendens a materia apostemante exigit septem intentiones. Prima est euacuatio. Secunda diuersio. Tertia, repercussio, quæ debetur principio. Quarta est repercussio mixta resolutioni auturationi quæ debetur augmento usque ad medium status. Quinta est putrida resolutio quæ debetur à medio status usque ad finem declinationis. Sexta est accidentium correctio. Septima est debitum regimen sex rerum non naturalium uariandum non solum secundum diuersitatem materię, sed etiam secundum exigentiam intentionum, de quibus dictum est. Et hæc omnia intelliguntur in cura regulari. Sed in dolore extrinsecus auris non competit repercussio. Est enim membrum satis ignobile & reputatum ad recipiendum superfuitates membri nobilis, &c. Vbi uero dolor esset ualde intensus ad eius sedationem ante omnia est inchoandum iuxta sententiam Auic. 4. primi. Quando ad diuersum trahere uolueris membri à quo protrahis dolorem prius seda, quo sedato ad curam ordinariam secundum intentiones superscriptas iter redeundum. Si ergo dolor fortis sit à causa calida hæc remedia facies uel aliquod ipsorum quorum sunt de intentione Mesue, cuius fere totum caput hoc scribam declarando, quæ declaratione indigent. Oui album cum lacte mulieris tepido impositum auri, & partibus circuitantibus cum petis aut cotto superpositum. Item oleum rosæ tepidum per se aut ablutum cum aceto quantum est oleum,

deinde bullitum ad aceti consumptionem, aut permixtum cum succo cucurbitæ, & bene cum ipso conuassatum, oleum de floribus salicis, secundum eandem doctrinam oleum nenupharinum, oleum de semine cucurbitæ, oleum papaueris si dolor est uehemens per se aut cum aliquato caphoræ. Est enim sedatiuum cum remouendo malam complexionem calidam, tum etiam stupefaciendo, lac mulieris solum mox cum mulgetur aut cum succo solatri aut cum aqua coriandri humi. Mucillago psilii cum oleo rosæ conuassata, aut mucillago sem. cytoniorum, oleum de gribret, idest de mandragora, quando dolor est acutus cum lacte mulieris mox cum mulgetur, lenticulas, scilicet stantes in superficie aquarum coctas scilicet cum mica panis cataplasma, succus hyoscyami fortes sedat dolores, etiam stupefaciendo, lactuca agrestris secundum omnem modum administrationis est medicamen bonum. Similiter succus solatri & papaueris & mandragoræ & salicum & turionum uitis, idest, teneritatum extremitatum uitis & similia. Hamech ad dolorem auris à caliditate. Recipe olei rosacei partes duas, olei amygdalarum dulcium partem unam, aceti partes tres, fac coqui lento igne usque ad aceti consumptionem cola & administra tepidum.

Item accipe foliorum cucurbitæ aut ipsius cucurbitæ succum, & misce cum oleo rosaceo, diu coquassato, & utere. Et alicui istorum addere potes apud dolorem fortem parum opii scilicet pro .s. 3. quinq; aut decem grana.

Sed ad dolorem auris à causa frigida administretur oleum nardinum, idest, de spica, costinum, samspuci, rutaceum, amygdalarum amararum, chamemillinum, anethinum, laurinum, de lilio, de cheiri, chrysomelinum, de behen, de cherua, oleum cinnamomi, quodcumque eorum proprietatem habet ad dolorem auris à causa frigida aut uentosa. Fundamentum autem & materia præparationis eorum artificialiter est coepæ concauum, in quo oleum impositum oportet decoqui cum facilitate super cinere prunarum, & ex rebus admixtis sigillantibus ipsis, uirtutes mirabiles cum bonitate decoctionis in coepæ cum eis est ruta proprie, & succus radicis qui comeditur, idest, raphani, & spica, & samspuc & sceha, & est species ab sinthii, & putatur quod sit fantonicum, scilicet herba lumbricorum siue semine eius, alias semencina. & chamæmilla, & galbanum dissolutum in succo porri per se. & alium, & castoreum & piper, & such, idest gallia muscata, & succus coepæ, & succus farafio, idest prassii, & succus aphodelli & euphorbium & uterque elleborus, & proprie albus, & non est inconueniens in huiusmodi permixtionibus admisceri modicum mellis, & deinde tepidum distilletur. Si autem dolor est fortis ex miscibilibus bonis est opium cum paucio castorei & croco, aut philonium cum lacte, aut trochisci stellæ, aut trochisci croci, deinde remoue nocumenta narcotici, scilicet cum eis, quæ scis, de quibus statim dicetur.

Ex uaporatoriis autem siccis est milium, aut panicum & sal, calefacta & superposita, aut bacce lauri cum melle paucio calefacta & superposita, aut pulegium cum melle & olibano aut granum lauri & olibanum cum succo rutæ. Et hæc maxime ualent in dolore uentoso. Et dixit Gal. facelletur ex fursure cum uino cocto, & oleo spicæ aut rutæ. Coepæ marinum contulum cum oleo aut butyro coctum est expertum. Vaporatorium autem humidum fit cum aquis decoctionis rerum quæ maturant, & carminant & mollificant sicut meliloti, piperis & anethi, & chamæmilla, & scenogreci & uolubilis, & foliorum caulium & seminis eius, & herbæ uenti, idest paretariæ & samspuci, & absinthii & similia, singulariter aut coniunctim, ita ut recipiatur uapor eorum per canulam, cuius una extremitas sit fabricata super uas in quo res coquantur, & alia extremitas applicetur auri. Et quoadque est necesse ut misceatur his rebus aliquid ex stupefacientibus, ut sedetur uehementia doloris, & tunc fiat istud cum cautela. Remouet autem nocumenta narcotici uapores superius dicti cum modico, scilicet castorei croci & piperis, sicut scis. Gal. linimentum quod administratur & sedat dolorem auris. Accipe medullam ceruinam, aut medullam cruris iuueni & ceræ ana. 3. s. olei amygdalarum amararum, succi polygoniæ, idest uirgæ pastoris & a multis uocatur sanguinaria & corrigola ana quantum sufficit, fiat unguentum, & inungatur in circuitu auris. Est .n. mirabile. Vel radices raphani cum oleo & decoque & distilla

stilla ex eo in auribus & est lana calida auri applicata. Et uermes qui sunt sicut media faba et inueniuntur sub lapidibus. Aut uermes plurimum pedum coquantur in oleo ex oliuis immaturis, & distilletur ex eo in aurem, est enim expertum. Fit autem similiter ex scarabeis & ex lumbricis terrestribus, coctis cum oleo omphacino. Oleum similiter de scorpionibus est ad istud subline. Item fel tauri cum adipe anatis est inuameti mirabilis ad dolorem auris a causa uehementer frigida. Hec omnia sunt de intentione Gal. quæ experientia confirmabit, hic multiplicauit res medicinas in sedatione doloris auris, quia uehemens dolor ipsius est perniciosus, &c. Dolo-rem sedato uel remisso, procedatur ad curam ordinariam secundum septem intentiones supra scriptas. Pro prima igitur intentione quæ est euacuatio. Si humor peccans fuerit sanguis, aut sanguini mixtus, si materia non fuerit ualde multa, fiat phlebotomia ex cephalica eiusdem lateris. Materia autem existente plurima, fiat phlebotomia ex cephalica lateris contrarii, deinde ex eodē latere. Vbi autem uideretur hepar esse in causa aut alia membra naturalia, fiat primo phlebotomia ex basilica, deinde ex cephalica eiusdem lateris, si oportuerit. Vbi autem matrix & retentio mēstruorum fuerint in causa, primo phlebotometur saphena eiusdem lateris, deinde cephalica eiusdem lateris si oportuerit. Hauiatur autem quantitas sanguinis secundum exigentiam circūstantiā iuxta doctrinam superius datam. Melue tamen propter multam ægritudinis acuitatem præcipit multam sanguinis extractionem, aut una uice aut pluribus. Post hoc si oportuerit euacuetur humor peccans cholericus, scilicet cum his, quæ dicta sunt in textu, aut cum electario succi ros. & similibus. Verum materia existente ualde calida, & proprie apostemante, lenientia frigida sunt potētiore, sicut manna aut calsia cum decoctione prunorum, tamar. uiol. &c. Phlegmaticus uero cum coctiis Melacholicus cum indis & similibus, quibus aliquid cochiarum sit admixtum. Et si non sit opus phlebotomia ab istis euacuationibus est inchoandum. Diuersio iuxta secundum intentionem fiat cum clysteribus, lotionibus brachiorum & crurium, uentofationibus, dinesionibus per nares, gargarisationibus, & phlebotomiis, uenarum, quæ sunt iuxta aures, non autem masticatoriis dolorem enim auerent & materiā magis ad locū attraherent. Tercia intentio perficitur cum repercussu inuicis auris, super aurem, & circa dūmodo materia non sit critice expulsa, non sit uenenoſa, non furiosa non pluri-uma, non expulsa immediate a cerebro, nō ualde tenax crassa & uiscosa, nō ibidem paulatim congeſta neque fluat ad partē extrinsecam auris, aut ad locum emunctorium illi proximum, repercussu autem possunt esse multa, ut patet ex iam dictis. Sicut in materia calida oleum rosaceum cum quarta parte aceti, aut oleum rosaceum cum tantūdem aceti, a quo acetum per decoctionem sit resolutū. Et multa ex supra scriptis in sedatione doloris. Sed in causa frig. oleum amygdalarum amararū, aut de spica, aut chamemellinū, & similia nō attractiua, sed aliquantū stiptica, primo conuassata cum tantūdem aceti, deinde bullita usque ad aceti consumptionem. Et hæc applicantur per totum secundum aut tertium diem. Et post hoc tempus permiscenda sunt iuxta quartam intentionem repercussu cum resolutiuis & mollificantibus. Vnde in causa calida supra scriptis addatur mucillago sem. citoniorum, aut sem. lini, aut foenugræci, aut oleum amygdalarum dulcium. Et materia non existente multa caliditatis adeps anatis aut gallinæ. Et ex ualde bonis est mucillago sem. malua uisci, medulla cruris uituli ueteris, & dicta caliditatis. Et quanto magis proceditur uersus statum, multiplicetur hæc mollificantia & resolutiua, ita ut transacta sexta uel septima ponantur sola resolutiua & mollificantia, de quibus dictū est, donec materia resoluitur aut maturetur iuxta quintam intentionem. Et in toto cū processu attendatur summo opere sedationi doloris, iuxta doctrinam superius datam, eligendo, scilicet ex medicinis supra scriptis, quæ magis uideatur conuenire, habendo respectum ad qualitatem materiæ & tempus ægritudinis & ad intentionem quam queris. Et nota quod auri imponenda non debent esse omnino humida etiam si imponatur gratia sedationis doloris, aut maturationis, quia complexio auris est siccissima cuius conseruationi cum siccis semper pro parte intendendum est. Et propterea

Gal. 5. de ingen. san. reprobatur medicum ponentem in aure nimis maturatiua, quib. communiter utimur in maturatione reliquorum apostematum. Et in maturando apostemate ualde calido, diachilon minus est ualde proprium, & proprie cum oleo de alcanna, diachilon autem magnum utrumque magis confortat in maturando apostemate frigido. Ioan. Mesue, Emplastrum conferens ad maturandum & resoluendum apostema auris cal. non multæ caliditatis. R. farinæ hordei, decoque eā cum rob. & oleo chamemellino. Aliud. R. farinæ fabarū, fol. uiol. florum chamemillæ, farinæ hordei, althææ, meliloti, decoque cum aqua & oleo chamemillæ, & rob. & suppone. Aui cen. yfopi ceratur, cuius inuamentum est sublime, ad apostema auris maturans & sedans dolorē. R. adipis gallinæ, butyri ouini seu uaccini, loti, ceræ citrinæ adipis caprini, mellis, olei de lilio, yfopi humidi, ana. partes equales, fiat ex istis ceraturum & tepidum in aure mittatur, & hoc ualet in materia frigida, scilicet non uehementer frigiditatis etiam suppositū & linitum in circūitu, & est expertum. Aliud eiusdem, coep. album elixum & cum butyro contritum & superpositum est proprium in causa, scilicet frigida. Cōfectio Rafis emplastri satis boni ad dolorem aurium apostemosum apostemate mixto. R. bdellii, adipis caprini, ana. 3. 3. farinæ, foenugræci, farinæ sem. lini, radicis althææ, radicis lilii, an. 3. 5. chamemillæ, meliloti, ana. 3. 1. croci. 3. 1. uittellum unius oui cōficiatur sic: chamemilla, melilotum, radix althææ, radix lilii decoquantur in aqua bene usque dum decocta sint, bdellium uero dissoluatur in aqua decoctionis herbarum, & ex omnibus his fiat emplastrum addendo rob. olei sesamini ana. 3. 2. butyri quod sufficit. Et apud necessitatem addatur opii. 3. 2. & est mirabile. Et quādoque ponitur pro opio papaueris albi. 3. 6. Multa etiā dicta sunt supra, in sedatione doloris, quæ ad hunc locum etiā accommodari possunt. Et in mento quod butyrum non habet aliquod sibi compar in maturando apostema aurium, mollificando, resoluendo, & sedando dolorem, & proprie in corporibus teneris, maturato autem apostemate, intentio est ut rumpatur, & deinde curetur cura ulcerum, de quorum curatione agitur in cap. sequenti. Si uero apostema nō fuerit in loco ualde profundo, & apte possit fieri, cum sagittilla incidatur. Vbi uero esset profundum, aut æger noller incidi, rumpatur cum medicinis, & ex leniter rumpentibus est coep. album coctum permixtum cum butyro & fermento, & si prædictis addatur allium coctum est efficacius, aut radix ireos decocta, & coep. narcisci, id est lilij habentis florem albū in giro, & in medio croceum, aut purpureum cum radice rotundæ sicut bulbus, & semen nigrum & oblongū coctū cum aqua & mixtum cum melle & oleo liliorum alborum & butyro, & est efficax ualde. His autem si addatur parum fimi colubini efficitur præstantius, &c. Sexta intentio est corrigere accidentia tam præsentia sicut inflammationem, uigilium, syncopim & similia, quā futurā sicut surditatem, &c. quorum curatio ex propriis cap. positis, & ponendis est perquirenda. Septima autem, scilicet debitum regimen est, ut aer inspiratus declinet ad cal. frig. aut temperamentum secundum exigentiā materiæ facientis apostema & febris magnitudinem. Cauendum tamen est ne auris qualicumque apostemate labores, lædatur ab aere circūdante frigido, est enim frigidum inimicum omnibus neruosis, & diæta sit tenuis & declinans ad frigidū in causa cal. & proprie apostemate. Caveat a uiuo & carnibus nisi in declinatione, comedat pisanam, hordaceam, panem lotum, & olera frigida. Sed in causa frigida non apostemosa, bibat aliquando parum uini ueteris, & diæta declinet ad cal. & sic. Et si esset apostema frigidum aut non bibat uinū, aut sit ualde permixtum, & totum regimen declinet ad cal. aut sit temperatum. Sit somnus communiter septem horarum & non super aure, scilicet dolente, nisi forte cum esset tempus eruptionis apostematis, aut esset ruptum quiescat, & frictiones uicem suppleat exercitii, procuret omnes euacuationes naturales, & sit sperans & gaudens, fugiat accidentia animi molesta & excelsiua. Si autem dolor cum apostemate aut sine esset in parte extrinseca auris, aut prope aurē, nō est necessaria tanta sollicitudo in euacuatione, diuersione, nec ibi competit repercussio, imo procedendum est cum mollificantibus & resolutiuis, & reliquo regimine de quo supra.

Si autem dolor fuerit criticus, tres requiruntur intentiones.

nes. Prima, est crifim adiuuare. Secunda, accideſtia corrigere. Tertia, eſt debitum regimen ordinare. Prima autem intentio quinq; modis cõpletur. Primus modus eſt debilitare inimicũ uirtutis, ſcilicet materiam, qui modus perficitur digerendo & euacuando, & hæc debent fieri ante crifim. Secundus modus eſt confortando uirtutem & membra principalia multiplicando ſanguinem & ſpiritum, qui eſt expeditus per crifim. Et hoc debet fieri ante crifim, in crifi, & poſt crifim exhibẽdo ea quę ſunt facilis digeſtionis & conuerſionis, boni chimi, paucarum ſuperfluitatum cauendum tamen eſt tempore crifis cum hæc exhibentur, ne natura à crifi impediatur, & propterea eſt tutius huiusmodi ante crifim exhibere. Tertius modus eſt præparando uiam ſicut mundificando aurem à cerumine, & ſuperfluitatibus in ipſa exiſtentibus ſicut mundificamus inteſtina à ſecibus. Et hæc faciẽda ſunt ante crifim & etiam in crifi ſi expedit. Quartus modus eſt ſtimulãdo uirtutem expulſiuam, ſicut in crifi per inteſtina, ſupponimus ergo ſuppoſitorium aut clyſtere aliquod ſtimulã expulſiuam. Sic & in propoſito ponemus digitem in aure ſcalpẽdo aliquantulum, aut aliquod ſimile faciẽdo. Et hoc fieri debet ante crifim ſi tardauerit, & in crifi ſi poſtquam incepit ſit pigra & lenta. Quintus modus perficitur attrahendo materiam, ſicut in crifi per inteſtina fricamus hipochõdria, & illa, & quãdoq; ſupponimus clyſtere attractiuum materię cuius crifim ſperamus. Sic in propoſito, ſcilicet fricamus quandoq; aurẽ & emplaſtra ſuperponimus attrahentia, & etiam uentofa ſi expedit. Sed cauẽda ſunt duo. Primum ne dolor nimis excreſcat. Secundum ne materia extrahatur ſupra illud quod neceſſarium eſt, & operatio membri deſtruatur. Et propterea hæc attractiua ut plurimum ſunt leuia & dolore mitigantia ſicut euaporatoria facta cũ ſpogijs & filtris, & emplaſtra potius dilatantia poros, quã forſiter attrahentia niſi forte materia eſſet uenenoſa aut furioſa. Et ſi timeremus crifim impedi in his caſib; deberemus forſiter attrahere etiam cum uentofis magis eligentes uitam hominis cum ſurſitate, quã mortẽ. Si tamen propter huiusmodi attrahentia dolor nimis excreſceret, ut ad ſyncopim deueniret, & huiusmodi accideſtia extrema hæc dimittendo procedamus cum ſupraſcriptis leuibus dilatantibus, & dolore lenientibus potius eligentes ut eger ui egritudinis moriatur, quã quod ipſum interiſſe. Emplaſtra autem huiusmodi & fomenta tã leuia quã fortia, ex ſupraſcriptis eligantur. Fermentum enim, galbanũ ammoniacum, ariſtolochia, radices lilij, & ſimilia ſunt de forſiter attrahentibus. Secunda intentio, ſcilicet accidentium correctio eſt, ut dolor modum excedens leniatur, non cum frigidis reperiſſiuis aut ſtupefacientibus, ſed cum molliſſcantibus, de quibus ſupra. Reliqua accideſtia curentur ſecũdum quod oportet, crifim non impediendo. Regimen autẽ ſextum non naturalium iuxta tertiam intentionem eſt, ut aliter ordinentur ne crifim impediãt, imo adiuuent, &c. Sit aer leuiter declinans ad cal. aut ad frigidum ſecũdũ exigentiam cauſe doloris. Viter excellentiam in qualitatibus primis. Et ſit boni odoris mediocriter illuminatus. Cauet tempore crifis à cibo & potu, niſi quantum ſit expediens pro cuſtodia uirtutis. Et propterea ſi cibus eſt neceſſarius ſit paucus, boni chimi, paucarum ſuperfluitatum, facilis conuerſionis. Cauet à ſomno. Niſi quantum eſt expediens pro cuſtodia uirtutis in hac crifi & ceteris, niſi in ea, quę ſit per ſudorem. Euacuationes naturales ſpontaneas natura inuitante ne ipſam à pugna diuerteret. Quieſcat animo & corpore ne naturam à crifi diuertat. Si ergo ſit crifis euacuationis completa, bene eſt. Si uero incompleta ſuppleatur per illud quod aptius uidebitur. Si autem ſit crifis permutationis intendatur poſtea reſolutioni & maturatiõ, non autem reperiſſioni ſecũdum quod dictũ fuit, & maturato apoſtemate rumpatur iuxta doctrinam ſuperiorem.

De ulcere aurium & ſanie. Cap. 36.

Vlcus eſt ſolutio continui cum ſanie. Et dicitur cum ſanie ad differentiam vulneris, quod eſt ſolutio continui ſine ſanie, &c. Ex quo inferũ quod ulcus eſt morbus in unitate, ſicut & quolibet ſolutio continui, & per conſequens eſt morbus communis tam ſimplici, quã compoſitorum, ſicut & unitas natura cõmunis eſt utroq;

complexio autẽ appropriatur ſimplicibus ſicut compoſitiõ organicis. Sanies autẽ deſcriptiua eſt ſuperfluitas quartę digeſtionis ex toto genere præter naturam. Et eſt duplex, ſcilicet laudabilis & illaudabilis. Prima habet quinq; bonas conditiones. Prima eſt enim alba, quia debet aſſimilari mēbris radicalibus ſive ſpermaticis, quę concurrunt ad ipſius generationem. In ipſis enim principaliter fundatur calor innatus qui eſt inſtrumentum ipſorum ad ipſius generationem. Secũda lenis, id eſt uniformis in partibus ſuis, hæc enim arguit bonam proportionem uirtutis naturalis digerentis digeſtionem quę ſit in nocitiũ ad materiam digerendam, & propterea uniformiter patitur à calore digerente & non diuerſificatur in partem obedientem, & non obedientẽ, neq; in modo ſubſtantię, neq; in colore, neq; in reliquis.

Tertio æqualis, id eſt mediocris ſubſtantię non multũ ſubtilis aut craſſę ſeruata proportione ad membrum in quo ſit & ad humorem ex quo ſit, non enim eſt dubium quod in neruo oſſe & cartilagine, & uniuerſaliter in membro quanto eſt denſior ſubſtantię generatur ſanies ſubtilior, & ecõtra in carne & membris mollibus generatur ſanies craſſior, & ex humore craſſiori craſſior, & ex ſubtili ſubtilior. Quarto non debet eſſe multi foetoris, ſed tamen aliquãlter, per hoc enim ſignificatur dominium coloris innati licet non abſoluatur ab extraneo, id eſt, putredinali. Iuxta ſententiam Auic. tertia, quarti cap. de iudicijs ſaniei. Pro cuius declaratione primo nota, quod ad digeſtionem laudabilem quę ſit in iuuatuo ſolum concurrat calor, ut naturalis, ſicut in digeſtionem qua chilus ex cibo generatur, ſanguis ex chilo, humiditates ſecundę ex ſanguine membrum aut pars membri ex humiditatibus ſecundis. Et ecõtrario in putrefactione concurrat calor ſolum, ut extraneus. Sed in digeſtionem in nocitiũ qua exempli gratia generatur ſanies, concurrat calor partim ut naturalis, partim ut extraneus. In generatione ſaniei laudabilis concurrat magis ut naturalis. Sed in generatione ſaniei male foetentis concurrat magis ut præternaturalis. Ex quo ſequitur, quod inter aliqua media inter has concurrat æqualiter, ut naturalis & præternaturalis. Secundo nota quod calor iſte de quo loquimur, eſt ille qui ſuſcipitur in materia ſanianda. Idem enim calor numero faciens ſaniem ex ſanguine, partim erit naturalis, partim extraneus & putredinalis, ut effectũ comprobatur. Tertio nota, quod non eſt inconueniens quod calor membri in quo ſit ſanies ſit omnino naturalis: Calor enim qui à membro ſuſcipitur in materia ſanianda eſt partim naturalis, partim extraneus, ſicut cum generatur ſanies ex ſanguine in concauitate uenarum in homine ſano non exercitato iuxta ſententiam Auic. ſumma de urinis. Sanus præterea non exercitatus mingit urinam ſicut ſaniem, & eſt ei euacuatio laudabilis, & propter hoc remouetur laſtitudo, quę ei ex diſmiſſione exercitiũ acciderat. Nota quarto non eſſe inconueniens eundem calorem numero in humido putrente eſſe præternaturalem omnino humido quod putrefit, & naturalem omnino uermi per putredinem ex illo humido generando, licet materia adæquata illius uermis non putrefiat. Quinto ſanies debet eſſe mediocris quantitatis non diminutę neq; ſuperfluz in relatione ad membrũ in quo fiet & ad quantitatem ulceris: ſanies enim poteſt eſſe laudabilis in colore, ſubſtantia & in ſingula cõditionum ſupraſcriptarũ & in pluribus ipſarũ, bonum enim habet rationem finiti, malum uero infiniti, ſecundo ethicorum.

Cauſa ſaniei materialis eſt humor primus, & proprie ſanguis & humiditas ſecunda. Cauſa efficiens inſtrumentalis eſt calor innatus. Efficiens principalis eſt uis animę digeſtiua. Finis ut paretur expulſioni materia. Et ſanies licet plurimũ reperiatur in ulceribus & exituris, reperiatur quandoq; tamẽ in aure & alijs mēbris abſq; ulcere & exitura, ſicut uidemus in quibuſdam multiplicari ſaniem in aure abſq; ulcere, & exitura, & per longum tempus, & hæc eſt ſanies generata in cõcavitate uenarum cerebri quę expellitur ad aures per oriſcia uenarũ ad ipſas terminata, de qua Auic. 4. primi. cap. tertio. Vlcera auris duplicem recipiunt diſtinctionem, ſcilicet in particula patiente, & in ſe, à particula quidem patiẽte, nã quædam ſunt intrinſeca auri, quædam extrinſeca. Et quę intrinſeca, quædam ſunt in cartilagine, quædam in miringa & neruo audituo, quædam in oſſe petroſo. Et hæc aliquando ſunt

sunt superficialia, aliquando profunda, quæ aliquando propter sui profunditatem possunt dici cavernæ & abscessiones. In se autem distinguuntur, quia quædam sunt munda, quædam sordida, quædam virulenta, quædam putrida, quædam corro sua, quædam fistulæ, quædam cum apostemate, mala complexionem, aut dolore, quædam sine, quædam antiqua, quædam nova. Causæ ulcerum sunt apostemata aut bothor, cum rumpuntur necnon humores acuti. Primo superficialiter imprimen tes, deinde paulatim se profundantes. Et similiter cerumen aurium, & vermes, & res extrinsecæ cadentes in aures, aut ibidem natæ paulatim corrodescentes aut putrefaciennes. Et similiter casus, offensio aut percussio uulnerantes aurem, ad uulnus enim sequitur ulcus.

Signa ulcera auris cognoscuntur ex sanie inde egrediente. Verum non est sufficiens signum, cum iuxta superius dicta possit sanies à cerebro ad aërem sanam derivari, siue in cerebro sano genita sit, siue sit ex apostemate in cerebro rupto profluens. Frequentius tamen deciditur ab ulcere auris siue uileus illud sit factum ex apostemate auris, siue nullo præcedente apostemate. Inter quæ est differentia. Cum enim fluit sanies ex apostemate rupto in cerebro aut in aure, primo sanies in magna quantitate effunditur, deinde paulatim donec còsumpta sit & præcesserint signa apostematis auris aut cerebri, de quibus supra. Si autem sanies genita sit in cerebro sano adest incolumitas cerebri, & auris, & illa sanies fluit in primis pluribus diebus in magna quantitate, postea paulatim donec còsumpta sit, & postea aliquando iterum reaggregatur, & iterum fluit, imò ipsius uolenta retentio facit uertiginem aut alias cerebri aggritudines. Si uero sanies sit ex ulcere facto in aure ex uulnere aut ex humore, aut ex aliis huiusmodi paulatim corrodentibus, aut putrefaciennibus, illa sanies paulatim incipit fluere, deinde sicut ulcus excrefcit, sanies auge tur quousque ulcus sit proximum consolidationi, tunc enim incipit minui. Sed uera signa ulceris auris, sunt dolor, & odor & punctio cum sanie, & proprie apud tactum & immisionem alicuius acuti, & aliquando sanguis simul cum sanie egreditur. Causa uero ulcerum ex ipsarum præcessione declarantur. Si ulcera sunt exterius, sensui subiacent. Si uero interius & sint in nervo, adest aut præcessit dolor intensius. Et si sint in ossis cognoscitur ex sanie, quæ est subtilis, tendens in citrinum, & ex morbi antiquitate. Et si stylus potest immitti, certificari ueretur propter ossis duritiem. Sed illud non est tutum propter dolorem intensissimum, nisi nervo corrupto aut eius còplexione. Et quæ profunda sunt sicut cavernæ, ex multitudine eius quod egreditur, cognoscuntur. Ulcera munda cognoscuntur ex sanie laudabili. Sordida ex crassitie cum multitudine eius quod egreditur. Virulenta ex subtilitate saniei putrida ex sanie foetente. Corrosiua quia aliquando post saniem egreditur sanguis, fistulæ ex diuturnitate ulceris & sanie uirulenta, & carne callosa & magis solito indurata, &c.

Prognosticum. Primum ulcera munda superficialia facite curantur, profunda autem peruenientia ad neruum consolidata relinquunt nocumētum auditur. Secundum. Ulcera pro uenientia ad os raro uel nunquā curantur. Et similiter fistulæ profundæ. Tertium. Ulcera profunda corrosiua aut putrida frequenter sunt perniciofa, cum frequenter se profundunt usque ad cerebrum.

Cum pus ab aure egreditur, hydromel tepidum multoties in una die in aure est distillandum. Deinde hoc medicamen optime faciens ad hoc est immittendum. Quod recipit, sarcocollam, aloem, & sang. draconis, thus, cor riam ferris, ziniar, ex eo in aceto dissoluatur, & in aure mit tatur, & lichinium melle illinitum in prædictis intingatur, & sic inde mittatur. patiens itaq; hoc medicamine et hydromel le medietur, donec sanus sit.

Diuiditur hoc cap. In duas partes. In prima ponit curam per mundificantiā. In secunda ibi. Deinde hoc medicamen. Ponit curam per consolidantiā. In prima parte mundificat ulcus auris cum hydromelle, sed debet esse pauca quantita tis, ut. ℞. aquæ. ʒ. 4. & mellis. ʒ. 1. bulliant simul despumando usque ad consumptionem tertiæ partis uel medietatis donec habeat aliquantulum tenacitatem & tepidum instilletur multo

ties, scilicet saltem quater in die naturali. In secunda parte po nit curam per consolidantiā describens medicamen conuenientissimum ad hoc. ℞. sarcocollæ cal. in secundo & sicca in primo, habens uirtutem consolidandi & corrodingi carnem mortuam, & specialem proprietatem habet ad ulcera auris, ita quod si lichinium illinitum melle cum sarcocolla pulueri zata immitatur auri saniosæ, sanat usque ad aliquod dies, se cum do cas. simplic. nono. secundo ponitur aloes calidum & sic cum in fine secundi ualens in ulceribus difficilis consolida tionis. tertio est sanguis drac. frigi. & sic. in tertio apud Serap. sed apud Auic. in secundo multum ualens ad glutinandū ulcera & uulnera, & contemperat caliditatem aliorum: quarto ponit thus siue olibanum à monte Olibano dictum, calidū in secundo, sic cum in primo, consolidans & habens proprietatem ad aurem & sedans dolorē auris. Quinta ponitur squama ferri frig. & sic. in tertio, & sicior omnibus squamis. Vltimo ponitur ziniar, idest, uiride æris, cal. & sic. in quarto mū dans uulnera sordida prohibens ambulantiā. Et potes sic do sare. ℞. sarcocollæ, aloes, sanguinis draconis, thus, ana. ʒ. s. scorix ferri. ʒ. 1. ziniar, gran. 6. dissoluatur cum aceto non multum acuto, & est acetum frigidum & sic cum prohibitiū putrefactionis, & ambulantis ulcerum, & sit aggregatum mediocris, scilicet spissitudinis, & ex eo duæ, aut tres guttæ tepidæ in aurem distillentur, postea lichinium illitum in mel le in prædicto puluere intingatur, & in foramine immittatur: hoc enim ad curam ulcerum sufficienti hydromelle mun dificando, & hoc mundificando & consolidando, &c.

Pro cura ulcerum auris, & etiam reliquorū ulcerum est in primis sciendum, quod medicina quibus frequenter indi gemus in ulceribus, aliquando sunt corrosiua, aliquando abster sine, aliquando carnis generatiua, aliquando consolidatiua, aliquando cicatrizatiua. Medicina enim corrosiua est, cuius proprietas est ut consequatur ex eius resolutione & ulceratione, quod de substantia membri minuitur, sicut flos eris, & hæc cal. & sic. in quarto. Sed medicina absterfina est cuius proprietas est, ut moueat humiditates uiscosas, & congelatas ab orificiis uenarum pororum in superficie membri, ita ut elonget eas ab eo, & hæc est cal. & sic. circa secundum gradum, cum quadam substantia subtili, sicut mel. Medicina generatiua carnis est illa, cuius proprietas est ut conuertat sanguinem superuenientem uulneri in carnem, propterea quod æquat complexionem eius & coagulat, & hæc est communiter sic. in primo cum temperamento actiuarum, aut salte proportionem ipsarum ad membrum pauca stipticitatis, pauca ab sterfionis, sicut thus. Consolidatiua uero siue incarnatiua est quæ exiccat & inspissat humiditatem stantem inter duas superficies uulneris propinquas, ita ut conuertatur ad conglutina tionem, & uiscositatem, & adhæreat una earum alteri sicut sanguis draconis, & aloes, & hæc est sicca communiter in secundo cum proportionem actiuarum ad membrum cum stipti citate & uiscositate absque absterfione. Cicatrizatiua uero siue sigillatiua est medicina quæ exiccat superficiem uulneris ita ut fiat cortex, & ista communiter est sic. in tertio cum stipticitate absque absterfione & absque multa mordicatione, & est cum temperamento actiuarum sicut cortex pini, licet quādoq; caliditas superflua exiccando per accidens faciat hanc operationem sicut alumen & nitriolum.

Notandum secundo, quod quia auris est membrum ualde sic cum naturaliter in ulceribus eius competit medicina sicior, quàm in alio membro nostri corporis aliorum paritate supposita, &c. Quāto enim membrum ulceratum aut lapsum ad humidū est magis sic cum naturaliter competit medicina intensius sicca quā in mēbro naturaliter humido lapsō equali ter ad humidū, iuxta Auic. quarta, quarti tractatu primo cap. de medicinis facientibus nasci carnem. cuius ratio est, quia cū nihil agat ultra gradū proprium, & à proportionem equalitatis aut minoris inæqualitatis non proueniat actio, non poterit medicina minus sicca quàm sit membrum, cui applicat ipsum exiccare. Cum hoc tamen tenendum est, quod in corpore & mēbro humido naturaliter, sed æqualiter præternaturaliter lapsō ad humidum, corpore naturaliter sicco, potentius sicca competunt quàm in corpore sicco naturaliter, præternaturaliter lapsō ad humidum. Cuius ratio est, quia ubi est maior resistentia maior requiritur potentia, &c. Sed in

in corpore humido lapsio præternaturaliter ad humidum maior est resistentia, cum exicantibus resistat humiditas naturalis & præternaturalis. In corpore autem sicco resistat tantum humiditas naturalis. Est autem inter hæc differentiæ, quia potentia rei insequitur multitudinem formæ. Intentio autem habet attendi penes distantiam à non gradu. Nunc autem reducendo ad actum practicum possumus in corpore sicco appropinquare intensius sicca sicut aristolochiam, sed in pauca quantitate, & in corpore humido possumus appropinquare remissius sicca, sicut thus & in multa quantitate. Contra tamen hanc determinationem sunt difficiles instatiæ quas nunc theoricis dimitto. His itaq; præmissis. primo ponam curam saniei auris venientis à cerebro ad aurem absq; ulcere auris, secundum ponam curam ulcerum auris. Pro curatione primæ dispositionis quatuor exigantur intentiones. Prima est euacuatio, & proprie à cerebro perficienda cum phlebotomia & aliis generibus euacuationum secundum quam dictum fuit in capitulo precedenti. Secunda est diuersio & proprie à cerebro cum caput purgibus & gargarismatibus multoties iteratis, de quibus in multis capit. dictum est. Tertia est cerebri confortatio ne talem materiam multiplicet, quapropter confortetur eius digestiua, & expulsiua cum interius sumptis odoratis & capiti applicitis. Ut in causa frig. diamuscum, & diambra, & similia. Et in calida saccharum ros. cum paucis speciebus, diamusci, aut pliris arcticon. Odorata autem in causa frigida sunt sicut nigella correpta aut pulvis ireos. Quibus potest addi parum musci, ambre, gariophili, aut galliæ muscate, & similia. Et in causa calida odorentur rosæ, & poma artificialia, quorum præcesit rememoratio in cap. de catarrho. Applicata autem capiti sunt sicut lotiones ex lixiuio factæ ex cinere stipitem caulium, in quo bullierit bachara sceua, & stoeas arabicum, & proprie in causa frigida. Sed in causa calida, aut non lanetur caput, aut cum lixiuio paucissimæ acuitatis in quo bullierint rosæ & bachara, & applicentur capiti sacculi ex milio torrefacto, sale, corticibus citri, mato rana, gariophili, uernice, gallia muscata, &c. Et in calida, ex rosis & sandaraca, & his non conferentibus fiat cauterium attuale in commissura coronali, iuxta doctrinam in multis capit. positam. Quarta intentio est aures mundificatio & confortatio, non autem stipitatio, imo potius prohibitio ipsius ab ulceratione lanando ipsam cum uino decoctionis mellis & rosarum, & si timeretur ulceratio instillentur duæ aut tres guttæ scif, memithæ, cum pauco aceti, & similibus. Et si timeretur obduratio, mundificetur cum tentis, & ex cortice, & aliquando oleum amygdalarum amararum instilletur. Cura ulcerum auris si munda fuerit & in corpore mundo, præter correctionem accidentium & regimen uitæ, duas tamen exigit intentiones curatiuas. Prima est ulceris mundificatio, secunda consolidatio, quæ qualiter debeant perfici, apparet in textu, & ex dicendis clarius apparebit. Si uero ulcus auris fuerit cum mala complexionem, apostemate, aut dolore uehementi, principalis est intendendum curationi illorum non neglecta cura ulceris, qualiter autem curentur, patet ex dictis in precedenti capitulo. Cura uero ulcerum auris malignorum, scilicet putridorum, corrosiuorum, fistularum cum corruptione ossis octo exigit intentiones curatiuas. Prima euacuat. secunda diuertit. tertia fluxum intercipit. quarta substantiam corruptam, scilicet putridam corrosam, aut induratum, aut aliter infectam remouet, quinta mundificat, sexta substantiam deperditam generat tandem cicatrizes, septima accidentia corrigit, octaua ordinat debitum regimen. Euacuatio autem iuxta primam intentionem complectitur phlebotomia si oportuerit, & aliis euacuationibus integratis ex minoratione, digestionem, eradicationem, etiã iteratis si oportuerit iuxta doctrinam precedentis capituli. Sed attende quod digestiua debent rectificare membra, & proprie cerebrum ipsius malas dispositiones corrigendo & ipsum confortando, ut fiat minera humorum laudabilium, debent etiam corrigere humores præparando ipsos euacuationem, aut ad benignum reduciendo, ipsorum namque malitia in quali aut in quanto multum impedit curationem ulcerum.

Secunda intentio, scilicet, diuersio perficitur cum his quæ dicta sunt in precedenti capitulo, ex diuertitibus ad propinqua, imo forte pro parte eradicationis materiam malignam

aurium, est phlebotomia uenarum quæ sunt post aures.

Tertia intentio, scilicet, fluxus interceptio perficitur appropinquando repercussiuæ & confortantia circa aurem, oleum ros. rude, id est, factum ex oleo omphacino, & rosis syluestribus, albis, cui si opus est addatur acceum, & bolum armenum, aut terra sigillata, aut alia huiusmodi. Quarta intentio, scilicet, substantiæ corruptæ remotio perficitur instillando in aurem unguentum ægyptiacum dissolutum cum pauco aceti, aut uini, est enim mirabile. Et fortius isto ubi esset multum de substantia corrupta, & cum quadam sensus obtusione. It. uiridis æris, aluminis, mellis, an. dissoluantur cum pauco aceti. Aliud. It. floris æris, tubel æris, id est, quædam æris, an. 3. 2. succi porri, mellis, an. 3. 1. urine puræ, quantum sufficit, terantur usque dum fiant sicut mel, lichenium melle inductum, deinde uitriolo subtilissimo puluerizato linitum, & in aure impositum optime ualet ad remouendum carnem putridam & callosam, & ad squamandum os si ad ipsum peruenire possit. Non est tamen credendum quod ad ipsum perueniat propter tortuositatem foraminis. Et uiride æs similiter applicitum esset conueniens, & fortius remouens carnes corruptas & callosas, quas attingit. Sed si caro corrupta esset in profundo, & aut os squamato indigeret, esset melius huiusmodi in forma liquida instillando applicare, sicut dissoluendo alumen aut uitriolum, aut uiride æris in aceto, & ex eo tepido duas aut tres guttas instillare, aut aliquam ex medicinis superscriptis. Sed esto memor non frequentare ista acuta, sufficit enim istorum instillatio bis in die, & cum tu comprehendis escaram uerisimiliter factam ex horum impositione eo quod neque uirtus, neque sanies egreditur secundum quod consuevit dimitte huiusmodi acuta, & si dolor est, infunde lac tepidum. Et si non est dolor, hydromel quousque escara remoueat, qua existente, quod comprehendens in eo quod egreditur aut quia forte mundificando cum cortice inuenies ipsam, aut partem eius in extremitate cotti. postea procede ad quintam intentionem, scilicet, ad mundificationem, aut si forte cum lacte aut hydromelle iam dicto sit facta mundificatio, procede ad sextam, scilicet, partis deperditæ restitutionem, secundo attende in horum acutorum approximationem, ut incipias à leuioribus sicut ab alumine dissoluto cum aceto aut oxymelle, deinde hoc non sufficiente, ad ministres unguentum ægyptiacum, deinde uenias ad alia fortiora gradatim ascendendo. Auic. tñ ponit curam quorundam medicorum qui obturant foramen auris optime, ut sanies non possit exire, & faciunt eum dormire supra contrariam partem ut sanies retenta descendat ad carnem glandosam, quæ est in profundo auris, ut ibidem retenta tumefiat locus ille quem tumefactum scindunt, deinde curant mundificando cum his quæ necessaria sunt. Non consulo tñ ut facias hoc, quia forte sanies retenta posset putrefacere neruum audituum & duram matrem. Sed si natura materiæ ad illas, scilicet partes, glandosas quæ sunt sub aure deriuauerit, & ille locus intumuerit materia suppurata, & etiã ante perfectam maturationem incide, & cura deinceps illud ulcus finem quod oportet, quia facilius, postea ulcus auris consolidabitur. Postea est necessaria tibi quinta intentio, scilicet, mundificatio, uel propter remotionem escaræ: non enim in his casibus est remouenda escara cum putrefactiuis, uel si remota escara non appareat locus mundificatus propter multitudinem eius quod egreditur aut ipsius malitiam, hæc perficienda est cum hydromelle, aut uino bullito cum melle, aut oxymelle simplici, aut scyllitico si sanies fuerit crassior & uiscosior, quæ possunt immitti per stringam, aut cum catathir si uolumus ut cum fortitudine impellatur ad profundum, sicut enim melius lauat. Postea procedatur ad sextam intentionem, scilicet, partis deperditæ restitutionem, & tandem ad cicatrizationem quæ perficienda est cum his quæ sunt mediocri exiccationis sine multa mordicatione, sicut olibanum aut cortex eius dissolutus cum uino, aut sarcocolla & olibanum solutum in uino & melle panco, & est expertum. Similiter myrrha & aloë dissoluta in uino, & sandaraca in hoc est mirabilis, & proprie trita cum uino & melle, & instillata, & immissa cum lichenio. Ex consolidantibus autem siue cicatrizantibus est licium cum sief memithæ. Similiter sang. drach. sief memithæ, sarcocollæ, myrrhæ, aloë, spumæ maris, corticis olibani, aluminis ulsi, ana. 3. 1. terantur

Io. Arculani L

terantur contritione ultima cum melle & uino, usque dum fiat in termino mellis fluentis & distilla & utere cum lichenio. mundificat, cicatrizat, & substantiam deperditam restaurat. Et ad hanc intentionem est medicamen Rasis positum in litera, & superius declaratum. Ioan. Serapionis modus confectionis scoriz ferri, cuius iuuamentum est sublime ad excicandum & consolidandum. Accipe scoriam ferri, laua eam cum aceto forti, postquam triueris eam uehementer deinde siccetur super latere calido, postea iterum tere, & laua cum aceto & exicca, & fiat hoc septies donec fiat puluis subtilis, decoquatur postea cum aceto decoctione uehementi usque dum habet mellis spissitudinem, & distilletur ex eo in aure, aut intromittatur cum lichenio. Et si uolueris hoc medicamen esse magis absterfuum adde modicum mellis. Septima autem intentio, scilicet, accidentium correctio est, ut corrigatur dolor & furditas, & alia fm quod dictum fuit, & dicitur in capit. sequentibus. Octaua intentio, scilicet regimen uitę est ut aer declinet ad sic. cum temperamēto actiuarum. Et cibus & potus similiter minuantur, & proprie dum timeamus fluxum humorum ad locum, & dum intendimus minorationem & mundificationem ulceris iuxta tertiam, & quartā & quintam intentionem. Cum autem uolumus iuxta sextam intentionem partem deperditam restaurare cibo abundantiori utatur, & semper sit boni chimi, facili digestionis, pauca superfluitatum, declinans ad siccum non uaporatiuus, dormiat super aure contraria immediate cum imposita sunt medicamina, deinde transactis duabus aut tribus horis dormiat super aure agra, procuret omnes euacuationes naturales & proprie mudificationes capitis per os & nares quiescat corpore & animo. Si uero ulcus non sit putridum aut corrosiuium, neque fistula, neque cum osse aut alia substantia corrupta, sed sit uirulentum aut sordidum solum exiguntur septem ex intentionibus suprascriptis, non enim requiritur quarta quę est substantię corruptę remotio. Illę autem intentiones persciuntur super hoc, attendendo, scilicet, quod uirulentum indiget multa exiccatione, pauca absterfione. Econtrario sordidum multa absterfione, & non tanta exiccatione sicut oxymelle scyllitico, & similibus.

De sonitu & tinnitu. Cap. 37.

Circa rubricam est sciendum quod reperiuntur isti termini apud autores sonitus, tonitus, tinnitus, & sibilus, qui aliquando significant sonos. Quando corruptio nem auditus. Sed secundo modo hic accipitur sonitus siue tinnitus de sonitu enim primo modo sumpto qui diffinitue est qualitas, de tertia specie qualitatıs per se primo perceptilis ab auditu causata in aere, scilicet, moto a duobus corporibus duris & planis, aut ab aliquo eorum uicem gerente, ordinata ad secundum aliquid, non est hic sermo. Sonitus autē est terminus communis ad alios tres importans quancunq; huiusmodi dispositionem corruptam auditus. Tonitus significat corruptionem auditus qua apprehenditur sonus grauis & fortis. Per sibilum autem corrupte apprehenditur sonus acutus. Sed per tinnitum sonus medius inter hos sicut sonus pluuiarum & foliorum arborum, & huiusmodi. Est autē hęc dispositio dicta uocabulo generali sonitus, descriptiue, auditus corruptio in qua apparet homini audire sonum aliquē ex motu facto in aere exteriori, qui est interior in miringa auditus, sicut enim motus & inundatio in aere exteriori, scilicet, cum speciebus soni representant sonum qui est & apparet exteriori. Sic etiam motus & inundatio in aere interiori representat sonum, qui apparet exteriori propter consuetudinem percipiendi illos sonos qui sunt exteriori & apud Auic. eius comparatio ad auditum est sicut comparatio imaginationum ad uisum. Sicut enim ex uapore aut alia re non per uia coram crystallino apparet homini, quod uideat aliquod obiectum exteriori. Ita ex inundatione aeris interioris propter uapores effusos ad aurem, apparet homini, quod audiat aliquem sonum exteriori qui non est. Ex quo inferitur, quod hęc dispositio dum est præter naturam, est accidens alicuius morbi, licet etiam possit dici morbus cum immediate impediatur operationem sensus communis siue imaginationis. Est autem hęc operatio corrupta duplex. Vna scilicet, non comparata ad nocumentum quę provenit ex bonitate auditus in aure etiam temperata, sicut quando apprehenditur

prehenditur sonitus uaporis subtilis, a quo auris nunquam denudatur quantumcumq; sana, ac si sonus ille esset exteriori: hęc enim est actio corrupta cum apprehendit sonum esse exteriori, qui non est, non autem est corrupte læsa, cum illic nulla sit læsio in aliqua materia auris neq; in spiritibus, neq; per essentiam, neq; per cōitatem. Est autem alia actio corrupta auditus, quę etiam est corrupte læsa, quia est cum nocumento auris de qua est sermo impræsentiarum. Comprehensio autem sonitus minimi existentis in aere, a quo aer quantumcūque quietus non denudatur quę fit ab aure optimi auditus, & non ab aure obtusi auditus non est operatio corrupta neque corrupte læsa. Licet hęc actio in aure debili, acuti auditus sit diminuta per intensiōem, & si senserit uaporē minimū facientē opinari sonum esse exteriori, erit non solum per intensiōem læsa, sed etiam corrupte læsa. loquamur autem hic de actione corrupte læsa, hęc enim curatione indiget, &c.

Causa huius est duplex. Vna sumpta ex parte audituę uirtutis. Altera ex parte obiecti & causarum mouētium. Et per uirtutem audituam intelligo potentiam animę cum instrumentis suis. Auditus ergo aliquando est nimis acutus propter malam dispositionem organi, & reliquorum instrumentorum, ut sentiat quemcumq; minimū sonum ut uaporis existentis in aere, aut minimum sonum existentē in medio exteriori per quē homo turbatur, & a melioribus operationibus impeditur. Et hoc prouenit aut ex dispositione foraminis, sicut quā foramen auris est nimis largum, aut nō debite tortuosum, quapropter inundatio sonora non debite modificatur, aut est miringę auditus cū est nimis tenuis, & aer stās nimis subtilis. Cū enim ad sonum percipiendū sit necessarius motus & aeris inundatio, si causa soni sit exteriori uterque aer interior & exterior mouetur. Si uero causa soni sit interiori, tantum aer intrinsecus mouetur. Requiritur enim ad quemcumq; sonum percipiendum medium intrinsecū motus ipsius aeris mediū intrinseci, qui aer si sit tenuis & subtilis a quocūque minimo uapore mouetur, cuius motus & inundatio perueniens ad neruū audituū, est causa perceptionis motus siue soni. Aut tertio, quia neruus audituus est texturę nimis tenuis & naturali hum. sue conuenienti priuatus, quare factus debilis patitur a qualibet inundatione aeris extrinseci & minima: primum autem, flatitudo foraminis & non debita tortuositas est a generatione, cui non est cura. fm & tertium potest esse a generatione, & etiam ex tēpore sicut frequenter accidit conualescentibus, & his qui nimis abstinent, humido resoluti & aere intrinsecu subtiliato. Quapropter deficit humiditas naturalis sensum aliquatiter obrundens. Et textura facta ex rariori debito, quapropter facilius patitur, & aer intrinsecus subtiliatus ex omni causa mouetur. Aliquando prouenit ex spiritibus nimis subtilibus, & ex cōplexione in corpore illo nimis ad siccū declinante, quapropter neruus audituus factus debilis patitur a quacunque minima inundatione aeris intrinseci, sed sicut patitur debilis calor & frigus a quacunque minima causa calefaciente & in frigidante, sic aer intrinsecus a quocunque minimo uapore mouetur. Et foramine auris existente lato aut non debite tortuoso omnis minima inundatio aeris extrinseci communicatur aeri intrinsecu, qui aer extrinsecus contiguatur pelliculę continenti aerem intrinsecum contiguum neruo auditu. Et ille aer interior apud Auicennam, est uapor effusus in concauitate illa. Sed ex causis contrariis fit auditus obtusus, ex parte autem obiecti & causarum mouētium. Causę huiusmodi corruptionis auditus sunt uentositas & uapores crassi aut multi, qui propter suam crassitiem aut multitudinem non solum mouerent aerem instantem subtilem, sed etiam crassum. Hęc autem uentositas & uapores quandoq; sunt in aure ex humore, scilicet, ibidem existente in hos uapores & uentositatem resoluti. quandoq; ex apostemate, quod in aure suppuratur multis uaporib. a materia dum suppuratur resolutis mouentibus aerem connaturalem, & consequatur neruum audituū. Quandoque uero hi uapores sunt auri aliunde communicati, aut forte et humores, quę communicatio quandoque est a toto, sicut in febrib. & proprie in principio paroxysmorum uaporibus interioris retentis, & non exhalantibus, etiam sicut in chrisi, & proprie per uomitum a materia agitata, uapores, scilicet,

et, resoluti perueniunt ad aurem. Et sicut in uehementi fame calore conuerso circa humid. & eas in uapores conuertere, & sicut aliquando retentis fluxib. consuetis, uapores, & materia ad cerebrum & aures deriuantur, & sunt causa sonitus auris & surditatis, sicut contra, fluxus uentris aliquando liberat à surditate, iuxta aphorif. 57. quartæ particulæ. Quibus-
cunque aures surdescunt in febribus, his solutio superueniens, aut sanguis de naribus fluens, aut uenter turbatus soluit egri-
tudinem. Quandoque uero hi uapores & etiam humores ad aures delati sunt per communiatem à membro particu-
lari, & maxime à cerebro. Materia enim superflua & uapo-
res in cerebro congesti, aut aliunde ad cerebrum deriuati facile auribus communicantur, & proprie per quintum par
neruorum cerebri, aut per uenas & arterias à cerebro ad au-
res ueniens. Aliquando communicatio fit à stomacho, aliquan-
do à matrice, & sic de cæteris membris, &c. Causæ autē pri-
mitiuæ sunt sicut aer frigidus retinens uapores, aut aliqua me-
dicinæ quarum proprietas est, ut retineantur uapores & uen-
tositates in partibus cerebri. Et sicut uentus aurem ingre-
diens. Similiter cibi & potus uaporosi & proprie ebrietas
& nauseatiua facietas. Et similiter somnus superfluus, & pro-
prie meridiaus aures & caput replendo & maxime post cra-
pulas, & similiter retentio euacuationum consuetarū, & ma-
xime per os & nares, & exercitium forte conuertens humi-
dum in multos uapores, qui ad cerebrum & aures deferun-
tur. Et inter accidentia animi ira potest esse causa huius cor-
ruptionis auditus. Similiter causæ primitiuæ extraneæ, sicut
calus, percussio & offensio adueniens auri & capiti mouedo
spiritus & uapores fortiter & inordinate, licet sint magis
causa uertiginis.

Signa sonitus cognoscitur ex relatu ægri. Et si sit propter
fortitudinem auditus cognoscitur per carentiam omnium
causarum præternaturalium, & ex perfectione operationis
auditivæ. Et quia non læditur à mediocribus sonis, imo non
nisi à fortibus & excellentibus. Si uero sit ex acuitate audi-
tus absque fortitudine, cognoscitur per carentiam uentosa-
tis uaporum crassorum & repletionis, & læditur à medio-
crib. sonis, sed excellentes tolerare non potest. Et si est ex la-
titudine foraminis aut paucitate tortuositatis illud sensui su-
biacet aspiciendo in aurem. Et est à generatione contracta.
Et si est à tenuitate miringæ subtilitate aeris stantis & spiri-
tuum, raritate textura, & humidi superflua exiccatione co-
gnoscitur, quia deterius se habet ex uigiliis, exercitio & ab-
stinencia, & contrariis dispositionib. melius se habet. Et si hæc
causæ fuerint à generatione semper sic se habebunt. Et secun-
dam plurimum eius complexio declinat ad sicum: & si sunt
ex tempore hoc nocumentum sibi euenit post præcessionem
al. cuius dispositionis ægri tudinalis in qua forte nunc est cõ-
ualecens, aut post præcessionem alicuius dispositionis ue-
riformiter subtilitatis & exiccantis. Signa uero causarum
corruptionis auditus, quæ sumuntur ab obiecto & causis im-
primementibus sunt signa multitudinis uaporum, uentositatum
& repletionis, & abundantia causarum acuitatis auditus, de
quibus sermo præcessit. Sed quod sit per essentiam in aure
aut in cerebro cognoscitur, quia sonitus est fere continuus,
per communiatem uero, quia est interpolatus, & excrefcit
cum cremento dispositionum à quibus pendet, & decrefcit
cum earum decremento, & si ex uentositate existente in au-
re sonitus est clarior, estq; auris sine grauitate. Si uero in au-
re sit præsentia humoris, qui continuo in uentositatem resol-
uatur est grauitas in aure & diminutio auditus, & fortasse
sonus non ita est clarus. Si uero sit ex apostemate quod sup-
puratur in aure, ad sunt signa apostematis, & maturationis ei-
us, & sonitus est magis confusus, & si sit cum communiatem
cerebri ad sunt nocumenta cerebri, scilicet, dolor aut graui-
tas & nocumentum pluribus sensibus communicatur secun-
dam plurimum. Vtrum autem sit per communiatem à to-
to, aut à membro particulari, & quod sit membrum commu-
nicans cognoscitur per nocumentum totius, aut illius mem-
bri per cuius nocumentum uel nocumenti augmentum aug-
getur sonitus, & per cuius decrementum decrefcit. Cognito-
scitur autem utrum uentositas sit in aure aut cerebro, uel cõ-
municetur ab inferiorib. per formam & modum ipsius uen-
tositatis. Si enim appareat sonitus ascendens, tunc genera-

tur in inferioribus & ad superiora eleuatur. Si uero appareat
sonus circumuolutus & quasi reflexus in seipso, tunc fit in au-
re & cerebro. Sibilus autem significat uentositatem pau-
cam cum impetu motam. Tonitus autem uentositatem mul-
tam & crassam cum impetu motam. Tinnitus autem qui in-
ter hos medius est dispositionem siue causam mediam signi-
ficat. Causæ autem priuatiuæ ex earum præcessionem cogno-
scuntur &c.

Prognosticum. Corruptio auditus natiua secundum plu-
rimum non est corrigibilis. Chronica & antiqua difficile
corrigitur. Recens autem secundum plurimum facile corri-
gitur. Pro declaratione dictorum querenda sunt aliqua. Pri-
mum. Nunquid sicut auditus læditur per intensiorem, ita
et uisus & quæcunque alia operatio animalis possit lædi per
intensiorem. Ad quod dicitur quod stante fortitudine uir-
tutis nulla istarum potest lædi per intensiorem. Sed cum de-
bilitate uirtutis bene possunt lædi per intensiorem, ut supra
declaratum fuit de auditu. Debilitas autem & fortitudo
uirtutis ex resistentia parua uel multa excellentib. sensibilib.
arguitur, scilicet autem in appetitiua & similib. possunt enim
lædi per intensiorem etiam cum fortitudine ipsarum, potest
enim appetitiua magis appetere quàm uirtuti digestiuæ cõ-
ueniat aut nutritiuæ, in quas ordinatur, sed non potest uisus
nec auditus melius aut acutius uidere aut audire quàm
conueniat sensui communi aut cogitatiuæ aut intellectui in
quas ordinatur. Secundum dubium utrum aer connaturalis
inti infecus permuteetur uel semper sic permaneat in corpo-
re naturaliter disposito. Ad quod dicendum quod aer ille cõ-
naturalis nō est de genere aeris extrinseci, sed est uapor qui
propter finem à natura ibidem genitus est, & resolutionem
recipit & restaurationem sicut & spiritus. Tertium dubiū,
nunquid ad percipiendum sonum præter motum aeris ex-
trinseci & intrinseci requirantur species representatiuæ soni,
sicut ad uidendum requiruntur species coloris. Ad quod
dicendum, quod præter motum duplicis aeris iam dicti re-
quiruntur etiam species soni, aliter non uideretur cur ma-
gis ex motu aeris deberet reputari sonus acutus quàm gra-
uis, nec distinguerentur variis concentus & harmoniæ quæ
sentiuntur in cantu. Neque ualeat instantia quorūdam dicen-
tium non semper requiri motum utriusque aeris cum non ui-
deatur uerisimile in sonitu bombardæ totum aerem orbicu-
lariter per distantiam centum miliariorum moueri. Et secū-
do quia duo soni aut plures non possunt orbiculariter moue-
re aerem medium, quia vnda vnus aeris moti per vnum sonum
distantem ab alio impedit vnam alterius soni &c.

Quapropter auris existens in medio, aut non audiret ali-
quem istorum sonorum si sunt æque potentes, aut audiret so-
lum potentiorum. Ad hoc respondetur quod motus huius ae-
ris non est nisi quidam tremor ipsius, hoc autem potest fieri
si sonus sit ualde magnus, & ad ualde longam distantiam.

Semper enim cæteris paribus quātitas aeris moti est pro-
portionata sono mouenti, & etiam si aer inundaret orbicu-
lariter potest una unda alteram superæquitate. Contra aer
per vnum sonum, exempli gratia, mouetur orbiculariter in
quocunque puncto ad distantiam. 10. miliariorum, ergo si
per alium sonum idem aer uel pars eius mouebitur orbicu-
lariter ad oppositas differentias erit necessarium, aut vnam
vnam alteram impedire, aut dari penetrationem corporū,
nec poterit vna vnda alteram superæquitate. Ad secundum
respondetur, quod quia motus aeris est quidam tremor, non
sele taliter impediunt, ut existens in medio non possit audi-
re utrumque sonum, fortis tamen instantia est contra dicen-
tes non semper requiri motum utriusque aeris, sed solū spe-
cies sufficere. Si enim sic esset sequeretur quod sonus æque
cito audiretur ab aure multum distante sicut ab aure parum
distanti, nam immediate cum est sonus in aere propinquo
rei sonanti species illius soni intentionales cum multiplicen-
tur sine resistentia multiplicantur subito, & per consequens
æque cito ad locum distantem sicut propinquum. sic etiam
per hanc causam species coloris subito multiplicantur, hæc
etiam opinio de motu utriusque aeris est conformis dictis
Aristotelis, Auic. Galeni, & cæterorum qui sunt inter phi-
losophos præstantiores &c.

Hæc fortasse quandoq; contingunt ex subtilitate sensus auditus, & eius claritate, cuius signum est quod in tempore famis augetur & in hora satietatis & ebrietatis minuitur, quæ propria non indiget cura, nisi superfluitatem obtineat. Tunc enim de opio dissoluto in oleo immittendum est quantum duo grana bordei ponderant. Si autem hæc cum grauedine capitis, & auditu debilitato affuerint, oleum de semine raphani, et oleum de amygdalis amaris, & oleum ros. in quo castoreum fuit resolutum sunt immittenda. Auris quoq; super uaporem aquæ in qua samsucus, stæcas arabicus, absynthium, mentastrum, origanum cocta sunt ponenda est. Et uenter multoties ex pilulis cochiis est soluendus. Et cibaria minuenda. Et unum dimittendum.

Diuiditur præsens capitulum in partes duas. In prima ponitur curam sonitus ex acuitate auditus. In secunda ibi. Si autem hoc cum grauedine. Ponitur curam sonitus cum debilitate auditus. Quæ dicit in prima parte nota sunt ex superius dictis. Sed hoc nota sicut dictum fuit, quod duplex est sonitus ex acuitate. Vnus cum fortitudine virtutis auditivæ, qui nullo modo curatione indiget, est enim cum auris temperamento. Alter autem sonitus ex acuitate auditus cum debilitate virtutis auditivæ, quæ cognoscitur, quia læditur à sonis etiam mediocribus, curatione indiget, non tamen nisi dum superfluit, quia eius curatio non est nisi stupefactio & sensus diminutio, & præterea nisi superfluat non curetur saltem cum stupefacientibus. Sed ubi superfluerit etiam cum stupefacientibus curetur, sicut cum duobus granis opij dissolutis cum .i. .3. olei rosacei, de quo tres guttæ instillantur iuxta textum. Quæ dicit in secunda parte etiam nota sunt. Oleum de semine raphani, & de amygdalis, scilicet amaris singularem proprietatem habent in resoluendo ventositatem auris & confortando eam. Castoreum vero est resolutivum forte sua caliditate vehementi, de quo Avic. scribit secundo canone, confortat surditatem frigidam, nec est aliud magis iuuatium ventositati in aure quam ipsum, quando ex castoreo accipitur quantum est lens vna & dissolvitur in oleo nardino & distilletur in aurem. Oleum autem ros. etiam est confortativum auris & contemperat caliditatem castorei. Reliqua nota sunt & superius declarata. Sed nota quod melius est post fomentationem auris, aut receptionem vaporis de quo loquitur in litera, olea superscripta auri instillare.

Sonitus præsens ab acuitate sensus cum fortitudine virtutis iuxta dicta in textu non indiget curatione. Si vero pendeat ab acuitate cum debilitate, curatione indiget. Si ergo in causa sit latitudo foraminis aut non debita tortuositas, curationem non habet, quia hæc compositio non potest permutteri, similiter raritas texturæ nervi, & proprie à generatione contracta. huic tamen raritati aliquo modo subuenitur uniendo partes & virtutem confortando, sicut cum signis calidis instillando oleum ros. primo conqussatum cum tantumdem aceti, & postea bullitum ad aceti consumptionem. His etiam possit addi sies memithe, sed cum signis frigiditatis oleum de amygdalis amaris cum aceto conqussatum ut supra, & postea bullitum ad consumptionem aceti, & totum regimen declinet ad humidum tam substantiæ quam qualitatis cum vfu rerum inraffiantium & inuisantium non vaporantium neq; ventosorum. Et hoc idem regimen conueniens est, ære, scilicet & spiritibus auditivis existentibus subtilibus. Si vero corpus sit nimis siccum complexionaliter est humectandum & permutandum. Si vero sit factum siccum ex ægitudine sicut conualescentes, regatur regimine conualescentium, & quæcunq; mala complexio sit in organo, aut cerebro, quæ sicut plurimum est siccæ aut calidæ, illa corrigatur. Rasis tamen & Avic. docent subuenire in acuitate auditus, quando vera cura fieri non potest cum his quæ auditum obtundunt, sed cum hæc sint duplicia, scilicet stupefactia & humectantia & inraffiantia absq; stupore, melius est à non stupefacientibus inchoare, sicut est nutrimentum humidum, crassum & viscosum, & instillatio olei viol. aut de sem. lactuæ. Quibus non sufficientibus procedatur ad stupefactia inchoando à leuioribus, sicut est oleum de kengi, & est species

hyoscyami permixtum cum oleo rosaceo. Et his non sufficientibus ponatur parum opij, scilicet à duobus granis usq; ad quinq; cum vna .3. olei ros. aut olei de amygdalis amaris, quæ prius conqussata sint cum aceto, & bulliant donec sit resolutum. Si vero sonitus pendeat à causis primitiuis, sicut percussione, vento, ebrietate, & cæteris quorum præcesit rememoratio, cura est remouere causas primitiuas & nocumeta earum cum contrariis super aurē & cerebrum confortando. Si vero sit per coitatem à toto sicut in febribus, & crisi interitio est cura febris & perfectio crisis, ad quæ perficienda si natura sufficeret bene est, si vero non sufficeret adiuuetur. Mesue tamen auctoritate filij Zacharie appropriat in debilitate auditus sequere feb. oleum de coctionis absynthij cum oleo ros. instillatum in auribus. Si vero sit per coitatem ab aliquo membro particulari sicut frequenter à stomacho, corrigatur nocumeta membri illius euacuando, diuertendo, eius complexionem permutando si lapsa fuerit, & ipsum confortando, & cum hoc intendatur confortationi cerebri cum oleo de myrto, & confortationis auris cum oleo de amygdalis amaris. Si vero sonitus sit per essentiam in aure sicut ab apost. quod maturat, curetur cura apost. de qua supra. Si vero pendeat à ventositate & vaporibus crassis, humore crasso, repletionem capitis, aut et totius, intentiones sunt quinq;.

Prima est euacuatio integrata ex minoratione, digestionem, eradicationem et iteratis si expedierit, & quæ sint digeneratione & euacuatio ex superscriptis patere potest. Secunda est diuersio, cõplenda cum clysteribus, frictionibus, caput purgij, masticæ torijs, gargarisationibus, & tandem cauteriis in commissura coronali si expediret. Tercia est causa coniunctæ resolutionis, aurē & cerebrum confortando & eius discrasiam corrigendo. Sed in huiusmodi intentionis executione duo canones obseruēt. Primus ut ante huiusmodi intentionis executionem duæ primæ intentiones sint absolute sufficere, imo exquirere, nam localia & proprie instillata & maxime caliditatis excellentis ante superscriptarum duarum intentionum cõplémentum magis obsunt quæ iuuant nisi forte materia existere paucissima. Secundus ut à leuioribus inchoet & gradatim ad fortiora procedatur, & ante ab exterius applicitis, quæ ab his quæ in aurē ponuntur, & ante ab his quæ sub forma solida in aure applicantur quæ ab his quæ instillantur. Ex his ergo quæ ad hæc cõplenda intentionem applicatur sunt sacculi, fomenta, suffumigia, ite ea quæ in aure sub forma solida applicantur & instillata. ex sacculis est quæ fit ex milio & sale torrefactis & caliqualeter vino potere aspersis, auri & partibus circumstantibus applicitis. Est. n. efficax in resolutione ventositatis. ex fomentis plurimum est quod ponit à Rasi in textu, chamæmellum, n. melilotum, samsuchus, calamitum, scea, hyssopus sicca, absynthium, origanum, stæcas arabicum, mentastrum singulariter & coniunctim sunt propria in huiusmodi dispositione, spongia siue filtrum in aqua decoctionis horum infusum & calidum auri & partibus circumstantibus applicitur & sæpe iteratū optime valet. Ex his et cum emboto & sine potest fieri suffumigium. Et post horum applicationem & et ante potest poni in aure parum mufcati cotto inuolutū, & efficacius est si secū aliquid castorei admisceatur, tenta quoq; ex radice raphani, ex muscato aut castoreo aspersa & inuoluta auri imposita est conueniens. Ex his aut quæ instillantur est castoreum cum oleo ros. aut de amygdalis amaris dissolutū, aut cum oleo rutæ aut de spica, succus et porri cum oleo ros. & lacte muliebri permixtū in caminus frigidum. & his addatur castoreum si oportuerit. Vltimum & fortissimū ex inuentione Mesue cõferēs sonitui auris & grauitati auditus propter crassam ventositatem, & materiam frigidam & crassam. R. ellebori albi, castorei, costi ana. 3. i. rutæ, nitrī piperis lōgi ana. 3. i. partes. 2. euphorbi. 3. i. tertiā. Deinde. Recipe succi radicis quæ comeditur, succi porri, olei nardini, chamæmellini, anethini, de amygdalis amaribus ana. 3. i. coquantur ad succorum cõsumptionem, cola & vtere, expertū est. Corrigat autem accidentia iuxta quartam intentionem sicut oportet. Regimen aut iuxta quintam intentionem declinet ad siccū, & sicut plurimum ad calidū. Caveat à vento & pluuiis, neq; stet sub radiis lunæ aut solis nisi forte in declinatione aut paucissima existere materia. Statio & ambulatio sub sole concedi potest ad resolutionem residui superfluitatū. Teneat caput satis calidum, & totum corpus præcipue auris læsa aliquo operimento tegat. Et in orificio auris aliquid cotti mufcati reneatur obturas ipsum, sed non inferēs dolorē. Vitet ebrietatē & satietatem

facietatem nauseatiam, caueat ab euaporantib. & à uino, nisi forte in declinatione. Caueat à somno meridiano, & à somno supra repletionem, & dormiat fm plurimum super la tere cōtrario auri laxē. Procuret omnes euacuationes naturales. Caueat à uomitu, non enim conuenit nisi opus esset stomachum euacuare à superfluitatibus faciētib. & fouētib. hanc dispositionem. Inter cetera procuret ventris lenitionem. Exercitium non conuenit in principio sed in declinatione. Vitet accidentia animi molesta, sicut irā, & quæ præcipitant materias ad caput &c.

De grauedine, diminutione siue ablatione
auditus. Cap. 39.

Circa rubricam sciendum qd apud autores reperiuntur isti termini, graedo auditus, defectus auditus siue tarax siue tarsef & guaref. Graedo auditus proprie accepta est diminutio auditus. Sed defectus auditus dicitur à diminutionem quā ablationem. Surditas autem dicitur ablationem auditus consequentem defectum foraminis auditus, siue illud sit creatum solidum à natiuitate, siue illa surditas & soliditas acquisita sit ex tempore. In tarax autē siue tarsef & guaref iuenio autores uarios. Sed dicamus nos quod guaref est ablatio auditus ex defectu nerui auditui, sed tarsef siue tarax est diminutio auditus & sic conuertitur cū grauedine auditus. De terminis nō est lis faciēda, aliquando enim unus istorum accipitur pro altero. Sed ut generalizemus magis capitulum dicamus, quod intentio Rasis est hic determinare de grauedine auditus largo modo sumpta siue de defectu qui diffinitiuē est diminutio auditus uel ablatio. De corruptione enim auditus & latione ipsius per intentionem actum est in præcedenti capitulo. Graedo autem auditus, quædam est à generatione contracta, quædam ex tempore, & quædam antiqua, quædam noua (nouam autem intel ligo infra duos annos.)

Causæ: quædam sunt per cōitatem, quædam per essentia. Per communitatem quidem aut à toto sicut in febribus in quibus uapores ad aures deferuntur, & quandoq; materia cricæ ad aurem permutatur, aut à mēbro particulari sicut à cerebro, cui materia scilicet uapores & uentositas facile permutatur ad aurem. & propter uiciniam, & quia sunt tanquā emunctoriū cerebri, aut à mēbro uicino, sicut in dentib. cum oriuntur aut cum dolent, & quandoq; à mēbro longinquo sicut à stomacho & ceteris. Et communitas totius & horum membrorum aliquando est sine crisi aliqñ cum crisi. Et cū sit crisis, aliquādo materia cricæ permutatur ad aurem & sit graedo auditus difficilis diu remanēs post crism. Aliqñ sit crisis absque hoc quod materia permutet ad aures, sed solū materia agitata per quemcūq; locum fluat, multi uapores eleuati ad aures grauant auditum. Hæc aut graedo facile recedit crisi completa. Aliqñ succedit graedo auditus ad retentionem fluxuum uentris, sicut econtrario fellæ egestionis superuenientes soluunt surditatem. 4. aphorif. cōsimiliter potest esse in retentione quarumcūq; euacuationum consuetarum. Causæ autem per essentiam aut sumuntur à foramine cum oppilatur, aut à causa extrinseca sicut à faba uerme, lapillo, aqua, & huiusmodi, aut à causa intrinseca sicut ab apostemate, cerumine aurium, & ab alio humore, & à uerruca & carne orta, aut à principio generationis, aut ex tempore quibus sit oppilatio, aut integra, aut diminuta, aut sunt in neruo aut propter malam complexionem cuiuscūq; generis, & maxime frig. sine materia, & cum materia cuiuscūq; generis, aut propter malam compositionem sicut est oppilatio ex tempore, aut à generatione contracta, quapropter spiritus audituius nō potest ad aures peruenire. Et forte nō est neruus in foramine ossis petrosi. Et si est forte creatus, est absq; foramine. Et hoc frequenter est causa ablationis auditus à natiuitate. Et quandoq; læditur neruus à solutione continui, aut noua aut antiqua. Et quandoq; propter apost. in ipso neruo de quo sermo præcessit. Defectus etiā spirituum. sc. cum sunt crassi & pauci est causa grauedinis auditus, & similiter paucitas spirituum, & corpus exiccatio & consumptio. Signa: graedo auditus per communitatē cognoscitur expressione alicuius ægritudinis aut dispositionis totius aut partis, cum cuius augmento augetur graedo au-

ditus, diminutione minuitur, quod ante illam dispositionem auditus erat incolumis. & communitas cerebri cognoscitur quia secundum plurimum non solum læditur auditus, immo multi sensus, & quandoq; uirtus motiua, cognoscitur autem quod sit cum crisi, quia ægritudo præcedens terminatur aut minuitur. Et si materia terminatur ad aures sit graedo auditus difficilis remanens post crism. Si uero materia ad aliud membrum permutetur aut expellatur finita crisi, remouetur graedo auditus. Cognoscitur autem quod sit per essentiam quia nulla adest dispositio totius aut alterius membri uerisimiliter factiua huius grauedinis, & si adest oppilatio in foramine, cognoscitur aspiciendo in aure sub radiis solis. Et cognoscitur etiam causa oppilans. Cognoscimus autē causam esse in neruo auditui ex carentia cuiuscūq; alterius dispositionis uerisimiliter facientis grauedinem auditus, & secundum plurimum est cum dolore. Sed mala complexio, solutio continui, apostemata, uentositas cognoscitur per signa propria dicta in capite de dolore auri, & capite de ulceribus aurium. Et si adest oppilatio in neruo, cognoscitur ex carentia omnium aliarum dispositionum, & quia forte præcessit plenitudo capitis, apostema, aut alia causa uerisimiliter oppilans, & quia sentitur grauitas, & proprie cum se prosternit in oratione. Et si est surditas à natiuitate cum bonitate foraminis auri cognoscitur illud esse, aut quia deficit neruus in osse petroso, aut quia creatus est solidus absq; foramine aut humiditas oppilans ipsum ingressa est. Cognoscitur autem spiritus esse crassus, quia auditus est diminutus non ablatus & ex carentia aliarum causarum. Diminutio autem auditus consequens siccitatem & paucitatem spirituum cognoscitur ex præcessione causarum corporis exiccantium, cum tornatilitate faciei. Causæ autem primitiue seipsas ostendū & nocumenta ab illis derelicta sibi proportionalia &c.

Prognosticum. Surditas à natiuitate non est curabilis: an tiqua supra duos annos difficillime curatur noua aliquando facilius, aliquando difficulter secundum causæ fixationem &c. Dubitatur. Vtrum plures sint muti quā surdi. Ad quod dicitur quod à natiuitate plures sint muti quā surdi. nam omnes surdi sunt muti, eo quod ipsis non audientibus non possunt discere formationē litterarum & syllabarum nec dictionum. Multi autem sunt muti à natiuitate propter defectum in neruis mouentibus linguam qui ueniunt à septimo pari neruorum cerebri, qui tamen non sunt surdi, nullo existente defectu in quinto pari neruorum cerebri & in ceteris organis & instrumentis quæ deseruiunt auditui. Sed econtrario ex tempore plures sunt surdi quā muti, uidemus enim ex decursu ætatiuo & etiam ex causis ægris occurrentibus plurimum lædi uisum & auditum, nō aut linguā, neq; quantū ad gustum neq; quantū ad motum, de ipsa enim natura multum sollicita fuit, & ordinauit, ut multæ arteriæ & nerui multū crassi à pluribus partibus cerebri uenirent ad linguā, scilicet à tertio & 4. pari ad dādum gustū & à 7. pari ad dādum motū, sed ad aurē pauci nerui, paucæ arteriæ, & uenæ ueniūt & multū subtiles ordinatæ ad ipsius nutritionē, & cū auris sit mēbrū parū & exanguæ, uenæ autē debuerunt esse paruæ per quarū extremitates purgatur naturaliter humor cholericus in aure repertus qui est cerumen aurium ordinatum sua exiccatione & calefactione ad auditus conseruationem. Lingua autem est membrum magnum, & carnosum, multo indigens nutrimento propterea uenæ eius magnæ fuerunt, & quia multos habuit musculos propter plurimos motus eius, multi ad ipsum ueniunt nerui, natura enim fuit multū sollicita de lingua & propter gustum sine quo non contingit animal diu uiuere, & propter motum linguæ cum deseruiat masticationi, & etiam lingua est magis posita in loco tuto, oculi autem & aures magis extrinsecus occurrentibus, propterea facilius læduntur quā lingua, quare ex tempore plures sunt surdi quā muti.

Cum in auditu contingit grauitas, considerandum est, an sit ibi sordities quæ vocatur cera quæ sit in aure. quæ si inueterauerit mundetur, aut cum medicinis secundum quod prædiximus, aut cum cura manus. Si autem sordes non affuerit, & uenerit hoc post satietatem fastidio-

Io. Arculani

L

3

tam

fam, quæ eam præcessit, aut ægritudinem acutam, auris ponenda est super vaporem aquæ, in qua ea quæ prædiximus cocta fuerint traiectorio interposito quousque vapor ascendant, quod hoc modo fieri convenit. Res istæ in curcuma habente hos acutum coquantur, deinde traiectorium ori curcumæ superponatur, & ne vapor egredi possit, pannis in uoluatur & auris super os traiectorij ponatur. Et istud sief in aurem mittatur, quod. Rec. colocynt. drach. 1. baurach tertiam drach. 1. castorei, aristolochiæ rot. suc. absinthij, omniū ana drach. s. costi quartam drach. 1. euphorbij 6. drach. unius, felli uaccini quantum sufficit ad prædicta conficienda, fiant ex eis sief. Cumque neceffe fuerint unum in oleum de amygd. amaris auri resolutum immittatur, hoc ualde utile existit dolori phleg. & uentositati & sonitui. & tonitui qui ex crasso uento fuerit, & surditati quæ est ex crassis humoribus. Si autem auditus debilitas post ieiunium nigiliasq; contingit, fueritq; facies extenuata & oculi concaui, æger balneum sæpe ingrediatur, et largiori cibo ac potu utatur. Et in somno fiat profundior. Super caput quoque aqua tepida cum oleo fundat donec sanctur. Quod si post phrenesim contingat ex medicinis primis curetur.

Diuiditur præfens cap. in partes quatuor. In prima enim ponit curam grauedinis auditus pendentis à cerumine aurium. In secunda ibi. Si autem fordes non affuerint, Ponit curam eius quæ pendet ab humiditate in organo auditus infusa siue inuiscata quæ secundum plurimum frigida est. In tertia parte ibi. Si autem debilitas. Ponit eius quæ fit ex inanitione & consumptione corporis & paucitate spirituum audibilibus. In quarta ibi. Quod si post phrenesim. Ponit curam eius quæ sequitur phrenesim aut alias capitis ægritudines. De prima dicit, quod si proveniat ex forditie quæ uocatur cera in aure diu retenta & indurata, curanda est cum medicinis & operatione manuali. In primis igitur agrò constituto cum aure sub radiis solaribus extendatur auris, ita ut foramen rectificetur, & cum instrumento argenteo communiter consueto auris ab illo cerumine purgetur cauendo, scilicet quantum est possibile ne organo auditus nocumentum inferatur, ideo fiat cum omni suauitate. Quod si cerumen multum profundum fuerit, & induratum & mollescet & abstergetur primo aliquoties lauando aurem cum hydromelle calido, postea immittendo duas guttas aut tres olei amygdalarum amararum deinde sequenti die fiant tentæ ex cortice longo subtiles cum quibus auris in profundo sufficienter mundificetur, illas tentas circumducendo, ut melius cerumen adhæreat. De secunda parte dicit, quod si surditas sequatur fatietatem fastidiosam, ex qua cõiter multiplicantur humores frigidi aut supplete aliquam ægritudinem chronicam, aut aliquam ægritudinem acutam, & sint humores frigidi in aure retenti, tunc suffumiganda est auris cum emboto posito super orificio curcumæ habentis strictum orificium, cuius extremitas subtilis ad aurem perueniat, & in curcuma bullierint herbæ superius posite in tinnitu & in sonitu, & suffumigium illud fiat stomacho ieiuno, primo per quartam partem horæ, deinde per amplius spacium usq; ad mediam, semel aut bis in die, quatuor aut quinque diebus continuis. deinde immediate post hoc suffumigium, hoc sief distemperatum cum oleo amygdalarum amararum auri iniiciatur. R. colocynthidis. 3. unam, quæ est calida in tertio, sicca in primo, mundificans aurem, resoluens & incidens, & trahens materiam ex profundo auris, baurach. 1. pro hoc fale accipimus salnitrum quod est sicum in tertio, exicat & subtiliat, castorei calid. & sic. in principio quarti gradus, aristolochiæ rotundæ cal. in tertio, sic. in secundo, quæ est subtiliatua & attractiatua ex profundo & à proprietate abstergit fordes auris confortans auditum, succi absinthij, calid. in primo, sic. in secundo, surditati appropriati, ana. 3. s. costi quartæ tertiæ unius calid. in tertio sic. in secundo attrahit ex profundo, & confortat omnia neruosa, euphorbij calid. & sic. in quarto, sextam tertiæ unius, felli uaccini calid. & sic. in quarto quantum sufficit ad conficiendum sief. In tertia par-

te dicit, quod si debilitas auditus contingit post ieiunium & uigilias, fueritque, facies extenuata & oculi concaui, sicut accidit his qui passi sunt longas ægritudines æger sæpe balneum ingrediatur, scilicet, aquæ dulcis, & ampliori cibo utatur, totus, & præcipue caput humectetur qualitatue & substantifice.

In quarta parte dicit, quod si contingat post phrenesim, curetur cū medicinis primis, per phrenesim intellige quodcunque apostema siue cal. siue frig. capitis, & magis ampliando quamcunque ægritudinem materialem ipsius: si ergo quod auri communicatur ex capite, fuerit cerumen aut similis materia cholerica, curetur ipsam extrahendo secundum quod in prima parte cap. dictum fuit. Si autem fuerit materia frig. infusa in organo auditus curetur, secundum quod dictum est in secunda parte cap. Si uero corpus sit consumptum præter modum resolutum per has ægritudines curetur cum humectantibus secundum quod dictum est in tertia parte cap. quæcunque curetur, curabitur cum medicinis primis, id est, quæ dictæ sunt. Hic non oportet ordinare curam surditatis quæ pendet à cerumine aurium: nam satis est ex suprascriptis manifesta. Neque curam eius quæ pendet ex siccitate, nam sibi unica debetur intentio, quæ est humectatio qualitatua & substantifica, de qua sæpe supra dictum est. Neque oportet ponere curam eius quæ provenit ex carentia foraminis, aut ex carentia nerui auditui, aut neruis ipse creatus fuerit solidus, hæc enim non recipiunt curam & est communiter surditas à generatione contracta, scilicet, ex defectu uirtutis informatiue. Neque oportet ponere curam eius quæ fit in senib. ex decursu ætatis propter paucitatem & crasitatem spirituum, & exiccationem substanticam nerui auditui & multitudinem humiditatis superflue quia non recipit curam. Neque curam illius quæ provenit ab apostemate resolutione continui &apore siue uentositate: nam de his in capitulis præcedentibus sufficienter actum est. Neque oportet ordinare curam eius quæ pendet ab oppilatione propter uermes in aure, scilicet, existentes, aut alia corpuscula quæ aurem ingressa sunt. quia de his in duobus cap. sequentibus agit. Super est ergo, ponamus curam surditatis quæ pendet à mala cõplexione siue materia in organo auditus existente, siue sit ibi paulatim cõgesta aut aliunde deriuata.

Cura ergo surditatis à mala cõplexione sine materia quæ exigit intentiones, & alteratione perficienda cū contrariis, aut prohibitione humorum à fluxu, correctione accidentium & regimè sex rerum nõ naturalium. Prima intentio si fuerit mala cõplexio calida perficiat iniiciendo aliquid olei rosati cū aceto bulliti ad acetum cõsumptionem, & si frigida fuerit calefaciendo cū pannis calidis, & cū infusione olei de amygdalis amaris, de spica, de balsamo, de costo, laurino, raphanino, de staphisagria, & similibus, & eisdem intentionibus perficiat. Secunda intentio, & auris cõfortatio cõpletur, & etiã tertia intentio, si huiusmodi sint aliquantulum stipitica, ubi si opus sit, fiant euacuationes & diuersiones sibi opportunitatē. Ex accidentibus corrigendus est dolor, de quo in principio cap. Regimè autem sex rerum nõ naturalium declinet in contrarium discrasie. Si uero fuerit mala complexio cū materia aliunde transmissa sex exiguntur intentiones. scilicet euacuatio, diuersio, regimè mēbri mētē, materiam coniunctam eductio & resolutio, & cum hoc discrasie alteratio, accidentium correctio & debitum regimen. Euacuatio aut fiat in materia frigida, cum hieris & cochis, & agarico, in calida cum decoctione fructuum, pilulis assaieret, & pilulis aureis, & digestiua propria ex capitulo de foda perquirantur, & multoties est necessarium iterare euacuationes, & proprie quādo fit surditas ex retentione chole ræ uel cuiuscunq; alterius humoris fluere consueti, cuius redundatio fit ad aures iuxta Hippoc. 4. Aphorismorum. Medicamen mirabile in soluendo humores crassos frigidos, optime conferens ad surditatem, & mirabile ad uertiginem & epilepsiam menstrua potenter educit. R. salis ammō. piperis ana. 3. 2. euphorbij 3. 1. dabis ex eo quatuor aut quinque grana cum ouo sorbili aut hydromelle, & melius est multiplicari numerum euacuationum & minorare quantitatem, ut uirtus conseruetur & proveniat maturatio. Diuersio autem fiat cum gargarismatibus, caput purgans per nares, & masticatoris secundum quod in pluribus capitulis dictum est usque

usque ad uescantia & cauterium in commissura coronali, omnes euacuationes diu consuetae prouocetur si facta sit retentio. Regimen autem membri mittetur si aliquid sit in causa perficiatur euacuando, diserasiam eius corrigendo & ipsum confortando, & de hoc saepe dictum est, plurimum enim in surditate cerebrum est in causa. Materiam autem conuictam educatione secundum plurimum est frigida perficitur cum exercitio, & proprie per loca sicca, & arenosa, & stomacho ieiuno. Item cum uociferatione & clangoribus tubarum, & ceterorum instrumentorum musicalium, & cum balneatione in aquis thermarum & salis, imo aqua maris, scilicet, instillata coferet, & cum suffumigiis & liquoribus in aures iniectionis, de quibus in litera, & etiam cum medicinis siccis in aure retentis. Sed pro hac intentione perficienda aliqui casus obseruentur, prater casus, generales ab initio positos. Primus, ut hac imponenda ordinetur secundum exigentiam diserasiae & humoris peccantis. Secundus, ut inchoetur a leuioribus, & gradatim procedatur ad fortiora. Tertius, ut primo tentetur ex terius applicata quam imposita, ut prius sicca quae non penetrant in profundum aures postea humida. Quartus obseruetur an propter horum administrationem sequatur iuuamentum & continuetur, an lequatur nocumetum & omittantur: est enim difficile bene metiri huiusmodi medicinas quae ponantur in auribus. Multoties enim magis nocent quam conferant. Ex conuenientibus ergo ad hoc in causa frigida est muiscus cotto inuolutus, & in aure retentus, item frustum raphani secundum foramen aures figuratum castoreo & musco aspersum, item suffumigium de quo dictum est, ite oleum amygdalarum amararum, nardinum, costinum, oleum balsami. Eua poratorium bonum est, ut calefiat urceus in quo diu steterit oleum oliuarum, & sit cum amurca sine oleo, & fumum recipiat per traiectorium, & succus, scilicet, absinthii cui sale est leuis & proprius, & urina caprae habet in hoc proprietatem. Aliud leue & expertum. J. gariophili. J. s. & masticis, grana. 2. sem. porrigrana. 6. puluerizentur crasso modo, & bulliant in J. s. olei de ruta, & tepidum instilletur, & pulpa colocynthis, & succo cucumeris asinini aut radici eius inest per prietas mirabilis cum aliquo dictorum oleorum, & ex eis est oleum nardinum cum castoreo & pulpa colocynthis partibus aequalibus confectis cum felle uaccino, & expertus est pulvis ellebori albi cui aceto distillatus in aurem, aut missus in aurem cum lichinio item ellebori albi, castorei, pirethri, nigri ana. coquant in uino potetici. cola, & distilla de oleo i auribus, & spolum serpentis cum aceto, & uino confert cum proprietate sua, ut oleum decoctionis eius. In causa calida confert oleum rosae cum aceto bullitum ad acetum consumptionem. Item succus granati reducatur in cortice suo cum pauco aceto thure & oleo rosato, & decoquatur donec aliquantulum inspissetur, & in maiori caliditate succus lactuca & solatri confert, & ex uaporibus conuenientibus est aqua calida folia, uel in qua bullierint res infrigidantes ut folia uitis, salicis, &c. Corrigatur autem dolor sicut supra dictum fuit in primo capite, & regimen ordinetur in contrarium diserasiae, & particulariter perquiretur ex capitulis praecedentibus. Surditas autem pendens ex neruo aut carne addita, raro propter loci nobilitatem curam recipit: interdum tamen curetur cum administratione medicaminis acuti una uice post aliam usque dum consumatur, sed esto memor ut id paulatim fiat & in longitudine dierum.

De uermibus aurium & paruis animalibus. Cap. 50.

Cum in aure fuerit titillatio, & pruritus, & dolor, & deinde ceciderint uermes ab aure, immittatur auri succus mēstari, aut foliorum persicorum, aut oleum de nucleis ipsorum, aut aloes in aqua dissoluatur et mittatur haec enim uermes aures et parua animalia ingrediētia ipsam quando erunt in aure & in ulceribus nascuntur interficiunt.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima ponit signa uermium & huiusmodi animalium in aure existentium. In secunda ibi. Immittatur. Ponit curam de ambabus partibus simul. De prima dicit quando in aure sentitur titillatio quaedam, id est, motus quidam cum agitatione parua, & adest pruritus quae est una de decem & quinque speciebus doloris. Secunda prim. & dolor, scilicet, alius qui secundum plurimum

est pungitius, & aliquando maximus & spasmosus cum peruenit ad neruum audituum, & etiam cum maxima aegri angustia, & inquietudine, & aliquando aliquis uermis ab aure egreditur, haec manifesta sunt signa ibi adeste uermes, uel similia animalia parua sicut pulices cimices, sanguisuga parua & similia. Vermes autem ibi nascuntur ex sanie, aut ex alia humiditate ibidem putrefacta. Aliquando uero aures ingrediuntur, sicut & alia animalia illis similia, & hi uermes quando sensibilibus laedunt operationes sunt morbus in numero sicut & uermes in intestinis. In secunda parte dicit, & ponit curam complendam quinque intentionibus. prima uermes educit. Secunda si uermes educi non possunt, ipsos interficit. tertia interfectos educit & aures mundificat. quarta corrigit accidentia. quinta ordinat regimen. Prima intentio completur situata aure agra sub radiis solis immittendo in orificio auris cotum infusum in lacte, aut in melle, aut in penidiis cum lacte distemperatis in succo carniū pinguium affatarum. Ad dulcia enim & pingua mouetur uermis. Et post hoc sternutatio nem commouere ore clauso & naribus ut impetus & commotio magna fiat ad partes aures, cum quo excutiantur uermes exterius. Si uero fuerit sanguisuga quod forte cognoscetur aspiciendo aurem sub radiis solis, tunc sanguis columbae in orificio aures imponatur, & si non separetur, quia forte iam adhaesit alicui parti, distilletur in aurem aqua salita aut lichinium & immediate separebitur, & tunc cum motu sternutationis aut tussis facilius poterit educi. Secunda intentio est uermes interficere, quam intentionem complet Rasis cum succo mentastri calidi & siccis in secundo, multum proprio ad interficiendum uermes, similiter cum succo de foliis persicorum similis complexionis & uirtutis etiam eos interficiens sua amaritudine, similiter cum oleo de nucleis ipsorum, aut aloes cum aqua dissoluta, distillando ex his duas aut tres guttas in aurem, & haec cum hoc quod uermes interficiunt etiam aures a sanie & humiditatibus extraneis mundificant, & non solum in ea fieri putrefactionem. Et breuiter omnia amara acuta, acetosa, sunt in hoc praestantia, & cum hoc si habeant singularem proprietatem contra uermes, magis conueniunt sicut absinthium, alphasium, id est, radix mori secundum aliquos, sed credo quod sit pralsium uel centaurea. & fortius his est calamentum. Haec enim aut aliquod eorum si bulliant in uino aut aceto sunt ultima, succus tamen ipsorum est potentior, necat enim uermes & dolorem sedat, & similiter succus caparis, succus radicis mori, succus cucumeris agrestis cum radice eius, & succus lupinorum amarorum, & ex bonis miscebilibus cum eis sunt sella aut euphorbium, & oleandro in est proprietas mirabilis adhuc. Dixit Galenus, si cetera non conferrent, sulphur uiuum & calx uiua terantur, & cum melle conficiantur, & cum aceto in aurem instillantur, & alkitra distillatum in aurem eos perneat, & per alkitram aliqui intelligunt resnam pini, aliqui picem, aliqui gummi cedrini, quaelibet est bona. Quandoque permiscemus placentia uermibus cum eis qui eos necant, sicut mel cum aliquo supra scriptorum. Auic. ponit hoc medicamen. R. uini. 3. z. mellis. 3. 3. olei. 3. i. misce cum albumine duorum ouorum fiant tepida, & imbibantur lana, & impleatur aures, & cubet super aure, & non dormiat, deinde subito rapiatur, quoniam uermis egredietur. Tertia intentio est ipsos interfectos educere, impleatur ergo aures una uice post alia ex uino & oleo tepidis, & cum stuellis ex cotto factis circumducendo educantur, & cum hac intentione complentur. dormiat eger super aure egras, ad hoc etiam ualet immisio aquae mellis, & proprie uioleter cum catathis, & postea exicatio cum stuellis de cotto. Quarta intentio scilicet accidentium correctio completur sedando dolorem aut curando ulcera ex putredine uermium derelicta secundum quod in capitulis praecedentibus dictum est. Quinta intentio scilicet debitum regimen perficitur utendo amarum, salis, acutis, & acetosis, & ipsa masticando, masticata in ore tenendo & odorando, &c.

De his quae in aures extrinsecus cadunt. Cap. 41.

Qum aliquid in aure figitur, oleum tepidum est immittendum, & patiens balneum ingreditur, ibi moram faciens donec corpus eius mollescat. Deinde naribus insuffletur conditum, & teneatur anhelitus donec sternutatio

Io. Arculani L 4 tatio

tatio sequatur: forſitan enim ſic egredietur. Si autem fuerit difficile, & non exierit, erit neceſſe ut cum ferro auri immiſſo extrahatur. Quod etiam in naribus eſt faciendum ſi quid eas ingreſſum fuerit, quod extrahi non poſſit. Quod ſi aqua aurem intrauerit, capite ad partem auri illius inclinato ſalutari ager. Quod ſi non exierit, prouocetur ſternutatio, ut diximus. Deinde oleum tepidum multoties immittatur. Neque hoc pro paruo eſt habendū & præcipue ſi res malā habens qualitatē ingreſſa fuerit, ex ea namque grauis ſequitur dolor.

Diuiditur hoc cap. in tres partes. In prima ponit modum extractionis rerum duarum fixarum in aure. In ſecunda ibi. Quod ſi aqua. Ponit modum extractionis rerum liquidarū. In tertia parte ibi. Nec hoc pro paruo eſt. Facit medicum diligentem in huiusmodi rerum extractione. In primaparte innuit duas intentiones. Prima eſt foraminis mollificatio & dilatatio & etiam mollificatio rei, quæ ingreſſa eſt aurē, aut ipſius comminutio ſi fieri poſſit inſtillando in aurē oleū tepidum & ægum ponendo in balneo ſcilicet, aquæ dulcis, & maxime fomentando aurem cum philtro aut petia inſuſa in aqua tepida. caue tamē ne res quæ eſt ingreſſa aurem per humectationem creſcat, ſicut faba, phaſcolus, cicer & ſimilia, in his enim ab olei inſtillatione & fomentatione cauendum eſt. Secunda intentio eſt ipſius rei extractio, prouocatio ſternutationem cum cōdiſ, aut elleboro narib. inſuſſato, ore & narib. clauſis, ut cum impetu aere inſpirato, uerſus aurē motu, illa res ab aure excutiat. Si autē cum ſternutatione exire non poterit, extrahatur cum instrumento cōgruo cū quo etiam extrahuntur res narē ingreſſæ cuius instrumenti figurā uidēs in margine, & cum hoc etiam extrahuntur lapilli in uirga retēti. Sed bene caueat operās quomodo ipſum applicet ne in profundum rem extrahendam impellat. De expertis per me in extractione rerum inſixarum in aure eſt, ut lacerta uiua aut nouiter mortua applicetur cum capite ſuo auri, & ligetur ſic per tres horas retēta, & cū eā amouebis inuenies rem inſixam adhærentem capiti lacertæ, & hoc ualet in extractione cuiuſcūque rei ubique fixa. In ſecūda parte dicit, quod in extractione aquæ, & rerum liquidarum debet eger ſaltare capite incuruato ſuper aure ægra & liquor exibat. & ſi non ſufficiat prouocet ſternutatio ut prius. Vterius dicit quod medicus nō debet eſſe negligens in extractione huiusmodi rerum, & proprie cum ſunt affectæ mala qualitate, cauſant enim interdum dolorem fortem & alia peſſima accidentia. Ingentia autem in extractione hōi rerum humidarum penes Auic. et alios, ſunt plurima. Primum eſt cum embula ideſt canula perforata, cuius extremitas bene cotto circumdata in aurem ponatur ut bene adhæreat, deinde cum ore poterit fiat ſuctio, exibat enim ne detur uacuum. & ſimile huic eſt cathatr cum ſua extremitate in aure immiſſum. Secundus modus eſt ut ſpongia facta ſubtilis per fortem cōſtrictionem cum extremitate ponatur in aure: exiccabit enim humiditatem illā & ſimiliter huic eſt medulla melignæ, aut ſuſtes anethi, aut papirus paluſtris cum extremitate ponatur in aure, poſtquam bene per cōſtrictionem fuerit ſubtiliatum, ut creſcendo bene foramini adhareat. Deinde alia in extremitate cotto circumdata uſque ad tertiam partem ſui accendatur ignis, qui procedat ardendo uſque prope aurem. ægro iacente ſuper aure ægra, & ſubito extrahatur & exibat aqua. Tertius modus eſt etiam ne detur uacuum, accipiat ueſica, & in collo ueſicæ ſit cannula poſita & bene ligata, & in reſiduo ueſicæ ſint tres circuli æque diſtantes bene adhærentes & ligati cum ueſica ſiue conſueti, & ueſica hæc cum circulis ſuis cōſtringatur uerſus collum ſuum, & cannula in aure ponatur cotto ſecūdam extremitatem ſuam circumdata, & poſtea ueſica elongetur tenendo cannulam bene firmam, & exibat aqua ne detur uacuum, & ad hoc optime faceret folliſ paruiſ cuius cannula eſſet auri proportionata, his duabus intentionibus peractis. Sequitur tertia quæ eſt accidētium correctio maxime doloris, cuius cura ſuprapoſita eſt, & imponatur in aure oleum, & proprie de amygdalis amaris ſi aqua ingreſſa fuerit, & ſi lichinium aut aliud calidum oleum roſ. omphacinum inſilleſſetur, & idem facit, & ordinetur regimen ſecundū exigentiam accidētium & intentionem, &c.

De ægritudinibus naſi. & primo de anatomia eius. Cap. 42.

Vtæ ordinem à nobis præmiſſum habemus duo præcognoscere. Primum eſt anatomia naſi. Secundum eſt modus congruus applicandi medicinas pro cura paſſionum naſi. Quātum ad primum naſus deſcriptiue eſt membrū instrumentale in ſuprema parte corporis ſitum ad lōgum ex duobus oſibus, tribus chartilaginibus, & duobus muſculis compoſitum, duo habens foramina uſque ad colatorium pene trantia ad euentandum cerebrum, odorandum, diſtinguendum literas, & ſuperfluitates à cerebro euacuandum, finaliter ordinatum: eſt enim primo membrum instrumentale ſiue organicum, quia compoſitum, & ad plures operationes facientes pro bene eſſe indiuidui ordinatum. eſt autem in ſuprema parte corporis ſitum ut eſſet cerebro proximum, eſt autem factum oblongum: ſic enim melius deferuit ad operationes de quibus infra. eſt autem compoſitum ex duobus oſibus figuratis ſecundum formam duorum triangulorum, & ſecundum eorum angulos iunguntur colatorio, ſecundum baſes iunguntur inferius, ita ut naſus ſit maior & latior inferius quā ſuperius. Hæc autē oſſa fuerunt ſubtilia, ut ſcilicet eſſent leuia neque fuerūt multum dura, quia magna fortitudine non indigebant merito operationū in quas ordinantur. Fuit etiam naſus compoſitus ex tribus chartilaginibus, duabus, ſcilicet, extremitatibus duorum oſium, quorum iuuamentū fuit triplex. Primum generale, ne membra mollia ſicut cutis & muſculi immediate oſibus duris coniungerentur, ſecundum fuit, ut nares ſtarent apertæ, & poſſent dilatari & conſtringi ſecundum neceſſitatē aeris attracti & expulſi: ſi enim fuiſſet ſolum os non potuiſſet dilatari & conſtringi. Si uero caro & panniculus non ſtetiſſent nares dilatate propter molitiem ſubſtantia. Tertium iuuamentum, ut quateretur in expulſione ſuperfluitatum, ſic enim adiuuat ad ipſarum expulſionē. tertia uero chartilago eſt in medio naſi diuidēs ipſum per medium ſecūdu longū, & eſt durior ſuperius quā inferius. Hoc autē factum fuit ut in naſo eſſent duo foramina, ut ſuperfluitates expulſæ à cerebro ſecundū plurimū tranſeant ſolum per alterum foramē & reliquum attractioni & expulſioni aeris libere ſubſeruiat.

Si enim non fuiſſet niſi unum frequenter ſuperfluitatibus à capite deſcendentibus per naſum fuiſſet impeditus tranſitus aeris. Et fuiſſet compoſitus ex duobus muſculis paruis, ut ſua magnitudine non impeditet alios muſculos, qui ſunt in genis deſeruietes motui labiorum & aliarum partium faciei. Fuerunt autem fortes ut fortitudine ſupplerent quod deſicit in magnitudine, & ortum habuerunt à genis, quapropter nares uerſus ipſas contrahuntur ſecundum uoluntatis imperium. Habuit autem duo foramina peruenientia ad colatorium quod eſt in oſſe baſilari, eſt enim ibi perforatum. Et ſimiliter perforati ſunt panniculi tegentes cerebrum ex ipſius directio uſque ad carunculus mammillares, quæ ſunt in extremitatibus duarum partium uentriculi anterioris. Hoc autem factum fuit ut ſuperfluitates à parte anteriori cerebri poſſent expelli per nares, ut etiam ſpecies odoris & etiā ſumalis euaporatio aeri pennixa poſſent per foramina nariū & colatorii & duorum panniculorum deferri ad carunculas mammillares qui ſunt organum olfactus. Subduntur autem poſtea in diſſinitione quatuor iuuamenta ad quæ naſus ordinatur. Primum eſt ad euentandum cerebrum quod facit mediante multo aere in ipſo contento, quem modificat, ut modificatus tranſeat ad cerebri euentationem, licet maior pars aeris per ipſum attracti deferatur ad cordis euentationem. Secundum iuuamentum eſt, ut multus aer in ipſo contentus receptius ſpecierum odoris & ſumalis euaporationis melius ad odoratum deferuiat. Tertiū ut per ipſum, ſcilicet paulatim expulſum, ſecundum exigentiam literarum etiam diſtinguatur, nā taliter deferuit naſus iuxta Auic. i. primi, cap. de anatomia oſium naſi, ad diſtinguendum literas qualiter deferuit foramen magnum ſitula ad diſtinctionē ſonorum. Quartum iuuamentum fuit ad tegendum ſuperfluitates, & ipſas expellendum quæ à cerebro deſluunt per nares. Cum enim manibus ſit narium cōſtrictio, aer per loca anguſta in pulſus expellit cum uiolentia ſuperfluitates quibus obuiat. Ex his patet ſitus naſi, figura, quantitas, numerus partium, ſubſtantia. Ex quo etiam patet complexio, eſt enim frigida &
ſicca

siccæ complexionis. et colligantia, colligatur enim cum cerebro, colligatur etiam cum ore & gutture, quia per illa foramina est transitus ad guttur, colligatur etiam cum oculis. quia in superioribus partibus osium nasi sunt foramina quæ ad oculos terminantur, quapropter alcohol positum in oculis gustatur, aliqua parte ipsius resudant ad os per foramina narium. Potest autem pati omne genus ægritudinis, scilicet complexionis, compositionis, & unitatis & apostemata cuiuscunque generis, & hæc sufficiant de anatomia.

Secundum autem perficiendum est modo applicationis medicinarum. pro quo sciendum quod aliquando applicatur capiti, & præcipue parti anteriori & maxime ad diuertendū à naso, aliquando applicantur ori sub forma masticatorii, aut gargasmatum. Aliquando applicantur naribus quadrupliciter, aut infundendo eas liquidas in naribus capite conuerso ad posteriora, & melius est, saltem medicina existēte acuta, ut os sit plenum aqua, secundo naribus sugguntur, tertio sub forma odoris & suffumigii applicatur, quarto sub forma pulueris insufflantur. Sciendum tamen est, qd si medicina fuerit acuta, sequitur odor & dolor nasi & capitis cui oportet subuenire cū attractione siue iniectione lactis & similiū sedantium acuitatem & dolorem remouentium.

De sanguine à naribus fluente. Cap. 43.

Hæc quinta pars de passionibus nasi habet quatuor cap. quorum primum est de fluxu sanguinis narium. Quid nominis satis notum est. Sed fluxus sanguinis narium descriptiue est exitus sang. per nares siue immediate ueniat à naribus siue aliunde. pro cuius noticia ut ueniamus ad secundum, scilicet ad species siue modos fluxus sanguinis narium. prima distinctio. Sciendum est quod sanguis aliquando egreditur immediate à uenis quæ sunt in naribus aliquando à uenis & arteriis longinquis, sicut ab arteriis retis mirabilis cum rumpuntur, aut ab aliis arteriis & uenis quæ sunt in cerebro. Nonnunquam rupta uena in pulmone sanguine impetuose expulso cum tussi, aliquando egreditur simul per os & nares. Item accidit sanguine impetuose uento. Sanguis tamen ex naribus proprie secundum omnem intentionem medicorum dicitur de illo qui immediate egreditur de naribus aut cerebro siue rete mirabili. Secunda distinctio. Fluxus sanguinis aliquando est paruus sicut distillās, aliquando multus & impetuosus, aliquando medius inter hos. Tertia distinctio. Aliquando est à uena, aliquando ab arteria. Quarta distinctio. Aliquando est periodicus, aut de mense in mensem, sicut aliquando accidit mulieribus quibus retēta sunt menstrua. Hic enim supplet uicem fluxus mensualis. Et aliquando habet alios periodos, secundum quod in diuersis temporibus tantus congregatur sanguis, ut sufficiat ad fluxum, aliquando est sine periodis. Quinta distinctio. Aliquando huiusmodi fluxus est criticus aliarum ægritudinum præcedentium, aliquando non criticus. Sexta distinctio. Est aliquando iuuatiuus, aliquando est nocuus. Iuuatiuus quidem est existente multa pectoria cum uenæ sunt tensæ, color rubens præter modum, & facies tumens, imminet enim periculum aut fracturæ uenæ aut suffocationis subitæ. Similiter cū sanguis esset nimis acutus licet etiam esset mediocri quantitatē. In his enim casibus fluxus sanguinis ex naribus optime confert. Est enim iuuatiuus in multis ægritudinibus quæ sunt apertice terminari per fluxum sanguinis narium, sicut apostemate cerebri & propriè calido & sanguineo aut cholerico in soda ex sang. proveniente & in synache & peripneumonia aut pleuresi & apost. hepatis & in morbillis & uariolis & feb. synocha, & febre tertiana & causone in quibus maxime cholera esset mixta cum sanguine. Sed dicit Aui. j. tertii cap. de fluxu sanguinis narium, quod pleuresis est apta melius & frequentius terminari fluxu sanguinis narium quàm peripneumonia, cuius causa quia secundum plurimum fit pleuresis à sanguine cholerico qui est aptus per nares expelli. Et etiam uena arterialis deferens sanguinem ad pulmonem, minorem habet colligantiam cum uena chilis ascendente quàm uenæ pectoris ab ea ramificatæ. dicit tamen A. etiam uena chilis ascendens à qua ramificantur uenæ disseminatæ per pectus est proximior uenis narium siue quæ terminantur ad nares quàm pars uenæ chilis à qua rami fiunt uena arterialis de-

ferens sanguinem ad pulmonem. Dicit tamen A. 2. quarti de iudiciis fluxus sang. narium, quod peripneumonia terminatur per fluxum sang. narium, & quod pleuresis quātum ad hoc iudicium est medium quem passum credo sic esse intelligendū, scilicet quod pleuresis rarius terminatur per fluxū sang. narium quàm multa alia apost. ut uerbi gratia rarius quàm apostema cerebri & synanche, frequentius tamē quàm peripneumonia ego tamen cum uiderim centum pleureses & multas peripneumonias, nunquam uidi nisi unam pleuresim sanguinis fluxu terminari. Nullam autem uidi peripneumoniam sanguinis fluxu terminari, sed bene multas phreneses sine apost. cali. cerebri. Et forte etiam quod apost. hepatis & propriè existentia in gibbo & frequentius terminantur per fluxum sang. narium quàm pleuresis cum truncus uenæ chilis transeat per gibbū hepatis. Et forte hoc intellexit A. in proprio capite de fluxu sang. narium, cum dixit, iuuatur eo præcipue ægritudinibus acutis & in apost. intrinsecis & propriè sanguineis & cholerice in cerebro, deinde in hepate, postea in uelamine, id est, diaphragmate, & per uelamen etiam possumus intelligere pleurā, ex hoc ordine Aui. possumus intelligere suam prædictam. Aliquā hic fluxus est nocuus sicut quando superfluit, tunc enim in cholerice facies citrinatur cholera furente & ebulliente & residuum sanguinis adurentē, & in phlegmaticis facies pallidat, & sit plumbea phlegmate multiplicato, & in melanch. sit facies fusca, & pierūq; in omnib. istis facies tendit in colorem mortui spiritus pauca, & extremitates in frigidantur & cadūt in syncope, & interdum moriuntur, & præcipue cum magna quantitas in paruo tempore egreditur, sicut. 25. lib. licet mulierem uiderim euasisse postquam ab ea egressa sunt. 25. lib. sang. per matricem in tribus diebus, sanguine autem in multa quantitate sed paulatim fluente & in pluribus diebus, debilitatur hepar, & peruenitur ad hydropem & corpora uehemētius præparata ad fluxum sang. narium sunt corpora citrina subtilis sanguinis, & iuuatur ex eo qui temperatus est.

Causæ fluxus sanguinis narium sunt multiplices, scilicet secundum quod differēt fluxus egreditur. Aliquādo enim aperiuntur uenarum orificia. Aliquādo uenæ soluūtur, aut secundum longum aut secundum latum totaliter, aut secundū partem. Aliquādo sanguis egreditur resudando. Orificia autem uenarum à quib. potest sanguis resudare, licet sint multa fere ad uniuersam cutim terminata, unde aliqui per hunc modum sudarunt sudore sanguineo, sicut de Christo credimus, licet illud etiam potuerit esse per resudationē à uenis. Tria tamen sunt loca famosa in quibus frequenter sanguis egreditur per orificia uenarum ad illa loca terminata scilicet nasus anus & matrix.

Causæ autem apertionis uenarum siue orificiorum. Quædam sunt primitiue, sicut aer calidus, statio sub sole, balnei ingressio, cibi et potus calefacientes, repletio multa ciborum, motus violentus, furor & ira, similiter percussiones, casus, & offensiones, clamores, leuationes ponderum, iterum aliqua medicina sicut aloes, scamonea, & similes. Et aliquæ sunt corporeæ sicut multitudo sanguinis, aut ipsius acuitas & subtilitas, feb. calefacientes, debilitas uirtutis retentiue & similia. Causæ autem solutionis uenarum sunt iam dictæ primitiue & corporeæ, similiter ulcera corrodentia. Causæ autem resudationis sanguinis est caliditas & subtilitas ipsius & dilata-tio pororum & raritas texturæ &c.

Signa quædam sunt prognostica sicut splendor apparens in utroque oculis & lineæ albæ, & rubedo, & citrinitas, & propriè post sodam & reliquas ægritudines, de quib. supra aptas fluxu sang. terminari, ipsæ enim ægritudines sunt signa fluxus sanguinis futuri, splendor tamen apparēs in utroque oculis potest intelligi ex parte ægri & ex parte aspicientis in oculum, utroque modo nunciatur fluxum sang. futurum, pruritus autē & titillatio accidens in naso cum signis iam dictis significat iam fluxum sanguinis proximum. Signa autem quod sanguis egrediatur ex naso immediate sunt, quia per approximationem alienius lichini constringentis ad intra nares facile sedatur: secundum quia nullo loco capitis dolor percipitur. si uero sanguis sit ex cerebro in aliqua parte determinata dolor percipitur & non facile sedatur fluxus sang. imo in naso posita nihil conferunt. Quod autem sit ex ruptura uenæ in cerebro,

rebro, & non ex refudatione cognoscitur, quia multus est & crassius, proueniens autem refudatio, paucus & subtilis. Quod autem sit ex arteria cognoscitur, quia calidus rubeus cum claritate, subtilis, & est cum spuma frequenter & impetuofo egreditur. Sanguis autem ex uena est rubeus tendens in fulcū, crassius, sine spuma, cum paruo impetu egrediens. Quod autem sit periodicus cognoscitur, ex determinata periodo seruata, quod autem sit criticus cognoscitur, quia sequitur alias ægritudines, & cum ipso ut plurimum terminantur, quod autem sit inuatiuus cognoscitur quoniam sequitur bona cōferentia & bene toleratur, contrariorum contraria sunt signa. Causæ autem primitiua & corporeæ seipsas ostendunt, quod autem sit ab ulceribus cognoscitur, quia post saniem sanguis egreditur, & significat ulcus ambulatiuum, scilicet crosium aut putridum.

Prognostica. Primum. Fluxus sanguinis narium ex fractu ra arteriæ in cerebro difficulter curatur, & secundum plurimum male terminatur, et proprie si frāgatur arteria retē mirabilis. Secundum est A. Et scias quod quādoq; uiuit homo fluxus sang. nariū usq; quo egrediantur. 20. lib. & usq; ad. 25. lib. deinde moritur, licet ut antea dixi, uiderim superuixisse mulierem, cū tribus diebus egressa fuerit. 25. lib. sanguinis.

Ex his quæ sanguinis de naribus fluxum retinēt, est suc. albedorogi cum campbora fuerit in eo resoluta naribus immisus, confert enim ei qui hanc passionem incurere solitus est, ante eam iniectus, aut in hora ægritudinis. Aut sumatur gypsum cinis chartæ de panno gallæ, sang. draconis, calcis, gezi, & puluerizata naribus insufflentur. Aut lichinium in eis intinctum mittatur in nares. Aut alumen iameni puluerizatum, ut alcohol cum amilo eiusdem quantitatibus naribus insuffletur.

Hoc capitulum de sang. fluente ex naribus, diuiditur in tres partes. In prima ponit quædam medicamina naribus imponenda. In secunda ibi. Quod si adhuc uehementer, curat fluxum sanguinis per diuersionem. In tertia ibi. Medicamen quod uehementer ualet ponit aliud medicamen naribus imponendum. Prima pars potest diuidi in tres partes, secundum quod tria sunt medicamina, de quibus facit mentionem partes patebunt. Primum medicamen est suc. albedorogi, id est, ozimi maioris siue basiliconis, de quo uerbi gratia sumatur. 3. i. & misceatur media drachma camphoræ. Et si maior esset caliditas sit. 3. i. confert enim, ut dicit Rasis in textu curando, & perseverando, cum autem basilicon sit triplex, scilicet cet maius habet folia magna & stipitem satis longum & est commune, secundum minus habens folia parua, redolens odorem gariophyl. & dicitur ozimum gariophilatum, tertium habens etiam folia satis magna redolens odorem citri & dicitur citrarium. De maiore est hic sermo. Retinet enim sanguinem à forma specifica, non à qualitate manifesta. Imo quia calidum est fortasse magis adiuuaret ad sanguinis prouocationem. Et ideo secū permiscetur camphora frigida in quarto ad reprimendam eius caliditatem. Itellus itaq; in eo infusus & naribus immisus optime iuuat. Secundum est hoc. Recipe gypsi frig. sic. & stiptici, cineris chartæ de panno calidi, sicci & stiptici, dicitur de panno ad differentiam chartæ, de papiro palustri super qua antiqui scribebāt, gallarum frig. & sic. & stipticarum, sang. draconis frig. & sic. & stiptici & inuiscatiui, calcis calid. & sic. in quarto, & causticæ, zezi, id est uetrioli calid. & sic. in quarto, omnium ana. 3. i. & puluerizata subtilissime naribus insufflentur. Aut lichinium ex cotto prius infusum in albumine oui, deinde isto puluere aspersum naribus immittatur.

Vltimum medicamen est alumen iameni, calidum & sicū & stipticum subtilissime puluerizatum & mixtum cum æqua li quantitate amyli retinentis sua inuiscatione.

Quod si adhuc frequenter manauerit, superiores adiutorum partes apud ascellas cum insita & coxa apud inguina ligentur, & testiculi sunt ligandi similiter. Si uero passio inualuerit, phlebotometur cephalica eiusdem partis de qua fuit sang. Si autem nec hoc modo strictus fuerit, magna uentose cum igne superponatur ueneri ab ea parte de qua fuit.

sang. Medicamen quod uehementer ualet ad sanguinem constringendum, sumatur calx al. et leuis qua utuntur aurifices & sepe naribus insuffletur sine interpolatione & lichinium albumine oui illinitū ea inuoluitur et naribus immitatur.

In hac secunda parte curat fluxum sanguinis diuertendo. primo sine euacuatione, secundo cum euacuatione, scilicet phlebotomia, & patet. Et in ultima parte docet assumere calcem, qua scilicet utuntur aurifices & naribus frequenter in sufflare uel in lichinium in albumine oui illinitum, & postea ipsa inuolutum naribus imponi &c. Pro ordinatione curæ fluxus sang. narium, sciendum quod fluxus criticus non est cōstringendus, Imo adiuuandus nisi uirtutem debilitet. Similiter fluxus factus à natura stimulata ipsius multitudine, aut et ipsius acuitate cum mediocri quantitate eius non est restringendus. Imo in exitu. 4. lib. est aliquando ægro iuuamentum non paruum, quo fortasse præferatur ab apostemate uel ruptura uenæ, uel morte subita & similibus. Reliqui autem fluxus sunt secundum plurimum restringendi. Et etiam iam dicti cum nimium exuberant.

Cura ergo fluxus sang. narium triplex exigit regimen. primum uniuersale, secundum particulare, tertium commune utriusq;. Primum completur quatuor intentionibus. prima sanguinem infrigidat & incrassat, caliditatem membrorum reprimens. secunda diuertit. tertia uias & meatus quibus sanguis ducitur ad nares, cōstringit. quarta causam fluxus remouet. Prima completur ex his quæ actū & potētia, ut utroque modo infrigidant interius & exterius applicitis, ut si hepar sit in causa, aut cerebrum propter superfluum calid. & similiter uniuersum corpus infrigidetur cum aceto, aqua rosacea, suc. semperuiuæ, solatri & similibus, quæ sint actū & potētia frig. sed sint propria membris quibus applicant, & si totū corpus sit in cā, totū corpus in aqua frigida infundant, uirtute & reliquis contentientib. & interius sumat syrupum de papauere & similia, præcipue infrigidetur testiculi cum aceto & aqua ueri frigoris. Secunda intentio, scilicet diuersio per ficitur stringendo fortiter adiutoria. prope ascellas & coxa, prope inguina & mammillas in radicibus suis, & testiculos quæ ligaturæ sint dolorosæ, & sepe remouentur. Item ponatur uentosa super hepate si fluat ex nare dextra, & super splene si ex sinistra, & super utroq; si fluat ex utraq; & ponatur super sumine & super spatulis & super noenam conferunt. Item diuertatur sanguis cum phlebotomia. Et si fuerit magna repletio in toto fiat ex saphena uel ex aliis uenis pedis eiusdem lateris. Et si hepar fuerit in causa, phlebotometur basilica. Si uero repletio fuerit parua aut à furcula supra, phlebotomet cephalica dextra aut sinistra, & fiat semper phlebotomia subtilis & hauriatur quantitas sang. secundum quantitatem repletionis & tolerantie uirtutis, imo lipothymia si superuenit, esset efficax remedium stringendo sanguinem. Sed consulo quod si fluxus dat inducias ut quia non sit impetuosus uel fortassis sit periodicus, quod potius reiteretur phlebot. quā quod magna quantitas una uice extrahatur, sed impetuosus & non dante inducias iudico contrarium. Sed Mesue dubitans à qua istarum duarum intentionum sit inchoandum, in actu practico, dicit & bene. Quod si fluxus sanguinis est propter calid. & subtilitatem, inchoetur à prima. Si uero propter multitudinem tantum, aut multitudinem cum acuitate simul à secunda est inchoandum, quamuis eadem hora sit ad ambas festinandum. Tertia intentio scilicet cōstrictio ductuum & uiarum perficitur cum frig. actū & potētia, & stipticis applicitis super loca uiarum & transitus sang. ad nares, & cum debita cōstrictione, quapropter applicantur acetum & aqua ros. & similiter suc. frig. iam dicti singulariter aut coniunctim circa collum, ut oppilentur & claudantur uenæ, deferentes sanguinem ad caput. hoc idem fiat circa frontem & tempora & si opus sit maioris cōstrictionis suprascriptis, possunt addi bolum armenum, terra sigillata, sang. draconis, albumen oui, trochilci de karabe de terra sigillata & similia. Quarta intentio, scilicet remotio causæ perficitur hoc modo. Nam si cholera fuerit in causa calefaciens, subtilians, mordicans, & stimulans uirtutem expulsiuam euacuetur cum decoctione prunorum, tamarin. mirob. citrin. cum pauco calsie aut maniz. Si uero aquositas esset in causa educatur cū decoctione

aut suc.ireos & similibus, sint tamen admixta cum mirobalanis chebulis, bdellio & similibus costringentibus. Et in hoc casu prima intentio iam dicta non habet locum. Et tertia intentio complenda est calidis, & sic. Stipticis inuiscantibus, sicut cum thure, mastiche, alumine, nuce cupressi & similibus, quæ tam in decoctione, quam in substantia possunt applicari ad costringendum vias & transitus. Et nota quod ubi fluxus esset periodicus, aut daret inducias, hæc intentio quæ est quarta deberet esse prima, sed in fluxu non dante inducias debet esse quarta &c.

Secundum regimen, scilicet particulare siue locale completur cum medicinis naribus impositis costringentibus secundum unam aut plures harum quinque virtutum. Prima est virtus infrigidatiua congelans sanguinem & incrassans. Et istæ sunt sicut opium, hyssopus, camphora, mandragora, papauer, solatrum, semine lactuæ & suc. eius, semperuiui. Aliæ sunt cauterizantes, facientes escaram, sicut arsenicum, calx, colchotar, calchantum, æs vltum, flos æris & similes. & Cauterium actuale ubi conuenienter potest applicari, obtinet principatum. Conglutinatiua vero sunt sicut farina volatilis albumen oui, charta combusta, spongia marina combusta, pilus leporis & coagulum eius, fumus thuris & thus, aloes, gypsum, gummi asstum, drag. combustum, pennæ combustæ, & rastra leberis terre qui sæpe steterit ad ignem. Aliæ sunt vehementer stipticæ, vt rosa, semen eius, suc. barbae hircine, galleg. suc. palmæ, balaustia, cortices granatorum, alumen, hæmatites, myrrha, karabe, sang. draconis, bolus armæ, terra sigillata acacia, suc. rubi, suc. foliorum pisorum & similes. Aliæ enim à proprietate retinent, sicut stercores asini odoratum in sufflatum. Si militet stercores porci, suc. porri, suc. basiliconis, menta & plura his similia. Cerebella autem gallinarum comesta in magna quantitate retinent sanguinem fluentem de pelliculis cerebri. Et secundum sententiam Gal. quinto de ingenio sanitatis, thus & aloes incorporata cum albumine oui, ita ut habeant mediocrem ipsitudinem, sicut mel, excedunt omnes medicinas in costringitione sanguinis fluxus ex pelliculis cerebri. Et in hoc medicamine secunda virtus aloes, quæ est inuisccatio reducitur ad actum, & non tertia per quam aperit officina venarum. Vbi contra, si in potu fumeretur tertia reduceretur ad actum, & non secunda, vel saltem magis operaretur per tertiam quam per secundam. Securiore tamen medicinæ, & ceteris prælegendæ sunt stipticæ inuisccantes, restringentes à forma specifica. Frigidæ enim congelantes corrumpunt spiritum, & calorem innatum, sed in approximatione cauterizatum est timor de casu escaræ & de fluxu vehementiori. Istæ vero medicinæ aliquando applicantur sub forma pulueris, & sunt subtilissime puluerizandæ, & elaborandum est, vt bene adhæreant. Aliquando approximantur stuellæ, siue tentæ infusæ in ipsis, & elaborandum ut bene obturæ nares, & multum ad superiora transeant, neque remoueantur nisi postquam de fluxu sanguinis securi fumus. Sunt tamen aliquæ medicinæ, quæ portatæ, vel suspensæ collo, stringunt sanguinem, sicut iaspis & similia. Tertiū regimen respicit accidentia, subueniunt ergo debilitati virtutis cum uino, aqua carniū, & similibus. Item si sanguis transiret ad pulmonem procuraretur eius extractio, & melius esset, ut transitus eius ad pulmonem prohiberetur frequenti extractione eius quod descendit. Et similiter prohibeatur eius transitus ad stomachum, & si transiret uomitu educatur, & si transierit ad intestina cum solutiuis, & sang. discoagulatis per os sumptis, & cum clysteribus &c. Regimen autem sex rerum non naturalium declinet ad frigidum & siccum, scilicet aer, & cum hoc sit boni odoris, unde sternantur in loco habitationis folia pisorum, citoniorum, mespilorum, sorbarum rubi, & similia, & sit aer aliquantulum obscurus. Et pauca etiam habeat vestimenta, & non stricta, & proprie circa collum. Et nihil teneat in capite, & stet capite eleuato. Cibi sint similiter huius intentionis frigidi, sic stiptici, uiscosi. Et bibat aquam calibeatam. Et comedat pedes & extremitates animalium, & pisces uiscosos, somnus sit multus, sed interruptus, ne sanguis declinet ad pulmonem uel ad stomachum, & dormiat capite eleuato, procuraretur uentris solutio cum clysteribus leuibus, & similibus non agitantibus. Nares autem non demuet, aut demuet minus quā pōt. Sit quietus animo & corpore, ita vt vix loquatur, & ca-

ueat ab ira, furore, gaudio, timore tñ adiuuat ad costringitionem.

De ulceribus narium. Cap. 44.

Vid nominis, & quid rei ulceris narium sunt satis ex dictis manifesta. Species autem sumuntur quandoque ex parte membri patientis, quandoque ex ulceribus in seipsis. Primo namque quædam sunt extrinseca quædam intrinseca. Intrinsecorum autem quædam sunt in alacrisim, & sunt praua, quædam in colatorio, & sunt prauiora. Quædam in carunculis mammillaribus perueniunt usque ad ipsam cerebri substantiam, & sunt prauissima. Et ubicunque sunt, aliquando sunt superficialia, & sunt leuiora, aliquando se profundant sicut cauernæ, & abscessiones, & sunt difficilia. Ex partem autem sui distinguuntur. Nam quædam sunt sicca, crustosa à quibus fere nihil emanat, & sunt superficialia pendentia à uaporibus, aut humoribus aduultis, quædam sunt humida à quibus notabiliter sanies emanet. Et istorum quædam sunt munda à quibus sanies laudabiliter emanat, quædam uirulenta, quædam sordida, quædam putrida, quædam corrosua, quædam fistulæ, quædam cancrofæ. Item quædam horum sunt recentia, quædam chronica & antiqua. Causæ ulcerum sunt apost. aut bo. chor, quæ rumpuntur in naribus. Aut vulnera à causa primitiua illis partibus illata, quæ postea fiunt vlcera. Aut humores acuti paulatim se profundantes. Aut uapores acuti ad partes narium eleuati paulatim excoriantes donec se profundunt. Causæ remotiores sunt quæcunque possunt hos humores & uapores multiplicare, & hi humores quandoque defluunt à capite per uiam catarrhi. Aliquando ab aliis confurgunt partibus, & quandoque in principio cum veniunt ad membrum non sunt aduult, sed postea tandem aduruntur sicut videmus multa apost. à principio non cancrofæ, quæ tandem ad cancerum permittantur. Signa. Vlcera si extrinseca sunt sensui subiacent. Si uero profundentur, ex sanie, aut ex crustis, deinde egredientibus cognoscuntur, & dolore interius sensato, nam ubi dolor ibi ægritudo.

Et si sint in acrisim frequenter obturant nares. Et in colatorio sanies foetens per os egreditur. Quæ si proueniat ex ulcere, & corruptione olis est subtilis. Sed in carunculis mammillaribus nocetur olfactus. Et si proueniat ad cerebri anterius tandem nocetur sensus communis & adest febris. Et si profunda sint & ampla, ex egressione multa saniei. Si munda, etiam ex sanie laudabili. Si sordida ex sanie crassa, si virulenta, ex sanie subtili. Si putrida ex foetore saniei. Si corrosua ex exitu sang. cum sanie, aut post saniem corrosione tendente ad partes sanas. Cancrofa ex signis canceri cognoscuntur, maxime ex dolore fulmineo cum sanie foetentissima inde egrediente. Sed fistulæ ex antiquitate, & sanies communiter est subtilis, quæ aliquando paucificatur, aliquando multiplicatur. Causæ autem vlcere sunt ipsas ostendunt. Prognostica. Primum. Vlcera extrinseca superficialia, munda, retentia facile curantur. Secundum. Occulta profunda immunda difficillime curantur maxime ossibus narium, & colario cõcicata. Putrida uel corrosua cancrofæ maxime carunculis mammillaribus, & cerebro communicantia plurimum sunt perniciofæ. &c.

¶ Vm in naribus fuerint escaræ, cera & oleū, & adeps gallinaceus eis immittatur. Et aquam calidam naribus in mane multoties per aliquot dies odoret. Cūque pustula egredi cœperit, lichinium aceto forti infusum in quo sal positum sit naribus immittatur, ac super eas similiter ponatur, siccabuntur enim ex hoc, & non prolongabitur earum mora. Quod si ulcera ibi affuerint, unguento de cerussa curentur.

Diuiditur hoc caput in duas partes, primo ponit curam ulcerum, quæ sunt sicca crustosa. In secunda ibi. Quod si ulcera &c. Ponit curam ulcerum humidorum. De prima dicit, quod cum in naribus sunt escaræ, & crustæ, primo debet æger odore frequenter aquam tepidam, idest uapores aquæ calidæ ad nares recipere, postea immediate naribus imponere unguentum hoc. R. adipis gallinæ, olei ana. 3. s. vel quantum vis, ceræ quantum sufficit, fiat unguentum molle, hoc ter aut quater in die ponatur debite calidum, & continetur quousque escaræ ceciderint, & post earum casum stuellæ ex cortice in aceto solito infusus naribus immittatur, & aliquoties replicetur,

tur, ex his enim medicaminibus eger satis cito sanabitur. De secunda parte dicit, quod si ulcera, scilicet humida in naribus fuerint, curantur cum vnguento de cerusa, cuius descriptio notissima est, & proprie apud Mesuem, & maxime si ulcera superficialia fuerint, & affuerit ibi mala complexio calida.

Horum ulcerum cura triplex exigit regimen, uniuersale, particulare, & tertium quod est commune utrique. Vniuersale uero quatuor cōpletur intentionibus prima est euacuatio, secunda diuersio, tertia regimen membri mittentis, quarta fluxus interceptio. Pro prima intentione complenda maxime attendatur cacochimia totius, & maxime membri mittentis, ita ut fiat phlebotomia, aut alia euacuatio secundum quod oportet etiam iterata ex suis partibus minoratione, digestione, & eradicatione, quæ qualiter fieri debeat est satis ex sepe dictis manifestum. Secunda, scilicet diuersio completur cum omnibus, aut pluribus generibus diuersionum de quibus sæpe dictum est. Sed ex propriis est uentofatio, aut sanguisugarum applicatio circa secundam aut primam spondilem, sicut ex proprie eradicantibus cām coniunctā, est phlebot. uenarū nasi.

Regimen autem membri mittentis, quod secundum plurimum est cerebrum completur euacuando ab ipso discrasiam eius corrigendo, & confortando, quod qualiter fieri debet, patet ex præcedentibus taliter etiam rectificetur hepar, & cætera membra principalia, & sibi deseruiencia, ut sanguis delegatus ad nares sit conueniens in quantitate, & qualitate. Intercepitur autem fluxus vngendo nares circuncirca cum defensiuo facto ex bolo arme. aceto, oleo rosaceo, aut sibi similibus, secundum discrasiam exigentiam, & similiter ponendo stiptica, fluxus ad nares prohibetia, fronti & temporibus si per eam regionem materię fluxerint. Secundum uero regimen, scilicet locale, si vlcus fuerit crustosum perficitur duabus intentionibus. Prima est mollificatio cum vnguento in textu dicto, & uapore aquæ calidæ, aut aliqua decoctione mollificante, prius naribus applicita, & ex propriis est butyrum recens. Et si affuerit caliditas misceantur cum oleo uiolaceo, aut mucilagine psyllii, aut mucilagine sem. cytoniorum. Et si non fuerit caliditas cum oleo sesamino, amygd. dulcium, & pinguedine gallinæ, mucil. maluanisci, sem. lini, & similibus, & escara remota infundatur stuellus in aceto salito, & expressus aliquantulum inuoluatur vnguento de cerusa, aut tetrapharmaco facto, scilicet ex lythargyrio, aceto & oleo, aut cum vnguento de thutia, & naribus immittatur. Si uero vlcus fuerit humidum & mundum solum tres exigit intentiones. primo scilicet mundificationem complendam cum aqua mellis, quod sit sub quadruplum ad aquam, & si sit cum signis frigiditatis, cum vino decoctionis mellis, & bulliat ad consumptionem tertię partis. Secundo, carnis generationem, complendam cum his, quæ dicta sunt in cura ulcerum aurium, ab illo tamen potest demi ziniar cum huic minus sicca debeatur quam auribus, & magis sicca quam oculis. Vnguentum quoque tetrapharmacum, & de cerusa est adhuc conueniens, & cum hoc complebit etiam tertiam intentionem, quæ est si gillatio, & si opus est confortetur cum pauco colcothar, aut alumine. In vlcere uero sordido indigemus maiore abstersione, sicut oxymelle simplici, & etiam scyllitico apud maiorem necessitatem, & postea generetur caro, & cicatrizetur secundum opportunitatem. Sed in virulentis maiori indigemus exiccatione, sicut sangu. draconis, scoria ferri, thutia, cadmia, & similibus cum succ. plantaginis, quibus apud maiorem necessitatem posset addi aliquid aluminis, aut aliquid paruum aquæ aluminosæ, & pauca indigemus abstersione. Et hæc etiam cicatrizabunt, & proprie si ponatur in forma pulueris: Et si thutia aut cadmia misceantur cum thure aut sarcocol. cum oleo ros. & cera carnem generabunt. Si uero vlcus fuerit putridum cum carne, aut osse corrupto, aut corrosiuum, aut fistula, quatuor exigit intentiones, scilicet corrosionem, aut cauterizationem complendam cum ferro ignito figurato secundum exigentiam partis cauterizandæ, & proprie si malicia fuerit magna. Et melius est si ferrum illud ignitum immittatur per cannulam ferream circulatam luto sapietia, siue alchimistarum, aut cum medicina corrodente, aut caustica. Et ex leuibus est vnguentum Aegyptiacum, & fortius illo est quod fit ex viridi æris alum. melle, ana partibus æqualib. & adhuc fortius est quod fit cauterio facto cum capitulo dissoluto, fortis-

simum autem omnium est arsenicum sublimatum. Sed non potest nisi in pauca quantitate, scilicet ad quantitatem grani mellicæ, aut grani frumenti. Ex eo tempore quo istæ operationes fiunt tueantur partes circumstantes cum aquis, & succis frig. postea procuretur casus escaræ non quidem putrefactibus, sed cō vitello oui, oleo rosaceo, & pauco cerusæ, aut cum stuello in lacte infuso, & postea locus mundificetur cum aqua mellis, tertio caro generetur. Et tandem cicatrizetur. Et si esset os discoopertum, tentetur ipsius squamatio, & ossis corrupti emissio cum alumine, aut uitriolo sæpe super osse iterato. Si uero vlcus esset occultum, & profundaretur ad colatorium, & ad partes distantes mundificetur cum hydro-melle attracto per nares. Et si opus sit maiori exiccatione addatur oxymel simplex, aut compositus. Et adhuc apud maiorem necessitatem, & ubi esset caro putrida, addatur vnguentum Aegyptiacum, & per nares fugatur, sed melius est, ut capite conuerso ad posteriora per nares huiusmodi infillatur etiam fortiter sugendo. Quidam præcipiunt filum fugi per nares, & eleborare, ut descendat per os, & habeat plures nodos, & in modum ferræ trahatur, & retrahatur donec locus sanguinet. Quæ operatio mihi videtur satis vana & fortuita, secabitur enim non secādm. Sed forte in hoc posset esse aliquid iuuamentum, ut in extremitate fili ligetur aliqua petia subtilis linea, & vnguento aliquo vngatur, aut aliquo liquore ut attrahatur superius per filum egrediens, per os, & ibidem dimittatur usque ad sequentem mutationem, & postea in sequente mutatione illi petiæ, quæ secundum aliquam partem remansit extra nares sumatur alia petia consimiliter vincta, & attrahatur, debet autem petia illa esse vincta aut infusa in liquore conueniente ad intentionem quam queris, scilicet corrosionis, mundificationis, consolationis &c. Sed maxime cum opus est superflua corrodere: Aliter & melius possemus primam petiam abiicere, & filo interius remanenti aliam innectere, & ad superiora trahere. Dicit enim Mesue quod consuetudinarie vlcera, id est longo tempore consueta ex defluxu, scilicet materię ad nares, quæ sunt sicut crustæ & bohor rub. coloris, & asperitates curantur cum duobus cauteriis positis inter labia, & gingiuas iuxta dentes caninos, & ascendunt hincinde ad colateralia nasi, & debent fieri cum duobus stillis ignitis, & debent etiam dimitti aperta longo tempore, ut materia illuc deriuetur. Filius Zachariæ, medicamen conficiens vlceribus narium. R. cerusæ, lithar. plumbi vsti, ana partes æquales, lauentur pluribus uicibus postquam fuerint trita: deinde fac vnguentum cum uino, & oleo myrrhino diu conterendo in mortario, nunc uinum, nunc oleum, usque dum inspissetur, & sit mortarium de plumbo, & similiter pistellum, & proprie quando vlcus esset cancerosum, & tunc dimittatur uinum, & ponatur succ. solatri, cadmia quoque, & thutia sunt in hoc casu præstans. Ex medicinis communibus est, ut sumatur granata acetosa, sed melius est succus eius contritus cum tota substantia sua, decoquatur in uase æreo post ipsius contritionem donec perueniat ad medietatem, & liniatur ex ea & tenta administretur. Tertium regimen corrigit accidētia doloris quod perficitur cum lacte naribus imposto, aut uitel. lo oui, & oleo ros. & similibus mitigantibus ardorem sequentem medicinas acutas. Regimen autem vitæ declinet ad siccum com temperamento actiuarum, verum tempore huiusmodi fortium operationum sicut cauterizatio cum ferro, aut medicinis acutis, sit diæta tenuis, siue vino, & carnisbus declinans ad frigidum.

De polypo et hæmorrhoidibus nasi. Cap. 45.

Irca rubricam sciendum, quod reperiuntur isti termini hæmorrhoids, alharnabet, polypus, qui significat carnes additas in naribus, et frequenter hi termini accipiuntur, ut synonymi. Sed uim vocabuli considerati apparebit quod hæmorrhoids de qua hic est sermo, sit additio carnosæ in naribus a qua sanguis facile profluit. Hæmorrhoids enim græce, fluxus sang. latine, hoc autem est, quia oritur ab extremitatibus uenarum, quæ ad nares terminantur. Alharnabeth uero, et polypus important additionem carnosam in naribus non connotando pronitatem ad fluxum sang. sed ex intentione Auic. videtur posse elici alharnabeth, siue polypum esse carbem duriorem quam sit hæmorrhoids. Polypus autē dictus est hæc ægritudo ad similitudinem carnis piscis, qui

qui polypus dicitur, qui tendit in albedinem, aut quia habet multos pedes, id est, radices quibus naribus alligatur sicut polypus piscis, qui propter hanc causam multipes dicitur. Et bene consideranti apparebit huiusmodi carnes esse morbum in numero cum sit aliquod additum supra partes narium sensibilibiter laedens operationes. Polypus, siue hæmorrhoids est duplex. Est enim alter quædam caro mollis alba, aut rubea, à qua humid. profluunt sine dolore, habens radicem gracilem, quæ caro aliquando multum prolongatur donec nares egrediatur. Aliquando transiens per palatum apparet in ore. Sed alter est caro durior tendens in rubedinem uel fuscedinem, à qua minor humiditas profluit exilis cum dolore, habens radicem firmiorem, & communiter minus prolongatur, & hæc aliquando malignata materia propter incisionem, aut approximationem medicinarum acutatur, aut ex longitudine temporis cum malo regimine fex rerum non naturalium uertitur in cancerum. Aliquando tamen in naribus fit cancer, incipiendo, qui incipit sicut faba parua, durus, fusci coloris, cum dolore fulmineo secundum radicem in profundum affixus, & incipit secundum plurimum in parte inferiori nasci, qui ualde tandem augmentatur donec nares impleat ipsas ualde extendens cum magna duritie, & communicatur colatorio apprens in palato cum dolore & duritie, & cum ulceratur emittit uirus foetentissimum, & incrassantur labia ulceris, & inuolantur.

Ex his manifestæ sunt species polypi siue hæmorrhoidis. Est enim quidam mollis, quidam durus, quidam paruus, quidam magnus ualde elongatus donec extra nares pendeat, aut in ore appareat, & communiter quanto est mollior magis prolóngatur, quidam antiquus, quidam nouus, & quidam habet radicem suam superius ualde affixam in superiori parte. Quidam in parte inferiori, quæ sensui subiacet, & est aliquando una caro, aliquando plures, quæ habent radices suas diuersas, & est aliquando cum fluxu sanguinis aliquando sine. Et Mesue ponit q̃ aliquis est mollis, foetidus, putridus, qui fortasse non sanatur, quod potest esse uerum, quia corrumpit partem in qua &c.

Causa autem materialis sunt humores à cerebro secundum plurimum deriuati, aliquando in naribus paulatim congesti ex nutrimento, scilicet ipsorum, qui in hanc carnem paulatim, & in longitudine temporis conuertuntur à uirtute nutritiua, aut augmentatiua ad hoc concurrente sua complexionem, & spiritu uitali, & naturalia ut forma carnis inducatur, cuius carnis finis in quantum morbus est, ut noceat operationibus narium, qui tamen finis est præter intentionem uirtutis, sed finis ipsius in quantum caro intentus à uirtute est, ut ipsa conseruetur, humores autem isti, qui subiiciuntur pro materia carnis mollis alba sine dolore sunt à prædominio phlegma, quibus aliqua pars sanguinis est admixta nulla participante aduisione. Materia autem carnis durioris tendentis in colorem rubrum, & aliquando fuscum, sunt humores phlegmat. & sanguinei per aduisionem tendentes in melanco. & quædoque cum his permiscetur aliquid cholera, aut melanco. propter cuius admixtionem aliquando redunt in fuscum huiusmodi additiones. Materia autem cancri potest esse, quæcunque melanco. adusta, hoc autem non est caro, sed aposte. Signa ex iam dictis sunt manifestæ, & est quilibet polypus, cum opilatione foraminis nasii, & impedimento respirationis, & species ipsius manifestæ sunt ex iam dictis, & signa, distincta inter eas, & signa quibus à cancro differunt &c.

Prognostica. Primum. Huiusmodi carnes molles albae sine dolore facile curantur, timor tamen magnus est cū sunt hæmorrhoides de superfluo fluxu sanguinis. Carnes duriores cum dolore difficulter curantur, & transeunt in cancrum. Secundum prognosticum. Cancer etiam incipiens, curari non potest nisi tota substantia cui affixus est eradicetur. Illi ergo cancri sunt incurabiles, qui non possunt propter loci notabilitatem eradicari.

Quam intus in naribus caro superflua mollis, & quæ si dissoluta, rubea, aut alba exorta fuerit, & nares incrassari cœperint, ac ex carne prædicta repleti cephalica prius erit phlebot. deinde lichinum ex unguento

uiridi, quod in cap. de corrodentibus carnem nominauimus liniendum, & naribus erit immittendum. si uero istud non suffecerit; medicamen acutum, quod ibi descripsimus apponatur, donec ex toto mundificetur. hæc passio præterea quandoque curatur cum ferro radicitus omnino, quandoque incidendo. medici tamen in hoc errant. unde ex eorum cura æger maximum incurrit nocumētum; in hoc namque loco cancer plerumque exoritur. uerum cancer quando in hoc nascitur loco; nec tolerat acutas medicinas, nec incisionem, quæ cum ferro fit: imò indiget, ut suauiter tractetur, & medicaminibus lenientibus, & phlebot. & uentris solutione curetur. cognoscitur autem, an illud accidens sit cancer: quia est durus pertingens quandoque usque ad palatum. sed, cum nares sicæ sint, & duræ, nec fit in eis aliqua humiditas. summopere cauendum est, ne hæc ægritudo, aut similis ferro, aut acuto medicamine tangatur. si autem, quod in naribus exoritur, caro est mollis, fluxerintque ex eis humores, & cum nares stringuntur, inueniuntur molles: & cum tanguntur; tactus non sentitur solidus; non est timendum, quin ex medicaminibus acutis, & ferro mederi possint.

Diuiditur præsens caput in partes tres. In prima notificat hanc ægritudinem. In secunda ibi. Cephalica prius erit phlebotomanda. ponit curam eius. In tertia ibi. Medici tamen, docet quendam errorem euitare. Quod dicit in prima parte notum est, per dissoluta, intellige quod habeat radicem, & tenuem, & exilem. Quod dicit in secunda parte est etiam manifestum. Sed unguenta illa corrodentia, & cauterizantia require septimo huius cap. de medicinis, quæ carnem superfluam remouent, quorum descriptionem ponam, quando ordinabo curam. In tertia parte docet euitare errorem, quem medici plerumque incurunt.

In hoc namque loco plerumque fit cancer, aut incipiendo, aut permutando, qui neque curatione cū ferro, neque fortes et sustinet medicinas, imò medicinis blâdentibus, phlebotomia, uentris solutione, & conueniente uitæ regimine ad frigidum & humidum declinante curandus est. Quapropter signa distinguenda inter polypum non malignum, & polypum malignum tendentem in carne, imò cancrum ipsum sunt bene consideranda. Cū enim fuerit durus, fusci coloris, non emittens humiditates coicatas palato cum dolore fulmineo, & radicibus magnis non gracilibus non est procedendum in eius cura ferro, aut medicinis acutis. Vbi uero adsint contrariæ conditiones cū ferro, & medicinis acutis curari potest. Immo cancer ipse incipiens, exiens sicut faba parua, non debet ferro, aut medicinis acutis curari, nisi uoluntas sit ipsum cū tota parte cui affixus est eradicare.

Cura polypi septem exigit intentiones. prima euacuat. secunda diuertit. tertia materiâ fluentem intercipit. quarta polypum remouet. quinta consolidat. sexta corrigit accidentia. septima ordinat regimen. Prima intentio, & secunda complentur cū extractione sanguinis, sive plurimū phlebotomia, aut uentofatione, aut sanguifugarum applicatione, si non toleret phlebotomia. Prouocatione hæmorrhoidarum, & menstruarum si fuerint in causa eorum retentiones. Et phlebotomia uenarum non nocet, & cæteris diuersionibus præterquam per nares usque ad cauterium in commissura coronali. Phlebotomia uenarum nasii, & fluxus sanguinis narium potius eradicant quod diuertant. Fluxus materiæ intercipitur iuxta tertiâ intentionem cum stipticis applicitis fronti, & temporibus si fluat per partes extrinsecas. Si uero per intrinsecas. potius nocent quod conferant. Sed cum inciditur & cauterizatur polypus, est conueniens, ut fiant huiusmodi defensionis fronti, temporibus, & circa nasum, ne ex defluxu humorum propter dolorem loca illa apostementur. Quarta intentio perficitur si fuerit ex mollioribus, trahendo ipsum cum tenacula dentata per quamcunque partem appareat quantum est possibile, dummodo non ruptur. Et incidatur in radice sua, ut nihil, aut minimum de eo remaneat, ut cum forfice subtili, stricta, aut cum raspatorio subtili, paruo, cuius sit possibilis in nares ingressus, aut cū cultello, non ex lateribus incidente, sed solum sive extremitatem

tatem suam, quæ sit lata, & optime incidens. Et si dubitetur de fluxu sanguinis huiusmodi instrumenta cum quibus fit sectio igniantur, postea residuum cum ferro ignito, aut cum medicaminibus acutis, de quibus infra consumatur. Si uero abhorrentur huiusmodi operationes, aut apte fieri non possunt, consumendus est cum medicinis acutis, quæ in radice sua ponantur. Et si pro his operationibus perficiendis nares non sint sufficienter apertæ, aperiantur, & apertæ teneantur cum speculo nasi, cuius figura est hæc in margine depicta. Deinde stuellus decocto inuolutus in unguento uiridi à Rasi descripto. 7. huius super radice ponatur. R. uiridis æris bene depurati mel. ana. 3. i. optime permisceantur. Et hoc etiam confert in corrosione carnis in naribus superflua, & sic medicetur mane & sero donec fiat escara fortis. Aliud fortius, & citius expediens est, ut stuellus infusus in aqua forti, scilicet qua separatur aurum ab argento, aut in aqua dissolutionis cauterii super radicem imponatur. Escara autem perfecta procuratur eius remotio cum uittello oui, cum oleo rosæ mixto donec cadat, & si tota radix consumpta sit, ita ut separatur bene est. Si uero non, idem medicamen, & eodem modo replicetur donec tota consumpta sit, & stuelli illi sint cum filo ligati quod pendeat extra, & aliquando imponimus per os & nares super radice polypi stylum in extremitate sua cotto inuolutum, & infusum in aqua forti sapius replicando donec fiat escara, sed oportet, ut aqua illa sit ualde fortis, sicut illa cuius descriptio est apud Rasim. 7. Alman. cap. de his, quæ minuunt carnem. R. arsenici citrini, alchalis, id est cineris facti ex herba salia inuenta in litore maris, calcis uiuæ, uiridis æris ana. lib. i. argenti uiui lib. i. salis armo. 3. 3. terantur omnia cum aqua donec argentum uiuum sit extinctum. Et forte melius est quod aqua illa sit aqua fortis facta ex calce, & cinere, & in summa sit capitellum, postea exiccetur, & exiccata iterum terantur: deinde in alambico alchymistarum totum sublimetur, & quod sublimatum est, in ampulla uitrea totum reseruetur: est enim faciens operationem ignis, & ad hanc intentionem est calidicon in eodem cap. à Rasi descriptum, hæc operationem maxime facimus cum apparet in ore, cum ibi apte non possint medicinae dimitti. Operatio autem Mesue, & Auic. est cum tribus pilis caudæ equi nodatis in tribus, aut quatuor locis, & contortis adinuicem, & retractis nunc per os, nunc per nares in modum seræ, quæ operatio est factis fallax, & fortuita, cui parum intendendum est. Verum cum polypus est occultus si attrahatur per nares filum, in cuius extremitate sit futa petia unguento, aut aqua ad hoc propria intincta est causa, ut medicamen applicetur super polypo, & applicatum remaneat, & in secunda mutatione parti petiæ, quæ remanet extra nares suatur alia petia, & similiter per nares trahatur, & sic fiat quousque uolueris. Sed melius est, ut prima petia abiiciatur, & filo interius remanenti alia petia confutur, & in nares cum eodem filo trahatur, & sic fiat in qualibet mutatione, quandoque tamen in auferendo polypum procedimus cum medicinis lenibus ipsum in longo tempore auferentibus, ex quibus est medicamen Gal. R. ex tribus generibus granatorum partes æquales, & tere ea secundum totalitatem eorum, & extrahe succum ipsorum, & decoque in essentia rob tennis: deinde tere substantiam granatorum contritione multa donec fiat sicut pasta, & fac cum succo eorum formas similes nasalis, & intromitte ex eis in naribus unam post unam, liniendo semper cum succo prædicto, ita ut attingant radicem polypi, efficit enim operationem suam sine dolore, & tandem sanat, & est expertum. Si autem non sufficienter imprimeret, adde ex trochiscis alcardicon aliquid parum, uel ex medicamine in principio descripto facto ex melle, & uiridi æris. Confectio trochiscorum alcardicon consummentium polypum, cancerum, & omnes additiones carni in omnibus locis. R. calcis non extinctæ, arsenici citrini, ana. par. 2. colcothar. flor. æris, alumi. ana. par. 1. gallarum, balaustræ, ana. partem. s. contere ea in mortario æneo cum aceto forti contritione multa usque ad quinque dies: deinde fac ex eis troch. & in uase uitreo conseruentur in loco frigido & sicco, & distempera unum eorum cum uino, & utere cum lichinio, est enim expertum. Diosc. medicamen auferens polypum cancerum. R. feminis Iusid est, serpentariæ, tere cum succo malorum gran. tritorum

cum cortice suo, & liniatur super polypo, & in circuitu eius. Idem etiam operatur succus radicis eius, & proprie lana ex aliquo eorum imbibita, & immissa naribus, est enim expertum. Item xylocaracta contusa, & immissa super polypo cum lana, aut cotto, corrodit enim, & cadere facit polypum, sicut facit cadere verrucas. Similiter nuces cupressi puluerizata. Et Auic. dicit se expertum fuisse attramentum, & uiriolum uiride tritum, sicut alcohol insufflatum in naso, sed melius est, ut aliquid ipsius cum molera subtili super radice polypi ponatur, aut stuellus infusus in oxymelle simplici, in quo puluis eius sit supra positus, sanat enim si mane, & sero aliquibus diebus continetur. Si uero dubitetur ne cancretur, aut forte ne cancer nouus incipiat, portet crystallum, & ipso in cibo & potu utatur, nam præseruat à cancro, similiter polithricum portatum. Medicinæ diuersæ posita sunt, ut eis secundum opportunitatem utaris, nunc leuibus, nunc fortibus secundum diuersitatem polypi in duritie & mollietie, & secundum eius resistentiam. Cancer uero, & polypus cancerosus curatur cum blandientibus sicut cum unguento de cerula, & cum mineralibus, sicut thutia præparata, cerula, cadmia, & similibus, in mortario plumbeo, cum oleo rosa. & succo solatri diu agitaris, & pinguedo cancerorum in mortario plumbeo, & cum pistello plumbeo diu malassa ta est in hac dispositione proprium: hæc tamen non curant, sed prohibent eius augmentum, & ulcerationem. Scribit tamen Auicem. quod succus expressus ex uua, quæ est super extremitate serpentariæ, & cum lana, aut cotto impositus destruit omnem carnem additam, & cancerum, sed facilius est dicere quam facere. Consolideatur iuxta quintam intentionem si cancer, aut polypus fuerit male naturæ cum mineralibus de quibus sermo præcessit. Si uero non malignus sit ex his potest addi thus, sarcocolla, & similia. Accidit corrigenda maxime iuxta sextam intentionem sunt dolor, qui mitigetur cum lacte tepido, uittello oui, & oleo rosa. simul mixtis, & similibus fluxus stringatur cum his, quæ dicta sunt. Cortices autem, quæ quandoque remanent in naribus educantur sternutando. Diata autem iuxta septimam intentionem declinet ad frigidum & humidum, cum est cancerosus. Et similis sit cum exercemur operationes fortes, de quibus supra, sed cum hoc etiam sit tenuis, ut caueat tunc à uino, & carnibus. Si uero polypus sit benignus declinet ad siccum cum temperamento actiuarum. Cancer autem incipiens, aliquando curari potest, sed non nisi incisione profunda eradicante ipsum, & permittatur sanguis egredi multus, & postea satis profunde cauterizetur cauterio actuali, & hæc fiant præmissis vniuersalibus. uerum aliqui moderni profitentur se omnem polypum & cancerum curare ubicunque sit cum hoc medicamine. R. cantharidarum par. 2. arsenici sublimati pars. s. aut plus, aut minus secundum quod uis facere unguentum fortius, aut debilius, incorporentur cum oxymelle simplici, & apponatur, ut bene adhæreat, & quandoque incorporant ipsum cum sapone nigro, & uerum est quod est fortis medicina se profundans, cuius operatio durat tribus diebus etiam si minimum sit quod de ipsa ponatur, & cum apponitur, bonum est defendere partes circumstantes cum succis frigidis, & defensiuo in forma communis, & uerum est si cancer eradicabilis est, eradicat: si uero non, saltem facit curam paliatam, & tota uis est in arsenico. Sed caue, scilicet ne approximes membris nobilibus nam forte eorum operatio destruetur.

De amissione & nocumento olfactus. Cap. 46.

Circa rubricam sciendum, quod licet amissio olfactus proprie dicat eius ablationem, & nocumentum olfactus dicat eius destructionem, diminutionem & corruptum. frequenter tamen hi termini accipiuntur, ut synonymi. Licet Rasi in præfenti cap. per amissionem proprie intelligat diminutionem & ablationem. Est autem olfactus, siue odoratus sensus exterior, quo odores percipiuntur. Cuius nocumentum est triplex, diminutio, scilicet in qua solum odores intensi uix percipiuntur, sicut aromaticum ualde, aut foetensissimum, ablatio in qua nullus percipitur odor, & corruptio existens duobus modis. Aliquod enim percipitur odor esse in medio qui non est. Aliquod unus pro altero repræsentat sicut foetens aromatico,

& contra. Sunt enim aliqui quibus omnia foetent, sunt contra aliqui quibus omnia redolēt, & aromaticū spirēt odorē. Quod etiam nocumentum aliquando est nouum, aliqui antiquum, imò aliquando à generatione contractum. Hoc autē nocumentum frequenter accidit hominī, quia organum sui olfactus est debile propter superfluum humiditatem cerebri in comparatione ad multa animalia. Et propter hoc homo prae odorat, ut dicitur in de sen. & senfat.

Causae nocumenti odoratus quandoque sunt ex decursu ætatis, sicut in senibus non solum olfactus laeditur, sed et auditus et uisus, & ceteri sensus interiores, & exteriores propter paucitatem spirituum & crassitatem, exiccationem substantiam, & multiplicationem humiditatem accidunt. Et quandoque est hoc nocumentum propter egritudines in cerebro, sicut uertiginem, apoplexiam, lithargiam, & similes, & maxime cum laeduntur duo uentriculi anteriores. Et quandoque causae nocumenti olfactus sunt in duobus carunculis mamillaribus à malitia complexionis sine materia cuiuscumque generis, quæ tamen semel plurimum est magis frigida, calida, & magis humida, sicca, aut cum materia cuiuscumque generis, sed maxime phlegmatica. Et materiei huiusmodi quandoque sunt apostemantes, quæ non. Tercio causae nocumenti olfactus quæ sunt in colatorio, id est in foramine oris basilari, & duorum panniculorum propter oppilationem in his foraminibus factam à uentositate, aut à materia cuiuscumque generis apostemante, aut non apostemante, aut carne ibidem nata. Et quandoque defecerunt huiusmodi foramina, sicut etiam potuerunt deficere caruncule mamillares ex defectu uirtutis informatiue. Quarto causa nocumenti olfactus potest esse oppilatio in caecum, aut à materia, & proprie à capite rheumatizante. Et dicitur coriza, aut à carne ibidem nata sicut polypo, hamorrhoides, verruca, & similibus, aut apostemate, quod frequenter est cancerosum. Et quæque est oppilatio in foramine illo propter malam compositionem illorum osium, aut ex tempore, sicut cum premuntur, aut rumpuntur propter percussione, casum aut offensionem, aut forte est illa mala compositio à generatione contracta. Et quæque est oppilatio ista à faba, phaeolo, lapide, & huiusmodi, nares ingredientibus, sicut etiam potest esse à uermibus, crustis, & similibus. Et causae horum nocumentorum semel has quatuor species quæque sunt primitiue, sicut aer malus, cibi mali, potus, crapula, ebrietas, somnus meridianus, & proprie super crapulam, retentio euacuationum consuetarum, & similes. Et causae primitiue magis extraneæ sunt sicut medicinae exterius applicatae, & nares instillatae inducentes aliquam speciem male complexionis, & proprie in carunculis mamillaribus. Item calidus offensiones, & percussiones, de quibus sermo præcessit. Sed causa corruptio olfactus odoratus, ut aliquis odor appareat esse in medio, qui non est, aut quod omnia appareant foetentia, aut bene redolentia est duplex, scilicet, aut corrupta complexio organi olfactus, scilicet caruncularum mamillarum per quas uis olfactus corripit, & corrupte sensui communi representat. At aliquis odor foetens, aut redolens existens in aliqua partium sensatarum suprascriptarum uel in caecum, uel in foraminibus oris basilari, & panniculorum, aut in carunculis mamillaribus, aut in cerebro, aut forte in ore stomachi, pulmone, & partibus inferioribus. Cuius odoris causa est aliquis humor corruptus, aut alia substantia corrupta, aut boni odoris, sicut phlegma dulce existens in aliqua partium sensatarum suprascriptarum. Cognoscitur nocumentum olfactus ex relatu ægri. Sed quod sit ex decursu ætatis senium ipsum declarat, & paulatim factus euentus eius, & nocumentum aliis sensibus commune: si autem sint egritudines in cerebro signa earum iam præcesserunt, & cum hoc alii sensus laeduntur. Si uero causa nocumenti sit in carunculis nocumentum odoratus est maxime continuum, neque appareat nocumentum in cerebro, neque oppilatio in caecum, neque in foraminibus oris basilari, & panniculorum, quia forte superfluitates descendunt per nares sicut consueuerunt, neque adeo nausetas, & prohibitio respirationis, & malitia compositionis cognoscitur, quia sentitur calidum aut frigidum, aut aliqua alia qualitas in anteriori cerebro, ubi sunt caruncule, & quia præcesserunt causae calefacientes, infrigidantes, &c. Tercio, quia laeditur à similibus, iuuat à contrariis, & materia cognosci

tur per grauitatem perceptam, et si egreditur per colorem, odorem, substantiam, & speciem nocumenti, quod imprimitur. Et si apostemata, adeo febris, dolor, granitas, oppilatio uero in foraminibus oris basilari, & panniculorum cognoscitur, quia humiditas solita non egreditur, & adeo ibi dolor, grauitas cum incolumitate caecum, & aliarum partium: non enim est nausetas, & prohibitio respirationis per nares, sicut quando oppilatio est in caecum. Sed causa oppilans cognoscitur aspiciendo in naribus, & proprie sub radiis solaribus naribus cum speculis dilatatis. Cognoscitur enim an sit caro, an apostema, aut crusta, aut humor inniscatus absque apostemate, & si quid nares sit ingressum inspiciendo cognoscitur, & habetur ex relatu ægri, & apostemata cognoscuntur per signa propria. Causae primitiue seipsas ostendunt, quia præcesserunt, & postea huiusmodi nocumentum secutum est. Causa corruptionis huiusmodi odoratus si sit mala complexio sine materia existens in carunculis, aut partibus uicinis cognoscitur, quia odor ille semper apparet eiusdem speciei, & æque intensus. Si uero sit in partibus distantibus non semper sic apparet, & membrum in quo est huiusmodi humor, aut alia substantia corrupta ex nocumentis illius membri comprehenditur, humor autem sine alia substantia redolens coniectura quadam comprehendere potest quo loco sit: quod patet discurrenti. Prognostica. Primum. Nocumentum odoratus, & proprie ablatio antiqua, aut à generatione contracta est incurabilis. Secundum. Quando in egritudinibus acutis æger percipit odorem malum, sicut piscium, luti, aut alterius rei foetentis, quod non est merito alicuius agentis obiecti extrinseci, & à nullo circumstantium comprehenditur cum aliis signis malis, argue mortem. Signant enim debilitatem caloris innati ad quam sequitur putrefactio, quæ secundum plurimum est in partibus cerebri.

Cum sensus, à quo odoranda percipiuntur, amissus fuerit, nec in naribus caro superflua creuerit, & aer ita leuiter, ut prius attrahitur, & oculi, ac sensus naturaliter existunt, naribus erit insufflandus pulvis adeo subtilis, ut alcohol: qui fiat ex conditis, & artanitis, & sale ammoniaco. ægro quoque præcipiatur, ut nares uapori ex acetato calido procedenti multoties apponat si autem hæc non suffecerint, naribus insuffletur pulvis, quem nominabimus, cuius descriptio est Recipe nigella, fellis grani, colocynthidis, ellebori albi, omnium, ana partes æquales. puluerizentur, & ponantur in urina camelli arabici quantitate tanta, qua cooperiri possit. & ponatur ad solem, donec siccetur: deinde fiat ex eis sies. cumque necesse fuerit, unum ex eis lentis habens magnitudinem in oleo sambacino intinctum, naribus immittatur: optimum enim ad hoc existit. si autem ex eo, quod naribus immittitur, fortis sequatur dolor, oleum de semine cucurbitæ eis immittatur; & aqua calida super caput fundatur. & sorbeat calida ea, quæ humectant, ut priscana, & quod sit de aqua fursi, & de farina, & similia. & hoc quidem est medicamen ad amissionem olfactus probatissimum, quod sic conficitur. Nigella puluerizetur, donec fiat, ut pulvis: & misceatur cum oleo ueteri: deinde æger implens os suum aqua declinet caput retro, quanto plus poterit: et tunc ex prædicto medicamine aliquantulum gutte naribus distillentur. ægro quoque præcipiatur, ut, quantum ei possibile est, aerem extrinsecus interius attrahere nitatur: quod in tribus diebus, tribus uicibus fieri conuenit. si autem mordicatio superuenerit: fiat hoc, quod prædiximus.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima notificat nocumentum illud quod intendit curare. In secunda ibi. Nariibus erit insufflandus. Curam profequitur. De prima parte dicit, cum sensus olfactus amissus fuerit, id est, diminutus uel ablati, nec in naribus fuerit caro, nec aliud oppilans, cuius signum est, quia aer ita leuiter respiratur sicut prius & oculi, & ceteri sensus naturaliter sunt existentes, quod arguit nocumentum non esse in cerebro: nam tunc plures sensus

Io. Arculani.

M 2 essent

essent laesi, ex quibus infertur nocumentum odoratus esse, aut in carunculis mamillaribus, aut oppilatio in foraminibus ossis basilaris, & panniculorum, quæ secundum plurimum proueniunt à mala complexione frig. & humid. cum materia phleg. tunc utendum est medicinis infra scriptis. Naribus erit. Diuiditur pars ista in tres. In prima ponit tria medicamina ad hoc propria. In secunda ibi. Si autem ex eo. Docet subuenire ardori ex huiusmodi medicinis contingenti, & proprie ex ultima. In tertia ibi. Et hoc quidem medicamen, ponit aliam medicinam docens similiter ardori ex ipsa contingenti subuenire. Quod dicit in prima parte satis est manifestum. Condisi de quo supra non habemus, sed loco eius accipimus elleborum calidum & sicum in tertio. Arthanita est panis porcinus cal. & sic. in tertio. Et hæc potenter commouent sternutationem prouocando, & cerebrum per nares mūdificat, sal ammo. cali. & sic. in quarto resoluens, & attrahens potenter. Hæc recepta potest sic ordinari. R. ellebori, arthanitæ, ana. 3. i. salis ammo. 3. i. fiat pulvis subtilis, & insuffletur stomacho ieiuno, prius tamen precedente euacuatione. Acetum acutum suffumigatum, & frequenter odoratum est præstans medicina incidens, subtilians, & se profundans, & resoluens, tertia medicina præstantior supra scriptis fit ex nigella cali. & sicca. in tertio incisua, absterfua, resolutiua uentositatum. Vltima mundificat, aperit oppilationes colatorii à proprietate conferens cerebro, & coriæ. et felle gruis cali. & sic. in quarto, colocynthyde, elleboro albo, de quibus superius. De his quatuor accipiantur partes æquales, ponantur in uase aliquo, & cooperiantur urina cameli arabici, & si non habeatur urina asini post ipsorum puluerizationem. Et dimittantur in sole donec siccantur. Deinde fiant ex eis sies, cumq; necesse fuerit unum ex eis lentis habēs similitudinē, id est, ualde parum distemperatur cum oleo ieiulemino, & naribus instilletur capite ad posteriora reuoluto. In secunda parte subuenit dolori ex hoc contingenti cum oleo de semicucurbitæ naribus tepido instillato, & cum infusione aquæ repidæ naribus, & cum diætâ infrigidante, & hum. ut prius sana, & proprie hordei, & cum ferculo factio ex aqua fursur. id est, in qua fursur fuerit infusum, postea colatum, & sufficienter coctum, & cum ferculo factio ex farina de simula, id est, flore farinæ. Quod dicit in ultima parte est manifestum. Est enim nigella expertissima medicina in hoc casu, & proprie si prius fuerit infusa in aceto forti, postea exiccata, siue naribus instilletur, siue odoretur, siue mixta cum aliquo liquore naribus potenter fugatur, siue corpore supino capite conuerso ad posteriora, uel naribus instilletur, siue suffumigetur: hæc enim sola sufficit in mala complexione frig. & humi. cum materia, & siue materia, siue sit oppilatio, siue materia in organo olfactus sit infusa, &c. Superest, ut ordinemus curam nocumenti olfactus. Quod si pendeat, ex decursu ætatiuo nulla est curatio, nisi ad retardandum eius totalem ablationem cum odore rutæ, nigellæ, & frequenti mūdificatione capitis, masticatoriis, gargarismatibus, caputpurgiis per nares. Si uero pendeat ab ægritudinibus cerebri earum cura præcessit. Si uero sit à mala complexione caruncularum, & partium uicinarum, quæ fm plurimum est frig. & hum. Si fuerit sine materia causæ conseruantes remoueantur, disfracata cum contrariis corrigatur, sicut frig. & hum. odorando, suffumigando, fomentando, sugendo, instillando, embrocando, emplastrando, facellando, & omnibus aliis modis applicando calida & sicca, & proprie circa partem anteriorem cerebri, & super commissura coronalis, & cum hoc in hac dispositione propria, sicut est maiorana, spica, ruta, nigella, & muscus, & calamus aromat. & fortiora sunt euphorbium, & castoreum. olea propria sunt, sicut oleum de ruta, de spica, de coito, de ieiulemino. Et si fuerit calida remoueatur cum frigidis, sicut cum rosis, & aqua rosata, coriandro, & aqua eius odorata, atque aceti euaporatione, quibus apud maiorem caliditatem posset addi aliquid camphor. & acetum cū his mixtum facit eorum uirtutem magis ad profundum penetrare. Si uero malitia complexionis cum materia, aut uentositate fuerit in carunculis mamillaribus, & uentriculis anterioribus, & oppilatio in colatorio. Primo materia euacuetur cum coctiis, & hieris si fuerit frigida, & si fuerit calida cum aureis, & si apostemauerit phlebotometur cephalica, & euacuationes iterum fm necessitatem. Secundo, materia diuer-

ta cum diuersionibus coctibus, s. uetofationibus, clysteribus, lotionibus crurium, & similibus, proprie si fuerit comunicata à mēbris inferioribus, & materia existente sanguinea, & proprie apostemante conuenit phlebotomia uenarum nocræ, & uentosa posita in parte posteriori, scilicet in nocræ & spatulis, & similiter sanguifuga. Tercio, materia eradicetur cum masticatoriis, caputpurgiis per nares, gargarismatibus, & resoluatur cū exterius applicitis, scilicet facellis, emplastris, unctionibus, fomentationibus, embrocis, odoribus, & suffumigiis, quæ in omni dispositione cerebri confortent. Masticatoria & gargarismata supra in multis locis dicta sunt. Caputpurgia propria sunt, quæ dicta sunt in textu, & similia illis sunt succus radicis ireos, in quo pulvis pithri sit infusus. Similiter infusio olei nar. in quo aliquid musci, euphorbii, & castorei sit dissolutum, sed parum ualde potatur de euphorbio: est enim nimis acutum, imò sola istorum calidiorum sufficeret infusio absque q. ponerentur in substantia. Ea autem in quibus possent infundi sunt sicut uinum bonum odoriferum, & aliquod ex oleis supra scriptis, & consulo tibi, ut incipias à leuioribus, & gradatim ad fortiora procedas, & si ante horum instillationem, aut infusionem, siue suctionem odoretur, aut suffumigetur acetum: est enim ualde efficax, & ad oppilationē uentosa laudatur caputpurg. ex oleo amygd. amaro montano, & in causa calida in instillatione decoctionis rosarum, coriandri, anethi, & similibus, facelli fiant ex maiorana, ruta, spica, nigella, musco, calamo aroma. floribus genferini, coito, & similibus. Et ex eisdem fiant decoct. in uino, & aqua cum quibus fiat fomentatio, & embrocatio, & cū eisdem possunt fieri emplastra, & unctiones oleis additis propriis, de quibus supra: ex odorandis autem, & suffumigandis est ruta, sicca, & nigella, maiorana, muscus, ambra, laudanum, xyloaloes, & in causa calida rosæ, sandali, poma, & citronia odorifera. Quarto, corrigatur accedentia, scilicet ardor, & dolor confurgens ex huiusmodi medicinis cum his, quæ dicta sunt in textu, & panis, calidus odoratus ad hoc optime confert. Quinto, ordinetur regimen in contrarium disfracæ cauendo ab euaporantibus, & caput repletibus. Procurentur euacuationes à natura instituta. Et exercitium est conueniens stomacho ieiuno, cauendum est à somno meridiano, & super repletionem, & ebrietatem.

Si uero causa nocumenti olfactus fuerit oppilatio in radicem ex humore à capite fluente, recurre ad capitulum deca tharro. Si uero oppilatio fuerit à uerruca, & carne orta in naribus, recurre ad cap. de polypo. Et si aliquid intrauerit nares extrahatur, sicut dictum fuit superius in cap. de his, quæ ingressa sunt aurem. Si uero mala ossis nasi compositio fuerit à causa primitiua os rumpe, comprimente, aut cōtorquente reducatur ad situm naturalem cum ligno rotundo nafo imposito, cum quo os subleuetur, & ad figuram propriam reducatur alia manu adiuvante ad ipsius æquationē. Et post reductionem applicentur, opportuna in hoc casu, ut inquit Auic. Ille autem qui sentit odorifera, & non sentit foetida, nō cesset sibi facere caputpurgia, scilicet cum castoreo, multoties usq; quo rectificetur eius dispositio. Si autem omnia sibi appareant foetida odoret acetum, & suffumigetur cum eo, & fugat per nares oxymel simplex, aut scylliticū cum uino odorifero, aut cū urina asini, & cū his parū musci misceat, & gariophili, aut galliæ muscate, & si opus sit fortibus, addant quædam commouentia sternutationem. Si autem humor ille foetidus fuerit in stomacho, aut in alia parte euacuetur.

De passionibus Dentium. Cap. 47.

Hæc est sexta pars principalis in qua agit de passionibus dentium, &c. Et ante omnia sunt tria præmittenda. Primum est anatomia dentium. Secundum est regimen conseruatiuum dentium. Tertium regimen uniuersale curationis passionis dentium. Dentis ergo descriptiue sunt ossa parua dura in utraque mandibula constituta numero. 32. aut. 28. ad locutionem, sed principalius ad masticationem finaliter ordinata. Sunt quidem ossa parua, quia si fuissent magna tot numero non potuissent in ore, & mandibulis contineri, & sunt duriora cæteris ossibus nostri corporis cum sint ordinata ad conterendū res duras. Et sunt in adultis numero. 32. fm plurimum, scilicet in superiori

16. mandibula, & 16. in inferiori. In aliquibus autem sunt fo-
lum. 28. in superiori, scilicet. 14. & tot in mandibula inferiori.
In quibusdam enim deficiunt quatuor dentes extremi di-
cti neguegid, & sunt dicti dentes sapientie, nascuntur enim
circa medium adoleſcentie cum iam homo coire possit. Duo
anteriores in superiori mandibula vocantur duales, duo alii
ab utraque parte vocantur quadrupli, & isti ordinati sunt ad
ſcindendum cibum, postea sunt duo canini ordinati ad fran-
gendum cibum in crassas partes. Postea sunt octo molares,
quatuor ab utraque parte iam dictorum ordinati ad conte-
rendum cibum. Deinde sunt duo neguegid iam dicti, qui e-
tiam sunt molares ad conterendum similiter ordinati, & tot
sunt in mandibula inferiori ad eosdem fines ordinati. Hi au-
tem dentes inſiguntur in foraminibus exſistentibus in mandi-
bula inferiori, & superiori, quibus multum annectuntur me-
diante additione quadam exſistente in extremitate dictoru
foraminum, & alligantur mandibula mediante carne, & li-
gamentis fortibus. Sex autem primi superioris mandibula
habent radicem unam, & similiter sex etiam sibi correspon-
dentes in mandibula inferiori non habent nisi duas radices;
superioris uero mandibula molares communiter habent tres
radices. Similiter neguegid mandibula superioris habent
quatuor radices. Sed duo neguegid inferiores habent solum
tres. Quod factum fuit, quia grauedo superiorum adiuuat ad
exitum, & casum ipsorum, non autem grauedo inferiorum.
Secundo, quia plures rheumatismi facientes ad casum den-
tium communicantur dentibus superioribus quam inferiori-
bus. Fuerunt autem creati tot dentes, & non unus, ne no-
cumentum partis communicetur toti, & sunt ad locutionem;
quia per ipsos fit refractio aeris ordinati ad prolationem, &
distinctionem litterarum, & syllabarum, & dictionum, qua-
propter carentes dentibus in locutione impediuntur: sunt
tamen principaliter ordinati ad cibum adeo masticandum,
ut possit faciliter deglutiri, imò bona eius masticatio est
quædam digestio, siue primæ digestionis initium. Post hæc
ſciendum, quod dens sentit per neruum uenientem ad radi-
cem eius a cerebro, scilicet a tertio ramo tertii paris neruo-
rum cerebri, quod non conuenit alteri oſi: hoc autem factum
fuit, quia foli dentes sunt discooperiti, & obuiant extrinsecus
alterantibus. ne ergo ledantur, datus est ipsis ſensus, quâquâ
efficax argumentum ſit in contrarium, quod dentes non ſen-
tiant nisi in radicem, cum alię partes non doleant ex solu-
tione continui etiam si totaliter ſecentur. ueruntamen appa-
rent dolere ex contractu cali. aut frig. sed hoc non est quod
illa partes dolent, aut ſentiant, sed quia species cali. & frig.
multiplicantur usque ad neruum exſistentem in radice. Secū-
do ſciendum, quod dentes habent hoc proprium, quod nulli al-
teri membro conuenit, quia ipsi cresunt per omnem decur-
sum ætatis. Vnde uidemus dentes maiores in ſenio, quam in
iuuentute reliquis membris minoratis. Hoc autem factum
fuit, quia dentes ex contritione ſua ſue masticatione quoti-
die minuuntur. Si ergo non creſcerent cito deuenirent ad
non quantum. Et propterea dentes qui non habent sibi cor-
reſpondentes multum creſcunt in comparatione ad alios. Ex
his est manifestus ſitus dentium, quãtitaſ, numerus, colligan-
tia, quia colligantur cum mandibulis, & cum cerebro, & ſub-
ſtantia, & per conſequens compoſitio eorum etiam patet.
Sunt enim frig. & ſic. in comparatione ad medium generis,
licet in comparatione ad mediũ ſpeciei ſuę in aliquibus ſint
cali. & lumi. quod comprehenditur per craſſitatem, & rube-
dinem naturalem gingiuę, in aliquibus cali. & ſic. quod com-
prehenditur per citrinitatem gingiuę, in aliquibus frig. &
ſic. quod per fulcedinem gingiuę cognoscitur. In aliquibus
frig. & lumi. quod comprehenditur per albedinem gingiuę.
Inuamenta patent ex ſupradictis: poſſunt autem pati omne
genus ægritudinis complexionis cuiuſcuque generis cum
materia, & ſine materia compoſitionis, & unitatis cum ali-
quando ſcindantur, rumpantur, concauentur, putrefiant, &
poſſunt pati apoſtoma: nam omne membrum quod poteſt
naturaliter augmentari cum nutrimento, cum ſuperfluitate,
poteſt etiam augmentari præter naturaliter, & ſic apoſtoma-
ri. Patiuntur etiam malas colorationes, & limofitates ſibi
adherentes, & lapides, ſiue gypſum circa ipſos generantur.
Regimen autem conſeruatium dentium decem comple-

tur canonibus. Primus uitet corruptionem cibi, & potus in
ſtomacho, & per conſequens omnem cauſam corruptionis,
utputa ea, quæ merito ſuę ſubſtantie corrumpuntur, ſicut
lac, piſces ſaliti, & ſimilia, poſt poſitionem cibi ſubtilis craſ-
ſo. Motus fortes poſt cibi aſſumptionem, & ante deſcenſum
eius è ſtomacho, nutrientia diuerſa, coitum, & balneum poſt
cibum, & ſimilia. Secundus, caueat à uomitu, & multo magis
ſi uomeret re acetofam. Tertius, euitet cibaria craſſa, uiſco-
ſa, & proprie dulcia, uiſcoſa, ſicut ſunt confectiones de mel-
le, & ſicus ſiccas. Quartus, uitet res duras ad frangendum.

Quintus, congelantia dentes, ſiue ſtupefacientia fugiat. Sex-
tus, res uehementis frigoris non comedat, & proprie poſt
aſſumptionem calidi. Item omnia uehementer calida, & am-
plius poſt frigidi aſſumptionem. Septimus, res dentib. no-
centes ſua proprietate, ſunt porri. Octauus, mundificet den-
tes ſibi immediate poſt cibum ab eo ſuperfluo, quod ingre-
ditur inter ipſos, & proprie cum ligno ſubtili nõ acuto, nec
incidenti, ſed ſit obtuſum cum latitudine quadam, ſicut eſſet
ramuſculus cypreſſi, ligni aloes, pini, roſi marini, iuniperi,
& ſimilium, & hoc faciat abſque multa perſcrutatione ne no-
ceat gingiuę ipſam mouedo aut dentes ipſos, & ſint hæc pro-
prie participantia amaritudinem cum quadam ſtipicitate.
Nonus facta cali mundificatione immediate poſt cibum, ut
ſupra lauentur dentes, & proprie cum aliquo ex infraſcriptis
uinis medię uinoſitatis & ſaporis medii inter dulce, & acre
notabiliter ſtipicis. Et ex conuenientibus ad hoc eſt, ut in
quatuor libris multi conditionati, ut ſupra, poſtquam bullie-
rit ſub racemis circa tres dies, & extractum ſit de ſub ra-
cemis, bulliat in eo una libra ſaluie recentis inciſe in fruſtra
mediocria, & non piſcata, nec lota uſque ad ſufficientem cla-
rificationem ipſius uini: deinde extrahatur, & obſeruetur in
uale bene obturato, uel accipiatur cinnamomi electi. 3. i. ma-
ſtichis. 3. s. gallie muſcate, cubebarũ, ana. 3. 2. ſem. iuniperi. i.
3. 3. radices ciper. 3. 1. ſ. fol. roſi ſina. 3. 6. contundantur omnia
craſſo modo exceptis fol. roſi ſina. & bulliant omnia ſimul in
una brenta uini, ut ſupra conditionati, & ſiat per omnia, ut
ſupradictum eſt, & hoc multum ualeat in paſſionibus neru o-
rum. Decimus canon. Fricentur dentes ſua uiter, & tem-
pore breui, nam fortis friſctio. aut diuturna deſtruit dentium
humiditates naturales, & ad eos trahit rheuma & uapores à
ſtomacho aſcendentes, aut ſaltem ipſos præparat ad hoc re-
cipiendum. ſed friſctio cum equalitate abſtergit dentes, &
carnem gingiuarum confortat, & prohibet lapides, ſeu gyp-
ſum circa ipſos generari, & facit oris odorem bonum. Et li-
cet Auic. præcipiat friſctionem dentium fieri cum oleis cali-
dis, frigidis, aut mixtis ſm exigentiam, nihilominus, quia a fri-
ctio cum oleis eſt abominabilis ſtomacho, ideo omiſſa fri-
ctio cum oleis fricentur dentes cum infraſcriptis cum ua-
dit dormitum, & etiam ſtomacho ieunio quocunq; alio tẽ-
pore ad libitum. R. mellis par. 2. ſach. optimi, par. 1. miſce.
Item aliud. R. pulueris capitis leporis aduſti ad quãtita-
tem auellana, qui puluis ligetur in petia lini rara, & ſubtili. Et
cum hac petia in qua ſit hic puluis ſiat friſctio. Aliud. R. ſalis
uſti ad quantita-tem auellana, mellis quantum ſufficit ad in-
corporandum pro electario, cum quo ligato in petia, ut ſu-
pra ſiat friſctio dentium, & gingiuarum. Ex theriaca quoque
fricentur antiqua dentes omni mane ſemel ſtomacho ieiu-
no, ſcilicet poſt coenam per. 9. horas, ſuper qua friſctione cũ
dicta theriaca dormire poteſt ad libitum. Et nota quod poſt
dictas friſctiones non debent lauari, ne uirtus ſupraſcripto-
rum dentibus amoueatur, & ſufficit huiuſmodi friſctio ſemel
in hebdomada. Et nota, quod medicina conſeruatia den-
tium debent eſſe ſicca, ſed in actiuo temperamento propin-
qua. Si uero dentes eſſent notabiliter læſi, ſiue lapſi in acti-
uis, ad inera tamen latitudinem ſanitatiſ medicina ſint cali.
aut frigida ſm exigentiã lapſus corrigendi. Cauendo tamen
ab intenſe calidis, ſicut in tertio gradu, aut ſupra, ſimiliter ab
intenſe frigidis, & ab his quorum ſapore dentes ſtupent, ſi-
cut acria, acetofa, aut pontica. Sed ſint medicina ſuę exiccã-
tes, abſtergentes, reſoluentes ſuperfluitatem, quæ eſt in eis
cum moderatione, & ipſos confortantes cum ſtipicitate
moderata. Et ex frigidis ſunt roſa ſicca, galla, karabe, mar-
garita, fructus tamarici, & folia eius, cortices arboris mo-
ri, & radix acetofa. Sed calida natura uel artificio, ſicut ſal

ustum, cinnamomum, hyssopus sic. flos schinanti, fructus caparis, & cortex radicis eius, folium, mastix sandaraca, caput leporisustum, xyloal. muscus, capil. uen. fol. cupressi, fol. iuni peri, & cortex radicis eius, cornu cer.ustum, uel nonustum, mentastrum, cortex arboris pini. Acetum uero licet noceat dentibus sua acerositate, & sua substantia subtili incisua, tamen ponitur frequenter in medicinis dentium infrigidantibus, quia iuuat ad infrigidandum, & penetrandum, licet non ita penetret mixtum infrigidantibus eorum frigiditate penetrationem prohibente: & cum calidis, quia iuuat ad penetrandum, & resoluendum substantia sua subtili calida. & nocuumentum suum frangitur cum aliis medicinis propriis dentibus secum mixtis. Medicinæ autem dentales, aliæ sunt dentificia, aliæ mastificantur, aliæ liniuntur, aliæ sunt sicut pastilli, qui ponuntur supra dentes, aut super mandibula, & aliæ sunt cum quibus fricantur aliæ sunt cum quibus dens impletur, aliæ sunt uapores, aliæ suffumigationes, aliæ caput-purgia, aliæ distillationes in auribus, aliæ sunt euacuantes materiam cum phlebotomia, & uentosis ex propinquoibus locis, & aliæ sunt eradicantes dentes quibus utendum est, nunc una, nunc altera secundum quod tuo proposito est conueniens, &c.

De dolore Dentium. Cap. 48.

Circa rubricam dolor dentium quantum ad quid nominis, & quid rei satis manifestus est. Species, siue modi ipsius sunt, quia quidam est intensus, quidam remissus, & quidam nouus, quidam antiquus, & quidam continuus, quidam interpolatus, & quidam pulsatiuus, quidam extensiuus, & quidam pungitiuus, quidam perforatiuus, &c.

Causa dolorosa quandoque est substantia dentium, siue mala complexio calid. frig. & sic. sine materia. Et quandoque, id est, materia, aut apostemante dentem, aut corrodente, aut in ipso uermem generante. Et quique causa dolorosa est in neruo existente in radi. dentis, siue mala complexio siue sine materia, aut cum materia in eo infusa, aut apostemante. Et solutio continui in eo, aut est a uerme pungente, aut a materia crassa, & multa extendente, aut ab acuta subtili in substantia eius penetrante. Et tertia causa dolorosa est in gingiua. Et hæc frequentius accidit propter materiam ad ipsam fluentem, corrodente, apostemante, aut carnem superfluum generantem, aut mollificantem: unde fit prona ad suscipiendum materias malas, que putrescunt in ipsa. Et nocet dentibus putrefaciendo, & commouendo ipsos. Siccitas etiā propter priuationem nutrimenti quandoque est causa doloris, sicut in senibus, & consumptis ex ægritudinibus, siue sint adhuc ægri, siue conualescentes. Et dolor perforatiuus, aut extensiuus quandoque est a uentositate retenta in radice dentium. Sed nocumēti principium apud Auic. aut est ex stomacho, aut ex capite, aut utrisque simul. Et si fuerit totum corpus plenum illa materia, tunc cursus materiæ ex corpore ad dentes erit ex his duabus uis. Et materia ab his membris, aut ab aliis cōducatur dentibus, aliquando sub forma uaporis, aliquando sub forma humoris. Et quandoque dolent dentes in febribus acutis sicut semitam cōtinuitatis in malitia complexionis. Et quando accidit sub aliquo dente corroso dolor pulsatiuus, tunc in radice eius est superfluitas non matura, quare apostema illud maturetur, & dolor iuxta posse mitigetur, & cum cætera non conferunt, eradicetur dens. Materia autem ad dentes deriuata secundum plurimum est phlegma, & aliquando salum, deinde sanguis, rarius cholera, rarissime melancholia. Causæ autem primitiue sunt percussio, casus, & offensio, uentus, aer frigidus, crapula, & reliquum regimen malum sex rerum non naturalium, & quandoque fit difficile pluribus hominibus considerantibus suum dolorem discernere partem dolorosam, & multo minus causam sui doloris, quamuis regimen debeat esse diuersum, immo quandoque non distinguunt dentem dolorosum a non doloroso.

Signa. Primo consideres an gingiua patiat malam cōpositionem, quod ex malo eius colore potissimum comprehendes, & an sit tumida, sanguinolenta, apostemosa, aut sit in ea corrosio, aut putrefactio, & sanies exeat comprimendo, & tunc iudicabis nocuumentum esse in gingiua. Si uero nihil tale sit, & comparando ipsam gingiuam aliis non comprehendis differentiam, tunc causa dolorosa erit in substantia

dentis, uel in neruo inter quæ distingues. nam si fuerit in dente, forte dens erit corrosus, aut magis tumidus solito. Et forte uermis erit in foramine quod comprehendes ex dolore interpolato cum motu uermis: & si quandoque nihil tale fuerit, saltem dens totus dolebit secundum longitudinem suam, & non secundum extensionem mandibulæ: &c. Quod si nocuumentum fuerit in neruo, dolor cæteris paribus erit magis acutus quam in aliis partibus, & erit in radice dentis, & expandetur in carne rubea, & sicut extensionem mandibulæ, & forte dens erit etiam stupidus. & tu quidem comprehendes malam complexionem calid. aut frigid. ex relatu ægri. sentientis calid. aut frig. & ex colore tendente in rubeum uel citrinum album & fuscum, & ex calidis præcedentibus & concomitantibus, & quia iuuatur a contrariis & læditur a similibus, & siccitas cognoscitur per detumescionem & commotionem & præcessionem & concomitantiam causarum exicantium. & uentositatis, & uapor cognoscitur ex permutatione doloris, nisi esset in aliquo loco reclusa: tunc enim faceret dolorem perforatiuum aut extensiuum. & humor crassus cognoscitur cum submersione & mora doloris absque cal. & frig. apparentibus ualde. Sed humor acutus, sanguineus & cholericus cognoscitur ex uelocitate nocuumenti cum intentione & alteratione coloris ad similitudinem humoris, & ex sapore & caliditate acuta sensata ab ægro aut a tangente. Et dolor pulsatiuus arguit humorē calidum, & proprie sanguineum aut apostema quod maturatur. Et scies quod initium humoris est ex cerebro, aut stomacho, ex repletionem & nocuumento sensato in uno eorum, aut in ambobus. Causæ primitiue seipsas ostendunt.

Prognostica. Primum cum causa doloris est in gingiua non sufficit eradicatio dentis, imo non est necessaria, id est, utilis: & si est in dente, remouetur dolor cum eradicatione, & si est in neruo, quandoque remouetur dolor cum eradicatione, quandoque non, & non remouetur nisi quia materia inuenit locum amplum in quo expellitur cum prius esset præfocata retenta cum dente. Si uero materia sit fixa in neruo non sic facile remouetur. Secundum. Fortissimus dolor est qui prouenit ab apostemate quod in radice dentis maturatur. Tertium. Ad huiusmodi dolores fortissimos quandoque sequitur syncopis aut epilepsia, nocuumento cordi aut cerebro, communicato. Quartum. Cum barba tumescit ex directo dentis secundum plurimum dolor sedatur materia exterius deriuata.

Si gingiua cum dolore dentium fuerit sanguinolenta, & apostemosa, & rub. fueritque apostematio cum pulsatione, extrahatur sanguis cum uentosis, phlebotomia ex cephalica prius facta. deinde in ore aliquandiu acetum, & oleum rosatum teneat: quod postquam eiecerit, hoc idem iterum fiat. post hoc oleum rosatum in ore teneat. & si ex hoc non euaserit, fueritque pulsatio uehementis, & cum inflammatione caphora, & pirethrum terantur, & in radicibus dentium ponantur: cumque dissoluta fuerint, iterum mittantur. cottum quoque oleo rosaceo illinitum superponatur. quod si dolor aliquando augmentetur, et uehementior fiat, opii sexta pars drach. i. in oleo rosaceo dissoluatur: ex quo cottum illinitum radici dentis dolentis adhibeatur. si autem nondum sedetur, scalpelletur locus, & sanguisuga superponende sunt.

In hoc quarto tractatu agit de ægritudinibus dentium. Et facit quatuor capitula. Primum est de dolore dentis, quod capitulum trifariam partitur. Primo ponit curā doloris dentis a causa cal. secundo ibi. Gingiua uero. Ponit curam doloris dentis a causa frig. tertio ibi. Si uero dens corrosus. Ponit curā doloris dentis a corrosione. Prima in duas. Primo ponit signa quæ prouenit a causa calida & proprie sanguinea. in secunda ibi. Phlebotomia ex cephalica. Ponit curam. De duabus primis partibus dicit. Si gingiua fuerit rub. sanguinolenta tumida, fueritque apatio illa cum dolore pulsatiua, qui, ut superius dictum fuit, maxime pruenit ex apostemate sanguineo, fiat primo phlebotomia ex cephalica, & prope ex latere dentis dolentis, deinde fiat uentositatio cum scarificatione in spatulis ad euacuandum & diuertendum. Deinde teneat in ore acetum

cum

tum & oleum rosaceum quod sit duplum ad acerrum, & sint adinuicem bene concussa, & cum fuerit aliquandiu in ore retentum abiciatur illud, & nouum sumatur in ore, & sic fiat pluribus uicibus, & sint actu frigida ad percipiendum & ad alterandum discrasiam cal. tam membri quam humoris. Secundo post hoc teneat in ore solum oleum rosaceum ad mitigandum dolorem: nō enim est opus amplius tanta percussione. Tertiū si ex hoc non recesserit dolor, fueritq; pulsatio uehemens cum inflatione, quod prouenit ex praesentia materiae calidæ in loco. camphora frigida in tertio & pithrum calidum in tertio, uel in fine tertie simul terantur, & in radicibus dentium ponantur, & cum dissoluta fuerint iterum ponantur. Et ut melius adhaereant possent permisceri cum oxymelle simplici, & cum cotto radici dentis apponi. Hæc autē mixtio fit ut per camphoram fiat caliditatis alteratio, & per pithrum materia de profundo dentis educatur, & postea cottum in oleo rosaceo infusum loco dolenti superponatur ad doloris mitigationem. Quartū si dolor non mitigetur, imō fiat uehementior, opii sexta pars 3. i. in. 2. 3. olei rosacei dissoluatur, ex quo cottum illinitum denti dolenti apponatur. Et apud necessitatem replicetur, cauendo tamen ne deglutatur. Quintū, si dolor adhuc non fedetur, locus scalpeli, & sanguisuga saltem una superponatur taliter ut materia quæ est causa doloris exiret, & ea remota per mittatur sanguis fluere. Deinde cum dicit.

Gingiu uero si non sanguinolenta fuerit, nec apostemosa nec dolor cum pulsatione, nec in facie fuerit inflatio, aut dolor acciderit post fastidium & satietatem, & post cenam, comederitq; ex cibo frigido multoties; venter agri soluendus erit ex pilulis coctis. & dolentium dentium radices ex hoc medicamine fricandæ sunt, quod sic fit. Recipe pithri, sinapis, setaragi indi, baurach, piperis, zingiberis. & ex eis puluerizatis dentium fricentur radices. cottum quoque eis illinitum super dentium radices ponatur. postquam æger os ex aceto, in quo pithrum, & mentastrum, & origanū fuerint cocta colluerit, de foris præterea panicum, siue milium in sartagine torrefactum super maxillam est ponendum, aut ex piperis puluere, melle commixto dens, & eius radix fricetur. & si hæc nō succederint in dentium radicibus hæc theriaca ponatur. quæ & castorei, & asæ, piperis, zingiberis, stracis, opii omnium partes æquales cōficiantur cum melle, & admiscetur. æger præterea per aliquantum temporis a comestione abstineat, maneantq; famelicus, et ingrediatur balneum, & utatur motu, si autem nec sic quiescat, ferrum ignitum radici dentis multoties apponatur, aut eradicetur.

S C H O L I A.

Abstineat, maneantq; famelicus] Reſtius quidem, ut textus habet manuscriptus, legetur Abstineat mane, atq; famelicus ingrediatur balneum.

In hac secūda parte principali curat dolorem à cā frigida. Et dicit, quod si non fuerint signa caliditatis supraſcripta, sed potius signa frigiditatis, & maxime q̃a dolor acciderit post fastidium ſatietatem nauſeatiua, & post regimen & cauſas inſtudentes, uenter ex pilulis coctis erit ſoluendus. Et radices dentium dolentium ex hoc medicamine fricandæ. R. ſinapis, pithri, ſetaragi indi, quæ ſunt ligna quædam minuta ſimilia garioph. cal. & ſic. baurach, pro quo accipitur ſalnitrum, piper, zingib. de his poſſunt accipi partes æquales uel de magis cal. ſcilicet, in quarto ſicut ſinapi. & piperis minor quantitas accipitur, & elaboretur, ut radici dentium aliquid adhaereat, poſtquam æger prius dentis colluerit ex aceto in quo pithrum, metatrum, & origanum cocta fuerint, & de foris panicum ſiue milium torrefactum, & pauco uino & aceto dum torrefit aſperſum, & in ſacculo poſitum, & ſuper loco dolente appoſitum. Item ex pipere puluerizato, & cum melle mixto, dens & eius radix fricentur. Et his non ſufficientibus, hæc theriaca in radice dentis, & circa dentem ponatur cum ſuello corti in ea inſuſo. R. caſtorei, aſæ, pithri, zingib. ſtracis, opii, omnium partes æquales, cōficiantur cum melle, remouendo cauſam ac ſtupefaciendo, dolore

mitigar. & dicitur theriaca per ſimilitudinem, quia ſicut illa iuuat in paſſionib. contra quas inuenta eſt, ſic iſta in tolendo dolorem dentium. & æger fameat, ſitiat, exercitetur, balneū ingreditur, ſcilicet iſtam aut balneum aliud calidum & ſic cum & his non ſufficiētibus, ſtillus ferreus ignitus radici dentis opponatur. Dolorem remouet, & dentem tādē cadere facit, aut eradicetur ſecundum quod dicitur in cap. ſequenti.

Si uero dens corroſus fuerit, repleatur ex medicaminibus quæ nominauimus, & quæ ſunt corroſiua, aut abſtrahatur.

Hic curat dolorem dentis à corroſione, aut putredine prouenientem, implendo foramē ex medicaminibus ad hoc propriis, quæ aliquando ſunt corroſiua, & conſumentia humiditatem putrentem & corrodentem ſubſtantiam dentis. Aliquando ſolum conſeruatiua cum proprietate ſua & conuenientia in qualitatibus manifeſtis primis & ſecundis, tamen prohibendo nec cibis aut aliis reſ putrens ingreditur ſicut eſt aurum, & dens extrahatur ſecundum doctrinam ſequentis cap. &c. Cura doloris dentis à mala complexione ſine materia quatuor exigit intentiones. Prima intentio eſt remotio cauſæ facientis aut conſeruantis ipſam. Secunda eſt alteratio ipſius cum contrariis. Tertia eſt prohibitio humorum à fluxu. Quarta correctio accideſcium. Si ergo cauſæ fuerint primitiua ſicut uentus, aer frig. aut calid. & cibi & potus caleſcientes aut inſtudentes, crapulæ ebrietates, & huiuſmodi remoueantur, & ſimiliter ſi cauſæ fuerint intrinſecæ, ſicut feb. hydrops, retentio euacuationum conſuetarum iuxta poſſe remoueantur, &c. Secunda intentio perficitur cum contrariis tam ex parte regiminis medicinalis, quàm ex parte ſex rerum non naturalium. In diſcrasia ergo calida teneat in ore aquam frigidam aut roſaceam, aut aliquam iſtarum cum tertia parte aceti permixtam, aut ſuccum aliquem frigidum ſicut plātaginis, ſolatri, ſemperuiui, & ſimilium, aut aliquam decoctionem, ſicut eſt decoctio facta ex roſis, myrto & foliis ſalicis, & ſimilibus. & ex oliis, eſt oleum immaturum, oleum roſ. ſaliciū, myrtinum, nenuphar. & apud maiorem neceſſitatem inſtudentis poſſumus addere pro qualibet 3. ſucci, aquæ aut olei, s. d. camphoræ, & apud maiorem neceſſitate profundationis, aut percutionis, aceti, quod ſit ſubtriplo aut ſubquaduplo ad illud cui admisceatur. Sed in diſcrasia frigida conſert uinum calidum retentum in ore, & decoctiones ex rebus calidis, ſicut ex ſandaraca, maſtice, ſaluia, hyſſopo, zingib. pipere, pithro, & ſimilibus, ex quibus 1. aut plura cum uino decoquantur, & his poteſt addi acetum pro octaua parte aut decima. Et theriaca & mithrida. ſuper dentibus illinita conueniunt, & aqua ardens eſt ultima. Si uero cauſa doloris fuerit ſiccitas pura, conſert ut fricetur dens cum eis quæ ſunt, ſicut butyrum & adeps anatis. Et regimen ſex rerū ſimiliter ordinetur in contrarium diſcrasie, &c. Prohibetur autem humores à fluxu ſi ſupraſcripta aliqua ſtipicitate participet, aut ſecum admisceatur acetum. Et ſi oportuerit ſiāt euacuationes & diuer. de quibus infra. Et corrigantur accidentia ſecundum quod oportet, & maxime uigiliæ ſecundū quod dictum eſt ſuperius, & maxime cum narcoticis, de quibus infra. Et prohibent materiam declinare ad dentes. Si uero dolor fuerit à mala complexione cum materia & propriè apoſtemate, exigitur duplex regimen. Primum tribus completur intentionibus, ſcilicet euacuatione, diuerſione, & fluxus prohibitione. Prima intentio perficitur cum phlebotomia ex cephalica ſi materia à capite rheumatizet. Sed ſi à mebris inferioribus cū phlebotomia baſilicæ aut ſaphenarū, & hoc ſi materia eſt ſanguis aut mixta cum ſanguine, & propriè apoſtemans, & reliqui humores cum propriis educantur, de quibus ſæpe dictum eſt. Sed materia calida apoſtemante potius conueniunt medicina lenitius, ſcilicet aqua fructuum quæ cum manna aut caſia permisceatur. Secundam rem cōplent uentofationes factæ in ſpatulis, frictions, extremitatum lotiones, crurium ligaturæ doloroſæ, & ex diuerſentibus, & ſimiliter eradicantib. materia ſunt incilio uenarum quæ ſunt ſub lingua, & in labiis & uentofationes ſub mento cū incifione & ſcarificatione gingiuarum, appoſitio ſanguisug. in radicibus dentium. Et dixit Gal. quod ſi terratur allis, & ponatur in palma manus in parte domeſtica per noctem,

Io. Arculani. M 4 &

& propriè in manu quæ sequitur dolorem dentis, tollit, & expertum est. Tertiam rem complent administrationes prohibentium fluxum materiem sicut pilulæ opiatæ alkaib, quas fecit Alex. & posita sunt in cap. de catarrho. Regimen autè particulare diuiditur in curam veram, & curam mendosam, ut est apud Mesuæ. Cura autem mendosa dicitur, quia auferre do sensum sedat dolorem, sed non, remouendo causam. Sicut est suffumigatio facta cum hyoscyamo, & propriè cum cannula ueniente ad dentes posita super emboro. Et expertum est oleum ros. 3. s. cum 3. s. opii, scilicet linitum super dentes. Et loco ol. potest accipi syr. acetosus. Similiter pirethrum & camph. & qualibus portionibus. Et collutio facta ex aceto de coctione hyoscy. aut ex radice eius cum aceto & oleo ros. Et solatrum cum aceto est medicamen expertum, & hoc in causa cal. Sed in fri. est hoc medicam. R. hyoscy. al. opii. stir. galb. ana. 3. i. pip. aff. foetida, ana. 3. s. misce cum rob. & linitur super dentem dolorosum. Castoreum quoq; & opium, ana. mixta cum ol. ros. & distilletur in aurem sequentem dolorem optime coferre, & sufficiunt de ambobus duo. gran. simul. Irè fagenea, troch. stella & philonium, & propriè si fuerit mixtum cum eis aliquantulum opii. Ex sedantibus dolorem illud quo communiter utitur, est oxymel scyllit. cum opio, ut puta, 2. 3. eius cum 5. gran. opii, & cum cotto in hoc inuoluto dens & radix eius inuoluatur. Et hæc sufficiunt pro cura mendosa. Cura uero autem tribus completur intentionibus. Prima est percussio conueniens in principio. Secunda percussio cum resolutione mixta, aut maturatione conueniens usq; ad medium status. Tertia est resolutio aut maturatione deinceps conueniens. Primò completur cum his quæ repellunt materiã & confortant suã stipticitate, de quibus supra dictum est, scilicet in causa cal. quantum est oportunitas. Sed in causa frig. in principio, fiat percussio cum oleo ros. mixto cum mastice, aut sandaracha, aut cum ramich, idest cum mixtura facta cum passulis & gallis ex qua fit gallia muls. & apud Auic. ex rebus fortibus ad percipiendum. Et propriè in materia frig. est alum. adustum & extinctum cum aceto cum æquali quantitate de sale & administratur, & postea colluatur os cum uino, & decoctio gal. in uino & aceto conuenit. & cum uentum est ad augmentum, administrandum est oleum ros. cum uino decoctionis mast. aut cum uino decoct. passul. aut foenug. Et sandaracha cum aceto est sublimis iuuameti, prohibet enim rheumatizationem, stringit gingiuas & sedat dolorem. Et ultimo perueniendum est ad resolutionem uel maturationem, sicut uinum decoctum, passul. sicum & foenug. inò ficus masticata & in ore retenta super dente dolor. maturant & sedat dolorem. Et ex maturantibus sedantibus dolorem est ol. decoct. rad. althææ, foenug. chamæm. melil. singulariter aut coniunctim, & hoc in causa cal. sed in frigid. conuenit uinum decoctum hyss. alafce, idest, thymi, & sic. porri cum cotto, loco do lenti applicitus. Expertæ habentia singularem proprietatem in sedando dolorem sunt multiplicia, scilicet collutiones oris appositæ circa dentes, suffumigata exteris appositæ, in aurè instill. Cauterizationes dentis & fricationes. Ex decoctionibus. iuuantibus est acetum decoct. spoli serpentis cum proprietate sua, & similiter decoct. rad. cappari. in ore retentum uel super dente dolente appositum. Item cortex & lignum pini bullitum cum aceto, & radix colocyn. & pulpa eius similiter bullita, & acetum bullitum in testa colocynt. Huiusmodi autem quæ fiunt cum colocynthide quandoq; abhorrentur propter amaritudinem, & ellebor. bullitus cum uino est ultimum. Item radix etiam raphani, folia almezereon, pirethrum zing. cucu. aff. armel. idest ruta agrest. aristol. rot. Hæc omnia singulariter aut coniunctim bullita cum aceto conferunt, & propriè in causa frig. Sed ex propriis applicitis super dentes dolorem sedantibus est piper & pix simul mixta. Similiter piper & assa, aut sinap. & assa, aut serapinum, resoluit enim dolorem congelatum. Item oppoponacum cum pirethro, spoliū serpent. combust. & mixtum cum oleo ad similitudinem unguenti, & positum super dentes est mirabile in sedatione dolorosa. Et pulvis factus ex origano & nitro super dentes & gingiuas aspersus mox tollit dolorem. Item. R. pirethri staph. ana. 3. i. & fiat pulvis subtilis, & cum cera incorporetur ex qua cera dens inuoluatur. Et ex conuenientibus leuibus muleum iuuantibus est ut medulla panis recentis calidi den-

tibus comprimatur. Ex suffumigatis est semen porri cum pice suffumigatum cum traiectorio ad radicem dentium, tollit dolorem, & uermes occidit. Res autem quibus fit euaporatio exterius ad dolorem dentium sunt sicut malua, anethum, althæa, parietaria, chamæ. & melilo. foenug. sem. lini. sem. caul. sem. porri. &c. Ex his potest fieri emplastr. & similiter ex cept. asso cum oleo chamæm. & anethino, aut oleo lilio. Et quado que fiant euaporationes ex rebus siccis, sicut ex milio pauco aut sale. Res autem quæ iniiciuntur in aures & sedant dolorem, sunt sicut oleum de amygd. dul. & amar. & sambuc. quod cumq; horum coctum fuerit in cape concauo postquam secū permiscetur aliquid castorei, aut euphor. & quadoq; aliquid opii apud uehementiam doloris. Auic. confectio experta ad dolorem dentium difficilem & ad corrosiones. R. castor. myr. opii, piperis galban. ana. confice cum rob. & fac ex eis troch. & linitur super dentes. Et apud Auic. si causa doloris est uentositas, resoluatur cum sagapeno galbano & granis alharmel. idest ruta agrestis, & cornua cer. cōbust. decocta in aceto scyllit. deinde trita & confecta in oxymel. denti applicita sedant dolorem, & propriè ex corrosione etiam hepar stellionis posita super dentem corrosum sedat dolorem. Et quandoque paratur barba frequenter & emplastratur, ut ad ipsum trahatur materia: cum enim emplastratur barba, idest, locus exterior ex directo dentis dolentis sedatur dolor, & propriè cum cauterizatur dens cum oleo feruenti illa hora. Cauterizatur autem dens aut cum oleo feruente applicito cum extremitate stili cotto inuoluta, aut oleum feruens cum embuba instillatur in foramine dentis. Sed primus modus est melior, & quandoq; cauterizatur cum extremitate stili igniti, & propriè proueniente ad radicem dentis, aut ad partem putridam aut corrosam. Et bonum est ut gingiua & dentes sani defendantur cum pecia in aqua ros. aut aliquo frigido infusa parti defendendæ applicita aut cum pasta, aut simili re uiscosa. Et quandoq; necessarium est ut perforetur dens perforatorio minuto, ut uirtus penetret cauterizatiua ad locum agrum. Et fricantur aliquando dentes ad excussione materiæ in ipso existens. Ex conuenientibus ad fricandum est zing. & pirethrum in oxymelle infusum, & similiter acetum cum sale. Et suffumigationes, & propriè cum traiectorio conueniunt, & maxime si uermis adsit, sicut si fiat ex colocynth. aut granis eius, aut sem. sinapis, aut cape. Tertio uero regimen curat acidentia sicut uigilias cum his, quæ dicta sunt in capitulo proprio. Regimen uitæ declinet in contrarium discretæ, & cum sunt huiusmodi cauterizationes declinet ad frigidum & humidum. & sit tenuis.

Cura corrosione dentium tribus completur intentionibus. Prima est euacuatio humiditatis putridarum cum eis quæ dicta sunt. Secunda est resolutio ipsarum cum ipsis dentibus ad quod ualet acetum, decoct. nigellæ cum cotto applicitum, aut nigella trita cum alchitram, & super dente linita. Et similiter acetum decoct. cappari, aut zing. aut acetum solum, & oxymel scyllit. & est proprium, & hepatis lacerti inest proprietas in prohibendo corrosione si eo fricetur dens corrosus. Tertia intentio est confortatio dentis prohibito corrosione cum ex eis linitur aut impletur dens corrosus. Et gallia sola prohibet putrefactionem, & caphora sola in causa cal. est ultima. Et hyoscyamo cum styrace mixto inest operatio mirabilis, cum per traiectorium dens corrosus suffumigatur.

Regimen autem implendo dentem corrosum est, ut impleatur in causa cal. cum frigidis, & in frigida cum calidis. Secundo, ut non impleatur cum labore & uehementia addente in dolore, & ex propriis est gallia cum ciperis aut cum mastiche, & eligantur ex superscriptis cal. aut frig. sicut oportunitatem in contrarium discretæ detis, sed ubi non fuerit multus recessus a mediocritate impleatur cum foliis auri.

De extrahendis dentibus.

Cap. 49

Medicamē, quod cum in dente corroso ponitur, ipsius sedat dolorem, aut ipsum constringit. Sumatur chebichengi, & piper, & trita, & alchitram conspergantur, & impleantur ex eo. Medicamen, quod dentes debiles, & qui sunt extrahendi, ac dolentes eradicat. Cortices radicem mori, & cappari, & pirethrum, et lac tithymalli atq;

lac

lac anabula, & arsenicum rub. & radix colocynthidis sumantur. & trita ex tanto aceto quod eis sufficiat conspergantur. Acetum quoque per hebdomadam unam semel in die prius addatur, post hoc dentes in circuitu scalpentur, & ex predictis decies in die epithimentur donec ad mouendum sint faciles, & sic extrahantur. Aut epithima fiat ex fece acetii acutissimi per multos dies, & postea extrahantur. Aut ranae fluuiales in oleo coquantur donec dissoluantur. Quandoque neceffe fuerit dentium radices scalpentur, et ex oleo isto multoties inungantur, donec facile moueri possint, postea cum in strumento euellendi dentes euellantur.

S C H O L I A.

Ipsam costringit dicit alii frangit medicamentum enim, quibus sit compositum illud facultatem habent dentium extrahendorum. Medica. quod dentes debiles, & qui sunt extrahendi, ac dolentes eradicat. sic lege Medica. quod dentes debiles dolentes, qui sunt extrahendi eradicat. ita & uetus codex est scriptus.

Causae eradicationis dentium sunt tres. Prima, quia sanitas nocuenti eius, & proprie doloris non speratur, cuius si gnium potissimum est, quia quamuis aliquando medicinali auxilio sedetur, tamen parum post redit. Secunda quia timetur nocumentum corrosiois, aut putrefactionis, aut aliud communicari dentibus uicinis aut mandibulae. Tertia, quia forte impedit operationes in quas ordinatur, scilicet locutionem aut masticationem, quare consilium est procedere ad ipsius eradicationem & proprie si causa & nocumentum sit in substantia dentis. Si autem dens sit sanus & nocumentum sit in gingiua uerisimilius est eius eradicationem magis obesse quam prodesse. Si uero causa nocuenti sit in nervo est indifferens eius eradicatione ad nocendum & inuadum. Iuuabit enim primo, quia de materia per eradicationem resoluetur. Secundo quia conuenientius est medicinas parti laesae, scilicet, nervo applicare. Sed nocebit, quia per dolorem extractionis materiam ad locum dolorosum attrahetur, quae erit causa augmenti doloris, & quod communicetur oculo & cerebro, & fortasse febrium, syncopis, & epilepsiae, & proprie si ante extractionem aderit magnus dolor, & cum hoc si magnus superueniet causa extractionis, quia forte dens est ualde firmus & pluribus radicibus affixus mandibulae, etiam si dens ipse fuerit apostemofus aut corrosus. Quare diligenter considera, antequam ad ipsius extractionem procedas, & alia medicamina prius experire. Quod si consilium tuum omnibus equè libatis fuerit in ipsius extractione, hoc facito quibusdam canonibus: Primus, ut praecedat euacuatio cum phlebotomia, pharmacia, aut utraque secundum exigentiam plectoria, aut cacoehymia. Secundus est, ut dolor si fuerit fortis, prius sedetur, & si non, cum alio saltem cum stupefacientibus. Modi autem in extractione dentium sunt tres. Primus cum ferro, sed prius debet fieri scarificatio gingiuarum & ligamentorum circa radicem dentis ligantium dentem cum mandibula, deinde cum instrumentis ad hoc propriis extrahatur, quorum figuras uides in margine. Secundus modus est cum cauterio actuali, ut cum stilo ignito multoties applicito in foramine dentis si quod est, aut si non est circa radicem dentis, nam per hoc forte sedabitur dolor, & cadet dens in processu temporis, & uicem huius supplet oleum feruens cum cotto in extremitate stili inuolutum multoties applicitum denti dolenti, aut cum molesta multoties applicetur granum olivani feruens figura tum secundum exigentiam partis cauterizandae, & haec cum hoc quod faciunt dentem in processu dierum cadere, dolore sedat. Tertius modus est, cum medicinis ad hoc propriis, quarum quatuor describit Rasis in praefati capite. Prima sumatur chebichengi id est apium, & proprie sylvestre, & maxime radix, quae est calida usque ad tertium gradum, & sicca in secundo, corrosiua, frangens dentes, & piper calidum in quarto faciens cadere dentem, consumendo humiditatem substantiam ipsius, & ligamentorum, & trita incorporantur cum alkitra, id est, pice liquida, calida, & sic. circa secundum gradum posita, ut medicinas faciat denti adherere. Impletur dens corrosus ex hoc, aut circumuoluitur. Dicitur etiam de apio quod appensum collo tollit dolorem eius. Secunda, quia eradicat debiles dentes, aut dolentes qui sunt extrahendi. & corticum radicum mori frig. & hum. cuius in fructu est cal. &

hum. si dulcis sit si uero acerbus frig. & hum. radicum capparis, de quibus supra. pirethri, lactis tithimali, laqueis anabulae, arsenici rub. cal. & sic. in tertio, radices colocynth. ana. & trita cum tanto aceto quod sufficiat ad incorporandum omnia, in modum unguenti misceantur & dentibus applicentur. Tithimallus autem habet septem species, quarum una est anabula: lac autem cuiuscunque speciei ipsius tithimali est cal. & sic. in tertio corrosiuum, & faciens cadere dentes consumendo humiditatem substantiam eorum & suorum ligamentorum. acetum autem quod singulo die per hebdomadam addi debet, iuuat ad faciendum uirtutes aliarum medicinarum penetrare, & cum hoc humidum substantificum exiccat, & hoc unguentum maxime imprimit dentibus in circuitu scarificatis, & multoties applicetur hoc unguentum cum cotto in eo infuso dentem circumdante donec facile moueatur & sic extrahatur. Tertia medicina est, ut fiat epithima ex fece acetii acuti, per multos dies, & proprie scarificatis dentibus, ut prius. Quarta medicina est, ut ranae fluuiales in oleo coquantur donec dissoluantur, & scarificatis dentibus ex oleo isto multoties inungatur donec facile moueri possit, & postea cum instrumento facile extrahatur, imò cum digitis aut sola fili suspensione aliquantulum cum impetu in rectitudine ipsum trahendo. Melior tamen est adeps ranae uiridis habitantis in arboribus & proprie si misceatur cum lacte tithimali, cum autem haec operationes sunt, dentes alii tueantur ne nocumenta eorum quae applicantur eis communicent. Et dentibus euulsis cum ferro teneat in ore acetum infigidatum decoctione gallarum aut balauft. sed pauca acuitatis, aut cum aqua rosacea mixtum. Et si dolor adsit oleum rosaceum solum, aut decoct. masticis quomodocunque extracti sint, aut lac in ore teneatur.

De congelatione, & stupore dentium. Cap. 50.
Portulaca & amygdale amar. & masticentur, aut his similia. aut fiat frictio cum sale, & masticetur cera.

Congelatio dentium siue stupor est diminutio sensus tactus accedens dentibus.

Causa eius est mala complexio, secundum plurimum frig. cum asperitate quadam in superficie dentis quae fit, aut a causis extrinsecis sicut rebus acetosis, acribus, ponticis, & stipticis masticatis, aut in ore retentis. Quandoque uero ab humoribus uenientibus ad dentes sub forma uaporis, aut humorum a stomacho uel a capite, quae acetositate uel acredine, uel potestate participant. Quandoque uero ab imaginatione, sicut cum uidemus coram nobis aliquos masticantes res acres, huiusmodi imaginatio facit dentes stupere, siue hoc immediate faciat, siue mediate similem humorem, scilicet acetosum, acrem, &c. ad dentes attrahendo. Et quandoque fit propter nerui oppilationem, aut aliam malam dispositionem siue propter alias causas. Et si quæratur quare aqua frig. aut aer frigidus non faciat huiusmodi stuporem postquam sequitur malam complexionem frigidam. Respondetur quod huiusmodi acetosa & pontica cum hoc quod inducunt malam complexionem, etiam exasperant dentes & gingiuae superficies, &c. Et forte bene consideranti apparebit stuporem dentis esse duplicem. Quidam dicit puram diminutionem sensus tactus, sicut qui prouenit ex oppilatione nerui, quidam cum diminutione quandam tristem sensationem, quae est actio corrupta sensus tactus ipsius dentis. Et prima posse contingere ex aqua frigida diu applicata. Secunda exigit praeter diminutionem sensus causa inducentes huiusmodi tristem sensationem in superficie dentis & gingiuae.

Signa quod stupor sit ex nocumento dentis cognoscitur ex ipsius diuturnitate, & praecesserunt nocumenta dentis. Sed quod fit per communiter a stomacho, aut capite declarat nocumenta praecedentia stomachi aut capitis. Sed quod fit a causis primitiuis ipsae semetipsas declarant.

Prognosticum secundum plurimum curatur satis facilliter, nisi sequatur malam nerui dispositionem, & praecipua eius oppilationem & solutam continuitatem, cuius cura sit difficilis. Cura. Masticatio portulae eam remouet sua uiscositate attrahendo quod in dente impressum est. Et Auic. 2. can. & Serapio dicunt quod hoc facit sua substantia uiscosa, remouendo asperitatem ab huiusmodi acribus & ponticis derelictam. Et similiter hoc facit masticatio cerae, casei, & similibus uiscosorum.

viscosorum. Amygdalæ autem amaræ masticatæ hoc faciunt partim sua caliditate, partim sua adhærentia & viscositate. Sal autem fricatum sua caliditate & siccitate alterando malâ complexionem frigidam, resoluendo quod ex humiditate subtili stupefaciente in dentibus est impressum, aut in superficie inuisicatum. Et panis calidus hoc idem facit sua caliditate actuali & adhærentia. Et in summa omnia cal. & sic. curant calefaciendo & resoluendo humiditatem dentibus impressam & remouendo malâ complexionem frigidâ. Et omnia uiscolâ sua adhærentia extrahendo quod dentibus est affixum, & quæcunque nerui oppilationem remouet sunt in hoc proficua si ab eius oppilatione confurgat. De stupore tamen superius est actum sufficienter in proprio capitulo.

De dentibus quod dolent, cum frigida tangunt.

Oleum calefactum in panno desuper est ponendum: aut uitellus oui assatus calidus multoties masticetur aut calidum panem multoties mordeat: aut fiat frictio ex balsamo, aut oleo de lilio syluestri.

Hæc dispositio ab Aui. nominatur ebet dentium, & est ut dentes nō tolerant calidū, neq; frigidum, neq; durum. Huius enim causa immediata est debilitas dentis, quare facilliter patitur à quibuscūq; occurrentibus. Causa aut debilitatis est triplex, scilicet frigiditas. Et est secundum plurimum propter complexionem dentium sua similitudine facile labetem ad frigidum. Et aliquando, sed raro est caliditas. Et tertio sed rarissime est nimia dentis sensibilitas cum raritate texturæ ipsius, unde à quibuscunque notabilis impressionis facile patitur & frigid. cognoscitur ex colore gingiuarum albo uel fusco, sicut calid. cognoscitur ex colore rubeo uel citrino.

Secundū cognoscitur utraque ex sensatione caliditatis aut frigiditatis. Tertio ex causis præcedentibus. Quarto, quia iuuatur à cōtrariis & offenditur à similibus. Sed raritas texturæ cognoscitur ex diuturnitate huius passionis, aut forte quia contracta est à principio generationis cui parum remedia proficiunt.

Prognosticum. Hæc passio cum est à raritate texturæ difficile curatur. Sed si pendeat ab aliis causis satis facilliter. Secundū, hæc dispositio frequenter nunciat & præcedit dolorē.

Cura. Si sit à caliditate uel frigiditate cum materia, est ut post euacuationem & diuersionem factam secundum exigentiam humoris peccantis, quælibet istarum cum suis contrariis remoueat: frigiditas quidem, cum panno uel cotto in oleo infuso, & dentibus applicito. Et est primum remedium Rafis. Secundū est ut uitellus oui assatus donec induretur existens multum calidus masticetur. Tertium est ut panem calidum multoties mordeat. Quartum est ut fiat frictio ex balsamo calido in tertio, aut ex oleo de lilio, psillio syl. calido in secundo, quæ tamen actu calida applicentur. Et per huiusmodi intelligere potestis multa alia cal. & propriè uiscositate quadā participantia, quæ etiam proprietate habeant in sedatione doloris sicut sunt oleagina, remouent enim frigid. & materiam si qua sit resoluunt & dentē confortant. Si uerò sit calid. cōfert oleū rosac. cū cāphora uel sandal. Item portulaca masticata, & semen eius & est propria & his similia. Si uerò sit à nimia sensibilitate cum raritate texturæ confortetur dens cum moderate stipticis & viscosis, & sensus obtundantur, etiā si oportuerit cum leuiter stupefacientibus.

De anatomia oris. Cap. 51.

Iuxta morem consuetum nobis præmittenda est anatōmia oris & reliquorum membrorum quæ in ore continentur, præterquam dentium, quia de ipsorum anatomia actum est. Os enim descriptiue est uas uniuersale membrorum locutionis in homine & vociferariōis in reliqui animalibus uociferantibus ex sufflatione, ad retinendum cibum donec masticetur & deglutatur, & retinendum aerem pro euentatione cerebri & membrorum spiritalium, & ad expulsiōem superfluitatum quæ per meri cannam pulmonis & colatoriū ad ipsum deferuntur finaliter ordinatum. Labia uerò quæ sunt anterior pars ipsius sunt composita ex cute, carne, neruis & panniculo interius regente, qui est continuus cum palato panniculo lingue & meri ad os stomachi. Et propterea ante nomen propter hanc cōtinuationem trenit labium inferius.

Et est de signis uomitus proximè futuri. Hæc autem habentes partes labia componentes, sunt adnuicem mirabiliter cōtextæ, ita ut non possint separari. Hoc autem factum fuit, quia labia debuerunt moueri ad omnem differentiam positionis secundum exigentiam locutionis. Si ergo in ipsis fuissent musculi pro his motibus necessariis nimis labia fuissent crassa, quod ualde fuisset indecorum. Et propterea nerui fuerunt cum his partibus ad minima diuisi, ut cum subtilitate labiorum seruarietur motus uoluntarius. Ex quo patet quod labia sunt calida & humida propter carnis dominium. Et in ipsis sunt quatuor uenæ dictæ alienæ, duæ in labio superiori ab utroque latere superiori una, & duæ in inferiori similiter partitæ, quarum phlebotomia ualet multum in egritudinibus oris & partium eius, &c.

De ægritudinibus linguæ.

Cap. 52

Lingua uerò est membrum instrumentale in ore constitutum figuræ oblongæ ex carne, panniculo, uenis, & arteriis, & nouem musculis compositum osi lambdæ in parte posteriori alligatum. Ad gustum, locutionem cibumque uolendum pro mastinatione finaliter ordinatum. Fuerunt autem tot musculi in lingua, quia debuit ad omnes differentias positionis moueri secundum locutionis exigentiam. Et habuit plures uenas, arterias & neruos quàm aliud membrum respectu suæ molis. Est autem organum gustus per neruos uenientes à tertio pari neruorum cerebri & habet motū uoluntariū per neruos uenientes à septimo pari neruorum cerebri. Circa radicē eius ab utraque parte sunt carnis glandosæ ad hoc ordinatæ, ut humiditatem salualem generarent pro humectatione linguæ, ne tot motibus exiccetur. Generatur autem in eis salua ex uaporibus undecunq; ad illas partes eleuatis, & ex rheumatismis à capite descendentibus. Et in illis carnibus glandosis sunt duo foramina in quæ possit ingredi stilus, per quæ humiditas salualis ad linguam distillat, & cutis linguæ est diuisa in duo media coram commissura coronali. Et inter illa duo est communitas in ligamentis & cōtinuatione. Sub lingua uerò sunt duæ uenæ uirides magnæ, ex quibus procedunt uenæ plures, & uocantur ramina. Et melior linguarum secundum potentiam bene loquendi est commensurata, id est, mediocri in longitudine & latitudine sua, & subtilis ad extremitatem suam ex teriorem. Illa enim quæ magna est & lata ualde & crassa, aut parua sicut spasmata, non est conueniens ad locutionem. Et ex his patet linguam esse calid. & humid. in complexione. Et potest pati omne genus ægritudinis, &c. Et patet eius colligantia cum cerebro, hepate, corde, per neruos, uenas & arterias, & cum stomacho mediante meri, & cum pulmone & membris spiritalibus per cannam pulmonis. Et propterea signa sumpta à lingua sunt ferè in quacunque ægritudine efficacissima. Postea sunt dentes, quorum anatomia præcessit. Et postea est palatum habens concauitatem in cacumine superiori ut fiat uocis intonatio & reuolutio agilis cibi quando dentibus conteritur. Et in fine palati est uuula pendens in modum grani uuæ, ideo uocata est uuula existens rara in substantia, & spongiosa, quia principaliter facta est ut superfluitatem descendentem à capite hora rheumatismi recipiat ne ad membra inferiora descendat, & propterea frequenter apostemat. Est etiam formata ut uocem modulet refrangendo aerem qui est materia uocis.

Tertium inuamentum est ut aerem qui ad pulmonem uadit, & attrahitur per nares & os repercutiendo aliquandiu in ore retineat ne frigidus, sed alteratus ad pulmonem deueniat. Et propterea contingit quod habentes abscissam uuulā multum sunt catarrhosi, & ideo prohibetur ab authorib. ne incidatur. Sed si sit putrida uel apostematata debet aduri semper dimittendo tantum de ea ut possit ad suprascripta inuamenta deferuire, quod posset fieri cum cauterio actuali & cannula ænea lutata luto sapientie. Et cum potenciali, ut puta cotto in extremitate stili imposito, & in aqua forti intincto, & pluries applicito secundum exigentiam, siue cum cannula siue sine cannula, & cum isto etiam potest abscindi si nimis elongatur, & pendeat posita sub ipsa aliqua lamina ferrea, super qua adhæreat, & non debet scindi propter multitudinem sanguinis egredientis difficulter cōstringibilis, & quia difficul-

culter consolidatur propter situm suum & modum substantię unde perpetuo sanies emanat & sequitur fœtor oris perpetuus. Post uulua sunt fauces dictę pharynges, & sunt loca ampla, glandosa, ex utraque parte colli apta suscipere superfluitates cerebri, imò sunt emunctoria cerebri, ideo frequenter apostemantur, & apostema earum licet non emineat extra, eminet tamen intus, & ideo si os aperiat & in profundum aspiciatur. Apparet tumor, & fit ibi una species synaches quę in vulgari nostro dicitur gaion. & in sine istarum existit principium cancræ & meri, de quorum anatomia infra dicef.

De pustula linguę.

Cap. 53.

Pustula linguę quasi parvū apostema & bothor linguę sunt termini synonymi significantes hanc dispositionem quę diffinitivè est pustulę multiplicatę in partibus oris.

Bothor enim Arabicè idē significat q̃ pustula latinè. Species harum sunt secundum diuersitatem humorum, scilicet sanguinę, cholericę, phleg. & melancholicę. Item, quędam malignę herpeticę, quędam pauca malignitatis. Cause sunt quędam extrinsecę sicut constitutio pluuialis, calid. & humid. dispositiones ad humorem putredinem. Similiter cibi in stomacho corrupti & proprię ad putridum & fumosum licet etiam corruptio ipsorum ad acetosum aliquando possit esse in causa, & proprię corruptio lactis in stomachis puerorum lactentium, siue propter lactis dispositionē, siue suorum stomachorum discrasias, aliquando cause sunt corporeę duplices existētes per cōmunitatem aut à toto sicut in feb. acutis & proprię pestiferis. Et sicut in speciebus hydropis, aut à parte, maxime à stomacho & capite propter uapores eleuatos ab humiditatibus putrentib. in ipsis & cōmunicatis partibus oris. Et aliquando propter humores à capite reumatizantes. Similiter potest fieri cōmunicatio à ceteris membris. Hi autem uapores ad os peruenientes faciunt pustulas duobus modis, aut quia fixi in partibus cutis oris quę subtilis est & tenera, postea incrassati reducuntur siue condantur in humore à quo eleuati sunt. Aut quia inficiunt partes oris quas attingunt taliter ut illarum partium humores male dispositi faciant has pustulas. Aliquando uerò cause sunt per essentiam in ore, scilicet mala dispositio humorum in uenis oris contentorum talis ut natura moueatur ad ipsos expellendum, et sic expulsi faciant has pustulas, nulla alia causa corporea præcedente.

Signa harum pustularum habētur ex relatu ægri & uisu, q̃ sint sanguinę ex colore rubeo purpureo cognoscitur, & quod sint cholericę ex colore rubeo tendente in citrinū, & phlegmaticę ex colore albo, & melancholicę ex fusco siue nigro, quod sint malignę cognoscitur, quia procedunt dilata do se & corrumendo partes uicinas, & quia tendunt in nigredinem, quod pendeant à causis primitiuis declarat præcēssio illarum. Et quod sint per cōmunitatem à toto declarat ægritudines totius, & similiter quod sint per cōmunitatem ab aliquo membro declarat præcēssio mala dispositionis illius membri, cum cuius cremenro augetur, & decremento minuitur. Quod autem sint per essentiam in ore, declarat ab absentia aliarum causarum, quę sunt per cōmunitatem. Prognosticum. Primum, cum pustulę nigrę huiusmodi multiplicantur in ægritudinibus acutis, mortem in breui securam pronuntiat. Secundum, cum huiusmodi pustulę maxime non nigrę in ægritudinibus acutis multiplicantur externis in labiis, & circa ipsa, magis attinet salutem quam morti. Significat enim dominium uirtutis super materiam, sicut in casu priori cum nigrę sunt, & interius factę significant malignitatem materię propter nigredinem & uirtutis impotentiam, quia natura non expulit exterius, quāpropter oportet ut citò succumbat. Sed quia ad huiusmodi pustulas sequuntur secundum plurimum ulcera oris, de his ulceribus quę apud Auic. & Arabes uocantur alchola est agendum. Sunt enim ulcera existentia in cute oris & linguę cum expansione & dilatatione & eius species sumuntur ab humoribus, sicut dictū est in pustulis. Et malignius omnibus est melancholicum, & fit ex melancholia adusta, sicut phlegmaticum fit ex phlegmate salso, &c. Cause & signa sumuntur secundum quod dictū fuit supra in pustulis, non est enim differentia nisi quod ulcera sunt cum sanie, & pustulę non, nisi ulcerentur, & de cōsuetudine. Auic. est ut nominet ea colaham dum in superficie perseue-

rant. Quādoque putrefiunt & submerguntur, se profundatiora & dilatantia non nominat coloham, imò ulcera maligna herpetica, & indiget medicinis cauterazatiuis, & possunt huiusmodi ulcera incipere absq; præcēssione pustularum.

Prognosticum, Omne ulcus ueniens in superficie oris est uelox ad dilatandum, propterea quod non deficit ei calid. & inseparabilis & cutis humida lenis, & sic intellige in ceteris membris similibus, sicut uulua & ueretro. Reliqua prognostica sumuntur, ut dictum est in pustulis.

Si pustulę fiant rubę, sumantur antherę, amyli, spondij lentium ex corticatarum, sem. portulacę, coriandri sicci sem. scenę de mecha, omnium partes æquales, camphorę parum, ex his puluerizatis fiat frictio, & cum aceto mixta, & oleo rosaceo in ore teneantur. & sanguinis minutio cum uentosis fiat. albę uerò si fuerint pustulę, cum sale, & melle fricentur. & syrupus acetosus, aut almuri in ore teneatur.

SCHOLION.

Oleo rosaceo in ore. Rasis textus emendatus Aqua rosaceam addit.

Hoc capitulum habet duas partes. In prima ponit curam pustularum calidarum, quę sunt sanguinę aut cholericę. In secunda ibi. Albę uerò. Ponit curam phlegmaticarum. Et patient omnia. Anthera est semen rosę colligendū in autumno ex quodam fructu rubeo nascente in extremitate rosarii in cuius parte intrinseca sunt semina dicta anthera cum multa lanugine, & est frigidum & siccum & stipticum, sicut cetera quę hic ponuntur præter semen portulacę quod est frigidū & humidum, & semen scenę de Mecha, quod est calidum & siccum, & dicitur de Mecha ad differentiam scenę de Arabia, quod nō est ita bonum. Camphora autem sit subdecupla ad quodlibet aliorū. Et melius est ut in regione nostra sit hæc mixtio sine oleo rosaceo propter abominationē. Quid dicat in secunda parte manifestum est. Almuri est balsamentū factum ex piscibus salis cum aceto mixtis & speciebus. Et syrupus acetosus de quo sequitur, maxime fit mellinus, licet etiam saccharinus conueniat. Harum pustularū cura triplex exigit regimen. Primum est uniuersale completum per euacuationem, diuersionem, & membri mittentis correctionē. Vnde pro prima intentione fiat phlebotomia, & aliorum humorum euacuatio secundum quod expedit, de quibus dictū fuit sufficienter in multis ex præcedentibus cap. Et communitate euacuantur humores adusti & corrupti. Pro secunda intentione adponantur uentosa iuxta textum in spatulis uel in nocrea uel sub mento, uel apponantur sanguisugę, uel phlebotomentur uenę illarum partium. Et sic discurre per alia genera diuersionem, ut supra in aliis cap. Pro tertia intentione corrigantur ægritudines totius, sicut febres & species hydropis & similes, & reliquorum membrorum cōmunicantium, sicut stomachi & cerebri, secundum quod dictum fuit supra.

Secundum regimen completur primò per eradicationē materię coniunctę, quāpropter fiat phlebotomia, aut uenarum sub lingua, aut uenarum alienerim quę sunt in labiis, aut fiat scarificatio partium læsarum. Et hac intentione opus est cum iam adest materia notabilis quantitatē in partibus illis siue ibi congesta sit, siue aliunde defluxa. Si uerò non, sed incipit fluere, opus est ut repercutiatur in principio, postea resoluatur aut suppuretur.

Singularia uerò conuenientia in principio cum opus est in frigidatione & exiccatione, sunt apud A. mirobalan. sem. ros. siel. memithę, tragagan. balau. duo sandali, rosę, spodiū sumach, lentes, lutum, armen. capita gran. corticum glandiū & cadmia. Item suc. frig. sicut lactuca, solatri, uirgę pastoris, portulacę, extremitatum uitis, camphorę, rob de ribes, rob acetosę, rob de moris syluest. succ. & rob. gran. & agrestę, & forbarum, pirorum, & similibus stipticorum. In processu conueniunt gallę, fructus tamarisci, ciperum, nux cupressi, folia oliuarum siccat. Et in fine cortices nucis mus. garioph. mentastrum, gallia, & huiusmodi, quę cōueniunt in processu, uel in fine in causa calida, conueniunt in principio in frigida. Et tua interest miscere calida cum frigidis secundum oportunitatem & temporum ægritudinis, & mixtionis materię. Sed chelidoia, gallę, alchana, idest arbor cyprica cōuenit in principio.

cipio, in utraq; materia, similiter myrtus & acetum quod secundum plurimum cum his medicinis debet esse permixtū, & chelidoniz cum rebus stipticis inest virtus mirabilis in alchola, & similiter camphoræ, ubi opus sit multa in frigiditate. Si nerò huiusmodi pustulæ suppurentur, adiuuetur huiusmodi suppurationi cum lacte & propriè asinino retēto in ore. Item cum mucillaginibus sem. althææ maluæ, lini almaru, id est, linguæ bouinæ, sem. citoniorum, aut cum horum decoctione, aut passularum, & apud A. quidam sublimium medicorum dixerunt non esse aliquid magis ultimum in cura bothor oris quàm oleum de schinantho tepidum in ore retentum. Cum autem ex his pustulis facta sunt ulcera, uel fortè ulcera inchoarint ab initio, tunc considerandum est, an huiusmodi ulcera calida sint, id est facta ab humoribus per se calida aut frigida, id est facta ab humoribus, per se frig. qui tamè secundum plurimum habet caliditatem accidentale per adustionem aut putredinem acquisitam. Calidorum quidem cura perficitur tum medicinis superius dictis in causa huiusmodi bothor cal. antequam ulcerentur. Sed eligantur medicinæ magis sic. Et ad hoc sunt propria, quæ sunt dicta in testu in curatione eorum, quæ pendent à causa calida.

Si tamen notabiliter saniosa uideantur, præcedat mundificatio cum aqua sacchari, aut syr. acetoso simplici. Sed frigid. phlegmatica exigunt duplicem intentionem. Prima est mundificatio perficienda cum medicinis absterfuiis & exiccantiis, sicut est oxymel simplex, aut scyllit. quæ etiam apud necessitatem poterunt permisceri cum aqua oliuarum salutarum. Item potest fieri oxymel cum uino, & potest huic addi modicum aluminis. aut colchotar, id est uitrioli. Secunda intentio perficitur cum exiccantibus, & consolidantibus, sicut uinum stipticum, decoct. gall. cyperi fructus, tamaris. nucum cupres. & similia. Melanchol. uerò maligniora præcedenti bus exigunt duplicem intentionem. Mundificationem perficiendam autem medicinis multum absterfuiis, imò uirtute corrosiua participatibus sicut acetum, decoctio gall. aut memithæ quæ est species chelidoniz, aut almezereon cū melle quibus in decoctione potest addi almuir, & colchotar & palfule. Vnguentum quoq; Aegypt. cum aceto permixtum est adhuc efficax si loca ulcerata inungantur. Secundo, ardor mitigetur cum lacte in ore retēto, aut cum aqua albuminis qui in ore retenta, aut aqua plantaginis, folatri, & similia. Tertiò consolidetur cum his quæ dicta sunt & dicuntur.

Si uero alchola fuerit herpeticum malignum similiter triplicem exigit intentionem. Prima est mundificatio partis corruptæ, cum administratione unguenti Aegyptiaci aut fortioris factis, scilicet ex melle, alumine, uiridi gris ana, quibus pro unaquaq; uncia addantur 3. 2. aceti acuti, & bulliant, donec habeant mellis spissitudinem, & cum cotto super parte corrupta imponatur. Et aquæ fortes & ceteræ medicinæ corrosiue superius in cura polypi memoratæ huic loco accommodentur. Et similiter medicamē corrosiuum positum à Rasi in capitul. sequēti de gingiui sang. & est efficax adhuc propositum. Vitriolum quoq; cum aceto habet mirabilem proprietatem in his alchola cum sint maligna. Similiter administratio floris æris cum colchotar, & gallæ in syrupo acetoso. Et gallæ coctæ cum aceto & sale conferunt omni alchola maligno, & cinis almezereon habet proprietatem mirabilem in alchola etiam maligno, & propriè cum aceto aut oxymelle. Et si os esset contaminatum cauterizetur cum ferro ignito, aut procurentur eius squamationes cum uitriolo, aut alumine combusto. Et hoc cauterium actuale est magis propriū quàm cætera in rectificando huiusmodi herpes, & optimū est in huiusmodi herpetibus, quousque sedata est malitia ipsorum. Vt frequens fiat collutio oris cum aceto salito tepido & propriè ante impositionem medicinarum, de quibus supra. Secundo efchara remoueat, & dolor mitigetur cum lacte in ore retento, & multoties permutato. Tertiò consolidetur cum his, quæ dicta sunt, & dicuntur. Ex expertis in consolidando huiusmodi ulcera cum sunt cum caliditate & superficialia est cerusa cum aqua rosea aut aqua albuminis oui. aut suc. citr. aut uino granatorum, & similia applicita. Sed cauendum est ne deglutiantur. Et mineralia frigida propriè & abluta sunt ad hanc intentionem efficacia. Aliud in causa calida. R. sumach ros. fic. ana. 3. 1. spodii, balaufti ana 3. s. ra-

mich. 3. 1. tere & accipe ex eo parum, & frica locum alcholatū uel puluerem hunc misce cum rob citon. & fiat ex eis oris collutio frequenter. Aliud frigidius. R. sem. ros. amyli, sumach, sem. porri, lentium excorticatarum, spodii, alchanæ, balaufti ana partes æquales, camphoræ partem 1. quartam, ex medietate huius crasso modo cōtusi fiat decoctio in aqua cum quarta parte uini granatorum, & os sape colluatur, deinde cum alia medietate pulueris fiat aspersio loci alcholat. & sic frequenter nunc unius, nunc alterius fiat administratio. Sed conferens alchola phlegmatico & huiusmodi. R. memithæ, id est, radices chelidoniz, corticum radicem capp. colchotar ana partem. s. aluminis, balaufti, partis unius tertias duas, alchana partem semis, confice cum aceto & melle, & applica.

Si uero alchola fuerit permixtum ex cholera & phlegmate. R. chelidoniz, sief memithæ, spodii, sem. plantaginis, sem. rosarum, & caput eorum, mirob. citrinorum, balauft. foliorum oliuarum syluest. sic. carmexi, id est fructus tamarisci, aluminis, iamenian. terantur & misceantur, & possent administrari sub forma pulueris, & sub forma unguenti conficiendum cum syr. acetoso simplici. Medicamen conferens alchola nigro & herpeticum. R. fol. oliuarum sic. foliorum ramis. sic. corum, acaciæ ana 3. 8. aluminis, iamenis, colchotar ana 3. 2. croci 3. 1. terantur & administrantur, aut sub forma pulueris aut sub forma unguenti conficiendum cum melle uel oxymelle. cum autem ulcera hæc sint melanch. confert ut cum aliis misceantur passulæ & semen scenæ de mecha. Hic plures medicinæ positæ sunt quibus utendum est, nunc una, nunc alia, secundum corporum & ulceri diuersitates, in corpore enim magis molli, sicut sunt pueri minus sic. competunt & minus corrosiua. Et similiter in ulceribus minus humidis et minore putredine participatibus. Et in contrariis cōtraria, &c. Ultimum autem regimen exigit duplicem intentionem. Correctionem accidentium perficiendam secundum ipsorum exigentiam. Secundo, debitum regimen quod ordinetur in contrariis discrasia, debet enim secundum plurimum declinare ad frigidum & siccū. Et in lactentibus caueatur corruptio lactis, alterando discrasiam stomachorum eorum, & ipsorum stomachus confortando, & nutriendo nutrimentum cum his quæ prohibeant corruptionem lactis, & sint contraria discrasie per quam corrumpitur lac. Et diamoron cum oxymelle est mihi expertum linitum in alchola puerorum.

De exitu sanguinis gingiuarum. Cap. 54.

Cum ex gingiuis sanguis subtilis assidue manauerit, utriusq; arsenici scilicet rub. & citrini, calcis gallarū aluminis, omnium partes sumuntur æquales: ex quibus puluerizatis, & cum aceto mixtis parui formentur trochisci. cūque necesse fuerit, ex eis puluerizatis sumatur quantum sexta pars drach. 1. fricentur gingiue ex eo optime, & permaneat sic parum: deinde teneatur oleum ros. in ore: est enim hoc mirabile ad hanc ægritudinem curandam, & putredinem, & herpetem estionem, qui est ore.

Sanguis potest exire ex gingiuis duabus ex causis. Aut à causa extrinseca sicut à percussione, casu & offensione. Et de huiusmodi exitu sang. nō est sermo hic. Et potest exire à causa intrinseca dupliciter. Aut propter multitudinem sang. quæ propter tumescunt gingiue & uenæ scinduntur, aut earum orificia aperiuntur. Aut subtilitate sua sanguis resudat, & de hoc etiam non est hic sermo, facile enim curatur cum phlebotomia manus & aliarum uenarum, & scarificatione gingiuarum siue sanguifugarum applicatione. Sed quandoq; sanguis egreditur propter corrosione factam in gingiuis in materia acuta cholerica aut sanguinea, phlegmat. salia, & ali quando melancholica adustione participante. Quapropter corrosione paulatim se dilatante & profundante sanguis effluit & magis subtilis propter corrosione uenarū cappillarium, in quibus hic sanguis cōtinetur. Et differt à putredine gingiuarum in qua scilicet gingiue putrefiunt, & caro putrefacta remanet ibi, & non dissoluitur sicut in corrosione. Vnde corrosio prouenit à fortiori calido. Et de sanguine hoc tertio

tertio modo fluente, scilicet per corrosione[m] est hic sermo in hoc ca. Est enim hec corrosio quandoque ulcus corrosiu[m], quod aliquando est in superficie. Aliquando magis profundatur: licet quando est in superficie non appelletur ulcus propter paucitatem saniei inde egredientis: sicut nec superficialis exco[n]tiatio vesicæ aut intestinor[um] dicitur ulcus. Sed in veritate ubicunque sit solutio continui cum sanie ibi est vulcus. Hæc autem corrosio aut putrefactio siue sit cum sanie siue sine sanie. Aliquando est superficialis aliquando profunda: immo aliquando ossi mandibule communicata. huius causæ sunt proportionales illis quæ dictæ sunt superius in alcola & proprie maligno, & herpetico, & similiter signa sunt illis proportionalia.

Prognostica si superficiales sunt & in principio faciliter curantur. Si autem sint profundæ & propriæ ossi mandibule communitate difficulter curantur.

Cura quantum ad regimen universale ex euacuatione diuersione & membrorum mittentium rectificatione est proportionalis curæ alcola. Similiter quantum ad regimen locale exigit tres intentiones proportionales illis quæ dictæ sunt in alcola herpetico, scilicet mundificationem siue cauterizationem partis corrosæ aut putridæ. Secundo doloris mitigationem & partis cauterizationem remotionem. Tertio consolidationem. Prima complectitur cum illis quæ dicta sunt superius in alcola herpetico. Sed Rasis in præfati ca. ponit medicinas causticam satis potentem dicens. Cum ex gingiuis sanguis subtilis assidue manauerit, scilicet per corrosione[m] utriusque arsenici, scilicet rubei & citrini quæ sunt calida in tertio sicca. in secundo corrosiua & cauterizatiua calicis calidæ, & sic in quarto gallarum frig. & sic. in secundo aluminis de roca ca. & sic. in tertio partes fumantur æquales.

Ex quibus puluerizatis cum aceto mistis parui formetur troscisci. Quandoque necesse fuerit ex eis subtiliter puluerizatis fumatur sexta pars. 3. i. cum qua fricentur gingiue optime eis applicando & permaneat pulvis sic parum super gingiuis, scilicet per quartam partem hore: deinde remoueat[ur] lauando os cum lacte aut aqua tepida: aut aqua plantaginis. Postea teneat in ore oleum ro. aut lac ad ardoris mitigationem & elchara si qua facta fuerit remotionem iuxta secundam intentionem.

Et si opus est mundificetur cum oxymelle aut melle ros. Est enim mirabile illud medicamen causticum ad hanc egritudine[m] curandam & herpetem effluuium, id est putrefactionem profundam quæ fit in ore. Et uos supplete tertiâ intentionem, scilicet substantiæ deperditæ restitutionem cum puluere facto ex myrobolanis ablutis cum pauco thuris aut masticis. & ex his cum melle ro. aut oxymelle possit fieri unguentum aut cum puluere facto ex olibano sarcocolla & sanguine dra. ana. Et si post hoc opus fuerit prohibitione fluxus & confortatione gingivarum colluatur os cum aqua decoctionis aut distillationis foliorum cypressi. Si autem corrosio fuerit leuior, & incipiens sufficit allumen extinctu[m] cum aceto cum duplo sui de sale & cum sauc. id est utriusque rubeo in proportionem sexquialtera ad allumen, & puluerizetur super gingiua & est Auic. secundum leuius etiam penes Auic. est ut adurantur caratha salita usquequo fiant sicut carbones: caratha autem siue caratham sunt lumbrici terrestres ex quorum puluere fumatur pars una: rosar[um] sic. partes duæ & mistæ superponantur. Aliud eiusdem fumantur myrti lenticuli adustarum ana. pars. 1. sumach furie ana. partes. 2. florum qui nanci partes tres misceantur & administrentur. Hæc omnia sunt ad complendam primam intentionem postea succedant alie intentiones. Præstantissimum tamen omnium ad complendum primam intentionem est ferrum ignitum, scilicet super parte corrosa aut putrida appositum uel applicitum, licet aurum ignitum etiam sit præstantius. Cum autem huiusmodi corrosiones sunt leues sufficiunt medicinæ alcola superius dictæ absq[ue] q[ui] sint corrosiue. Regimen autem lex reru[m] non naturalium communiter ad frigidum & siccum declinet.

De Casu vvlæ.

Cap. 55.

Sciendum q[uod] egritudines vvlæ sunt quatuor, scilicet apostema ulcus putredo siue corrosio & casus. Apostema uero licet possit fieri à quacunque materia sem plurimum:

tñ fit à sanguine uel phlegmate: ulcus uero aut sequitur apostema aut fit à materia ulceratæ absq[ue] q[uod] apostemet. Putredo aut siue corrosio fit aut à multitudine materiæ aut eius acuitate & malignitate & plurimum sequitur apostema magnu[m] aut malignum. Et posset fieri à uaporibus malignis ad ipsam eleuatis. Casus autem vvlæ qui est ipsius præternaturalis elongatio secundum plurimum fit à sanguine aut phlegmate & propriæ aquoso ipsam remouere siue hi humores apostement siue non: & est egritudo in situ. Humores autem isti quandoq[ue] congeruntur in uuea: sed ut plurimum à cerebro deriuantur. Apostema uero cognoscitur per dolorem tumorem & duritiem siue extensionem quandam. Cognoscitur autem q[uod] sit sanguineum ex colore rubeo purpureo. Sed coloricum ex colore rubeo tendente in citrinum. Phlegmaticum ex colore albo. Melancholicum ex colore etiam fusco. Mista autem colorem habent mistum. Et cum sanguineo est dolor grauius & pulsatiuus & in cholerico pungitiuus.

Cum aliis autem paruus aut nullus adest dolor. Et reliqua communia signa sumpta ex ætate tempore anni regimine præcedente & similibus consignantur, & significant q[uod] sint facta per uiam paulatinę congectionis paulatinus ipsorum euentus & longitudo temporis: sicut econtra quando fiunt per uiam de fluxus fere subito eueniunt. Vlcus autem sensui manifestu[m] est & sanies inde egrediens manifestat ipsum. Species ipsorum ulcerum sumuntur & cognoscuntur sicut dictum fuit in capitulo de ulceribus aurium. Putredo autem vvlæ cognoscitur ex nigredine aut uiriditate ipsius cum fetore magno & humiditate fortente inde egrediente. Et quia non sentit secundum partem quæ putrefacta est: corrosio autem est cum dolore, & cum sanguinis distillatione sequente corrosione[m]. Casus uero cognoscitur, quia æger sentit aliquid in radice lingue suæ præter consuetudinem insistere. Et cum aperitur os uidetur ipsius manifesta elongatio. Quæ elongatio aliquando est ualde magna sicut cauda muris. Aliquando parua aut mediocris & aliquando cum febre: aliquando sine febre. Et humores qui sunt in causa ex coloribus suis cognoscuntur.

Prognosticum. Apostema cancerosum ipsius aut non potest curari aut difficillime si incipiens fit in extremitate ipsius cum totali ipsius euulsione. Reliqua apostemata satis faciliter curantur & similiter ulcera ipsius. Putredo autem & ipsius corrosio etiam si profunda sit caustificando curatur. Sed ipsius elongatio si parua sit neque sit graciliata satis facilius curatur cum medicinis. Si uero multum elongata sit, & in radice graciliata, & in extremitate sua facta rotunda curatur sola incisione, aut caustificatione donec magna pars ipsius abscindatur. Quod si totaliter abscindatur, nocetur uox, & sequitur tussis, & secundum plurimum phthisis, aut asthma in processu temporis propter defluxum catarrhoru[m] ad pulmonem, & quia aer inspiratus pro refrigerio spiritalium non modificatur, infrigidatur pulmo secundum plurimum & ad asthma disponitur, & anhelitus constrictio[n]em. Et sequuntur etiam nocumenta stomachi catarrhis ad stomachum descendentes. Et si totaliter incidatur antequam graciliata sit, sequitur fluxus sanguineus, qui cum difficultate constringitur, &c.

Cum æger senserit aliquid radici suæ lingue insistere, aut gutturi: & cum iubetur aperire os, & extrahere linguam, uidetur uulua eius iam esse fluxa, & elongata: ramich, & sal ammoniacum sumantur, & bene puluerizata cum instrumento insufflandi super uulua[m] insufflentur: & ex eis in summitate prædicti instrumenti aliquid ponatur: & radici uulue cum eo dirigatur: & ipsa cum instrumento parum exterius extrahatur. aut granatum acetosum cum pulpa sua teratur, & fiat ex eo gargarismus. quod, si diu permanserit taliter, & elongata fuerit, eiusque pars superior subtiliata, & caput eius rotundum fuerit: tunc radicatus erit incidenda. cauendum tamen, ne antequam ita, ut prædiximus, sit disposita, incidatur: ex hoc enim sequeretur quadoque sanguinis fluxus, qui restringi non potest.

Io. Arculani.

N

Præfati

Præfens caput in quo agit Rafis de casu vuulæ, diuiditur in quatuor partes. In prima ponit signa casus vuulæ superius declarata. In secunda ibi. Ramich, & sal ammoniacum. Curat casum eius quando prouenit à causa frigida. In tertia ibi. Aut granatum acetosum. Curat casum eius à causa calida. In quarta ibi. Quod si diu permanferit. Ponit modum & necessitatem incidendi ipsam. Quod dicit in prima parte est manifestum ex iam dictis. Sed in secunda parte est sciendum quod medicamen illud non conuenit in principio, sed in augmento & statu. Ramich, id est mixtura facta ex gallis, & passulis ex qua fit gallia muscata & est satis propinquum temperamento cum repercussione, & digestionem quadam. Sed sal ammon. resolutiuium calid. in quarto, & sic. Ex his enim æqualiter sumptis fiat puluis, cuius aliquid ponatur in extremitate cannulæ, quæ sit lata secundum quantitatem vuulæ, sed illa extremitas sit non cannulata, & longa ultra partem cannulatam ad quantitatem digiti parui, & non acuta taliter ut possit poni sub vuula, & sit illa extremitas aliquid curua. Et cum hac vuula subleuetur trahendo eam uersus os. Et cum est sic subleuata, puluis qui est in extremitate cannulæ insuffletur in vuulam, & sic tota hoc puluere circundabitur, tum quia sibi adhærebit puluis qui erit in extremitate non cannulata, tum quia puluis insufflatus qui continetur in parte cannulata continua extremitati non cannulæ sibi adhærebit per insufflationem. Figura huius instrumenti est hic in margine depicta. In tertia parte dicit quod cum succo granati acetosi contriti & expressi cum tota substantia sua, fiat gargarisma in ea, est enim frigi. & sic. In ultima parte dicit, quod quando diu sic permanferit, & multum elongata fuerit, & gracilis facta, & eius extremitas pendens fuerit rotunda, quæ rotundatio fit ex humiditate ad illam extremitatem defluxa grauitate sua, natura non regente, tunc est radicatus incidenda, dimisso tamen tanto eius quod suffecerit ad fines in quos ordinatur. Et cauendum est, ut nullo modo incidatur antequam fuerit sic disposita, sequitur enim fluxus sanguinis, qui forte non constringitur per sectionem extremitatis uenarum, quæ ad vuulam terminantur. Et quia medicina non possunt ipsi conuenienter applicari, & adhærere. Sed cum est sic elongata, & gracilis facta, uenæ illæ sunt extenuate sanguine carentes, & non est dubium de fluxu sanguinis. Præstantius tamen est ut cum cauterio incidatur, ut infra dicitur.

Cura harum dispositionum triplex exigit regimen. Primum est universale respiciens causam antecedentem complendum euacuatione, diuersione, & membri mittentis, scilicet cerebri regimine, quæ intentiones compleantur phlebotomia, & cæteris euacuationibus secundum horum exigentiam. Itē uentofatione in spatulis, aut in nocrea. Item phlebotomia uenarum alienarum, & uenarum, quæ sunt sub lingua sicut superius cap. de pustulis, quæ sunt in lingua, dictum est. Et similiter caput regatur euacuando discrasiam eius corrigendo & confortando, sicut sæpe dictum est. Mesue tamen si humor apostemans, aut faciens casum vuulæ fuerit ualde calidus laudat euacuationem cum aqua fructuum. Et laudat diuersionem cum frictione, extensione dolorosa aurium, & earum scarificatione, & phlebotomia uenarum, quæ sunt post eas est conueniens, & pro diuersione laudat, ut capiatur manipulus capillorum in commissura coronali, & egro iacente ponas pedes super humeros ægri trahendo capillos eius fortiter, donec cutis dislocetur, ex hoc enim subito vuula eleuatur. Sed hoc remedium satis ignominiosum est. Et subdit quod iam expertum est, ut liniatur linimento super commissura coronali emplastrum factum ex succo acatiæ, & hoc in principio, aut ex acatia cum aceto, aut ex gallis adustis cum aceto, quoniam eleuant ipsam. Regimen autem locale apost. vuulæ & casus eius exigit tres intentiones. Repercussionem conuenientem in principio. In augmento repercussionem cum resolutione usque ad medium status. Aut repercussionem cum maturatione si tendit in uiam maturationis. Sed à medio status ultra resolutionem, aut maturationem solū. Si ergo apost. fuerit multum cal. cum magna rubedine, reperiatur in principio cum multum frigidis sicut suc. solatri, plantag. aut semperuiuæ, cum tantundem aquæ ros. & aceto quod sit quarta pars totius, & his possunt addi sandali, & camphoræ apud maiorem necessitatem infrigida-

tionis. Si uero non sit tantæ inflammationis, sufficienti stiptica & pontica, inter quæ est differentia, quia pontica sunt frigidiora, & magis terrea quàm stiptica, licet utriusque uirtus minus profundetur quàm uirtus acetosi. Et ex conuenientibus est succus granat. acetosi triti & expressi cum tota substantia sua. Et si permisceatur cum ros. sic. & semine earum fiet adhuc maior repercussio. Et in hoc tempore conuenit puluis subtilissimus factus ex ros. sandalis & balau. ana. quibus apud maiorem necessitatem infrigidationis potest addi camphora, quo puluere utere cum instrumento superius descripto. Et si adhuc fuerit minor caliditas, fiat gargarisma cum succo expresso ex duobus granatis, scilicet acetoso, & dulci contritis, & expressis cum tota substantia sua, & super vuula ponatur puluis factus ex gallis balaust. & alumine quod sit duplum ad utrumque. Et infusus sumach optime cotriti in aqua ros. & aceto subtriplo ad aquam est cōueniens in principio. Et in fine principii, & principio augmenti est proprium diamoron proprie factum ex moris rubi immaturis cum tantum dem aceti, & duplo aquæ rosæ. Et magis procedente augmento conuenit diamoron ex moris celsi, & proprie maturis cum pauciori aceto, & aqua hordei, aut hordei, & passularum, aut aqua decoctionis ramich, id est, passularum, & galliarum, quæ aqua sit dupla ad reliqua, aut hæc aqua misceatur cum oxymelle simplici, aut syrupo acetoso, deinde gradatim perueniendum est ad piper, zingib. sal ammoniacum, sinapi, alium, cinnamomum, & similia, quibus possumus uti in decoctione ipsarum permiscendo cum oxymelle, aut melle ros. aut oxymelle scillitico. Et possunt huiusmodi cum superscriptis pulueribus misceri in modum electarii, & applicari cum extremitate pennæ, & possunt fieri pulueres cum instrumento applicandi. Mesue narrat plures descriptiones. Prima est filii Serap. & balaust. 3. 2. aluminis iamenti. 3. 1. croci. 3. s. camphoræ gran. 5. fiat puluis subtilissimus, & utere cum instrumento post gargarisma factum ex diamoron, & aceto, & ualet in causa calida in principio augmenti. Item aliud ualde bonum & ramich. salis ammon. partem unam aluminis, myrrhæ, ana. partem. s. fiat puluis & utere cum instrumento, conuenit in causa frigida in augmento.

Aliud ex intentione Mesue. Recipe zingib. cinnamomi peris, pyrethri, balaust. corticum, granatorum, fol. ros. sem. earum, ana. par. æquales, fiat puluis, & utere cum instrumento, & ualet in causa mixta post gargarisma sibi proportionatum. Auenzoar. & piperis nigri & longi, & myrrhæ, salis ammon. ana. fiat puluis, & ualet in causa frigida in statu, & in declinatione. Et nota quod quantum ad huiusmodi localia non est differentia inter curam aposte. vuulæ, & casum eius à causa proportionali, uel simili, nisi quia magis constringenda conueniunt in casu, & magis indiget subleuatione cum instrumento pulueribus superpositis, imò si esset apostema absque casu non indigemus subleuatione neque pulueribus, imò sola sufficiunt gargaris. aut electaria cum penna administrata. Si uero apostema suppuretur adiuuetur cum gargaris. facto ex ficibus, passulis, dactylis, & materia existente frigidiore addatur radix lilii, & ex fecce eorum fiat emplastrum. Et quandoque cum his admiscetur aliquid ex confortantibus membrum ne cadat putrefactio in integrum ipsius, & destruat membrum, sicut balaustia, ramich, myrrhæ, rosæ, ciperi, quodcumque horum magis uidebitur oportere secundum exigentiam materiam. Postquam autem suppuratum est, aperiat sicut dicitur in cap. de synanche, & proprie cum sagittella, aut instrumento incidente huic operationi proportionatum, quod habeat additionem quandam distantem à cuspidem per medium digitum, ut non possit profundari ulterius. Post hoc cure-

tur

tar cura ulcerum mundificando cum hydromelle gargarizato, aut cum oxymelle, aut cum melle rosaceo mixto cum thure, & sarcocolla applicito, cum extremitate stili cotto inuoluta etiam applicita usque ad intrinsecam ulceris. Deinde consolidatur cum uino decoctionis gallarum, cyperi, & similibus, aut cum melle rosaceo, aut oxymelle mixto cum thure, & sarcocolla applicito cum extremitate stili, ut supra. Si nero putrefiat uulua, aut præter modum elongetur, & gracilis fiat ut non amplius ad benignum reduci possit, opus est, ut auferatur, quæ ablatio licet multis modis fieri possit, præstantior tamē modus est, ut habeatur cannula ferrea satis amplam habens concavitatem, & sit facis etiam crassa, ut non facile igniatur. Sed extremitas quæ peruenit ad uulnam sit sicut media cannula ad quantitatem digiti parui, aut medietatis digiti. Sed extremitati, quæ remanet extra os sit annexum manubrium, uel ipsamet desinat in manubrium ex eodem ferro pendens ad inferiora cum quo possit teneri. Situato itaque ægro super una cathedra in loco lucido, & capite ipsius retento per ministrum existentem post ipsum, medicus imponat speculum in ore cum quo fortiter præmat linguam ad inferiora quod speculum per aliquem ministrum teneatur. Post hoc imponat cānulam iam dictam usque prope radicem uulue, & cum stilo trahat uulnam super extremitatem non cānulam, ita ut æquiter ipsam, & ipsam cānulam magister teneat cum manu sua sinistra, & cum manu dextra immitat per cānulam incisorium aureum, uel ferrum ignitum, ita ut feruat, quod tamen incidat satis obtuse, & cum ipso fortiter comprimendo incidat uulnam, non tamen radicem, sed relinquat aliquid ipsius, scilicet quantum erat tempore sanitatis, fortasse enim natura sumet ex eo quod remanebit officium aliquod proficuum ad fines in quos ordinata est uulua, & hoc si istud non sit putridum. Si uero tota putrida sit neque tota auferatur, & deinde colluatur locus cum aceto decoctionis aluminis, & gallarum, & procuretur ipsius cauterizatio cum uino decoctionis earum, scilicet rerum, aut cum puluere facto ex gallis, corticibus granatorum, & similibus. Si autem uulua sit putrens, & non pendens, tunc cum instrumēto ferro, aut aureo cuius extremitas proportionetur parti cauterizandæ immisso per cānulam cauterizetur, & habeantur diuersa instrumenta ignita, nam aliquando oportet ipsum multoties cauterizare mutando cānulam, nunc ad unā partem, nunc ad aliam partem secundum exigentiam partis corruptæ cauterizandæ, deinde procedatur ut supra, uel teneatur in ore lac ad mitigationem ardoris, & partis causticæ remotionem. Si quis autem abhorreat cauterium actuale, ipsam auferat cum cauterio potentiali, habeatur ergo media cannula, & super ipsam cum stilo trahatur uulua, & cum extremitate stili cotto inuoluta infuso in aqua forti tangat ipsam fortiter comprimendo, & hoc multoties fiat, deinde teneat lac in ore aliquando donec separetur, & eodem modo si sit putrida non pendens, potest causticari, postea procedatur, ut dictum est, quousque sanitati restituta sit.

Instrumenta autem pro hac operatione necessaria sunt in hac margine depicta. Tertium autem regimen duas exigit intentiones, scilicet correctionem accidentium, & regimen sex rerum non naturalium.

Curetur ergo fluxus sanguinis ex uulua cum phlebotomia cephalica, & positione uetoriarum super collo, & teneatur in ore iuxta uulnam, succus plantaginis, succus solatri, & proprie confusi cum pulueribus constrictiuis, sicut est bolus armenius, sanguis draconis, thus, tragagant. & trochis. de karabe, & de terra sigillata, aut huiusmodi pulueres cum aqua albuminis oui permisceantur, & iuxta uulnam teneantur, & oia sint acta frigida, sicut nix. Et iuxta Auic. administret medicamen Diogenis, & est helhenium, aliis alutefuch. His uero non sufficientibus cauterizetur profunde cauterio actuali, aut potentiali iuxta superiorē doctrinā si possit applicari, & aliquandiu teneri adhærens uulue. Secundum accidens est cūctis, nocumentū uocis, phthisis, asthma, necnon aliquando nocumenta stomachi pp catarrhos, qui nō retinentur, &

atque inspiratus non modificatur. Sed his subueniatur locando ægrum in aere temperato declinante ad calidum & siccū, & adhibendo curā catarrhi, de qua supra. Regimen autem sex rerum nō naturalium cōiter declinet ad siccum, & aliquando leuiter ad calidū, aliqñ ad frigidum fm exigentiam discrasie, & tempore operationum fortium, scilicet cauterizationis, & incisionis, dicta declinet ad frigidum, & sit tenuis.

De sanguifugis quæ bibuntur. Cap. 56.

Cum aliquis in gutture suo titillationem senserit, & sanguis subtilis inde manauerit; existimandum est tunc sanguisugam in ore esse, & præcipue si aquam loci, in quo sanguisuga fuerint; biberit. os igitur ægri est aperiendum, & lingua extrahenda, & inferius præmenda, & guttur in sole est aspicendum. & si sanguisuga in loco propinquo pendere uisa fuerit; cum forficibus, quibus sagitta educuntur, extrahenda crit. quod hoc modo fiat. Caput, a quo pendet, est stringendum, & sic extrahatur. quod, si non fuerit manifesta; æger multoties gargarizet sinapim cum aceto; quia de loco, in quo est mouebitur. aut fiat gargarismus ex aceto, & assa; aut ex aceto, & assa, & sale. nigella præterea, & sinapis trita insufflentur gutturi. fiat etiam gargarismus ex succo cape. si autem post eius casum remanserit ægro sanguinis desudatio; fiat gargarismus ex apozemate, in quo cortices granati, & balauilia, et sinapi colica fuerint, & gutturi insuffletur puluis ex balauiliis, & thure, & sanguine draconis, & amylo. si autem sanguisuga stomacho annexa fuerit; medicamina, quibus uermes expelluntur, in potu sumantur. ex his etiam, quæ sanguisugam exire faciunt, est, ut æger balneum ingrediatur, & moretur in eo, donec magnam patiatur sitim, & tunc aquam in frigidatam in niue frigidissimam, scilicet in ore aliquandiu teneat. cum tepeferi caperit; eam expellat, & aliamumat: sanguisuga enim quandoque uenit ad os frigiditatem querendo.

Sanguisugæ ingrediuntur guttur cum homo aliquando bibit aquam in qua sunt sanguisugæ non aduertendo, aut quia non uidet, sicut accidit iter agentibus tempore noctis. Et aliquando cum homo natat ore aperto, & proprie hoc accidit quando sunt parux uix uisibiles, quæ postea magnificantur cum mordent & sang. sugunt, quæ sanguisugæ sunt aliquando uenenosæ, aliquando non. Venenositas, aut ex accidentibus inde sequentibus maxime cognoscitur, sicut syncopis, tremor cordis, & similia. Et hæc sanguisugæ quandoque adhærent palato, & parti superiori uersus colatorium. Aliquando partibus oris manifestis. Aliquando gutturi. Aliquando meri, & stomacho. Et cognoscuntur ubicunque sint ex titillatione, & punctione in ea parte, & sang. subtili per os fluente. Sanguis enim egrediens ex uenis paruis est subtilis in comparatione ad eum qui egreditur ex uenis magnis. Et confirmat iudicium hoc quod homo memoret se bibisse aquam in qua huiusmodi habitant, aut natasse in ea; tunc cognoscitur locus, ubi est per sensum titillationis eius, & punctationis ubicunque sit. Et si est prope colatorium, sanguis in ore egreditur, & non indiget rascatione ad hoc ut expuatur. Si uero sit in partibus oris subiacet sensui, si in gutture sanguis egreditur rascando. Si in meri impeditur deglutio, & uomitus excitatur. Si in ore stomachi uomitus excitatur absque impedimento deglutitionis, & ab his locis sanguis egreditur cum uomitu. Prognosticum. Curatur hæc dispositio satis facilliter si non sint uenenosæ. Si uero uenenosæ fuerint, non sunt absque periculo. Quantum uero ad curam præsciendum quod habens sanguisugam debet cauere a calore, & locutione cum tentatur eius separatio, ne forte ad cannam pulmonis præcipitaretur, esset enim periculum de suffocatione. Si uero sanguisuga sensui subiacet capiat cum tenacula habente rostrum subtile longum dentatum cum capite cum quo adhæret, & stringatur fortiter & extrahatur, cum hoc enim solent ferra sagittarum extrahi. Quod si uideri non possit, tunc considerandum ex signis scriptis ubi uerisimiliter sit. Si enim sit uersus colatorium cum me-

Io. Arculani. N a dic inis

dicinis infra ponendis fieri debet oris fortis collutio, ut liquor in ore acceptus usque ad colatorium impleatur, aut per nares ad intra os trahatur. Si uero esset in gutture fiat gargarisma. Si uero in meri, aut stomacho huiusmodi deglutatur. Medicina autem Rasis sunt istæ. Recipe aceti, uncias quatuor, sinapi, drach. 2. aut cum aceto tantumdem assæ, miscetur, aut cum eisdem tantumdem salis dissoluatur. Postea nigella, & sinapi trita subtiliter uersus partem ubi adhæret insuffletur. Et succ. coepe ualet optime ad hanc rem, & hæc omnia inimicantur sanguisugis sua acuitate, & fetore, & faciunt eas separari a loco in quo adhærent, imò etiam eas interficiunt. Ex bonis cito interficietibus eas est medulla, drach. 1. semicitri. cum 3. semis aceti dissoluta & bibita interficit eam maxime si sit in meri, & stomacho, & hoc possunt utigar. garizando, & etiam os colluendo secundum oportunitatē, & quando est in stomacho, & meri omnes medicina, quæ sunt contra uermes bibita, aut comesta ipsas interficiunt, aut saltem ipsas separant. Et Rasis dicit in fine cap. quod ex his, quæ sanguisugam exire faciunt est, ut æger balneum ingrediatur qualescunque sit illud, & in eo tantum moretur donec sitiat multum, & tunc aquam in niue infrigidatam, siue notabiliter frigidam in ore teneat aliquantulum, & cū coeperit tepescere eam expellat, & aliam sumat. Nam sanguisuga quandoque uenit ad os frigiditatem querendo, & cum his absoluta sit prima intentio, quæ est sanguisugæ extractio, aut interfectio, aut saltem a loco cui appensa est separatio. Secunda uero intentio est accidetium correctio. Quorum unum est fluxus sanguinis post sanguisugæ separationem. Cui subueniendum est permittendo primo aliquid ipsius exire, ita enim præcepit Auicenna quarta primi cap. de sanguisuga, postea cum dictis in textu constringatur, scilicet cum apozemate, id est, de coctione, in qua cortices granat. balau. & sumach cocta fuerint quo utendum est gargarizando, aut aliis modis superscriptis, scilicet bibendo paulatim, aut colluendo taliter, ut perueniat ad locum morsum, & similiter ualet puluis ex balauistiis thure, sanguine draconis, & amylo gutturi insufflatis, aut aliter unde fuit applicitis.

Alia accidentia infrequentia uentofratem corrigantur exhibendo theriacam, aut michridatum, aut zedoariam, aut terram sigillatam, & huiusmodi quæ contra morsum uentofum sunt propria. Et ex his patet expositio textus Rasis, qui diuidendus est in quinque partes. In prima ponit signa sanguisugæ in os ingressæ. In secunda ibi. Os igitur est. Docet modum extractionis ipsius cum sensui subiacer. In tertia ibi. Quod si non fuerit manifesta. Docet ipsam extrahere cū non sensui subiacer. In quarta ibi. Si autem post eius casum. Docet constringere fluxum sanguinis post eius separationem. In quinta ibi. Si autem sanguisuga. Docet occidere, uel extrahere sanguisugam in meri, & stomacho existentē. Quæ dicit in omnibus his partibus manifesta sunt ex superscriptis sunt enim sigillatim superius declarata.

De his quæ intrant guttur. Cap. 57.

Qum aliquid, quod guttur ingreditur, & infigitur in eo, aut meri fuerit bolus magnus, aut ei simile de his, quæ non habent frustra scissa contenta in eis, aut acuta, confert plerumque percutere ægrum in collo posterius & multoties, & aqua saepe trahere, fortasse enim descendit inferius. æger quoque balneum ingreditur: & oleum multoties traiciat quod, postquam factum fuerit, magnos deglutiat bolos. Quod, si non descenderit, instrumentum, quod illi simile inferius duci consuevit, in os mittatur. est aut instrumentum illud de plumbo, quod cum sit, reti simile est longum, gibbositate in se habens.

In hoc cap. docet Rasis extrahere ea, quæ retenta sunt in gutture si fuerit bolus male masticatus, siue anulus, aut os pruni, & similia crassa uiam oppilantia, siue fuerit spina, aut os acutum, & simile, alicui parti gutturis, aut meri affixum. Et primo docet extrahere res crassas uiam oppilantes. Secundo res acutas gutturi affixas. secunda ibi. Postquam factum fuit. De prima dicit, quod cum illud quod guttur ingreditur, & infigitur in eo, aut in meri, id est isophago, siue uia

transitus cibi ad stomachum fuerit bolus magnus: de his, quæ non habent frustra scissa, id est, diuisa contenta in eis, scilicet gutture, aut meri, aut acuta infixæ in eis, confert plerumque percussio ægri in collo posterius satis fortiter maxime collo depresso, & humeris eleuatis, sic enim illa res crassa descendit: & inuat secundo, aquam trahere multoties, aut oleum, & proprie ægro existente in balneo, balneum tamen apud nos non est multum consuetum. Et si hoc modo res crassa oppilans non descenderit, tentetur ipsius uomitibus digito, uel penna in ore imposita, & proprie si fuerit multum in parte superiori. Ad extrahendam autem spinam, aut res acutas infixas, iubet magnos deglutire bolos, & male masticatos, ut descendentes rem infixam secum ducant, & ad hoc inuat bibere sorbitiones uiscosas de pasta, & similibus. Et proprie cum impetu. De secunda parte dicit. Quod si cum his non descenderit: instrumentum quod huic simile existens interius in gutture duci consuevit in os immittatur. Instrumentum autem illud est cannula de plumbo, habens longitudinem palmæ, & crassitiem pennæ, ante perforata multis foraminibus paruis ad modum retis, & proprie secundum partem que guttur ingreditur, & secundum extremitatem illam aliquantulum curua, & ponatur interius quantum est possibile, & trahatur sursum, & etiam deorsum impellatur ad omnem gutturis differentiam, adhæret enim in aliquo illorum foraminum res illa acuta, & educetur, & posset hoc instrumentum esse solidum secundum eam partem, quæ tenetur in manu, si autem res infixa uideatur, est melius, ut cum moleta, aut tenacula dentata capiatur, aut extrahatur. Præter hos sunt multi modi. Primus ut suspendatur cum filo carica quæ male masticetur, & deglutatur, & postea cum filo extrahatur, & similiter potest fieri cum carne, aut spongia condensata in modum pilæ, & deglutatur, & dimittatur per quartam horam donec crescat, & propter hoc bibatur post eius deglutionem: deinde cum filo extrahatur, & est melior cæteris, & drach. 1. nasturtii, 2. lias raphani, uel parum ellebori cum aqua tepida bibita, & euomitur a proprietate extrahit quod gutturi est affixum. Emplastrum quoque mollificatiua, & maturatiua exterius applicata inuant, & proprie cum res infixa est causa apostematis. Nam apostemate maturato, & erupto educitur. Et uidi semel os acutum infixum in gutture exire per cutem exterius in fine duorum mensium. Gargarisma autem cum sunt in gutture, & proprie uiolenter facta inuant ad extractionem. Rasis in cōtinenti dicit, quod sterens surethi cum aqua decoctionis carnis distemperatur, & gargarizatum a proprietate extrahit res infixas, similiter facit exterius linitum. Ultimo si queratur. An sanguisuga, aut res similis existens in gutture, aut meri sit morbus in numero, & an oppilatio inde proueniens sit morbus. Respondendum est fin Gal. quod non, cum eius causæ sint primitiua, & oppilatio inde proueniens immediate pendeat a causa primitiua. Sed penes Auicenna sanguisuga esset morbus in numero, sicut & uermis ibidem existens in corpore genitus, & oppilatio inde proueniens dicitur morbus in cōpositione.

De passionibus Linguae. Cap. 58.

Superius posita sunt anatomia linguae. Nunc duo alia circa linguam præmittenda sunt. Primum est, quæ sunt linguæ ægritudines in generali. Secundum est, modus generalis curationis ipsarum ægritudinum linguæ. Linguae igitur ægritudines multiplices sunt secundum quod multiplices sunt operationes linguæ, quæ per ægritudines eius læduntur, scilicet motus linguæ, gustus, & tactus. Motus linguæ læditur tripliciter diminute, & ablate, & corrupte, per quas læsiones impeditur locutio una de principalibus operationibus eius diminute, ablate, & corrupte, de qua statim erit proprium capitulum. Gustus etiam & tactus similiter tripliciter læduntur. Hæc autem nomenclatura sunt in lingua per essentiam, aut per communitatem. Aut a toto, sicut in feb. Aut a parte, sicut ex documento tertii paris neruorum cerebri, & proprie tertii paris neruorum rami eiusdem, qui linguæ delegatur, læditur gustus, & tactus, licet gustus possit auferri, sine tactu, sed non e contrario, quia gustus præsupponit tactum. Et quauis gustus, & tactus sint adæquate in eadē parte linguæ, & perficiantur eisdem instrumentis, stat tamen ab eadē causa notabiliter lædi, imò auferri gustum, & non tactum. Et

ex nocumento septimi paris neruorum cerebri impeditur motus linguae, & per consequens locutio, aut per communitatem à stomacho, aut à membris spiritalibus, hepate, splene, renibus, uescis, matrice, & sic de singulis, quæ ægri- tudines proprie illis membris sunt, aut mala complexio, & proprie cum materia, aut apostema, aut ulcera, & huiusmodi. Aegritudines uero per essentiam in lingua similiter sunt malæ cõplexiones cuiusunque generis cum materia, & sine materia, malæ cõpositiones sicut magnitudo linguae, & paruitas, mala figura, malus situs. Similiter soluta continuitas recens, aut antiqua. Et apostema, siue bothor cuiusunque generis. Malæ autem complexiones linguae, & proprie cum materia, siue per essentiam, siue per communitatem cognoscuntur ex 7. Ex sapore amaro, acetoso, salso, pontico, acuto, foetido, & sic de singulis, quorum quidam arguunt calidum, quidam frigidum, & sic humorem calidum, aut frigidum. Secundo ex colore rubeo purpureo arguente dominium sanguinis, & ex citrino arguente choleram. Et similiter ex nigro mixto cum citrino ad quem peruenitur ex citrino, aut ex albo arguente phlegma, aut ex fusco, siue nigro abluque citrinitate, & rubedine arguente melanco. Tercio ex humiditate, & siccitate. Et siccitas quidem sentitur duobus modis, quorum unus est cum claritate superficiei linguae. Et hæc est siccitas levis, & secundum plurimum sine materia. Et secunda est, cum cur- su humoris uiscosi profundi, qui est in ipsa, quem calor iam exiccavit, & hæc non significant siccitatem in substantia eius, scilicet sine materia, imò humiditatem uiscosam aggregatam in ea, aut ex catarrho, aut ex uaporibus crassis, spissis, & hoc est ex eis, quæ faciunt errare medicos, qui cum cognoscunt ex infirmo dispositionem exiccationis oris non discernunt inter istas. Quarto ex asperitate, quæ significat siccitatem, sicut planities significat humiditatem. Quinto ex motu, scilicet uelocitate, tarditate, facilitate, difficultate, quod maxime cognoscitur ex locutione ueloci aut tarda facili, aut difficili, motus namque siue locutio uelox, & facilis arguit caliditatem cum temperata humiditate, sicut contra locutio difficili- lis, & tarda frigiditatem aut siccitatem, aut humiditatem su- perfluam. Sexto ex crassitie linguae arguitur humiditas, & ex tenuitate siccitas. Septimo ex pustulis, & reliquis ægri- tudinibus calidis arguitur caliditas, ex frigidi, frigiditas. Reliquæ au- tem eius ægri- tudines, scilicet malæ complexiones, solutio cõ- tinuitatis, & apostemata sensui subiacent. Modus autem ge- neralis curationis passionum linguae est, ut quando sunt per communitatem, fiat euacuatio à membris comunicatibus, & ipsorum differat corrigantur, & tertio fiat ipsorum con- fortatio ne malas materias multiplicent. Quando sunt per essentiam in lingua, curentur medicinis linguae propriis, qua- rum quædam sunt euacuationes. Cauendum tamen siue læda- tur per essentiam, siue per communitatem à uomitu quantū est possibile. Secundum genus medicinarum est collutiones linguae. Tercium gargarismata. Quartum unctiones, & pul- uerum aspersiones. Quintum ea, quæ tenentur in ore, siue sint pilule, quæ debent esse compressæ, siue electaria, & similia. Sextum eius frictions, & oportet ut caueatur in administra- tione medicinarum oris, & linguae cum fuerint ex genere acu- tarum, quæ nocet gutturi, et pulmone, & nihil ex his ad illa pfluat.

De grauedine Linguae. Cap. 69.

Grauedo linguae, mollificatio eiusdem sunt termini sy- nonymi huius dispositionis, quæ descriptiue est impe- dimentum motus linguae, locutionem minuens, aufe-rens, aut corrumpens. Pro cuius descriptionis noticia est sciendum, quod motus linguae tripliciter potest impedi-ri di- minuire, ablate, & corrupte. Et tot modis impeditur locutio una de principalibus operationibus linguae. Minuitur quide- motus linguae cum homo difficulter, aut tarde mouet lingua. Aufertur cum nullo pacto potest eam mouere. Corruptitur autem cum homo intendit mouere ipsam ad unam differen- tiam, & mouet ad alteram præter uoluntatem. Sicut etiã lo- cutio tripliciter impedit. Aufertur quidem cum homo nihil potest loqui, & hi appellantur muti. Diminuitur cum tarde, aut difficulter loquitur. Corruptitur cum una litera profer- tur pro altera, aut syllaba pro altera. Diminutio autem in lo- cutione tripliciter fit. Vno modo, quia sunt aliqui, qui non possunt incipere loqui nisi primo multum aerem inspiciens,

deinde cum uelocitate loquuntur. Hoc enim accidit, quia musculi pectoris, sed maxime epiglottis sunt debiles. Vnde nisi primo moueantur cum inspiratione multi aeris non pos- sunt debite moueri pro uoce formanda. Secundo sunt aliqui, qui non possunt incipere loqui, nisi prius multoties moueat labia, & linguam. Deinde expedire loquuntur. Et hi sunt ha- bentes debilem linguam, quam oportet pluries moueri, & si militer labia antequam oportune moueant ipsa secundum exi- gentiam locutionis formandæ, & hæc dispositio ab Auicenna uocatur tarhas. Sunt tertio aliqui, qui postquam incep- erunt loqui impediuntur, nec possunt continuare sermonem. Et eorum aliqui nihil proferunt per tempus, eadem postea pro- ferentes quod intendunt, horum autem aliqui sæpe eandem syllabam repetunt antequam dictionem proferant, & hi ap- pellantur tranli. Corruptio autem locutionis est multiplex. Imò infinita secundum indiuiduorum multitudinem. Sicut enim aliqui, qui non possunt proferre unam literam, aut syl- labam, sed alteram pro illa proferunt. Et multipliciter uariatur secundum multitudinem causarum indiuiduantium. Ali- qui etiam in locutione sua multiplicant fen fen, ten ten. Nō nulli uero tata, sicut pueri. Et aliqui kaka, & sic de singulis. Et omne impedimētum in locutione præter ablationem no- minatur ab Auicenna. alchael. quapropter omnis tarhas est al- chael, & similiter traulitas est alchael, sed non econtrario, pueri autem in principio sunt altaka, idest, loquentes ta in locutione, quos nos in uulgari sermone uocamus tartaria, qui postea facti uiri recte loquuntur consumpta humiditate su- perflua ex decursu ætatiuo. Et hi aliquando post ægri- tudine acutam, sicut febrem incendentes, aut chronicam consumē- tem humiditatem superfluam sunt recte loquentes. Hæc au- tem dispositiones aliquando sunt nouæ, aliquando chronice, imò frequenter à generatione contractæ. Vnde aliqui sunt à generatione muti, & hi secundum plurimum sunt surdi. Aliqui tarde loquentes. Aliqui male loquentes, impediti ali- quo ex modis scriptis. Et hæc sufficiant quantum ad quid no- minis, & quid rei, & species grauedinis linguae.

Causæ uero quædam sunt primitiue, sicut ebrietas, ira, tri- stitia, timor, uerecundia. Quædam sunt corporeæ, & sunt du- plices, quædam per communitatem, quædam per essentiam in lingua, & musculis eius. Per communitatem quidem à toto, sicut in febris, & proprie in arsiuis, quibus lingua arefcit, & spasmatur spasma de inanitione, nonnunquam materia p- mutata ad linguam fit motus eius & locutio difficilis. Aut à parte sicut à septimo pari neruorum cerebri, qui aliquando oppilatur, aliquando apostematur, & fit quadoque spasmus, aut paralytis, aut tetanus, & consequenter sequitur difficul- tas, aut impotentia ad motum linguae. Aut per communita- tem à cerebro, sicut in lithargia, & similibus. Et sit defectus in lingua, aut propter humiditatem à cerebro communica- tam, aut defectu spirituum, aut per communitatem à stoma- cho, hepate, membris spiritalibus, matrice, & cæteris. Per es- sentiam uero in lingua, aut mala complexio, sine materia, aut cum materia cuiusunque generis, sed secundum plurimum sanguinea, aut phlegmatica aquosa, infusa in ipsa, aut muscu- lis eius, aut à mala compositione, scilicet magnitudine, aut paruita- te, aut mala figura, aut malo situ, aut à magnitudine ligamen- ti existentis sub lingua impediēte motum eius, aut à soluta cõtinuitate, scilicet uulneribus, & ulceribus derelicta, aut propter apostemata, & pustulas ipsius.

Signa. Grauedo linguae est sensui manifesta. Sed causæ primitiue sunt sibi signa cum consuetudine prouentus hu- ius impediēti linguae ex causis similibus.

Causæ aut corporeæ per cõitatem cognoscuntur, quia præ- cesserunt, etiam cum earum augmento augetur grauedo linguae, & decremento minuitur, & ablatione aufertur. Nisi nocumentum per cõitatem sit factum per essentiam. Sed specialiter si sit per cõitatem à toto, sicut in febris arsiuis, adest linguae exiccatio, & forte spasmus, & ipsius contractio sequens inanitione, & forte materia liquefacta impleti sunt musculi ipsius. Vnde lingua est spasmata spasma de repletio- ne. Sed et plurimum paralytica, & remollita humiditate existente subtili. Inter quæ distinguitur, quia spasmus de repletione, & paralytis fere subito acciderunt. Sed spasmus de inanitione paulatim. Spasmus autē de repletione differt

Io. Arculani N 3 à paralyti,

à paralyſi, quia taliter ſpasmata non poteſt per ſe, neque per alium faciliter moueri, ſed paralytica licet non per ſe, per alium tamen faciliter mouetur. Si uero ſit læſa per cõmunitatem à .7. pari neruorum cerebri, eſt nocumentum in motu linguæ, quod non eſt commune aliis operationibus cerebri, aut ortorum ab eo. Et cum hoc non uidetur aliqua ægritudo linguæ propria ex ſcriptis. Nec apparet nocumentum ei cõmunicatum ab alio membro. Nam cum eſt per cõmunitatē à cerebro nocumentum eſt cõmune pluribus operationibus cerebri, aut operationibus ortorum ab eo, & ſi materia à cerebro ſit communicata linguæ, & muſculis eius eſt ſpasmata, aut paralytica complete, & ſecundum partem. Si uero ſequatur defectum ſpiritus animalium, cognoscitur ex debilitate uirtutis animalis in ceteris membris, imò aliarum uirtutum aliquãliter. Similiter ſi ſint per cõmunitatem alio membro, præceſſit nocumentum illius membri. Si uero lingua ſit læſa per eſſentiam, nocumentum eſt continuum, neque præceſſit nocumentum alterius membri. Et materia ſanguinea ſignificatur per rubedinem linguæ, & caliditatem, & tumorem uenarum, & alia ſigna ſanguinis. Sed ſubtilis aquoſa per multitudinem curſus ſaliuæ, & paucitatem iuuamenti reſolutionis, & iuuamentum ab eo in quo eſt ſtipcitas. Item per albedinem linguæ cum palliditate, & paucitate caliditatis. Mala autem compoſitio. ſ. magnitudo paruitas, mala figura, aut malus ſitus, ſenſui ſunt manifeſta. Similiter ſoluta continuitas, & cicatrix. Magnitudo autem ligamenti exiſtētis ſub lingua cognoscitur, quia non poteſt emitteſe linguam ſecundum quod oportet, ſed remanet curuata cum exteriꝝ ipſam emittit. Similiter ligamentum linguæ extenditur ſerē uſque in extremitatem eius. De apoſtematibus autem linguæ agitur in ſequenti cap. Prognostica. Grauedo linguæ ſequens apoplexiam, lithargiam, & ſimiles cum antiquatur, raro & cum difficultate curatur. Quæ uero eſt à natiuitate ſequens ſurditatem, non recipit curam. Et ſequens malam compoſitionem non poteſt perfecte curari. Quæ uero eſt à natiuitate contracta non ſequens ſurditatem corrigetur, cum ex decurſu ætatis, cū medicinali auxilio. Et ſere omnes reliquæ ſpecies emendari poſſunt. Licet omnes ſecundum plurimum non perfecte curentur, & proprie cum inueterantur.

Quam lingua abſque alijs membris grauedine a fuerit paſſa, & æger neque febrem, neque acutam ægritudinem incurrit, ſal ammoniacus, & piper, & zingib. & ſinapi album, ac pirethrum, & ſtaphiſagria, atque origanum, & baurach, & ſal indiæ, nigella, & ſampſucus ſiccus ſumantur, & in aqua coquantur, & fiat ex eis gargarismus. caueat tamen patiens, ne ex eo aliquid trahat. aut æger ieiunus multis diebus gargarizet almuſi nabati. aut fiat gargarismus ex aceto, & pirethro. poſtquam uero gargarizare ceſſauerit, ſumantur ſalis ammoniaci, pirethri, piperis, ſinapi, omnium partes æquales, & ex eis bene puluerizatis lingua diutius fricetur.

Hoc capi diuiditur in quatuor partes. In prima curat grauedinem linguæ pendentem ab humiditate phlegmatica aquoſa muſculos eius ingreſſa. In ſecunda curat ipſam grauedinem linguæ pendentem à paralyſi, & molliſicatione per cõmunitatem à cerebro. In tertia parte curat ipſam exiccatam, & ſpasmata ſpasmus de inanitione ſequente febres acutas, & cauſas huiusmodi inanientes. In quarta cauſa curat ipſam pendentem à ligamento quod eſt ſub lingua nimis prolongato. ſecunda ibi. Quod ſi cum linguæ tertia ibi. Si autem loquela quarta ibi. Et ſi diu eſt ex quo loquela. Quæ dicit in prima parte nota ſunt.

Nam præmiſſis uniuerſalibus, quæ Raſis omittit breuitati indulgens, curat grauedinem linguæ cum exiccantibus, reſoluentibus humiditatem phlegmaticam, quarum quædam ſunt notabiliter calida attingentia uſque ad quartum gradū, de quibus debet ſumi minor quantitas ſecundum can. doſan di, quia tamen bulliunt cum aqua contemperante ipſorum acuitatem, poſſumus accipere de ipſis æqualiter, ut Raſis & ſalis ammon. piperis, zingib. ſinapi albi, quia eſt minus calidum, pirethrum, ſtaphiſagrie, baurach, loco eius accipitur ſal nitrum, origani, ſalis indiæ, nigellæ, ſampſuci ſicci, id eſt ma-

ioranæ ſiccæ omnium, ana drach. i. bulliant in .i. lib. aquæ, ad conſumptionem medietatis, & coletur, cum qua colatura debite calefacta fiat gargarifina ſtomacho ieiuno cauendo ne deglutatur. Ipſa quoque debet aliquando in ore teneri abſque quod gargarizetur. Secunda medicina eſt almuſi, id eſt ſalſamentum. Nabati, id eſt, illius regionis. Tertia medicina eſt acetum cum pirethro, quæ facit fluere multam humiditatem ex lingua. Sed poſt gargarizationem decet fricare linguam cum ſal. ammoniaco, pipere, pirethro, ſinapi, an. partibus æqualibus. Sed hæc eſt acutior medicina qua non eſt utendum niſi in adultis habentibus ſenſum obtuſum, & hoc quantum ad primam partem.

Quod, ſi cum linguæ grauedine auditus, ac reliquorum ſenſuum grauitas fortis aſſuerit, fiet ægri curatio ſecundum doctrinam, qua paralyſis curatur.

In hac ſecunda parte curat grauedinem linguæ per cõmunitatem à cerebro. Et dicit ipſam eſſe curandam ſicut curatur paralyſis, de qua ſuperius factum eſt capitulum.

Si autem loquela in acutis febribus aggrauata fuerit, & uideris ipſam cum grauitate in loquela extenuatam, & abbreviatam, & ſpasmata; aqua calida ab alto ſuper ſpondiles dorſi & auris principia fundatur, & cū oleo fricetur. æger quoque oleum tepidum in ore tenere debet.

In hac tertia parte curat grauedinem linguæ ſequentem ſpasmus, & arefactionem eius propter febres acutas cum embroca aquæ tepidæ ſuper noctra, & ſpondilibus colli, quæ loca deinde cum oleo, & proprie uiolato tepido ungantur bene fricando, ut uirtus penetret in profundum, & retentione eiꝝdem olei in ore. Sed decentius eſt oleum amygdalinum. Et lac eſt ad hoc conueniens.

Et, ſi diu eſt, ex quo loquela minui non ceſſauerit, uel etiã ſemper, conſiderandum eſt, an ligamentum, quo inferius lingua connectitur, maius ſit, quàm debeat. quod, ſi ita fuerit, ex eo parum eſt incidendum, & zingib. puluerizatum immittendum.

In hac quarta parte curat grauedinem linguæ propter longitudinem ligamenti quod eſt ſub lingua, cuius ſuperius ſigna dicta fuerunt cum ſectioe ipſius, & zegi, id eſt uitrioli ſuperpoſitione in loco ſectio ne ruſus conſolidetur. Hæc autem ſectio fiat ſecundum tranſuerſum ligamenti, ut totum in latitudine ſecetur cum lanceta curua ſubtili in extremitate. Poſtea ponatur zegi ad prohibendum cõſolidationem. Sed apud Auic. imponatur filum cū acu & ſtriſte ligetur, donec rumpatur, aut tertio cum lanceta ignita ſcindendo cauterizetur, & melius eſt, ut ſit aurea, iuxta doctrinam ſapientū. Fiat autem hæc ſectio in loco magis oportuno, per cuius ſectio nem iudicio exiſtimatio uideatur magis ad motum facilitari. Sed hic ultimus modus iudicio meo eſt melior. Poſt eiꝝ ſectio nem ponatur in uulnere parum cotti inuſi in oleo roſæ, tepido, uel melius in albumine oui, ut partes ſolutæ diſtantes conſeruentur nec permittantur inuicem reuniri. Cõformius tamen uidetur textur Raſis, aliquid de ligamento eſſe ſecundum longitudinē incidendū. Si cauſa fuerint primitiuæ remoueantur, & paulatim aſſueſcat proferre homo ſyllabas, diſtiones, & literas in quibus maxime difficultatur. Item aſſueſcat loqui coram magnis uiris, & magiſtratibus incipientes do à minus dignis, & gradatim ad magis reuerendos procedendo. ſi timore aut uerecundia in locutione impediatur. Et ſi pueri fuerint tardantes in locutione, ad loquendum irriteretur. Et ſi adulti fuerint, aut grandes, ſtudeant ſe exercendo paulatim componere maxime, & frequenter proferendo ea, quæ ſibi fuerunt, difficilia. Et imitentur Demothe nem uirū eloquentiſſimum, qui cum inepte, & balbutiendo loqueretur, ſumebat in ore lapillos paruos ſex, aut plures, poſtea cū ſtudio, & conatu loqui ſtudebat. Cumq; pluries ſic loqui ſtudiſſet, poſtea pauciores in ore loquendo retinebat. Tandem poſt longam conſuetudinem, & experientiam talem, ſine lapillis, ita clare, & expedite locutus eſt, ut ceteros in pronuntiando ſuperaret. Vtebatur ſpeculo magno in quo ſeipſum frequenter intuebatur, pronuncians in loco ſecreto orationes quas habiturus erat in publico, & ſeipſum notans emendabat ineptos aut turpes geſtus manuum, & pedū aliorumq;

rumq; membrorum motus, oculos & oris, ita ut se totū corrigeret, & poliret inde cum uoce breuem & submissam, & anhelitus angustia pateretur, ad littora maris accessit, ubi si se orare audire uolebat, necesse erat, ut alte clamaret. Quibus ingeniis limatissimum ac florentissimum se fecit. Et propter hoc qui habent anhelitum breuem & angustum, studeat anhelitum diu continere. Item longam orationem uno anhelitu uoce sonora producere.

Si grauedo linguae pendeat ab humiditate sanguinea, aut aquosa sepulta, aut imbibita in lacertis, aut musculis linguae cum communicate cerebri, aut sine comunitate eius exiguatur, sex intentiones. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia resoluit, & exicat residuum materiae per partem oppositam. Quarta uero per eandem partem. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat regimen sex rerum non naturalium. Prima quidem perficitur cum phlebotomia ex cephalica si materia fuerit sanguinea. Deinde uenarum, quae sunt sub lingua. Et tertio si expeditur sub mento uentose, quae omnia fiant si materia sit multa: si uero pauca sufficit phlebotomia uenarum, quae sunt sub lingua, & uentosatio sub mento. Si uero materia fuerit phlegmatica, aquosa euacuetur euacuatione, post euacuationem cum hieris minoribus in principio: deinde cum maioribus. Et pilulae cochiae sunt conuenientes. Et pilulae de hiera cum agarico. Secundam rem complent frictions extremitatum uentosationes in spatulis, & administratio clysteriorum acutorum iteratis uicibus. Primo leuius, deinde acutorum. Item caput purgia per nares. Terciam rem complet administratio medicinarum propriarum parti posteriori capitis nocere, & primis spondilibus resoluendum humiditates aggregatas in lingua, & neruis linguae deferuentibus incipiendo a fomentis, & unctionibus, postea procedendo ad embrocās, emplastra, & cetera usque ad rubificationem, & cauteria quando alia non contulerint. Fomenta autem, & embrocās possunt fieri ex huiusmodi. R. ruta, salvia, rosmarini, sampluci, calamentis, iux, & similia, ana. quantum sufficit. bulliant in uino, & aqua, ana. cum paucis aceti, & approximetur locis iam dictis cum spongia, aut filtro debite expressis, postea sequatur aliqua ex unctionibus, cerotis, aut emplastris dictis in cap. de paralyti, quae omnia ad hunc locum afferantur secundum oportunitatem, & casus aque theriacis sulphurearum, & uniuersuliter exiccantium super puppi capitis, & primis spondilibus est conueniens. Forma autem cauterizationis si expeditur est secundum hunc modum. Fiant tria cauteria actualia cum ferro, aut auro figurata, secundum formam medietatis ossis olivae, quae penetrant quantum est medietas ossis olivae, secundum longitudinem, aut minus. & fiat secundum longum in fontanella puppis, capitis, quorum primum sit in nocrā, id est ubi caput collo coniungitur secundum in fine primae spondilis. tertium in fine secundae, & fiant duo alia lateraliter in radice cranei distantia a medio secundum quantitatem pollicis, & diu conferuentur aperta. Ista tamen postponantur quantum est possibile, ut non fiant nisi cum cetera non contulerint. Quartam rem complent gargarismata collutiones oris, frictions linguae, res quae in ore retinentur exiccantes residuum materiae ad quas gradatim perueniatur incipiendo a debilibus, & gradatim procedendo ad fortiora, neque fiant continue, sed per interualla dando etiam aliquando dum haec expediuntur theriacam mithridatum, & similia, sicut semel in hebdomada debita seruata custodia. Medicinae autem simplices leues ad hanc intentionem sunt maiorana, salvia, iux, stoeas, hyssopus, origanum, costus, alae, radices capparis, acorus, & similia. Sed fortia sunt zingib. cinnamomum, sinapi, & staphisagria, pithrum, tria grana piperis, salia ammoniacus, nigella, euphorbiū, & similia, his autem uti potes faciendo decoctiones, pulueres, pilulas, & similia his secundum exigentiam, & castoreum retentum sub lingua, & confricatum confert mirabiliter. Et ex supra scriptis possunt fieri pilulae incorporando pulueres supra scriptos cum castoreo, terebinthina, assa foetida, laudano, resina, tragachan, & similibus, & sunt efficacissimae. Item acori cōditum, & diacori sunt medicinae praestantes ad hanc intentionem. Item confectio de pithro, & confectio anacardina data per interualla est conueniens sumpta, linita, & emplastrata parti posteriori, & origini neruorum. Item sal solutiuum

linitum super linguam descriptum in cap. de paralyti, & quadoque confert frictio linguae cum acetosis stipticis, sicut lac acetosum, succus fructuum acetosorum, qui non sunt maturi & acetum, & huiusmodi. Et nota quod si timeatur fluxibilitas materiae sunt stiptica praedictis exiccantibus miscenda sicut darlesaham, & est flos mali granati permixtum cum rosis. Et sicut flos schinanchi cum spodio. Medicinae autem Rasis sunt fortes & ultimae. Et humiditate sanguinea exilente in causa conueniunt leniora, & minus calida. Quinta autem intentio est correctio ardoris, aut excoarationis linguae, & similia si acciderit. Sexta autem intentio elici potest ex cap. paralyti, debet enim dicta ad sicum declinare. Si uero grauedo linguae sequatur spasmus de inanitione, aut magnitudinem ligamenti, quod est sub lingua, cura a Rasi sufficienter posita est, & per me declarata. Sequens uero malam compositionem non potest perfecte curari, corrigitur tamen ingeniis superius dictis in principio curae positus.

Cura autem grauedinis sequentis solutionem continuitatis est cura ipsius solutionis, & si cicatrix remaneret, mollificationi, & subtiliationi eius intendatur. Apotematum autem linguae cura ponetur inferius.

De tumore Linguae.

Cap. 60.

Tumor linguae, magnitudo, inflatio sunt termini synonimi huius dispositionis, quae diffinitiuē est tumor praeternaturalis linguae, interdum tantus, ut os egrediatur est autem hic tumor aliquando apotemosus aliquando sine apotemate, sed hic de tumore non apotemose agitur. Differt apotemosus a non apotemose, quia est cum mala complexionē, mala compositionē, solutione continuitatis, ex quibus cum coniunguntur prouenit una aegritudo, cuius unitas saluatur in ordine, & dependentia istorum membrorum simplicium adinuicem. Cum enim humores fluunt ad linguam, suscipiuntur in uenis, & postea in poris eius, & ipsos extendunt, & sic tumorem faciunt postquam extensione, & tumorem soluitur continuitas ipsorum, ita ut ex pluribus poris solutis fiat una concauitas, aut plures, ad quem tumorem simul cum soluta cōtinuitate sequitur mala complexio propter prohibitam transpirationem, & in hoc ordine, & dependentia saluatur quod apotema est morbus unus. Sed in non apotemose humores fluxi suscipiuntur in uenis, & poris, & non soluunt ipsos, est ergo tumor sine soluta cōtinuitate, & per consequens sine apotemate.

Huius tumoris causa cōiuncta est duplex, scilicet sanguis dominans, aut humiditas plurima phlegmatica. Causae uero remotiores sunt aliquando primitivae, sicut comestio fungorum, & aliorum uenenosorum, quae linguam tumere faciunt, & aliquando morsus ab aliquo animali occulte permixto cibis qui comeduntur, sicut species uestipae, aut araneae, aut scorpio, & similia. Aliquando sunt corporeae, sicut multitudo sanguinis, aut phlegmatis in toto, aut in capite. Signa causae primitivae significant seipsas, & nocumentum festinū ex ipsis derelictum. Tumor uero sanguineus cognoscitur ex colore rubeo cum aliis signis attestantibus sanguini. Et phlegmaticus ex colore albo, & multa humiditate phlegmatica ex ore fluente cum ceteris signis phlegmatis. Discernitur autem apotemosus a non apotemose duritie, febre, dolore non autem quantitate. Prognosticum. Haec dispositio curatur secundum plurimum si conuenienter tractetur.

Cum contingit linguam adeo inflari, ut praemagnitudine os egrediatur, si icanda est ex capite, aut ex citra acetositate, aut cum ribes, aut ex granato acetoso, donec salua multa ab ea fluat: hoc namque modo detumescit, & ad primam redibit mensuram. si autem non sufficit, fiat frictio ex sale, & aceto. & si nondum sufficit, fiat minutio ex utrisque; cephalicis prius, et postea ex uenis quae sunt sub lingua.

Diuiditur hoc capi in partes duas. In prima ponit remedia localia. In secunda ibi. Et si nec sufficit. Curat hanc passio nem per phlebotomia. totum cap. parebit ex dicendis. Cura huius humoris triplex exigit regimen. Primum respicit causam antecedentem complendum euacuatione & diuersione. Vnde materia existente sanguinea, fiat phlebotomia ex utraque cephalica propter eius multitudinem. Et si retentio haemorrhoidarum, aut menstruorum esset in causa, praemittatur

Io. Arculani N 4 phlebotomia

phlebotomia saphenarum, & pro hoc recurrit ad ea, quæ superius dicta sunt sæpe. Materia autem existente phlegmatica euacuatur, cum sibi propriis, de quibus supra. Secundò, diuertantur istæ materiæ sanguinæ cum uentosis in spatulis & nocrea, & phlebotometur uena, quæ est in mento, aut sanguis fuga, uel uentosa ibi apponatur. Sed materia phlegmatica cū caput purg, & clysteribus, & similibus. Secundum regimen respicit causam coniunctam. Primo complendum per materiæ eradicationem, sanguinæ equidem per phlebotomiam nenerum linguae. Phlegmaticæ autem gargarismatibus, aut masticationibus, sed melius est, ut hæc postponantur usque ad statū, secundo materia existente sanguinea repercutiatur. Et siquid fluxum est, educatur cū acetositatē citri, aut ribes, aut uini granatī, acetosi, ex quibus lingua fricet aliquoties, & in ore teneantur: per hæc enim frigida, & sicca & stiptica fiat repercussio, & per acetositatem humiditatis cum salina educio. In materia uero phlegmatica in principio, approximetur oxymel simplex. In augmento uero in sanguinea addatur supra scriptis rob diamoron, & in phlegmatica oxymel, parum zing, aut salis communis aut salis ammo. & ulterius uersus declinationem misceatur acetum, & diamoron in sanguinea. Et in phlegmatica fiat frictio cum sale & aceto cum cepis, addatur tandem zingi, & sal gēma, & sal ammoniacus, & reuertetur ad mensuram suam. Mollificatio quidem linguæ cum accidit pueris, sufficit in ea sollicitudo custodiē, id est, regiminis in sex rebus, & cibatio ex passeribus, & uolatilibus multū ambulatius, id est, quæ declinet ad siccum. Qui dam homo, ut dicit Auicē, iam uentofatus fuit, & percussus est cum scalpello uilus nervi in spondilibus panniuli coniuncti cum lingua, quare mollificata est lingua. Ex quo arguitur præter septimum par neruorum cerebri alios neruos à spondilibus colli orientes concurrere ad motum linguæ, & secundo infertur in actū practico scarificationem esse faciendam in pulpis spatularum non in spondilibus, neque prope spondiles. Tertium regimen sedat accidentia, ut puta ardorem sequentem ad medicinas acutas, ut cum lacte retento in ore, & similibus, secundo ordinat regimen sex rerum non naturalium. Quod in sanguinea declinet ad frigidū & siccū, in phlegmatica ad calidum & siccum. Si uero hic tumor pen deat à uenenosis cura requirēda est sexta quarti. Nimis enim prolixus essem si omnia huiusmodi prosequi uellem.

De ranula Linguae.

Cap. 61.

Hæc passio dicitur glandula, quia ad similitudinē glandulæ in figura, quantitate & duritie, aut quia est uere glandula, scilicet apostema phlegmaticum kisti circum datum mobile facilius de loco ad locum, & hoc est raro, imò est secundum plurimum caro ibidem nata, ac si noua lingua excrederet. Et dicitur ranula ad similitudinem ranæ parue in quantitate figuræ & colore: habet enim colorē album tendentem ad uiridem similem colori ranæ. Hæc autē est similis colori linguæ composita ex colore suæ substantiæ qui est albus, & ex colore uenarum, quæ sunt in ea, quæ tēdit in nigrum, ex quibus confurgit color albus tendens ad uiridem. Et hæc ægritudo est proportionalis pueris, & infantibus, quia in eis multiplicatur humiditas uiscosa à capite defluens, quæ est eius causa. Species eius est duplex, est enim quædam alba mollis tractabilis, quædam nigra uel fusca dura intractabilis & utraque est duplex, quædam cum dolore, aut alia sensibili læsione, quædam sine, & quælibet est duplex, quædam antiqua, quædam noua. Signa, & causæ patent ex dictis. Apparet enim aliquando in loco iam dicto, ac si noua lingua oriretur, & quæ est alba, est ab humore phlegmatico uiscoso, & quæ nigra ab humore phlegmatico tendente in melancholiam per adustionem, aut per partium subtilium resolutionē. Prognosticum. Secundum plurimum curatur si conueniēter tractetur. Nisi pendeat ab humore melancholico. Et pro prie adustione participante.

Cum sub lingua glandula nocina fuerit, in principio ex sale ammoniaco, & gallis fricanda est. Si autem uetusta fuerit, ex medicamine gingiue sanguinolentæ fricanda est, quod est medicamen acutum. Eger autem acetum, & sal in ore teneat.

Diuiditur hoc cap. in partes duas, primo ponit curationē

ranulæ nouæ, secundo antiquæ, secunda ibi. Si autem uetusta fuerit, totum patebit ex dicendis.

Cura post euacuationem, & diuersionem, & debiti regiminis ordinationem. Primo est tenenda cum leuibus exiccantibus cum salua pistata, uel succo eius ibidem cum cotto apposito, uel fricetur cum origano, sale, & corticibus granatorum tritis, & simul mixtis, postquam frictionem infundatur cotto cum his medicinis cum aceto mixtis, & applicetur, & fortius istis est calcanthum, id est uitriolum ustum, hermodactylum, albumen oui mixta & applicita, uel iuxta textum fricetur cū sale ammoniaco calido in quarto, & gallis simul mixtis, uel acetum, sal, & flos æris simul mixta applicentur. Acetum etiam, & sal ibidem retenta sunt leuia, & conferunt in cura. Si autem uetusta fuerit, est auferenda, aut cum causticis, aut operatione manuali. Rasis autem dicit esse applicandum medicamen superius positum in cap. de gingiuis sanguinolentis, quod tenendum est ibidem per mediam horam, aut approximetur cauterium ex capitulo factum, & eam causticabit in paruo tempore, & tunc temporis defendantur partes circumstantes cum petis infusus in albumine oui, aut cū suc. plantaginis, & aceto, post eius remotionem applicetur lac, aut uitel. oui, & tandem remota escara consolidetur. Operatio autem manualis est, ut capiatur cum uncino, & cum sagittella eradicetur, post eius eradicationē ponatur uitriolum mixtū cū albumine oui. Sed hæc fortia nō hāt nisi in illa, quæ sensibilibus lædit, & quæ nō est fusca. Si enim est fusca, tutius est dimittere, ne conuertatur in cancrum. Et si fluxus sanguinis impediret pro illa uice dimittatur. Et sanguine contriēto sequenti mutatione operatio compleatur. Et post extractionem lauetur locus cum aceto per duos dies, postea cum aceto decoctionis myrrhæ, donec sit facta consolidatio.

De his quæ nascuntur in lingua. Cap. 62

Ista ex eisdem sunt curanda, ex quibus curantur aleola, quas nominauimus, & synanche sanatur.

Rasis breuiter se expediens dicit hæc esse curanda, sicut aleola, id est pustulæ linguæ, quas superius nominauit, & etiam sicut synanche, de qua in sequenti cap. est acturus. Sed pro integra notitia sciendum est hæc apostemata esse sanguinea, cholerica, phlegmatica, & melancholica. Quæ iterum sunt duplicia quandoque generantur à melancholia adusta, & sunt cancri, quandoque à melancholia non adusta, & sunt de genere sephiros.

Causæ & signa patere possunt ex sæpe dictis, quandoque enim generantur ex potu uenenosorum, sicut fungi, & opii, ac etiam ex morfu, sicut dictum est superius.

Prognosticum. Hæc apostemata si conuenienter tractentur, curantur præter melancholica, quorum secundum plurimum est difficilis eradictio, & præcipue cancri.

Cura similiter exigit triplicem regimen, sicut dictum fuit in tumore non apostemoso: hæc tamen uelocioribus indigēt auxiliis. Fiant ergo euacuationes, & diuersiones in sanguineo phlegmatico, sicut ibidem dictum est. In cholerico autē, & melancholico fiat euacuatio cum propriis, quæ ex sæpe dictis possunt esse manifesta. Duo tñ hæc attendenda sunt. Primum, quia phlebotomia in quacunque specie horum apostematum secundum plurimum est cōueniens. Et similiter phlebotomia uenarum sub lingua ad materiæ eradicationem.

Secunda, ut in his apostematibus, sicut etiam in tumore linguæ non apostemoso uomitus caueatur, sed super lingua localia applicanda in principio apostemata sanguinei & cholerici sunt suc. plantag. aqua rosacea suc. solatri. suc. semperui, & est proprius, quæ omnia cū aceto misceantur quod sit subquaduplum ad succos secum permixtos. Sed in cholerico eligantur ex his, quæ sunt magis frigid. & humid. quibus etiam minus aceti permisceatur. Similiter decoctiones ros. & aliarum rerum in frigidantium, & stipticantium, sicut sumach, myrti, & similia. In augmento autem addatur his decoctio foliorum oliuæ & uinum ponticum, & similia, & si tendant in uiam resolutionis. Si uero maturentur, adiuuentur cum melle & lacte, & cum decoctione ficuū & pasularum fœnugr. sem. lini. & similia. Et post maturationem aperiantur cum sagittella, & tandem mundificentur & consolidentur cum melle ros. uino nigro, & sic de singulis. Phlegmatica

matica uero in principio repereantur cum decoct. myrtis, fol. oliuæ, uino pontico & aceto, quibus potest addi radix fænic. combust. & puluerizati. & ulterius in processu addatur his sal, zingiber. & similia superius dicta in tumore phlegmatico non apostemosa. Si uero apostemata sint melancholica, inchoandum est cum lacte muliebri, asinino & caprino. postea teneatur in ore decoct. dañtil. & sicum cū uino dul. & sic procedatur per tempora sua, in cancro autem procedatur cum magis frigidis, sicut cum lacte & oleo rosæ. nuc. cil. pil. & suc. solat. & similibus. Et Auic. recitat historiam Gal. de senexagenario habente apostema in lingua cui non fecit phlebotomiam, quia non erat consuetus, & cum apposuisset quædam localia non uolebat obedire quia fatius erat, & tandem dixit se somniasse tenere in ore succ. lactuc. ex quo uidebatur sibi in somniis esse liberatus, quod Gal. illi cōcessit & per illum liberatus est. Et est deinceps inuentum succū illum esse medicinam singularem in hoc casu quod etiā multoties expertus sum. Curatio autem uera canceri & similiter sephiro puri non est nisi eradicatione ipsorum cum tota substantia linguae in qua sunt, & etiam auferendo aliquid de parte sana, & pprie in cancro, quæ res difficillima est & secundum plurimum impossibilis. Dieta autem in sanguineo declinet ad frigid. & sic. In cholerico ad frigid. & humid. in phlegmatico ad calid. & sic. In melancholico non cancroso ad calidū & humidū, sed in cancroso ad frigidū & humidū.

De anatomia gutturis.

Cap. 63.

Postquam Rasis in parte præcedente egit de passionibus oris. In hac parte agit de passionibus gutturis, de quibus Auic. determinat. con. tertii. licet de quibusdam passionibus eius superius dictum fuerit. Iuxta ordinem præmissum præmittenda est anatomia gutturis. Est enim guttur spaciū in quo sunt meatus anhelitus & cibi, in cuius principio est uulua pedes ex palato, & à lateribus duæ amygdalæ & sub uulua galsamat & epiglottis, & canna pulmonis post quas uersus spondiles est meri. De anatomia uulue fuit superius dictum. Et similiter pro parte de anatomia duarum amygdalarum, quæ iuxta sententiam Auic. sunt duæ carnes natæ in radice linguae tendentes ad superiora, ac si ipsæ sint duæ auriculæ paræ, & sunt neruose, ut sint fortiores, quarum iuuamentum est ut adiuuent, ut aer penetret per epiglottim ad cannam pulmonis. Algamat uero est caro panniculosa & p parte cartilaginosa annexa palato sub uulua cooperiens caput cannae, id est orificium epiglottis, ut cibus ab ore possit super hoc cooperimento transire ad meri quod est situm in parte posteriori, aperitur autem homine loquente, ridente aut canente. Et propterea si tunc temporis cibum deglutiat uel potum, transit ad epiglottim, homo strangulatur, & tussit donec quod ingressum est emisit. Anatomia uero epiglottis cannae pulmonis & meri dicemus posterius.

De synanche seu angina.

Cap. 64.

Circa rub. huius capituli, sciendum quod reperiuntur isti termini, synanche siue synanchia, cynanchia siue synanche significantes hanc dispositionem, de qua hic agit Rasis, quæ diffinitiuè est apostema in gutture anhelitum impediens uel deglutionem aut utrumque. Parasyanche, & parasyanche sunt termini synonymi significantes paruum synanchen, & propterea appropriantur synanchia, quæ est in musculis extrinsecis & non intrinsecis ipsius meri & epiglottis, licet apud Salernitanos. Synanchia dicitur quando est intus & non apparet extra. Cynanchia uero, quando est solum foris. Squinantia quando est intus & foris iuxta uersum suum. Sy. intus, cy uero, foris (qui. tenet utrumque). Dicitur autem in diffinitione quod est apostema, nam licet possit accidere impedimentum in deglutione & anhelitu ex aliis causis existentibus in gutture, illud tamen non dicitur synanchia. Sicut si præfocaretur homo ex comestione fungorum aut aliorum uenenorum, aut ex congelatione sanguinis in aliquibus uisceribus, aut si istæ operationes impedirentur propter dislocationem alicuius spondilii collis, maxime primæ & secundæ ad interiora quæ dislocatio potest esse tam à causa extrinseca, quam à causa intrinseca, & propriè in pueris propter debilitatem ligamentorum suorum. Similiter & si palparentur aut paralytarentur musculi meri,

aut epiglottis propter quæ istæ operationes impedirentur si cut est possibile nullo existente apostemate, tunc non diceretur synanchia, imo est possibile quod fiat præfocatio & impediat anhelitus propter nocuum lacerti, quæ est in interiori parte epiglottis, quamuis meatus non sit oppilatus & plurimæ sunt aliæ causæ, quæ possunt impedire deglutionem & anhelitum, quæ tamen non faciunt synanchiam, quia non apostemant. Species synanchia, quædoque sumuntur ab humoribus, quandoque à locis in quibus sunt. Est enim quædruplex, scilicet sanguinea, phlegmatica, cholerica, melancholica, quæ tamè rarissime accidunt. Cuius causa est, quia ista passio fit ualde citò & secundum plurimum per uiam defluxus. Raro autem humor melancholicus propter sui crassitatem & paucitatem citò permutatur de loco ad locum, neque huiusmodi apostema melancholicum posset, nisi in longo tempore congeri. Atamen uult Auic. hanc synanchiam melancholicam cā incipiendo, quam permutando maxime ex apostemate sanguineo aliquando posse generari. Sunt etiam quatuor species distinctæ secundum loca.

Nā aliqua fit in musculis extrinsecis ipsius epiglottis uersus partem anteriorem gulæ. Et aliquando fit in musculis extrinsecis ipsius meri siue uersus epiglottim, siue uersus spondiles collis, & similiter etiam aliquando fit in musculis spondilium collis. Tertiò aliqua fit in parte intrinseca ipsius meri. Quarto aliqua fit in parte intrinseca epiglottis & cannae pulmonis. Et quandoque fit in pluribus partibus simul. Auic. uero nominat unam speciem famosam præfocationis quæ dicitur canina. Nam patiens ipsam gerit similitudinem canis sub actu solis fatigati. Emitit enim linguam, tenet os apertum habet anhelitus succedentes sicut canis taliter fatigatus. & hoc est secundum plurimum in parte intrinseca epiglottis & cannae. Et ex his inferitur apostema duarum amygdalarum non propriè synanchias appellatas. Cuius causa est, quia secundum plurimum leuiter impediunt deglutionem aut anhelitum, sed dignius appellantur parasyanchia. Causæ conium dte sunt humores iam dicti. Sed frequētius sanguis, quia eius maxima abundantia in uenis & arteriis collis est reperta, deinde phlegma, plurimum ex eo à cerebro deriuatur, rarius cholera, rarissime melancholia.

Causæ antecedentes sunt repletio aut totius, aut capitis, aut partium circa guttur, similiter debilitas illorum membrorum. Causæ primitiue sunt indebitum regimen sex rerum nō naturalium, & propterea multiplicatur in uere frigido & humido, & aliqui cibi à proprietate eam generant, sicut andacochar, id est trifolium. Item balneum, exercitium forte & inconsumetum corpore repleto, & similia. Terminantur autem sextupliciter, quia aut resoluitur, aut suppuratur, aut induratur, aut permutatur, uel ad cutem exterius, uel ad pulmonem uel ad cor, uel ad stomachum, uel ad cerebrum, aut putrefit, aut interficit maxime suffocando. Signa communia. Omnes synanchia sunt impedimentum deglutionis aut anhelitus, & secundum plurimum utriusque & aliquando tantum, ut potius cum non potest deglutiri per nares egrediatur. Signa autem sanguineæ si sensui subiacet est color rubeus, purpureus, tenso, durities, dolor fortis extensus, grauius, & quandoque pulsatiuus, sapor rei dulcis attestantis dulcedini sanguinis aut similis sapor uini, & constrictio anhelitus uehemens, & reliqua signa sumpta ex complexionem & habitudine sanguineæ, & tensione uenarum faciei & collis, & similia. In cholerica, color est rubeus tendens in citrinum dolor pungiuius aut mordicatiuus, pauca tenso & durities, sitis lingue, citrinitas, & ariditas parua, anhelitus constrictio & uigilia, & apparet quod sit in loco aliquid acutum mordicatum: dolor tamen cholerica minor est dolore sanguineæ & cætera attestantia cholerae. Phlegmatica dolor est paruus obtusus, sapor phlegmatis saluus cum caliditate & uiscositate, quonia hoc phlegma est corruptum & putrefactum, albedo lingue & faciei, paucitas sitis & paruitas inflammationis, multa humiditas ex ore profluens & cætera signa phlegmatis. Et quædoque præsternitur lingua cum mollificatione, & raro accidunt cum ea apostema in glandulis, & nō sunt cum ea feb. & prolongatur spaciū eius ad quatuor dies, & quando nititur habens eam possibilis est deglutio, quoniam penetrat deglutitum in mollitiem. Melancholica uero, color fuscus, paruus dolor,

dolor, siccitas linguæ, durities, tardus euentus, eius sapor pōticus, & cetera signa melancholiæ. Et quandoque fit incipiendo, & quandoque permutando ex apostemate sanguineo. Signa illius quæ est in musculis extrinsecis epiglottis uersus anterius est, quia comprehenditur per uisum & tactum tangendo cutim exterius ex directo epiglottis, nā sentitur durities, & leui tactu causatur dolor, & aliquando color apostematis communicatur exterius, & est magnum impedimentum in anhelitu paruum in deglutione non potest uideri aspiciendo in ore. Illa uero quæ fit in musculis extrinsecis meri, & facta in musculis spondilium comprehenditur uisu fortiter comprimendo linguas, sed magis impedit deglutionem quam anhelitum, facta in musculis extrinsecis epiglottis uersus meri etiam comprehenditur uisu, fortiter comprimendo linguas. Sed magis impedit anhelitum quam deglutionem, facta autē interius in meri non comprehenditur aliquo modo per uisum, & magis impedit deglutionem quam anhelitum. Sed facta in epiglotti etiam non uidetur, & magis impedit anhelitum quam deglutionem. Nota qd si fiat in parte inferiori meri potest impedire deglutionem, non impediendo anhelitum sicut facta in canna distat ab epiglotti multum impedit anhelitum, imò secundum plurimum suffocat quamuis non impedit deglutionem. Sed in parte superiori propter magnā connexionem utriusque in quocunque fiat, utriusque notabiliter operationem impedit. Signa uero causarum primitiuarum sunt ipsarum præcessio. Signa uero apostematū quæ fiunt in amygdalis ex loco sumuntur, facile enim subiaccit uisui, & etiam cū digito tangi possunt. Signa terminationis ipsius sunt, quia si resoluatur feb. & cetera accidentia completē remittuntur, neque apparet alterius membri nocumentum. Si uero suppuretur intenditur. feb. & dolor, & proprie pulsatiuus & cetera accidentia, deinde parum quiescit circa quartum diem, donec tandem rupatur, siue à natura, siue ab arte. Si uero induratur resolutis partibus subtilibus crassis remanentibus, in primis fit alleviatio, decrescit feb. & cetera accidentia, & remanet tantum grauitas, & dolor, & impedimentum deglutionis aut anhelitus longo tempore, & forte per annum. Et quādoq; materia lapidatur. Et aliquando res dura sicut lapis egreditur. Si uero permutetur, illius apostematis delirescunt omnia accidentia præter feb. & cum hoc sequitur nocumentum in alio membro ad quod materia permutatur. Vnde si permutatur ad pulmonem, sequitur tussis, & pulsus fit undosus, anhelitus postea constringitur cum in principio permutationis fuerit dilatatus, & sequuntur cetera accidentia peripneumoniarum. Si uero pulsus fiat spasmosus permutatur ad neruos. Si uero ad cor, fit pulsus diuersus debilis, tremor cordis, & syncopis, & festina mors. Si uero ad stomachum sequuntur nocumenta stomachi cum remissione nocumentorum gutturis. Si uero ad cerebrū sequitur dolor capitis, alie natio, & cetera accidentia phrenesis, de quibus supra. Si uero ad cutim, crescit in cute dolor, durities tumor & rubor: si materia sit cal. cum remissione nocumentorum synanchie. Si uero non permutetur, sed potius materia dilaretur propter sui multitudinem, tunc cum cremento nocumentorum cutis crescit accidentia synanchie. Si autem putrefiat crescit feb. & cetera accidentia, & partes putridæ, quæ sensui subiaccit, aut nigrescunt & foetent. Si uero interficit absque alia ex supradictis terminationibus tunc est, aut quia corpus nō nutritur deglutione impedita, aut præfocatur anhelitu propter apostema impedito.

Prognostica. Primum. Omnis synanche est acuta & uelocis terminationis ad mortem uel ad salutem nisi ad duritiem terminetur, tunc enim quandoq; chronicatur. Velocissimæ aut terminationis, & proprie ad mortem est quæ est in parte intrinseca epiglottis. ita ut quandoque in 24. imò in 12. horis præfocet. Et cum hac frequenter est exitus amboꝝ oculorum, & egressio linguæ cum debilitate motus eius. Sed in pluribus est terminatio inter quartum & septimum. Secundum. Illa synanche est deterior, quæ apparet interius & exterius occupans omnes partes, postquam sequitur in malitia, quæ non apparet interius nec exterius, deinde quæ apparet interius & non exterius: minus mala quæ apparet exterius & non interius. Tertium. Illa synanche est ualde mala cum qua prohibetur anhelitus omnino si æger resu-

pinetur, & si non resupinetur fit anhelitus difficilis. Illa autē cum qua impeditur deglutio, imò aufertur absque magno impedimento anhelitus est secundum plurimū salubris, sicut e contrario illa cum qua multum impeditur anhelitus cū pauco impedimento meri est secundum plurimum mortalis, & mortalior est illa, quæ plurimum impedit anhelitum absque aliquo impedimento deglutionis, quā quæ simul impedit anhelitum & deglutionem. Significat enim apostema in canna pulmonis quod est deterius aliis partibus, quā in epiglottis. Quartum. Quando tanta fit anhelitus constrictio ut eductis humiditatibus ex pulmone fiat spuma, tunc non est spes in ipso, nec oportet ut curetur. Cum tamen quandoque accidat ut præfocatus spumet, scilicet ex aliis causis, deinde sanetur. Quintum. Cuiuscunque præfocati facies fit uiridis & denigratur situs oculorum, tunc moritur, & similiter quādo minoratur pulsus & infrigidatur extrema. Sextum. Crassities linguæ & ipsius denigratio est ex signis ualde malis. Septimū quarto est cum præfocationibus mali, feb. melancholica & inordinate uagans & non seruans periodum, tunc mors festinat, quoniam feb. facit ægrū indigere anhelitu magno. Octauum. Dictum est in signis mortis uelocis, quod si quis præfocationem patitur, & alteratur color postremi colli eius à rubedine sua cōsuetā ad albedinem aut ad uiriditatem & sudat assellæ & inguina eius sudore frigido, moritur inter spacium duorum dierum. Nonum. Si permutetur ad pulmonem, in septem diebus pereunt. Si uero hos effugerint, salui sunt. Sed quæ permutantur ad cor semper interficiunt. Signa uero spei sunt, si permutatur rubedo ad exteriora, multoties enim aperiant oculos & sanantur, & similiter quando alteratur eorū anhelitus & capiunt anhelare anhelitu breui, cuius causa est, quia in uehementi constrictione habent anhelitum longum, quoniam propter strictionem uiarum aerem paulatim intrare faciunt. Cum ergo abbrevietur, remouetur causa præparans ad longitudinem, & redeunt membra ad dispositionem naturalem, & similiter quando permutatur materia ad larem oppositum facit sperare, & quando accidit dolor perferens anno uno aut duobus in gutture, significat petrosam superfluitatem in partibus gutturis.

Quam in deglutiendo sentitur angustia; adeest passio quæ synanchia uocatur: cuius grauitas, aut leuitas secundum angustie quantitatem deprehendi potest.

Diuiditur hoc cap. in partes duas. In prima ponit signa synanchie, in secūda ibi. Cum traiciendi ponit curam. De prima parte dicit. Cum in deglutiendo sentitur angustia, tū ex dolore in deglutiendo, tum ex anhelitus constrictione adeest synanche, & uos supplete reliqua signa superius dicta concludentia ibi adesse apostema. Huius autem synanchie grauitas est maior aut minor fm quantitatem angustie; id est, nocumenti in deglutiendo & anhelando, sed maxime in anhelando.

Cumq; cum traiciendi angustia fuerit in facie, & oculis rubedo, & repletio; in principio curationis caphalica phlebotometur, et gargarismus ex succo granati muzzi cū carno sitate sua fiat, aut ex rob mali maciani acetosi, aut ex rob mori de seni. & post hoc fiat gargarismus ex aqua rosacea, in qua sumach fuerit infusum. quod postquam per tres dies sic factum fuerit. & uenter ex succo fructuum; sicut prunorum, tamar. cassie fist. & terene. bim solutus fuerit; fiat gargarismus ex apozimate ficcum citrinarum, & passularum, aut ex medulla cassie fist. cum hydromelle. quod, si passio inueterauerit; ex gargarismis, & insufflatione sortium medicaminum. quæ dicturi sumus, curanda erit

Hic ponit curam. Et diuiditur in tres partes. In prima curat synanchen à causa calida. In secundo ibi. Si autem in facie non fuerit rubedo. Curat synanchen à causa frig. in tertia ibi. De his præterea ponit media malæ synanchie. Quæ dicit in hac parte sunt manifesta. Innuit enim curationem uniuersalem cum phlebotomia cephalica, & cum decoct. fructuum & manæ, & cassia ad euacuandum choleram, quæ in his casibus cum frigidis lenientibus debet educi, & non cum medicinis exoluentibus. Recepta autem sit huiusmodi. R. prunorum

rum tamar.ana. 3. s. incedantur crasso modo, & bulliant in 9. 3. aquæ ad consumptionem duarum partium, & coletur, cum qua colatura trahatur crass. 3. s. mannæ. 3. i. aut decem. 3. flor. rum cassie cum suprascripta decoctione misceantur. Et quantum ad curam particularem innuit intentiones tres. Prima est repercussio cum quatuor medicinis frig. & sic. & stipt. & in litera descriptis, quæ debent aliqua ponticitate & acridine participare, ut profundius imprimant. loco macianorum acrium, de quib. supra, accipiamus succum pomorum immaturorum, aut succum pomorum rub. acrium, mora sunt duplicia sunt enim mora rubi quæ sunt magis stipt. magis conuenientia in principio, & mora celsi magis conuenientia in augmento, & utraque sunt duplicia matura conuenientia in augmento, immatura magis in princ. Et ex maturis quædam sunt acetosa frigid. & humid. & apud quosdam frig. & sic. conuenientia magis in principio, quædam dulcia conuenientia in augmen. & statu. horum ergo succorum aut rob utere secundum quod oportet. Secunda est resolutio cum lenitione quædam aut maturatione: quæ tamen debent esse mixta cum repercussione, & propriè si apostema tendat in uiam resolutionis. Si uero per uiam maturationis, aut sufficiunt sola maturatione, aut sint mixta cum paucis repercussiu. Vnde cum decoctione ficum passularum, & cæ. sit admixtum ali- quid diamoron aut dianicum. Tercio est resolutio pura conueniens a medio status, deinceps cum medicinis ponendis in fine cap. Si uero apostema tendat in uiam maturationis, adiungetur maturatio, & postea eruptio secundum quod dicitur in ordinatione curæ.

Si autem in facie non fuerit rubedo, fluxeritq; ab ore salie multitudine, & æger fuerit humectatus, in principio soluat uenter ex chochys. & fiat enema ex clysteri acuto, quod in cap. de apoplexia nominauimus. cum passio tamen inceperit, fiat gargarismus ex syrup. acetoso, aut cum hydromelle, pip. & oximelle. Deinde ex almuvi nabati fiat etiã gargaris. ex hydrom. & sinapi.

Quæ dicit in hac secunda parte sunt manifesta, & magis ex dicendis manifestabuntur.

Et de his præterea, quæ male squinantie conferunt sunt, ut ex uenis, quæ sunt sub lingua, fiat minutio, & uentose absque scarificatione in collo ponantur, & epithimetur collum ex melle anac. donec uescicæ in eo generentur, & fiat gargaris. cū sinapi. et fiat gutturi insufflatio ex hoc medicamine, q. sic fiat sinapi. sal ammoniacus, piper. hrum, nitrum assa, piper metast. sumatur, et ex eis cum hydromelle fiat gargarismus.

In hac ultima parte innuit intentiones quatuor, scilicet eradicationem materię cum phlebotomia uenarū quæ sunt sub lingua, secundo meri & epiglottis dilatationem cum uetosis appositis in collo, & propriè super secunda spondili ad faciliter anhelandum & deglutendum. tertio diuersionem cum melle ana. cal. & sic. in quarto uescicante, apponendo propriè supra secunda spondili per spacium 8. aut 10. horarum, donec uescicæ factæ sunt, quæ aperiuntur, & apertæ teneantur ultimo intendit resolutionem cum medicinis in textu descriptis quæ sunt illæ, de quibus facta est mentio superius. Cura synanchiæ triplex exigit regimen. Primum debetur causæ antecedenti, secundum causæ coniunctæ, tertium commune utrique. Primum habet tres intentiones, euacuationem, fluxus prohibitionem, & diuersionem. Euacuatio autem si solus peccet sanguis, ut alij humores cū sanguine dominante, aut etiam si omnes humores æque proportionabiliter creuerint est phlebotomia, quæ repletionem existente in toto fiat ex uena communi. Et si retentus fuerit fluxus hæmorrhoidalis co- fuetus aut menstrualis fiat ex saphenis, & si hepar fuerit in causa generans sanguinem acutum fiat ex basilica, quæcunq; harum prius phlebotomata fuerit, phlebotometur postea cephalica eiusdem lateris, & si ad neutrum latus declinauerit synanche, phlebotometur cephalica dextra, aut dextra & sinistra simul. Quantitas autem sang. hauriendi constante uirtute, & multa existente repletionem est usque ad syncopim exclusiue, qui in casibus fortibus non dantibus inducias est continuatim extrahendus, donec uideatur sufficere. Si autem uir- tus non toleret aut ægritudo dederit inducias, est huiusmodi

phlebot. partienda, ut uerbi gratia prima hora extrahatur à 6. usque ad 12. 3. sang. deinde per 8. horas aut 12. horas auriatur à 4. 3. usque ad 8. Et postea si oportuerit à 3. usque ad 6. & melius est ut hæc fiant ex diuersis uenis incipiendo à re- motis & ueniendo ad propinquas, & ultimo ad cephalicam eiusdem lateris, & quacunque harum phlebotomata, aut plu- ribus, phlebotomentur. Si ægritudo non manifeste cessauerit uenæ quæ sunt sub lingua, & permittatur sanguis per se stringi nisi multum exuberauerit. Et si repletio solum fuerit à furcula, supra phlebotomentur solum cephalicæ, & prius cephalica lateris oppositi, deinde cephalica eiusdem lateris. Quod si pauca sit repletio sicut uerisimilis est in illis qui frequenter incurrunt synanchen, sufficit phlebotomia cephalicæ eiusdem lateris à quatuor 3. usque ad 6. postquam per duo decim horas si oportuerit phlebotomentur uenæ sub lingua, & maxime si in eis apparuerit plenitudo. Si autem chole- ram cum sanguine abundare cōtigerit, soluat, & ante phle- botomiam si plurimum abundauerit, & etiam si uenter fue- rit stipticus, soluat. Sed post phlebotomiam secundum plurimum, & soluat cum medicinis infrigidantibus & lenientibus sicut cum decoctione prunorum, tamarin. uiol. mi- rob. & similibus addendo cassiam & mannam. Et apud maio- rem necessitatem infrigidationis addatur aqua sola & rei- teretur secundum necessitatem, & nullo pacto soluat cum medicinis exsoluētibus. Et similiter si alij humores peccaue- rint cum sanguine facta phlebotomia educatur phlegma cū cochiis, & hieris: & melanchol. cum epithymo, sena, & pilu- lis indis, & similibus. Pauci enim sunt calus in quibus sit ex- culatio à phlebot. Secunda autem intentio si materia fuerit calid. subtilis perficiatur comedendo & tenendo in ore dia- codion & fumendo syr. de papauere nocte & die stomacho ieiuno ad compingendum & incrassandum materiam. Et his non sufficiētibus sumat unam pilulam alkeiber opiatam aut requiem descriptionis Nicolai & similia, hæc tamen opiatæ postponantur quantum est possibile. Tertia autem intentio perficitur cum clysteribus leuibus in calid. & propriè existē- te febr. & cum acutis infrigid. & cum frictionibus & ligaturis & lotionibus crurium & brachiorum, & cum positio- ne uentofarum in pulpis spatularum & in collo. Et propriè circa secundam spondilem, elargat enim fauces & guttur & adiuuat ad attractionem aeris & expirationem fumorum & remouet prohibitionem deglutitionis. Quapropter oportet ut sæpius reiterentur, & sit uentosa magna. Et coferet uentosa posita super commissuram coronali & super mēto & sub mē- to, & super maxillis, faciūt enim materiem facilem diuer- sionem. Et Rasis diuertit cum uescicatione facta in collo & pro- prie circa secundam spondilem cum melle anacardio. Secū- dum uero regimen scilicet locale exigit tres intentiones, si apostema resoluatur, & quatuor si maturatur. Prima inten- tio est repercussio conueniens in principio, apud A. & Ra- sim. licet apud Mes. non conueniat nisi in augmento. Nam in principio non facta euacuatione est suspecta apud eum, non enim recipit repercussionem corpus plenum existens. 3. Te- ch. Sed inter hos autores est concordia hoc modo ponenda. Quod apud Mesue repercussio gargarizata non conueniūt corpore existente pleno, cum ille motus gargarizationis agi- tando materiam sit causa maioris attractionis quàm stipticū aut ponticum repercussionis. Attamen illa retenta in ore & in gutture nō gargarizata corpore existente pleno apud Me- sue competeret. Et idem sentiunt cæteri autores, & commu- niter practicautes, licet enim non repercutiant materiam fa- ciendo ipsam retrocedere, attamen confortando locum & uias, siue ductus stringendo, prohibent plurimæ aduentum materię & in hoc satisfactum est auctoritati G. 3. Tech. Est præterea aliud dubium discussione dignum. Sunt enim qui- dam moderni & quidem excellentes uiri qui in principio re- percussio exteriori iubent apponi, & adducunt rationes appa- rentes. Si enim in principio phrenesim approximatur re- percussio fronti & usque ad commissuram coronalem & in principio apost. hepatis, similiter & cordis, renū, uescicæ, sple- nis & singulorum membrorum nobilium, quare etiam non sunt gulæ approximandæ? & experientia confirmatum etiam huiusmodi applicita conferre mirabiliter. In qua dubitatio- ne tenendum cenleo huiusmodi repercussio in principio sy- nanchiæ

nanchia aut in aliis temporibus non esse exterius gulae appropinquanda, cum illud plurimum possit nocere percussione materiam, quae facile potest permutari ad pulmonem & cetera membra nobilia sicut per sepe accidit. Et quia percussiva interius approximatur prohibentia augmentum apost. neque verisimiliter inferentia illud nocuum, quod possunt percussiva exterius applicata inferre, immo forte percussione materiam membra exteriora, cum exterius applicata solum percussione materiam ad interiora, & ad experientiam suam quia uisa sunt mirabiliter iuuare. Credo quod in aliquibus casibus hoc fuerit possibile sicut materia existente pauca & benigna. In quibus etiam casibus sine horum applicatione liberati fuissent, licet forte non ita celeriter, attamen in casibus arduis credo illa magis obesse quam iuuare & ad argumenta de apost. cerebri & aliorum, dico quod in illis applicantur percussiva exterius, quia non possunt applicari interius sicut in synanchia. Et si insisteretur quod A. iubet in synanchia approximari percussiva super commissuram coronalis, sicut suc. acaciae, ergo multo magis poterunt gulae applicari. Negatur consequentia, est enim inter commissuram coron. & guttur colligantia quadam qua sit ut medicinae ibi applicatae inuent in passioib. gutturis. Sicut & mirabilis est quod in fissuris labiorum medicinae appositae sumini & ano conferant. Conferentia ergo in sanguinea sunt illa quatuor percussiva in textu posita. Ex communibus autem est aqua rosae cum quarta parte aceti, & suc. solat. cum sem. rosae est ad id mirabile, & similiter suc. cyton. forbar. zazar. id est, genus piri paruum. Et apud Siculos arbor eius uocatur zarore, & non est forba neque mespila, & albelach, id est, species dactylorum & proprie sylvestrium & immaturorum, & quandoque cum istis ad uigorandum operationem suam admiscuntur balaust. gal. sem. rosae. alumen & similia, & suc. agrestis inspissatus & mixtus cum praedictis medicinis liquidus est iuuamenti sublimis, & similiter succus sumach inspissatus. Quod si materia fuerit cholericum conferunt haec quae diximus facta magis infirmandaria cum eo quod est proprie suc. solat. sandali & camphora, & mucil. psyllii & similia stiptica, pontica, aut acetosa. Et apud Mesum quaedam ex his non tantum gargarizata, sed etiam bibita sunt iuuamenti sublimis. Sicut uerbi gratia rob de papauere bibitum est sublimis iuuamenti uementis de loris synanchiae & profocationis, & proprie cum aqua sumach. Et similiter haec quod mulgetur ex sem. papaueris & proprie cum aqua rosae aut sumach, & ex eis est suc. solati depuratus & bibitus mane & sero secundum mensuram duarum testarum cuius, similiter mucilago psyllii cum coriandro & gran. i. s. camphore. Sed haec proprie complent intentionem secundam regiminis uniuersalis & ualent in sedatione doloris & uigilantur sicut dicitur in regimine tertio. Sed in phlegmate in principio conuenit si phlegma fuerit uiscosum syrup. acetosus aut oxymel simplex gargarizata cum decoctione myrti aut gallarum aut cum diamoron & aceto cum aqua rosae. Et si phleg. fuerit aquosum conuenit decoctio myrti, thuris. gall. aluminis aut alicuius istorum cum diamoro aut dianuci praedicto. Et si fuerit melancholica gargarizetur decoctio liquiritiae & passularum cum diamoron, aut lac cum diamoro aut dianucum. Sed in augmento calid. cum aliquo aut aliquibus ex praedictis superius misceatur dianucum. Et quanto magis procedit augmentum tanto plus minorantur frigida, acida, acetosa, pontica & stiptica. & addantur resoluentia & lenientia sicut decoctio liquiritiae, passul. dactil. aut sicum aut lac cum diamoron & dianucum cum diamoron aut dianucum. Et lac solum est optimum sedans dolorem deinde, & sit caprinum aut asininum, & mucilago, sem. cytoniorum, & sem. maluauisci lenit & sedat dolorem. In ultimo status, gargarizetur cum lenientibus & resoluentibus simul sicut est decoctio praedicta, cui apud maiorem necessitatem resolutionis addatur aliquid modicum cineris hirundinum aut aliquid uini albi, & in summa in principio conueniunt percussiva pura. In augmento usque ad medium status percussiva mixta cum resolutiuis & lenitiuis gradatim augendo resolutiua, & minuendo percussiva. Sed a medio status deinceps resolutiua pura. Sed in phlegmate in augmento conueniunt decoctiones praescriptae cum diamoron, cui in processu addatur mirrha, crocus, baurach, sal ammoniacus, pyrethrum, sina-

pi, suc. raph. ster. hirundinis, cinis ipsarum combustarum cum pennis aut sine pennis. Modus artificialis comburendi hirundines est, ut caput abscindatur, & permittatur sanguis exire & deplumentur & saliantur, & ponantur in uase uitreato, luto luto sapientiae in furno donec desiccantur ut possint pulverizari, & conuenit eius puluis ad resolutionem, si uero ratum comburatur ut incinerentur non solum confert eius cinis ad resolutionem, imò ad eruptionem, & possunt etiam comburi cum pennis & sunt efficaces. Sed in augmento melancholicum conuenit decoctio praedicta lenientia cum diamoron & uino cocto, & in processu addatur aliquid ex resolutiuis praescriptis. Exterius applicanda in principio suae terminetur per uiam resolutionis suae maturationis est oleum commune aut chamemil. quod Auic. iubet cum lana succida applicari. Quod si timeres calid. lanæ suc. applicetur cum pettia lini ueteri, neque aliquo pacto approximanda sunt percussiva. Postea in augmento approximetur hoc emplastrum. Jd. farinae hordei, farinae sem. lini ana 5. i. carniū dactylorum, sicum sic. pinguium ana 3. i. s. m. i. c. panis 3. i. coquantur omnia in rob. pistentur, & fiat emplastrum & potest impinguari cum oleo amygdalino & pinguedine porci. Emplastrum mirabile ad resolutionem istius apost. Accipe nidum hyrundinis, fac illud diu in aqua bullire, postea cola cum cribro, deinde in colatura coquantur radices lini & maluauisci, & folia maluarum, uiolarum & parietariae, postea pistentur fortiter & incorporetur cum eis aliquid fermenti acris & aliquid farinae sem. lini & in fine addatur olei ueteris, axungiae porcinæ ana quantum sufficit ad impingandum, & fiat emplastrum & dum hoc applicatur fiat gargarisma cum aqua, uino cocto & melle, ita ut aqua sit dupla ad uinum, & uinum duplum ad mel, & in his coquantur sicum sic. passul. sem. maluauisci, sem. cytoniorum. Secundum eam proportionem quae tibi uidetur, haec tamen magis maturant quam resoluunt. Quod si resoluatur, bene est. Si uero maturetur erumpendum est. Modi autem eruptionis sunt isti. Primo praescriptae decoctioni maturanti addatur aliquid acutum sicut baurach, aut stercore hirundinis, aut cinis hirundinis, praeparatus secundum artem, aut aliquid stercoreis adib. aut stercore album canis, qui diu persistens est ossibus. Si autem cum his non rumpitur, rumpendum est cum ferro si uideri possit, capiatur lignum uel aliud simile in cuius extremitate figatur ferrum non maioris longitudinis quam sit digitus paruus secundum latum, & sit latitudine tanta sicut est medietas digiti, & ore aperto cum instrumento simili freno uel ligno inter molares posito perforetur locus apostematus in loco qui tibi uidetur magis idoneus hoc enim instrumentum est tutum ita ut non possit laedere, & certe si uideri potest & confert de maturatione est illud a quo inchoandum est. Si autem non uideatur, sed cum digitis tangi potest, cum ungibus rumpatur. Sed haec operatio non est omnibus committenda, sed doctis & expertis. Cum autem sanies manare coeperit teneat os apertum & caput inclinatum ita ut sanies egredi possit, imò aliquando ipse aeger, aut medicus cum digito, aut instrumento obtuso comprimat locum apostematū, ut sanies egrediat: aliqui tamen uolentes rumpere faciunt deglutiri spongiam cum filo suspensam & ipsam uiolenter extrahunt postquam creuit, sed hoc est difficile cum secundum plurimum uix aquam possint deglutire, postea uacandum est mundificationi ulceris cum uino decoctionis mellis, aut aliis huiusmodi, & tandem consolidetur cum uino decoctionis rerum stipticarum. Quod si locus synanchicus putrefiat propter multitudinem aut propter malignitatem materiae, quod comprehenditur, quia locus uiride scit aut denigratur & foetere incipit, tunc iteratis uniuersalibus & iterata phlebo. uenarum sub lingua, si uideatur expe-diens scarificetur locus, qui putrescere incipit donec materia corrumpens egrediat, deinde gargarizetur cum aceto salito aut oxymelle multi aceti, & in summa regatur regimine alchola herpetici de quo supra. Si uero apost. in durent, curetur cum mollificantibus. exterius applicitus sicut diaquilone de mucilaginib. & fomentis mollificantibus. interius cum gargarismatib. ex decoctione sicum, sem. lini, cyton. maluauisci, & radices eius, & teneant in gula ficus masticata & oleū amygd. dulce, & scammonia, & similia, & in summa regatur cura apost. duorum. Si uero permutetur, quod comprehenditur

tur quia minuitur tumor & dolor loci synanchici & membrum ad quod permutatur incipit pati, tunc si permutatur ad partem ignobilem sicut ad cutim, adiuvetur ponendo super loco ad quem permutatur emplastrum attrahentia, in quibus ponatur fermentum & emplastrum de sinapi solo, aut cum mollificantibus permixtum. Si uero permutetur ad membrum nobile iteretur phlebot. uenarum quæ sunt sub lingua, gargarizet res mollificantes potius attrahentes quam repercutientes, & confortetur membrum ad quod fit permutatio, ne recipiat sicut cerebrum, cum oxyrod. fronti, & temporib. applico & fiat phlebo. cephalicæ, & in summa curatur cura phrenes. Si uero permutetur ad spiritalia, fiat phlebot. de basilica aut ambabus si uideatur expediens, euacuando notabilem quantitatem, & leniatur uenter secundum materiam exigentiam si permutetur ad cor, quod comprehenditur ex pulsu & tremore cordis & ex aliis accidentibus sibi propriis, emplastrum pectus cum frig. & sic. cordis confortatiuis. Et si permutetur ad pulmonem curatur cura peripneumoniæ. Tertium autem regimen habet duas intentiones, una est correctio accidentium, secunda debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima corrigatur dolor, gargarizatio, aut tenendo in ore lac caprinum uel asinum, gargarizando tamen addit in dolore propter motum partium dolentium. Si uero oregmonizer & timeatur suffocatio, gargarizet cum decoctione aliqua ex supradictis, cui si humor sit crassus & viscosus, possit addi parum oxymellis simplicis, & syrupus de liquiritia, si uero subtilis, iunibinus aut uioleaceus, & procurretur cum falcatione & tussi euacuatio superfluitatū. Quod si deglutire non potest, teneat tempore comestionis uentofam super spondili secunda. Pro secunda intentione loceatur in aere temperato non fumo neque uentoso mediocriter illuminato, & teneat corpus satis bene pannis cooperitum secundum exigentiam temporis. Sed caput mediocriter calid. inspicere sua consuetudine ut neque æstuet neque frigeat. Somnus eius sit interruptus, & sint ibi astantes fideles & discreti, qui expergefiant ipsum cum sentiant eum oregmonizari, & faciant ipsum spueri, deinde ad somnum redire, & dormiat sedens capite ad alterum laus declinante & distanter a cibo per horam. Sollicite procuret omnes euacuationes à natura influitas præcipue asceller bis aut semel in die natura aut arte, & demouet nares, non tamen fricetur caput saltem in principio, nullo pacto moueatur neque loquatur neque sit ibi strepitus personarum, sit sperans & gaudens, & uiget animi accidentia superflua, prima die non bibat nisi aquam saccharat. aut hordeaceam, aut mellitam, si materia fuerit frig. secunda die comedat prisanam hordeaceam in die, uel panem lotum in aqua, & non bibat uinum, neque comedat carnes aut oua. Et sic continet quousque incipiat declinatio, qua incipiente comedat prisanam hordeaceam aut panem lotum in brodio pulli & poma cocta, tandem ipsa magis declinante concedantur oua forbilia, & tandem uinum limphatum, & carnes, & brodium cicerum est conueniens proprie in materia frig. Et de hac cura hæc sufficiunt.

De anatomia pectoris. Cap. 65.

Quia hic agitur de passionibus pectoris & membrorum spirituum iuxta consuetudinem, præmittenda est anatomia eorum, & primo anatomia pectoris. Est enim pectus descriptiue uenter medius contentius membrorum spirituum superius ad furculam, inferius ad diaphragma terminatum. 88. habens musculos ad eius motum ordinatos. 24. costas à 12 spondilibus ortu habentes interius circumdatas panniculo dicto pleura ad motum pulmonis & tutelam cordis principaliter ordinatus, & motus musculorum eius est animatus, id est, uoluntarius, adueniunt ipsi, nerui à duodecim spondilibus pectoris qui nerui in somno non oppilantur nec quiescunt. Diaphragma uero est panniculus in medio neruo sus cū quo pulmo coniungitur, in circumferentiis carnosus ad anhelitum & diuidendū naturalia à spiritalibus & ad expellendū, quæ in membris naturalibus sunt digna expulsionem finaliter ordinatum, & eius motus partim est naturalis partim animatus: adueniunt ipsi, nerui sensitiui & motiui à quarto & quinto pari neruorum nuchæ. Pleura uero est panniculus durus undiq; tegens costas ad continendum immediate membra spiritalia, & ut panniculi cætera spiritalia suspendentes

& inuoluentes ab eo orirentur finaliter ordinatum. medius uero est panniculus unus, imo potius duplex diuidens pectus secundum longum, ortum habens à pleura ad suspendendū pulmonem & prohibendum transitū meri de una medietate pectoris ad alteram finaliter ordinatus. Pulmo uero est membrum instrumentale in pectore contentū ex trachea arteria, uena arteriali & arteria uenali, carne molli, spongiofa & pāculo inuolūte compositis ad anhelitum & cordis euentationem principaliter ordinatus ad anhelitū mere naturaliter concurrens, licet ad ipsum causandū sit agens principale. Trachea autem quæ est prima pars eius est longa, rotunda, in gutture constituta contigua meri & ori secundum partem eius superiorem, quæ uocatur epiglottis, ex annulis cartilagineis & panniculis inuolūteibus & ligamentis adinuicem annulos coniuuantibus qui secundum partem posteriorem meri cum quadam pellicula continuantur ad defendendum aerem ad pulmonem & exterius referendum ad uocem secundum eius extremum superius ordinata. Epiglottis uero est canna principium ori contigua, & cum suprema parte meri multum colligatum ex tribus cartilaginibus & 20. musculis, & panniculis inuolūteibus compositū ad uocem principaliter ordinatum. Est enim hic epiglottis infusprema & anteriori parte gutturis constituta ut ipsa cum sit uocis instrumentum sit proxima ori in quo perficitur locutio cum uox in locutionem ordinetur, & fuit facta tota cartilaginosa, ut esset sonora. Est autem multum annexa cū meri, ut cum meri eleuatur ad cibum attrahendum ipsa secū eleuetur ne remanens inferius deglutitionem impediat. Vna eius cartilago est anterior & uocatur scutalis siue clipealis ad modum clipei. Posterior uero uersus meri uocatur nomen non habens. Tertia autem est in medio earum in qua est lingua fistula ad modulandum ordinata, dicitur autem hæc epiglottis fistula, quia est ordinata in cantum sicut fistula ordinatur in sonum. est autem ex uiginti musculis composita quæ ordinantur in motum eius uoluntarium secundum exigentiam uocis formandæ, & duodecim sunt interius, & octo exterius, & ad istos musculos adueniunt duo nerui dicti, reuersiui. in unoquoque latere canna est unus, & oriuntur à sexto pari neruorum cerebri, cuius una pars descendit ad cor, iuxta arteriam aorti & exinde incipiunt ascendere superius usque ad epiglottim. Et hi nerui reuersiui diuiduntur in hos. 20. musculos dantes eis sensum & motum, & isti sunt proprie nerui uocis. Alii uero descendentes de quibus dictum est sunt nerui uocis & aliarum operationum. Hi autem nerui fuerunt reuersiui, & non directe uenerunt à cerebro ad epiglottim quatuor ex causis positis à G. in libro de moribus liquidis. Vna causa, ut essent fortiores, cum sunt principii magni motus. Nunc autem quanto sunt sicciore, sunt duriores & fortiores, siccitatem autem acquirunt quanto magis à cerebro distant. Secunda causa ut cerebro modice moto moueretur epiglottis secundum imperium eius. fit hoc autem melius per hoc quod nerui illi sunt situati ad modum freni quibus utitur cerebrum sicut miles utitur freno & habenis.

Tertia causa quia licet uox dependeat à cerebro tanquam à principio uoluntarii motus, dependet tamen à corde tanquam ab eo in quo firmatur conceptus, uel in quo est principium conceptus cerebri, & ideo cum sit communis operatio cerebri & cordis, nerui qui sunt instrumenta uocis debet communicari cordi & cerebro. Sed hæc duæ causæ sunt rheorice. Quarta causa melior est cæteris, quia nerui debent peruenire ad musculos iuxta principii ipsorum, & non iuxta finem. Principium autem musculorum epiglottis est uersus partem inferiorem, quare &c. Panniculi autem inuolūteibus epiglottim & canam pulmonis ortu habent à pleura & ad istos & panniculum inuolūteibus pulmonem adueniunt nerui totum dantes sensum à sexto pari neruorum cerebri. Hæc trachea arteria cum est infra furculam diuiditur in duas partes, una eius pars transit ad dextrum pulmonem, altera ad sinistram, & utraque subdividitur. Nam utriusque una pars transit ad superiorem partem pulmonis, altera ad partem inferiorem, & sic ulterius procedunt se diuidendo: scilicet rami maiores in minores, & minores in maiores, donec ambiant totam substantiam pulmonis, & annuli qui sunt in pulmone sunt completi stantes semper aperti ex eo quod cartilaginei.

Io. Arculani.

Q

Fuerunt

Fuerunt autem facti in canna tot annuli ut ipsa esset flexibilis, & melius posset dilatari & situari secundum exigentiam aeris inspirandi & expirandi. Et propterea non fuit facta ossea, nec fuit facta carnea aut pellicularis ne latera cōciderent. Componitur secundo pulmo ex uena arteriali ortum habente à dextro uentriculo cordis deferentis sanguinem subtilem, acutum, nutriturum pulmonem, & propterea habuit duas tunicas, & dicta est arterialis propter hoc, & dicta uena quia non pulsatur, & cum uenit ad pulmonem diuiditur in duas medietates dextram & sinistram, & quelibet illarum in duas medietates superiorem & inferiorem, & sic deinceps donec ambiat totum pulmonem, ut de trachea dictum est. Est deinde arteria uenalis ortum habens à sinistro uentriculo cordis, & dicitur arteria quia pulsatur, uenalis dicitur, quia habet solum unam tunicam. Et est facta ut accipiat aerē inspiratum ad tracheam arteriam & deferat ipsum ad cor, & eius euentationem & econtrario ut referat fumos & aerem multum ad tracheam arteriam & expiretur, & hæc cum uenit ad pulmonem similiter diuiditur, ut de aliis dictum est. Et rami istorum trium componuntur ad modum retis replet caro mollis spongiosa quæ est propria substantia pulmonis. Et omnia hæc inuoluuntur panniculo subtili ortum habente à pleura cui datus est sensus per nervos, de quibus superius dictum est, & mediante isto, pulmo sentit, & non per substantiam suam. Et nota quod rami tracheæ arteriæ sunt iuxta ramos uenæ arterialis, ut nutriantur ab ea, & iuxta ramos arteriæ uenalis, ut aerem transmittant ad arteriam uenalem, ut eum portet ad cor, & à corde ducatur ad tracheam arteriam aer, qui factus est inutilis. Istæ tamen uix siue rami qui sunt iuxta has, sunt ita stricti ut sint inuii sanguini & peruli aeri intranti & exeunti, & ideo si dilatantur, superflue potest fieri exitus sanguinis à pulmone sine ruptura uenæ, sicut aliquando contingit propter multitudinem sanguinis aut ipsius ebullitionem. Et ex his ulterius patet uia per quam à pectore ad pulmonem, & tracheam arteriam expellitur excreatus, scilicet, sanies uel sanguis emanans à pectore, ut in pleuresi, empyemate & hæmophthoica passione, quia materia in his locis cōgregata subleuitur, & fortitudine pectoris impellitur ad pulmonem per orificia ramorum tracheæ arteriæ, & non per orificia uenæ arterialis aut arteriæ uenalis, quia sic de necessitate prius hæc materia transit ad cor. Sed utrum hoc melius fiat quando pectus dilatatur, aut quando constringitur, tenetur communiter quod hoc fiat quādo dilatatur, quia orificia tracheæ arteriæ magis dilatantur.

Sed mihi potius uidetur oppositum, nam quando pectus constringitur magis adhæret pulmone, ergo facilius potest materiam in pulmonem impellere ad quod adiuuat, quia aer tunc expiratur, & sic ne detur vacuum debet materia in pulmonem ingredi per foramina à quibus aer expellitur, nec ualeat ratio adducta in contrarium, quia semper tracheæ rami arteriæ cum sint cartilaginosi stant aperti, rami autem alii bene clauduntur, & sic non ingreditur per alios. Et nota quod in pulmone plus de aere cōtinetur quā indigeat cor in pulsu uno, cuius iuuamentum est ut cum animal submergitur in aqua, aut emittit uocem longam continuam impediens ipsum ab attractione noui aeris, ut cum abhorret attractionē eius ex fectore aut per aliam causam, sit aer in pulmone præparatus quo interim cor euentetur.

De tussi.

Cap. 66.

Quid nominis tussis manifestū est. Est autem secundum Auicennam decima tertiū tractatu tertio, capite primo, ex motibus, quibus expellit natura nocumentum à pulmone & membris, quæ ei continuantur & cōmunicant. Et subdit quod tussis est pectori sicut sternutatio cerebro. Et completur cū dilatatione pectoris, & constrictione, & motu uelaminis, id est, diaphragmatis, per hoc quod dixit ex motibus, tergit genus caute loquens. Sed per hæc uerba caute intelligere debemus, quod tussis est aggregatū ex duobus motibus, scilicet, ex dilatatione & constrictione, & pulmonis, & pectoris impetuosa, licet principalior motus qui magis meretur dici tussis, sit illa constrictione pectoris impetuosa, per hanc enim fit sonitus in tussi, auditus, & rei nociuæ expulsio, quibus expellit natura nocumentum, id est, re nociuam, uel tentat expellere à pulmone, quia tussis est pro-

pria eius passio & membrorum, quæ & ei continuatur, sicut canna pulmonis & communicant sicut pectus, diaphragma, & ex his est manifestum, quod tussis est pectori sicut sternutatio cerebro, quia in utraque primo fit dilatatio & aeris attractio, postea constrictione impetuosa ad expellendum nociuam, & Auic. in parte superscripta præter uirtutem motiuam naturalem pulmonis tangit alios duos motores ad tussim cōcurrentes, scilicet, motiuam uirtutem musculorum pectoris quæ est mere uoluntaria, & uirtutem motiuam diaphragmatis, quæ est mixta, scilicet naturalis, & partim uoluntaria cū sibi à quarto, & quinto pari neruorum nuchæ, ut supra declaratum est in anatomia adueniat uirtus uoluntarie motiuæ. Modus autem est, quia uirtus sensitua panniculi pulmonis sentiens nocumētum mouet uirtutem naturalem pulmonis ad expellendum, quæ cum ex se impotens sit adiuuatur ordine naturali à deo instituto, à diaphragmate habente duplicē uirtutem de qua statim dictum est, & à musculis pectoris habentibus solum uirtutem uoluntarie motiuam. Ex quo concludi posset diffinitio integra tussis, quia est aggregatum ex duobus motibus, scilicet dilatatione & constrictione impetuosa pulmonis & pectoris, uel sola constrictione impetuosa ad expellendum sibi nociua facta à uirtute expulsiua naturali pulmonis coadunata à uirtute mixta diaphragmatis, & uirtute uoluntarie motiuæ musculorum pectoris cum adiutorio aeris impetuose expirari. Et quia tussis est ad expellendum nociua non est dispositio hominis perfecte sani. Notandum primo quod partium pectoralium quinque assignantur motus siue actiones. Prima est anhelitus æqualis. Qui completur principaliter per uirtutem attractiuam, & expulsiuam naturalem ipsius pulmonis naturaliter attrahentis & expellentis aerem. Secundo per uirtutē duplicem ipsius diaphragmatis naturalem & animatam, de qua supra coadiuuantem pulmonem ad superscriptam operationem. Tertio per uirtutem animatam quorundam musculorum pectoris. Et quæuis hæc duæ uirtutes diaphragmatis & musculorum prius cōcurrant ad anhelitum, & incipiant mouere pectus, ad cuius motum sequatur motus pulmonis, sicut de spongia inter manus retenta quæ dilatatur cum manus dilatatur, & constringitur cum constringitur, ut explicat Gal. quinto de interioribus, cap. secundo, tamen cum toto hoc fiat, quod principalis pulmo concurrat ad anhelitum, quā diaphragma aut musculi pectoris, cum hæc membra pulmone in anhelando deseruiant. Secunda actio est status aeris maior & impetuosior solito anhelitu & equali, & hæc actio supponit primam, scilicet, anhelitum æqualem & tres motores iam dictos ad anhelitum æqualem concurrentes. Et præter hos exigit lacertos qui sunt inter costas, & etiam cooperientes costas interius, ut uult Gal. 4. de interioribus cap. de nocumento uocis, & tertio de inuamentis, cap. 1. cum ad anhelitum æqualem sufficerent musculi pectoris extrinseci, & hæc operatio secunda potest fieri dormiendo & uigilando secundum necessitatem instantem expellendi fumos, & attrahendi aerem frigidum pro cordis & spiritualium euentatione. Tertia actio est status cum ictu aliqui aeris expirati & repercussui in tribus cartilaginibus, epiglottis, & hæc tertia actio supponit duas primas, & omnes motores scriptos, & cum hoc motum lacertorum existentium in gutture. Quarta actio est uox, quæ comprehendit tres præcedentes, & supponit eas, & cum hoc exigit expirationem aeris cum maiori ictu, & supponit omnes motores præcedentes, & cum hoc exigit motum lacertorum epiglottis pro uoce formāda. Quinta actio, partium pectoralium est loquela comprehendens & supponens quatuor dictas, & omnes motores suprascriptos & cum hoc exigit motum linguæ, ut uariet & diuidat uocem & compleat loquelam una cum partibus quibusdam adiuuantibus, & sunt dentes, labia, nares, palatum, aut. 4. inter cap. de nocumento uocis, qui motus linguæ fit per nervos uenientes à 7. pari neruorum capitatis orto à puppi secundum quod patuit superius de intentione Auic. & 4. de interioribus, cap. 3. circa principium. & sic patet quod istæ actiones partim sunt naturales, partim sunt animatæ, siue uoluntariæ. In primis tribus actionibus, uirtus naturalis pulmonis & diaphragmatis superat motiuam uoluntariam. In quarta actione motiuam uoluntariam interdu-

rat naturalem pulmonis, & partium vicinarum sicut videmus in tussi voluntaria, interdum naturalis superat motuam uoluntariam, ut patet in tussi inuolutaria. In quinta actione motuam uoluntaria superat naturalem pulmonis & partium vicinarum, quod patet, quia secundum imperium uoluntatis loquimur, & desistimus a loquela. Et ex his patet, quod quatuor primae actiones concurrunt in tussi. Nam in flatu cum ictu aliquali & motu lacertorum gula non est uox, sed in tussi est uox, & exigit fortem motum lacertorum gutturis, & lacertorum pectoris, & cum hoc etiam fortem motum lacertorum epiglottis.

Hic est dubium satis difficile. Nunquid tussis sit propria passio pulmonis, ita ut non possit fieri per alterius membri nocuentum non nocito pulmone. In qua quaestione tenendum est tussim esse propriam passionem pulmonis, ad hunc intellectionem, quod per nullius alterius membri nocuentum potest fieri tussis nisi pulmo laedatur, uel aliquo modo ad expellendum nociua irritetur, siue per essentiam siue per communiteriam, unde Anic. 10. tertii. tractat. 4. cap. de signis pleuritis in princ. capituli inquit: Et tussis quidem non accidit nisi si propterea, quod pulmo laeditur ex uicinitate, & hanc eandem sententiam reperies ab eodem decima tertii, in multis locis quae gratia breuitatis omitto. Idem Auerrois tertio colligit. cap. de agitudine pulmonis. dicit enim quod propria agitudine pulmonis est tussis, & Galenus sentit idem secundo de crisi, & tertio de interioribus. ult. cap. Et breuiter omnes auctores quantum ad hoc in eandem coincidunt sententiam, & semper intelligendum est de tussi inuolutaria, quia de tussi uoluntaria dicendum est oppositum, & unusquisque potest in seipso experiri. Sed contra, tussis compleitur cum motu pectoris & diaphrag. & principaliter res expellenda per eorum motum expellitur, quod per motum pulmonis ergo si ex laesione pulmonis solum accidit tussis multo magis ex ipsorum laesione. Et confirmatur, si propter laesione pulmonis pectus mouetur, & facit tussim ut nocuentum expellat a pulmone, ergo multo magis mouebitur propter nocuentum proprium, ut ipsum a se expellat. Cum unumquodque membrum fit magis sollicitum de commodo proprio, quod de alieno, & eo magis stat robur huius argumenti, quia pulmo de intentione Galeni, ut supra, nullum habet motum nisi quem recipit a pectore. Amplius Rasis in hoc capi. inter causas tussis ponit res infrigidantes pectus & lacertos eius. Item in apostemate hepatis fit tussis sicca, & non nisi per moridicationem inducitur in diaphragmate, tertio prognosticorum, commento. 3. Præterea sputum sanguinis a pectore fit cum maiori tussi & longiori quam sputum sanguinis a pulmone de intentione omnium auctorum, aut ergo fit tussis antequam sanguis tangat, uel laedat pulmonem, & habetur intentum, aut solum dum ingreditur pulmonem, & tunc non uidetur ratio, quare tussis debeat esse maior & longior, quam si sputum sanguinis esset a pulmone. Et confirmatur, quia auctores assignantes causam huius dicunt, quod sanguis exiens de pectore uenit a longiori seu distantiori loco, quam exiens a pulmone. In summa tenenda est sententia scripta, quod ad tussim necessarium est pulmonem aliquantulum irritari, aut de per se, aut de per accidens, aut per essentiam, aut per communiteriam, ita quod si solus laedatur aliis non laesis, neque per essentiam, neque per communiteriam fit tussis propter naturalem subordinationem ipsorum ad pulmonem: si uero ipsa laedatur nullo modo laeso pulmone non fit tussis. Huius sententiae habemus duo signa. Primum, quia si esset maximum ulcus aut apostema in pectore quod nullo modo penetraret non esset tussis: attamen ex omni modico nocumento pulmonis aut canna sequitur tussis. Secundum signum est, quia non fit tussis nisi meritis illius membri cui communicatur aer propter expulsionem nocuenti eius. Sed aer nulli membro communicatur nisi pulmoni ad hanc intentionem, ad expellendum nociua, quare, &c. Sed ad argumenta in oppositum respondetur. Ad primum conceditur quod compleitur tussis propter motum pectoris & diaphragmatis, & res expellenda expellitur per illa, tamen dico quod haec sunt principaliter per pulmonem quam per haec membra coadiuuantia. Et ad confirmationem difficilem dicitur negando, quod si pectus mouetur ad tussim propter nocuentum pulmonis, multo magis mouetur propter

nocuentum proprium, quia licet pectus sit magis sollicitum de nocumento proprio quam de alieno: tamen nunquam mouetur ad faciendum tussim nisi prius pulmo sentiret nocuentum & sentiens hoc exigeret motum pectoris in adiutorium, quia in hoc subordinatur pulmoni, & non pulmo pectori. Et quantum pulmo nullum habeat motum nisi quem recipit a pectore. Attamen pectus neque diaphragma unquam mouebitur ad aliquem motum nisi pulmone prius illum motum exigente. Ad Rasis dicitur, quod causa infrigidans pectus facit tussim quia infrigidat pulmonem. Et similiter de apostemate hepatis, quod nunquam faceret tussim nisi nocuentum communicatum immediate diaphragmati aliquo modo comunicaretur pulmoni, & de sputo sanguinis a pectore dicitur, quod tussis est maior & longior, cum ille sanguis est crassior, & si esset aequae subtilis multa fit tussis, est enim maior, longior cum ille sanguis est crassior, & etiam si esset aequae subtilis, multa fit tussis antequam pectus ingreditur. Illud enim est difficile quod postquam ingressus est exercetur.

Tussis est quaedam sicca & est sine sputo, quaedam humida existens cum sputo. Et utraque est duplex, quaedam multum frequens quaedam rara. Item quaedam laboriosa & fortis & quaedam facilis. Causa tussis est duplex primitiua & corporea. Primitiua sicut aer frigidus aut uetosus, maxime uentus septentrionalis exprimendo, australis replendo, & multiplicatur tussis in hyeme & uere hyemali, & cum ætas est septentrionalis parum pluuiosa, & est autumnus meridionalis pluuiosus, multiplicatur tussis in hyeme. Similiter uapores acuti inspirati sicut piperis, & similia sunt causa tussis mordicando pulmonem, & similiter sapor cibi acuti acris aut acetosi ualde, & res bibita, aut comesta quae canna pulmonis ingreditur. Causae uero corporeae sunt duplices per communiteriam & per essentiam. Per communiteriam aut a toto sicut in febre, aut a parte sicut a cerebro ex defluxu materierum ad pulmonem, quae materiae cum distillant super canam pulmonis non faciunt tussim secundum plurimum, sed tunc maxime faciunt tussim cum figuntur in aliqua parte mordicando, aut aeris transicum oppilando. Similiter per communiteriam ad pectus sicut in pleuresi & empyemate, aut per communiteriam ad diaphragma cum apostematur aut ulceratur, & quandoque per communiteriam a stomacho, hepate, splene, cum apostemantur aut oppilantur, ipsa enim taliter intumescunt faciunt tussim comprimendo diaphragma, & pulmonem, & quandoque materiam transmittendo, a reliquis etiam membris corporis potest accidere tussis communicatio materiam, uapores aut malam complexionem pulmoni. Causae autem per essentiam aut sunt mala complexio sine materia frigida, aut sic, aut cum materia cuiuscunque generis sanguinea, phlegmatica & melancholica, sed rarius, quae materiae aliquando imbibuntur, aliquando inuiscantur, aliquando oppilant, & apostemant, aliquando resolutis partibus subtilibus in partem densantur. A solutione quoque continui sicut ab ulcere pulmonis fit tussis sicut in phthisi, & similiter a uulnere facta ab aliqua causa primitiua. Causae autem tussis sic sunt quaecunque causae faciunt tussim absque praesentia materiae in pulmone sicut causae primitiuae corporeae communicantes malam complexionem aut uapores, aut facientes malam compositionem comprimendo. Materia quoque existente in pulmone accidit tussis sic, quando est nimium subtilis, aut nimium crassa, inepta excretioni, quae postea cum reducitur ad medium per digestionem facit tussim humidam, propterea multoties in principio apostematum pulmonis, aut quando sunt aliae materiae in pulmone non apostemantes est tussis sicca, quae postea digesta materia efficitur humida. Apostemata autem pulmonis dura sunt fere semper cum tussi sicca. Materia quoque contenta in uenis pulmonis sua acuitate aut multitudinem stimulo facit tussim sic, & quandoque causa tussis sicca est debilitas uirtutis expellentis.

Signa causarum primitiuarum tussis sunt ipsarum praecessio. Signa uero tussis per communiteriam a toto sicut in febre, sunt quod post febrem, secuta est tussis cum quarum augmento augetur, & diminutione diminuitur & ipsis recedentibus recedit, &c. Cognoscitur esse per communiteriam a capite per signa catarrhi, de quibus supra in principio ca. Et cognoscitur esse per communiteriam a pectore & diaphrag-

10. Arculani.

O 2 mate

mate sicut accidit in apostematibus. & ulceribus eorum per signa pleurefis, empyematis, & ulcerum ipsorum, de quibus infra, & maxime per excretionem sputi sanguinolenti, saniei, & huiusmodi. Cognoscitur autem esse per communiter a stomacho, splene & hepate sicut accidit in apostematibus & opilationibus ipsorum de quibus infra, & maxime quia tussis huiusmodi est sicca proveniens per solam compressionem diaaphragmatis & pulmonis. Similiter cognoscitur esse per communiter a ceteris membris propter vapores, & malam complexionem pulmoni communicatam, quia præcesserunt ægri tudines ipsorum, & cum augmento ipsarum augetur tussis & diminutione diminuitur, & quia tussis est sic. Cognoscitur esse per essentiam in pulmone, quia est magis continua & magis laboriosa, quam illa, quæ est per communiter, sed quæ est a mala complexione calida, frigida, aut sic. sine materia est tussis sic. & quia præcesserunt causæ calefacientes, infrigidantes, aut exiccantes, & læditur ex similibus, iuuatur a contrariis, & caliditas, frigida, & sic. ab ægro sentitur. Sed materia sanguinea cognoscitur per rubedinem faciei, & tensionem uenarum, & saporem sanguinis in ore sensatum. Et quia forte sanguis excreatur, sicut cholericus cognoscitur per colorem faciei citrinum, saporem amarum, sitim & per citrinitatem eius quod excreatur. Et phlegma cognoscitur per paliditatem faciei cum albedine, sapore insipido, aut salso cum humiditate superflua oris, & pauca siti, melancholica uero per colorem faciei fuscum & saporem ponticum in ore, & tardum euentum eius, & longam durationem. Si uero materia sit apostemans cognoscitur ex signis peripneumonix de quibus infra. Subtilitas uero materix cognoscitur ex subtilitate, & fluxibilitate eius quod expellitur, & quia subito accidit, sicut econtra uiscosa ex signis contrariis. Quod autem sit ab ulcere, sicut in phthisi cognoscitur ex signis phthisis, de quibus infra. Vlnus autem pulmonis cognoscitur ex sanguine excreato, & ex causa primitiua quæ uulnus intulit. Sed apostema durum comprehenditur, quia tussis est sic. diuturna cum signis ceteris peripneumonix. Quod autem materia ad intra uenas contineatur cognoscitur, quia si multa est, adeo tensio uenarum, & repletio. Si uero acuta sunt signa cholere, de quibus supra, & hæc tussis est sic. Tussis autem pendens a lapide in pulmone genito cognoscitur per eius excreatum, & causis calefacientibus, & exiccantibus proportionatis generationi ipsius.

Prognostica. Primum tussis intensa frequens & diuturna deducit ad sputum sanguinis propter rupturam uenarum. Secundum, tussis prægnantis frequenter prouocat abortum. Tertium, tussis excrecens in febribus, aut post febres augmentum, & reciduum significat.

Quam tussis acciderit fueritque aspera & sicca, & cum rubedine & calore ægro muraba uiol. & pistana tribuenda erit, fabas quoque excorticatas, & spina chias, cum oleo de amygd. dulc. in comestione accipiat. In ore uero semper tenere debet pilulas bichibias. Aqua autem quam bibit syrup. uiol. est admiscenda. Pilule bichibie. Rec. suc. liquiritie sacch. al. amborum ana. drach. 10. amili, dragagan. amygd. dul. excorticatarum omnium ana. drach. 5. ex his cum mucilagine sem. citonij conspersis informantur pilule.

Diuiditur hoc capitulum in partes tres. In prima ponitur curam tussis a causa calida. In secunda ibi. Quod si cum tussis, ponitur curam tussis a causa frigida. In tertia ibi. Quod si tussis antiqua, ponitur curam tussis inueterata, & proprie catarrhalis. De prima parte dicit. Quod cum tussis fuerit a causa calida, quod comprehenditur, quia est cum asperitate, & est sicca, & sine sputo, aut quia est a mala complexione calida. aut sicca. sine materia, aut cum materia subtili, quæ non facile excreatur nisi postquam digesta est, & cum rubedine, scilicet faciei, & lingue, & colore, quod comprehenditur ex febre, ali quando ex amaritudine siti, & similibus arguentibus caliditatem, tunc detur ægro muraba uiolaceum, id est, conditum de uiol. pistana, hordeacea, & comedat fabas sine corticibus, sed melius est kist fabarum. Nam infrigidat, & incrassat, & spinachia conueniunt, quia frigida & humid. & proprie cum

oleo amygd. dulc. humido, & leniente pectus & pulmonem, & in ore teneat pilulas bichibias, quæ interpretantur pilulæ ad tussim, nam βιχί græce, tussis latine, ideo bichium medicam ad tussim: hæc aut descriptio in textu satis manifesta est.

Quod si cum tussis multum affuerit sputum, quod cum expuendo expelli non potest nocimentum infert, sed neque feb. neque uehemens uentris solutio ipsam comitantur. Ex his troch. dandum erit infirmo. Rec. sem. fenic. sem. opij, suc. liquir. capil. ueneris, amygd. omnium partes æquales ex his cum mucilagine sem. lini conspersis informantur trochif. ex quibus drach. 3. tribuantur. Decoctionem autem quæ in hac ægitudine utendum est in cap. de catarrho iam descriptimus, cui tamen drach. 5. capilli uen. sunt addenda.

In hac secunda parte curat tussim pendentem a phlegmate dicens: Quod si cum tussis affuerit sputum multum, id est, magna quantitas materix expuenda, quæ tamen non facile potest expui pp. crassitatem & uiscositatem suam non existente febre, nec uentris solutione, dentur ex his trochif. egro. 3. scilicet in mane stomacho ieiuno debita seruata custodia cum decoctione superius dicta in capitulo de catarrho. Cui decoctioni factæ, ex passulis, sicub. liquiritia, & huiusmodi addantur in decoctione. 3. 5. capil. uen. qui sunt multum pectoralis temperati in actiuis declinantes ad siccum, & ualde aperitiui. Simplicia autem ingredientia trochifcos in litera descriptos satis nota sunt: possunt autem hi trochifci 3. 3. permisceri cum 3. 3. huius decoctionis, & totum calidum in potum exhiberi, possunt etiam ex trochifcis fieri pilulæ, postquam sumptionem sumantur 3. 3. decoctionis prædictæ.

Quod si tussis antiqua & nociua fuerit adeo ut ægrum in nocte dormire non permittat, pilula styracina sunt danda, quæ. Rec. mirrhæ, styracis, opij, omnium partes æquales, informantur ex his pilulæ ad lupinorum similitudinem ex quibus una, aut due patienti tribuantur, in potu uero sumat syr. de papauere, & comedat semen albi papaueris cum saccharo. Qui hanc præterea patiatur ægitudine uitæ in comestione acetosa, salsa, pontica, acris, atque amara. Sussu migium ad antiquam tussim & sputum sæti dum, Rec. aristolochie, mirrhæ, styracis, galbani, omnium partes æquales, arsenici rub. ad pondus omnium, omnia puluerizata ex butyro uac. conspergantur ex quibus magdaleones ad pilule parue similitudinem informantur, & cum necesse fuerit in initio ex uno eorum per traiectorium suffumigetur æger.

In hac ultima parte ponitur curam tussis antiquæ & proprie catarrhalis. Et primo dum multum infestat pp. tussim continuam non permittentem ægrum quiescere dando pilulas stupefacientes, materiam incrassantes, quæ uocantur pilulæ de styrace, quæ sunt pilulæ satis notæ. Cauendum tamen est cum primo exhibentur ne dentur ultra duo grana opij, cõcedit etiam syrupum de papauere conuenientem maxime cum materia est calida subtilis: deinde dat sem. apij, & papaueris cum saccharo, ut accipiendo sem. apij, & papaueris ana. 3. 2. sacchari 5. semis, & ex eis simul mixtis. 2. aut. 3. 3. possunt accipi pro uice, hoc conuenit in materia mixta cum apij subtiliet materia frigida, & papauer calid. & subtilem incrassat. Quod si textus dicit albi papaueris, est clarus, & ponit a quibus in tussi cauendum sit, secundo curat humiditatem superflua pectoris, & pulmonis, siue pendeat a sanie, sicut in phthisi, & empyemate, siue pendeat ab humid. phlegmatica faciendo suffumigium, quod debet ore aperto per emborum inspirari. Est autem hoc suffumigium ex aristolochia, myrrha, styracis, galbani calid. in tertio, omnium partes æquales, arsenici rubei ad pondus omnium, quæ puluerizata cum butyro uac. permiscantur, & fiant magdaleones ad modum & similitudinem paruorum pilularum, ex quarum uno cum oportuerit fiat suffumigium, ut supra. Cauendum tamen est ne hoc existente feb. administraretur, & non nisi materia paucificata. Si causæ tussis fuerint primitiue remoueantur & inducatur regimen contrarium. Si uero tussis fuerit per communiter a toto, sicut in feb.

feb. duplex exigitur cura. Vna cōtra febrem capite proprio perquirenda. Altera contra tussim in qua est habenda consideratio: si enim tussis sit sic. sequens malam complexionē febrile, aut fumos acutos pulmonē stimulantē, curanda est in frigidatione & humectatione cum bibitis, & in ore retentis, sicut aqua hordei, syrup. uiol. mucilago psylli, pilulæ bichichia: de quibus infra, & si cauma fuerit magnū infrigidet & humectetur cor & pectus cum exterius applicitis. Si autē per febrē liquefiant catarrhi petentes pulmonē, quod significabitur per multitudinē creatū curetur cura tussis catarrhalis. Hæc autē tussis catarrhalis duas exigit res, Vna est sedatio fluxus catarrhi, & cura est superius dicta. Altera autem respiciens quod fluxus est, exigit duplicē intentionē. Prima est maturatio eius quod fluxit, secunda uero est illius quod maturatum est educitio & absterfio. Si ergo catarrhus fuerit acutus calid. & subtilis curatur cum infrigidantibus, in crassantibus, & tardantibus uelocitate sui fluxus. Et hæc eadem conueniunt ad maturationē eius quod fluxus est sicut syr. de papauere proprie cum aqua decoctionis hordei, iuiubarum & sebesten, & fortius diacur. siue diacodion datum pondere 3. i. & proprie post coenam hora somni, & teneat in ore pilulas bichichias in textu descriptas, aut aliquā ex his si fuerit opus magis infrigidare, & catarrhū constringere. R. amyli, tragachā. amygd. dulcium excorticatarum, farina fab. sem. papaueris albi & nig. & corticum eius, gummi arabici, boli armen. añ. fac formas similes lupinis aliquantulum compressas cum mucilagine psylli, & sem. cyton. & si cum hoc significat plenitudinē esse in sang. phlebotometur cephalica post sedationē acuitatis, & inflammationis superflue, & mane detur aqua decoctio hordei, iuiubarū & sebesten cum iulep, aut syr. uiol. Et si indiget uetris solutione. R. iuiubarum, & sebesten, añ. numero. 10. uiol. liquir. añ. 3. i. sicum sic. quatuor bulliāt in. 1. lib. aquæ ad consumptionem duarū partium, & coletur, cum qua colatura distemperetur manna. 3. i. s. aut florū cassia. 3. i. & calid. in mane stomacho ieiuno exhibeatur. Cum aut apparuerit maturatio, & creare inceperit detur hæc decoctio. R. sicum sic. pinguium numero. 5. sebesten, iuiubarum ana numero. 15. psyllarum nuclearum. 3. 5. liquir. 3. 2. sem. alchæz. sem. cytoniorū, hyssopi, uiol. sic. ana. 3. 2. aquæ lib. 3. decoquantur ad consumptionem medietatis, aut duarum partium, & dentur. 3. 3. cum s. sacchari uiola. aut. 1. 3. iulep, aut syr. uiol. omni die stomacho ieiuno, & in ore tenere potest tragachantum cum quarta parte loch de pino. Et si opus fuerit emplastrare pectus stante magno caumate fiat unguentum ex oleo uiolaceo, mucilago psylli, & pauco ceræ, postea maturatione perfecta cum opus est excreando materiā in pectore collectam educere, his addatur oleum amygd. dulciū & similia. Cibi aut sui sint cucurbita, prāsana hordeacea, kist fabarum, malua, attriplies, spinachia, blitis, quæ cōdiantur cum lacte amygd. dulcium, aut oleo amygdalino, & triticum, id est frumentum, & lac, sem. communium in brodiis, & si non sit feb. lac est conueniens, ex carnibus autem conueniunt pulli parui, pedes uitulorum & similia, aues minutæ, uicelli ouorū recentium forbillum, caueat a uino, bibat aquā saccha. Quod si tussis pendeat a catarrho cali. cum crassitie uitanda sunt compingentia & in crassantia, sicut syrupus de papauere, diacodion & similia, & dent infrigidantia aliquantulum subtiliantia & abstergentia, sicut est decoctio statim descripta in catarrho subtili cum est perfecta maturatio, & in ore teneatur tragachā. mixtum cum pauco loch de pino. Si uero tussis sit frig. materialis, aut pendet a materia, a cerebro, aut ab aliis membris delegata, aut est in pulmone paulatim congesta. Si uero primum exigit duplicem curam, unā quæ debetur catarrho, & membris mittentibus, quæ cura saltem catarrhi a cerebro superius est expedita ad quam recurramus necessitatē. Altera quæ debetur causæ uel materiæ iam fluxæ in pulmone collectæ, quæ siue sit ab aliis membris defluxa, siue in pulmone congesta exigit sex intentiones. Prima digerit materiam. Secunda euacuat euacuatione cōmuni. Tertia euacuat euacuatione propria. Quarta exiccat residuū materiæ in pulmone relicte. Quinta accidetia corrigit. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima intentio, scilicet digestio materiæ completur cum syrup. liquiritiæ, de hyssopo descriptione Mesue. Item cum

syr. de prasio si materia fuerit ualde frig. & crassa, & in senibus, & frig. naturæ, & possunt sumi cum aqua decoctionis liquiritiæ, psyllarum, sicum sic. & similiū, & si materia esset ualde crassa aut uiscosa, his posset addi aliquid oxymellis, scilicet compositi, aut scyllitici. Si uero aquosa digeratur cum melle ros. mixto cum aqua decoctionis thuris, sandarachæ, nucum cupressi, & similiū, hæc enim cū hoc quod digerūt phlegma subtile, sistunt catarrhum frig. Secunda uero intentio completur cum pilulis de hiera simplici, & tertia parte agarici preparati. Item cum pilulis de agarico descriptione Mesue, & si uolumus simul euacuare a capite & pectore misceantur pilulæ cochæ, aut de hiera composita Gal. cum pilulis de agarico. Minoratur etiam & diuertitur huiusmodi materia cum clysteribus acutis, aut leuibus sū exigentiam, & aliquando uomitu. Sed tertia intentio completur cum medicinis educentibus materiā a pectore, sicut loch de pino, loch sanum & expertum, & multa quæ dicuntur in asthma in hac intentione. Quartam intentionem complent medicinae exiccantes residuum materiæ in pulmone relicte, quarū administratio penes Mesue est secundum duos modos, scilicet aut lambendo, aut bibendo, aut uaporando, & ex his est lambere. 3. i. ex mirra cum melle, faciliat enim anhelitū, & confamit humiditates, & ad hoc ualet styraz & oppopanaxum si sumantur cum ouis, aut melle. Item sagapenum factis ex eo pilulis cum aqua rutæ uitæ, & inchoandū est a parua quantitate paulatim crescendo, ex uaporibus autē ad tussim antiquam est illud quod dictum est a Rasi in fine huius capituli de tussi. Aliud Mesue. R. arsen. citrin. aristol. rotun. ana. fac formas similes auellanis cum butyro uac. recent. Aliud eiusdem. R. styraz, mirræ, thuris, gall. ana. 3. i. arse. citrin. ad pondus omnium, fac formas similes auellanis cum butyro uac. Et si timeres administrationem arsen. loco eius administraretur tantundem sulphuris, imò aliquando ad hanc intentionem exhibetur sulphur cum melle, aut uicello oui, & diaphurphur descriptione Mesue est proprium. Sedat enim statim tussim antiquam. Sed cum huiusmodi administrantur, siue sumantur, siue lambantur, siue suffumigantur, obseruentur hæc conditiones. Prima, ut materia existens in pectore sit paucificata a natura, uel ab arte, iteratis euacuationibus cōmuni, & propriis. Secunda quod non adsit feb. saltem notabilis. Tertia quod virtus sit satis constans. Quarta quod administrare stomacho ieiuno. Quinto, quod inchoetur a pauca quantitate gradatim ascendendo ut experiamur quō rger bene toleret. Sexta quod fiat suffumigatio cum emboto ore aperto, & egro bene tolerante ter aut quater in die. Septima si sequatur cōstrictio anhelitus, aut feb. augmentum corrigantur cum humi. pectus dilatantibus, & frig. aut in actiuis tēperatis sicut aqua hor. liquir. psyllarum & similiū cum iulep, ut fac. uiol. huiusmodi medicina conferunt in phthisi, asthma, & empyemate & proprie quando materia est subtilis siue saniosa. Quinta intentio, scilicet correctio accidentium completur sū ipsorum exigentiam. Si ergo adsunt uigiliæ & tussis sit præter modum infesta dentur fomnifera, sicut mulso, sem. papaueris, aut syr. de papauere hora somni, aut aliqua ex pil. infra scriptis. Recipe styraz liquida, thuris, masticis, opii, croci, succ. liquirit. ana fiant pilulæ, sicut cicer, & dosis est ab una usque ad tres, sed incipiens a pauca dosi, ita ut p. prima uice non des ultra duo grana opii, his si uolueris magis calefacere potes addere caltorii, & plenitudine existēte in pectore nō sunt danda opiata nisi post euacuationē, & danda sunt p. interualla, & cibo digesto, aut ferē digesto, & si adsit cōstrictio anhelitus intendat ipsius dilatationis sū quod dicitur in asthma. Et nota quod opiata sicut philonium Romanū iuuant ad dilatandum anhelitum præfocatum, & si excreuerit febris corrigat sū quod oportet. Et in toto curæ processu attendatur ad sedationē tussis, ad confortationē pectoris, pulmonis cum medicinis ad hoc propriis, & regimine conuenienti sex rerum non naturalium. Est enim hoc necessariū maxime quādo recipiunt materias aliunde. Et ex propriis mirabilibus est rob, aut syrupus ex succ. gran. myrti cōpletorū, & hoc in tussi calid. sed in frig. misceat cū modico myrrhæ, & croci, & pulmonis uulpis sic. est inuamentū sublimē in tussi cal. & frig. sed in cali. det ex eo succ. & pulueriza eo aur. 1. cū syrupo myrtino. In frig. uero cū aqua mellis. hu^o

Io. Arculani

O 3

etiam

etiam intentionis est crocus cum syrupo myrtino, aut syrupo de hyssopo in materia frigi. similiter sandaracha cum melle, & nux cupressi cum uino & melle, & ista cum hoc quod confortant pulmonem, sicut catarrhum, & grana pini confortant, mundificant, & anhelitum dilatant. Ex medicinis autem, quæ magis tussim sedant pectus & pulmonem confortant, sunt theriaca, mithridatū, diamusculus, & similia, quibus per intervalla utendum est. Sexta autem intentio, si sex rerū non naturalium regimen. Aer sit temperatus in actiuis declinans ad sic. Sit parcus in cibo & potu, & cibi sui sint ueteris lenitius, pectus dilatantes, & confortantes, non acetosi, falsi, pontici, acres, aut amari, sed potius dulcedine participantes sicut appares conditi cum oleo amygdul. paulo aceto, & proprie passulato, & paulo melle, aut lacte, aut uini cocti. Item radix porri. Ex ferculis conuenit blitis, brodium cicerum, cicerā fracta siue kist cicerum, uitelli ouorum sorbilibus, carnes teneræ proprie leporis, gazelli, pullorum & reliquarum auium bene conditionatarum, & pulmones animalium sunt proprii, & proprie vulpis, & ericii porcini, & panis sit bene fermentatus in quo sint sem. anisi, fœnic, potus sit uinum subtile, antiquum, pauca quantitas, & uinum dulce, & hydromel est bonus potus. Ex fructibus passulæ, ficus sic. & grana pini dactyli, & comestio sic. cum amygd. & nucibus abscindit illam, quæ est antiqua, uitet somnum supra cibum, & diurnum, & dormiat capite eleuato ad alterum latus declinante, ut uideatur magis sedere quam iacere, exercitetur stomacho ieiuno, & à paruo & tardo incipiat gradatim augendo exercitium, procuret omnes euacuationes à natura institutas, sit gaudens & sperans, iram, timorem, tristitiam, & desperationem fugiat. Et nota quod si aliquando contingeret intentiones contrariæ, sicut sistere catarrhum cum incrassantibus & educere materiam contentam in pectore cum abstergentibus, & subtiliantibus, opus est, aut miscere subtiliantia cum incrassantibus, quæ tamen non sint fermentata sicut syr. de hyssopo, & de myrto, aut syr. de hyl. cum aqua decoct. thuris, iuiubarum & similia, aut uti diuersis medicinis, sicut diuersionibus per nares, uescicatoriis, aut cauteriis ratione catarrhi & syr. subtiliantibus ratione materiæ contentæ in pectore, & possunt etiam retenta in ore contrariarum intentionum inuicem permisceri, sicut loch de pino cum bol. arme. euacuationes autem sunt utrique intentioni communes. Si uero tussis sit per communitatem à pectore sicut in pleurexi, & empyemate, aut per communitatem ab hepate, stomacho, aut ab aliis membris duplex exigitur cura. Prima quæ debetur membro communicanti. Altera debetur pulmōni. Prima autem completur secundum exigentiam ægritudinis quæ est in membro communicante, quæ propriis ca. perquirant. Secunda autem debetur pulmōni in qua est habenda consideratio. Nam illud quod communicatur pulmōni aliquando est sola mala complexio, aut mala compositio sequens complexionem membri uicini, aut uaporis, & in his casibus, duplex est habenda intentio, una est alteratio di-
crasie pulmonis communicatæ, altera pulmonis confortatio, quæ qualiter complendæ sint ex scriptis est manifestum. Mala autem compositio pulmōni communicata à membro uicino non potest corrigere nisi corrigendo dispositionem membri communicantis. Si uero illud quod communicatur pulmōni fuerit materia calid. aut frig. saniosa, aut non saniosa, cura perficienda est secundum quod dictum fuit superius, est enim ostensum, quibus ingeniis, & auxiliis in materia calid. & frig. procedendum est. Mala autem complexio in pulmōne cuiuscunq. generis sine materia exigit alterationē cū contrariis, & ipsius pul. confortationem, quæ qualiter debeat compleri patet ex sup. scriptis, & mala complexio frig. immaterialis rectificatur in momento cum retentione anhelitus, & frig. curantia malam complexionem calid. superius posita sunt in tussi à materia calid. sic. autem curantia malam complexionem humi. sunt sicut, bol. armen. tragachan. gummi arab. hyl. capil. uen. cinnamo. & similia, & sic. si fuerit sine feb. curatur cum lacte caprino aut asinino. Si uero cum feb. aut aqua hor. prisana hor. sorbitionibus, & amygd. dulcib. liquir. retenta in ore, & similia. Si uero tussis sequatur apost. pulmōnis, aut solutione continui eiusdem cura ponetur inferius in propriis cap. Si uero materia existens in uenis pul-

monis faciat tussim sic. eius cura phlebot. basilicæ perficitur, aut prouocatione fluxus sang. narium, hæmorrhoidalis, aut menstrualis, similiter uentris solutione secundum exigentiā humorum peccantium materia prædicta. deinde cum medicinis pectus excreando mundificantibus, quæ ex supra scriptis patere possunt, hæc tamen parum conferunt, cum difficile sit illas per se cretum educere nisi forte aliqua pars extra uenas residaret.

De asthma.

Cap. 66.

Circa rubricam notandum quod reperiuntur isti termini, asthma, constrictio anhelitus, difficultas anhelitus, dyspnoea, orthopnoea. Asthma græce, cantus latine, & hæc ægritudo dicta est asthma eo quod em plurimum quidam sonitus, siue cantus in respiratione auditur. Constrictio anhelitus differt à difficultate eo quod in constrictione (sicut uocabulum sonat) uia per quam debet aer inspissari, & expirari pro cordis euatione & mundificatione, est stricta, quæ strictura pendet immediate ab aliqua specie oppilationis. Difficultas autem anhelitus est quando cum difficultate pectus dilatatur, & constringitur propter nocumentum in membris mouentibus pro anhelitu causando sicut in musculis pectoris, aut diaphragmate, aut nervis uenientibus à nucha ad musculorum pectoris compositionem. Aut forte propter nocumentum in ipsa nucha, aut in cerebro, ex quo inferitur secundum plurimum cum difficultate esse coniuncta constrictio, licet non e contrario, & hæc difficultas dicitur dyspnoea, sicut constrictio anhelitus. Aliqua dicitur orthopnoea quia, scilicet oportet pro anhelitu complendo pectus stare rectum. Orthos enim græce, rectum latine. Anhelitus uero præparationis est, quando oportet hominem præparari, ut possit habere anhelitum. Et ex hoc inferitur quod omnis orthopnoea est anhelitus præparationis, & non contra, licet aliquando anhelitus præparationis approprietur cuidam speciei constrictiois anhelitus. Asthma autem dupliciter sumitur, scilicet communiter pro quocunque nocumento anhelitus cum frequentia à quacunque causa proueniat, & sic describitur ab Auic. 10. tertii. Est ægritudo pulmonis cum qua patiens non inuenit exultationem ab anhelitu frequenti, sicut est anhelitus quo laborat præfocatus, aut festinatus. Est enim ægritudo pulmonis cū semper sit necessarii in asthma pulmonem ledit per essentiam, aut per communitatem. Nam sicut anhelitus est principaliter operatio pulmōnis sic nocumentum in anhelitu est principaliter eius passio. Et est necessarium in omni asthma esse anhelitum frequentem, sicut est anhelitus festinatus id est, exercitati aut præfocati, siue à causa intrinseca, siue extrinseca, sicut à constrictione colli. Non tamen necessarium est in asthma anhelitum esse uelocem, aut magnū sicut uirtute existente debili, aut p. inobedientiam instrumenti. Quapropter si anhelitus esset magnus & uelox, & non frequens non diceretur asthma. Et ex his patet quod asthma est accidens, quia actio læsa, licet etiam sit ægritudo cū ex hac impediuntur operationes, & proprie cordis euatione. Pendet, aut immediate secundum plurimum ab oppilatione coartatoria, attenuatoria, aut carnosa ipsius pulmonis, quæ est ægritudo in uia, siue in receptaculo, posset tantum teneri quod asthma est oppilatio ad quæ sequitur huius frequentia anhelitus, & esset magis consonū uerbis Auic. & consequenter esset morbi in uia, aut in receptaculo. Asthma, aut proprie sumptum, sicut accipitur à Rasi in proprio cap. describitur quod est anhelitus constrictio cum frequentia propter materiam inuiscatam in pulmōne em plurimum cum sonitu & cantu, & ex his patet quod licet in peripneumonia sit asthma, non tamen peripneumonia est asthma cum sit apostema. Duplex est asthma: quoddam uerum, & est materiale, & proprie à materia in pulmōne contenta. Quoddam non uerum, & est immateriale. Item quoddam antiquum, quoddam nouum, quoddam periodicū, quoddam sine periodicis, & uerum asthma secundum plurimum est periodicū, cuius periodicitas causa est materia in determinato tempore congregata catarrhizans ad pulmōnem, siue fluat ad eum per cannam pulmōnis à capite, siue fluat ad eum per uenas, & arterias, aut à capite aut ab aliis membris nostri corporis, siue paulatim in eo congerantur. Causa quæque est per essentiam, quandoque per cōitatem, & quandoque

est primitiua. Per essentiam quidem, aut à mala complexione sine materia, sicut à frigiditate coangustante & oppilante, quandoq; à siccitate corrugante. Aliquando ab humiditate superflua, mollificante, & faciente oppilationem attenuationem. Aliquando à caliditate augente necessitatem euentationis. Sed secundum plurimum est cum materia, & proprie phlegmatica, aut in pulmone congesta, aut aliunde derinata, licet ab omni materia fieri possit. Hæc autem materia continetur, aut in canna pulmonis, & ramis eius, aut in uena arteriali, aut arteria uenali, & ramis earum per uniuersum pulmonem ad minima diuisis, aliquando in spongiosis pulmonis, & carne molli, & quandoq; pendet asthma à fumis, quandoq; à uentositate in pulmone, aut in pectore cõteta, quæ si in pectore contineatur prohibet pulmonis dilatationem, & sic aeris inspirationem. Si uero in pulmone phibet ipsius constrictionem, & sic prohibet magis expirationem. Aliquando uero in causa sunt ulcera, & apostemata ipsius per communitatem, aut à toto, sicut in febris, & hydrope, aut membris particularibus, sicut capite, nucha, neruis, spondilibus pectore, diaphragmate, hepate, stomacho, splene, matrice & similibus. A capite quidem secundum plurimum propter catarrhum. A nucha uero propter oppilationem non potestibus spiritibus transire ad musculos pectoris, & diaphragma, sic anhelitus difficilis. Et similiter per communitatem à neruis uenientibus ad compositionem musculorum pectoris, & uenientibus ad diaphragma ad dandum ipsi motum, & sequitur frequenter spasmus, aut eorum paralysis. A spondilibus autem colli, & pectoris cum dislocantur maxime ad intrinsecam, quæ dislocatio, aut fit paulatim à causa corporea, sicut gibbus, aut subito, sicut in casu, aut percussione. A pectore autem cum creatum est nimis paruum, aut à uentositate, apostemate, ulcere, & sanie, aut aliis materiis in ipso cõtētis, à diaphragmate similiter propter apostemata, aut ulcus eius, ab hepate uero, stomacho, & splene cum intumescunt propter apostema, aut propter oppilationem, & comprimunt diaphragma, & pulmonem, aut sibi materiam uaporis, aut malam complexionem communicant. A matrice autem, aut quia mouetur ad superiora, aut cum impletur foetu, uno, aut pluribus, aut est molatice, aut communicat ipsi uapores malignos, aut uentositatem, & sequitur præfocatio. Causæ autem primitiue, sicut sunt percussiones, casus & offensiones, similiter in causa potest esse aeris intemperies & ceteræ res non naturales indebite applicite. Maxime multiplicatur in hyeme, & proprie in fine eius, & in principio ueris, & multiplicatur in locis humidis & antris, & cauernis, & est familiaris his, qui circa metalla operantur, & utuntur odore sulphuris colophonie, id est picis græce, & picis naturalis, & qui conflant argentum uiuum, & qui terunt lapides pro uitro conficiendo, & curantur per elongationem ab huiusmodi. Signa asthmatis absolute sunt anhelitus frequentia, & quia non potest iacere supinus propter casum unius partis pulmonis super alteram, quapropter uia expirationis constringitur. Et secundum plurimum in processu pallefcunt eorum facies, & tandem sunt cachectici. Signa asthmatis à mala complexione sine materia est lenitas pectoris sine extensione, & grauedine sensata in partibus spiritalibus, & si fiat tussis, est sine sputo, & mala complexio calida cognoscitur ex sensatione caliditatis, & ex anhelitu, & pulsu magis uelocibus, & frequentibus, & quia præcesserunt causæ calefacientes inuatur à frigidi, & nocetur à calido. Signa autem frigiditatis sunt, frig. sensata in spiritalibus, pulsus & anhelitus parui, tardus, sed frequentes præcessio causarum infrigidantium, inuatur à calidis, nocetur à frigidis. Signa siccitatis sunt asperitas sitis, præcessio causarum exiccantium, inuatur ab humiditate, nocetur à siccis, & pulsus est durus ferrinus. Sed humiditatis sunt signa contraria. Si uero sit præsentia materiz in pulmone adest grauitas, & secundum plurimum sentitur sonitus in respiratione proprie quando materia continetur in trachea arteria. Species autem materie cognoscuntur per saporē & colorem cum excreatur, & similiter cognoscitur crassities & subtilitas. Et si sit in canna pulmonis sentitur grauitas, & oppilatio in partibus gutturis, & fit excreatus facilliter cum tussi parua, & rascatione. Si uero sit in ramis paruis tracheæ arteriz distantibus à canna non fit creta

tus nisi cum tussi multa. Si uero materia contineatur in uena arteriali, aut arteria uena frequenter est asthma sine tussi, & si fiat tussis est sine sputo, & fit pulsus tremulus maxime quæ materia continetur in arteria uenali propter tremorem, siue pulsus cordis tremulum, cui pulsus arteriarum proportionatur, & hoc asthma perducit frequenter ad tremorem cordis confirmatum, & syncopim, & morrem. Si uero materia contineatur à carne molli fit creatus secundum plurimum cum tussi multa, & laboriosa. Si uero asthma pendeat à uentositate sentitur extensio, siue grauitas, quæ aliquando permutatur & si sit in pectoris spatio, id est inter pulmonem, & pectus fit difficilis inspiratio & pulmonis dilatatio. Si autem contineatur in pulmone fit difficilis expiratio, & pulmonis constrictione. Si uero asthma pendeat ab apostemate, aut ulcere pulmonis signa ponentur inferius in capit. de peripneumonia, & phthisi. Si uero asthma fit per communitatem à toto, sicut in febris, & hydrope, præcesserunt huiusmodi ægri tudines cum quarum augmento augetur asthma, & diminutione diminuitur, & est asthma sine sputo. Si uero sit per communitatem in cerebro catarrhizante, ad sunt signa catarrhi de quibus supra in proprio cap. & fit subito secundum plurimum, id est in paruo tempore, & econtra quando materia congeritur in pulmone non fit nisi in longo tempore. Et si sit per communitatem à nucha, aut neruis adest spasmus, aut paralysis uniuersalis, aut particularis, & si sit per communitatem à spondilibus adest dislocatio spondilium, & proprie ad interiora non uiter facta à casu, percussione, aut offensione, aut adest dislocatio spondilium antiquata, sicut accidit in gibbis, quæ ad quacunque differentiam fiat est secundum angulum curuileum, & si ad interiora est, comprehenditur, quia gibbositas est in pectore. Si uero sit per communitatem à pectore sicut à pleuresi, & empyemate ad sunt signa ipsarum de quibus infra, & nunquam fit tussis nisi cum materia ingreditur pulmonem. Si autem sit per communitatem à splene hepate, stomacho, cum in tumescunt propter apostema, oppilationem, & similia ad sunt signa nocuenti ipsorum de quibus infra, & si militer si sit per communitatem à matrice, causæ autem primitiue seipsas ostendunt. Prognosticum. Primum, asthma materiale frequenter ducit ad peripneumoniā, quod cognoscitur ex superuentu febris cum prius non fuerit, & ceteris signis peripneumoniz. Secundum, asthma est insanabile in senibus & in iuuenibus ualde difficile. Tertium, longitudo asthmatis ducit ad nocuenta hepatis, & hydropē. Quartum, asthma periodicum quandoque propter opinionē interficit.

Cum aliquis assidue patitur tussim, & aerem attrahit quemadmodum fit post cursum, aut post uehementē motum, & cum iacet supinus, est ei deterius, sed cum sedet est ei melius; decoctio ei danda est, quæ. *Reci. sicum citrin. drach. 10. dat. maiorem humid. habentium, sem. apij, sem. feniculi, capil. uen. liquirit. hyss. prassij, omnium ana drach. 5. coquantur in 3. lib. aquæ dul. donec redeant ad 1. & coletur. de hac uero decoctione tribus diebus ægro in potu tribuatur cum pendere duorum aureorum huius confectio nis. quæ. Rec. succ. liquiritie, hyss. capil. uen. omnium drach. 10. cordumeni, piperis, amyg. amari. aristol. rot. sem. urtica omnium ana drach. 5. mellis despumati, quantum sufficit. hæc enim confectio superfluitates, quæ sunt in pectore, mirabiliter expellit: & est optima. danda itaque per hebdomadam unam continuo: deinde æger, postquam comederit sinapim, & mel; uomere cogendus est, & uenter ex his pilulis soluetur, quæ. *Rec. agarici gran. hor. 18. colocynt. interioris. gr. 4. hor. 6. elateryj. gran. 4. succi liquiri. drac. 5. fiant ex eis pilule. & sufficiunt ad dosim unam. post hoc quoque iterum redeat ad bibendam confectio nem, & decoctionem sumendam, & postremo ad uomitum, & uentris solutionem ut prius. hoc sape faciendum est, donec æger sanitati restituatur. iterum tamen à cibis crassis, & slipt. & acut. abstineat.**

Hoc caput de asthmate diuiditur in partes duas. In prima notificatur asthma. In secunda ibi, decoctio enim danda. ponit

Io. Arculani O 4 nit

nit curam. Prima pars est nota ex suprascriptis. Secunda uero diuiditur in quinque. In prima ponit curam per unum digestiuium, & sputi prouocatiuium anhelitusq; facilitatiuium. In secunda ibi. Deinde æger. curat per uomitum. In tertia ibi. Et uenter curat per solutionem uentris. In quarta ibi. Post hoc quoq; iterum redit ad easdem medicinas. In quinta ibi. Iterum tamen. ponit dietam. Quæ dicit in prima parte nota sunt, permisceat enim decoctionem digestiuium præparantem materiam ad expulsiuonem per sreatum cum medicina sputum prouocante fortiter subtiliante, abstergente & incidente, uirtutemq; expulsiuam pulmonis stimulantem, ut simul digerendo euacuet per sputum, & hæc medicina proprie conuenit in asthma uero, pendente à materia phlegmatica, crassa, uiscosa, in pulmone congregata & simplicia sunt satis nota, prasiuum, idest, marrubium, corderum apud quosdam cardamomum, sed apud Ioannem Serapionem, cui credendum est, carui agrestæ. Ista autem medicina danda est per hebdomadam, licet decoctio non sufficiat nisi pro tribus diebus, & certe decoctiones non debent fieri pro pluribus diebus cum facile putrescant. In secunda parte curans per uomitum præcipit ægrum prius comedere sinapim, & mel ad subtiliandum, & incidendum, & abstergendum phlegmata in stomacho contenta, postea uomitum prouocare, scilicet cū pēna, aut digito in ore imposito, aut fumendo aliquid uomitiuium ex describendis inferius dum curam ordinabimus. Vomitum enim in facile paratis ad ipsum est conuenientior, quā uentris solutio. Tum quia euacuat à pulmone per uiam propinquiorē, tum quia stomachus est lacuna phlegmatis. In tertia parte curans per uentris solutionem, præcipit pilulas fumēdas cum custodia euacuātes à pectore, & è capite phlegmata, & etiam à membris naturalibus, elaterium, idest, succus fructus cucumeris asinini. Inter tamē uomitum, & solutionem debet tempus notabile mediare, ut uirtus restauretur in quarta parte posito alicuius temporis intervallo, ne natura ex nimis continuo usu medicinarum terreatur, docet redire ad medicinas iam dictas eodem ordine, qui dictus est. Ultimo ponit dietam ostendens à quibus cauendum est. Asthma pendens à mala complexionē frigida sine materia curatur cum retentione anhelitus, & inspiratione aeris calidi, & applicatione pannorum, & rerum calidarum exterius, & cum regimine medicinali, & sex rerum non naturalium declinante ad calid. & confert decoctio fœnugraci cū passul. sed cum regimine contrario curatur pendens à mala complexionē calid. sine materia, & est in ueritate species malitiæ anhelitus & non constrictio. Et confert saccharum, uel iulep, aut syr. uiol. cum aqua hor. & curatur cura hæcticæ febrilis. Si uero pendeat à siccitate, & sit cum feb. putrida dentur frigid. humectantia non putrescibilia, sicut aqua hor. syr. uiol. & similia frig. & humid. interius & exterius applicita, & in ore retenta. Si uero sit sine febre, aut saltem sine febre putrida lac caprinum & asinum sunt præstantissima, & administratur aer, & omne regimen medicinale, & sex rerum humiditatum, & curetur cura hæcticæ febrilis, si sit coniuncta calid. & cura ethicæ senectutis si sit coniuncta frig. Si uero pendeat ab humid. exiccat, tam regimine sex rerum non naturalium, quam medicinali, aut aere sic. dicta tenui, & exiccante, pauco somno, exercitio sumpto & similibus. Et similiter ordine tur regimē medicinale in cōtrariū disersat. Si uero asthma sit pendens à materia in pulmone contenta, quæ secundum plurimum est phleg. exigit 7. intentiones penes Mesue. Prima est debitum regimen sex rerum. Secunda adæquatio materiæ. Tertia subtractio eius. Quarta diuersio. Quinta educitio proprie cum sputi prouocatione. Sexta exiccatio residui in pulmone contenti. Septima correctio accidentium. Pro prima intentione. Sit aer temperatus in actiuis declinans ad sic. hac cōsideratione semper habita quod si asthma sit catarrhale, & causa catarr. fuerit calid. declinet parumper ad frig. Et e contrario, si causa fuerit frig. declinet ad calid. & sit boni odoris, & si opus est rectificetur artificialiter secundum temporis exigentiam, & mutatio regionis, & proprie humid. ad sicciorē plerumq; confert. Panis sit ex optima farina frumentis, alicqualiter salitus, qui non comedatur dum est calid. neque transacta quarta die, in quo si ponatur aliquid anisi

aut fœniculi, mellis, aut sacchari, est præstantior. Vinū eius sic album, subtile, antiquum, alicqualiter dulce, aut aliquid uini dulcis commisceatur cum uino antiquo subtili, & parum bibatur, sed nec post cibum, neque inter unam cibationem, & alteram est bibendum neque aquam neque tinnum, debet autem uinū esse limphatum si catarrhus fuerit in causa, & et absque catarrho si fuerit hominum consuetudo bibere uinū limphatum, & non bibat multum subito, sed in pluribus uicibus parum pro uice &c. Carnes sint facilis digestionis, boni chimi, paucarum superfluitatum, & sic. sicut aues bene conditionatæ satis notæ. Et ex quadrupedibus caro gazelli, lepore, hædi castrati annualis, pulmones uero animalium conueniunt cum proprietate sua, proprie pulmo uulpis, & ericii procini. Item pisciculi petrosi, ex ferculis cōuenientibus cicerum, cicera fracta, kist fabarum & brodius galli decrepiti. Et ex herbis conueniunt blites, ius caulium, petroselinum fœnic. lingua arietis & similes. Et intendatur uentris lenitio in dando passul. & ficus siccas, saccharum, & aquam mellis, imò ipsa est potus conuenientissimus, & his non sufficientibus ad lubricandum detur in principio mensē aliquid medullæ carthami cum brodio, & cappare salitæ stimulando lubricant, & oua sorbilia leniendo & condiantur fercula cum his, quæ dilatant anhelitum sicut mel & crocus, butyrum, saccharum, & oleum amygdulicū caudā sunt acetosa, acris, & crassa, stiptica & pōtica, & sit parcus in cibo & potu, nam fames & sitis moderatæ sunt cura huius ægitudinis. Somnus si nocturnus non meridians nisi aliqua occasione somnus nocturnus omiserit, & distans à cibo per duas horas. & dormiat magis sedens quā iacens, & sit communiter sex horarū nō continuus, sed interpolatus, & cum euigilat sufficienter se exerceat, & caueatur dormiendo superflua calefactio cum puluaribus, aut aliis pannis. Exercitium suum sit gradatim de remisso ad intensum, de breui ad longum, ita tamen, ut nō multum intendatur anhelitus difficilis, laudatur autem descensus per loca decliua & arenosa, & exercitium sit inuendum. Item laudatur leuatio uocis, & ipsius gradatio de breui, aut humili ad fortem & longum, & fiat frequenter stomacho ieiuno.

Procurat omnes euacuaciones à natura institutas, præcipue per sternutationem & demucationem narium, & munificationem per sreatum. Et si uomitum aliquando natura tentaret adiuuandus est, imò procurandus artificialiter, ut dicetur inferius. Secunda intentio est digestio pro qua artificialiter faciendā. aliqui præmittuntur canones obseruandi in cura asthmatis, & cuiuscunque ægitudinis ab oppilatione pendētis. Nam si oppilatio fiat à multitudine, cura est euacuatio, de qua dicetur. Si uero à uiscositate, curatur incisio. Si uero à crassitie, curatur subtiliatio. Sed in subtiliatio crassi, duplex est periculum. primum ne subtiliatum sit nimis remissum, ita ut solum rareficeret nihil resoluendo, tunc enim crassum maiorem locum occupando plus oppilabit. secundum ne subtiliatum resoluat subtile, & crassum indurando petrificet. Quapropter cum necessaria est resolutio crassi, fiant cum resoluentibus leuibus, sicut chamæmilla, melilotum, & similia. Et si opus est fortibus resoluentibus, his admiscenda sunt mollificantia humid. participantia actuali & potentiali, sicut exempli gratia uaporatorium humid. & sic. præstantius. Pro quibus intelligendis, est sciendum. Primo quod humor quanto est crassior tanto est aptior ad petrificationē. Et similiter quanto uiscosior. Vnde plures lapides ex phlegmate quā ex melancho. generantur. Secundo quanto medicina resoluens agit à maiori proportionē in humorem resoluendum, tanto citius indurat, & petrificat, ut si ad resoluendum sufficeret chamæmilla calid. in primo, tu admittitres calamamentum. Tercio quando medicina participat multa siccitate. Et idem dico de quocunque alio resolvente disproportionato materiæ resoluendæ sicut aer calid. exercitium, ieiunium, & balneum, & omnia applicita. Quarto quādo humor longam moram in loco contraheret. siue ex angustia loci, siue in renibus, siue sit inuiscatus, sicut in uescia, siue nō possit expelli nisi ascendendo, sicut in pulmone hac longa mora propter actionem caloris facit, ut humor induretur & petrificetur. Quinto quando humor retinetur in loco intensi caloris, sicut in pulmone hæc omnes causæ faciunt, ut humor induretur

induretur & petrificetur, & contrariæ prohibent petrificationem. Ad propositum redeūdo sunt multæ ex his causis petrificationis in pulmone asthmatico uero asthmate. est enim humor crassus & uiscosus, siue ab initio talis sit in pulmone aggregatus, siue sit factus talis ex actione caloris. Secundo est longa mora, tum propter loci angustiam saltem in aliquibus partibus pulmonis, tum quia oportet humorem euacuum dum ascendere. Tertio est intensus calor. Propter has omnes causas, medicinæ asthmatis ueri non debent esse ualde calidæ, nec multæ sic coniunctæ, imò humectantibus permixtæ. Et cum hoc etiam habentes proprietatem singularem in cōfortatione eius. Ad quod etiam facit quia pulmo est membrum molle. facile passibile, non tolerans medicinas acutas sine nocumento. Quapropter inferitur primo quòd pro digestionē, & mundificatione materiæ ab ipso indigemus medicinis remissæ calid. lenitiuis applanatiuis, & humidis, absterſiuis, & incisuiis. Et si aliquando medicinæ notabiliter calid. necessariæ sunt, sicut hyssopus, prassum, & similes, est eorum calid. remittenda cum frig. secum mixtis, & similiter siccitas sua cum humid. sicut facit Mesue & ceteri autores cum componunt huiusmodi syropos. Inferitur secundo esse uitandas medicinas multum exiccantiuas licet frigidas. Tertio uitandas esse medicinas multum frigidas sicut opiu, papauer, hyoscyamus, & similia, incrassant enim & congelant, & prohibet expulsiōem. Et dicit A. in cap. de asthmate, antiquos nō fuisse uſos opio, & hyoscyamo, uel mādragora nisi intentio sit per illud prohibitio catarrhi cum multiplicetur, imò nec psilio, nisi quod Deus uult gloriosus & excelsus, quasi dicat psilio utuntur aliquando propter suam singularem proprietatem. Quarto uitandas esse medicinas multum subtiliatiuas, & incisuias, siue modo A. subtiliatiuas & incisuias puras, adducit quandoque labor earum & in obedientia materiam ad uulnera in pulmone. Quinto uitandas esse medicinas prouocantes ualde propterea quia extrahunt subtile, & remanet crassum. Sexto cum crassities hepatis cōiungitur asthmati, sicut accidit frequenter asthmate prolongato, permiscendas esse medicinas pectorales cum medicinis hepatis, quæ sunt sicut eupatorium, & absinthium. Et istud quod coniungit inter duas res simul uehementer habet proprietatem singularem in utriusque membris, sicut rubea tinctorum, & aristolochia. Idem est iudicium de nocuentis aliorum membrorum cū asthmate coniungitur. Septimo ubi necessaria sit resolutio, siue subtiliatio materiæ, & incisio. Incisio debet subtiliationē superare, patet, quia prohibet indurationem, & facit ad expulsiōem. Vnde. 10. tertii. 5. cap. sit studium cum incisione plusquam cum resolutione. Octauo, quia asthma est egritudo chronica sunt permittendæ medicinæ, & eiusdem generis & potentie, quoniam inter medicinas, & corpora sunt proportionē quæ non comprehenduntur nisi cum experimento, cum experieris pluries consequeris, idest colliges quod magis sit iuuatiuum. A. in cap. proprio. Item. 4. primi, cap. 1. Imò in una medicatione medicinam permuta, quoniam ab eo quod consuetum est non fit passio, & uni quidem corpori, & uni membro in una hora, & altera inest proprietates ab una medicina pati, & non ab altera. Et propter istos sermones sapientes practici in curis ægritudinum chronicarum ordinant plures medicinas eiusdem uirtutis diuersarum tamen compositionum, & unam exhibent quatuor diebus, aut sex, postea alteram, & sic faciunt coalterationes. Nono in ægritudinibus chronicis faciendæ sunt interpollationes, uerbi gratia inter unum ordinem medicinarum digestiuarum, & similiter euacuantium, secundum ordinem aliarum media bunt. 6. uel. 8. dies in quibus æger utetur sola diætā, & quāto ægritudo magis prolongabitur magis interponetur tempus ne natura ex continuo usu medicinarum tereatur, & abominetur. Decimo si causa antecedens, & coniuncta aduersetur, exempli gratia, catarrhus quia indigeat incrassatione & materia in pectore contenta subtiliatione, incisione, & absterſione incitantibus expulsiōem procedatur secundum alterum tertium modorum. Aut enim attendatur dispositioni magis infestæ, & proprie si sine curationi illius altera curari non potest, sicut secundum plurimum: est catarrhus, postea attendatur materiæ iam fluxæ, aut secundo cum aliquibus instrumentis attendatur catarrho, ut puta cum diuersionibus,

& his quæ in ore tenentur, & cum aliis instrumentis attendatur materiæ iam fluxæ, ut puta cum bibitis, & his quæ lambendo sumuntur, & cum exterius pectori applicitis. Aut tertio eodem instrumento quod ex diuersis componatur, sicut quando permiscemus aliquando syr. de hyssopo. cum syr. de myrto, aut de iuiubis, natura enim sagax digerit incrassantia contra materiam fluentem, & subtiliantia contra fluxam, sicut etiam in augmen. apost. miscemus repercussiuam cum resolutiuam, & in hemitritæo aquam hord. cum pipere. Digestiua autem taliter conditionata sunt fœnugræc. passul. ficus sic. da ctyli pingues, mel in materia frig. sed in cal. hordeum, uiol. iuiub. sem. cyton. & similia cum lact. & ex his possunt fieri decoct. & syr. fm exigentiā. Et sem. malux, cyton. sunt optima in causa calid. sem. maluauis in causa frig. Et si uolueris incidere & abstergere his addemus parū oxymel. simplicis. Aquæ aut sunt aqua mellis, aqua hor. si uoluerimus temperare aliorū calid. Et si uoluerimus filtrare catarrhū cū his permiscemus syr. de iuiubis, de myrto, aut aliquid syr. de papauere. Et si uoluerimus facilitare anhelitū aromatizemus cum pauco croci, aliqñ facimus aquā ex decoctione iuiubarū, liquiritiæ, hordei, passularum, ficul. sic. quæ permiscemus cū syrupo factis ex suprascriptis. Et ad has intentiones sunt loch. & electaria, ut. 1. tragachā. frigid. loch. de pino, ana. 3. 1. pulparū, sebesten. 3. s. croci gran. 5. fiat electarium spissum cum syrupo uiol. & de hyssopo ana quantum sufficit, & incorporādo sine igne. Et hic fm necessitate potes addere dactylos maturos, passulas. Imò parum boli armen. ubi sit opus constringere catarrhum, nam bolus armen. apud Auic. est mirabilis iuuamenti in prohibendo catarrhū, & in exiccando humiditates pectoris, sed constringit, & diffcultat anhelitum, nisi miscatur cū lenientibus in magna quantitate. Ego autē sæpe misceo. 1. 3. boli armen. cū. 1. 3. loch. de pino. Et de propriis est ænula cocta, comesta sola, aut cum aliis cibis aut cū melle permixta. Similiter aqua distillata, aut decoctio eius. Et medicinæ superius scriptæ in cap. de tussi ad hunc locum afferantur. Et medicina Rasis superius in textu exposita est efficax, & ultima ad phlegma crassum. Consulo tamen propter causas dictas superius, ut fm plurimum lenioribus utaris, & si opus est fortibus gradatim ad alia ascende. Ex uere autem maturantibus, & domesticis apud Mesue est ius galli antiqui, & ego misceo aliquando cum syrupo fm exigentiā. Item syr. recipiens fœnugræci, & passularum, enulæ, ana partes æquales, est iuuatiuus ualde. Et ex unctionibus conuenientibus ad hanc intentionem est oleum amygd. chamæ. anethi, & de keiri citrino, laurinum, de ireos, sed magis tēpore mundificationis. Et ex his composita fieri possunt addēdo etiam mollificantia fm exigentiam sicut mucilaginem, fœnugræc. althææ, & fiat unctionio cum frictione conuenienti, & lana hyssopi superponatur. Tertia intentio est euacuatio. Si ergo uideatur plenitudo sanguinis fiat phlebot. ex basilica, aut cōi, si repletio appareat in toto. Aut ex saphenis si fuerit in causa retentio menstruum, aut sang. hæmorrhoid. Verum phlebot. fm plurimum ab initio debet fieri.

Postea digesta materia conueniunt propria solutiua, quæ fm plurimū debent esse facilia, inquit etiā A. finiantur humide sunt in pulmonibus eorū cum facilitate, & æqualitate. Finiuntur aut humiditates cū digerentibus prouocantibus sputū, & exiccantibus. Oportet ergo omnia ista esse facilia æqualiter operātia circa partes crassas, & subtiles. Solutiua ergo cōuenientia sunt sicut cassia, agaricus epythym. polip. & charta, & fortiora sunt colocynthis, & suc. fruct. cucumeris asi. & hierapi. diaphenico, electariū indū, pilulæ de agari cos. sed lenissime sebesten. passulæ, uiol. & si cerebrū cōicet miſceantur cochliæ, aut pilulæ de hierapi. cum pilulis de agario. Troc. autem de uiol. conueniunt in materia calid. imò potius in mixta. 1. folia uiol. mediocriū in exiccatione, & humectatione. 3. 6. turbi electi. 3. 4. succ. liquiritiæ, tereneabim, ana 3. 2. scāmoneæ correctæ. 3. 2. fac trochiscos. Valēt ad constrictionē anhelitus, & leniunt naturā, et potius mundificant, & dosis est ā. 3. 1. usque ad. 3. 2. cum aliqua decoctione pectorali, & sunt boni saporis. Sed existente febre, & proprie corpore existente debili melius est solvere cum cassia aut manna. Et ex his trochiscis potest addi aliquid tanquā calca. scil. 3. 1. distemperentur autem electaria solutiua cum aquis

aquis propriis scilicet uiol. hor. excorticati, capil. uel. hyssopi, farfare, idest, pulmonariæ, aqua mellis, aut alicuius decoctionis compositæ ex rebus pectoralibus. Et in hac intentione obseruentur hi canones. Primus est iam dictus, ut fiat solutio cum facilitate, & æqualitate. Sed hic nota quod materia euacuanda est duplex. Quædam enim est coniuncta coangustata in meatibus, & carne spongiosa pulmonis, & huiusmodi cum solutiuis non est multum speranda euacuatio, neque cum uomitiuis, sed ex screatu. Quædam uero sub forma causæ antecedentis, & hæc cum resolutiuis est educenda, aut cum uomitiuis. Propterea dicit Auicenna in cap. de asthma, si materia est plurima scilicet supra illam, quæ est sub forma causæ coniunctæ, tunc necessaria est purgatio, scilicet cum medicina solutiua. Si autem fuerit solum ea, quæ sub forma causæ coniunctæ non est educenda pharmacia, sed per screatum. Secundus canon, ut sit digesta subtilis, ducta ad mediū per increffationem, crassa, & viscosa, per subtiliationem & incisionem. Tertius, ut non fiat euacuatio tempore paroxysmi asthmatis. Quartus, ut reiteretur euacuatio cum difficultate materia educatur, & non nisi pluribus euacuationibus. Sed inter unam euacuationem, & alteram interponatur tempus notabile, ut uirtus non debilitetur, imò reficiatur. Mesie autem iubet inter euacuationes uomitum prouocari. Sed in tellige mediante notabili tempore ne addatur debilitas debilitati. Et secundo quod corpus sit satis facile ad uomitum. Vomitiua autem sunt sicut suc. aut decoc. rapha. à duabus usque ad tres. 3. cum duabus. 3. oxymellis simplicis compositi, aut scyllitici secundum fortioris, aut minus fortis uomitui exigentiam. Et ex fortioribus est suc. raph. in quo steterit infusus elleborus à 12. usque ad 24. horas. Quintus canon, ut euacuatio fiat cum medicinis trahentibus à longinquo, quæ tamen non sint multum agitative. Agitatio namque facit constrictiorem anhelitus, quam ipsi materiis quiescentibus, maxime patiuntur: huiusmodi autem est agaricus, & maxime præparatus secundum artem Mesie. Item colocynthis, sed in parua quantitate sicut apparet in pil. descript. Rasis in textu: Sarcocolla, oppo. & debent omnes esse consolatæ secundum artem Mesie. suc. aut cucu. asi. magis ualet ad educendum aquositatem. Sextus canon, ut eligantur medicinæ expertæ, quapropter illæ quæ posite sunt ab autoribus sunt tutiores. Seprimus, ut medicinæ huiusmodi euacuent à membro mittentes, scilicet à capite, aut quodcumque aliud fuerit, quam à pulmone recipiente. Quarta intentio, est diuerso complenda cum frictionibus extremitatum, frictione pectoris, & aliorum membrorum, aut manu, aut mantili asperfo rubificante cutim, attrahente materiam de profundo ad superficiem. Ad quam si sequatur lassitudo remoueat ungendo partes dolorosas cum oleo chamæmilino, & similibus. Item uentrosationes in spatulis, & natibus. Clysteria quoque sunt ad hanc intentionem. Et si catarrhus esset in causa fiat caputpurgia per nares de quibus sufficienter dictum est in cap. de catarrho. Et fiant apud magnam necessitatem uestigationes, & cauteria, & in commissura coronali. Quinta intentio esteductio propria cum sputi prouocatione, & complementia hanc intentionem sunt multiplicia. quædam lenientia, quædam remollientia cum abstersione, & hæc duo genera magis complent tertiam intentionem, scilicet digestionem, quædam irritantia cum incisione & abstersione, aut acuitate, quædam abstergentia cum proprietate, quædam mundificantia cum proprietate, quædam ampliatiua uiarum, quædam sunt subtiliantia. Lenitiua quidem sunt uiolæ, pruna, calsia, vitelli ouorum, iuscula pinguis, iulep & sirup. uiol. saccharum uiol. et sebesten, & liquiritia. Remollientia uero cum abstersione quædam sunt sicut butyrum, fœnugræcum, malua, alchæa, semina earum, & mucilagines ipsarum, ficus sicæ, passilæ, grana pini, & sunt propria. Irritantia uero cum incisione & abstersione sicut sirup. aceto. species oxymellis, scilicet simplicis, compositi, scilicet scyllitici. Sed incitantia cum acuitate sunt sicut semen urticæ infusum in aceto, semine nalturtii infusum in oleo amygdul. sinapis, piper, diatrion pipereon. Sed abstergentia cum proprietate sunt sicut mel, hyssop. & sirup. eius, hæc, idest, thymus, prasiūm, origanum, calcan. crocus cum melle, laurus secundum omnem modum administrationis est ualde expertus, enula & succ. eius, aristol. rot. species centaureæ, quæ-

rum maior ualet in paroxysmo, minor in quiete, loch de pino, loch sanum & expertum, loch de scilla, cappares salitæ. Itæ porrum cum melle, item iris mundificat pectus efficaciter, & iuuamentum decoctionis calamenthi cum scibus, & passulis in extractione humorum crassorum ex pectore, & pulmone, & dilatatione anhelitus est sublime. Et huius intentionis est thymus, & gran. lauri cum melle, & sirup. de hyssopo, & prasio. Sed mundificantia cum proprietate qua pulmo confortatus expellit à se nocua sunt liquir. capil. uen. pulmo uulpis, & ericii, campestris, porcini, theriaca, michridatum, diamuscum dul. & amar. Sed ampliatiua uiarum sunt crocus, & capil. uen. & sunt dilatantia anhelitus, & istis duobus generibus uti debemus à principio usque ad finem, componendo tamen illa cum medicinis propriis ad intentionem quæ uolueris complere, tumentur enim pulmonem, & faciunt uirtutes aliarum citius ad pulmonem penetrare. Sed subtiliantia sunt sicut ammo. oppo. & sagapenum cum aqua ruxæ, & ista conueniunt post digestionem, & minorationem, similiter mundificantia sine acuitate, dicta sunt superius. Medici autem prudentes & experti multoties componunt adinueniendi medicinas diuersarum intentionum secundum necessitatis exigentiam. Et taliter facit Rasis in præfati cap. permissens decoctionem cum electario, & apud Gal. decoctio paffularum enuc. & fœnugræci cum modico castoreo, scilicet. 3. 3. decoc. cum. 3. s. castorei, frequenter data commodius operatur. Item gutta ammoniaci mixta cum oxymelle potenter liberat. Item decoct. hyssop. cum melle & scibus, item crocus cum melle, aut cum melle & scibus. Ex medicinis compositis conferentibus stricture anhelitus, & difficultati sunt michridatum, theriaca, athanasia, diamuscus, philonium, & est proprium. Vnctio conueniens in hac intentione est hæc. R. ceræ citrinæ. 3. i. olei de keiri, & proprie citrini. 3. 4. adipis anatis, & gallinæ, mucil. fœnugræ. & semi. lini, ana. 3. 6. styracis. 3. 6. fiat eorum bona aggregatio, & cum eo debite calido ungatur pectus. Et si oportuerit magis calefacere his adde hyssopum humidam, & materia existente cal. ungant cum oleo uiolæ. oleo amygd. dul. ana. 3. i. mucilagine piluli. 3. s. cum pauco cere, & si materia sit mixta, misce in compositione calida cum phlegmide. Sexta autem intentio est exiccatio, & consumptio residui humid. in pulmone contentæ. Pro qua intentione complenda recurre ad cap. præcedens de cussi intentione quarta: ibi enim dicitur quantum est opportunum. Sed pro septima intentione corrigenda est sitis cum bibitis, & retentis in ore, quæ tamen sputum non impediunt, imò faciliunt, sicut aqua hordei, uel sacchari potata, liquiritia in ore retenta, pruna bene matura, anguria, & similia. Sed instantia uigilantia cum diapopuleone applicito fronti, & temporibus, & philonium rom. quantitate. 3. s. exhibitum inducit somnum, & sedat anhelitus præfocationem. Sed constrictio anhelitus, quæ tempore paroxysmi asthmatis adeo crescit, ut præfocet diligenti curatione indiget. Primo situetur infirmus in aere libero ad frig. declinante, neque habeat circa gulam, neque circa pectus aliquid strictum, ideo stet aliquando pectore à pannis discooperto, & sedeat super cathedra, quæ ab utroque latere habeat ligna satis alta, & satis distantia, quibus cubitis possit adherere, ita ut pectus sit latum, & altum cum brachiis dilatatis se apodiet alicui ligno ut stet apodiat pectore dilatato, uel apodiet cubitis supra genua sua, uel super disco aliquo se inclinando uersus faciem, uel cum manibus se appendendo ad locum altum, & undique pectus dilatetur. Necessitas enim respirandi docebit situm conuenientiore & paucifecit cibum ante paroxysmum, & etiam in paroxysmo, & sit cibis sicut ptisana hordeacea, & dentur lenitiua dilatantia anhelitus: sicut aqua hor. excorticati cū croco, & saccharo, uel iulep uiolæ. aut fiat aqua cum passulis, liquiritia, & similibus leuibus. Nam iuxta Mesie. autoritatem potius blandiendum quam curandum: peruenit enim interdum ad præfocationem excitatione medicaminum laboriosorum. Postea ueniendum est ad frictiones, extremitatum ligaturas, & huiusmodi diuertentia. Et uentosa posita circa spondiles pectoris dilatant anhelitus. Denum si expedierit propter multitudinem sang. fiat phlebo. basilicæ. Aliæ uero euacuationes scilicet uomitus & solutio non fiant in paroxysmo. Sed si non possit habere beneficium uetris fiat suppositorium

positorium, & ant clystere lenis, licet sit difficile clysterizare propter situm, & somnus sit interruptus. Et si paroxysmus prolongatur usque ad quatuor dies uetoretur inter spatulas cum scarificatione, & ponantur rubificantia, uel uescicatoria super pectore. Et in paroxysmo conferat leuis uentatio cum flabellis. Et apud Auic. in 1. ca. fumatur baurach, loco eius utitur aliqua specie salis acuti. 3. 4. cum 3. 2. nallurtii in 3. 5. aqua mellita: confert enim statim apud uehementiam praefocationis & constrictionis anhelitus, Et iuuat in schiatica. Credo tamen tutius esse partiri hanc medicinam in duabus, aut pluribus uicibus. Et reliqua accidentia curetur secundum quod oportet. Si uero asthma pendet ab aliis materiis in pulmone contentis, scilicet sang. cholera, uel melanch. quod raro euenit, procedatur eisdem intentionibus. Sed materia existente cholericam declinet regimen magis ad frigi. & humi. Sed melancholia existente in causa notabiliter ad humi. sed ad cal. & ad frig. secundum quod est adusta, uel non adusta. Si uero sanguis fuerit in causa, declinet aliquantulum ad frigidum cum temperamento passiuarum, uel prope. In asthma autem & constrictione anhelitus propter uapores fumosos diantes in corde, & ab humoribus existentibus in arteriis cordis, confert apud Auic. phleboro. & melior est illa, quae fit in latere sinistro scilicet ex basillia sinistra. In cura uero asthmatis ex uentositate penes Auic. exiguntur tres res, quarum una est resolutio uentositatis cum facilitate, quod fit cum subleuatiuius notis. Et secunda est apertio oppilationis, ut inueniat quod inobediens est ex ea ad dissoluendum meatum. Et ex eis, quae conferunt ad hoc est inunctio cum oleo de neride, oleo laurino oleo rutaceo. Et ex emplastris iuuatius est, ut anethum & samplucus, & chamamila decoquantur, & uaporetur cum eis pectus, & ambo latera. Et ex his, quae in potu sumuntur est sagena omorufa, & etiam sagapenum, & oppopanaxum & sit potio cuiuslibet eorum aureus unus. Et quandoque potest haec esse necessaria euacuatio communis humoris à quo uentositas eleuatur. Si uero in causa sint ulcera, & apostema, intendatur principaliter eorum curationi, & cum hoc attendatur dilatationi anhelitus, confortationi pulmonis sputi prouocationi, & ceteris secundum quod oportet. Si uero sit per communitatem à toto sicut in febribus, & hydrope, attendatur principaliter curationi illarum dispositionum. Et in febribus uapores diuertantur ad extrema cum frictionibus, lotionibus curium, & hmoi, & illuatur cum aeris frig. inspiratione. In hydrope autem constrictione anhelitus uehementis superueniens cum prius non fuerit est signum mortis festinè quod parum profunt remedia. Si uero sit per communitatem à capite scilicet ex catarrho, elaboretur in prohibendo catarrhum, & secundo in faciendo spueri quod aggregatum est. Et cura patet ex suprascriptis. Illius autem quod est per communitatem à nucha, aut neruis, quo secundum ueritatem est species difficultatis anhelitus, & non constrictionis, radix curae est remotio dispositionis membri communicantis. Et cum hoc intendatur dilatationi anhelitus, & pulmonis confortationi. Si uero pendeat à prauitate pectoris, cum talis non sit remouibilis beneficio medici, regendus est regimine praefocationis, prohibendo catarrhos, & repletiones, & nocentia pectori & pulmone. Si uero sit per communitatem à spondilibus diaphragmate, pleura, hepate, stomacho, matrice, & sic de ceteris, radix est cura dispositionum membrorum communicantium si fieri potest. Attendatur tamen dilatationi anhelitus, confortationi pulmonis, modificationi, & huiusmodi secundum quod oportet. Si uero pendeat à causis primitiuis multoties curatur per elongationem ab ipsis, imò haec sit prima intentio, & secundo remoueat dispositio in pulmone impressa cum contrariis secundum quod oportet. Et ex his possunt patere curationes reliquarum specierum malitiae anhelitus.

De pleuresi.

Cap. 68.

Pleuresis dicta à pleura panniculo tegente costas interius, ex eo quod in ipso fiat secundum plurimum. Aliiter dicta brisen, quasi pectoris apostema, licet proprie pleura graece sit costa latine. Est enim duplex scilicet, uera & non uera, siue pura & non pura secundum Auic. Vera autem pleuresis siue pura est diffinitiuè apostema calidum, in panniculis, aut lacertis pectoris intrinsecis. Non uera au-

tem siue non pura est apostema cali. in panniculo aut lacertis extrinsecis. Ex quo inferitur, quod si apostema sit uentosum, aut etiam ex humoribus frigidis per essentiam quibus non acciderit caliditas per accidens, sicut sephiros purum adu- beleft phlegmaticum non est dicenda pleuresis. Sunt enim panniculi intrinseci pectoris tres, scilicet, pleura tegens costas interius, mediastinum diuidens pectus secundum longum in dextrum & sinistram, & diaphragma aliter dictum metaphrenon diuidens naturalia à spiritualibus, in quibus potest fieri pleuresis uera. Lacerti quidam sunt intrinseci, aut mediantes inter costas, in quibus etiam potest fieri pleuresis uera, quidam extrinseci in quibus in panniculo tegente costas exterius sit pleuresis non uera. Causa coniuncta pleuresis sunt quatuor humores scilicet, cholera frequentius siue sang. cholera. Deinde sang. purus. Raro enim phlegma. Rarissime melanch. Et hi quandoque sunt adusti, quandoque non, sed semper sunt calidi cum hanc pleuresim faciunt per se, aut per accidens per putrefactionem, aut saltem per aduersionem, & propterea pleuresis semper est apostema cal. Verum pendens ab humoribus per se calidis est ægritudo secundum plurimum acuta, à per se uero frigidis frequenter chronica. Causa antecedens sunt humores huiusmodi in cerebro aut membris spiritualibus, aut naturalibus contenti, qui ad membra suprascripta catarrhizantes, aut deriuati huiusmodi causant apostema, concurrente fortitudine membrorum expellencium, debilitate recipientium, & uiam aptitudinem. Verumtamen propter debilitatem uirtutis digestiuae & expulsiuae in membris istis, hoc apost. quandoque paulatim congeritur attineat tunc magis pleuresi frigida per essentiam, quam calida. Causa primitiua est inordinatum regimen in sex rebus non naturalibus, & annexis in aere praecipue, ut in frigida, &c. Pleuresis autem 5. modis terminatur. Aut enim resoluitur, aut maturatur, aut putrefit & corrumpitur, aut induratur, aut permuratur. Resolutio autem, aut est insensibilis per poros cutis, & hoc est raro, aut est sensibilis, licet non proprie resolutio dici debet cum paulatim resudando ad pulmonem cum cunctis expellitur & hoc frequenter. Maturatur autem cum re- tenta materia & non paulatim euacuata sit exitura & sanies in sinu colligitur. Sed putrefit cum a calore praeter naturam materia alterata simul cum parte membri circundante, corrumpitur, & fit cancrena ascachilos, & tandem estiomenus, quae terminatio est mortalis, & haec terminatio ab autoribus non ponitur. Aut induratur per resolutionem partium subili- lium, & hoc rarissime. Aut permuratur, & hoc multipliciter quandoque enim ex approximatione percussui in principio materia retrocedit & uenas ingreditur, ibique ad benignum reducitur. Quandoque permuratur ad superiora, & fit apostema in faucibus aut post aures, & haec est terminatio salubris, aut ad cerebrum & fit phrenesis secundum plurimum mortalis. aut ad neruos inducens paralytim, aut aliam huiusmodi passionem. Quandoque permuratur ad pulmonem interdum subito praefocans sui multitudinem, quandoque paulatim cum materia non est tanta, sed uirtus deficit à sputo, aut ex defectu sui, aut ex laesione instrumenti, aut materiae inobedientia, operatio namque spuendi duabus completur uirtutibus, quarum una est naturalis maturatiua & expulsiua & altera uoluntaria. Et quando non confortantur ambae possibile est, ut deficiat à mundificando. Quandoque est faciens peripneumoniam mortalem secundum plurimum, aliquando phthisim inducens, aut immediate, aut mediante peripneumonia, quod potest esse ante maturationem & post. Aliquando permuratur ad cor syncopin & mortem festinam faciens. Aliquando ad empyema materia super diaphragmate collecta secundum plurimum post pleuresis eruptionem, quae si non mundificatur in 40. diebus à die rupturae, transit in phthisim. Quandoque permuratur resudando ad uenam chilis & consequenter ad uescicam, & cum urina expellitur, quandoque ad intestina & secessu expellitur, quae duae permutationes salubres sunt. Et communiter post digestionem eueniunt. Quandoque ad subscellam. Quandoque ad cutim pectoris. Quandoque ad inguina. Quandoque ad iuncturam membrorum inferiorum ibidem plerumque faciens apostema quod per sepe transit in fistulam, &c. Pleuresis autem quae- dam est in dextro latere existens communiter salubrior, sed tardioris

tardioris terminationis; quædam in sinistro minus salubris, sed uelocioris terminationis, & quæ est in diaphrag. omnibus est periculosior, & magis molesta. Deinde in mediastino deinde in musculis intrinsecis. Deinde in pleura. Deinde in pâniculo & musculis extrinsecis, & facta à sang. est deterior, quàm à cholera sed tardioris terminationis. Et, quæ ab humoribus adultis & uenenosis perniciosior, & à melancholia deterior, quàm à phlegmate & tardioris terminationis. Hæc autem pleuresis habet quatuor tempora uniuersalia, si salubris sit penes accidentia distincta: si uero mortalis tria, principium, aug. & statum, sed penes alterationem materiæ frequenter quatuor quandoque pauciora: sed hæc tempora penes accidentia & materiæ alterationem considerata secundum plurimum non coincidunt. Hanc dispositionem consequuntur hæc accidentia, instantia uigiliarum, & aliquando sinebæ, somnia terribilia, & molestia, & phrenesis uera aut non uera ex uaporib. aut humoribus ad caput delatis, dolores neruorum & contractiones spasmodicæ his repentibus ad nernos. Syncopis, tremor cordis, & huiusmodi ad cor delatis. Fluxus uentris, aut creticus, aut symptomaticus, aut ex debilitate uirtutum naturalium, aut ex irritatione materiæ, si eis, fluxus sang. nar. superfluus & alchola, &c.

Signa quædam significant pleuresim, ipsam distinguunt, à multis passionibus sibi similibus, quædam eius puritatem, à multitudine, & consequenter particulam patientem, quædam quod salubris sit aut mortalis, quædam causas ipsius, quædam tempora ipsius, quædam longitudinem & breuitatem, quædam ipsius terminationem siue permutei siue nō. Signa ueræ pleuresis sunt quinque. Primum febris continua propter cordis uiciniam. Secundum dolor pungitiuus sub costis quoniam membrum est panniculolum. Et quandoque est extensius propter multitudinem materiæ. Tensio enim significat multitudinem, & punctura fortitudinem in penetratione & mordicatione. Tertium est constrictio anhelitus, paruitas & frequentia propter coarctationem factam ab apostemate. Quartum est pulsus ferrinus, cuius quidem diuersitas augmetatur & egreditur ab ordine apud statum propter debilitatem uirtutis & materiæ multitudinem, & hoc de statu accidentium solo si pleuresis per excreationem paulatim factam terminetur. Si uero suppuretur uerum est tam de statu accidentium, quàm quo ad alterationem materiæ. Quintum est tussis si secundum plurimum in princ. siue ægritudine inchoante. Deinde cum sputo ægritudine procedente, & quandoque est hæc tussis in princ. rei cum sputo, & est laudabile ualde, &c. Et quamuis pleuresis assimiletur apostemati ipsius hepatis in tussi, febre, constrictione anhelitus, dolore proueniente ad panniculum cooperientem propter tensionem suspensorium eius. Differt tamen ab eo quoniam pulsus in apost. hepatis est undosus, & dolor est grauatiuus, pungitiuus, & facies est uergens ad citrinitatem aut aliter male colorata, & tussis est absque sputo in princ. & in processu, & secundum plurimum urina est deterior, & egestio similiter in apostemate hepatis, & sentitur secundum plurimum tumor & durities infra costas in latere dextro, & constrictio anhelitus est minor. Et licet etiam in pluribus similetur peripneumonia: differt tamen, quia dolor in peripneumonia est grauatiuus & ualde paruus. Constrictio anhelitus maxima & pulsus undosus, multo magis diuersus & absque ordine quàm in pleuresi, & in ea poma maxillarum faciei rubent ut tinctæ appareant colore rubeo, &c. Et differt à sirsen siue apostemate cerebri, licet in multis secum communicet quoniam in pleuresi constrictio anhelitus, & frequentia est ab ipso initio, in sirsen uero alienatio, oppositum enim accidit in sirsen: est enim sirsen incipiens cum alienatione, & postponitur anhelitus constrictio & frequentia, & in sirsen est rubedo oculorum, & attractio ipsorum ad superiora, & in sirsen tractio mirach ad superiora & dolor in pectore pungitiuus, & pulsus in sirsen est magnus declinans ad raritatem, & in pleuresi paruus declinans ad frequentiam, ut succurrat paruitati, & in pleuresi urina multum tincta est & crassa, e contrario in sirsen. Differt autem uera à non uera in quinque signis suprascriptis. In uera enim tussis non est nisi in ultimo, si rumpitur interius, sed frequenter rumpitur exterius, aut resoluitur, & sic nunquam est in ea tussis, nec etiam tanta feb. nec tanta anhelitus con-

strictio, nec pulsus ferrinus sicut in uera, & licet dolor sit in utraque, & plerumque pungitiuus, tactus tamen in non uera leuiter premendo inuenit dolorem. In uera autem minime, & in non uera præsertim si sit in musculis adest pulsatio. In uera autem minime, cum ibi non sit præsentia arteriarum ad hoc sufficiens, scilicet, in panniculis. Cognoscitur autem particula patiens in non uera. Nam si sentitur dolor in attractione aeris est in musculo dilatante. Si uero in aeris emissionem est in lacerto constringente. Sed in pura si sit pleura, sentitur dolor ascendens usque ad furculas & spaulas, aut descendens ad hypochondria. Si uero in mediastino communicat, dolor anterior usque ad ossa pectoris, & forte usque ad collum transiens per medium pectoris in longitudine, aut dolor sentitur posterius communicans spondilib. pectoris, & accidentia quinque suprascripta ualde intensa plurimum perducunt ad alienationem. Si uero sit in diaphragmate sentitur dolor in extremitatib. costarum, & extremitate osium pectoris, scilicet, ubi finiunt spiritalia, & incipiunt naturalia, cum locus ille sit diaphragmatis, & accidentia quinque suprascripta sunt intensa ualde, & est multum ducens ad alienationem. Distinguitur autem uera & non uera à doloribus uetosis in pectore ex carentia febris in his. Et frequenter ex doloris permutatione. Et quia dolor alleuiatur etiam ex approximatione carminantium in principio. In pleuresi autem uera in principio secundum plurimum intenditur ex horum approximatione. Signa salutis sunt infra scripta, scilicet, spiritus bene conditionatum, scilicet, facile, uelox, plurimum, quantitati tamen materiæ apostematis proportionatum, maturum, quod est album æquale, id est, non diuersum in partibus, mediocriter substantiæ, non foetens neque mali saporis, non rotundum, hæc enim sunt conditiones boni sputi quo ad digestionem in statu, uerum in initio sufficit ad bene prognosticandum, quod sit subrubrum uel subcitrinum uelox et facile, & in augmento medio modo se habeat inter hoc & illud. Sputum spumofum malum, mortem enim significat. Rubrum purum, citrinum purum, album, uiscosum, rotundum, in omnibus deterius est nigrum, & proprie foetidum. Viride autem minus malum, quàm nigrum & significat congelationem, aut aduersionem uehementem & putrefactionem inter quas foetor & ipsius priuatio distinguit. Et non rotundum melius est rotundo secundum plurimum, cum illud superfluum crassitiem signet, & multoties conuersionem ad phthisim. Et similiter nimis subtile, aut crassum & diuersum in partibus, tardum, difficile, paucum, malum significat. Similiter salinum superflue & amarum, Urina bene conditionata bonum prognosticatur. Et melius est ut tendat ad rubedinem quandam aut citrinitatem cum crassitie quàm ad albedinem & subcitrinitatem, & similiter multa melior est quàm pauca. E contrario urina male conditionata malum prognosticatur, & multa deterius quàm urina bona bonum significat, sicut urina alba tenuis, aut ualde rubea, aut pauca, aut limida, aut subingalis, aut nigra, aut uiridis sine hypostasi, &c. Hæc omnia maximum malum prognosticantur & frequenter mortem. Urina saniosa secundum plurimum bona significans pleuresis crissim laudabilem. Egestio bene conditionata bonum, male conditionata malum, & ualde deterius, quàm bona significat bonum. Et secundum plurimum melius est, ut uenter declinet ad stipticum, quàm ad lubricum. Fluxus enim uentris secundum plurimum malus in principio cum multitudine materiæ. In processu autem secundum uirtutum naturalium stomachi & hepatis defectionem significat, licet quandoque cum aliis bonis signis prædigesta materia bonam crissim significet. Egestio saniosa secundum plurimum bona, ut supra de urina. Sudor bene conditionatus aliquando bonum, & proprie cum sequitur alleuiatio, male autem conditionatus malum sicut frigidus foetens. Sudor diaphoreticus malus. Sudor sequens anhelitus constrictio nem malus, fluxus sang. narium aut hæmorrhoidalis, aut ex matrice bonus & laudabilis. Febris intensa multum, malum significat, e contrario ipsius remissio. Frigiditas extremitatum cum caumate intrinseco mortalis rubedo faciei superfluum malum, sed deterior est superflua liuiditas, & color sicut mortui. Facies tornatilis mortalis. Ariditas linguæ citrinitas & nigredo malum. Pulsus paruus, debilis, frequens, multum durus, & diuersus, malum, nigrum

mia anhelitus constrictio & frequentia. Intensus dolor, & proprie tendens ad posteriora, similiter superflua uigilia & subeth malum. E contrario somni incolumitas bonum metis alienatio pelsimum, paruitas sitis bonum. Tremor sub thorace in pleuresi significat commixtionem rationis propter coirata diaphragmatis cum cerebro. Ex signis malis est ut profundetur exitura procedentes a pleuresi absque sedatione feb. & non sit sputum bonum, significat enim mortem per preditionem materiam ad profundum. Et cum in pleuresi non est sputum ualde malum, nisi ibidem modicum sit de materia: significat enim aut debilitatem uirtutis, aut quod est mala aut fraudulenta. Inquit Hippocrates, multoties est sputum bonum facile, similiter & anhelitus, & reliqua signa sunt mortalia sicut illa in qua. dolor tendit ad posteriora, & est eius dorsum sicut dorsum uerberati; si tamen pertransit septimum, ut plurimum euadit. Et quando adest sputum diuersarum materiarum aquosum, deinde dolor fit uehementior moritur satis cito, aut si non cito moritur, sanatur. Et quando sequitur pullatio a furculis extensa usque ad curam, & est urina aquosa & non est sedamen, nec sputum, nec alia euacuatio, est mortalis propter declinationem materiam ad caput. Si autem pertransit septimum sanatur, & ut plurimum cum pleuresi ualde acuta pertransit septimum sanatur. Conferentia medicaminum & agri bona toleranda bonum, contraria uero malum.

Signa horarum. Cum non est sputum, aut est sputum subtile, aut paruum, aut id quod nominatur salua tunc est principium principii. Cum uero subrubrum aut subcitrinum, tunc est finis principii. Et cum augmentantur accidentia & sputum, & incipit remoueri a subrubredine aut subcitrinitate in albedinem, tunc est augmentum. Et cum sputum iam est album æquale plurimum, &c. & accidentia remittuntur, tunc est status, quo ad alterationem materiam, declinatio quo ad accidentia. Et cum sputum minuitur uel incipit minui, accidentia remitti notabiliter tunc est declinatio. Cumque sputum totaliter remouetur & cessant accidentia, iam completur declinatio. Et ex his infertur, in ea pleuresi, quæ terminatur per paulatim factam euacuationem, tempora accidentium & materiam non coincidere. Imo augmentum respectu materiam comprehendit augmentum & statum accidentium. Et status & declinatio respectu materiam comprehendit declinationem accidentium. Secus in ea quæ terminatur ad maturacionem, coincidunt enim fin plurimum utraq; tempora: tunc enim est declinatio cum est perfecte matura, & tunc iam remittuntur accidentia. Et tu ex his concipe tempora quando aliis modis terminantur. Speculatio enim huiusmodi confert ad curam. Si enim terminatur ad putrefactionem, tunc est principium. cum parum sputi aut indigestum. Cumque sputum augetur & incipit fieri liuidum est augmentum respectu materiam & accidentium. Cumque multiplicatur, aut est iam uiride, aut nigrum, est status respectu materiam & accidentium cui non subsequitur declinatio.

Signa causarum sumuntur ex colore sputi, ex dolore, ex febre, ex paroxysmis febris, complexione & habitudine, tempore anni, & ex regimine præcedente. Cui enim sputum est rubrum, aut subrubrum est ex sanguine. Cui est tendens ad citrinitatem est ex cholera. Et cum album non existente adhuc digestione facta est ex phlegmate. Et cui est tendens ad nigredinem & plumbeitatem non per putredinem aut causam extrinsecam est ex melancholia. Si autem colores sint mixti, tunc humor est mixtus. Ex dolore, quia si dolor est ascendens, tunc est ex humoribus calidis. Si descendens, est ex humoribus frigis. Et minor est dolor ex frigido quam ex calido. Et magis pungitius ex cholera, ex aliis forte magis extensius. Ex febre, quia maior febris est ex calido quam ex frigido. Sed ex paroxysmo, unicuique enim humori inest periodus, quæ sibi conuenit. I. quar. cap. de feb. apostematibus: Afflictio sanguinis, fere uniformis, Phleg. motus quotidianus incipiens uersus sero. Cholera de tertio inter. incipiens in mane. Melanch. de quarto in quar. incipiens in uesperis. Ex complexione & habitudine, quia pleuresis proportionatur fin plurimum complexionum. Et ita ex regimine præcedenti & temporibus anni, quia in uere magis a sanguine & ab omnibus humoribus similiter. In æstate uero magis ex cholera. In hyeme uero magis ex phlegmate. In autumno uero magis ex melancholia & ex humoribus adultis. Et tu omnia signa considera & adinuiem copara. Signa resolutionis. Cui terminatur nulla appareat

manifesta euacuatione gradatim tamen præcedens per tempora quo ad accidentia tunc resoluitur. Si autem terminatur per paulatim factam euacuationem cum sputo usque ad finem quod est fin plurimum in uera, tunc est quia pulmo paulatim recipit materiam, quæ ab apost. deciditur sua spongiositate cum pectus contringit. Et sic transit materia de uenis paruis ad magnas, & de magnis ad maiores, donec deueniat ad tracheam arteriam, siue truncum magnum eius existentem in collo, & tandem expellitur ad extra coadiuuante cussi, & tandem rascatione concurrentibus. etiam uirtutibus naturalibus maxime digestiua & expulsiua. Si autem materia retrocedat ex approximatione repercussiu, aut per phlegma. aut aliam causam, & materia uenas reingressa ad benignum reducit, cognoscit, quia post principium non uidetur sequi aliud tempus. Si autem terminatur ad putrefactionem, sputum apparet liuidum, & tandem uiride & nigrum multum foetens cum reliquis signis malis, & magno anhelitus foetore. Si uero induitur cessat febris, nec apparet aliqua euacuatio manifesta nisi diminuta, cessat dolor, præsertim pungitius & extensiuus, sed remanet dolor grauius & serenitas pulsus, & anhelitus constrictio minuitur sed non aufertur, & diu remanet fin hunc modum & ita multum chronica efficitur. Si autem transit ad cancerum, augebitur febris, aut saltem non minuitur, & sequitur dolor quidam fulmineus cum grauedine, & si ulcerabitur, emittitur per sputum uirus nimium foetens. Si uero permutatur ad aliquod membrum puta caput, apparebit urina tenuis alba cum metis alienatione, & ut plurimum uenter restringitur. Si uero ad pulmonem ut faciat peripneumoniam cessabit dolor lateris, & constrictio anhelitus augebitur, & febris, subsequenter accidentia reliqua peripneumoniam de quibus infra. Si autem sui multitudine suffocet subito oppilando meatus pulmonis, apparebit ultima anhelitus constrictio, subita pulsus. f. uehementis diuersitas, rubedo faciei cum nigredine, sudor plurimus, orationem multus in respiratione, & anhelitus succedentes. Si autem post peripneumoniam ruptam remanebit ulcus in pulmone, aut ipsa materia, quæ paulatim transit per pulmonem ulceratum, tunc res efficitur chronica & apparebunt signa phthisis. Si autem permute ad cor, apparebit pulsus & tremor cordis, & pulsus uehementis diuersitatis: non tamen cum ultimata anhelitus constrictio, & tandem syncopis & mors festina. Si autem permute ad neruos, apparebit aliqua neruorum ægritudo, ut stupor, tremor, spasmus, paralysis, &c. cum allevatione doloris sine manifesta euacuatione. Et quoniam constrictio anhelitus sit uehementis & febris non sit fortis, est significatio spasmus iam inchoantis. Si uero permute ad fauces ad subascelas, ad inguina, ad iuncturas, & ad alia membra extrinseca cognoscitur ex tumore & dolore illius membri ad quod terminantur, & ex mitigatione doloris in loco pleuresis, aut ex sedatione cæterorum accidentium eius. Si uero maturetur cognoscitur, quia sputum non est uelox facile copiosum, nec mundificatur in 4. diebus. & dum maturatur uehementis sit dolor, febris & siccitas linguæ, alienatio, & difficultas, & anhelitus constrictio, & eius duplicitas apud dilatationem cum paruitate, & etiam tussis sine sputo per materiam inobedientiam & spissitudinem uelaminis & uirtutis debilitatem. Cum uero facta est collectio quiescunt febris & dolor, & augetur grauitas. Cumque rumpitur accedit tremor diuersus & dilatatur pulsus cum diuersitate sui, & cadit uirtus & debilitatur anhelitus, & multoties accedit febris uehementis, quia materia mordicat membra ad quæ effunditur, aut per quæ transit. Sed post rupturam si non mundificatur in quadraginta diebus a die rupturæ perducit ad phthisim. Et ruptura saniosa in die 7. uel ante, raro euenit, sed fin plurimum tardatur eruptio usque ad 40. aut 60. Et quanto plus fuerint accidentia collectionis uehementiora, erit eruptio uelocior, & quanto plus fuerint leuiora, erit eruptio tardior, & proprie febris existens de summa accidentium & similiter dolor. Et quoniam apparent accidentia fortia cum constantia uirtutis, nec alia euacuatio manifesta sufficiens, tunc nihil timeas: est enim eorum euentus causa collectionis non per aliam causam. Si uero uirtus erit debilis & materia multa, subito moritur per suffocationem & resolutionem caliditatis innatæ. Si uero uirtus fortis aut materia non tantæ quantitatæ accedit in primis debilitas manifesta forte cum lipothymia aliqua syncopi, & est pulsus debilitatus, tardus, dilatatus, & rarificatus propter resolutionem uirtutis

Io. Arculani P cum

cum euacuatione & extinctione calid. innatæ, & accidit tre-
mor quem sequitur feb. causa mordicationis factæ à materia
corruptente. Deinde materia quieta in concavitate pecto-
ris sequitur quibuldam diebus alienatio, cum gravitate tñ
manifesta super diaphrag. deinde malignata materia & nocu-
mento communicato pulmōi, & mēbris circumstantib. cre-
scent accidentia, tussis, feb. inquietudo, defectio uirtutis, ap-
petitus, &c. Et cum uideris ægritudinem sedari sine sputo,
tunc minuitur materia cum urina aut egestionē, & sic appa-
rebit aut urina crassa, aut fluxus uentris materiæ chol. subtilis,
aut alia manifesta euacuatio. Quod si nihil ex his appa-
ret, & uideris tensionem ad mirach. hypochondria, & cutem,
cum grauitate indicabit exiturā apud inguina & crura, quod
est uehemens significatio incolumitatis & euasione, &c. Lō-
gitudinem aut breuitatem pleurefis, siue longinquitatē aut
propinquitatem status, quod idem est siue salubris aut mor-
talis declarant ægritudo ipsa, causa eius, particula patiē-
tis, complexio, tempus, regio & accidentia eius. Aegritu-
do ipsa se acutam communiter ostendit, est enim ut plurimū
media inter peracutas & tropicas, eius enim status est cōmu-
niter circa septimum & terminatur frequenter in decima-
quarta aut añ: si uera pleurefis sit, frequenter tamen cum nō
est uera pleurefis, aut si uera est ex humore frigido per essen-
tiam, est ex genere tropicarum, aut chronic. & sic causa eius
ipsius statum declarat: est enim breuior ex choler. q̄ ex sang.
& ex sang. quā ex phleg. & ex phleg. breuior quā ex me-
lancholia oium semper paritate supposita. Particula etiam
patiētis si sinistra fuerit, cordi propinqua, statum propinquo-
rem ostendit, & cōter quanto particula est nobilior, ceteris
parib. tanto status uelocior. Ideo uelocior est status cū est
in mediastino, aut in diaphragmate, quā in pleura & maxi-
me cum est mortalis. Actas uero, complexio, regio, tempus
anni si calida sint, abbreviant: si frig. sint prolongant. Accide-
tia uero eius quanto uehementiora fuerint tanto ēm pluri-
mum ipsam breuiorem significant, & proprie si sit mortalis.
Econtra uero quanto remissiora tanto longiorē ipsam signi-
ficant, nisi ex materiæ paucitate ipsiusq; benignitate proue-
nit, quod raro est, & per accidentia intelligo febrem, constri-
ctionem anhelitus, dolorem, alienationem, instantiam uigili-
arum, inter cætera tñ sputum est efficax signum lōgitudinis
aut breuitatis. Si ergo in prima die expuerit aliquid subru-
beum aut subcitrinum, aut spumofum maturitati attinens, li-
cet non maturū, sperādum est ut maturetur in quarto, & ter-
minetur in septimo. Si autē non expuerit in die primo, nec
maturetur usq; ad quartum, sed in quinto aut circa tunc ter-
minabitur i. i. aut 14. Si autē non expuit nisi post quartum, &
quod expuit sit attinens maturati, tunc terminatur circa 20.
Si autē non sit, maturitas, tunc res prolongatur usq; ad 24. aut
supra, si cum fiducia adsint bona signa uirtutis, etatis, & appe-
titus, & bonæ tolerantia, quibus deficientib. æger deficiet in
uia. Si autē non expuit usq; ad 7. aut expuat aliquid in quo nō
appareat uestigium maturationis, si sit uera pleurefis & mate-
ria acuta, ut plurimū moritur ante 14. si uirtus sit debilis. Si
autē uirtus sit fortis, de lyderia bona, somnus incolumis, &
anhelitus, urina matura, &c. transiet 14. sed morietur post il-
lum, qm̄ uirtus non est tanta ut possit expectare usq; ad 40.
& 60. in quib. ēm plurimū est hora crisis. Et qñq; ex sputo &
ceteris indicamus ægritudinem terminandam in 14. Deinde
apparebit sputum nigrum aut uiride, aut aliquod sæuū ac-
cidens & morietur in 7. Non uera autē pleurefis ex materia
acuta, & etiā uera pleurefis ex materia non acuta potest ter-
minari etiam post quartum diem, tam ad bonum q̄ ad malū.
Si uero pleurefis ex materia acuta, non transit. f. 30. diem ni-
si sit reciduiatio, &c. Signa prognostica quibus temporib.
ætatibus, constitutionibus multæ pleureses & peripneumo-
niæ uenturæ sunt. Horum ergo quædā sumuntur à corporib.
cœlestibus, quorum consideratio pertinet astrologo. Quæ-
dam ab ætatibus, tēporibus anni, aeris impressionibus, quo-
rum consideratio medico pertinet. Ratione ergo ætatis fre-
quentius accidit primis senibus, quā his, qui in aliis ætati-
bus constituti sunt, scilicet 25. anno uel circa usque ad 70. an-
num. Et in hyeme frequentius quā in aliis, & in constitu-
tione boreali frig. & sic quā in australi, aut in ceteris. Quā-
do enim fuerit hyems borealis notabiliter frig. & sic. tēpus

uero præcedens austrinum & pluuiosum hyeme pleureses
& peripneumonias expectare oportet.

Cum aliquis sub costis suis dolorem sentit pungitiuū,
& propriè quando siccam patitur tussim, & febri-
expedit, ut si dolor super partem costarum, & furcu-
lam tendat; fiat minutio ex basilica eius partis, in qua est
dolor. nisi totum corpus multo sang. repletum fuerit; tunc
enim ex latere contrario sang. detractio facienda est. ægri-
tudo quoque si iam per aliquos dies à sui principio infesta
uerit agrum; phlebot. à parte dolente facienda est. quod,
si dolor inferius ad partem costarum posteriorem tendit; uē-
ter ex decoctione, quam in cap. de rheumatismo descripsi-
mus, est soluendus. melius tamen est, ut phlebo. fiat, dein
de aqua hor. cum sacch. assidue tribuatur. & si uideris
tussim eius uehementis siccitatis; da ei in diluculo omni die
de iulep: deinde da ei potu aquam hordei. & si æger fue-
rit debilis; nutriatur cum pane ex sacch. si autem fortis
fuerit; aqua hord. usque ad diem quartum sufficiat. quan-
doque scireare cœperit; decoctionem, quam in cap. de rheu-
matismo nominauimus, quotidie sumat, antequam aquam
hord. bibat, donec sanetur. si autem feb. & acuitas per-
seuerent, & æger in excreatione difficultatem patiatur, de-
tur decoctio, quam in cap. de asthma nominauimus: quod
similiter est faciendum; cum saniei sit excreatio. quod, si in
princip. passionis, quod excreatur, nigrum, aut ualde ci-
trinum apparet, & sic permanserit, & feb. non quieue-
rit, nec calor usque in diem septimum; timorosum est. &
si cum hoc toto aeris attractio non alleuiatur, & in pecto-
re affuerit oregmon, aut in maxillis rubedo, & in oculis
labor; est morti propinquus. si autem exterius in latere ap-
paruerit rubedo, aut apostematio: & cum premittur lo-
cus, dolet; ponatur desuper uentosa, aut emplastrum ex
sinapi, & ficubus, & dimittatur ibi, donec locus ulcera-
tur. de his uero, quæ ex errore stolidorum ad augmentum
nocuenti accidunt hanc ægritudinem patientib. est, quod,
cum dolor sentitur in principio sub costis; existimant cras-
sam fore uentositatem. ideoque electarium, diamyscum,
aut eis similia agro tribuunt, cumque interficiunt. hæc pas-
sio uocatur birsen, cuius causa est apostema, quod oritur
interius sub costis hypochondriorum.

SCHOLION.

In oculis labor] habent emendatissimi codices in oculis stupor.

Diuiditur hoc cap. in partes octo. In prima notificat pleu-
resim. In secunda ibi. Expedit ut si. Curat per euacuationē.
In tertia parte ibi. Deinde aqua hord. Curat per digestiua
conuenientia in princ. cum tussis est sic. In quarta parte ibi.
Et si æger fuerit debilis. Curat per dietam. In quinta ibi.
Quandoque scireare cœperit. Curat per digestiua & muna-
dificantia cum sputo. cum tussis est humid. In sexta parte
ibi. Quod si in principio passiois. Ponit signa malæ pleu-
resis, & secundum plurimum pernitiosa. In septima parte
ibi. Si autem exterius. Ponit curam pleurefis, quæ exte-
rius ad cutem permutatur. In octaua ibi. De his uero. Do-
cet euitare errorem plerunque medicis contingentem. Quæ
dicit in prima parte nota sunt, & uos supplete reliqua duo
signa generalia: pleuresis, scilicet, pullum furinum, & anhe-
litus constrictionem. In secunda parte curat per phlebot.
basilicæ eiusdem lateris corpore non existente repleto. Sed
ipso existente repleto. Primo, per phlebot. basilicæ contra-
riæ partis uel lateris oppositi in princ. Secundo per phle-
bot. maxime conueniunt dolore ascendente ad fureculā & co-
stas superiores. Sed dolore descendēte ad costas inferiores
docet soluere uentrem cū medicina lenitiua superius descri-
pta in cap. de catarrhos, sed tñ absolute, siue dolor ascendat si-
ue descendat magis laudat phlebot. q̄ pharmaciam. De his
tamen inferius dicitur quantum est opportunum. In tertia
parte

parte digerit in princ. cum aqua hord. exhibita frequenter. Sed ubi tussis sit omnino sine sputo, dat in diluculo, id est, ante ortum solis per unam horam aut duas, iulep scilicet, factum de aqua comuni cum multo sacch. deinde per duas horas post dat aquam hordea. ad educendum, quod per iulep est abstersum, & cum hoc ad infrigidandum & humectandum. Crede tamen aquam hord. cum sacch. utraq; intentione coplere. In quarta parte cibatur pleureticum debilem cum panata sacch. sed melius est ut panis sit lotus ter aut quater. Fortè uero cibatur cum aqua hord. sola usq; ad quartum diem, usq; ad statum accidentium inclusue. Sed consulo ut temporibus nostris utatur pitana hor. subtili cum sacch. In quinta parte digerit & mundificat cum iam sciretur inceperit, sed nota sunt omnia: nam materia existente calidiori & subtiliori exhibet primo, scilicet in diluculo decoct. dictam in cap. de catarrho factam, s. ex scib. citrin. numero 5. iuiub. numero 10. feb. numero 10. paful. 3. 10. liquir. 3. 5. coquantur usq; ad dissolutionem, & colentur, scilicet in 3. lib. aquæ, & dentur ex hac omni die 3. 3. cum 3. murabo. uiol. & sacch. uiol. & per duas horas post det aquam hord. ad lauandum infrigidandum & humectandum, sed materia existente frigid. & crassiori, digerit, & mundificat cum decoctione dicta in cap. de asthma facta, s. scib. dacty. sem. apii, &c. Sed hæc sola in potu exhibeatur sine electario quod iubet administrari. Quæ dicit in sexta parte sunt nota ex superius dictis. Similiter, quæ dicit in septima, ponuntur enim illa ad iuuandum naturæ in expulsiōe materiæ ad exteriora: illud autem emplastrum ex sinapi & scib. describitur à Mefue in suo antidotario. In ultima parte admonet medicum ut nō properet ad curam nisi præcognita agitudine, & quæ dicit nota sunt. hipochoëdria, sunt partes uentris laterales superiores, sed illa, partes uentris laterales inferiores.

Cura pleurefis duplex exigit regimen, scilicet, tentatiuum & curatiuum. Regimen tentatiuum est quo nobis acquiritur notitia, scilicet, an sit pleurefis, an dolor uentrosus, quod quia secundum plurimum medicis & mediocriter exercitatis innotescit, raro est opus hoc regimine. Verum Mef. ut apparet ex processu suæ operationis non solum uentositatē, sed etiam humorem intendit resoluerē si paucus sit, ita ut excusetur à transeundo ad aliud genus curationis. Competit ergo materia existente pauca & apta per poros cutis resolui. Tutius autem est primo incipere à calefactoriis humidis ex quibus est philtum siue spongia in aqua cal. infusa & optime expressa, & peria linea subtilissima circumuoluta, & totius loco dolenti applicita, & bis aut ter iterata semper post in futionem ipsius in aqua calida, & optima expressiōe, & circumuolutione cum peria sicca, & hoc si uideremus ipsius cōferetiam. Si autem dilatata materia dolor augetur, ab hac operatione desistendum est, & ad curam pleurefis procedendum ut infra. Debet autem super loco remanere tanto tempore uidelicet, donec calor ipsius tepescat, & deinde reinfundi in aqua calida, ut supra quod aptius fieri poterit si duæ spongiæ aut duo philtura habeantur huic operationi deferuientia: una enim remota quàm prius imum altera superponi poterit & apponatur debite calida, sed non acute siue intense. Et conueniens ad hoc est scæculus ex furfuribus frumenti magnus secundum loci dolentis quantitatem bullitum in aqua, leni ebullitione & loco dolenti post ipsius fortem expressiōem applicitus; & secundum necessitatem reiteratus ut supra, & his efficacior est spongia siue philtum infusum in aqua decoct. infra scriptæ. R. alchæ. 3. 3. maluarum M. 1. sem. lini 3. s. Horum chamamili. meliloti, anethi, añ. M. 1. radices long. & non abraße extracto ab ipsis meditullio bulliant simul cum reliquis medicinis in aqua fluuiali quantum sufficit, usque ad sufficientem decoct. maluauisci, & fiat ut ab initio dictum fuit. Parietaria quoque cum oleo in patella mortificata, & loco dolenti superposita est ad hoc efficax, & reiteretur secundum necessitatem ut supra. Et ex siccis autem uaporatoriis est facellatio facta ex milio, sale aut fursure debite calefactis & applicitis, ut supra. Et si uoluerimus calefactoria media inter sicca & humida aspergimus res suprascriptas, cum eas calefecimus uino aut aqua, aut aceto, aut ex his simul mixtis: deinde in sacculis ponemus aut prius ex his faciemus sacculos quos calefaciemus super

lateribus calid. aspersis cum suprascriptis, aut ipsos sacculos infundemus in huiusmodi debite cal. & post sufficientem expressiōem applicabimus, ut supra. In resoluendo autem cum his calefactoriis ordo seruandus est, ut secundum plurimum ab humid. inchoemus, & à debiliorib. gradatim procedentes ad fortius resoluentia habito semper respectu ad materiam resoluendam, ut si subtilis sit, aut crassa, posita in superficie, uel profundo, humid. uel sic. cal. uel frig. In materia enim sicca siue cholericæ, siue melancholicæ, melius est cum humidis procedere. In materia autem humidam, siue phlegmaticæ, siue sanguineæ, audacius cum siccis. In materia crassa, cum humidis primo tandem ad sicca procedentes: in subtili autem cum siccis, ad resoluendum materiam profundam fortius resoluentib. indigemus quàm superficiali. Cauendum tamen est ne uapor ex uaporatoriis consurgens ad nares agri pertingat: debilitatem enim & tristitiam generat, & anhelitus necessitatem, & fortem constrictionem. Cum ergo ex sententia operationis nostræ dolor quietatur notabiliter, aut in totum euanescit excusati sumus à transeunto ulterius. Si uero dolor non minuitur notabiliter aut forte augetur, ad curam uerz pleurefis procedendum est. Cura uerz pleurefis octo exigit intentiones curatiuas ubi per resolutionem insensibilem, aut paulatinam excretionem terminetur sicut secundum plurimum est in salubrib. Prima lenit uentrem si fuerit constipatus. Secunda minorat & diuertit causam antecedentem phlebotomia, aut uentofatione huic proportionata, aut pharmacia, aut aliis generib. diuersiōnem. Tertia repercutit causam antecedentem ne transeat in coniunctam. Quarta digerit tam causam antecedentem quàm coniunctam. Quinta, eradicat causam antecedentem. Sexta digerit causam coniunctam, & eam ad sputum habilitat, abstergit, & mundificat, & insensibiliter resoluit, si uideatur pleurefis posse per hanc uiam terminari. Septima, accidentia corrigit. Octaua, ordinat debitum regimen secundum exigentiam intentionum. Ventris lenitiuum iuxta primam intentionem. R. decoct. hord. maluarum matrum uiol. blitis 3. 15. flor. calisæ. 3. s. olei uiol. si pleurefis uideatur cholericæ aut san. 3. 4. sacchari albisimi, 3. s. salis communis. 3. 2. misce & fiat clystere. Si uero uideatur phlegmatica, aut melanchol. dimittantur matres uiol. & addatur mercurialis, & furfur, & semen lini, & oleum commune, & uitellum oui, & puluis sacchar. & cum cæteris positis in alio clysteri & fiat clystere. Si autem uenter fuerit lenis non est opus hac prima intentione. Phlebotomia minoratiua & diuersiua causæ antecedentis iuxta secundam intentionem si materia peccans siue faciens pleuresim fuerit sanguis solus, aut saltem à prædominio, uirtute, & cæteris ad hoc consentientibus fiat quàm citius est possibile, præmissa ut supra, uentris lenitione si expedierit sanguinis minutio facis copiosa. Sed ex qua parte debeat fieri apud medicos modernos est multa altercatio cum quidam solummodo ex saphenis, quidam ex basilica contraria dicant in principio esse phlebotomandum, & omnes se suis tuentur rationibus, & experientis, & prosperis uel aduersis successibus, quorum rationes omitto. Sed pro parte mea hanc uiam sequar quā nunc subscribam. Solum in quatuor casibus mihi uidetur esse facienda phlebotomia de saphenis à principio principate. Primus, quando corpus esset multum repletum, & materia peccans uerisimiliter multa. Secundus, quando esset uenenosa, aut uenenositate attinens, & multum corrupta & putrida. Tertius, quando timeremus raptum ipsius ad membra superiora, scilicet nobilia. Quartus, quando prouenerit aut cum ea adesset retentio alicuius euacuationis consuetæ à membris inferioribus, sicut retentio mēstruorum, sanguinis hæmorrhoidalis, consolidatio ulcerum crur antiquorum, laqueatio uenarum.

Sed in cæteris casibus omittenda est. Quid enim confert phlebot. saphenæ in pleuresi facta per uiam paulatim factæ congestiōis, aut etiam per uiam defluxus, ubi membrum mittens esset hepar, aut ab hepate supra? nam ab hepate infra non esset materia peccans, cum non euacuetur hæc phlebot. nisi ab hepate infra quarta primi cap. de phlebotomia. Præterea ubi materia esset pauca & corpus inani-

Io. Arculani

P. 2. tum,

tum, nec esset conueniens iterare phlebotomiam, nonne præstantius est ex brachio phlebotomare, præterea phlebotomia pedum multo plus debilitat, quam phlebotomia brachiorum. Stante ergo pari utilitate, scilicet utriusque tutius est ex brachio phlebotomare. Non ergo nisi in quatuor casibus, supra scriptis est facienda phlebotomia saphenæ. Et debet fieri ex saphena eiusdem partis nisi in repletionem modum excedente in quo casu uult Mesue fieri ex saphena opposita. Sed forte melius esset phlebotomare utrasque saphenas simul incipiendo à contraria, & post ipsam phlebotometur uena basilica opposita in latitudine nisi forte materia existente uenenosa aut ualde corrupta, & timeremus ipsam trahere uersus cor phlebotomando basilicam sinistram. in hoc enim casu forte melius esset phlebot. basilicam eiusdem lateris præcedente phlebot. saphenæ. Sed post phlebot. basilicæ oppositæ docet A. phlebo. communium eiusdem lateris oppositi, quod uerum esset in maxima repletionem ubi scilicet esset necessarium multiplicare tot phlebot. diuersas, quod raro euenit, cum non sit reiteranda phlebot. nisi ex magna causa ne materia congeletur. in cæteris autem casibus præter supra scriptos notabili existente repletionem debemus incipere à phlebot. basilicæ oppositæ communiter usque ad 3. dies inclusiuè, sed in prima & secunda die melius est ex manu, in tertia ex brachio, & deinde si expedit ex basilica eiusdem lateris phlebotomamus. Si uero pauca esset repletio, aut iam transiisset tertia dies, melius est phlebot. basilicam eiusdem lateris. Sunt tamen imaginabiles casus in quibus nullo modo cõpetit phlebot. Vt puta in pleuresi ex cholera pura multum distante à natura sang. nec apta educi cum sang. & corpore existente multum cholericum in quibus euacuando sang. timeremus choleram furere. Et similiter in phle. puro, & corpore phleg. ne perduceremus ad humorum cruditatem. Sed quia humores non sunt puri communiter, imo permixti cum sang. aut apti educi cum sang. Et quia communiter omnes humores phlebo. euacuat, cum omnes in uenis contineantur, propter hoc fere semper in pleuresi & cæteris apost. intrinsicis facimus phlebot. non tamè sic facimus in febre, cum communiter humores facientes feb. sint magis simplices nec, opus sit in feb. sic diuertere sicut in apost. optimum autem diuersum est phlebot. &c. Si autem phlebot. non poterimus, aut ratione ætatis, aut debilitatis, aut quauis causa cum uentosis suppleendum est appositis in natib. aut in curuaturis genuum, & aliquando cholera aut alio humore multum dominante. oportebit præmittere solutionem, & deinde sang. minuire. In pluribus tamen præstantius est primo minuire, cum phlebot. sit omnium humorum euacuatiua & optime diuertat, quæ plerumque sola sufficit, ubi alii humores non sint in causa, sed sit copiosa iuxta quantitatem repletionis & tenorem uirtutis & alia, quæ phlebot. consentiunt aut dissentiunt &c. Si autem alii humores peccent sine peccato sanguinis, sint tamen apti educi cum phlebot. nec multum distantes à natura sanguinis præmittatur pharmacia, deinde quàm primum sequatur phlebotomia, ubi autem non peccent cum sanguine, & sint multum distantes à natura sanguinis, simus contenti pharmacia sine phlebotomia, ut in præcedentibus casibus dictum est, quemadmodum nec in erysipelate extrinseca ex cholera pura competit phlebot. iuxta præceptum Auic. tertia quarti capite proprio. Pharmacia autem si humor cholericus in causa fuerit siue præcedat aut subsequatur phlebot. aut fiat sine phlebotomia, fiat cum solutiuis benedictis lenientibus. & non stipticis iuxta sententiam Mesue & Auic. Quapropter inepte operantur quidam uiri magnæ experientiæ qui fortia exoluentia exhibent uolentes prohibere augmentum apostematis notabiliter minorando materiam. Sunt enim causa quod humores agitati & non digesti suant amplius ad locum dolentem, & sic apostema augmentent, & febrem, & corpus amplius calefaciant. Item uirtutem debilitant & interdum fluxum, qui non facile sistitur, prouocant qui secundum plurimum pessimus est in pleuresi, neque etiam solutiua debent esse stiptica ne derelinquendo uestigium stipticitatis sputum prohibeant, quod est sumo-

pere cauendum, propterea neq; mirobol. neque rheubarbarum aliquo modo conuenit sicut opinatur est Gordonius in hoc casu exhibens rheubar. Nec ratio sua alicuius est momenti cum dicit, ideo exhibendum esse rheubar. cum optime choleram euacuet & relinquat uestigium stipt. qua prohibetur fluxus uentris in hac passione suspectus: imo stipticando prohibet uentris lenitatem, debet enim uenter esse lenis sed non lubricus, debet enim assellare bis in die. Sit ergo solutiuum huiusmodi in materia cholericâ. R. mannæ ʒ. i. succ. uiol. pulparum, sebest. ana ʒ. s. feri caprini quantum sufficit, pro potione misce aut loco feri caprini aqua decoct. uiol. iuiub. sebest. quantum sufficit, & loco mannæ si non habeatur ponatur cassia sed in minori dosi. Istud solutiuum sumat in aurora cum custodia, deinde non assumat lauatiuum aliquod. Si uero fluxum uentris accessurum timeret in pleuresi, tunc nec hoc nec aliud solutiuum assumat, maxime autem solutiuum uti debet dolore descendente ad hypochondria. Virtute uero existente debili non consentiat phlebotomiam nec solutionem, de qua supra, tunc diuertere & aliquid euacua clysteribus lenitiuis mediis aut etiam acutis, in quibus cassia aut agaricus ingrediatur secundum exigentiam, aut aliud huiusmodi, & proprie dolore descendente ad hypochondria, quibus utatur singulis diebus aut alternis secundum necessitatem. Vbi autem timeretur fluxus uentris nullo huiusmodi utatur. Alleviatio enim uentris à fæce & uentositate excusat ab additione uocumetorum in hac ægritudine. Et si pleuresis quidem fuerit phlegmatica, euacuatur sumendo cassiæ ʒ. 6. agarici præparati ʒ. s. cum decoctione liquir. passul. hyl. cum pauco melle. Si uero fuerit melanch. sumatur cassia cum sena & epichymo cum horum decoct. nec non buglossæ & pauco sacch. uel trahatur cassia cum decoct. senæ, & epith. et aliorum pectoralium, ubi autem timeretur fluxus uentris nullo modo utatur aliquo solutiui. Diuersum & acutatis humoris æquatiuum iuxta secundam intentionem. R. folia. etuæ M. i. maluæ M. 2. salicis uitis ana M. 2. florum uiol. M. 2. nenuphar. chamemil. ana. M. i. incidantur aliquid & bulliant simul in aqua fluuiali quantum sufficit pro lotionibus amborum crurium, sed flores uiol. & nenupharis ponantur in sine ad bulliendum. In hac decoctione debite calida lauatur stomacho ieiuno & fricentur primo pedes & crura à genu infra, deinde eadē hora immediate manus & brachia à cubito infra ipsi pleuræ oppositæ, licet forte regularius sit primo lauare brachia, deinde crura. hoc uero diuersum utat singulo die stomacho ieiuno saltē semel, sed hora qua non assumit clystere supra scriptum aut fiat alia ex euacuatiuonib. supra scriptis aut diuersionib. descriptis. Diuersione autē cū uentosis ad cutim & ad partes extrinsecas positus super loco dolente nō laudo, nisi natura id p se primo tentauerit, in quo casu adiuuanda est cū uentosis, cū scarificatione & sine, & cū rubificationib. loco appositis sed maxime hanc operationem debent præcessisse tã phlebot. diuersiua q̃ euacuatiua, nec nō minoratio materiæ cū solutiuis de quibus dictū est & dicei, & et ipsius eradicatio si fieri pōt. Tertia autē intentio. s. repercussio perfici cū exterius applicitis & nō interius & domesticæ repercussiuus nō fortibus, & solū in principio principiante & nō in augmento usq; ad duos dies cōiter, exceptis semp. casibus. qui excipiunt quarta primi, de cura apost. ut quia materia nō sit uenenosa nec multum corrupta, nō sit crassa & inepta repercussioni nec timeat reditus eius ad pulmonem, cor, cerebrū, & huiusmodi mēbra magis nobilia, nec corpus sit repletum ualde. Et quia frequenter desunt conditiones supra scriptæ repercussiuæ cōiter omittunt. Repercussiuū autē domesticū est quo utebatur G. factū ex cera alba & oleo rosaceo simul mixtis, & pluries lotis cū aqua ros. Repercussiuū autē Mesue sunt satis fortia super quib. nō præsumerē, præcipue quæ sūt cum ros. aceto, balauft. In materia tñ chol. subtili licentius possumus uti repercussiuis, q̃ in materia crassiori adiuuant enim incrassando p parte ad digestionē, oleū ros. esset satis ad hoc cōueniens, aut mixtū cū oleo uiol. &c. Quarta intentio cōpletur cū digerentibus tñ interius, q̃ exterius applicitis. Materia autem existente chol. cōuenit hmoi. R. syr. de uiol. de iuiub. an. ʒ. i. aqua decoct. hordei iuiub. seb. & uiol. an. ʒ. 3. misce, sed digi. ponant in sine, hoc digestiuū cal. sumat in hyeme, æstate uero tepidū in aurora & et in uesperis p 3 horas

horas ad minus ante cenam quatuor dieb. continuis & dormiat si potest post eius functionem, sed non amplius. 2. horis, similiter in sero per 1. horam dormiat, & sufficit si huiusmodi syr. cum aqua hor. distemperentur.

Si uero maiori extinctione opus sit addatur syr. de nenuphare. Et si adhuc pluri frigidatione opus fuerit addatur mucil. psilii, 3. s. rescindantur autem omnia quantum est possibile, quæ constringunt sicut portul. papauer. lactuca, & similia. Aquæ uero conuenientes in materia cholera sunt aquæ citruli, cucur. melonis. Indi quæ solæ cū fac. aut suprascriptis syr. misceantur possunt. Si autem materia peccans fuerit sang. sint digestiua maioris absterfionis & minoris alterationis sicut syrapi suprascripti cum aqua hor. seu sem. communium frigid. iuiub. seb. & similia. Digerentia autem exterius applicata sunt oleum uiol. & amygd. dulcium secundum quantitatem quæ uidebitur, in his debite calid. infundatur petia linea subtilis & cum ea ungatur particula dolens, deinde super ipsa extendatur & debite fascietur cum fascia subtili ueteri, 2. reuolutionibus. Si uero materia sit phleg. exhibeatur aqua mellis cui si opus fuerit admisceatur oxymel simplex, syr. de liquiritia, & huiusmodi. Si uero melancholia addatur his syr. de buglossa uel de pomis dulcib. Et pariformiter exterius addantur suprascriptis aliqua olera pectoralia magis calid. attinentia de quibus infra, sicut oleum chamæmel. Quinta autem intentio, scilicet causæ antecedentes eradicatio perficitur phlebot. & pharmacia phlebot. ergo basilica eiusdem lateris si opus erit iterata phlebot. & hauriatur sang. secundum tenorem uirtutis & quantitatem repletionis, sed non fiat nisi ex forti causa ne materia congeleatur & sputum prohibeatur & fiat communiter transacta die tertia, obseruatis canonib. suprascriptis in primaphlebo. Deinde si fuerit materia peccans præter sanguinem pharmacia educatur proportione uirtutis & materia peccanti, ut puta quando aliqua ex ea, quæ suprascriptæ sunt in secunda intentione obseruatis canonibus ibidem descriptis, hoc obseruato quod inter hæc phlebot. & pharmacia cadat dies medius in quo uirtus restitui possit. Sed semper memor sis ne uentrem nimis lubrices, est enim præstantius ut sit nimis stip. quam nimis lubricus. Sexta autem intentio est ut causa coniuncta pleuresi digeratur paulatim, per sputum mundificetur, & etiam parte insensibiliter resoluatur semper cauendo iuxta posse ne suppuretur. Mundificatiuum. R. liquir. rase & mundæ ad cortice suo 3. s. hor. exorticat. 3. s. sebelten. 3. i. iuiub. 3. a. uiol. M. 2. suc. granat. dul. 3. 6. aquæ uiol. lib. 4. succ. candidi, penidiorum, diadragan. ana. 3. i. s. incidantur incidenda deinde simul bulliant ad leuem ignem usque ad consumptionem tertiæ partis aquæ, & fiat iuleb longum, uiol. tamen addantur in fine ad bulliendum, de hoc iuleb tepid. aut calid. gargarizet & teneat in ore lambendo, deglutiat sæpius in die maxime stomacho ieiuno. cui si opus fuerit amplius mundificare & digerere addatur suc. liquir. 3. i. sem. malux. sem. maluauif. sem. coium frig. ana. 3. s. & de eo bulliendo fiat iuleb longum. Et si amplius fuerit opus mundificare & digerere addatur mellis uiol. 3. i. & c. Mundificatiuum cum sputo efficacius suprascripto, & digestiuium. R. diadragachanti frig. Nicolai 3. 3. mucil. sem. malux. & maluauif. & cytoniorum, ana. 3. 2. manna 3. 2. mellis, uiol. 3. s. reformetur coactio in forma medicocriter liquida. Si uero sanguis fuerit in causa, requiritur maior absterfio & minor in frigidatio. Et si materia fuerit uiscosa, aliqualis incisio, ad quæ omnia confert oxymel cum suprascriptis mixtum & pro complendo hanc intentionem exterius ungatur ut infra. R. Oleorum, uiol. amygd. dul. chamæmi lini, butyri ana. 3. i. misce, in his oleis debite cal. infundatur petia lini subtilis uetus & inungatur particula, petia illa taliter infusa superextendatur & fascietur, nec non fomentatio facta, ex aqua decoct. maluarum sem. lini. paritaræ, foenugraci, maluauif. & similia. Minuit enim dolorem & sputum accelerat postquam sequatur inunctio, aut emplastrum subsequens. Maturatiuum adiuuans, ad mundificandū & doloris sedatiuum. R. foliorum uiol. M. 3. mucil. altheæ, sem. lin. foenugraci, ana. 3. s. florum chamæmel. meliloti, ana. 3. s. oleorum uiol. amygd. dulcium, butyri recentis sine sale ana quantum sufficit ad impinguandū farinæ hordei partes duas, farinæ sem. lini partem unam, ita quod sufficiant ad inspissan-

dum, flores bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad faciendum bullitionem sufficientem pro emplastro, deinde omnia simul misce ad lentum ignem & fiat emplastrum, & c. Super apost. loco dolente emplastr. hoc tepidum apponatur & quandoque iteretur bis in die. Si uero phlegma fuerit in causa adhuc requiritur minor in frigidatio, & maior incisio, & absterfio sicut hydromel cum oxymelle simplici, & syr. de liquiritia, quibus etiam aliqua ex suprascriptis possunt admisceri, & potest fieri aqua mellis cum sicub. passulis, & liquir. nec non loch de pino addatur suprascriptis. Si uero melancholia fuerit in causa confert decoctio ex melle, passulis, liquiritia, lupulis, buglossa, cui oxymel addi potest si fuerit opus incidere. Et si magis in frigidare uis, ponantur uiolæ in decoctione, aut addatur syrupus uiolaceus: & si magis uis maturare addatur in decoctione semen malux, cytoniorum, maluauif. & ficus sic. pingues, & loch de pino cum syrupo, de buglossa, melle uiol. oxymelle simplici, & cum mucilagine, semine maluauif. semine malux, & semine cytoniorum, sit ad hoc sublime, non enim sunt expolienda abstergentia nec incidentia a maturantibus & remanentibus asperitatem sic enim felicitatur operatio. exterius autem applicantur infra-scripta. Recipe olei uiolarum, amygdalarum dulcium, butyri recentissimi, mucilaginis, maluauif. foenugraci, sem. lini misce, quibus si erit opus fortius abstergere addantur radices lilii & caules cum butyro. Sed in materia melancholica intendatur magis mollificationi, & in phlegmatica magis absterfioni. Vnguentum leue competens in pleuresi ex melancholia. Recipe mucilaginis, maluauif. foenugraci, lini, butyri recentis, medullæ cruris uituli, olei amygd. dul. liliorum alb. ana. 3. s. croci. 3. 2. misce. Septima intentio, scilicet correctio accidentium completur, ut infra, si fuerit instantia uigiliarum. primo lauatur crura & brachia trahendo in ferius cum decoctione dicta, in secunda intentione ex foliis lactucæ, malux, & c. Et ponantur in decoctione cortices papaueris albi & nigri, & etiam feminis hyoscyami, & ungantur exterius tempora & frons cum diapopuleon addito etiam opio si oportuerit.

Et detur etiam apud necessitatem syrupus de papauere factus ex semine papaueris, & non ex cortice, sed cum caute la ne compingat sputum quod esset deterius, & si hoc timeretur detur cum aqua mellis, aut aqua decoctionis passularum, aut similibus. Subeth, si accidat curret odorato acetum acutum, & ponendo petias in eo infusas circa frontem, & tempora, & apponendo uentosas parti posteriori descendendo & faciendo clysteria ad hoc propria & frictions fortes, trahendo inferius ligaturas & recurratur ad caput de subeth. Subueniatur autem phrenesi, si non sit uera, inducendū somnum, lauando crura & brachia, ut supra in sedatione uigiliarum super commissura coronali fiat embroca, aut fomentum cum decoctione suprascripta pro cruribus, & diuidatur pullus columbinus per medium & aspergatur puluis hyoscyami albi, & tepidus ponatur super commissura & dimittatur per horam.

Si autem uentre existente stiptico, sicut est ut plurimum in tali casu leniatur primo uenter cum clysteribus lenitiuis & etiam cum acutis si oportuerit, & fiat phlebot. quado materia est in ascensu, ex saphenis, & ponantur uentose in spatulis & natib. cum scarificatione, sed postquam ascendit uirtute consensiente fiat ex cephalica, aut phlebot. uenæ frontis, aut fluxus sang. narium prouocetur, & super caput ponatur embroca, de aqua suprascripta. Et unctiones in primis alterantes, & somnum inducentes & in processu aliquantulum magis resolutiue. Si uero materia repat ad caput & nervos fiant frictions in latere contrario, & super locis levis fiat unctio cum oleo chamæmel. & liliorum al. debite calid. & inuoluantur faldelle lang. suc. & fiant diuersiones debite per clysteria, & c. Si uero accidat syncopis ex uirtutis debilitate subueniatur exhibendo modicum uini dulcis lymphati cum aqua hor. aut uiol. & contusi pulli aut brodii consumpti. Si uero ex raptu humorum aut uaporum ad cor fiant diuersiones omnibus modis suprascriptis, & confortetur cor & spiritalia cum odoribus bonis. Si uero sedanda est cum humectantibus & uehementi inflammationis extinguendis sicut aqua citruli, melonis indi, mucilago psilii & cōsimilib. uerū

Io. Arculani.

P 3

oportet

oportet ut non sint frig. actū, & oportet ut misceas secū ali-
quid ex abstergentibus subtiliter, ut lenificetur sputum, sicut
sacch. aut suc. granatorum dulcium. Et si fuerit sitis à cauma-
te spiritualium administretur libertas aeris temperati decli-
nantis, scilicet ad humid. Si autem fuerit ab ebullitione cholerae
rub. confert syr. acetosus & uiol. cū aqua plurima, sedat enim
sitim etiam aqua hor. facta, secundum ordinem & debitam
artem. Fluxum sang. à naribus contingentem si fuerit creti-
cus non debemus restringere nisi modum excedat, & si fue-
rit non creticus propter exuberantiam sang. confert tunc
phlebot. & cetera, quae requirenda sunt in proprio cap. &
similiter ex ebullitione magna cum extinguentib. & ebulli-
tionem sedantibus procedendum, ita tamen ut non compin-
gatur materia & sputum prohibeatur. Fluxus uentris si acci-
dat in principio morbi est secundum unum duorum modo-
rum, aut propter multitudinem materiae praesentia regula-
tionis naturae & non est restringendus, sequitur enim ex hoc
anhelitus facilitatio & delitescētia feb. & est significatio bona,
aut est propter multitudinem materiae praeter hoc quod
regulatur à natura, imo est sicut egurgitans, & est significa-
tio mala, & proprie cum non sedatur per ipsum constrictio
anhelitus & feb. inflammatio, tunc enim superueniet forte
mors in 4. uel ante, nec hic est restringendus nisi modum ex-
cedat, sed obuiandum male qualitati humoris siue occulte siue
manifeste impediēte naturam ut regulare non possit,
& natura ipsa fouenda est, ut non cadat. Si autem accidat flu-
xus in fine morbi aut praecedente morbo est similiter secun-
dum alterum duorum modorum. Aut enim est creticus ex-
pellente natura nociuū, & separante post debitam digestio-
nem, & sequitur ipsam incolumitas, & non est restringendus,
nisi modum excedat, aut accidit ex debilitate membrorum na-
turalium, scilicet prostratione digestiuae, & contentiuae eo-
rum, & sequitur ipsum mors. Huic autem subueniendum
confortando utramque uirtutem cum interius & exterius
applicitis, ita tamen ut sputum non prohibeatur. Alchola
autem uel oris excoarctio si proueniat à uaporibus febrilib.
acutis, siue à uaporibus eleuatis ab humoribus putrescenti-
bus, aut in membris naturalib. aut in spiritualib. aut ab ipso
ulcerare in pectore, aut pul. & denotat multam ipsius ulceris
corruptionem, subueniendum est cum his, quae dicta sunt
in cap. proprio, cauendo semper, ne remedia localia sint sti-
ptica multum impediētia sputum, quod esset deterius. Con-
uenit ergo retentio lactis in ore, & gargarif. cum eo & deco-
ctio iuiub. dia. & huiusmodi in utroque conferentia. Re-
gimen fex rerum non naturalium iuxta octauam intentionē.
Sit aer in actiuis temperatus potius declinans ad calidum, q̄
ad frigid. tendens aliquantulum ad humidum. Viter aer
uentosus & uaporosus, & fumosus & superflue humidus &
aerosus, & similiter aestuosus & ficcus. Vbi autem esset ma-
gnum cauma in spiritualibus & sitis ardens & huiusmodi acci-
dentia cum cal. superflua posset aliquantulum ad frig. & hu-
midum declinare, nec sit suffocatus, uaporibus plenus, ma-
xime existente spiritu anxio, ut cum anhelitus sunt subsequen-
tes & sit mediocriter illuminatus. Verumtamen si est spiri-
tus anxius & uidetur infirmo, quod suffocetur, sit magis illu-
minatus, & sit redolens odore remisso nō inteso, sit eius som-
nus cōiter septem uel octo horarum & magis nocturnus, ue-
rum etiam in die dormire potest, sed non incipiat dormire
nisi saltem distanter à cibo per unā horam cum dimidio. Et
dormiat non reuolutus, sed quasi sedens, & in situ secundum
quē minus à dolore molestat, uerū iacere super latum agrū
magis adiuuat ad spūendum. Sit eius corpus magis inanitū,
quā plēnū, unde sollicite euacuet omnes superfluitates cat-
tarhales per os, nares, & sit sollicitus ad tulsindū, spūendū,
& non parcat dolori, habeatq; pro posse bis in die beneficiū
uentris, ante prandium & coenam, naturaliter aut medici-
nali auxilio cum clysterib. uel suppositorio, uerū si solum as-
felleret in die semel sufficere, similiter urinam nō retineat, nec
sudorem stringat natura inuitante, quiescat, nō exercitetur,
uerū friciones suas à pectore infra supplēt uicem exerci-
titi & diuertunt ad inferiora, fiant ergo aliquādo stomacho
ieiuno, nisi senferit se debilitari, parum loquatur, & uoce sub-
missa. Sit gaudens sperans, sollicitudinem, timorem, tristiti-
am, gaudium magnum, uerecundiam, & omnes animi pas-

siones excedentes enitet. In diātando ad quatuor respiciē-
dum est, scilicet ad morbum, causam eius, accidentia ipsius, eiusq;
distantiam à statu, aut propinquitatem, secundo ad fortitudi-
nem uel debilitatem aegri, tertio ad eius consuetudinē, quar-
to ad ipsius repletionem, & inanitionem. Quanto enim mor-
bus est interior & accidentia seueriora & statui propinquior
competit magis tenuis diēta.

Causa uero morbi magis indicat de qualitate diētae quā
de quantitate. Fortitudo uirtutis indicat minus de cibo ex-
hibendum esse, licet plus pro uice. E contrario uirtutis debi-
litas, consuetudo indicat tam quantitatem cōtinuam, quā
discretam cibi, iuxta aphorismū 17. primae particulae, & sub
his duobus etiam aetas & cetera intelliguntur: frequentius
enim pueris & decrepitis exhibendum est. Iuuenibus plus
pro uice sed rarius, senibus primis minus, & rarius, quā
ceteris. Repletio etiam multum esse attenuandum indicat,
contra uero inanitio &c.

Sed pone quod sit pleures cholerica uel sanguinea, medio-
cris intentionis, cuius status debeat esse in septima, secundū
quod & plurimū euenit, in corpore mediocri fortitudinis
mediocriter repleto, aetatis à 19. usque ad 70. in prima die na-
turali nihil debet comedere, sed solum bibere aquam hordea-
ceam, uel aquam facc. solum, aut cum iuleb aut syr. uiol. ita
ut aqua sit tripla aut quadrupla ad iulep, quae sit facta secun-
dum artem, ut accipiat hordei bene conditionati, mundi à
cortice exteriori, quod prius fricetur cum panno asperso ue-
hementer pars una, aquae bene conditionatae partes uiginti,
decoquatur lento igne sine fumo ad consumptionem medie-
tatis aut duarum partium auferendo spumam. Hic enim est
potus medicinalis abstergens, lauans, sputum facilitans, uen-
trem lubricans, oppilationes aperiens & urinam prouocans.
Si uero uelimus ut sit potus tantum, fricetur primo fortiter
& excludantur cortices intrinseci & bulliat una pars eius
cum octo partibus, scilicet aequa una bullitione, & proiciat
aqua illa, deinde pone super ipsum aquae calidae lib. 20. & de-
coque cum facilitate usque ad lib. 10. Sitim enim & etiam
asperitatem sedat, inflammationem extinguit, pectus & pul-
monem & guttur lenit, uentrem lubricum facit, praecordia
humectat, & sputum facit, haec secunda magis cōpetit ubi
esset pectoris asperitas & siccitas, inflammatio maior, de ali-
qua ergo istarum, quae magis facit ad propositum, bibat ut lu-
pra, aut sola, aut cum iulep, aqua uero sacch. sit ut accipiat
3. i. sacch. optimi, & 20. aquae decoquatur ad cōsumptionem
tertia partis, aut medietatis. Secunda uero die comedat
psitanam hord. factam scilicet aut ex farina hordeacea debi-
te cocta cum aqua, aut secundum Mesue, ut haec aqua ulti-
ma descripta per ulteriorem decoctionem refundendo ad-
huc parum post parum circa decem partes aquae inspissetur
aliquantulum quousq; habeat mediocritatem inter spissum &
liquidum, & est cibus laudabilis hoc in proposito, de qua su-
mat in prandio & coena. Tertia etiam die comedat hanc
psitanam altero ipsorum modorū factam, scilicet in brodio
pulli parui. Et similiter in die quarta & quinta. Die uero sex-
ta & septima in quibus est status aegritudinis & accidentia se-
uissima, iterum redeat ad psitanam primam factam in aqua
& non in brodio, cui potest addere modicum sacch. optimi
ad libitum. Die uero octaua & nona cum incipit declinatio
redeat ad psitanam in brodio pulli cum sacch. sed pullus sit
maior. Decima & undecima adhuc pullus sit maior & sumat
psitanam cum pluri saccharo. Sequentibus uero diebus po-
test dare psitanam cum pulpis pulli contusi cum saccharo us-
que ad 14. & post 14. iam fere totaliter declinante aegritudi-
ne incipiat comedere praeter ferculum primo de extremita-
tibus pulli. Deinde ulterioribus diebus ex partibus maioris
nutrimenti, & incipiat bibere parum uini aquosi cum aqua
sacch. & tandem de uino dulci cum aqua praedicta. Sed nun-
quam bibat uinum nisi cū aegritudo fere totaliter declinaue-
rit, & praecipue dulce, sed solum aquam, de qua in princi-
pio. Sed uolentibus psitanam detur temporibus propor-
tionatis amygd. aut lac seminum communium frigid. cum
brodio pulli aut panatella, ita ut panis sit quinquies lor-
tus cum aqua calid. quamuis Galen. prohibuerit dari pa-
nem & fermentatum & non fermentatum, sed corriga-
tur lauando cum aqua calida, ut supra. Aut detur bro-
dium

dium consummatum abiiciendo partes unctuosas cum saccharo, aut sine saccharo. Aut cucurbita in brodio pulli, aut aliquid ex maluis, blitis, & spinachis. Similiter auicula parua in declinatione, ut supra de pullo, & similiter pisces parui petrosi iam declinante aegritudine & oua sorbilia concedi possunt: poma autem cocta conceduntur in fine mensæ, & gratia dulcia. Ex confectiōibus conuenientibus in declinatione est marzapanis ex amygd. saccharum & aqua uiol. & piper præparatæ confectæ, & passulæ transmarinæ. Et secundum maiorem distantiam status post secundam diem est in crassanda dicta, ut puta si debeat esse status in 14. in tertia die debemus dare contulum pulli cum prafana, & sic continua bibimus usque ad undecimum diem, deinde usque ad quatuordecimum, demus prafanam solam, postea declinante aegritudine redibimus ad prafanam mixtam cum pullo contulo, ut supra. Si uero materia fuerit phlegmatica, uel melancholica, & status sit eque propinquus cum suprascriptis in crassabimus & subtili libimus ut ante, sed faciemus diuersitatem in qualitate ciborum. Nam in prima die dabimus potum solum, scilicet aquam mellis pauci aut multi mellis secundum maiorem aut minorem caliditatem, quæ sit secundum hunc modum. R. mellis clari lib. 1. aquæ cisternæ lib. 9. bulliant simul ad lentum ignem sine fumo ad consumptionem tertiæ partis & despumetur optime & coletur, aliquando accipimus partem unam mellis, & decem uel duodecim aquæ secundum maiorem aut minorem inflammationem, & est magis delectabilis. Ex cibis conuenientibus est brodium cicerum, aut prafana cocta in brodio cicerum, aut in brodio caulium, aut in brodio buglossæ, & boraginis, si materia fuerit melancholica, & kist ipsorum cicerum, quæ omnia possunt fieri cum brodio pulli aut sine, secundum exigentiam temporum ipsius pleuresis, deinde deueniendum declinante aegritudine ad contulum pulli & pisces & uinum, & cætera ut supra, licet secundum plurimum audacius possemus in crassare in pleuresi phlegmat. & melanchol. cum secundum plurimum status sit distantior à principio, quam in sanguinea aut cholerica, & in his passulæ & piper præparatæ magis conueniunt. Et hæc dicta est regularis atamen aliquando compellimur irregulariter dare uinum & contulum in statu quando uirtus dissoluitur & deficit. Attende tamen, quod pueri frequenter sunt cibandi à decimo anno & infra. Et teneas à septuagesimo supra oportet cibare frequentius, & præcipue infantes & tanto pluries quanto sunt animosiores & habentes plus de caliditate, & similiter decrepitos cum non possint multum cibum digerere una uice. Dabimus ergo infantibus quater in die naturali, decrepitis ut plurimum. Similiter si pleureticus fuerit à principio supra modum repletus stabimus cõtentis solo potu duobus diebus & si multum fuerit inanitus à principio, statim incipiemus à prafana hor. Si autem resolutio non fuerit possibilis, imò tendit ad hoc ut suppuretur, quod maxime signatur ex eo quod non mundificatur in quatuordecim diebus, imò crescent accidentia cum deberent minui, scilicet dolor feb. difficultas & constrictio anhelitus, tussis, tunc attente consyderemus an cum prædictis accidentibus, etiam auctis stet fortitudo uirtutis an non. Si primum expecta suppurationem, si secundum mortem. Ars uero producendi ad suppurationem, & ex suppuratione ad sanitatem sex exigit intentiones curatiuas.

Prima quidem est apostem. maturatio: secunda ruptura eius: tertia absterio & mundificatio: quarta incarnatio, & tãdem sigillatio: quinta correctio accidentium: sexta regulatio uirt. Intentionem primam complent res calefacientes temperate & communiter humectantes cum uiscositate quadam prohibente, scilicet fortem resolutionem ne separetur humidum à sicco, sed remaneat sicco permixtum, ut sit æqualitas in toto & eueniat æqualis maturatio per totum, & hoc inter resolutiua priuata uiscositate ne fiat retentio materiæ. Imò fiat eius resolutio per partem post partem & attinet magis caliditati & siccitati, quam humiditati. Mollificatiua autem attinet magis hum. quam aliqua istarum & minus calid. nec est inuiscitatiua, imò pororum dilatatiua, propter enim ad hoc, ut humor cum æqualitate resoluitur, & quod non remaneant partes terrestres in fine, & maturationum quædam ad-

ministrantur interius, quædam exterius. De interius applicatis temperate maturantibus est aqua decoctionis ficum sic. aut dacl. aut utrorumq; aut aqua decoctionis ficum sic. passularum, fœnugræci cum aqua & uino cocto aut sine eo. Et possunt addi semina maluauisci & malua. Et si fortiori opus est, ut in materia phlegmatica crassa, addantur radices lilii in decoctione, &c. Si uero materia in caliditate excedat accipiantur semen malua, cyton. uiol. hordei, & coquantur in aqua sufficienti cum saccharo, & addatur etiam semen maluauisci & lini si amplius maturare necesse fuerit. Possunt etiam fieri ex suprascriptis, aut aliis mixtis cum his trochif. loch. electaria calid. aut frig. secundum necessitatem cum mucil. seminis lini, aut sem. malua, aut seminis maluauisci, aut cyton. & exhiberi cum syrupo uiol. aut aliqua decoctione delectabili & ex his teneat aliqua in ore, gargarizet & bibat & sumat actu calid. Ex maturantibus aut extrinsecis quædam sunt embrocationes ex decoctione maluauisci, althææ, fœnug. sem. lini, & similibus. Et administretur potius cum filtro quàm cum spongiis. Et cum sedare dolorem oportuerit addantur aliqua ex anodinis aliquid resoluētia, sicut parietaria, melilotum & anethum. Et si fortius maturare uolueris radices ireos & ex mucilagine suprascriptorum cum adipe gallinæ & anatis possunt fieri unguenta. Et diachilon cum mucilaginibus est efficax, & possunt fieri emplastra, & sunt efficacia ualde cum maluauisco, farinis ad hoc propriis, pinguedinibus, oleis, & cæteris quæ in emplastris maturatiuis poni consueuerunt. Et ex fortibus ualde cõuenientibus in materia phlegmatica aut melanch. sunt folia caulium in emplastro addita. Et adhuc fortius radices ireos aut aliquid de galbano dissoluto in rob. Et adhuc fortius si addatur aliquid ex fimo columbino, imò hæc sunt causa ut materia ad cutem quandoque trahatur, sed incipiendum semper à leuioribus, habendum respectum ad qualitatem materiæ & accidentia, & gradatim ascendendo. & cum perficitur hæc prima intentio quiescat in aere temperato declinante ad calid. Et sint eius cibi maturantes sicut ferculum ex malua, blito, siue ficula, atriplice cum oleo amygd. & ius cicerum abiecta prima aqua, & kist, & brodium frumenti, & ius caulium, & in secunda mensa ficus sic. passulæ sine interioribus, daclili, poma dulcia elixa. Secunda intentio perficitur, aut cum medicinis ad hoc propriis, aut cum motibus partium apostematata conuassantibus aut extendentibus. Ad quam intentionem non est perueniendum nisi præcedente maturazione & iam exiturato apostemate, quod signatur ex remissione doloris & feb. & multiplicatione grauedinis in loco collectionis. Medicinæ autem sint calidæ lenientes, subtiliantes, sicut secundum Mesue syrupsus de hyssopo, de prafio, & eius efficacior est syrupsus herbæ bendeleur cum melle, aut decoctio eius sumpta cum modico fermenti secum desuperati & cocti, & fortius est suc. eius cum fermento & melle. Et fortius eis est si addatur modicum baurach, & proprie cum natura est fortior & feb. est remissa. Et in hoc casu laudat Auic. theriacam & mithridatum ad erumpendum cum conseruatione caloris innati. Exterius autem applicetur emplastrum factum ex bendeleur cum butyro, adipe antiquo & melle, & adhuc fortius si addatur fermentum & fimo columbinus. Et fortius si addatur baurach. Emplastrum etiam factum ex radice maluauisci, ireos receti, simul coctis & præparatis cum asungia ueteri & far. fœnugræci, & sem. lini, & oleo liliorum alborum, est ad hoc efficax & do mesticum satis. Et addatur fermentum & fimo columbinus & baurach si oportuerit. Motus autem ad hoc cõuenientes sunt tussis fortis, uomitus uolentus, & iacere super latus ægrum & subito se ad sanum uolere, uel econtra. Et in hac hora sint cibi eius sorbitiones fermentatæ cum melle & prafana ex farina frumeti & panis bene fermentatus, passulæ & ficus sicca, grana pini cum ficibus & amygd. & daclili sunt proprii. Et si cum his, quæ dicta sunt, apostema non rumpitur, opus est, ut aperiatur cum ferro, aut cum cauterio, sed quia difficile est inuenire locum saniei cum ferro perforando, aut cum cauterio nisi aliquis tumor aut qualitas mutata appareat exterius. Præstantius est, ut à tali operatione abstineas, nisi locus saniei per aliquod huiusmodi tibi manifestetur, & in casu etiã quo manifestetur tutius est primo cauterizare cum cauterio potèntiali usque ad costas aut propè, ita

ut cauterizatio sit satis magna & incidens secundum incesum costarum. Deinde cum phlebotomia perforare usque ad locū saniei. Et si cum phlebotomia prima uice non inueniatur, iterum perforetur secunda uice & tertia in loco cauterizato imo in distinctis locis loci cauterizati donec inueniatur illud enim ferè sine dolore fieri poterit iam loco mortificato, ut supra. Debet enim in hac operatione paulatim incidere ne cū phlebot. penetret interius & sanies in pectore colligatur & fiat empyema. Et propterea huiusmodi operatio nō est multum tardanda ne interius fiat eruptio. Et forte ad hanc operationem conuenientius est pilum paruum ut sanies paulatim extrahatur iuxta canon. ne uirtus deficiat, & consideretur qualitas saniei. Si enim equalis alba cum paruo foetore fuerit, cum bona tolerantia, bene sperandum est. Si uero contrarium, malum. Et procedendum est ægrum reficiendo secundum quod oportet & quantum oportet cum uino, ferculis, carnis laudabilibus, & huiusmodi. Qualiter autem hoc uulnus factum sit, tractandum uideatur cap. de empyemate. Tertiam rem complent abstergentia, lauanda, & mundificantia, hoc prius diligenter inuestigato quod quandoq; sanies expellitur per pulmonem cū tufci, & aliquando ingreditur uenam magnam resudando tandem ad hepar. Et quandoque expellitur ad renes. Quandoque per concauum hepatis trāsit ad intestina. quæ omnia sensus manifeste distinguit. Aliquādo in uacuitate pectoris colligitur, & ibidē diu retenta perducit ad malas ægrotudines. Nisi enim mūdificetur in 14. diebus perducit ad phthisim, ex mundificantibus autem per os & tandem per uiam pulmonis sunt aqua sacca, aqua hordeacea, aqua mellis, syrupus de liquiritia, de hyssopo, oxymel simplex & tandem decoctio radicum lilii coelestis cum suprascriptis & syr. loch de caulibus & loch de scilla, & plurima in althmate conferentia. Exterius autem applicetur quæ resoluant insensibiliter materiam in pectore contentam, & cum hac adiuuent ad sputum, sicut decoctione halassæ, idest, thimi hyssopi, & ireos, quibus posset addi lignum balsami, spica, & acorus, huic idest, aristolochiæ rotundæ, quæ decoctio debite calida administraretur cum spongiis in ipsa infusus & optime expressis super loco cōgregationis saniei & post eorum applicationem ter uel quater exiccetur locus cū panis calido. Et ungatur locus cum oleo de liliis, de spica, de anetho, de alchanna, de cypero, & fortius est oleum de ireos de balsamo, de quibus omnibus si queratur maior resolutio & exiccatio addatur sulphur & asphaltum, idest bitumen iudaicum, & aggregentur cum melle, & adiuuet ad penetrationem, aut prius iungatur oximelle, & proprie scillitico & de super aspergatur pulvis factus est suprascriptis, his autem arfenicum, idest auripigmentum, si opus est fortiori resolutione addi potest.

Si uero appareat materia ad uias urinæ deriuari, adiuuetur cum decoctione radicum apii, sparagi, foeniculi, sem. cōmuniibus alchechengi. Item cum brodio cicerum & similibus urinam prouocantibus. Si uero ad intestina deriuetur, adiuuetur cum medulla carthami, casia, manna, & huiusmodi cum clysteribus trahentibus ad intestina mundificantibus sicut decoctione agarici, carthami, hyssopi, aristolochiæ cum debita mellis quantitate & huiusmodi. Sunt tamen quedam quæ sumpta per os adiuuant expulsionem per omnes uias suprascriptas, sicut ius galli antiqui iuxta doctrinam Mesue capite proprio de iure gallorum & gallinarum. Item aqua mellis, liquiritiæ, hyssopi, capil. ueneris diuisim & coniunctim. Item casia, manna, & cætera. Et ex medicinis magis administrandis cum morbis chronicatur sunt mitridatum, theriaca athanasia, quæ per omnes adiuuant uias, medicinis autem ex tremis sicut de piperibus, de arsenico, & sulphure & similibus, non est utendum nisi cum cætera non contulerint, incipiendo à dosi pauca & minori, quæ ab authoribus scripta sit, præcipuè à Mesue in capite de althmate, & gradatim ascendendo seruatis canonibus ab eodem scriptis in capite proprio de pleuresi, & de althmate, sed his non est utendum nisi cum in pulmone & pectore est superflua humiditas non corrigibilis per suprascripta, & feb. est remissa & uirtus constans & prius suffumigiis utendum est, sicut si ex arsenico & sulphure & croco fiant formæ similes auellanis cum adipe reum capræ, & ex una earum posita super prunis recipiatur

fumus per os. Si autem aliquid horum oportuerit dari per os, detur drach. s. sulphuris cum ouo forbilis, aut detur diaphuris descriptione Mesue tantundem cum aqua mellis semel aut pluries secundum exigentiam, & siquid nocementi acciderit ex exiccatione aut calefactione corrige cum contrariis secundum canon. Mesue. Cibi eorum sunt ius cicerū ius caulium, farina hordei, ius galli antiqui. Condiunturq; cibaria sua cum saccharo aut melli, aut oleo amygdulicium, & nisi febris obstet aromaticetur cum pipere, sed declinante materia ad intestina dentur, quæ uentrem laxant sicut malua blata, atriplices & betonica, quæ dicitur & leureng, uel leuloga. Declinate uero materia ad uias renum sparagi, baucia, idest, pastinaca, & in secunda mensa dactyli, passulæ, pinæ præparatæ, amygdalæ, nec non poma dulcia, similiter cytonia declinante materia ad uias urinæ. Potus autem sit uinum dulce, aqua mellis, aqua sacca, aqua hordei, & uinum de passulis, uinum alchefures, &c. Si autem materia in concauitate pectoris colligatur ad nullam partem declinans, oportet ut perforetur aut cum cauterio actuali uel potenciali, & si nullus tumor appareat communiter fiat apertio inter quartam & quintam costam distanter à spondilibus per quatuor & septem digitos in latere in quo per signa comprehenditur saniem fuisse collectam & paulatim sanies extrahatur, & locus mūdificetur, ita ut si opus fuerit iniiciatur aqua aut uinum, mellilotum cum cathair, idest, stringa, & tandem curetur, ut infra in capite de empyemate. Quartam rem complent medicinæ incarnantes tam interius quàm exterius applicitæ, sed aliquando oportet uti incarnantibus, aliquando redire ad mundificantia secundum quod necessitas exposulat, aliquando simul miscere ex conuenientibus lac asinæ, capræ, uaccinum, & pecudinum plus incarnat, quàm caprinum aut asinum, & generaliter lac pluris casei & minoris serositatis est magis incarnatiuum, & contra magis mundificatiuum, aqua hordei decoct. cancerorum fluuiatium secundum artē præparatorum sac. ros. bolum armen. secundum omniem modum administrationis, & multæ aliæ medicinæ, quæ reperiuntur incapite de sputo sanguinis aut phthisi. Cibi autem complentes quartam intentionem sunt aues parue degentes in arboribus, pedes & partes uiscose uitulorum, porcorum, & huiusmodi, & ex ferculis conueniunt tri. pannicum, hor. frumentum kist fabarum, ptisana ex farina frumenti, amyllum, & hordeum rizi, & lac coctum, & fercula quæ cum lacte sunt. Caseus recens nō salutus aut pauci salis, potus autem sit uinum modicoriter stipticum aut uinū dulce, aqua calibea, aut aqua fluuiatilis infusio gummi Arabici, & rob myrtinum & syru. eius, &c. Quintam rem complent auxilia sedantia accidentia superuenientia totius curæ processu, quæ sunt dolor feb. tussis uel hemens restrictio anhelitus, angustia, sitis, uigilia, abominatio cibi, quæ tēpore maturationis suspecta sunt sed maturata materia suspecta sunt magis post eruptionē aut diu remanentia mortalia & præcipue dolor, feb. restrictio anhelitus angustia, solēt enim hæc accidentia iuxta doctrinā Hipp. maturato apostemate remitti & ipso erupto ad huc magis remitti saltē post primā & secundā diē, demū sicut materia paulatim mundificatur, ita in dies paulatim emittitur. Si ergo contrariū horum acciderit, quid aliud assignare possunt nisi morbi summā malignitatē & profundā corruptionē, præcipue si sanies quæ egreditur sit foetens, mali coloris & substantiæ. Verū sunt aliqua accidentia minus suspecta sicut uigilia, sitis, appetitus defectus, quæ possunt habere alias causas quā ulceris malitiā & profundā corruptionē, quæ causæ possunt remoueri & corrigi. Sed si sequantur ulceris malitiā, aut sint cōplicata cū aliis accidentibus senioribus omnino desperandum est, hæc autē accidentia corriguntur remouendo eorum causas, quod ex propriis eorū capitulis considerādū est. Sex tamen cōplent debitū regimen sex rerū non naturalium exigentiæ. s. intentionū suprascriptarū, de quo sufficienter actū est in regimine pleuresis præsolutionē. Si autē permuetur ad putredinē, ad corruptionē quod apparet ex signis ab initio dictis, obuiandum est prohibendo causam antecedentem, ne transeat in coniunctam omni auxilio superius dicto, scilicet phlebot.

phlebotomia, euacuatione, &c. circa quas in hoc casu debemus esse audaciores cum fere certum mortis imminet periculum, & festino auxilio opus sit, & eum adiuuare, aut causa coniuncta extrahatur per sputum & resolutionem insensibilem, & in hoc casu competit oxymel simplex cum adiuuet sputum & sua acetositate corruptionem prohibeat. Si uero induretur procedendum est cum mollificantibus interius & exterius, interius autem cum saonea quæ comedatur & in ore retenta deglutatur, & cum decoctione sem. malua uisci maluz. cyton. pasul. sicum sic. & huiusmodi mollificantium ex qua aliquid post aliquid bibatur, in ore teneatur & cum ea gargarizetur. & exterius applicentur, quæ mollificant ex his quæ in apost. scilicet conferre consueuerunt præter acetum, & cum hæc sint propria membro cui applicantur, scilicet pectori, & hæc ex propriis requirantur cap. Si uero permittatur ad cancrum nulla fiducia salutis habenda est, sed cum frig. & hum. est procedendum, & cura blanditiua. Si uero permittatur ad nervos, cerebrum, cor, &c. dicta est cura, supra in correctione accidentium. Si uero permittatur ad exteriora, natura iuuanda est cum attrahentibus & tandem cura apost. extrinsecorum est procedendum. si uero ad pulmonem & phthisim procedendum est cura phthisis, si uero ad peripneumoniam tunc procedendum cura peripneumoniz, de qua infra. Sed obuiandum est omni ingenio possibili ne mutetur ad pulm. euacuando, diuertendo, etiam cum uentosis super loco pleureis applicitis cum scarificatione & sine, & similiter quando permittatur ad loca nobilia.

De peripneumonia. Cap. 69.

Peripneumonia dicitur etimologice quasi prope pulmonem, & est definitiue apostema calidum in pulmone siue hæc caliditas insit ei per causam essentialem siue accidentalem per putrefactionem aut aduersionem. Ex quo inferitur quod nodus aut glandula, aut alia huiusmodi adubelæth phlegmatica aut apost. aquosum, aut phlegmaticum molle, aut sephiros durum aut non purum, quibus non insit caliditas notabilis, nec per se, nec per accidens, esto quod sit in substantia pulmonis, non sunt peripneumoniz quapropter distincta de huiusmodi Auic. facit capita. Facit tamen cap. de bothor in pulmone, quod est pustula parua calida pulmonis, quod ratione paruitatis non appellatur peripneumoniam, licet posset dici peripneumonia parua. Generatur autem peripneumonia dupliciter per uiam paulatim factæ congestionis cum materia ex superfluitate nutrimenti. Aut ex nutrimento ipso paulatim congeritur faciens apostema, quod in dies paulatim augetur, donec notabiliter exerceat. Et hoc est secundum plurimum chronicum, aut per uiam defluxus, aut à cerebro humiditate ad pulmonem catarrhizante, aut à gutture cum synanche mutatur ad pulmonem uel ad peripneumoniam, aut à partibus pectoris cum pleureis mutatur ad peripneumoniam. Frequenter etiam fit in pulmone apostema per uiam defluxus humoribus aliunde defluentibus & in pulmone congregatis nulla ægritudine precedente. Et ex his inferitur peripneumoniam quandoque fieri incipiendo, scilicet, nulla ægritudine precedente quandoque permittendo, scilicet, ex alia ægritudine.

Causæ autem coniunctæ peripneumoniz sunt quatuor humores. Verum frequentius generatur à phlegmate, deinde ex sanguine, raro ex cholera, rarius ex melancholia. Sicut contra pleureis frequenter ex cholera, raro ex phlegmate, quod non absque ratione: cholera enim facilliter penetrat in rem densam, sicut est panniculus, & in eo retinetur, sed bene in rem phlegma sua crassitie penetrat in rem densam, sed bene in rem raram in qua sua crassitie facile retinetur. Esto enim quod cholera facile penetrat in rem raram, tamen ab ea sua subtilitate facile euaporat & resoluitur, quare, &c. Est aut duplex secundum Mesue uera & non uera, siue propria & ezebdég, id est nota: uera siue propria, ut dicit Mes. autoritate Galeni, est quæ fit ex phlegmate, cum frequentius eueniat propter causas supra scriptas, & minus mortalis. Et proportionatur superfluitati nutrimenti ipsius pulmonis, quæ phlegmatica est, licet nutrimentum sit cholericum. Quamuis quidam opinentur contrarium maxime.

Concil. differentia. 100. reprehendens Mes. dicentem su-

perfluitatem nutrimenti pulmonis esse phlegmaticam cum potius sit cholericum, debet enim proportionari nutrimento suo quod est sang. choler. Et consequenter secundum Concil. habemus dicere peripneumoniam genitam per uiam paulatim factæ congestionis esse cholicam & acutâ, quod est contra sensum. Licet concederet Concil. peripneumoniam genitam ex superfluitate accidentali ipsius pulmonis, quæ in est sibi à catarrhis descendentibus, & à uaporibus à toto ad ipsum eleuatis esse secundum plurimum phlegmaticam. Sed sequendo Mes. respondendum est superfluitatem nutrimenti esse contrariam ipsi nutrimento, sicut nutrimento ossis contrariatur medulla. Vnde quia nutrimentum pulmonis est cholericum eius superfluitas est phlegmatica. Sed contra hoc sunt multæ instantiæ, de quibus alias. Sed in summa secundum Concil. concedere habemus omnem peripneumoniam genitam per uiam paulatim factæ congestionis esse cholicam aut à sanguine acuto, sed per uiam defluxus quandoque phleg. quandoque cholicam secundum naturam humoris fluctis, licet secundum plurimum phlegmaticam propter causas supra scriptas. Sed secundum Mes. si per uiam paulatim factæ congestionis generetur, ex nutrimento esse semper cholicam aut sang. si autem ex superfluitate nutrimenti, esse semper phlegmaticam: si uero per uiam defluxus quandoque phlegmaticam quandoque cholicam.

Signa quædam significant genus ægritudinis, scilicet ipsam peripneumoniam eam ab aliis dispositionibus distinguere, quædam causas eius, quædam quod salubris sit aut mortalis, quædam tempora eius, quædam modos terminationis, quædam longitudinem & breuitatem, &c. Terminatur autem quinque modis, ut supra de pleurefi. Aut enim resoluit uel in sensibilibiter uel sensibilibiter cum eius materia paulatim per sputum euacuatur, aut induratur, aut permittatur, uel ad caput, uel ad nervos, uel ad pectus, & transit in pleur. uel ad exituras manifestas, aut eius materia per urinam, aut etiam flux. uen. euacuatur, aut maturatur, aut putrefit, ut superius in pleurefi. &c.

Significant peripneumoniam ipsam feb. acuta, & cæteris paribus acutior quam in pleurefi propter cordis propinquitatem: maior tamen aut minor secundum causam facientem ipsam. Constrictio anhelitus uehemens & maior quàm in pleurefi. Altus tamen uelox & frequens est anhelitus secundum feb. magnitudinem, & est cum magna necessitate euentandi ita ut arbitretur se ex proximo suffocari. Et quandoque infirmus coactus erigitur & stat erectus secundum eam positionem, quæ orthopnea uocatur, & multoties non potest bibere & non nisi male loqui. Dolor extensius & grauatiuus, non punctitiuus, sicut in pleurefi, & est dolor extensius in pectore toto, licet magis in ea parte in qua est apostema, procedens ex profundo ad partem thoracis, & ad dorsum secundum incessum mediastini, & panniculi tegentis pulmonem, pulsus secundum plurimum undosus & diuersus multum, frequentior & rarior secundum necessitatem. Hæc diuersitas pronit propter uehementem pugnam naturæ contra morbum, & e contrario non tamen semper est undosus, ut puta in peripneumonia choler. aut melanch. Nec potest dormire super dorsum, nec super latera, nec super faciem, sed oportet ut dormiat sedens, licet secundum plurimum minus molesteretur dormiendo super dorsum, quàm super latera. Et coloratur lingua secundum naturam calidi apostematis, licet secundum plurimum sit inuiscata & adhæreat ei digitus tangentis, & propter multitudinem uaporum ascendentium ad superiora quandoque increpatur collum ut appareat, sicut uenter plenus uento, ut uidi. Et propter hanc causam rubefiunt maxillæ, ut uideantur tinctæ. Et secundum plurimum apparet plenitudo & extensio in tota facie & collo, & oculi rubefiunt & tumescunt ut uideantur apostemari. Tussis in principio sicca sine screatu, sed procedente ægritudine cum screatu pluri aut pauciori secundum quantitatem materiæ & eius digestionem, & uirtutis fortitudinem. Urina ruffa aut subruffa, spumosa, liquida secundum plurimum. Et quandoque subigalis, & hic screatus est frequenter spumolus propter conclusionem aeris respirati sub humiditate quæ expellitur & propter uaporum multitudinem. Aliquando aduenit subeth materia existente phlegmatica aut sang. cum multa uapora-

tione

tione. Aliquando farra in materia cholerica. Signa causarum facile elici possunt ex his, quæ dicta sunt in signis causarum pleurefis.

Signa salutis & mortis etiã sumuntur ex his, quæ dicta sũt in pleuresi. Fluxus tamen sang. uar. nõ est adeo efficax signũ in significatio salutẽ peripneumoniz sicut pleuresis, propter diuersitatem materiæ, quæ est crassior in peripneumonia, unde eius crisis aprior e p inferiora, scilicet per anũ uel matri- cẽ, & quia non est tanta colligantia pulmonis cũ uenis nariũ sicut pectoris, ut ex anatomia patet. Et propterea fluxus mẽ- struorũ, aut sang. hemorrhoidalis, aut crisis per urinã, aut per fluxũ uentris est cõmuniter signum bonũ in peripneumonia plus quã in pleuresi: hoc tamen diligenter attende quod peripneumonia secundum plurimũ est mortalis, pleuresis uero econtra secundum plurimũ est salubris. Signa terminatio- nis facilius habentur ex his, quæ in pleuresi dicta sunt, uerũ si conuertitur ad pleuresim, alleuiatur anhelitus constrictio, & fit in pectore dolor pungitiuus, & est terminatio salubris secundum plurimũ. Signa longitudinis & breuitatis sumũ- tur ex dictis in pleuresi, sed frequentius reperitur peripneu- monia longior, quã pleuresis cũ cõiter pendeat ab humore crassiori, quã pleuresis. Cũ prolongatur peripneumonia per- ducit ad tumorẽ pedũ & hydropẽ frequenter propter nocu- mentũ hepatis coicatum. Signa etiã temporũ proportionabi- lia dicta sunt in pleuresi. Accidit in pulmone apostema durũ nullo modo cal. nec per se, nec per accidens saltẽ caliditate notabili, quod est uel phlegmaticum, sicut dubeleth, scilicet nodi aut glandulæ, aut melancholicum, cuius signum est con- strictio anhelitus, quæ in dies augetur secundum apostema- tis augmentum tussis frequens sic. & calor paucitas, & gra- uitas senfata, constrictio anhelitus qui quãdoque alleuiatur, deinde redit. Et quandoque accidit apostema molle phleg- maticum in pulmone, cuius signum est constrictio anhelitus, salua plurima, humiditas mulca in lingua & partibus oris, le- nitas pectoris, paucitas caliditatis, liuiditas faciei tendens ad colorem plumbeũ. Et quandoque accidit in pulmone bo- thor, idest pustula parua calida differens à peripneum. sicut paruum à magno, licet ratione suæ qualitatis sit apta facere accidentia peripneumoniz, de quibus supra. Attamen ratio- ne paruitatis suæ non facit ea neque meretur nomen perip- neumoniz, licet possit dici peripneumonia parua. Signa cuius sunt grauitas non multa, constrictio aliquis anhelitus cum uelocitate & frequentia, caliditas in pectore senfata & inflammatio corporis absque feb. notabiliter sensibili, est enim neutralitas aut feb. parua, ita ut totum corpus non cale- fiat notabiliter, licet partes propinquiores apostemati am- plius calefiant. Et quãdoque congregatur in pulmone aquo- sitas siue apostemans, siue non, quæ quia non est cum calidi- tate notabili non meretur dici peripneumonia, cuius signa sunt commotio de latere in latus.

Cum enim infirmus se resoluit de latere ad latus sentitur ab infirmo, & forte auditur à circumstantibus sonitus aquæ commotæ, feb. leuis aliqua caliditate putredinali in ea accen- sa, constrictio anhelitus, sputum subtile aquosum, color fa- cie albus, liuidus cum apostemate undimiali extremitatum, & breuiter est ut dispositio hydropica, de qua posset esse du- bium quomodo ibi congregata sit, an per uiam defluxus, an per uiam paulatim factæ congestio, &c. Est præterea du- bium cum sit multæ quantitatis & fluxibilis ualde sicut aqua, & in meatibus tracheæ arteriæ, & spongiositatibus pulmo- nis contenta, quomodo non subito suffocet patientem, pene- trando ad partes angustas, & prohibendo transitũ aeris ad cor ad quod pro nunc dicendum pulmonem esse diuisum in duas medietates, scilicet dextram & sinistram mediante mediasti- no diuidete pectus per medium, potest ergo aqua in una me- dietate contineri, & per alteram fieri inspirationem & ex- pirationem, sed de his satis pro nunc.

Accidit apostema in canna pulmonis, quod quandoque ulceratur, cuius signa sunt feb. remissa cum materia in ea par- te collecta, quæ ex natura morbi non posset esse multa, dol- or & pulsatio dorsi ex directo spondilium à. 12. spondili su- pra, & à. 5. infra, quia in ea parte canna pulmonis situatur, quæ sensibilis est mediãte pinniculo, quo regitur pruritus in cor- pore propter uapores dispersos per corpus.

Aliter pruritus in constrictione narium, & naribus ipsis propter ipsorum propinquitatem ad cannam pulmonis, & raucedo uocis, causa nota est, & sputum paucum, quia mem- brum est densum in quo non nisi pauca materia sputabilis po- rest contineri. Et si ulceratur, est odor oris foetidus, & repræ- sentatur in ore sicut odor piscium.

Prognostica, peripneumonia ut plurimum est mortalis, omnis peripneumonia cholerica est mortalis, peripneumo- nia facta ex synachia aut pleuresi est mortalis secundum plu- rimũ, quia aut interficit in spatio. 7. dierum, aut efficiuntur empyeci & tandem phthisici iuxta aphor. &c. licet ut pluri- mum si transierit. 7. est salubris, sed tamen rarissime transeũt. 7. peripneumonia diuturna perducit tandem ad nocumentũ hepatis, ita ut erret eius digestiua, & tumescunt pedes & cru- ra & interdum uenter. A pleuritide aut peripneumonia ha- bito, diarrhoea superueniens malum.

Cum homini superuenierit feb. & in anhelitu tantam patitur constrictiõem, ut se præfocari putet: & in maxillis ita uehemens sit rubedo, ut tincta uideantur & anterior pars pectoris dolet, & tussis adest, & quod cum screatione emittitur, existit spumofum, & in pectore sentitur grauitas sine punctiõne, sine calore, cui omnia hæc ac- cidunt, acutum in pulmone patitur apostema: & uocatur hæc passio peripneumonia. in principio igitur curationis eius basilica est minuenda: deinde æger ex his, quibus medicatur pleuresis, est curandus.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima ponit si- gna. In secunda ibi. In principio ponit curam. In prima par- te ponit sex signa, febrem scilicet continuam, constrictiõem anhelitus maximam, maxillarum notabilem rubedinem, ua- poribus petentibus superiora, tussim frequentem, screationem spumofum propter magnam ebullitionem subtiliantem ma- teriam, & conuertentem ipsam in uapores, qui retenti sub materia uiscosa eleuant ipsam in diuersis partibus facienti- bus ampullas. Ad quod adiuvat aeris respiratio per loca an- gustata, cuius pars sub materia illa retinetur faciens ampullas, in pectore sentitur grauitas & extensio sine punctiõne, & si- ne alia specie doloris, quia pulmo non sentit nisi per pannicu- lum inuoluentem, per quem apostemata existente in sub- stantia pulmonis non sentitur nisi extensio, & per panniculũ suspendentem, scilicet mediastinum per quem non sentitur nisi dolor grauatiuus, & per eandem causam non sentitur ca- lor in parte apostemata. Si autem materia communicaretur alteri istorum panniculorum sentitur dolor pungitiuus, & calor: quæ dicit in secunda parte nota sunt.

Cura peripneumoniz similis est curæ pleurefis quo ad om- nes intenciones curatiuas dictas in capitulo de pleuresi, quas omnes huic cap. peripneumoniz accomoda secundum exi- gentiam ipsius terminationis, similiter eadem antidota sunt utrique communia, oportet tamen ut medicinae exterius ap- plicentur, iuxta sententiam Aui. sint magis profundantes in pe- ripneumonia, cum sit à cute distatior quàm pleuresis ad qua- rum profundationem duo iuuant: una est forma medicinarũ, nã uirtus emplastri magis profundatur, quàm uirtus unguen- ti, & uirtus embrocæ quàm fomenti. Secundum, in medi- cinis peripneumoniz ponatur aliquid acutarem habens sub- tilium partium sicut modicum aceti acuti, sit enim ita modi- cum, ut penetrare faciat & sputum nõ prohibeat, neque pro- hibeat permutationẽ peripneumoniz ad pleuresim. Et oportet ut sit maior sollicitudo ad mundificandum cũ sputo, quod ualde difficilius est, quàm in pleuresi non propter loci distan- tiam, sed propter nocumeuti magnitudinem ad materiã ino- bedientiam. At quod iuuat statio super loco infirmo. Tercio, ut cũ auxiliis nostris magis intendamus euacuare & diuer- tere ad inferiora, quàm in pleuresi. Et propterea prouoca- tio hemorrhoidarum ac mestrurorum est utilissima & ulti- ma in peripneumonia. Sicut fluxus sanguinis narium est ulti- mum in pleuresi. Et lãge melius est phlebotomare saphenas in peripneumonia, quàm in pleuresi, cuius causa potissima est, quia peripneumonia communiter est crassior magis pe- tens inferiora. Cura peripneumoniz cholerica, quæ al- mesir dicitur, est difficilis, est enim ægritudo peracuta pluri- mum

num occidens in. 7. uel ante, & in hac opus est pluri extinctione, quam in pleuresi à simili causa propter membri caliditatem & cordis uiciniam.

Dentur agro per os extinguentia fortia & in quantitate notabili & actu frigida, sint tamen stringentia aut compingentia, sicut aqua melonis indurata, cucurbita, mucillaginis psilii, aqua solatri, & huiusmodi, & exterius non ponantur emplastras, sed unctiones, sicut oleum uiolaceum aut epithimare, quia & si emplastra frigida sint tamen calorem reflectendo, interius calefaciunt. Et potest fieri exterius epithima cum aqua uiolacea, & modico aceti, quæritur enim maior extinctio, quam resolutio. sicut in erysipellate puro, & similiter omne regimen reliquum magis ad frigidum declinet quam in pleuresi. Cura autem & regimen reliquorum apostematum pulmonis, quæ non dicuntur peripneumoniz, cum in eis non sit caliditas notabilis, nec per se nec per accidens est similis curæ peripneumoniz. Sed ceteris paribus cum magis cali. procedere possumus, quam in peripneumonia. Si enim sit melancholica curæ cura pleuresis mela. de qua supra. Si uero phlegmatica à phleg. crasso curetur cura pleuresis phlegmat. & procedatur cum multum humid. mollificatibus, aut parum sic. remissis calefacientibus. Si uero à phlegmate subtili aquoso cum calefacientibus magis & aliquantulum exiccantibus spiritum calefacientibus spiritum facilitantibus. In omni enim huiusmodi dispositione spiritum facilitandum est, ut in crasso & uiscofo iunetur cum subtiliantibus & incipientibus. Verum aquositas in pul. congregata indiget propriis educantibus aquositate, ad quod præcipue est suc. ieros cum educat aquositate & sit medicina pul. & proprie. 3. 2. cum aqua mellis & in hac audacius procedere possumus cum cal. interius & exterius exiccantibus usque ad sulphur & asphaltum, & similia exterius applicata, & interius etiam medicamen de arsen. & sulphure, de quibus apud authores in cap. de asthma & etiam superius in curatione pleur. sufficienter actum est, ista tamen apost. multum chronicatur præter bothor, & plerumque perducunt ad malum exitum nisi diligenter curentur. Cura bothor in pulmone similis est curæ peripneumoniz aut pleuresis sanguineæ, sed propter paucitatem materiæ & paruitatem eius est facilis curationis & citæ curationis, licet ut plurimum suppurentur, propterea ipso erupto regendus est æger diligenter cura ulceris, de qua supra. in pleuresi cum terminatur per suppurationem, actum est sufficienter, ne aucto ulcere & malignato trahatur ad phthisim. Ex uariolis enim quandoque fit phthisis, ut aliquando uidetur. Et propterea minus malum est pro honore medici & utilitate agri, omnes ægritudines aliquantulum pluri periculi existimare, quam pauciores, ut & ipse diligens sit omnes præmeditatis finitros euentus, omniaq; symptomata occurrere potentia ut ipsis secundum exigentiam succurat & ne aliquando dicat non sic putabam, homo enim est præstantissimus omnium quæ sunt infra concavum orbis, lunæ, qui semel periens non amplius reuiuiscit, nisi in die nouissimo. sunt & aliz rationes quæ diligenter animaduerti possunt facile innotescere, &c. Apost. in canna pul. eodem modo curatur sicut in peripneumonia & pleuresi, de quarum cura sufficienter actum est hoc addito quod medicinz exterius applicatæ debent potius posteriore super spondilibus, & anteriore in medio pectoris ex directo partis canne apost. Secundo quia medicinz quæ per os sumuntur debent potius in ore teneri, gargarizari, & lambi quam bibi, ut ex ipsis aliquid ad cannam pulmonis transeat. Et si deglutiantur paulatim debent degluti, nam cum meri sit proximum canne pulmonis in longa mora sui incesus, & per meri melius uirtutes eorum possunt canne pulmonis communicari. Et propterea quæ deglutiuntur aliquis corpulentia & uiscofitatis esse debent ut diu in transitu morantur, licet etiam bibita & comesta uiuent, sicut etiam in peripneumonia.

De empyemate.

Cap. 70.

Empyema est collectio saniei in pectore, siue super diaphragmate in spatio inter pulmonem & pectus, aut in una medietate tantum, aut in ambabus, quamuis collectio cuiuscunque humiditatis etiam si saniosa non esset, posset largo modo empyema dici, sicut collectio aquositas ut iam uidi phlegmatis & san. &c. Huius causa multiplex est,

aut catarrhus effusus ad pulmonem, & tandem ad pectus aut materia synanches permutata ad has partes, aut apostema ruptum in pulmone, aut ulcus pulmonis, aut pleuresis quæ post maturationem rumpitur, aut saltem quæ non debite mundificatur, aut effusio sanguinis ad pectus propter uulnus extrinsecum, aut propter uenarum intrinsecarum rupturam, aut aggregatio humiditatis in pectore quæ postea sanatur, siue fuerit paulatim congesta, siue à pulmone deriuata, siue aliunde per uias occultas, potest etiam sanies per occultos meatus à multis partibus corporis ad pectus deriuari, sicut in Ioanne Boiardo. Cumq; materia in pectore colligitur terminatur uno quinque modorum. Aut enim subito præfocatur sui multitudinem, aut putrescit pulmo, & facit cadere in phthisim, & hoc im plurimum, aut mundificatur cum sputo facile succurrente, aut mundificatur ex uia uenæ magnæ & arteriæ magnæ ad uescam cum urina crassa, & est curius eius prius ex uena ad hepar, deinde ad renes. Et quandoque ad intestina cum egestione, & sunt ambæ laudabiles facientes sanitatem necessario, sicut in domino Nicolao de Bonaueris per uiam secessus, & quandoque apparent tumore in cute pectoris scinditur, & materia per foramen illud educitur.

Signa sunt feb. minuta quæ quandoque malignata materia & amplius putrefacta excrescit & augetur ualde & forte est feb. minuta quæ est hectica. Secundum calefactio extrematum, aut manum & pedum propter uapores illuc delatos. Tertium grauitas & extensio quædam in pectore præcipue in ea parte in qua sanies continetur. Quartum est tussis sicca in principio, in processu uero humida, cum materia ingreditur pulmonem & sputo educitur. Quintum rubedo maxillarum ex uaporibus ad ipsas ascendentibus. Sextum dolores circa eas partes ex mordicatione saniei, & cum incipit malignari. Septimum corpus extenuatur & extrema tumescunt, licet substantiæ exicetur debilitata amplius digestiua in extremis. Octauum anhelitus consequentes & frequentes sunt uoces eorum quod accidit propter stricturem anhelitus & laborem in anhelando. & dicit Auic. quod frequenter sunt nares eorum, id est, motus dilatationum uel dilatatiuum & contractiui narium ob eandem causam. Nonum deiectionis appetitus. imo rædem ablatis laesis enim spiritualibus, necesse est tandem naturalia laedi. Decimum tumor aliquando exterius apparet ex directo illius partis in qua sanies collecta est. Undecimum iacet & dormiunt super latere in quo collecta est sanies, & super latere opposito iacere non possunt, quia grauantur & suffocantur à sanie pulmonem comprimere, & per hæc duo signa distinguitur latus saniei. Duodecimum signum sonitus auditus, in reuolutione de latere ad latus ex puris agitatione. Et dicit Auicenna, quod quidam intingunt filum in luto rubeo in aqua dissoluto, & cum eo circumdant pectus, & ille est locus saniei in quo sit prius fili exicatio.

Signa salutis & mortis in empyemate sumuntur ab actione quidem læsa, qualitate mutata, & exeuntibus. Ab actione quidem læsa, quia cum fortificantur operationes & conualescunt sicut somnus, appetitus, digestio, pulsus, anhelitus, bonum. E contra uero malum. A qualitate mutata, quia si febris minuitur & coloris habitudo melioratur, bonum, e contra malum. Ab exeuntibus, quia facilis sputi & copiosius secundum exigentiam materiæ & laudabilis. ut quod appareat sanies laudabilis bene conditionata, bonum, e contra uero malum. Et similiter exitus saniei per urinam aut secessum copiose secundum materiæ exigentiam arguit sanitatem necessario, etiam si non sit laudabilis. Significat enim fortitudinem uirtutis, & materię obedientiam cum non possit expelli nisi resudando ad uenam chilis aut ad arteriā magnā, ut supra scriptum est. Et similiter exitus sanie laudabilis cum perforatur locus empyematis, bonum, contra uero malum. Distinguitur autē sanies ab humi. phlegmatica per odorem, saporem, colorem, modum: hæc tamen distincte scribi non possunt, sed oporteret horum notitiā longa experientia acquiri, ut agnosceretur habitus dictus gnomon. 6. ethico. Et sanies quam primū descendit in, e contra uero humiditas phlegmatica natat, nisi sit ualde crassa, & in partibus suis tenax & inuiscata, &c.

Cura empyematis magna ex parte habenda est ex his, quæ dicta sunt, præcipue de cura pleuresis per suppurationem. Est enim in cura empyematis una intentio principalis, scilicet euacuatio

euacuatio materiæ super diaphragmate contentæ, quæ per tres vias potest educi, aut enim refudat ad uenam concauam transiens per eam ad gibbum hepatis, & exeundo per alteram duarum uiarum expellitur. Si enim transit ad uenam chilis descendente exinde per emulgentes ad renes tandem ad uescicam mictu educitur. Si uero ex gibbo hepatis transeat ad cœcū, exinde per melaicas ad intestina secessu educitur. Et si per utrasque vias transierit simul mictu & secessu educitur: qui modus terminationis est laudabilis, cū quo est fiducia sanitatis, sed rarissimus. Quem modum si natura tentauerit adiuuanda est, si diminuta fuerit cum his: quæ dicta sunt in capite de curatione pleurefis, per suppurationem intentione tertia. Si uero per se suffecerit non est impedienda. Sed regenda est debito regimine sex rerum non naturalium secundum exigentiam accidentium & uirtutis tolerantiam quod ex supradictis facile elici potest. Secunda uia euacuationis huiusmodi materiæ est, ut paulatim refudat ad pulmonem & tandem per tracheam arteriam transeundo educatur: qui modus terminationis licet sit frequens, non tamē ita tutus, sicut suprascriptus, cum plerumque natura deficiat à spūto, aut ipsius imbecillitate, aut materiæ inobedientia, est enim difficilior graue ascendere quàm descendere, & plerumque materia diu transiens per pulmonem sua nitrositate ulcerando perducit ad phthysim. Hanc quoque euacuationem si natura tentauerit adiuuanda est, ut suprascriptum est in cura pleurefis per suppurationem intentione tertia. Restat tertia uia si neutram istarum non tentaret, aut non uideatur sufficiens, scilicet aperire pectus apertione penetrante interius ad locum saniei taliter, ut per foramen factum sanies pulsus educi. Super quam operationem non est præsumendum nisi duabus conditionibus seruatis. Prima ut uirtus sit constans, potens hanc operationem tolerare. Secunda, aut alicui membro nobili sicut est pulmo aut diaphragma non sit impressum nocumentum quod non uideatur corrigibile, quod plerumque ex longa mora solet euenire. Et propterea cum alia due uia euacuationis huius materiæ non uidentur sufficientes, non est tardandum usque ad quadraginta dies, in quo tempore solet esse nocumentum hoc adeo impressum ut deinceps sit male corrigibile. Sed quanto citius tanto melius, dummodo primo uisum sit neutrum aliorum adhuc sufficere nisi ubi natura per se tentaret huiusmodi materiæ expulsionem eleuando in cupum & tumorem manifestum aliquam partem pectoris, tunc enim omnino adiuuanda esset, nisi iam esset ultima uirtutis defectio. His ergo conditionibus stantibus super tali operatione audendum est. Dummodo primo ab ægro aut ab amicis suis de tali operatione rogati fuerimus nobis tamen non promittentibus salutem, imo rei dubium euentum, sed asserentibus, quod si qua est uia soiam hanc esse, quæ seruari possit. Et tunc Dei nomine inuocato est perforandum aut cum sagittella forti aut rasorio, ita ut foramen sit satis augustum, dummodo sanies per ipsum sufficienter possit educi, aut frigida existente materia, saltem radicaliter, & cum pauca feb. cum cauterio actuali aut potenciali, licet actualiale sit salubrius, quamuis magis horribile. Sed in omnem euentum foramen sit tantum ut sanies & trumbi si qui sint libere possint egredi, nec fiat uirtutis & spirituum nimia resolutio, fiatque foramen istud secundum incessum costarum, inter quartam & quintam costam mendosam, distanter à spina secundum longitudinem costarum, aliquantulum tamen citra costarum extremitates, ut puta per duos digitos uel circa penetrans interius ad locum saniei. Si autem fieret hæc operatio cum cauterio potenciali, oportet post cauterizationem perforate quod uisum est cum sagittella, adeo ut sanies libere egrediatur. Et in prima uice aliquid modicum, ut puta medius cyathus permittatur exire.

In secunda uice per duodecim horas post, cyathus unus in tertia similiter tantum uel parum plus. Et sic deinceps usque ad completam euacuationem. Inquit enim Hipp. 6. Achori. Quicumque empyeci aut hydropici aut uruntur aut inciduntur, hi fluente aqua aut sanie repente omnino pereunt. Et adiuuetur etiam ad exitum saniei si fuerit necessarium cum tussi hora mutationis, & iacendo super latus ægrum. Et quā primum sanies sufficiens exierit, claudatur uulnus, nec diu dimittatur apertum, ne fiat ab aere alteratio & caloris exha-

latio. Medicinæ autem uulneri imponendæ usque ad duos dies uel circa, sunt tentæ infusæ in oleo rosaceo, satis molles ad doloris sedationem & apostematis prohibitionem & circum circa cum oleo rosaceo est inungendum. Si uero escara fuerit ex cauterio derelicta in oleo rosaceo, uittello oui admixto est tenta infundenda, ut dolor mitigetur & procureretur casus escaræ.

Si autem timeretur ne sanies erumperet propter sui multitudinem & subtilitatem & fieret nimius eius fluxus, tutius est in albumine oui, aut albumine simul cum uittello tentam infundere, & etiam stupas in his simul infusas & exterius applicare, conueniēterque ligare donec amplius hunc repenti nū exitum nō timuerimus. Transactis duobus uel tribus diebus ad mundificationem ueniendum est.

Si ergo uideatur necessarium ad meliorem mundificationem iniciatur interius cum cathair aut alio instrumento, aqua aut uinum decoctionis mellis in quantitate notabili, ita ut mel sit sexta pars, & fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, & iniciatur debite cal. & reuoluatur de latere ad latus in modum ablutionis uegetis cum suauitate tamen, & postea permittatur exire quod immixtum est simul cum sanie, & si fuerit necessarium reiterare, reiteretur toleranter uirtute donec quod immixtum est clarum exeat. Si uero uirtus non toleret, sufficiat una immixtio donec uirtutis fortificetur, & si opus fuerit fortiori mundificatione & à putrefactione, præseruatione, iniciatur aqua aut uinum decoct. myrrhæ & lupinorum, & procedatur modo qui suprascriptus est exterius autem ponatur unguentum ex melle rosaceo terebinthina & farina hordei. Et si opus erit fortius mundificare addatur myrrha & sarcocolla, & si propter escaræ esset opus aliquanti maturacione addatur uittellum oui aut parum farinæ foenugræci & tandem incarnetur cum thure, masticæ & mumia, aut cum unguento ex ipsis factum cum terebinthina aut alio huiusmodi, & hoc post sufficientem mundificationem cum iam uulnus exiccati uisum fuerit & parum saniei emittere & tunc tentæ quotidie diminuuntur. Ultimo cicatrizetur cum puluere facte ex nucis cupressi, balauftiis, gal. thuria croco ferro aut ære uiso, primo cum uino nigro balneando in quo decocta sint aliqua stiptica huiusmodi. Et postea loco exiccato aspergendo huiusmodi pulueres, quibus etiam si opus fuerit maiori exiccacione potest addi aliquid aluminis & possent etiam in huiusmodi uino stupæ infusæ & bene expressæ desuper apponi, &c. Dieta in principio usque ad duos uel tres dies licet ratione uulneris deberet esse tenuis, tamē ratione debilitatis uirtutis propter resolutionem spirituum tum ex dolore, tum propter emanationem saniei debet aliquantulum in crassari, & ad frigidum declinare. Vnde in hoc tempore est exhibendum confusum pulli alteratum cum lacte seminum communium & suc. hordei in brodio confusum, & similia. Et uinum debet esse dulce, lymphatum nobiliter cum aqua fac. & exhibendum est de cibo bis ter aut pluries in die naturali secundum uirtutis constantiam & ægri consuetudinem. Transactis autem duobus uel tribus diebus, cum tunc sit tempus mundificationis, dentur cibi adiuuantes ad mundificationem sicut suc. hordei in optimo brodio, brodium cicerum, hordeum ipsum coctum in brodio laudabili carniū, & similia. Et carnes laudabiles, pullor, perdicū &c. Et postea adueniente tempore incarnationis & consolidationis dentur cibi magis inuiscantes, sicut spelta, frumentum tritum, & uinum rub. semper tamen aliquanti dulcedine participans, aut fiat tale cum aqua sacch. quæ aqua si oportuerit ad maiorem consolidationem possit calibeari, & tunc etiam exhibeantur carnes laudabiles pluri nutrimenti, sicut caponum, phasianorum, & tandem capreti, & castrati iuuenis, & extremitates horum animalium magis in uiscantes & tandem ad diætā sanorum paulatim perducatur. Si autem ulcus uera consolidatione consolidari non potest, imo transit ad fistulam quod quandoque accidit propter debilitatem particulæ, præcipue cum sanies longam moram ibi contraxerit, adhibenda est cura fistulæ. Impedimentum enim consolidationis potest ex duplici causa accidere, aut ex continua reagggregatione materiæ siue saniei super diaphragmate, aut per uiam paulatim cōgestionis iam digestiua debilitata, aut per uiam defluxus aliunde. Secundo ex malitia ulceris facte

In pectore, aut quia labia sunt inuversa, aut genita sit caro molli aut dura fistulosa. Si primum sit in causa, intendendum est ad confortationem membrorum spiritualium & precipue digestiua & expulsiua ipsorum & fortem exiccationem tam cum cibis, quam cum medicinis tam interius, quam exterius applicitis, quæ omnia ex his, quæ dicta sunt supra, innoscere possunt precipue ex cura aquæ in pulmone, & ex cura plenioris cum suppuratione intentione tertia. Si uero impedimentum consolidationis proueniret ex malitia ulceris pectoris iam dicta, cauterizetur totum ulcus cum ferro ignito aut auro usque ad profundum, cauendo tamen à latione pulmonis cauterizatione satis notabili, deinde casus escaræ procuretur, tandem mundificetur, incarnetur, & consolidetur, ut superius dictum fuit. Hoc semper memorando quod medicinae in his ulceribus fistularibus debet esse ualde sicca, & sicciore ceteris paribus quæ in aliis ulceribus communiter occurrentibus, & hæc de his dispositionibus satis dicta sint.

De sputo sanguinis. Cap. 71.

Quid nominis & quid rei sputi sanguis, sunt satis manifestata. Est enim sputum sanguinis, emissio sanguinis per os undecunque proueniat, propter quod sciendum quod sanguis qui spuitur aliquando descendit à cerebro, aliquando uenit ex naribus, aliquando spuitur ex partibus oris, sicut gingiuis & lingua, aliquando spuitur ex partibus gutturis, scilicet à principio meri, epiglottis, & à partibus uicinis, aliquando spuitur ex partibus meri, stomacho, & aliis membris naturalibus mediante stomacho, aliquando spuitur ex canna pulmonis, pectore & panniculis intrinsecis ipsius pectoris, omne autem illud appellatur sputum sanguinis, si per os emittatur à quocunque membro proueniat. Sputum sanguinis est duplex. Est enim quoddam impetuosum in quo est egressio multæ sanguinis. Quoddam est cum paucis impetu, & exitu pauci sanguinis. Et quodlibet istorum est duplex, quoddam est creticum, quoddam non creticum, & iterum quoddam est periodicum, & quoddam sine periodis, in quibusdam enim sanguis determinato tempore congregatus, postea expellitur, quod frequenter est à membris naturalibus, quam à spiritualibus, aut animalibus, & aliquando est illis sanitas, aut præseruatio à multis ægritudinibus. Pro notitia causarum sciendum quod sanguis aliquando egreditur à uenis & arteriis, aliquando à membrorum substantia. Sed primo modo egreditur tripliciter, aut propter apertionem orificiorum uenarum, aut propter resudationem, aut propter solutionem continuitatis in uenis & arteriis siue illæ rumpantur totaliter scilicet latum, siue in parte scindantur, aut scilicet longum, aut secundum latum. Sanguis autem egreditur propter apertionem orificiorum, aut quia orificia illa facta sunt lata in creatione sua, aut quia ex tempore dilatata sunt propter malam complexionem humi & caliditatem aut dilatantem, aut quia remota est pellicula tegens ipsa orificia, aut ab humoribus acutis corrodentibus, aut à medicinis fortiter abstergentibus & orificia uenarum aperientibus, sicut aloes & medicinae exoluentes ualde acutæ. aliquando prouenit ex debilitate contentiue sequente omnem malam complexionem, licet proprie calidæ & humidi, aliquando fit sanguinis egressio per orificia propter multitudinem ipsius aut acuitatem, aut subtilitatem, siue subtilitas sit per choleram, siue per aquositatem sanguinis permixtam, aliquando fit hoc per motum sanguinis cum magno impetu ad ipsa orificia propter fortes motus corporeos aut animales, aut propter phlebot. trahentem sanguinem impetuose ad ipsa orificia, & secundum hunc modum phlebot. sapientiarum prouocat sanguinem menstrua. Causa uero resudationis sanguinis à uenis est aut subtilitas sanguinis, undecunque prouenit aut raritas tæxturæ uenarum, huiusmodi autem causa est frequenter ebullitio & in sanguine agitatio.

Causa uero solutionis continuitatis uenarum coniuncta, est aut multitudo sanguinis extendens, aut acuitas sanguinis, aut humor corrodens uenas, aut uentositates retenta in eis scindens eas, remotionem autem est caliditas humores ebullire faciens, & retentio euacuationum consuetarum, sicut sanguis per nares menstrualis & hæmorrhoidalis, aut uarietate laqueatio, aut ulcerum antiquorum consolidatio, aut aliquid membrum abscisio quapropter superfluit nutrimentum illius membri. Causæ autem primitiæ sunt caliditas, percussio,

morbus uenarum. Aer nimis est uisus aut nimis frigidus aut nimis siccus uenam exicans, & indurans, propter quod paratur eruptioni, quod etiam potest à causis intrinsicis contingere. Cibi multiplicantes sanguinem, aut acuentes ipsum. Medicinae acutæ, corrosiue, aut à proprietate aperientes orificia sicut euphorbium, gummi, ruta agrestis, & aloes, somnus multus, retinens superfluitates & proprie super dura, aut superflua uigilia, sanguis subtiliantes & acuentes, nimia repletio & retentio euacuationum consuetarum & motus fortes corporei & animales, sicut ira, timor, tussis frequens & fortis, uociferatio, acuitas uocis, sine gradatione & rixa. Et propter hoc multiplicatur in demoniacis, & in illis qui rixantur ab omni re, & procedit ex uomitu laborioso, sternutatione, expressione forti, retentione anhelitus, & omnibus huiusmodi moribus fortibus, & proprie factis sine gradatione. Soluuntur etiam uene & membrorum substantiæ propter corrosiones & putrefactiones & maxime pulmo is ex humoribus acutis in ipso congelitis, aut ad ipsum aliunde deriuatis, & maxime à cerebro, est enim pulmo propter molliem suam substantiam & ipsius humoris acuti pronus in corrosiones & putrefactiones ad quas fluxus sanguinis sequitur. Est autem sciendum quod cum uenæ sunt sanguinis, præter modum repletæ, natura tentat ipsius euacuationem per regiones conuenientes, scilicet per uenas narium, hæmorrhoidales, aut menstruales, per sputum, & solutionem sanguinis, quæ cum non potest per illa loca expellere, tentat uenæ scissuram, ne sanguis tentus repens ad membra nobilia per uenas magnas, scilicet cerebrum, cor, & huiusmodi subito suffocando interimat. Sanguis autem à membrorum substantia egreditur, aut propter apost. aut pustulas membrorum à quibus sanguis resudat sicut in pleurisi & peripneumonia quæ apost. aliquando sunt salua quando sunt sanguinis, & quando resudat materia non imbibita nec incrassata, aut propter corrosiones & putrefactiones aut propter sanguisugam alicui membro appensam, aut propter eradicationem humoris cum membri superficie inuiscati quo modo possit etiam uena excoriari & scindi. Signa sputi sanguinis à cerebro est nocumentum cerebri præcedens, & quod sanguis egreditur cum extractione ad inferiora, aliquando tamē decidit in os absque alio auxilio per uiam colatorii & aperiendo os egreditur, & si sanguis fuerit arterialis egreditur cum maiori impetu & est subtilior rubens cum claritate, & spumulosus & eius retentio est difficilis, & contraria signa sunt sanguinis uenalis. Signa uero quod sanguis ille sit ex naribus, est frequens fluxus sanguinis narium & illius attractio ad partes oris cum rascatione, & si inspiciantur nares sunt sanguinolentæ, item in sufflatione narium sanguis educitur. Si uero sit à palato, egreditur cum rascatione sensata in palato, & si à colatorio egreditur cum rascatione sensata in acumine palati, & si est à lingua uel gingiuis solum expuitur, & aliquando in sufflatione ipsarum, nocumenta quoque horum membrorum, quæ sensui subiacent hoc declarant. Si uero egreditur à partibus gutturis, rascatione educit in gutture sensata, & nocumenta harum partium hæc declarant.

Quod si fuerit in canna pulmonis & epiglottis egreditur cum pauca tussi, & forti rascatione, & dolor existit in canna, est enim sensibilis per panniculum tegentem ipsam, & ille qui est ex uenis cannae est minus spumulosus & magis spissus quam qui est ex pulmone, & similior sanguinis, quamuis non sit in crassitie eius qui est ex pectore, & cum hoc ex omnibus his locis sanguis est paræ quantitatis præterquam ex cerebro & naribus. Signa prognostica sputi sanguinis à pectore aut pulmone sunt dispositiones corporum ad ipsum, sicut nuditas pectoris à carne cum strictura humeri eleuati & spatula exterius eminentes, sicut curuaturæ alarum, collum subtile & longum, depressum inter alas & humeros, & frequentat eos tussicula cum punctura, nunc apud dexteram, nunc apud sinistram spatulam, nunc apud aliquam mammillam. Quod si fuerit à pulmone & pectore egreditur cum multa tussi. Nā quanto sanguis uenit magis à propinquo, expuitur cum tussi minori, & à longinquo cum maiori, & qui dormit super loco in quo est ægritudo, addit excreatio eius quod expuitur.

Distinguitur autem sanguis proueniens à uenis pectoris à sanguine proueniente à uenis pulmonis, quia à uenis pectoris proueniens est minoris quantitatis magis cras-

Io. Arculani.

Q. sus

sis, imo aliquando coagulatus, sicut sanguisuga, cuius coagulatio potest fieri in concavitate pectoris, & deinde sic coagulatus ingrediens pulmonem expuitur & potest fieri cum coagulatione in pulmone. Sanguis autem pulmonis non coagulatur propter multam cholere admixtionem. Item veniens à pectore cum maiori tussi expuitur propter difficultatem ingrediendi pulmonem, & maiorem distantiam & propter crassitatem. Item adeest dolor pectoris & est parum spumofus signa his contraria. ostendunt ex pulmone provenire. Distinguitur autem proveniens à substantia pectoris, à proveniente à substantia pulmonis, sicut accidit in apostematibus & ulceribus ipsorum per signa apostematum ipsorum, de quibus supra, & per signa ulcerum ipsorum, de quibus infra in cap. de phthisi. Et veniens à pectore est cum dolore, magis niger, minus spumofus, cum maiori tussi sicut nunc dictum est. Distinguitur autem sanguis veniens ab utriusque venis à sanguine veniente ab eorum substantia, per multitudinem cum est à venis, per paucitatem cum est ab ipsorum substantia, & est abscessus, id est non continuus, imo manifeste separatus, sicut sputum ab altero in vase in quo colligitur, proveniens aut à venis est continuus. Distinguitur aut proveniens ab aperture meatum qui continent arterias pulmonis cum trachea arteria, qui naturali dispositione sunt per vias, aereas, et in viis sanguinis, à sanguine proveniente ex factura venarum pulmonis quia ille est paucus, hic vero multus, & cum levis remediis ille facile curatur, hic vero difficiliter, proveniens autem à meri excreatur cum vomitu, & cognoscitur per nocuum mentum sensatum in ipso meri & est paucus. Sed proveniens à stomacho, cognoscitur ex dolore stomachi, & quia egreditur cum vomitu. Sed egrediens ab hepate, & membris, quæ sunt ultra hepar mittentibus sanguinem stomacho cognoscitur per nocuum eorum, & sanguis proveniens à splene est magis niger, & habet odorem ponticum.

Nota tamen contingat error, quandoque sanguinem à pectore vel pulmone manantem ad stomachum descendere & vomitu educi, sicut e contra aliquid de sanguine à stomacho exiens ad pulmonem descendit & tussi educitur. Et discernit inter hoc, quia si est à pulmone vel pectore in principio, & secundum pluralitatem vicum expellitur à tussi, & raro vomitu, & ita si à stomacho in principio, & secundum pluralitatem vicum expellitur à vomitu & raro tussi.

Creticus cognoscitur, quia est terminus alicuius ægritudinis. Periodicus cognoscitur ex ordine sui periodi, & secundum plurimum provenit à stomacho & est per eum aliquando salus & præservatio à multis ægritudinibus. Cognoscitur autem provenire ex aperture orificiorum venarum, quia in principio est paucus & augendo procedit, & est sine dolore. Contra vero proveniens ex ruptura venarum in principio est multus, deinde paucus & cum aliquo dolore. Differt autem proveniens per refudationem ab utroque istorum, quia ille est valde modicus & subtilis in comparatione ad utrumque istorum, sed dilatatio orificiorum à generatione contracta, cognoscitur propter facilem fluxum sanguinis à quacunque causa. Signa causarum primitivarum sunt ipsæmet causæ, cognoscitur autem provenire ex apostematis corrosionibus, & ulceribus, ex ipsarum præcelsione & cum sputum sanguinis succedit sputo saniei, signatur ulcus esse factum corrosivum. Corrosionis signa sumuntur ex antecessione causarum corrodentium, ut catarrhi acuti, falsi, vel suppuratione alicuius corrosivi, & erit aliquando febris, propter malitiam materiam corrodentis. Item forte præcelsit sputum saniei vel alicuius crustæ, vel partis pulmonis. Et aliquando apparet sputum simile aque carnis lotæ propter paucum sanguinem commisceri multæ aquositati. Item incipit sputum sanguinis paulatim, maxime corrosione existente in carne pulmonis & non in vena. Et quandoque deinde fluit subito & expuitur res magnæ quantitatis. Et color eius est malus maxime quando corrosio profundatur, quia corrumpitur sanguis vicinus, & etiam propter novam mixtionem materiam corrodentis, unde color apparet lividus, niger vel viridis, & plus manifestatur illa malitia coloris in primo sanguine existente, quam in postero, & plus in paucis quam in multo. Et propter hoc cognoscitur quod non est ab aperture orificiorum nec abscissione venæ, quia in illis non est

color malus. Et si sanguis est arterialis, est feruens, calidissimus, spumofus, saliens, & cum saltu exiens, aut saltem cum maiori impetu, & est subtilior, rubeus cum claritate, cuius retentio est difficilis. Oppositæ conditiones sunt in sanguine venali. Sanguisuga autem cognoscitur ex punctione pluris sensata, & quia bibit aquam in qua habitant. Significatur autem sanguinem fluere per eradicationem alicuius pelliculæ superficialis, quia aliquid viscosum habens pelliculam annexam sanguinolentam emittitur. Signa autem corporum preparatorum ad sputum sanguinis dicuntur in phthisi. Sed pro complemento doctrinæ sunt aliqua notanda. Primum quod in sputo sanguinis quatuor timentur. Primum ne nimis superfluat. Secundum, ne sui multitudine subito suffocet. Tertium, ne in aliqua parte coaguletur, Quartum, ne sequatur ulcus propter ipsius sanguinis contractionem & putrefactionem, aut quia vultus non consolidatum fiat ulcus. Secundum notandum est quod fluxus sanguinis ex pulmone est valde malus, & deterius quam fluxus sanguinis ex pectore pluribus ex causis. Prima, quia motus pulmonis impedit consolidationem, & auget fluxum sanguinis, sed hæc causa est etiam communis pectoris. Secunda, quia sanies in membro spongioso diutius retinetur, & difficiliter extrahitur, unde magis acuitur, & acuta magis ulcerat.

Tertia, quia solutio continui in pulmone impedit anhelitum magis, quam in pectore unde augetur caliditas & corpus deficcatur. Quarta, quia caro pulmonis est multæ passibilitatis, unde cito fit ulcus primum ad dilatationem. Quinta, quia pulmo nutritur sanguine subtili, acuto impediens consolidationem. Sexta, quia pulmo est magis subiectus catarrhis prohibentibus consolidationem & augmentibus putrefactionem. Tertio notandum quod sanguis exiens ex naribus frequenter in somno, & alio modo descendit ad pulmonem, qui deinde cum tussi expuitur, & facit suspicionem quod veniat ex pulmone, quare considera, an præcelsit fluxus sanguinis, naribus, & si gna ipsius superius dicta in fluxu sanguinis, naribus, scilicet rubedo faciei, & oculi, & splendor coram oculis, capitis alleuiatio post gravitatem, & ut non spuma sit, & inspicere nares an sint sanguinolentæ, & an ex suffundendo sanguine exeat, de his tamen ista dictum fuit, &c.

Prognostica. Primum. Omne sputum sanguinis in notabili quantitate cum febre est suspectum, cum febris significet putredinem & corruptionem, maiorem tamen inducit suspicionem sputum sanguinis arterialis quam venalis, imo etiam sine febre suspectum est. Secundum. Omne sputum sanguinis cum tussi ex pectore aut pulmone, cum febre, & sine febre, malum, sed deterius est proveniens ex pulmone, & maxime ex ipsa substantia pulmonis quam plurimum ducens ad phthisim: quod enim est ex pectore sanatur velociter, & si non sanatur habet malitiam ulcerum pulmonis, & multoties fit ulcus fistulosum rediens frequenter cum sputo sanguinis. Tertium. Omne sputum sanguinis sequens corrosionem pulmonis est mortale.

Quartum. Sputum sanguinis cum vomitu etiam in notabili quantitate sine febre, aut cum modica febre curat multas ægritudines, aut ab eis præservat, sed cum febre intensa & perseverante est suspectum. Quintum, reliqua sputa sanguinis & maxime sine febre sunt salubria.

Cum sanguis cum rascatione, aut parvo sonitu, qui fit sine tussi, egreditur; non est ægro inde timendum: poterit enim sanari gargarizando ea, quæ in cap. de synanche nominavimus: & regimen subtiliando.

Cap. hoc diuiditur in tres partes. In prima agit de sputo sanguinis cum rascatione proveniente ab uvula, palato, & partibus gutturis. In secunda ibi. Cum vomitu quoque. Agit de sputo sanguinis cum vomitu emanante à stomacho & membris naturalibus. In tertia ibi. Quod si cum tussi. Agit de sputo sanguinis emanante à pectore, pulmone, & canna pulmonis. De primo dicit cum sanguis egreditur cum rascatione aut parvo sonitu, qui fit sine tussi non est ægro timendum: sanabitur enim gargarizando, scilicet stiprica, quæ dicta sunt in cap. de synanche. Et etiam dietam subtiliando, quæ etiam fit viscosa & stiprica.

Cum

Cum uomitu quoque si exit sanguis; non magnum affert timorem. curatur namque hoc phlebotomando ægrum. et si comederit stiptica, sicut sumach, & suc. vnae acerbæ. in potu præterea sumat ex bolo arm. gummi arab. balauft. sang. drach. 3. thuris omnium ana partes æquales: dentur ex eo drach. 3. cum rob simplici de citon. quibusdam autem solet acci dere sanguinis exitus cum interpolatione: ex quo nullum sentiunt nocumentum, imo remedium. ideoque sic est dimittendus.

In hac secunda parte curans sputum sang. cum uomitu emanante, dicit quinque. Primo, qd hoc sputum non magnum timorem affert, quod est intelligendum, si fuerit sine febre. Secundo curretur phlebotomando ægrum, scilicet ex basilica aut ex saphenis, si in causa fuerit retentio menstruorum aut hæmor. Tercio, si comederit stiptica, scilicet succum fructuum siccorum, & stipticorum, & succum uux acerbæ similis complexionis. & sumet etiam cibaria quæ ex eis fiunt, aut cum his condiuntur. Quarto, fumendo in potu. 3. huius pulueris cum rob simplici de citon. id est, succus citon. per decoctionem inspissato. 5. boli armen. sang. draconis, gummi arab. omnium frigidorum, & stipticorum, & uiscos. thur. cal. & sic. uiscos. ana partes æquales, stomacho ieiuno. Quinto dicit, qd quibusdam solet accidere hoc sputum cum interpolatione ex quo nullum sequitur nocumentum, imo remedium ad curandum, scilicet, uel præseruandum, quapropter sic est dimittendum.

Quod, si cum tussi superueniat sanguinis egressio; est timorofum. & tamen incipiendum in curatione ægri cum sanguinis subtractione ex basilica: deinde ex trochiscis istis in potu est tribuendum, qui. Rec. thur. sang. drac. amborum, drach. 3. & tertiam charabe drach. 5. hæmatitis, terre sigillatæ amborum, ana drach. 10. aluminis, drach. 2. & 5. balauft. drach. 3. opii, drach. 2. ravedsceni, drach. 2. ex his omnib. fiant trochisci. 10. de quibus quotidie unus in potu sumatur cum succo ozimi maioris aut portulacæ. & si ægritudo uehemens fuerit; alius circa noctem dandus est. adiutoriorum quoque, ac coxarum partes superiores sunt ligandæ, & extremitates fricandæ. pectus etiam præcipue si fuerit in eo locus dolens ex prædictis trochiscis, ex aqua, & aceto epithimetur. eius præterea cibaria suc. vnae acerbæ, & sumach, & eius similia admixta habeant. & patiens supinus iacens de terra sigillata aliquid post aliquid paulatim comedat.

In hac tertia parte curat sputum sang. cum tussi, & dicit. 7. Primum, quod hoc sputum est timorofum, ut patet ex dictis. Secundum, quod phlebotomanda est basilica ad minimum sang. & ad diuertendum. Tercium, qd unum ex his trochiscis dandus est in die, scilicet in mane stomacho ieiuno, & si ægritudo fuerit uehemens id est, quod sanguis impetuosè egrediatur, alius est dandus circa noctem, id est, per duas aut tres horas ante cenam cibo prædigesto, distemperatus cum suc. ozimi maioris, id est, basiliconis cômunis uel citrarii, non autem gariophylati: habent enim ambo folia lata, & quamuis sint calid. & sic. & potius per qualitates manifestas dilatantia, stringunt tamen cum proprietate oculata, aut dentur cum suc. portul. frig. & hum. uiscoso, & optimo in hac dispositione, præcipue si sit cum caliditate & sanguis acuitate, & similiter est suc. plantag. quantitas autem succi sit. 3. 1. usque ad. 2. & detur actum frig. Trochisci autem sunt isti. 5. thur. sang. drach. ana. 3. s. & tertiam Karabæ frig. & sic. stipticæ & uiscosæ. 3. 5. hæmatitis, terre sigillatæ frig. & sic. stipticæ & uiscosæ. ana. 3. 10. aluminis, scilicet rochiæ uel iamenti, uel sacch. cal. & sic. stipt. 3. 2. & s. balauft. frig. & sic. 3. 3. opii. 3. 2. ravedsceni, loco cuius accipiat rheum barbarum. 3. 2. & est cal. & sic. stipticum habens proprietatē in confortatione stomachi & hepatis, ex omnibus his fiant trochisci. 10. cum aliquo ex dictis succis, sufficit medietas unus ex his trochiscis: est enim quilibet. 4. 3. habet. 1. 2. gra. opii, & unus non dabitur absque timore in una uice. Quar-

tum, quod adiutoriorum, id est partium brachiorum à cubitis usque ad spatulas superiores partes sunt ligandæ, & similiter partes superiores coxarum fortiter stringendo, quæ ligaturæ sunt mutandæ descendendo, & extremitates sunt fricandæ, non autem aliarum partes, quia supercalefaciendo nocerent. Quintum, quod locus pectoris dolens ex trochiscis prædictis cum aceto & aqua ros. mixtis epithimetur. Sextum, quod cibaria sint suc. uux acerbæ, & sumach admixta habeant: si tamen istorum acredo cum sacch. dulcorata ne tussim excitent. Vltimum, quod patiens supinus iacens aliquid post aliquid de terra sigill. comedat, scilicet lambendo, ut aliquid eius ad pulmonem transeat: est enim propria frig. & sic. stiptica, uiscosa.

Cura sputi sang. à cerebro emanantis, & similiter deriuati à naribus ad os, patet ex cura fluxus sang. narium, de quo supra. Et similiter cura sputi sang. à partibus oris, & à partibus gutturis, patet ex prædictis in cap. de uulneribus. & ulceribus oris & partium eius, & similiter ex cap. de ulceribus uulvæ, & etiam partium adiacentium. Et conferunt eis retentiones in ore, & gargarizationes rerum stipticantium & inuiscantium, sicut aqua albuminis oui sola, aut in qua infusus sit bo. armen. sang. drac. trachagantus, & similia, quæ in textu dicta sunt, item succus plantag. & portul. cum similibus permixti, & sint actum notabiliter frig. uel si locus emanationis subiacet sensui, ponatur super uena soluta aliquid pulueris præscripti, & aliquantulum retineatur bene compressum, quæ si non suffecerint phlebotometur de cephal. uice post uicem phlebotomia subtili diuertente, & paulatim subtiliorem partem eius euacuante, quæ est prouior fluxui. Et si cetera non contulerint & sensui subiacet cauterizetur cauterio actuali, aut potenciali profunde satis, ut escara non facile remoueatur & fiant reliqua remedia in similibus casibus opportuna. Si uero sputum sang. sit cum uomitu est habenda diligens consideratio. Si enim sit criticum, aut propter malitiam eius in quanto uel in quali expellatur, si nescius est, nisi modum excederet. Curat enim & præseruat à multis ægritudinibus. Si uero nihil tale sit aut forte superfluat uirtutem deiiciens, sistendus est. Pro cuius constrictione exiguntur tres intentiones præter duas omnibus communes. Prima est rectificatio membri à quo est origo emanationis eius renouendo nocumentum illius membri, & ipsum confortando, ut sit minera humorum laudabilium. Secunda est, ut fiat diuersio cum subtractione sang. ex uena deferuiente illi membro & cum applicatione uetolarum super ipsum, & si est à toto corpore propter exuberantiam sang. in ipso fiat phlebotomia cum iteratione ex basilica aut communis, nunc dextra nunc sinistra, & quandoque ex saphenis, si retentio menstruorum aut hæmor. fuerint in causa, & si solâ quantitate exuberet. larga phlebotomia, uel mediocris facienda est: si autem sit acuitas aut inflatio in sang. cum subtilitate & ebullitione subtili phlebotomia utendum est. Et similiter si esset subtilis propter nimiam aquositate sibi admixtam, minor tamen sit phlebotomia. Tertia intentio est administratio consolidantium & conglutinantium sicut expedit, nunc uero quæ compingant sang. & increascent ex his quæ dicuntur. Huius tamen cura licet possit esse nota ex his quæ dicta sunt in præfenti cap. manifestior tamen fiet cum ageus de dispositionibus membrorum naturalium.

Cura aut sputi sang. ex pectore aut canna pulmonis apud Mesue, cuius doctrinæ sequar, exigit duplex regimen, uniuersale & particulare. Uniuersale aut quatuor cõplebitur intentionibus. Prima est æquatio sang. complenda maxime debito regimine sex rerum. Secunda est eius diuersio. Tertia ipsius mundificatio. Quarta accidentium correctio. Prima autem intentio corrigit nocumenta sang. in quantitate, aut qualitate eius, aut utriusque. In quantitate quidem cum diminutione cibi & potus, & dimissionem uini, & si non potest dimitti sit stipticum pauciferum multæ permixtionis cum aqua, & proprie ferrata extinctionis calibis, aut in aqua infusum fuerit tragachantum, aut aqua ros. & proprie decoct. rosarum sic. Et si potest abstinere à uino bibat huiusmodi aquas cum rob myrtino, aut bibat aquam decoct. iuinbarum, & uicet dulcia, & omnia quæ dilatant & multiplicant sang. sicut frumentum & trit. Et consimiliter omnia, quæ sunt ex sari-

Io. Arculani

Q 2

na

na frumenti, sicut alaganæ, & similia, & proprie quando est peccatum in quantitate sang. nam huiusmodi, quando esset peccatum in subtilitate eius conferunt incrassando & inuiscando. Et panis eius sit ex farina milii & siliginis, aut ex his cum pauca farina frumenti parum fermentatus non salitus. Et sint contenti forbitionibus factis ex rizo, milio, lenticulis, prima aqua abiecta, scilicet decoct. earum & horum kist est conueniens. Similiter Kist fabarum aut sorbitio ex farina earum. Item Kist hordei & proprie torrefacti. Ex oleribus conuenit portulaca, lactuca, cucurbit. citrulli & plantago. Ex carnibus perdices & aues minutæ extremitates uiscosæ, uiculi castrati, & similia, turtures & similes stipticitate quadā participantes: comedat tñ in parua quantitate cū sang. supra bundet, item caro cuniculi, capreoli. Et ex piscibus pisces petrosi, qui tamen non sint frixi, sed assati aut elixi, item cancri fluuiales cocti in lacte, aut aqua hordei, & proprie torrefacti. Fructus conuenientes sunt stiptici sicut pira, citonia, sorbz, mespila, uitent tamen omnes fructus, & cætera nimis acria, aut acetosa, dulcia, amara, salia, unctiosa & acuta, sed insipida, pontica, stiptica conueniunt. Et si peccatum in sanguine sit propter acuitatem, & subtilitatem eius corrigitur cum extinguentibus inflammationem, & incrassantibus ipsum, sicut cibi & potus stiptici extincti in inflammationem, sicut cibi ex lentibus aut cucurbita aut citrulo, & portul. & plantago sunt mirabiles: sedant enim inflammationem & stringunt sang. Et concedantur eis cibi pauca acetositate, sicut qui sunt ex prunis, cerasis acerbis, granatis, carnibus paruorum auium, & extremitates animalium uiscosæ, proprie cum remissa acerbis conditæ. Et confert maximū iuuamentum administratio aqua ros. aut plantag. aut portulacæ permixtæ cum coriandro aslo, aut sem. portul. papaueris in maturinis: hæc enim incrassant & compingunt sang. & laudantur iuiubæ, & aqua decoct. earum, fructus stiptici & sic. & simile sit reliquum regimen sex rerum non naturalium. Aer autem declinet parum ad frig. & sic. si fuerit peccatum in multitudine sang. Si uero in acuitate, declinet ad frig. & hum. & si fuerit multum aquosus, declinet ad sic. cum temperamento actiuarum. Vitetur aer fumosus & uentofus, & nimis humidus. Vitet omnes motus fortes corporeos & animales, & nimium somnum cum est multitudo sang. in causa & proprie sub radiis solis, aut lung & nimiam quietem, e contra autem somnus & quies confert cum est peccatum in acuitate sang. Item uitet coitum & balneum aquæ dulcis. Et procuret omnes euacuationes à natura institutas & etiam non naturales, si fuerit ex longo tempore consuetæ, & si fuerit peccatum in multitudine & acuitate materiei nostra occupatio erit cum utraque simul, & similiter si fuerit in multitudine & aquositate. Secundam intentionem, scilicet diuersionem, complent phlebotomia iterata, nunc ex basilica dextra nunc ex sinistra, quæ sunt subtiliores: si fuerit peccatum in sola acuitate, aut aquositate cum subtilitate. Si uero in sola multitudine, sint latæ. Si uero in utrisque simul, scilicet multitudine & subtilitate, sint mediocris latitudinis. Et quandoque phlebotomentur saphe-næ si magna ualde fuerit sanguinis multitudo, aut cum in causa fuerit retentio sang. menstrualis aut hæmor. qui iuxta posse prouocetur, & similiter fluxus sang. nar. si fuerit retentus. Lac quoque prouocetur, si in causa fuerit eius retentio. Et conferunt uentofationes in hypochondriis sine scarificatione, scilicet super hepate & splene. Tertiam intentionem scilicet sanguinis mundificationem complent administrationes medicaminum sanguinem mundificantium, aut à cholera secum permixta cum decoctione fructuum lxi. mirob. citrin. 2. 3. i. usque ad 2. prunor. tamar. ana. 3. s. iuiub. numero. 15. incidantur incidenda & bulliant in lib. 1. aquæ ad consumptionem duarum partium, & cum sufficienti expressione colentur, huic posset addi. 3. s. fyru. uol. aut de iuiubis, aut exhibe. 3. i. s. rheubarbari cum suc. ling. arietis, aut aqua quæ mulgetur ex semine portul. & si in causa fuerit aquositas educatur cum. 3. i. turbith non confortati, aut quantum sufficit, dissoluta cum decoctione mirobol. chebulorum, aut cum decoctione mirobol. chebul. in aqua mellis misceatur succi ireos. 3. s. usque ad 1. & in his casibus si sanguis peccauerit sola qualitate, scilicet subtilitate, incipe-

re debemus ab ipsius mundificatione & postea phlebotomare. Si autem peccauerit multitudine & subtilitate prius minoradus est phlebotomia, deinde mundificandus. Si uero sola quantitate, sola sufficit phlebotomia. Ex his autem quæ mundificant sanguinem & diuertunt inferius sunt clystera quæ sanguinem peccantem acuitate sint leuiter infrigidantia. Si uero aquositate, sint acutiora, & proprie sicut cum decoctione ireos, & similia, aut in eis ponatur succi ireos 2. 3. usque ad 6. Si uero sanguis sola quantitate peccauerit, sint lenientia aut mediocris acuitatis. Si uero plures causæ adinuicem componantur, circa plures fiat occupatio. Quarta autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur prohibendo reiterationem sputi sanguinis cum soleat frequenter reiterari, aut præseruando, ne accidat in paratis ad ipsum qui sunt conditionati, ut superius dictum fuit, & dicitur in cap. de phthisi. Et secundo perficitur, succurendo accidentibus sequentibus sputum sanguinis. Primum autem, scilicet prohibitio casus in ipsum, aut reiterationis eius perficitur tripliciter. Primo, cum prohibitio ne rerum facientium cadere in ipsum sicut sunt res acuentes & agitantes sanguinem, ueluti cibi & medicina acutæ, labor uehemens, ebrietas, rixæ, uociferationes, casus, percussiones, & similia descripta superius inter causas eius. Secundo, perficitur cum administratione conuenientium ad præseruandum à casu in ipsum eius reiteratione, sicut est phlebotomia basilicæ aut saphe-næ secundum exigentiam, & appositio uentofarum in cruribus, & prouocatio hæmor. aut menstruorum, aut sang. narium. Et conueniens administratio sex rerum. Et hæc omnia in uere obseruanda sunt: est enim tempus faciens sanguinem exuberare, nocumenta autem facientia cadere in ipsum, quibus secundum exigentiam subueniendum est, sunt catarrhus acutus, & tussis uehemens, cuius cura iam præmissa est. Item apostema pleuriticum, peripneumonia, in quibus apparens sputum sang. est laudabile: si tamen non fuerit sanguineum purum, quorum cura præcessit. Item apostema hepaticum in quo apparitio sputi sang. in princ. est malum, significans multitudinem, aut malitiam & apostematis magnitudinem. In processu uero cum incipit resolui est bonum, de cuius cura infra. Item re-tentio sanguinis narium, de qua supra, & retentio sanguinis hæmorrhoidalis, aut menstrualis consueti fluere, de quibus infra. Item lactis retentio, quibus subueniendum est ipsum prouocando secundum oportunitatem. Tertium autem, scilicet succurrere accidentibus sequentibus sputum sanguinis, perficitur secundum ipsorum exigentiam. Syncopi ergo subueniatur secundum quod dicitur in cap. proprio. Similiter coagulationi sanguinis in pectore uel stomacho. Pro cuius discoagulatione dentur aliqua incidentia & abstergentia, sicut oxymel simplex & coagulum leporis uel hoc de confert cum proprietate sua ad coagulandum discoagulata, & discoagulandum coagulata, siue sit sanguis, siue sit lac, de quo possunt dari gran. 5. cum 3. i. oxymellis. & 2. aquæ saccharatæ. Particulare autem regimen variatur sicut quatuor modos sputi sanguinis. Primum, cum sputum sanguinis resurdat ex membrorum substantia, uenis aut arteriis. Quod si fuit ab apost. sanguineo cuius materiam parum post parum cum creatu expellitur constrictione non indiget, imo potius creatus adiuuandus est secundum quod fuit in pleurexi. Si uero resudet ex uenis aut arteriis pectoris, aut pulmonis, propter ebullitionem, aut agitationem sanguinis conueniunt medicamina sang. feruorem reprimentia & ipsum compingentia, sicut portulaca masticata, cuius succus paulatim deglutitur & in ore teneatur, & semen eius assum, & tota planta ipsius sicut omnem modum administrationis, & similiter papauer assum. Item iuiubæ sicut eundem modum administrationis. Et in mucilage psylli cum lapide hamatite subtilissime trito & diligenter loto, proprie cum aqua plantaginis est uirtus mirabilis. Et si idem lapis præparatus misceatur succo plantaginis, Et dosis eius sit communiter circa. 3. s. cum 3. i. succi plantag. aut mucilag. psylli. Et psyllium assum conquisatum cum succo portul. Et semen eius usque dum fiat mucilaginosum, est ad illud mirabile. Et similiter sem. hyoscyami albi. 3. i. cum succi arnoglossæ 3. s. Item lac coctum cum lapidibus fluuiialibus, aut ferro ignito & proprie

prie acetosum abstracto butyro optime conuenit. Item lutū sigillatum & armenum & proprie cum succo plātagnis sunt medicinae praestantes ad illud. Item aqua ferrata cum gummi arab. & tragachanto afflo. Et quādoq; oportet cum his ali quid ex narcoticis permiscere, sicut trochiscos de karabe M. & descriptione à Rasi in textu. Secundum est contra sputum sanguinis emanantis fm uiam redundationis ex aliis mēbris, sicut ex matrice, & similibus, & huiusmodi cura perficitur cum euacuatione & diuersione, tam à membro mittēte, quā recipiente, quē potest patere ex supra scriptis, &c. Tertium contra sputum sanguinis fluentis ex ruptura uenae, & indiget administratione stipticorum consolidantium, sicut sang. draconis, karabis, boli armen. lutum sigil. balauftia, rosae, cornu cerui adustum, corallus adustus, cortices & flores granatorum, haematites, gummi asium, mumia, rheubarbarū & proprie asium cortices thuris, cortices mastichis, coagulum leporis, coriandri semen, linguae arietis, capita & uirgula rosarum, & fructus, folia myrti, spodium. Ea autem in quibus haec sunt administranda, sunt succus plantaginis, succus portulacae, suc. basiliconis maioris, & aqua ferrata infusionis gummi alsii, aqua ros. succus citoniorum succus granatorum myrti. Medicinae autem compositae sunt sac. ros. est. n. medicamen benedictum, myrrha, syrupus de ros. siccis, syrupus de iuibis, syrupus myrtinus, trochisci de terra sigillata, trochisci de karabe, philonium persicum. Administranda autem exterius, sunt oleum ros. mastichinum, myrtinum, oleum de cytoniis & similia, quae possunt permisceri cum pulueribus supra scriptis, & cum farina fauich, lentium, fabarum, & similibus cum succis supra scriptis, & albumine oui, & ex propriis est thus subtilissime puluerizatum mixtum cum albumine oui, & haec administrantur super loco doloroso, in illo enim uerisimiliter est ruptura uenae. Quartum, contra sputum sanguinis ex corrosione & ulcere praecedente, & hoc est illud, quod est maxime suspectum & timorosum, sed huius curam ponemus in cap. sequenti de phtisi, si Deus uoluerit.

De phtisi.

Cap. 72.

Phtisis graece, sputum latine. Sed phtisis graece, consumptio latine. Haec dispositio quocunque nomine uocetur est descriptiue fm Mesue detritum desiccationis & consumptionis cadens in corpus ex calore febrili habitudinalium minutarum ex ulceratione pulmonis. In qua descriptione uidemus ad phtisim esse necessariam corporis consumptionem immediate sequentem febres habituales, id est, hecticas, quae proveniunt ex ulcere pulmonis. Dicitur autem minutarum, quia feb. hecticae non sunt ardentes, sicut putridae, imo phtisici non sentiunt se febrile, nisi cum cibum sumunt, per cuius sumptionem ratione hecticae calor excrecit. Est enim proprium hecticorum, ut supercaleant post cibum. Cum quo tamen concedendum est nullam hecticam esse remissiore ephimera aut putrida, quam immediate sequitur, quia primum esse feb. facta, est primum non esse sentis. Et ex hac descriptione patet differentia inter phtisim hecticam, marasimum & tabem. Hectica est enim febris habitata & festa, cum sit independens à causa corporis speciali dependentia, cuius calefactum esse, est in substantia cordis, & non includere in quidditate eius quae sequatur ulcus pulmonis quapropter omnis phtisicus est hecticus, & non e contrario. Differt autem ab hectica etiam improprie sumpta quia dicitur de hectica senectutis, & de hectica mēbri particularis: sicut de hectica stomachi & hepatis, & huiusmodi, quia haec hectica dicitur siccitatem fixam absque caliditate, aut totius, aut membrorum particularium, quapropter nullus phtisicus est hecticus hoc modo. Marasimus autem & tabes dicuntur corporis multam consumptionem, siue sit feb. siue non sit, & dicuntur etiam de consumptione mēbri particularis, sicut aliquando dicimus crus tabidū & brachium marasmatum, licet secundum alios marasimus differt à tabe, ex eo quod importat corporis consumptionem sequentem febrem acutam. Sed tabes absolute corporis consumptionem, unde eunquē proveniat. Sed item de omnibus omitteremus: nam quādoq; hi termini apud auctores accipiuntur ut synonymi. Pro notitia specierum phtisis est sciendum quod ulcera membrorum spiritalium, aliquando sunt in

pleura & musculis intrinsecis pectoris, & ossibus eiusdem cum eorum corruptione. Aliquando in diaphragmate. Aliquando in mediafino. Aliquando in canna pulmonis. Quādoque in pulmone ipso. Deteriora ceteris partibus sunt quae sunt in pulmone, deinde in diaphragmate, deinde in mediafino, deinde in pleura & partibus ipsi continuis: ita quod quidam arbitrati sunt nunquam ulcera pulmonis posse consolidari, eo quod est in continuo motu, quibus Galenus. 6. de ingenio sanat. contradicit motum non impedire consolidationem, cum ulcera pectoris & diaphragmatis, quae sunt in continuo motu possint consolidari, sed materiam limitando dicit, quod ulcera munda siue pura superficialia in pulmone consolidantur. Putrida uero corrosiua apostemola ualde sordida aut uirulenta, & huiusmodi non possunt consolidari, cui sententiae Mesues consentit. Ulcera uero pectoris & immunda siue impura consolidantur multis ex causis. Primo, quia pectus est carnosum. Secundo, quia est cum paruo motu. Tercio non habet substantiam mollem, pronam in corrosio nem & putredinem. Quarto, non habet carnem spungiosam in qua sanies retineatur, imo quod ab ulcere pectoris refudat, aut per aliam uiam expellatur, super diaphragmate colligitur, si non exspuatur, postea paulatim expellitur fm plurimum. Quinto, non est multum subiectum catarrhis. Sexto, non nutritur sanguine calidissimo multae cholerae admixto impediēte consolidationem. Septimo, non habet uenas magnas & amplas, sicut pulmo. Octauo, non ita cordi deseruit, sicut pulmo. Oppositae conditiones reperiuntur in pulmone. Item medicinarum quae applicantur exterius uirtutes uix possunt attingere ad pulmonem, quae autem sumuntur interius si deglutiantur multum transmutatae sunt, & earum uirtus est diminuta quando ad pulmonem uenerit. Si autem teneantur in ore, uel lambendo sumantur, parum de ipsis ad pulmonem penetrat. Praeterea aut sunt calid. & febrem augent, aut frig. & sputum impediunt, & cum hoc sunt tarde non penetrantes, aut sic. & similiter sputum impediunt, & nocent hecticae, aut humidae, & nocent ulceri. Praeterea si ulcus sit corrosiuum, requiritur tempus antequam humor corrodens sit correctus, & interim ulcus dilatur & ampliatur. Praeterea si ulcera pulmonis debent curari, indigent mundificatione, quae maxime cussi perficitur, sed tussim commouendo ampliatur ulcus. Item addit in dolorem si ulcus ad panniculum peruenit, & dolor impedit consolidationem, humores attrahendo, quare raro ulcera pulmonis consolidantur nisi fuerint munda, & superficialia, & non multum antiquata: quae tamen exigunt medicū prudentem & diligentem. Si uero profundetur notabiliter in substantia pulmonis difficillime curantur, & si peruenierint ad cartilagine non recipient curationem: homines tamē magis susceptibles curae phtisis sunt infantes.

Crustosa tamen ulcera non impetiginosa, aut pendentia ab humore adusto, quia haec difficillime rectificantur, sed crustosa, quia superficialia & paucae saniei quibus facillime aduenit crusta siue cutis non uera, facile rectificantur, & si non perfecte liberentur, longissimo tempore durant antequam agrum ad interitum ducant, ita ut aliquando fm Auic. prolongetur tempus in phtisi circiter. 23. annos. Ulcera uero diaphragmatis in parte carnosa rectificantur, nisi utrinque penetrant, sed in parte nervosa si sint aliquantulum profunda, raro uel nūquam curam recipiunt. Ulcera uero mediafini facilius rectificantur, quia ulcera diaphragmatis, & adhuc facilius ulcera pleurae & musculorum inter costas, & costarum etiam si sint corruptae, sed opus est sectione aut cauterio in parte extrinseca, ut perueniatur ad costam corruptam. Et ex his manifestae sunt differentiae ulcerum pulmonis. Ulcera uero existentia in canna pulmonis si sint in panniculo regente cannae & cartilagine ipsius, facile curantur. Si uero profundentur in substantiam cartilaginum non recipiunt curam. Causae ulcerum pulmonis quādoq; sumuntur ex dispositione patientis, quādoque ex fortitudine causae imprimētis. Primo modo, aut ex parte complexionis. Et sic complexio frig. est paratior in phtisim fm Auic. quā calid. quod uerificatur in hoc tantum, quod habent pectus strictius & abundant magis in superfluitatibus. Oppilatio tamen calida ratione acuitatis superfluitatum imprimentium in pulmone est ma-

Io. Arculani

Q 3 gis

Sis parata ad phthisim. Et certe uidi plures phthisicos, habentes complexionem calidam & frigidam. Complexio autē sicca & humida sunt fere æqualiter paratæ ad phthisim. Sicca quidem magis ratione fracturæ uenæ. Humida uero, quia abundans in pluribus superfluis, & quia pulmo est mollior. Ex parte sexus foemina & masculi sunt fere æqualiter parati, licet apud Mesue, in mulieribus magis occultetur, quam in uiris. Ex parte ætatis maxime parati sunt à 18. anno usque ad trigésimum secundū Aui. licet fñ Hippoc. usque ad trigésimum quintum, id est, ad finem consistentie, quod provenit, quia in hac ætate est pulmo satis mollis, facile susceptivus impressionis, & humores acuti multum imprimentes. In pueritia uero licet pulmo sit mollior, humores tamen sunt pauca acuitatis propter multam humiditatem obundantē caliditatem. Item secundo, quia uirtutes naturales puerorū sunt fortissimè optime digerentes, & sua expellentes superflua. In senio uero pulmo est durior & humores pauca acuitatis diminuta caliditate ex decursu ætatiuo. Credo tamen quod rarius accidat pueris, quàm senibus, & si accidat pueris facilius curantur quàm senes, licet in senibus non curata magis occultetur, quàm in pueris. Sed merito cōpositionis, prout in phthisim sunt, habentes collum gracile, & longum tendentes ad interiora cum eminentia. Et habentes humores alatos, sicut sunt curuaturæ alarum, & spatulas quasi à pectore separatas. Illi enim uidentur quasi alati, id est habentes alas, & de necessitate habent pectus constrictum. Si autem cum hoc sunt macilenti, & habentes carnem mollem cum acuitate humorum, & cerebrum catarrhizans, ut sit debile, facile recipiens superfluitates & nutrimentum proprium, non bene transmutans cum multiplicatione uentositatis in pectoribus eorum, & pulmonibus, & partibus uicinis, quæ multiplicantur propter debilitatem pectorum, & eorum sequentem malam compositionem. Et frequenter uexat eos tussicula cum punctura alicuius spatularum aut mammillarum, & præcipue si sint ex irascentibus facile, cholerici sunt maxime inter omnes parati ad phthisim, & proprie quando cum acuitate humorum habeant carnem mollem. Corpora enim mollia sunt parata ad phthisim, quia facile ulcerant substantia pulmonis, sed dura & spissa propter illud, quod accidit eisdem de eruptione uenarum. Ratione ergo causæ imprimentis multæ sunt causæ primitiue, sicut aer. Autumnus enim maxime facit cadere in phthisim, & uehementius nocet factis phthisicis. Item constitutio borealis multum dominans & maxime quando præcessit austrina, & similiter e contra, licet fñ Mesue regio borealis multum frigida & sicca. Item cibi & potus salii & acuti & capita replentes. Item retentio omnium euacuationum consuetarum. Item motus fortes corporei & animales, quia uenas rumpunt. Item percussio penetrans ad pulmonem, casus & offensio, & similes. Et ex corporeis antecedentibus sunt humiditates acutæ repentes ad pulmonem, sicut sanies ab ulcere synanchico, aut ab ulcere pleuretico, aut empyema. Si enim non mundificatur in quadraginta diebus fñ doctrinam Hippocratis ducit ad phthisim, licet in duobus uiderim ulcus pleureticum non mundificatum in quatuor annis, quod tñ non duxit ad phthisim. Sed causæ coniunctæ per essentiam in pulmone sunt bothor & uariolæ, quæ ulcerantur. Item peripneumonia, quando transit in ulcus. Frequenter autem inter omnes causas sunt catarrhi à capite defluentes ad pulmonem, aut sui acuitate corroderentes, aut sua humiditate superflua putrefaciētes. Ruptura quoque uenarum in pulmone à quibuscunq; causis fiat de quibus dictum est in capitulo præcedenti, frequenter ducit ad phthisim. Aliquādo etiam generatur phthisis incipiendo per essentiam in pulmone ex nutrimento suo non bene conuerso, & ex superfluitatibus suis non bene resolutis ob uirtutum suarum debilitates, quæ diuturnantes in pulmone ipsum corroderunt, aut putrefaciunt, sicut quæcunq; aliæ humiditates undecunque ad pulmonem defluerint, & ideo ex asthma quādoq; transit in phthisim, licet frequentius e contra phthisis associet sibi asthma. Signa quædam sumuntur ab exētibz, sicut à sputo quando est crassum, saniosum, quod cognoscitur, quia foetet sanies quando ponitur super prunas, & habet colorē album tendentem in uiridem uel citrinū, & quia descendit in aqua. Per hæc tria à sputo phleg-

matico non digesto discernitur, nam si esset digestum descenderet ad fundum, sicut sanies: nam de ratione phlegmatis digestorum, quæ sint incrassata, & ad terrem deducta, ideo descendit in aqua, ut placuit Auer. in commento canticorum, com. 9 hoc tamen signum non solum est efficax cum etiā sanies sputatur in ægritudine, quæ non est phthisis apud Aue. cap. de empyemate. Et quādoq; post sputum saniosum sequitur sputum sanguineum, & est proprium signum ulceris corrosiui, sicut e contra, quādoq; ad sanguineum sequitur saniosum. Si autem in sputo sint crustæ, aut aliquid aliud de pulmone substantia non remanet dubitatio. Est enim certa phthisis, & salsedo sputi arguit ulcus corrosiuum. Et si expuitur aliquid & sit crassum, est ex pulmone. Si uero subtile, est ex canna pul. & quādoq; in ulcere magno expiunt annulos ex canna pulmonis. Et nota quod aliquādo est sputum saniosum, quod tamen non descendit in aqua propter duo. Primo, quia est ualde crassum, & tenax, & obuians multæ quantitatē aquæ multum resistenti non potest ipsam diuidere. Secūdo, quia forte est cum multa spuma & inclusione multæ uentositatis subleuantis, quapropter sputo solo non est credendum. Virna phthisici est naturalis fñ plurimum si non habeant aliam ægritudinem complicatam in substantia, colore, quantitate, fedimine. Verum aliquando habet oleagineitatem in superficie, & aliquando furfures, & aliquando petala quædam, quæ omnia significant humidi consumptionem. Egestionem sunt naturales, nisi quod aliquando præcedente phthisi sit fluxus lientericus aut diarrhœicus ob debilitatem uirtutum naturalium, & est malum signum. Sudor quoque factus in fine digestionis quando spargitur nutrimentum per membrum est signum phthisis, & malum: significat enim humidi debentis nutrire dissolutionem à calore præter naturam. Sed à qualitate mutata. Primum signum est febris minuata, continuata, uniformis, nisi quando cibum sumit, & hæc febris est hecistica, licet secundum plurimum phthisicus non euacuetur à febre putrida sequente saniam uicinis, nec ex hac febre putrida est lac phthisicis disconueniens. Et quandoque associatur eis aliæ febres putridæ, scilicet quotidiana, tertiana, quartana, quintana, & est deterior per uiam signi, significat enim ultimam exiccationem per quam humores incinerant, & transeunt in melancholiam, licet per uiam causæ, aliæ febres sint deteriores, quia magis affligant. Et propter hoc tertiana est media in malitia tam per uiam signi, quàm per uiam causæ. Color faciei est plumbinus, licet post assumptionem cibi rubeat uaporibus sursum eleuatis. Extrema & proprie pedes quandoque tument & undimantur iam errante digestiua hepatis, & ipsorum per communitatem ad pulmonem, & superfluunt uenæ eorum omni hora, quoniam uirtutes eorum debilitantur à retentione nutrimenti & regimine eius: & caliditas resoluit & liquefacit, quapropter non attracto nutrimento à uenis, & humido ipsorum resolutio superfluunt uenæ. Sed ab actione læsa sumuntur signa, quia male dormiāt. Secundo, quia pulsus eorum est minutus, durus, frequens, uniformis, nisi quia cum cibum sumit excrefcit, & diuersus in fine debilitatis uirtutis. Et anhelitus licet in principio parum recedat à naturali, in fine tamen frequentatur & diuersificatur, & appetitus est diminutus secundum plurimum, & in fine aufertur. Dolor quandoque est in phthisi, scilicet, cū ulcus peruenit ad panniculum tegentem pulmonem interius aut exterius, aliter non est dolor in phthisi notabilis. Signa autem causarum primitiuarum sunt ipsæmet causæ. Sed signa causarum per communitatem & per essentiam in ipso pulmone sunt nota ex præcedentibus cap. Quando ergo aliqua signa & maxime, quæ sunt potentiora ex superscriptis adsunt debemus concludere phthisim adesse, & proprie quando præcesserunt causæ uniuersales ad ipsam ducentes.

Prognostica. Primum, quando in phthisi spuntur crustæ, substantia pulmonis, & annuli eius, & uenæ, & lapilli, significat ulcus magnum & propinquitatem mortis. Secundum, quando magis procedit in phthisi sputum magis incrassatur ipso longiori tempore retento propter uirtutis debilitatem. Tertium, quando intrinsecatur sputum aut retinetur in fine phthisis, & tunc non additur super quartum diem: quandoque enim constringitur anhelitus eorum usque quo

quo fiat insensibilis. Quartum, casus capillorum, curvitas unguum ultimam exiccationem arguentem significat propinquitatem mortis. Quintum, si super spatulas appareat pustula, sicut faba tendens, scilicet in duritiem, & fulcedinem moritur post viginti duos dies, idest, post multos dies, significatur enim quod humor malignus sit in causa. Sextum, cum tussis uehemens ducit ad sputum sanguinis continuum ponitur res fere in desperatione. Si enim curetur tussis cum prohibitiis sputi moriuntur aut suffocantur, aut quia fluxus uentris superuenit ob superfluitatem retentionem. Si autem dimittuntur tussire, moriuntur tussiendo & spuendo sanguinem. Septimum, quando phtisis parum impresserit, & non sit ulcus ambulatum, & non pendens a causa incorrigibili sanari potest, sed non apud negligentem & stolidum. Cum autem multum impressit cura secundum plurimum est cassa & uana, nisi iussu Dei, sicut in Mediolanensi ordinis sacri Fracisci de obseruantia, qui post annum quartum suae phtisis ex sputo sanguinis pluries iterato tandem uenit post multam corporis tabem ad impotentiam expuendi cum oregmone. Et cum crederetur ipsum esse morti proximum, euasit ex miraculo & impinguat us est. Vltimum, fluxus uentris in phtisi perniciosus est.

Quam aliquis carniū diminutionē pati uidetur post tussim ex chronica passione, & sputo sang. aut saniei procedente, lac asinum in potu tribuatur, quod, si inueniri nō poterit; caprinum cum pauco saccharo dandum est: cum quo etiam panem saepe comedat, ipsumque; quāto plus potest loco aque sumat. uinum tamen subtile, & temperatū aliquando est tribuendum. nutrimentum quoque agri sit ex carnib. auium, & hœdina. æger præterea ante comestionem, & post balneum ingrediatur, quod non sit calidum, sed tepidum, & in semicupio moram faciat. summopere uerò cauendum est, ne uenter soluatur, cui tamen si solutus fuerit, ex huius pulueris bibitione succurrendum est, qui. Rec. gummi arabici, spodi, boli arm. seminis myrtini omniū ana drach. fiat ex eis puluis, de quo in die drac. 1. cum syrupo de papauere albo, aut rob myrtino dentur. huius quoque pulueris bibitio omnibus uentris constrictione indigentibus, qui tussim patiuntur remedium affert. cui plerumque adduntur xylocaracte de syria, & bdellium de mecha. & si lac ægro febrem generauerit, auferendum est ei lac: & pristana, quousque febris recedat, danda est. deinde lac ei denuo tribuatur: & si febris iterum redierit, remoto lacte pristana est danda. post cuius recessionem, ut prius ad lac est redeundum. hoc autē semper est faciendum, ut necessitas urget: & uenter summopere custodiendus est, ne soluatur.

Hoc cap. habet duas partes. In prima ponit signa phtisis. In secunda curam ibi. Lac asinum, &c. Prima per se ex dictis manifesta est. Secunda pars diuiditur in quatuor. In prima ponit regimen uitæ. In secunda ibi. Aeger præterea. Docet usum balnei in phtifico. In tertia ibi. Summopere. docet subuenire fluxui uentris superuenienti hæcticæ. In quarta ibid. Quod si lac. docet curare febrem superuenientem. Pro notitia primæ partis sciendum, quod genera lactis quæ conceduntur sunt humanum, asinum, caprinum, uaccinum, ouinum, equinum. Humanum quidem summe confert cum proprietate currenre inter indiuidua speciei humanæ, & melius est, ut suggatur ab ubere. Asinum est magis subtile cæteris, prohibes oppilationem, & est abstersiuum ulceris propter multam partem serosam. Vaccinum autem & ouinum cum habeant multum de parte caseali & butyrofa multum nutriunt. Caprinum uero est temperatum apud Auic. secundum canō. cap. proprio, idest medium inter subtilitatem lactis asini, & crassitiem lactis ouini & uaccini, & similiter est minus frigidum lacte asino, & magis frigidum lacte ouino & uaccino. Equinum uero abstergit magis & faciliat sputū propter multam partem serosam. Vtere ergo his secundum intentionem, quam habes potiore magis deseruiēte tuo proposito. Sed in ipsius usu seruentur quinque conditiones

iuxta Aphor. quod caput non doleat, quod æger non sit febris, scilicet febre putrida, nec sit sticulus, nec uenter rugiat, nec fluat. Sed si uelles ipsum exhibere medicinaliter, in prima die accipiat paucam quantitatem, sicut à. 3. 10. usque ad 5. 3. cum pauco saccharo immediate cum est multum ab ubere, deinde paulatim omni die dosis augeatur usque ad 5. aut. 6. 5. & in plures, & sic continuet ipsum quousque senserit se iuari: est tamen melius ut suggatur humanum ab ubere. Si uero febris aut aliud nocumentum acciderit, docet Rasis in fine capit. loco eius uti pristana hordeacea facta secundum artem, de qua sermo præcessit in pleuresi, & sumat lac in mane aut ante coenam iam cibo præcedente digesto, & post ipsum non dormiat nec exercitetur, & tardet cibum per tres horas, uel quousque lac digestum sit. Pro secunda parte nota balneum pro phtifico conueniens esse ex aqua dulci tepida non calida cum fiat ad humectandum & in frigidandum, & tanto tempore moretur in semicupio, idest, in uase balnei quousque uerisimiliter potuit impressisse, quod est communiter à quarta hora usque ad mediam. Cauendum tamen ne adsit febris putrida, neque uenter lubricus nec multa debilitas, & ponatur in eo, cibo iam digesto quo ad primam digestionem. Cæteræ conditiones in usu balnei fumendæ sunt ex capit. de hæctica. Et non est ita administrandum à principio sed maxime conuenit phtisi declinante, semicupium tamen quasi medium capiens, proprie sumptum non est uas conueniens ab balneandum hæcticum, sed est uas in quo sedetur cruribus stantibus extra pro corrigendis ægritudinibus matricis & illorum per cholica. Pro tertia parte nota: uentris solutiu non conueniunt in phtisi, ut phtisis est, cum non sit morbus materialis & noceret, corpus exiccando, imo si fluat uenter summopere constriungendus est cum puluere à Rasi descripto, qui est frigidus, siccus, stipticus, inuisca, & est proprius per uirtutem quartam maxime propter gummi arabicum, sem. myrti, xylocaracte de sen. idest, carubia de regione illa sunt conuenientes: quia stipticæ siccæ. & cum hoc pulmo ni conferentes: *ξύλον* enim græce, est lignum latine, *κέρτα* cornua quasi cornua ligni, bdellium de mecha, idest, de regione illa est conueniens, quia frigidum, stipticum & uiscosum & ponitur de mecha ad differentiam bdellii iudaici, quod est calidū, & est ita conueniens huic proposito, reliqua patent.

Duplex est regimen habendum in phtisi præseruatiuum & curatiuum. De præseruatiuo sit prius sermo quod duas exit intentiones. Prima est prohibere & remouere quasque causas potentes ducere ad phtisim si possibile sit, quæ intentio perficitur curando catarrhum, synanchen, pleuresim, peripneumoniam, sputum sanguinis, empyema, & similia si fuerint in causa. Quod si nulla talis fuerit, sed solum dispositio ad phtisim, merito complexionis, compositionis, ætatis, & similibus, de quibus supra, intendatur ipsarum correctioni aut prohibitioni ulterius lapsus, quæ bene est possibile. Quapropter cauendum est ab omnibus cibis, & medicinis acutis & mordicatis, & ab omnibus quæ extendunt membra pectoris, & clamor, & rixa, & saltus, & luctus, & procurentur omnes euacuationes naturales, & etiam non naturales longo tempore consuetæ, & reliquum regimen seruetur secundum quod oportet. Secunda intentio est confortare pul. cum propriis moderata stipticitate participatib. & contrariis discraliz pulm. & cæteris nocumentis eius, & ex propriis sunt pulmo uulpis præparatus secundum artem, liquiritia & succus eius, capit. uen. grā. myrti, rob. aut syr. eius, hæc omnia singulariter aut coniunctim, & proprie cū aliquo dulci, sicut sacch. optime condita, ualent in confortatione pul. Sed regimen curatiuum phtisis est duplex secundum Mesue uniuersale & particulare. Uniuersale tribus complectitur intentionibus. Prima remouet causam phtisis. Secunda euacuat materiam nocentem in phtisi. Tertia ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Verum duas primas intentiones in unam possem reducere, uel remouere causam phtisis, tam producentem, quam conseruantem. Prima intentio perficitur curando catarrhum si pendeat à catarrho, similiter ulcus, synanchen, pleuresim, empyema, sputum sang. & huiusmodi si ab aliquo istorum pendeat, quorum omnium cura perquirenda est ex capitulis propriis, quæ præcesserunt. Attamen curando ista debes etiam intendere, quæ

Io. Arculani Q 4 tura

tum est possibile, ad curam phthisis cum his quæ dicuntur. Secunda intentio, scilicet euacuatio, debet perfici si sanguis fuerit in causa cum phlebot. ex basilica. primo ad euacuandum multitudinem si fuerit, deinde ex saluatella ad diuertendum si oportuerit, & si retentio hemorrhoid. aut menstruorum fuerit in causa, ante oia phlebotometur saphena & procurretur omnes euacuationes consuetae. Si uero cholera fuerit in causa educatur cum decoctione prunorum. uiol. iuiubarum, sebesten, capil. uen. ʒ. 3. trahatur, & cum casia. ʒ. 1. aut manna. ʒ. 1. s. iulep, aut syr. uiol. ʒ. 1. fit tamen solutiuum facile. Si tamen uenter esset præter modum stipticus Mesf. addit parum trochisci de uiol. quorum descriptio posita est superius, sed omittantur quātū est possibile cū sint scamonea. Et si phleg. fuerit in causa, exhibeantur pilulae cochiae in parua dosi. ʒ. 3. uel. ʒ. 2. s. bdellii, aut gummi arabici. Et si melanch. fuerit in causa detur senna, aut epithimum cum sero caprino aut similia. Sed in his uidetur contradictio inter Auic. & Mesue ex una parte, & Rasis pro cap. ex altera parte, primi enim precipiunt solutiua iam dicta Rasis omnino prohibet solutiua. Ratio Rasis fuit, quod ratione hectica uitanda sunt solutiua, ratione ulceris est ut ulcus non conueniunt. quapropter in phthisi ut phthisis est non conueniunt solutiua. Ratio Auic. & Mesue fuit, quod solutiua conueniant, ut auferatur causa tam factiua, quam conseruatiua phthisis, sicut catarrhus. In catarrho enim solutiua conueniunt. Item humores maligni superfluentes in quanto aut in quali impediunt ulceris pulmonis consolidationem sicut & consolidationem aliorum ulcerum, ergo cum oporteat causam auferri, solutiua pro ipso euacuatione erunt opportuna, sicut & quotidie facimus in curatione aliorum ulcerum. Et confirmatur, cū propter praesentiam humoris maligni ulcera ista fiant corrosiua. Responso est quod intentio Rasis fuit solutiua non conuenire in phthisi ut phthisis est, scilicet cum est facta & inde pendens, quod etiam primi non negassent, sed ratione causæ non ratione phthisis conceduntur solutiua. Tertia uero intentio exigit aerem aliquantulum frigid. temperatum in passiuis, quanquam Gal. 5. de ingenio, capite quarto recitet, quod ipse existens Romæ eligebat ipsis phthisicis montes calid. & siccos percussos à sole & elongatos à paludibus & locis humilibus, & mittebat eos ad montem altum in Sicilia, scilicet Aetnam, ubi est continuus ignis & dabat eis theriacam & mithridatum quarto interiorum cap. ultimo, & cum talibus prolongabat uitam, tandem tamen moriebantur, nullus enim eorum euasit cum suis remediis, ut recitat ibidem. Et ut tollatur contradictio & instantia, quæ fieri possent, Gal. concedens huiusmodi aerem exiccantem & calefacientem intendit curam palatiuum non ueram, quæ est ulceris exiccatio & curæ non ueræ inductio. Sed Auic. concedens aerem siccum in cura ueræ phthisis respicit ad ulcus quod est causa hectica, & non ad hecticam, quæ non potest remoueri sine remotione ulceris pulmonis. Similiter Mesue concedens aerem temperatum in actiuis ad siccitatem debilitantem curat phthisim, cui remissa hectica est associata. Ego autem simul intendens curæ ulceris & hecticae aerem frigidum, ratione hecticae eligo, qui ratione ulceris solius deberet esse temperatus in actiuis, & eligo ipsum temperatum in passiuis, quia ratione ulceris deberet esse siccus, & ratione hecticae debet esse humidus. Tu uero elige aerem qui proposito fuerit conformior omnibus æque librat, scilicet hectica, ulcere, causis, & accidentibus, quæ secundum plurimum debent esse proxima temperamento, non enim omnia sexto possunt mensurari. Et confert mutatio de regione propria ad regionem & aerem sibi magis conformem: contra si egrotauerit in regione & aere sibi non connaturali redire ad regionem propriam & aerem sibi connaturalem. Dieta uero aliquando habet respectum ad ulcus, & indiget primo abstergentibus & mundificantibus, & secundo consolidantibus. Aliquando habet respectum ad hecticam & indiget infrigidantibus, & humectantibus & bene restaurantibus. Aliquando habet respectum ad causam aut ad accidens forte sibi coniunctum, ut exempli gratia, sputum sanguis, & indiget stipticis uiscosis costringentibus, propterea medicus sit diligens & secundum exigentiam ægri tudinis causarum, & accidentium, non secundum exigentiam intentionum ordinet dietam. Ea tamen quibus

uitur sint facili digestiois, boni chimi, paucarum superfluitatum, quorum parum, multum nutriat, sicut oua forbilia testiculi gallorum, carnes laudabiles, uinum subtile. Et si aliquando fercula non habentia has condiciones conceduntur propter alia iuuamenta, sint cocta iuribus laudabilium carniuum. Ratione ergo abstersionis ulceris conuenit ius cicerum rub. coctorum in aqua hor. excorticati. Itē ciceria ipsa facta aut kist ipsorum sunt praestantia ad nutriendum pulmonem secundo canon. capite proprio. Item ptisana hor. cum saccharo est praestantissima, & aliquando ponitur mel in cibis eorum ad abstergendum quando non timetur calid. eius, panatella quoque cum semine communibus frig. spinachia. atriplicis, blites borag. buglos. quibus potest addi parum feniculi aut petros. ius galli decrepiti cum saccharo & semine communibus frig. item brodetum ex uitellis ouorum cum albumine addendo modicum sacchari, aut uitellis oui cum lacte debite coctis cum albumine aut sine. Sed & ad consolidandum cum adest sputum sanguis, dantur portulaca, lentes abiecta prima aqua far, ptisana ex farina amyli, rizum, panicum, spelta, trit. siue alaganae & proprie coctæ cum aqua calibea. Item carnes uiscosæ, sicut pedes & rostra animalium bene conditionati, alixi, aut alsi non frixi. Sed ratione hecticae conueniunt cucurbita, portulaca, broderi, lac, testiculi gallorum nondum coeuntium, cerebella hœdorum, hepata gallinarum, cancri debite preparati, sicut preparantur in hectica. Item limacia, ranæ, testudines, quæ debite abluantur & preparantur. Quod si salatas effectare concedatur eis aliquando lactuca, endiuias, borago, cichor. lupul. quæ debite coquantur & cum uino granat. & cum saccharo cōdiantur. Lac autem ad omnia huiusmodi est conueniens: abstergit enim per partem serosam, consolidat per partem casealem: humectat per partem butyrosam. Si ergo uolumus exhibere ipsum ratione hecticae sint animalia, quorum lac sumitur nutrita rebus humectantibus & infrigidantibus. Si uero uolumus ulcus abstergere, nutriantur rebus stipticis & inuiscantibus, & ponatur in ipso panis bis coctus, & sit lac calibeatum aut coctum cum lapidibus. Modus autem est, ut quinta pars aquæ pluuiæ lis cum lacte misceatur, postea calibis feruens teratur pluries in ipsum mittatur, uel lapides fluuii igniti sine fumo, & si aqua secum permixta esset calibea, esset praestantius, & melius, ut ante calibeam butyrum sit extractum. Ex lactibus magis conueniens est lac adolescentis puellam lactantis, scilicet quam peperit, si uis ipsum frigidius, sit nutrita lactucis, cucurbitis, & similibus, & si uis abstergere sit nutrita hordeo, & ciceribus, & si uis consolidare aut sanguinem sistere, sit nutrita rizo, panitio, kist lentium, alaganis, piscibus, & carnibus uiscosis, confert enim cum proprietate cadere inter indiuidua eiusdem speciei & sugatur ab ubere. post ipsum est lac capræ sanæ, rubæ, iuuenis comedentis fol. salicis lactuca, uicis si uolumus hecticae conferre. Si uero mundificare nutriatur hyssopo, hancæ, feniculo, hordeo, & cicere, & misceatur cum melle, & si consolidare & sanguinem costringere, nutriatur foliis, quercus, pirorum rubi, & similibus, uel misceatur cum saccharo rosaceo. Lac uero asininū est frigidū & humid. sed minoris nutrimenti, postea est equinum siccilans sputum & mundificans propter multam partem serosam, sed minus conglutinofum, habet enim parum de parte caseali, nec multum humectat cum habeat parum de parte butyrofa, propterea est multum nutriendum & consolidans, humanum itaque confert cum proprietate, asinum cum infrigidatione & humectatione, et notabili abstersione, sed caprinum cum mediocritate sua habens stipticitatem plus magis aliis ualet ad consolidandum. Equinum uero propter multam serositatem magis ualet ad mundificandum. Sed ouinum & uaccinum cum sint crassiora & habentia multum de parte caseali & butyrofa ualent magis ad nutriendum & consolidandum, & penes Auic. asinæ debent esse elongata à partu quatuor uel quinque mensibus. Mulieres uero per mensem, & credo quod capræ debent esse elongata à partu, sicut mulieres, oues autem & uaccae sunt mediæ inter utrunque. Lac uero bestiarum propter abhominatorem non sugatur ab ubere, sed in uase mundo fumatur & tepidum sicut mulgetur bibatur, iam præcedente cibi digestionem celebrata & tardet comestione per tres horas, aut tanto tempore, donec

fit digestum. Et Mesue dicit quod cum lacte dentur tortellæ triturræ, id est panis bis coctus, quod maxime uerum est ubi opus sit consolidare aut sanguinem sistere, secundum Rasim dat lac cum pane, Auicem. uerocum saccharo. & inchoandū est à modica quantitate per duos aut tres dies, ut puta ab. 3. postea dentur quatuor per totidem dies & sic paulatim augendum est, donec perueniatur ad. 3. 6. uel plures, & detur primo semel in die, postea bis & secum alius cibus non commisceatur nec sumatur, donec digestus sit. Ista autem gradatio fit, ut natura assuescat & non inducat lubricitatem uel febrem. Et post lactis consumptionem non dormiat nec exercitetur. Rasis autem tantum confidit in lacte ut dicat quod quanto plus potest loco aquæ in potu sumat, dat enim ipsum in potu quotidiano, & ipsum cum cibis aliis commiscet, hoc autem uerum est in illis, qui potui lactis multum assueti sunt & si febrem induceret, curetur febris, postea redeat ad lac, & si induceret lubricitatem uentris permisceatur secum aliqua stipica ut coralli, ros. hypocytic. & similia, & si tulsis in festaret apud Auicem. secum ponatur tragachan. quod est peccatorale prohibens catarrhum, & si propter debilitatem stomachi multiplicaretur uentrositas, secum misceatur cyminum uel carui uel si timeretur, febris trochisci, diarhodon, & lac coctum uel calibeatum minus multiplicat uentrositates & uentrem sistit. Si uero uolumus ipsum esse uentris lenitium sumatur cum saccharo, & pauco salis. Lac uero acetosum est conueniens ad extinctionem caliditatis ad sedandum scitum, & modus acetosandi est, ut accipiatur lac caprinum bonum & extrahatur butyrum, postea dimittatur die aut nocte una in aere ut temperetur, postea agitur uehementer & proiciatur spuma & est exiccacium, & constrictiuium, & consolidatiuium. Casei quoque nouiter facti non saliti sunt præstantes, & similiter lac coagulatum & capita lactis conueniunt ubi opus esset refumere, & humectare, & febre hecica existente remissa. habent enim multum de parte buti rosæ apta inflammationi, memorando semper quod lac conceditur & est præstans cibus medicinalis præterquam in quinque casibus de intentione Hippocratis in textu explicitis. Butyrum uero prohibetur propter aptitudinem ad inflammationem. Ius quoque caulium conceditur impinguatum cum gallis. Carnes pullorum cuiuscunque generis & auium bene conditionatarum. Item hoc di capreoli & agni aliquantulum crassiores, & castrati anuales, & pulmones suprascriptorum animalium conferunt cum proprietate. Pisces etiā bene conditionati conueniunt qui sunt boni chimis, facili digestiois, paucarum superfluitatum, parui in specie sua, degentes in aquis laudabilibus, & comedantur alixi aut alsi, similiter carnes. Oua conueniunt secundum omnem modum administrationis modo sunt mollia, non per decoctionem indurata. Olea uidentur nisi oleum amygdalinum dulce. Fructus conuenientes qui aliquando concedi possunt, sunt persica, melon, angu. sed in fine mensæ sunt pineæ quater in aqua feruenti infusæ & quater exiccatae solæ aut mixtæ cum passulis. Similiter amygdalæ præparatæ cum passulis mixtæ, ex saporibus conueniunt, agrestia aut uinum granatorum cum amygdalis & saccharo mixta, cui possunt ad libitum addi passulæ. Potus ipsorum non febricitantium febre putrida, penes Rasim esset lac. Sed febricitantium est aqua hordei, aut aqua sacchari, aut aqua hordei, decoctio cancerum fluuiatium, quæ fit hoc modo, cacci fluuiatiales abiectis extremis & corticibus, lauenter ter aut quater cum aqua cineris salita, deinde bulliant duæ aut tres uncie ipsorum taliter præparatorum in. 2. lib. aquæ hordei, donec optime cocti sint, aut aqua hordei cum iulep ros. aut uiol. Et si adesset uel timeatur sputum sanguinis bibat aquam calibeatam, aut solam cum syrupo myrtino. Vinum uero cõceditur apud uirtutis debilitatem, & etiam fortibus ubi non sit magna inflammatio, sed sit pauciferum aliqua li attinens dulcedini album subtile cum sufficienti quantitate aquæ temperatum, maxime in mensa, sed extra horas cibationis non conceditur, maxime autem uinum concedendum est his, qui uino multum assueti sunt. Cito enim & multum restaurat & nutrit. Sed Auicem. placet aqua pluuialis, panis autem sic similagineus, id est, ex optima frumenti farina, medicriter coctus, non salicus, magis fermentatus cum opus est mundificare, sed minus cum opus est consolidare, & fari-

næ frumenti posset addi farina milii, aut hordei secundum exigentiam. Somnus nocturnus prolixus, scilicet septem horarum, aut plurium conceditur, sed sit interruptus, ut expuat secundum exigentiam, meridianus uitandus est nisi aliqua occasione somnus nocturnus omiserit, & sit distans à cibo per horam cum dimidia, multum tamen debilibus & consuetis meridianus conceditur & dormiant capite eleuato ad alterum latus declinante. Procurentur omnes euacuationes à natura institutæ, & præcipue euacuationes capitis per conuenientes regiones, imo etiam non naturales, longo tempore consueta. Timenda tamen magis nimia uentris fluxitas quam stipticitas. Coitus uitandus est. Exercitium nullum uel leuissimum, deambulatio tamen ante cibum eis conceditur, post cibum quiescant per duas, aut tres horas, frictions tamen leues stomacho ieiuno conueniunt, sint sperantes & gaudentes, uident iram, tristitiam timorem, & similia corpus exterminantia. Restauratiua quoque ex uariis composita secundum exigentiam sunt in his casibus præstantia. Sunt enim cibi medicinales, sicut huiusmodi. 1. pulparum caponis, uel gallinæ unius anni tantum, uel duorum bene pinguis, aut phasiani, uel perdicis, uel franquillini, aut harum omnium, aut plurimum siml unciæ sex. Et huiusmodi carnes sint elixæ sufficienter coctæ, non tamen multum, imò melius est, ut sint parum coctæ, quam nimium, & si timeretur fluxus uentris, melius est, ut sint assatæ, amygd. excortic. 3. unam, pinearum præparatarum. 5. s. auellandarum mundatarum seminum conmunium frigidorum. ana. drach. 2. amyli. 3. 1. passularum electarum. 3. 6. liquiri. rasæ. 3. s. margaritarum perforatarum, gēmarum, electarii de gemmis sine speciebus, ana. 3. 1. scoriz ferri præparatæ. 3. s. mentha sicca, tragachan. gummi arabici, ana. 3. s. specierum tria sandalorum sine camphora. 3. s. specierum diarhodon abbatis. 3. 1. coral. rub. boli armeni, ana. 3. 1. seminis papaueris albi, sem. plantag. seminis portulacæ, an. 3. s. pulparum, sebesten. 3. 2. sacchari optimi, penidiorum, an quantum sufficit, fiat confectio in forma solida in morsellis cum sufficienti quantitate aquæ rosacæ, aut uiol. aut plātæg. aut acetosellæ, aut buglossæ, secundum exigentiam. Quod si appetitus esset, deiectus dimittantur ea, quæ non sunt boni saporis, sicut species diarhodon abbatis. Aliquando uero ad datur aromata cordialia, sicut gariophil. & stomachica, sicut lignum aloes, & galanga, & hepatica, sicut cinnamomum secundum exigentiam si non obstat febris. Croci tamen aliquid semper est ponendum cum sit cordialis, amicus pectoris, sputum faciliens, & ponuntur iuiubæ dum intendimus in crassare. Et in hac confectio habemus multam nutritibilitatem ex carnibus, & amygdalis, hepatis confortationem ex auellanis, & speciebus diarhodon. Mundificationem ex passulis, pineis, liqui. penidiis, exiccationem ulceris, consolidationem, & sistionem fluxus sanguinis ex bolo armen. coral. tragachā. gummi arabici, sistionem catharri ex sem. papaueris, bolo armen. sebesten, iuiubis, confortatione cordis, remissionem hecicæ ex margaritis & gemmis, speciebus tria sandalorum, & similibus. Confortationem hepatis ex scoriz ferri, & stomachi per metham, & aromata. hac ergo confectio ne uti potest, tam in horis cibationis, quam extra horas cibationis sumendo unum morsellum, aut plures secundum exigentiam cum potu, aut sine potu ad libitum, & potest ex his fieri electarium addendo plus de aqua rosacea, aut alia simili. Item addedo brodium carniū suprascriptarum, cuius pars nimis pinguis est eligenda. Alius cibus medicinalis apud Mesue est huiusmodi. 1. lactis acetosi, de quo supra. 3. 3. tortellarum de sceni bene tritarum. 3. 1. bulliat leui ebullitione donec adinuicem optime misceantur, & sumantur stomacho ieiuno, & non comedatur aliud nisi illud sit digestum, & sequenti die addatur suprascriptæ quantitati aureus unus laetis, & aliquid de tortellis diminuat, & sic procedatur quo libet die addendo aureum unum lactis, & miniendo parum tortel. donec deueniatur ad exhibitionem lactis puri. Cum autem peruentum fuerit ad declinationem eggritudinis, tunc incipiamus diminuerē aliquid de lacte acetoso, & addere aliquid de tortellis de sceni, donec paulatim deueniatur ad exhibitionem tortell. tantum. Tortellæ autē sunt panis bis coctus.

Particulare uero regimen habet quinque intentiones. Prima est ulceris mundificatio, & absterfio. Sed hic notandum

dum quod ubi à spūto sanguinis fuisset facta phthisis, aut ubi timeretur spūto sanguinis abstergentia sint leuiora ne fluxus sang. reiteretur, unde in hoc casu sufficeret aqua hordei excorticati, cum saccharo, & proprie ubi adesset febris, & in corpore iuuenili, et tempore calid. Sed in tempore frigid. & corpore senili cum pauca febre, & spūto sanioso existente crassiori utemur aqua mellis, cuius descriptio est, accipiatur mel. ʒ. i. aqua. ʒ. 8. bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & aliquando augetur dosis aqua ubi oportet magis infrigidare. Et fortius ipsa est ius cicerum cum saccharo, aut melle & adhuc fortior est decoctio hyssopi, & cum saccharo, & adhuc fortius cum melle. Et adhuc fortius est loch de caulibus, idest, succus caulium cum melle inspissatus. Et fortissimus est loch de scylla, diaris, & similia. De his tamen fortibus datur pauca dosis, sicut à drach. vna usque ad duas, & possunt exhiberi mane, & sero stomacho ieiuno cū aqua mellis, aut hordei. Sed forte tutius est, vt hæc fortia sumantur lambendo, ne febrē augeant, sed ubi esset maxima necessitas absterfionis, sicut in sene, & in sanie crassa cum pauca febre dantur utroque modo, & hoc tempore dantur cibaria similis intentionis, sicut ius cicerum, ius caulium, kist hordei cum melle, & kist orobi est fortius, & porrum elixatum cum aqua mellis est mundificatiuum, & maximi iuuamenti est huius. Reciperi eos affix. hyssopi, ana partes aequales confice cum melle da mane, & sero, ista tamen fortiora abstergentia apud Mesue uitanda sunt in phthisi quantum est possibile, dūcūt enim ad spūto sanguinis, & augent febre, & liberius in asthma te concedi possunt. Secunda intentio est prohibitio transitus materiei ad pulmonem, quæ intentio duobus modis perficitur, scilicet regendo membrum mittens ne materiam trā smittat, sicut cerebrum, cum his, quæ dicta sunt in capite de catarho, & in summa cuiuscunque membri mittentis dispositio corrigatur, ut materię per aliam regionem deriuentur. Secundo attendatur confortationi pulmonis ne recipiat, & ex eis est rob. myrti, aut syr. eius cum. 3. 2. pulmonis nulpis preparati secundum artem. Et ex medicinis mirabilis iuuamenti aggregantibus uirtutis confortationem, & mundificationem est medicamē Gal. Recipe pulmo. nulpis sicci, succi liquiritiæ, capillorum ueneris, seminis foeniculi, ana confice cum rob. aut syrupo myrtino. Modus autem preparandi pulmonem nulpis est, ut diuidatur in frusta, lauetur cum uino albo. Deinde bulliat in aqua rosacea in qua aliquid granatorum myrti crasso modo contusorum ponatur una ebullitione, postea abstergetur, & lauetur cum uino, & aqua ros. deinde excicetur donec possit puluerizari. Tertia intentio scilicet excicatio, & resolutio materierum, quæ sunt in pulmone, perficitur cum his, quæ lambuntur, & suffumigantur, & sumuntur, quorum copiam superius habuisti in cap. de tussis. Est etiam canon in usu harum medicinarum seruandus. Et Gal. multum utebatur theriaca, & mithridato, tamen hæc medicina propter heciticam mihi magis suspecta sunt quam in tussis, aut asthma. Vtere ergo leuioribus & pauciori tempore, & ex domesticis kvtram, idest gummi cedri cum melle, & posset addi parum galbani. Quarta intentio est incarnatio, sine consolidatio. Summa autem medicinarum incarnantiū ulcera pulmonis & pectoris penes Mesue sunt sanguis draconis proprie lutum sigillatum, lutum armen. karabe, sedene gi, idest, lapis hæmatitis, olibanum, mastix, balaustia, rosa, & semen eius, corallus, sem. portulacæ assum, amyli assum, sem. malux, & althææ assū, sem. arnoglossæ assum, gummi, assum, gran. myrti, & similia. Materialia autē cum quibus hæc sunt danda, sunt sicut, uitelli ouorum, lac dulce & acetosum, aqua pluuialis & proprie calibeat, aqua hordei, decoctio cancro rum fluuiatium, aqua sauc. idest, hordei torrefacti, succus cyton. idest, miua, succus myrti, rob & syrupus eius, mucilago psylli, & sem. cyton. syrupus de papauere, uiol. ros. & similia. Ex medicinis autem compositis sunt croci de luto sigillato, de luto armenico, philonium persicum, & est ultimum, mundificat enim & desiccatur putredines, & consolidat ulcera, & sistit catarrhum, & spūto sanguinis, & tussim sedat, & multa alia habet iuuamenta, & est apud Mesue in cap. de spūto sanguinis in fine. R. sem. papaueris albi, hyoscyami, añ. 3. 20. terræ sigillatæ, opii, ana. 3. 1. sedene gi, croci, ana. 3. 5. calthorei spicæ pyrethri, euphorbiæ, margaritarum non perforatarum,

karabe, zedoaria, doronigi, ramich, idest galliæ musc. ana. ʒ. 1. camphoræ. ʒ. 1. tertiam, confice cum melle ros. colato quantum sufficit dosis est ʒ. 3. usque ad. 1. cum suc. arnoglossæ, aut aqua rosac. & modico uini puri, sed credo non esseandum, nisi post fermentationem, scilicet post tres menses. Ex rebus autem mirabilibus ad cōsolidationes ulcerum pulmonis est saccharum ros. recens, idest eiusdem anni: aggregatur enim in eo uirtus absterfionis ex parte succi rosa. & uirtus cōsolidationis ex parte substantiæ earum. Virtus enim absterfionis propter antiquitatem absconditur, quæ adhuc possidetur in recentibus, & Gal. præcipit dari saccharum ros. singulis diebus in quantitate plurima cum rebus medicinalibus & cibaliis, ita quod etiam cum pane. Et post eum plurimi usi sunt & non comprehensibilis est numerus eorum, qui sanati sunt ex eius usu, tamen prius præcedentibus mundificationibus. Falluntur enim uerentes à principio dum mundificationem non præcessit: coarctat enim in pulmone materias. Mesue autem dat ipsum non febricitantibus cum lacte calido, febricitantibus autem cum aqua hordeacea, decoct. cancrorum fluuiatium, & aliis multis modis, & inuenit ipsum esse utilissimum. Verum quoties eius administratione contingit contrahi anhelitum, datur ea, quæ elargant ipsum ex his, quæ educunt saniem, sicut proprie syrupus de hyssopo, & similia, & si accidat super calefacto propter excicationē eius, quod potest esse quia siccitas accendit calorem, datur syrup. de iuibis, uiol. mucilago psylli, aut citonii, cum aqua grā. dulce, aut aqua expressionis, scilicet portulacæ cum trochiscis de camphora, & si sequatur post ipsum constipatio uentris datur muraba de uiolis, idest conditum de uiolis, & est saccharum uiolatum, aut datur syr. uiol. cum aqua hordei. Et postquam cessauerit redeatur ad saccharū ros. Credo tamē quod saccharum ros. nouum nō ita stringit uentrem, sicut antiquū, nam succus ros. ponitur inter solutiuā, & hoc sacch. ros. summis laudibus extollit. Auic. in capitulo proprio, & adducit in exemplo forminam illam quasi mortuam ex phthisi, quæ sanata est comestione sacchari rosacei. Et dicit Auicē. quod non est possibile, ut dicat summam sacchari ros. quod comedidit, & quidam modernus medicus dixit quandam comedisse quadringentas lib. sacchari rosacei cum quo sanata est. Quia intentio, scilicet correctio accidentium complentur fecit dum ipsorum exigentiam. Accidentia enim concomitantia sunt consumptio & debilitas, tussis, quæ interdum modum excedit. Superuenientia sunt spūto sanguinis, fluxus uentris, constipatio, fastidium, febris putrida, uigilix.

Consumptioni quidem subuenimus cum eis, quæ humectant, & cibis & potibus, tam qualitative, quam sustantice, scilicet cum administratione lactis, confectio num restaurantium, & ciborum, quorum parum, multum nutrit. Item cum balneatione in aqua dulci postquam uentum est ad declinationem. Nam ante illud est res prauior, & est ponere ægrum in desperatione, & post balneationem ungere corpus cum oleo uiolarum. ʒ. 2. rosacei. ʒ. 1. amygdalarum dulcium. ʒ. 1. sem. pinguedinis porci recentis decies lotæ cum aqua frigida, & in fine cum aqua uiolacea. ʒ. 5. quibus potest addi mucilago psylli, & similia. Modum autem balneandi prolium require ab Auic. in capitulo de hecetica, & à Mesue in capitulo de phthisi. Tussis autem, si modum excedat subueniendum est, sicut dictum est in capitulo proprio, & similiter de spūto sanguinis, præcessit caputulum proprium, ad quod recurrit. Sed fluxui uentris succurrendum est cum medicinis Rasis in textu, sunt enim præstantia. Constipationem autem, quæ tamē non est multum timenda succurrimus facile cum enemate lenituo infrigidante, & humectante, sicut ex lacte, saccharo, uitello oui, & oleo uiol. & apud maiorem necessitatem addatur calsia, aut mel uiolaceum similiter lac sumptum cum multo saccharo, & sale, & iure gallinarum cum saccharo, & passulæ, & similia sunt præstantia. Fastidio autem, & deiectioni appetitus cum exhibitioni citoniorum, pirorum, & similitum in miua, & succo citoniorum, & salitis, de quibus supra & cum emplastro de pomis coctis in uino & aceto, cui addatur rosæ, & galliæ musc. & stomacho applicetur. Febris autem subuenitur cum exhibitione aquæ hordei, & psifanæ hordeaceæ, & si inualeceret febris putrida constante uirtute digeratur humor faciens febre, & euacuetur secundum exigentiam,

tiam, sed cum leuibus. Vigiliis subueniatur cum emulsionibus papaueris, & syrupo eius, quæ si non sufficerent detur ali quid opiatum, sicut. 3. i. philonii persici, aut pilula una opia ta ex pilulis alchaiber, dictis in cap. de catarrho & tussi, & hæc est cura vera si fuerit possibilis. Quod si cura vera non uideatur possibilis administraretur cura blanditiua, & paliatiua, quæ secundum Auicem. est regimen indurans & exiccans faciens crustam & escaram in superficie ulceris, ut prohibeatur dilatio, & profundatio ulceris, licet cum hoc regimine non speretur incarnatio, & consolidatio. Et in hoc est spes in prolongatione uitæ patientis licet hæc uita parum sit dilecta, & lædatur à quolibet errore: dimittatur ergo lac, & cætera humectantia & primo facta aliquali mundificatione procedat ad consolidantia, exiccantia notabiliter, sicut sacch. ros. diatrachantum in quibus ponitur bolus armenus, & terra sigillata, sanguis draconis, lapis hæmatitis, & similia. Item trochisci de terra sigillata, de Karabe, & mixti cū sacch. ros. quæ lambantur & deglutiantur, & sedetur tussis cum papauere. & ex his quæ sunt ex papauere, & cum trochiscis suprascriptis si aliter sedari non potest, sumatur aliquid opii, & philonium persicū, ualeat in hoc casu, & comedat assata, & pulmo uulpis mixtus cum trochiscis de terra sigillata, & syrupo de myrto est præstant medicina, tam sumpta labendo, quam deglutiendo. Vlcus uero canne pulmonis quod cognoscitur; quia dolor est in medio colli antèrius, aut posterius: non tamen plurimum & accidit cū hoc pruritus in corpore rauedo uocis odoris foetidus, sputū paucum saniosum, quod ex creatur cum tussis aliqua pauca, & rascatione plurima. Et fortassis præcessit apost. in eadem parte significatum per febrem debilem & dolorem pulsatiuum in eadem parte curatur cum eodem regimine uniuersali, & particulare, quo curatur ulcus pulmonis, sed elaborandum est, ut medicina maxime abstergentes & consolidantes fumantur lambendo. Dicit enim Auic. quod æger iaceat super collum suum, & teneat medici nam in ore, & deglutiat saluam suam paulatim, ita ut non immitat plurimum subito & excitet tussim, & oportet ut mollescat lacertum gutturis sui, ita ut descendat ad guttur ipsius absque excitatione sordis, id est, doloris. Medicinæ autē mundificatione sunt, sicut diatracham. cum pauco melle mixtum, aut diatracham. cum loch de pino, sed consolidatiua sunt sicut sacch. aut diatracham. cum bolo armeno, & terra sigillata, reformata adinuicem cum syrupo de myrto, & his posset addi parum pulmonis uulpis præparati, & bolum armenum solum, aut terra sigillata solum in ore retenta præstans in consolidatione. de ulcere autem pectoris sufficienter dictum fuit superius in pleuresi, & empyemate, & qualiter pleuresis non uera secanda sit, aut urenda, si tumor, aut dolor, aut qualitas mutata communicentur cuti. Et qualiter post sectionem sanguis restringendus est, & labia uulneris dirigenda, postea mundificandum, & consolidandum sit, & si uratur qualiter escara remouenda, postea mundificandum, & consolidandum, & dictum fuit qualiter in empyemate secandum sit, aut urendum inter quartam & quintam costam si alio modo mundificari non potest per screatum, uomitum aut secessum. Et si tumor, aut qualitas mutata non apparuerit in parte alia, & qualiter postea mundificandum sit, & consolidandum. Quod si ulcus sit in aliqua parte pectoris, & intrinsecum sit, eadem procedendum est cura qua proceditur in phthisi. Si uero hac uia sanari non potest, & antiquatur, & fiat fistula, quæ multoties remouetur cum emissionē sanguinis, & saniei per screatum, sicut uidi in pluribus durasse per multos annos, nulla est uia incuracione nisi aperiatur exterius. Quod tamen nullo pacto facere debemus nisi tumor, dolor, & qualitas inuenta communicentur exterius, id est ex directo doloris intrinseci cōfueri, & in eo casu tutius est primo cauterizari locum tumorem cauterio potenciali, quod satis notabilem partem capiat, ut ad locum ulceratum peruenire possimus. Non tamen profundetur nisi ulque ad costas, postea remota escara tentemus cum sagittella paulatim perforare usque ad locum ulceris donec uideamus saniem egredientem, postea mundificetur, & consolidetur. Si uero aliquid costæ esset corruptum, tentemus cum medicinis, aut cauterio actuali euellere partem corruptam, postea mundificare & cōsolidare, &c. & sic Deo duce fit finis huius capituli.

De passionibus cordis. Cap. 73.

Via hic agitur de passionibus cordis ante omnia iuxta consuetudinem præmittenda est cordis anatomia. Cor descriptiue est membrum principalissimū mediocris quantitatis, figuræ pyramidalis in medio corporis situm, osse cartilaginose sustentatum ex pinguedine, uenis & arteriis, & carne, cū uillis longitudinalibus, & latitudinalibus, & transversalibus constitutum, tribus uentriculis, & duabus auriculis diuisum, capsula panniculari circumdatum, uenarum & arteriarum origo, diastolen habens & systolen, spiritus & uirtutis uitalis sedes & principium, & quidē principalissimum. Nam cum quatuor sint membra principalia. Vnum, scilicet testiculi ordinati in conseruationem speciei, reliqua tria, scilicet cor, hepar, & cerebrum, ordinata in conseruationem indiuidui, cor inter hæc est principalissimū est enim primum, quod uiuit, & ultimum quod moritur, imò ex uirtute uitæ cordis est, quod quando auferetur ab animali inuenitur pullare usque ad horam per temperamentū suum generans spiritum uitalem necessario ad quancunque alterius membri operationem concurrens. Est autē mediocris quantitatis in genere membrorum hominis, licet in comparatione ad corda aliorum animalium homo habeat maximū cor respectu suæ molis, quod fuit, quia homo habet plus de calido innato quantitatiue, non autem intensiue. Vnde nota quod animalia habentia parum calidi cum magnitudine cordis, sicut lepus, ceruus, sunt timida, ex eo quod pauco existente calido corda eorum non sufficienter calefiunt. Cum quo tamen stat, quod animal audacissimum cum habeat multum de calido, habeat etiam cor magnum, sicut homo, leo, equus & similia. Dicitur figuræ pyramidalis, ut cum sit calidissimū inter membra assimiletur primo calido, scilicet igni, & etiā cum figura illa uentriculi melius distinguuntur, & tertio, si esset uniforme per totū in crassitie, sicut est in basi nimii grauitaret. Basis autem est altior pars eius, ut sit longinquum ab appodiatione super ossa pectoris, & non lædatur tactu eorū & conus factus est subtilis & durus, ut minus posset lædi cō tactu ossium pectoris. Est autem in medio corporis situm inter sursum & deorsum demptis extremis ante & retro, dextrorsum, & sinistrorsum sicut rex in medio regni declinat tamen cum acutè ad sinistram, ut ipsum calefaciat. Calefit enim dextrum per hepar. Dicitur sustentatum osse cartilaginose: oportet enim omne quod mouetur sicut cor inniti alicui fixo: illud autem est magis osseum, & durum secundum partem coniunctam dorso, & est magis molle, & cartilaginose secundum partem coniunctam cordi ne molle lædatur ex cō tactu duri: maximum autem os cordis, & durum est in elephantis, licet os cerui sit magis cordis confortatium licet humanum forte magis cōfortaret cum proprietate currente inter indiuidua. Est autem compositum ex pinguedine secundum eius superficiem magis ex hac, generata, scilicet ut prohibeat cordis exiccationem, quā sit generata merito agentis cum pinguedo generetur à frigido, & cor sit calidissimū. Credendum tamen est aliquam partem frigidam ipsius sicut panniculum concurrere ad ipsius generationem. Et est compositum ex uenis, arteriis dispersis per eius substantiam. Nam immediate à uena chilis oriente à corde nascitur quædam uena, quæ per cordis partitur substantiam. Et ita ab arteria aorti descendit ramus, qui similiter transit per cordis substantiam. Et est compositum ex carne dura cum habeat sustinere multos & fortes motus, in quo sunt illi longitudinales ad attrahendum, transversales ad retinendum, latitudinales ad expellendum. Et est tribus uentriculis diuisum unus dexter, alius sinister tertius medius. Dexter quidem ad continendum sanguinem qui trahitur ab hepate per uenam chilis, ut in eo mundificetur secundum exigentiam membrorum nutriendorum. Latere uero huius uentriculi non sunt ualde crassa cum debuerint continere sanguinem non facile resolubilem. Venterculus autem sinister fuit ad continendum spiritus, propterea factus est crassius & densus cum debuerit rem subtilem facile uaporabilem continere. Et secundo, quia debuit per digestionem spiritum generare, ad cuius generationem fortis requiritur caliditas, quæ magis est in subiecto & denso, & multo quā pauco & raro. Tertio, ut sinister uentriculus per grauitatem suæ substantiæ cō-

tra

tra operetur gravitati ventriculi dextri ratione gravitatis sanguinis, ut esset æqualiter graue per totum, & basis quidem ventris sinistri est altior quàm basis ventris dextri, sed basis ventris dextri descendit multum, & est ualde maior quàm sinistri. Tertius autem uentriculus est paries qui est in medio dextri et sinistri, in quo sunt multa foramina penetrantia utrinque: non tamen recte sed curue, & hæc orificia sunt ampliora uersus dextrum, quàm uersus sinistram, ut sanguis conuertendus in spiritum recipiatur in illis foraminibus, & sic receptus paulatim transeat ad alium uentriculum, & iterum pertransendo per digestionem conuertatur uersus naturam spiritus & tandem factus uapor formam substantialem spiritus uitalis accipiat in uentriculo sinistro. Et illa foramina siue uia dilatantur in ipso cum dilatatur cor, & coarctantur apud longitudinem eius, id est, cum constringitur, & temperatio sanguis in medio continetur. Habet autem duas aurículas, unam in dextris alteram in sinistris, quæ adhuc factæ sunt, ut si aliquando repleatur multum sanguine, spiritu, aut uapore illæ auriculæ impleantur: sunt enim tenues, duræ & extensibiles adhuc ne calor innatus suffocetur. Cum autem contingit hæc paucificari, illæ auriculæ contrahuntur: hæc tamen auriculæ corde dilatato tenduntur & implentur, sed ipso contracto mollescentur, & euacuantur. Sed forte quis obijceret sicut obijcit Gal. 5. interior. cap. 2. quare non fecit natura cor, ita magnum, quod posset continere omnem multitudinem sanguinis, & spiritus. Sed fecit illa additamenta. Respondetur si cor fuisset ualde magnum esset causa debilitatis uirtutis propter dispersionem spiritus, cum spiritus & sanguis paucificarentur. Secunda causa, quia euacuat ponderositas, quæ esset ex cordis magnitudine. Illæ enim auriculæ leues & tenuissimæ sunt, & sanguine, & spiritu multiplicatis extenduntur, ipsas diminutis contrahuntur, & sic uitatur uacuitas & ponderositas, quæ sequeretur ad cordis magnitudinem. Est autem circumdatum capsula, quæ est panniculus durus ordinata ad tutelam cordis, & ut contineat aquositatem, quæ in illa continetur ordinata ad humectationem cordis, ne ex motibus exicetur. Quapropter cum illa minuitur, aut totaliter consumitur cor, & totum corpus marasmat & tabescit. Cum autem exerceat præter modum, tunc incurrit cor tremorem aut iectigationem, & apparet homini, ut cor eius suffocetur hæc autem capsula, licet sit ex genere panniculorum: tamen non inuenitur panniculus ei compar in spissitudine, ut sit cor discipulus, & tutum, & separatum est cor ab illo panniculo cum quantitate quadam nisi apud radicem ipsius, ut dilatetur in eo absque præfocatione. Est autem origo uenarum, & arteriarum, quoniam à uentriculo dextro oritur uena chilis, cum ibi sit crassior quàm in alia parte, & postea ramificatur in chilim ascendente & descendente, & stipes ille qui egreditur à corde non ulterius procedit. Et in origine istius uenæ sunt tria hostiola, quæ aperiuntur ab extra ad intus cum cor dilatatur & attrahit sanguinem, & clauduntur ab intra ad extra cum cor impellit sanguinem per uenam chilim ad nutriendum membra, sed non clauduntur perfecta clausione: huius autem causa fuit, quia cor plus attrahit sanguinem per uenam chilim, quàm postea quando mundificatus est, expellat per eandem, remanet enim in eo sanguis nutriturus cor & pulmonem & conuertendus in spiritum. Item est aliud orificium in eodem uentriculo à quo oritur uena arterialis nutritura pulmonem quæ dicitur uena, quia non pulsatur: arterialis, quia habet duas tunicas, ut melius conseruaret sanguinem subtilissimum, & propriè in pulmone qui est in continuo motu, & in orificio eius sunt tria hostiola, quæ aperiuntur ab intus ad extra cum cor constringitur & impellit sanguinem ad pulmonem, & constringuntur de extra ab intus perfecta clausione. cum cor dilatatur, cuius est ratio, quia per hanc cor expellit & nihil recipit. In sinistro uentriculo sunt etiam duo foramina, unum arteriæ aorti quæ dicitur aorti, quia immediatè oritur à corde, uel quia omnes arteriæ ab ipsa originantur, & in eius orificio sunt tria hostiola, quæ aperiuntur ab intus ad extra cum cor constringitur, & impellit spiritus ad membra per hanc arteriam, & clauduntur ab extra ad intus cum cor dilatatur, & recipit aerem ab arteria. Quapropter credo quod non perfecta clausione claudantur, sicut quidam dicunt cum aliquid cor recipiat. Est etiam in eodem uentriculo, aliud ori-

ficiū in quo originatur arteria uenalis, quæ dicitur arteria quia pulsatur, & dicitur uenalis, quia non habet nisi unam tunicam, cum non debeat nisi continere aerem & uapores capnosos, & habet duo hostiola in eius orificio, quæ non perfecte clauduntur: est enim ordinata ad expellendum fumos, & aerem inutilem ad pulmonem, & tandem egreditur per tracheam arteriam & os, & ad attrahendum aerem frigidum à pulmone cum cor dilatatur. Omnes autem aliæ arteriæ præter istam habent duas tunicas, quarum durior est intrinseca cum ipsa sit obuians percussioni, & motui substantiæ spiritus forti, cuius intenditur conseruatio, custodia & fortitudo habet autem cor diafolem, ut cum dilatatur recipiat aerem frigidum à pulmone & arterijs, & habet systolem, ut cum costringitur expellat sanguinem per uenam chilim ad membra & sanguinem ad pulmonem per uenam arterialem, & aerem inutilem ad fumos per arteriam uenalem: est autem sedes & principium spiritus, & uirtutis uitalis, quia deputatus est, & est proprius pro operationibus uitalibus: cum hoc tamen concurrat tanquam agens uniuersale ad quamcunque operationem alterius membri, & motus cordis non est uoluntarius, propterea non est lacertus, licet sit simillimus lacerto, & sic patet anatomia cordis. Ex quo sequitur quod cor est ualde calidum, & aliquid siccum, & potest pati omne genus agitudinis, scilicet complexionis cuiuscunque generis sine materia, & cum materia sanguinea, cholericæ, phlegmaticæ, & melancholicæ, aquosæ & uentrosæ cõtenta in uenis eius secundum plurimum, quæ mala complexio cum confirmatur ad hunc intellectum, quia sit maxime fixa, aut in ultima sui malicia, non recipit curam. Si uero est confirmata, quia esset in statu, aut quia esset facta independens bene posset recipere curam. Cõplexio tamen frigida esset deterior quàm calida & siccæ, quæ humida, & hæc malæ complexionis sunt minus corrigibiles in corde quàm in alijs membris, quia cor licet alijs membris ferat subsidium, à nullo tamen suscipit subsidium, aut saltem nõ tantum suscipit subsidium, quantum alijs tribuit. Potest etiã pati malam compositionem, & propriè opilationes propter quas spiritus suffocantur in corde non inuenientes spiraculum. Et aliquando malum situm multa acquisitione capsulæ comprimunt ipsum. Patitur etiam solutionem continui, quæ ex toto genere est mortalis. Si tamen fuerit superficialis, tardatur mors interdum usque ad secundum diem. Si uero fuerit profunda & maxime penetrans ad uentriculos interficit subito. Potest etiam pati apostema cuiuscunque generis, sed sanguineum frequentius: deinde cholicum, rarissime melancholicum, phlegmaticum, aut aquosum. Et hæc frigida sunt frequenter in capsula cordis, quæ facta in ea, licet possint chronicari, sicut in simia, Galen. tandem tamen interrimunt. Sed facta in corde ualde cito interrimunt. Nam si fuerit calidum & superficiale tardatur mors usque ad secundum diem. Cum autem profundum, interficit in hora. Si autem fuerit frigidum, & superficiale potest tardari mors usque ad quartum. Si uero profundum usque ad sequentem diem. Ex quo inferitur quod apostema calidum est deterius quàm frigidum, licet mala complexio frigida sit deterior quàm calida, cuius diuersitatis causa est, quia apostema ex toto genere mortale, & illud est deterius quod citius interficit. Sed mala complexio frigida non est ex toto genere mortalis, & salubrior cæteris paribus est calida quàm frigida, licet forte calida excessiua mortalis citius interficeret quàm frigida mortalis. Est enim caliditas acutior quàm frigiditas. Patitur etiã borbor, siue pustulam paruam, quæ tandem interficit cum egressu sanguinis nigri per nares, quia niger effectus est, mortificatis spiritibus, per quorum præsentiam reddebatur lucidus, dolores etiam non potest longo tempore tolerare, sicut nec alia nocumenta fortia: propter hoc apud Auicennam decoloratur, id est, syncopizatur, uel in cuius corde inuenitur ex nocumentis quod inuenitur in reliquis membris. Agitudines autem cordis famosæ ab autoribus nominatæ sequentes agitudines sunt præscriptæ sunt quatuor, debilitas cordis, pulsus, tremor, syncopis, quarum causæ differunt secundum magis & minus. Causæ enim ægræ cum sint leues faciunt cordis debilitatem, ita ut fiat impotens ad operationes. Aliqualiter auctæ faciunt pulsus cordis efficaciter imprimendo in cor. Cor enim se concutit, ut nocumentum expellat faciendo uariationem in motibus

motibus, scilicet ex magno ueloci uel frequenti ad paruum, tardum, uel rarum, aut econtra, quæ mutationes si non fuerint magnæ ualde aut frequentes, aut cum magna debilitate cordis, hæc passio dicitur pulsus cordis. Si autem fuerint ualde magnæ, ualde frequentes & continuæ, & cum magna cordis debilitate, tunc dicitur tremor cordis, differunt etiam alter, quia pulsus cordis magis sit uirtute existente forti tētan- te expulsiōem rei nocentis. Tremor autem sit existēte debili non potente perficere motum suum. Ex quibus infertur quod licet mutatione motum cordis sint maiores in tremore quā in pulsu, pulsationes tamen possunt esse minores cum sit debilius in tremore, sed istæ causæ multum imprimētes donec motum cordis notabiliter impediāt, faciunt syncopim & ultimatē auctā mortem. Auic. tamen sub tremore cordis comprehendit, quod est satis rationabile, cum non differat nisi secundum magis & minus. Causæ autem harum quatuor dispositionum sunt omnes ægitudines, de quibus supra per essentiam existentes in corde, sicut malæ complexionēs cuiuscunq; generis cum materia, & sine materia, malæ compositiones, solutio continui, apostemata, pulsulæ, dolores, sed de his statim sufficiēter dictum est. Causæ autem istarum per cōmunitatem sunt, aut à toto, sicut in febribus cum quarum augmento augentur, & decremento decrescunt, aut in crisi, quæ perfecta sedantur hæc passiones, aut à dolore forti cuiuscunq; membri, cuius augmento augentur, & sedatione decrescunt, & quandoq; ab euacuationibus magnis, siue fiat à toto corpore, siue à membris particularibus, sicut in apertione aposte, extrahione aquæ hydropicorum, phlebot. solutione, sudore nimio, & similibus, imò à nimia raritate corporis, aut à membris particularibus, sicut à cerebro quando in ipso multiplicatur humor melanch. qui penetrans in substantiam cerebri, postea penetrat in uias arteriarum usq; ad cor excitans tremorem cordis, pusillanimitatem, & tristitiā cum excitatione malitiæ cogitationis, & angustia, sicut aliquādo ex cerebro peruenit ad cor per hanc uiam ex humido, & facit accidere obliuionē, pigritiam & tarditatem motus, tam ad inchoandum, quā ad prosequendum. Et quandoq; propter nocumētū cerebri, & neruorum debilitatū diaphragma, & lacerti concurrentes ad anhelitum, quæ propter cor non debite euentant, neque mundificatū incurrunt huiusmodi passiones, cuius signum est nocumētū cerebri præcedens, post quod sequitur tremor cordis, & huiusmodi passiones, & quandoque accidunt huiusmodi ægitudines propter mutationem materiæ ex synanchia, pleuresi, & peripneumo. ad cor, & præfocat, & interficit secundum plurimū, & paroxysmus asthmatis frequenter cōiungitur tremori cordis, & aliæ passiones, & quandoque accidunt propter nocumētū hepatis deficientis in transmittendo nutrimentū ad ipsum, & quia mittit ad ipsum humorem, aut uaporem malignum. Et quandoque accidunt huiusmodi ægitudines propter aposte. calid. aut frigi. in capsula cordis aquosum, aut melanch. & quandoque propter multitudinem aquositate contentæ in capsula suffocātē cor, & sentit manifeste cor eius suffocari multo humido. Et quandoque propter eius diminutionem cuius defectu arefit, & exiccatur, cuius signū est corporis consumptio cum nocumētis cordis, quæ non uidentur ab alia causā pendere. Et quandoque accidunt propter nocumētum oris stomachi ab humore uilcofo, aut morficaciuo, aut uerbibus in ipso, aut intestinis, aut uomitu mordificaciuo, quia uenit cordis tremor ex eo. Et quandoque sunt propter cōmunitatem in dolore stomachi quando fit uehemens, & multoties interficit in paucō tempore, & quandoque accidunt in ipso ore stomachi tremor, & nocet cordi. Et quandoque accidunt huiusmodi ægitudines propter famem, repletionem, bochor, & ulcus in ore stomachi. Vnde propter magnam cōmunitatem oris stomachi ad cor antiqui os stomachi præcordia uocauerunt, & quandoque accidunt huiusmodi ægitudines cordis per cōmunitatem ægitudinum matricis, ex quibus est præfocatio, quæ sequitur, aut retentionem spermatis, aut membrorum mitentium malignum humorem, aut uaporem ad cor, & diaphragma. Et quandoque matrix ipsa mouetur ad superiora comprimeus diaphragma, & uniuersaliter per cōmunitatem à quocunque membro mittente uaporem ad cor mali-

gnum sua qualitate manifesta, aut occulta possunt huiusmodi quatuor ægitudines cordis contingere. Causæ uero primitiuæ harum quatuor dispositionum sunt aer pestilentialis, odores foetidi corrupti, uel uenenosi, aut sumptio rerum uenenosarum, & morsus uenenosorum, quæ omnia inimicantur cordi. Item ex accidentibus animi timor magnus & subitus, gaudium & huiusmodi. Item balneatio, labor, coitus, & reliqua ex non naturalibus rebus, aut extraneis ualde disproportionata.

Modi autem penes A. quibus significantur dispositiones cordis sunt octo, pulsus, anhelitus, creatura pectoris, ea quæ nascunt super pectus, tactus corporis, mores, fortitudo corporis, & debilitas eius, meditationes. Pulsus quidē, qm magnitudo, uelocitas, & frequentia ipsius significant calid. eius, & eorū contraria significant frig. & eius lenitas humid. & durities significant siccitatē, & fortitudo, equalitas, & ordinatio significant sanitatē, & contraria significant cōtrariū. Et anhelitus magnus, uelox, & frequens significant calid. sed contraria frig. Et pectus amplum latum si non est pp multitudinem cerebri significatam per magnitudinē capitis facientem magnitudinē nuchæ facientis magnitudines spondiliū facientiū magnitudinē costarum ortarū ab eis, imò est illic paruitas capitis aut mediocritas significat calid. cordis, & contraria ipsius si non facit ipsum, paruitas capitis significat frig. Et pili plurimi orti super pectus & paucitas pilorum significat frig. quod est uerum nisi humid. corporis superflua mora in aere frigido, & atas pueritiæ resistat. Quintus modus est à calid. totius sensata per tactum, quia cor calidum facit totū calidū si hepar, & splen non contra operetur, & corde existēte frigi. totū est frigi. si hepar non contra operetur, & ita intelligatur cor esse humidum per corporis lenitatem, & siccū per corporis asperitatem. Sextus est à moribus, ut ira uelox à leui causā, audacia, furiositas, crudelitas, significant cor calid. & opposita frig. Similiter gaudium, fiducia, bonitas spei significant cor forte calidum & opposita contrariū, similiter inquisitio solitudinis, timor, & tristitia significant cor frig. & siccum. Item promptitudo ad operationes significat caliditatem, sicut tarditas frig. Septimus est à fortitudine corporis, quæ significat cordis fortitudinem temperatam, & multitudinem spirituum, concurrente tamen bona dispositione cerebri & neruorum: & debilitas significat contrariū, & malitiam complexionis.

Octauus est meditationes, qm iucundæ, plenæ spe, & circa res magnas significant temperamentū, aut declinationē moderatā ad calidum & humidum, sicut contra meditationes tristes cum desperatione, & circa res paruas significant frigi. & sicc. & meditationes contentionis, separationis, & rixæ caliditatē & siccitatē, spiritus enim cum sunt clari multi, temperati, cor bene se habet, quæ percipiuntur sub ratione delectabilis, & spē bonā generant, & confidentiā, & econtra paucifumosi, frig. & sic timorē & desperationem, sed calidi & sic, fumosi multi, contentionē, iniquitatē, rixā. His potest addi notū. Nā caliditas in corde ab ipso patiēte percepta significat caliditatē, sicut econtra frig. percepta in corde frigiditatem, quod signū potissime accommodatur ad caliditatē & frigiditatē præternaturales. Potest addi decimū sumptū à pronitate lapsus, nā ceteris paribus facilius & frequentius est lapsus in morbum simile quā in contrariū. Talis ergo cōplexionis est cor qualis est morbus in quē facilius & frequenter labitur, et sic est. 1. o. modis significationū suprascriptarū possumus arguere supra quacunq; cōplexione cordis naturali. Signa autē quibus arguimus super ægitudinibus cordis sunt infra scripta. Signū malæ cōplexionis calidæ est augmentum pulsus in uelocitate, & frequentia non naturalē, & declinatio anhelitus ad magnitudinē, & uelocitatē, & frequentia non naturalē & frequentiam quæ sedatur cū aere frig. & bene se habere in frigore, & extenuari absque alia causā & econtra.

Signa malæ complexionis frig. sunt declinatio pulsus ad paruitatem, tarditatem, & raritatem non naturalem, nisi cadat uirtus, & sit necessaria frequentia, & anhelitus paruus, tardus, & rarus, & tranquillitas cum approximatione eius, quod calefacit. Item timiditas, & superfluitas in pietate, & misericordia. Signa malæ complexionis humidæ sunt incli-

Io. Arcniani

R

natio

natio pulsus ad lenitatem naturalem, & uelocitatem patien-
di ex imprimentibus in anima cum uelocitate retetionis eo-
rum, & multitudo euentus febrium putridarum. Signa ma-
læ complexionis sicca sunt, declinatio pulsus ad duritiem non
naturalem, & difficultas susceptionis passionum cum fixatione
earum, siue sint fortes, siue debiles, & liquefactio corporis, &
de significationibus apostematum sunt signa apostematum colo-
rum: Ipsa enim in principio sui faciunt diuersitatem mira-
bilem in pulsu non consuetam, & fit maxima inflammatio in
corpore proprie in temporibus membrorum, anhelitus quā-
uis attrahat aerem frigidissimum, tñ est quasi priuatus anhe-
litu. Deinde sequitur syncopis frequens, & non oportet, ut
expectetur pulsus durities, sicut in aliis apostematibus cali-
dis, quā interficit ante illud, interficit enim semper plurimum in
in prima die, uel in secunda. Sed signa apost. frig. quæ rarissi-
me eueniunt sunt omnia huiusmodi accidentia, sed remissa
cum paucitate inflationis, & interficit inter secundū & quar-
tū. Sed signū malæ compositionis, sicut complexionis eius
a multitudine aquæ in capsula sunt, quia sentit cor suum suffo-
cari & comprimi. Signa uero oppilationis uiarum est præso-
catio manifeste sensata absque causis aliis. Signa autem solu-
tionis continui sunt ipsæ causæ soluentes. Causæ autē impri-
mentes in cor quædam sunt cōes sibi, & aliis membris, sicut
causæ facientes malā cōplexionem, solutionem cōtinui, apo-
stemata, & similia, quædam sunt proprie cordi, sicut malus an-
helitus, & accidentia animalia, quæ quique nocent spargēdo
spiritum exterius quandoque suffocando ipsum interius, ita ut
quandoque sequatur syncopis, imò mors. ira autem est minor
omnibus illis in hoc, raro enim interficit.

Canones uniuersales in curatione dispositionum cordis
sunt quatuor. Primus, quia cor est membrum principale prius,
& sublimius omni principali, & ideo sumus festini ad curan-
dum cordis dispositiones, & sine errore quantum est possibi-
le. Paruus enim error in principali multum timendus est. Se-
cundus canon est, quod in phlebotomia quæ frequenter est ne-
cessaria in curatione ægritudinis cordis, cum plurimæ ægri-
tudines cordis materiales a sanguine pendeant, simus solici-
ti ne superfluat, & cadat uirtus, & si ceciderit succurramus
cum medicinis, & cibis uiuificantibus uirtutem secundū exi-
gentiam de his, quæ dicuntur, & hæc non appropriatur egres-
sioni sanguinis, tantum, imò etiā cuiusque euacuationi, quāuis
sanguinis euacuatio sit uehementioris necessitatis, ut sibi in ea
sui uirtutis subsidium afferatur. Et quia, ut dictum est plurimæ
ægritudines cordis sunt a sanguine, aut a uapore, phlebotomia
est congrua euacuatio a nocumento amborum liberās.
Repletio enim sanguinea remouetur, phlebotomia basilicæ
dextre, & uaporosa phlebotomia basilicæ sinistra. Tertius
canon est in euacuatione per medicinas solutiuas, & est quia
plures medicinas solutiuæ inimicantur cordi, uel secum per-
misceamus medicinas cordiales bezaharticas, quæ conferunt
tripliciter. Primo corrigendo nocumenta medicinarum sol-
uentium. Secundo confortando cor addendo in robore cum
proprietate sua, & stipticitate temperata. Tertio quia faciūt
uirtutes medicinarum penetrare ad cor remouendo eas ab
aliis locis. Quartus canon est in permutatione complexion-
is calidæ, frig. humid. & sic. aut compositæ. Nā si uolumus
permutare complexionem frig. audaces simus cum medi-
cinis cordialibus cali. solis, aut saltem permixtis medicinis cor-
dialibus, uitando tñ ne propter intentionem suæ calid. aut mul-
titudinem eius fiat agitatio in humoribus cordis, & materia
dilatetur & ampliatur, & forte perducatur ad apostema, ad op-
pilationem & reliqua nocumenta, nec tamen multum dimi-
nuta sit a gradu, & multitudine calidi. sufficienti secundū gra-
dum, & resistentiam ægritudinis, & sed in permutando com-
plexionem calidam, tunc non sumus contenti solis infrigidan-
tibus. Nam substantia per quam cor creatum est spiritus est
fluxus in ipso, qui est substantia calida calid. naturali, & nō cal-
lid. nociua corpori, quæ aliquando ex malitia complexionis
calidæ resoluatur, minoratur, conuertitur in fumum, & con-
tribuitur. Cum ergo superuenit corpori cordis quoddam extin-
guat ipsum non est permixtum cum medicinis calid. confortan-
tibus calorem innatum non solum propter caliditatem,
imò cum proprietate ipsarum associata calidi earum, possi-
bile est, ut noceat radici, id est spiritui, quamuis ramo conse-

rat, & est corpus cordis contemperando calid. eius. Quapropter sapientes antiqui permiscunt medicinas frig. cum
cordialibus calid. confidendo quod si natura fuerit fortis di-
scernet inter calefactum & infrigidatum, & affert infrigi-
datum cordi & calid. cordiale spiritui & temperabit ip-
sum. Et si inueniunt medicamen equale, aut proximum æqua-
litati confortatiuum spiritus, sicut buglossam uigorat &
adiuant se cum eo. Si uero natura fuerit debilis non cōfert
regimen nec sufficiunt medicinas cordiales frig. propter alia
causam, quia sunt tardæ penetrationis. Quapropter neces-
sarium est, ut secum misceant medicinas cordiales calidas qui-
bus iuuatur penetratio uirtutum medicinarum frig. quæ ta-
men notabiliter debent esse dominantes super medicinis ca-
lid. secundum exigentiam sui contrarii, sicut permisceat cro-
cum medicinis frig. in trochiscis de camphora, propterea
qui abstulerunt crocum ex trochiscis de camphora blasphemantes
priores fecerunt ipsos pauci iuamenti quamuis propter
ignorantiam non concedant. Complexio autem calidi. cura-
tur cum sumptis in potu, sicut sunt rob. frig. cordialia, scilicet
de ribes, de pomis & similibus, & cum aqua & suc. fructuum
sicut pomorum apiorum, cyth. acetositate citri, & similibus,
& cum exterius applicitis frig. permixtis cum paucis cordia-
libus calid. & si fuerit materia euacuetur. Cura autem malæ
complexionis frig. est cum confortatiuis magis quæ dicuntur,
sicut diamusco, theriac. mithridato, & similibus cum uino o-
dorifero, exercitio temperato, cibis calid. quantitate, quæ di-
geratur. Et cum applicitis exterius cordialibus calid. lipiti-
citate temperata participantibus, & si materia frig. fuerit in
causa euacuetur. Sed in cura malæ complexionis sic. est ne-
cessarius cibus & potus plurimus, humectatiuus dummodo
possit digeri. Et administratio tinnæ, aut balnei cum custodia
tamen, ne sit multum calid. nec sit longa mora in ipso, ne re-
soluat uirtutem deiciat, paucitas motus, & tranquillitas, &
potus aque non multum frig. & moderatæ quantitatis nisi
ad sit calidi. coniuncta sic. cum multitudine spirituum, tunc
enim magis frig. & plurius quantitatis posset exhiberi, & con-
uenit somnus plurimus, & si fuerit materia euacuetur. Cura
autem malæ complexionis humid. & subtiliati diætæ, quæ
uirtualiter declinet ad sic. & administratio medicinarum exic-
cantium, & exercitia potius longa, & frequentia quàm inter-
sa & fortia, nisi esset coniuncta frig. & materia humida si fue-
rit in causa euacuetur. Cura autem frigida & humida, est
intentio & multitudo exercitii, in quo tamen fiat gradatio
de paruo, & breui ad longum & magnum, & administratio
balnei ante cibum præcipue tinarum & longa mora in aqua
calida, administratio solutiuorum, & diureticorum, usus ui-
ni antiqui, odoriferi potentis, moderatæ tñ quantitatis, &
administratio ciborum calid. & sic. quantitatis moderatæ, &
si humid. fuerit coniuncta calid. uident balneum, & utantur
coitu, & si materia aliqua fuerit in causa euacuetur. Solutio
autem cōtinui non recipit curam, sed oppilatio remouetur,
phlebot. & aliis euacuationibus semper exigentiam, & admini-
strationem incidentium, & subtiliantium primo, postea aperi-
entium & prouocantium, quæ omnia sint cordialia, aut cor-
dialibus admixta, & sint calid. aut frig. aut temperata secun-
dum exigentiam. Si uero sit malus situs propter superfluum
humid. capsulæ comprimentis cor intendatur omni regimi-
ni exiccatio, tam cibali, quam medicinali, nec non euacua-
tionibus iteratis, quæ tamen uirtutem non deiciant. Cura
autem apost. Cum inceperunt non est possibilibus, sed obstan-
dum est ne incipiant cum phlebot. copiosis, & proprie basi-
licæ, & apud Auicennam. quandoque speratur in euasione eius
cum phlebotomiis arteriæ, & cum euacuatione humorum cum
solutiuis, moderatis tamen ne agitent materiam quibus cor-
dialia sint admixta, & sint calid. frig. aut moderata secundum
exigentiam, & deinde cum diuersionibus fortibus, & uentri-
sis, ligaturis & huiusmodi. Et tertio materia si fuerit subtilis
incrassetur & compingatur, ut non fluat etiam exhibendo o-
piata fortia in notabili quātitate, & super regionem cordis,
& partis circumstantis applicentur reperculsiua semper exigentia
confortantia cor cum proprietate sua, & repellentia mate-
riæ, & diætā sit tenuissima. Somnus sit interruptus, & procur-
rentur euacuationes naturales, & non naturales longo tem-
pore consueta, quiescant animo, & corpore quantum est
possibile.

possibile. Medicinæ autem cordiales quibus utendum est secundum exigentiam temporum descriptæ ab Auicenna, & ceteris sunt infra scriptæ. Temperatæ sunt lapides præciosi, ut hiacynthus, albedengelid, id est lapis ualens contra uenena, creditur quod sit saphyrus, uel forte lapis ille qui uocatur bezahar, id est liberans à ueneno alfenisagi, id est sinargodus & aurum copiosum in bursa, uel serino seruatum, argentum, granatæ, rubini, buglossa, borago, copazius lapis. Calidæ zedoaria, zorumbet quæ sunt eiusdem speciei quamnis Auicenna de eis diuersa faciat capitula, zorumbet sunt radices similes ciperio in figura, sed multo maiores & duriores intus sub citrini coloris, odoris, & saporis zedoariæ, remissioris tamen. Donoricon græce, arabice, doronigi est radícula parua, saporis dulcis, similis calamo aromat. in colore & figura, been album & rub. & sunt uelocis iuuamenti, gariophil. mirabiles, galangana, nux musc. cinnamomum, ozimum, id est basilicon, ambræ, balsamita, oleum balsami lignum & semen eius, stœcas, polium, ninum aromaticum pulegium, origanum, mentatrum, cortex citri, sem. citri, cubebæ, muscus, ambræ, fœta combusta & non combusta, xilaloës crudum, melissa & sem. eius, enula est mirabilis, macis, calamus aromaticus, casia, lignea, rosmar. laudula, sacuraia, betonica, hypericon, calamethum, menta, polytricon, gingiber, spica nardi, schinanthum, cardamomum, lapacium quod Auicenna acetosam appellat, non est illud, de quo est hic sermo, sed de lapatio uulgariter dicto rumese, quod est calid. & sic. & optime ualet, contra serpiginem conditum aceto & sale. Frig. margaritæ camphora, sandali 3. spondilum, poma, uiole, acetositas citri, cichorea, uinum granat. Karabe, corallus, rosa, lutum sigillatum & armenum, coriand. sic & humi. limones, arantij, scariola, laetuca, acetosa. Et uniuersaliter omnes ualentes contra uenena, & omne aromaticum ponitur cordiale. Vnde multipliciter dicitur medicina cordialis, primo quia temperata, ut supra scriptæ licet Auicenna quinto Colliget cap. de medicinis confortatiuis membrorum uelut quod medicina tendens ad aliquam calid. sit magis confortatiua quam temperata. Secundo quædam medicinæ confortant uirtutibus secundis, ut est stipticitas, odor sicut sunt rosæ, & muscus. Quædam confortant à proprietate occulta, & istæ sunt duplices, nam quædam habent proprietatem adiutam à qualitate manifesta, ut spica, & crocus, quarum proprietates adiuuatur aromaticitate & caliditate temperatis, & stipticitate quadam. Quædam confortant per proprietatem occultam non adiutam aliqua qualitate manifesta, ut hiacynthus, & similes, inter quas interest, quia primæ indigent actione à calore nostro ad quam exiguntur duo. Primum, ut fiant actuales cum prius solum essent in potentia. Secundum, ut uirtus ipsarum ad cor penetret, quæ maxime ducitur per uaporem ad cor penetrantem, secundæ autem non indigent transmutatione à calore nostro per quem ducantur de potentia ad actum, imò non indigent nisi ut uirtus sua ad cor deferatur, & prima proprietates indigens adiutorio qualitatibus manifestæ à quibusdam appellatur uirtus tertia, sed secunda non indigens adiutorio qualitatibus manifestæ uocatur uirtus quarta, & isti sunt quatuor modi quibus aliquæ medicinæ per se primo dicuntur cordiales, & confortantes, sed medicinæ alijs modis confortantes non diu dicuntur cordiales, nec confortantes per se primo, sed solum de bet per accidens, sicut quæ remouent nocumenta materiarum prauarum & uenenorum, quæ possunt imprimere in cor. Et harum quædam faciunt hoc euacuando, quædam alterando ad contrarium secundum qualitates primas, ut frigid. contra uenenum calidum, & sic de cæteris contra sua contraria. Tercio, aliqua faciunt hoc, stipticando, ut terra sigillata, prohibet uaporem eleuari sua stipticitate, & cum hoc etiam confortat cor, & similiter lutum armen. in pestilentia. Quarto, aliquæ faciunt hoc incidendo, sicut aqua raphani contra fungos. Quinto, quædam reprimendo acuitatem, ut buryrum, & alia unctiua, multi sunt alij modi quibus opponimus uenenis, sed hi sunt principaliores, sed illa quæ euacuando confortant sunt duplicia, quædam enim confortant expellendo uenenum, ut terra & lutum sigillatum, quod non cessat facere uomitum donec ue-

nenum expellatur, quædam autem confortante educendo materias malas existentes in corde & admixtas spiritibus, sicut mirobolani, agaricus, & lapis lazuli. Et in his est proprietas appellata uirtus tertia, scilicet respectus ad cor plus quam ad aliud membrum. Sunt autem præter hos alij tres modij minus principales, quibus medicinæ dicuntur confortatiue, sicut quæ ducunt uirtutes aliarum ad cor, sicut pulegium & stœcas. Aliæ custodiendo ne resoluantur uirtutes earum in uia, sicut opium, quædam consolidando alias, sicut species aromaticæ ingredientibus trochiscos de tyro, quæ ponuntur ad reprimendum earum malitiam, inter has omnes uere cordiales sunt medicinæ quatuor priorum modorum, quæ per se confortant. Aliæ uero theriacales, siue bezahartice appellantur, & non uere cordiales sunt theriacales, licet non econtra, quia medicina theriacalis potest esse excessiui gradus, & operationis nec absolute confortat cor, sed cum est in dispositione præternaturali: sed uere cordiales sunt temperatæ, aut parum recedentes à temperamento habentes singularem proprietatem ad ipsum maxime confortantes in dispositione sana, sicut buglossa hiacynthus, sed multæ theriacales nocent in dispositione sana, quæ in dispositione ægra optime iuuarent. Et hæc elici possunt ex dictis Gale. quinto de simplici medicina. & Ser. in suo de simplicibus, capite de medicina custoditiua & liberatiua. Et dicit ibidem quod medicina theriacalis est media inter uenenum, & corpus humanum, cui Auicenna contradicit quinto Colliget, capite de medicinis operantibus contra uenenum, & dicit quod medium est eiusdem generis cum extremis, sed medicina theriacalis non est eiusdem generis cum corpore nostro, & ueneno, quare non est medium. Ad quod dicendum, quod Gal. & Ser. noluerunt quod medicina theriacalis sit media per comestionem nec per formalem participationem utriusque, sed est media, quia cum utroque conuenit, cum homine quidem quia ipsum tuetur, sed cum ueneno conuenit, quia participat naturæ proportionem quadam, & forma uenenosa, participans autem uno formaliter, & cum alio uirtualiter, non est sub eodem genere reponibile cum ambobus extremis, sed est in genere extremi, cuius natura participat. Est enim medicina uenenosa, non tamen ex toto genere contraria naturæ hominis, sicut argentum uiuum, fel uiperæ, quia istæ non ponerentur in confectiionibus liberatiuis, sed aliquo modo uenenosæ, & interficientes si sumantur in notabili quantitate, sicut myrrha, opium, styrax, crocus, faciunt enim stuporem, & occidunt in multa quantitate sumpta.

Quapropter concludit Serapion allegato capitulo, quod ualde æquilibrata debet esse dosi medicinarum theriacalium, scilicet ne noceant corpori, imò ipsas bene toleret & sint sufficientes contra uenenum, & hoc est difficile apud inexpertos. Sed forte ex his quis infert contra determinationem supra scriptam, quod nulla medicina uere cordialis sit theriacalis cum nulla uere cordialis participet naturam ueneni. Ad quod dicit quod autores prædicti non loquuti sunt de omnibus theriacalibus, sed de his tantum, quæ natura uenenosa participant, & propositiones illæ sunt indistinctæ, & non uniuersales. Et ego sequor intentionem Sim. lan. in dictione bezahardi dicentis. Bezahartica est omnis medicina liberatiua à ueneno, nos autem proprio uocabulo carentes hoc significantes, theriacam uocamus, theriaca itaq; & medicina liberans à ueneno sunt synonyma. Et subdit bezahard aliquando uocant galbanum propter excellentem eius uirtutem contra uenenum, quod patet per Auicenna in descriptione tertiæ theriacæ, & per Ser. in descriptione theriacæ, uocatur nihilominus apud eos kemne, uocatur & interdum bezahard, uel bezahar quidam lapis multum charus regibus, ut in Serapione inuenies. Putant autem aliqui hunc lapidem esse qui generatur in oculis ceruorum in oriente, qui cum serpentes comedunt, ut deponentes senium fortiores fiant intrant flumen, ibique morantur immersi usque ad caput, tandem quosque sentiunt uirtutem ueneni superatam, interim lachrymā emittunt, quæ coagulata in oculis interdū usque ad magnitudinem nucis deficcatur donec cadit cum flumen exeunt, & sic inuenitur, & dicitur omnium uenenorum theriaca, & uerisimiliter deberet liberare à pe-

Io. Arculani R 2 stilen-

stilentia. Sunt etiam præter suprascripta aliæ medicinæ bezaharticae ualde excellentes; sicut tormentilla, dictamū, pim pinella, quæ sunt supremæ contra pestilentiam, de quibus feci mentionem in tractatu meo de pestilentia.

De tremore cordis. Cap. 74.

Quid nominis tremoris cordis est satis manifestum. Est autem descriptiue penes A. motus tremulus accidens cordi, & manifestum est, ut dictum fuit superius, quod sub tremore cordis comprehenditur pulsus eius, qui qualiter differant si proprie sumantur, dictum fuit superius. Species non habet nisi modos quosdam secundum magis & minus differetes, ut quia aliquis chronicus, aliquis magnus, ita ut à circumstantibus audiatur sonitus quidam, & uideantur panni tegentes pectus eleuari, quidem parvus, ite aliquis continuus, aliquis interpolatus. Item aliquis cum magna debilitate, & maxime pulsus diuersitate, aliquis, non licet non euacuetur à quadam pulsuum diuersitate.

Causæ tremoris cordis sunt omnia, quæ lædunt cor notabiliter, ita tamen, ut non perducant ad syncopim. Causæ autem lædentes per essentiam sunt mala complexio cuiuscunque generis sine materia, quæ facit tremorem, cor debilitatio, & omnis debilitas apud A. efficit in corde (donec perseverat in ipso uirtus sufficiens) agitationem quandam, ut expellat ab ipso nocumentum, aut quia non potest continuare uniformiter motum suum, quare fit motus tremulus, aut quia uirtus facta debilis est apta pati à quacunque facili causa quare frequenter accidit tremor. Sed contra sequitur quod mala complexio facta, non sensu percepta sicut in heciticis potest esse causa tremoris, qui erit continuus propter primam causam, sed propter secundam erit ualde frequens, consequens contra experientiam.

Respondetur quod mala complexio facta in corde non est sola causa tremoris, nisi ducat ad ultimam debilitatem, cum qua cor non possit complere motum suum uniformiter, sed mala complexio diuersa, quæ sentitur bene potest esse causa tremoris, etiam cum constantia uirtutis. huius autem diuersitatis causa est, quia tremor cordis qui sequitur solam debilitatem uirtutis, absque tristi sensatione, fit à uirtute uitali debili, non potente complere dilatationem cordis uniformiter. Sed tremor qui sequitur tristem sensationem, & malam complexionem diuersam fit à uirtute expulsiua naturali ipsius cordis, commouente cor, ut expellat nocumentum: sed bene uerum est quod mala complexio facta debilitatio cor, est causa, ut ipsum facile incurrat tremorem cordis propter aliquod nocumentum impressum ab ipsa sensatum, quod non incurreret nisi esset debilitatum, quia fortis uirtus omnia cōtemnit, & consequenter conceditur, quod debilitas sola nō est causa tremoris, sed debilitas cū nocumento impresso sensato, licet debilitas principaliter concurrat, sicut etiam in tremore stomachi debilis, sumpto bono cibo cum mouetur ad amplexando ipsum motu tremulo, uirtus debilis est cū magis quia cibus bonus. Et notandum secundum Auer. Tertio Colliget, de accidentibus spiritus tactus, quod mala complexio diuersa in habente heciticam non sentitur nisi per malam complexionem frigidam retinentem adhuc aliquid naturalitatis, unde heciticus sentit caliditatem additam post cibum per heciticam suam. Fit enim tremor à mala complexione cum materia sanguinea, & melanco. quæ frequenter facit tremorem, quia multum horrida cordi, & cuius minera est prope cor, scilicet splen directe cordi suppositus à quo profuit melanco. ad os stomachi, & item mirach, & mesenterium, in quorum uenis reperitur multum de melanco. sunt satis propinqua cordi. Item materia humida aliquando est in causa, & uentosa aliquando, & est leuior ceteris si sit subtilis, & non habens materiam à qua eleuetur. Materia autem cholericæ sui acuitate magis facit syncopim quam tremorē. Similiter mala compositio, oppilatio existens in curibus sang. & spiritus in corde & origine uenarum, & arteriarū eius, aut malus situs cordis sequens complexionem apostematis capulæ, aut multitudinem aquæ in ipsa contentæ, & similiter solutio continui in corde, & apostema faciunt in principio apparere tremorē: deinde syncopim, postea mortem, sed de his superius. Factus autem subtilitate sensus cordis cognoscitur, quia habenti ipsam accidit tremor cor-

dis ex qualibet qualitate uetustitate generata in spatio quod est inter ipsum & panniculum eius, aut in corpore panniculi, aut in uena eius. Et ex qualibet qualitate calid. aut frig. adueniente ei, ita ut succedat potui aquæ, præter quod perducatur ad debilitatem in operationibus suis. Factus autem per communitatem, aut est à toto, sicut in febribus, & proprie pestilentialibus, aut in crisi, cum materia mouetur, aut à doloribus fortibus in quacunque parte corporis, aut cum communitate panniculi sui, scilicet capulæ, si accidat in ipsa apostema molle, aut durum, sicut accidit simiæ & gallo per Ga. anatomizatis. Et quandoque accidit cum communitate stomachi, & proprie oris, quando in ipso est humor uiscosus, uireus, & mordacitius, cholericus, aut cibus corruptus, aut bothor in ore eius, aut propter attractionē materierum ad stomachum, siue apostemem, siue non, succedentium labori, id est dolori eius. Dolor enim stomachi potest facere tremorem cordis tam per se quam attrahendo materias ad stomachum, quæ erit causa tremoris. Et per communitatē stomachi est aliquando tremor tantus, & ita continuus ut non discernatur inter ipsum & illum, qui est per essentiam in corde, & quandoque accidit tremor in ore stomachi simillimus tremori cordiali, & fortasse perducit ad ipsum. Fit autem tremor in ore stomachi duabus ex causis, aut quia uirtus expulsiua oris stomachi concutit ipsum, expellat nociuū, aut quia uirtus naturalis stomachi debilis mouetur motu tremulo ad amplexandum & constringendum se supra cibum, ut melius digerat. Et fit aliquando cum communitate pulmonis quando multiplicat in eo oppilatio in parte illa, quæ obuiat cordi, & non penetrat anhelitus secundum quod debet, & indicat constrictionem anhelitus non securam cum quandoque accidat subito suffocatio & mors, sicut aliquando accidit in paroxysmis asthmatis. Et quandoque accidit per communitatem ab aliis membris, sicut diaphragmate, & reliquis partibus pectoris, & à splene, cerebro, gutture, transmittentibus materiam & uapores malignos. Et quandoque per communitatem ab intestinis propter uermes corruptos in ipsis effluantes ad cor, & quia uermes aliquando mouentur ad superiora & nocent ori stomachi, & aliquando perforant intestina. Et fit aliquando per communitatem ab hepate transmittente humorem, aut uaporem malignum, aut non transmittente sangu. sufficientem. Similiter accidit per communitatem à matrice, uaporibus spermaticis, aut menstrualibus, aut aliter malignis effluantibus ad cor, & quicunque matrix ipsa ad superiora mouetur, est causa præfocationis & quæ sit à causis extraneis, sicut à potu & morfu uenenosorum & quæ sit ab accidentibus anime fortibus, foetore, corruptione aeris, & sic de singulis causis primitiuis potentibus in corde imprimere. Signa cōmunia cuiuscunque tremoris cordis sunt, pulsus diuersus ualde in magnitudine, paruitate, uelocitate, tarditate, frequentia, & raritate, & multoties simulatur pulsui habentiū asthma & peripneumoniā, & tangendo pectus ex directo cordis sentitur diuersitas motuum cordis proportionata diuersitati motuum pulsus. Similiter aspiciendo arterias, quæ sunt in collo uidetur aliqui in motibus earum manifesta diuersitas, & aliqui sonitus quidam auditur sequens diuersitatem motuum ipsius cordis, & pendens ab humid. significatur per lenitatem pulsus, & sentit habens esse quasi cor eius sit positum in humiditate, & si sit humiditas multiplicata in capsula comprimens ipsum præter hoc quod sentit cor eius positum in humiditate sentit ipsum in eadem suffocari. Sed siccitas superflua significatur per duritiam pulsus. Et si fuerit consumptio humid. existentis in capsula, corpus arefcit & exiccatur in dies absq. febre, & factus à calidit. superflua singulari significatur per inflammationem in corde sensatā, si non est fixa, & si fixa fuerit per inflammationem sanatā ante fixationem, & pulsus, & anhelitus sunt magni, ueloces, & frequentes etiam extra horā tremoris, & præcesserunt causæ calefacientes sicut febres fientes & facta, motus fortes, & similes. Factus à frigore significatur per causas suas ex extrinsecis calorem innatum tam per se sicut aeris frig. agitudines infrigidantes & similia, quam per accidens, sicut euacuationes extinguentes calorem innatū, & adeo sensatio frig. in corde nisi sit fixa, & pulsus & anhelitus parui, tardi, & rari, et extra horas tremoris. Et malæ cōplexiones habent

habent signa composita, sicut habens caliditatem iuncta humi. cum hoc quod habet pulsum & anhelitum magnum, uelocem, & frequentem, habet ipsum lenem, & sentit quasi cor eius sit positum in humiditate, & per reliqua tu discurre, & omnes huiusmodi malæ complexiones cognoscuntur, quia læduntur à simili, & contrariis iuuantur. Sed tremor sanguineus significatur per magnitudinem & uelocitatem pulsus & anhelitus cum leuitate pulsus & plenitudine eius, etiam extra horas tremoris, & sentitur calid. & inflammatio, & iuuatur coitus, quia sanguinei aggregant multum semē quod corruptum multiplicat malos uapores cordi, & etiam per coitū temperatū clarificatur sanguis & spiritalis, euacuatur superfluitas quanti & remittitur calid. superflua. Item est plenitudo & tensio uenarū & multitudo urinx cum crassitie, & color & habitudo attestantur sanguis. Item complexio, regimē precedens & similia. & iuuatur minutione. Sed melancholice sunt signa contraria & cum tristitia & solitudine ut eorum qui sunt in terra aliena cum recordantur suorum.

Sed cholericum, qui tamen raro accidit, significant causæ calefacientes & exiccantes precedentes ægitudines cholerice sequētes, & est pulsus & anhelitus magnus uelox & frequens cum duritie pulsus, & est uehementia inflammationis, iuuatur frig. & humid. & nocetur contrariis, & sunt huiusmodi color, regimē, habitudo, tempus anni & cætera huiusmodi attestantia cholera, sed phlegmatici sunt signa contraria, & iuuantur fame & siti & exercitio.

Et uentolum purum significat uelocitas terminationis eius, paucitas nocimenti eius, & diuersitas in pulsu, & nocetur à multiplicandis uentositatibus, & iuuatur à contrariis. Factus autem ab oppilatione significatur per diuersitatem pulsus in magnitudine & paruitate, tarditate & uelocitate, per huiusmodi enim distinguitur à diuersitate pulsus sequētis uirtutis debilitatem, cum uirtus multum debilis non possit facere pulsum magnum, & similiter est diuersitas in fortitudine & debilitate, quæ non potest contingere à uirtute debili, cum non possit facere pulsum fortem, & est cum priuatione signorum repletionis, & hoc maxime uerificatur cum oppilatio est in locis propinquis cordi & uenis eius. Sed tremor sequens malum situm, scilicet cōpressionem cognoscitur, quia sentitur cor suffocari & cōstringi. Solutio autem cōtinui cognoscitur per causas suas, scilicet tremor sequens apost. in substantia sui cordis, aut sui panniculi cognoscitur per signa superius dicta, immediate post anatomia, & præter signa ibidem dicta cum apost. calido in substantia cordis adest maxima inflammatio, & diuersitas mirabilis in pulsu cum feb. maxima, & si fuerit profundum interficit in hora, si uero superficiale tardatur mors usque ad secundū diem, & si fuerit frig. non adest tanta inflammatio, & si fuerit superficiale tardatur mors usque ad quartam diem. Si uero profundum usq; ad secundum ut plurimum, tamē in corde sunt calid. sicut in cap. sula, ut plurimum frig. mollia aut dura, & cognoscitur, quia non cito interimunt, immo aliquando chronicatur, tandem tamen interimunt, & cognoscuntur præter signa superscripta calida & frig. per complexionem, calorem, habitudinē, & regimen præcedens, ætatem, tempus anni, & similia. Factus autem ab acuitate tantum sensus cognoscitur, quia fit à qualibet uentositate & quacunque causa facili, & est cum fortitudine pulsus & sanitate anhelitus, & icolumitate reliquorum membrorum, & fortitudo pulsus & magnitudo ipsius sunt significationes primæ significantes ipsum & certificant ipsum. Si fuerit corpus cum frequentia huius tremoris incolumē, & uirtus conseruata, est consuetudo operationibus sana, & illi quibus plurimum accidit illi sunt propter quorū facies apparent uestigia passionum animalium, sicut iræ, tristitie, & aliarum quamuis uestigia sint remissa. Ista autem uestigia passionum animalium, appetentia super facie sunt sicut mutatio coloris ex rubeo in pallidum, & e contrario, secundum diuersos motus spirituum & sanguinis nunc intra nunc extra secundum exigentiam passionum, hæ enim mutationes quamuis remisse arguunt passionem animales facientes tremorem cordis. Factus autem per communitatem à toto sicut in feb. declaratur per febres ipsas, cum quarū augmento augetur & decremento decrescit, & similiter criticus per crisin ipsam, quæ finita sedatur, sed factus à doloribus si-

gnificatur per dolores ipsos, cum quorum augmento augetur, & decremento minuitur, & ablatione aufertur. Signa autem facti per communitatem à capsula ex dictis sunt manifestissima, factum causa stomachi significat malæ dispositiones stomachi & nocumentum appetitus & aliarum uirtutum eius, item quod expellitur ab ipso stomacho maxime per uomitū, item imaginationes per eleuationem uaporum non solum ad cor immo etiam ad cerebrum, & nausea & subuersio, item alleuiatur cum abstinet à cibo nisi sit à materia cholericæ effusa ad os stomachi tempore uacuitatis, tunc enim magis fluit & acuitur, & fit uehemens quando cibis incipit digeri uaporibus pluribus cordi communicatis propter laborem uirtutis digerentis. Discernitur autem tremor stomachi à cordiali, quia hic sentitur in regione stomachi, ille in corde, & præcesserunt & adfunt nocumenta stomachi & non cordis sicut in cordiali præcesserunt & adfunt nocumēta cordis & non stomachi. Et factus per communitatem à pulmone cognoscitur, quia præcesserunt & adfunt nocumenta pulmonis sicut asthma, peripneumonia & c. Et sunt signa oppilationis pulmonis sumpta ex constrictione anhelitus, & cæteris, de quib. supra in propriis cap. Similiter factus à cōmunitate hepatis, splenis, matricis, intestinorum, & reliquorum membrorum significatur per nocumēta ipsorum quæ adfunt & præcesserunt, cum quorum augmento augetur & decremento decrescit & ablatione aufertur. Factum autem à uenenis sumptis à morsu uenenosorum & reliquis causis primitiuis significant causæ ipsæ cum priuatione reliquorum signorum. Prognostica. Tremor cordis quando superfluit permittitur ad syncopim, & quando magis superfluit permittitur ad mortem. Secundum. Si quis conqueritur de tremore cordis post ægitudines, & habet nauseam & uomit cholera plurimam, & non remouetur nausea, est malum & indicat spasum in stomacho.

De syncopi. Cap. 75.

Syncopis græce quasi concisio, & amputatio latine. Lithothymia dicitur à λίθος quod est deficiō & θυμός animus. Inde lithothymia, defectus animositatis. Sed quid nominis casus uirtutis subito, est satis manifestum. Subito enim importat duo, s. tempus imperceptibile & causam non manifestam. Syncopis tamen apud A. destructio est maioris partis, plurium uirtutum, motuæ & sensibilis propter debilitatem cordis, & aggregationem spiritus totius ad ipsum propter causam mouentem eum ad interiora, aut propter causam præfocantem ipsum interius, quare non inuenit spiraculum, aut propter paruitatem & subtilitatem suā quare non superfluit super illum qui est in minera. Dicit primo quod syncopis est destructio maioris partis plurium uirtutum motuæ & sensibilis, non quidem secundum suam essentiam, sed destruuuntur quia impediuntur ab exitu in suas operationes. Virtutes enim secundo Colligunt sunt nobis parum notæ, operationes aut notæ multum, quare necessarium est ut uirtutes per operationes notificentur. Dicitur maioris partis pluriū uirtutum, non enim operationes omnes motuæ destruuuntur, sed solum motuæ uoluntariæ, quæ perficiuntur per neruos & lacertos, non autem naturales sicut motus cordis, nec mixtæ ex naturali & uoluntario sicut motus diaphragmatis & peccoris nisi quando esset mors proxima. Sensibilis autē extrinsecas, tota destruitur, sed intrinseca siue operatio cogitatiua apud aliquos non totaliter destruitur. Per reliquas partes in diffinitione positas ponit tres causas immediatas syncopis. Prima est debilitas cordis sequens aliquod forte nocumentum sicut dolorem, solutionem cōtinui, malam complexionem, malam compositionem, apostema & similes, quibus debilitatur cor per essentiam uel per cōmunitatem, quæ debilitas est causa ut spiritus uitalis totus, uel fere totus in corde aggregetur per causas mouētes ipsum ad cor, quæ est uirtus attractiua ipsius cordis & naturalis subordinatio spirituum ipsi cordi. Quapropter membra extrinseca depauperata spiritibus, sunt in potentia ad operationes sensus & motus.

Secunda causa immediata est præfocatio spiritus in corde tanta ut non inueniat spiraculum, ita ut ipse neque cor possit sufficienter euentari, neque spiritus cordis transire ad alia membra, quapropter necessarium est uirtutem sensibilem & motuam multum minui in ipso corde & in membris aliis

Io. Arculan. R 3 destrui,

destrui, cum oporteat uirtutem uitalem ad quamcunque operationem concurrere.

Hæc autem præfocatio immediate sequitur prohibitam transpirationem, & prohibita transpiratio oppilatione, quæ potest esse coarctatoria ab autore multo aut crasso, & uiscofo, ita ut aer sufficiens non possit ingredi ad cor per ipsius dilatationem, & arteriarum constrictionem, neque uapores fumi possint egredi, neque spiritus ad membra transire per ipsius constrictionem & arteriarum dilatationem. Hæc autem oppilatio erit in origine arteriæ aorti, aut arteriæ uenalis, & potest oppilatio esse attenuatoria propter causam comprimentem cor, sicut capsula cordis apostemata, aut superflua aquositate repleta, aut propter apost. in ipso corde attenuans foramina, ipsa coarctando, aut forte humor, aut uapor malignus lædens uirtutem motiuam cordis, quapropter non posset ipsum sufficienter dilatare & constringere. Oppilationem autem carnosam credo rarissime contingere. Tertia causa immediata est paucitas & subtilitas spiritus, quare non superfluit super illum qui est minera, id est in corde.

Alia autem membra erunt sine spiritu naturali saltem sufficienti ad sensum & motum. Hæc autem paucitas sequitur omnes causas resolucentes, & quomodocunque spiritus paucificantes sicut famem, exercitia, balnea, euacuationes, aerem malignum, morsus uenenosorum, febres prolixas, & similia &c. Lipotymia autem descriptiue est destructio minoris partis plurium uirtutum motiuæ & sensibilis, propter tres causas in syncopi explicatas, aut aliquam earum, sed diminutas in comparatione ad causas syncopis, ita ut lipotymia sit uia in syncopim, sicut syncopis est uia in mortem. Est enim ut sonat quid nominis defectus quidam animositatis ad sensum & ad motum. Casus uirtutis subito apud A. est destructio maioris uel notabilis partis uirtutis motiuæ uoluntariæ absque documento notabili in uirtute sensibili, aut in motiua naturali aut mixta, contingens propter defectum in uirtute uitali in tempore ualde paruo & absque causa multum manifestata, propterea dicit A. hoc plurimum contingit ubi non est dolor neque solutio uentris, neque apost. magnum, neque euacuatio magna; & sic de aliis causis manifestis. Et hæc dispositio licet contingat propter defectum spiritus & uirtutis uitalis, tamen est passio uirtutis animalis, quæ debetur instrumentis motus uoluntarii. Causa immediata huius casus uirtutis est defectus spiritus uitalis in instrumentis uirtutis motiuæ uoluntariæ, per quem licet notabiliter minuatur motus, non tamen sensus, cum pauciores spiritus & magis subtiles sufficiant ad sensum quam ad motum. Causa autem paucitatis & subtilitatis spirituum in instrument. motus uoluntarii est, aut quia à corde non transmittuntur, quod potest esse propter oppilationem in uis transitus ipsius, scilicet in uenis & arteriis, ita ut etiã quandoque oppilentur uis anhelitus, quæ oppilatio plurimum fit ab humore phleg. liquefacto subito fluente ad uias transitus, non autem ita ab humore melanch. cum non sit aptus propter suam terrestritatem ita faciliter liqueferi & fluere ad uenas angustas, nec ab humore cholericò qui propter suam subtilitatem & paucitatem non sit aptus ita faciliter oppilare. Neque ita frequenter ab humore sang. quia sang. fluens multoties suffocat & interficit sui multitudine. Item fluens extra locum naturalem facit synocham, & facilius putrefit quam ceteri humores fluentes extra locum naturalem. Quapropter est raro causa solius casus uirtutis & syncopis. Et aliquando cor etiã non existente oppilatione non transmittit spiritus propter nocumētum propriū, aut per cōitatem, cuius causa non est ualde manifesta, imo potius retrahit ipsos ad se. Cōitas autē frequenter est à stomacho. Et aliqñ causa casus uirtutis est spiritui & humorum subtilitatio in substantia sua, & quia recipiunt resolutionem, & proprie in feb. Est ergo hic casus uirtutis apud A. dispositio quædam infra syncopim, propterea quandoque antecedit syncopim, quòq; subsequitur, ubi uirtus non destruitur nisi à neruis & lacertis ipsis existentibus ab ea uacuis, quare homo fit non motus nec remouetur à suo situ, & dormitione sua, id est, dispositione simili dormienti nisi cum labore. Causa illius est accidens, id est, nocumētum quod diximus. Nam cum uehemens fit, facit cadere uirtutem neruorū integre, & sic fit syncopis aut mors. Et si non fit uehe-

mens facit cadere uirtutem neruorum & lacertorum, & sic sequitur casus uirtutis. Differentia autem inter casum uirtutis, & lipotymiam est, quia lipotymia non connotat quòd fiat subito, id est, in tēpore impercepto & sine manifesta causa sicut connotat casus uirtutis subito. Et secundo quia non connotat, quòd fiat sine manifesta læsione uirtutis sensibilis, sicut connotatur per casum uirtutis. Differentia uero inter casum uirtutis & syncopim patet ex dictis, est enim minor syncopi antecedens eam, & transit in eam cum intenditur. Item sequitur ad syncopim cum syncopis remittitur. Hi tamen tres termini quandoque accipiuntur ut synonymi.

Causæ immediatæ syncopis sunt illæ tres, quæ sunt in diffinitione expressæ, scilicet attractio totius aut maioris partis spiritus ad cor, secunda præfocatio spiritus in corde, ut non inueniat spiraculum, tertia paucificatio spiritus in toto ut non superfluat præter illum qui est in minera: omnes autē aliæ causæ numerandæ præter has inducunt syncopim mediante aliqua aut plurib. ex istis. Causæ ergo syncopis sunt mala complexio in corde cuiuscunque generis fiens aut facta sine materia aut cum materia cuiuscunque generis si notabiliter imprimat in cor. Item dolor cordis, pustula parua leuissima, solutio continui cum paucissimo sanguinis fluxu, & paucissima spirituum resolutione sunt causæ, ut cor nocitum & debilitatum attrahat spiritus totius ad se. Sed apostema notabile in corde facit syncopim, spiritum præfocando. Solutio autem continui notabilis in corde mediantibus his tribus causis est causa syncopis, sed oppilatio in corde, & malus situs eius facit syncopim spiritus & cor præfocando, & similiter multitudo sanguinis & aliorum humorum existens in corde, per communitatem uero aut à toto, sicut, cum corpus est repletum sanguine & aliis humoribus superfluentibus in quanto, & est repletio quo ad usum, tunc materia subito fluens ad cor est causa syncopis præfocando. Et aliquando humor existens in toto aut in uenis magnis peccans qualitate maligna, manifesta uel occulta absq; multitudine fluens ad cor aut effluens est causa syncopis, aut præfocando, aut spiritus attrahendo. Et quandoque oppilationes existentes in toto sunt causa syncopis, quæ non sunt solum à multitudine, sed crassitie & uiscositate. Et mali humores multiplicantur ex malo & superfluo nutrimento, & malitia digestionis, quapropter sparguntur in corpore, replent uenas & oppilant meatus, & priuatur corpus nutrimento, & non sunt apti conuerti in nutrimentum, quoniam propter suam malignitatem & multitudinem habent proportionem supra naturam, & cum hoc complexio corporis corrumpitur. Et quandoque cōmunitas est à toto, ut in febribus, maxime pestilentialibus mittendo ad cor uapores putridos maligna putredine. Item in syncopali minuta mittendo ad cor uapores cholericos & acutos, etiam malignos qualitate occulta, aut etiam manifesta, repentes ad os stomachi, quod maxime contingit in principio paroxysmi. Item in syncopali humorosa propter uapores frigidi. uitreos cor infrigidantes in principiis paroxysmorum, & etiam quia corpus non nutritur, cum ipsum phlegma uitreum non sit aptum conuerti in substantiam nutriti, & etiã ita oppilet ut bonus sanguis non possit ad membra penetrare. Item in crisi bus fit aliqñ syncopis pp uapores à materia agitata ad cor eleuatos, & quia materia fluit aliquando ad aliqua membra nobilia, quib. cor cōpatitur, aut quia fit superflua euacuatio. Item per communitatem à dolorib. fortibus in quacunque parte corporis fuerint. Item euacuationes fortes resolucentes spiritus sicut sudores, quæcunque aliæ euacuationes fortes, siue à toto, siue à membris particularibus sicut fluxus sanguinis nariū hemorrhoidalis, mēstrualis per phlebot. aut per aliam solutionem cōtinui. Item solutio uentris, nimius uomitus, sicut in cholericà passione. Item fluxus nimius aquositate uentre secto in ascite, aut plurimæ sanies secto pectore in empyemate aut quocūq; alio apostemate magno nimia sanie fluente. Itē resolutio superflua insensibilis sequens raritatem pororum & humorum subtilitatem & similes causas. Fames quoq; superflua in infatibus & decrepitis, deinde in iuuenibus & conualescentibus magis, q̄ decidens, quæ ægri & sani incurrunt syncopim ex fame. Et omnia corpora sic subtiliū humorum, latorū pororū & acuti sensus facile ex fame incurrunt syncopim, & in ætate difficilior tolerant.

lerant, quàm in hyeme. Itē nimia macies & extenuatio. Per communitatem uerò à membris particularibus sicut à cerebro: nam cum in eo accidit oppilatio integra, & est apoplexia fit syncopis proculdubio. Sed per communitatem à stomacho fit frequenter propter tria. Primum, quia est propinquus cordi. Secundo, quia uehementis sensus. Tertio, quia est minera collectionis humorum diuersorum, quare facit syncopim, quia infrigidat ualde sicut in bolismo, aut quia calefacit ualde, aut quia dolorem efficit ualde. Et hæc sūt propter præsentiam materiæ calidæ, aut frigidæ, ulcerū bochor, aut apostematum in eo, & proprie in ore eius. Et quandoque causa syncopis est permutatio materiæ, synanchiæ, pleurefis, peripneumoniz ad partes cordis subito. Et quandoque est propter uiscositatem materierum in poris, quare oppillant meatus, & proprie in membris anhelitis, & quandoque per communitatem à splene cum superfluit mittendo melancholiam ad os stomachi, & similiter per communitatem à mirach, aut mesenterio mittentibus vapores melancholicos ad cor. Item per communitatem ab intestinis, maxime cum in eis superfluit uermes mortui, aut uiuentes, quia quandoque ascendunt ad hos stomachi. Item per communitatem à materia maxime cum sit præfocatio menstrualis aut spermatica. Item per communitatem ab hepate mittente sanguinem, & humores superfluos suffocantes ipsum, aut mittendo humores, aut vapores malignos sua qualitate manifesta aut occulta. Item per communitatem à capsula cordis cum apostematatur, aut superflua aqua repletur, & idem est iudicium in cæteris membris quib. cor potest compati, aut propter fortē dolorem, aut quia non transmittit quod deberet transmittere, aut quia transmittit humores, aut vapores superfluos, aut malignos consequens ulcera membrorum aut apostemata, aut corruptiones ipsorum membrorum, aut materierum exstentū in eis. Causæ autem primitiæ sunt sicut uenena sumpta & morsus uenenosorum. Item aer malus inspiratus sicut pestilentialis & cadauerum fetentium & fouearum, quæ diu steterunt clausæ & aperiuntur. Item superflua uigilia & exercitia fortia & continua. Item nimia inanitio & repletio. Itē accidentia animi exterminantia sicut timor, tristitia, gaudiū & huiusmodi cum superfluit. Sed hic notanda sunt aliqua primum cum aliquis inconusuetus syncopizare in phlebotomijs syncopizat, phlebotomia non existente superflua patitur aliquam ægitudinem in stomacho, uel habet stomachū debilem uel nimium sensibilem facile susceptiuium materierum, quorum nullum ante habuit. Secūdo notandum quod quando materia decrepiti febricitans eliquatur & fluit ad stomachum, facit syncopim, aut sui frigiditate, aut sui caliditate putredinali, & hoc magis accidit in ipsis decrepitis, quia materia eorum sunt magis aptæ dissolui & moueri ad interiora quàm resoluti, aut moueri ad exteriora, quia febres senum sunt sepulta. quarta primi, capitulo de rigore. Tertio notandum, quod causa quare aliquis syncopizat in prima phlebotomia, est quia occurrit sibi aliquod inconusuetum faciens agitationem in sanguine, unde cor patiens propter illorum agitationem attrahit spiritus ad se, aut forte cholera agitata repit ad stomachum, cui cor compatitur: hoc autem magis accidit in prima phlebotomia, propter timorem rei nondum expertæ. Sed contra hoc deberet magis accidere his, qui uulnerantur propter causas suprascriptas, consequens contra experientiam. Dicitur quod non accidit illis, qui primo uulnerantur, quia sunt intenti ad fugam uel ad persecutionem, unde spiritus & humores non concitantur ad stomachum nec ad cor sed ad instrumenta motus, &c. Ultimo notandum, quod multoties est phlebotomia causa syncopis propter infrigidationem, quæ fit priuatue propter sanguinis & spiritus euacuationem, & positue propter ingressum aeris frigidi circumstantis, & tertio fit melior euentatio sang. & spirituum sangu. euacuatio, unde 4. primi cap. de cura synoche. Syncopis infrigidat complexionem fortem.

Signa attendenda sunt. Primo illa quibus ponitur differentia inter syncopim, subeth, apoplexiam, epilepsiam, congelationem, præfocationem matricis, quæ dispositiones multum conueniunt hæc autem superius posita fuerūt in cap. de apoplex. Secundo attendenda sunt signa propinqua syncopis. Si non accidit subito. Primum est minoratio pulsus spiritibus

tractis interioribus. Secundum est pallor existens in facie, sanguine petente interiora. Tertium palpebræ non eleuantur paucificatis in musculis earum spiritibus mouentibus eas. Quartum apparet in oculis debilitas motus & liuedo propter eandem causam. Quintum uisui apparent imaginationes non consueta, tum ex inordinato motu spirituum, tum ex uaporibus ad ipsos eleuatis in agitatione sanguinis, cum conuertitur ad interiora. Sextum infrigidantur extrema primo, postea totum corpus calore amplius conuerso interioribus. Septimum apparet ros quidam frigidus in toto corpore qui budam humiditatibus subtilibus cutaneis calore depauperatis fluentibus exterioribus per poros cutis debilitata contentiua uel forte ex congregatione & suffocatione & ignitione caloris in corde fit quadam effusio, unde uapores quidam uenientes ad cutis superficiem cōdensantur à frigiditate cutis & continentis in humid. quadam apparēte in forma rosis in cutis superficie. Octauum, impotentia ad loquendum & cæteros motus ex defectu spirituum in instrumentis motus. Nonum, fit quadam nau'ea ore stomachi cordi compatiēte, uel ipso æque cito sentiente nocumentum sicut & cor propter acuitatem sui sensus, uel forte in agitatione humorum aliqui humores profluunt ad ipsum. Præterea medici sint attenti cum phlebotomant, soluunt, incidunt, urunt, extrahunt saniem aut aquositatem cum uideat ista signa, desistat ab illis operationibus & remoueant causam futuræ syncopis & si acciderint hæc signa futuræ syncopis in principijs paroxysmorum, aut in quibuscunque alijs casibus, provideant secundum opportunitatem, ne syncopis confirmetur.

Signa causarum debilitatum resoluendo spiritum & paucificando ipsum, notificantur ex præcessione euacuationum. Item ex diuersitate pulsus uehementi cum uicissitudinibus ex prauitate maxima. Signa autem causarum suffocantium sunt, quia sentit æger cor suum suffocari, & præcesserunt causæ suffocantes non inanientes, & permutatione materierum de membris alijs ad cor, & pulsus est significator horum: nā cum est profundus uirtute constante significat materiam cōprimentem, & cum uirtus non constat significat mortem. Signa causarum syncopis per retractionem spirituum ad cor, sunt, quoniam absunt signa causarum inanitionum & suffocationis, de quibus statim dictum fuit, & pulsus non est cum tanta paruitate & diuersitate sicut, cum syncopis sequitur inanitionem, nec cum tanta profundatione sicut cum syncopis sequitur suffocationem, & hoc signū attendendum est in principio, non autem cum syncopizatus appropinquaret morti. Signa causarum syncopis per essentiam habentur per abnegationem aliarum causarum tam primitiarum quàm per communitatem. Et secundo per signa debilitatis & alicuius nocumenti cordis per proprietatem, quæ ex dictis in tremore possunt esse manifeste. Tertio, quia frequenter syncopis si causa sit fortis & fixa. Vnde Hippo. 2. Aphor. Aphorif. 4. Quicumque exoluntur fortiter, & frequenter si manifesta occasione, repente moriuntur, idest, syncopizant frequenter & fortiter, idest, completa syncopi sine manifesta causa, scilicet, primitiua, aut per communitatem, subito moriuntur: significat enim fortem & fixam causam esse in corde, unde licet phuries euadant tandem moriuntur. Tremor quoque frequens & continuus significat nocumentum per proprietatem nisi pendeat à nocumento oris stomachi, aut capsulæ cordis. Signa autem malæ complexionis, oppilationis, mali situs, solutionis continui, pustularum, apostematū, & cæterarum causarū posita sunt in cap. de tremore cordis. Egedem tñ causæ cū debiliter imprimunt in cor, faciunt tremorem, & fortius imprimentes faciunt syncopim, ultimate uero mortem subitā.

Signa autem multitudinis humorum in corde sunt, quia apparet habenti eam cor suffocari, distinguitur autem inter unumquodque humorum per signa superius dicta in tremore cordis. Signa autem syncopis per communitatem ab alijs membris, sunt quia præcesserunt nocumenta aliorum membrorum, cum quorum cremento crescit, & diminutione diminuitur, & ablatione aufertur. Signa autem causarum primitiarum sunt ipsæmet causæ. Signa autem oppilationis & repletionis, tam quo ad uasā quàm quo ad uirtutem, tam in toto quàm in membris particularib. Et signa dominij cuiuscunque humoris: si non sufficiant, quæ dicta sunt in capit.

Io. Arculani R 4 de

de tremore cordis, perquirantur ab Auic. secunda primi, in cap. priis.

Prognostica. Primum syncopis confirmata, id est pendens à causa non remouibili uel confirmata, quia existens in ultima sui malitia, non recipit curam, proprie quando perducit ad uiriditatem faciei significationem extinctionem caloris innati & connexionem colli, omnino debilitate uirtute motiua. Hic enim aliter syncopizatus fortasse non eleuabit caput ut inspiret aerem, natura agente secundum ultimum conatum dum caput eleuabit morietur, unde constriction pectoris quæ sequetur, fiet à membri grauitate, non à uirtute. Secundum est Aphorismus statim allegatus, quicumque frequenter, &c. Tertium, syncopis etiam frequens sequens nocumenta matricis, & aliorum membrorum cordi communicantium secundum plurimum est salua, nisi causa sit ultimate fixa.

Si cum cordis tremore fuerit pulsus uelocitas, & febris; eger ex basilica est minuendus: et trochisci comphorati cum suc. malorum acetosorum in potu sint tribuendi. Qui recipiunt spodij, sem. cucur. citruli, endiuia, lactuca portulaca, ros. sandali al. omnium partes aequales. & pro unoquoque pondere aurei unius ex eis sumatur camphora triu. gran. hordei pondus: ex quibus cum succo macianorum confectis fiant trochisci. de quibus in potu quotidie unius aur. pòdus tribuatur. quod per duas hebdomadas fieri conuenit. Si autem hæc non suffecerint; lac, de quo butyrum sit extra. Etiam, ad bibendum detur. ipse uero nutriatur ex pullis cum aceto, & suc. unæ acerba, & ex acetoso. Syrupum præterea acet. de sacc. factum bibat. Si autem cum tremore cordis non fuerit feb. trochisci musc. in potu sumantur. qui recipiunt mastichis, spica, xiloloes, cinam. garioph. gallie musc. nuc. musc. cubebæ, cardam. maioris, belbane, corticum citri omnium ana pondus 1. aur. musci sextant drach. unius, ex his omnibus cum uino bene redolente conspersis fiant troch. & conferunt syncopi & tremori cordis. Electarium diamas. præciosum, quod ad syncopim, & trisitiā, cordisq; tremorem, & tadium facit. Rec. mastiches cinamomi sem. ozimi maio. garioph. sem. melis, sem. sisimbrij sem. sampluci, macropiperis oīm partes aequales. Ex quibus omnib; puluerizatis drach. 20. sumantur. margaritarū minutarū, coralli rub. cubebæ, setæ crudæ, karabæ, been albi & rub. folij omni ana. drach. 10. musci tabati, adubi puri, drach. s. conficiantur cum melle de mirobol. kebulis. hoc enim electarium ad frigiditatem stomachi, & digestiua ægritudinem optimum existit.

SCHOLIA.

Cordis tremor est quasi dispo media inter pulsū, & debilitatem: atque inter syncopim. curatio igitur est uniuersalis. Ex basilica est minuendus inā (ut inquit Auic.) plurium repletionum cordis non sunt nisi ex sanguine, & uapore nocentia. sem. lact. citruli, endi. portulac. J adiuuant medicinas cordiales. Lac ut remissius infigidet, ac magis recuperet uirtutem. Ex acetoso, f. cordiali. Trochisci mosc. in frigida cordis intemperie curatio fit alcerans, & confortans non euacuans.

Rasis indulgens breuitati intendit in hoc cap. simul agere de tremore cordis, & syncopi. Habet hoc cap. duas partes. In prima agit de cura harum pendentium à causa calida. In secunda, de his pendentibus à causa frig. secunda ibi. Si autem cum tremore. Prima iterum in tres. In prima curat p phlebotomiā. In secunda per infigidantia. In tertia per dia tam. secunda ibi. Trochisci de camphora. tertia ibi. Ipse uero nutriatur. In prima parte iubet phlebotomiam de basilica. Quod uerum est si sanguis peccauerit solus, aut cum aliis humoribus permixtus. Phlebotomatur autem basilica dextra ad remouendum repletionem sanguineam. Sed sinistra ad remouendum repletionem uaporosam. Secundo, iubet dare trochiscos de camphora quaque die usque ad duas hebdomadas, quorum sumatur aur. 1. & misceantur cum 3.3. aut circa succi pomorum acet. Vel ipsi trochisci in forma pilularū sumantur primo, & post ipsos immediate bibat 3.3. aut circa succi pomorum dictorum, qui sit depuratus per decoct. aut per residantiam. Succus autem pomorum rub. acrium quorum copia est apud nos, est huic proposito conueniens. Hi

autem trochisci sunt conficiendi cum suc. pomorum macianorum. Quæ poma apud Dioscor. colligantur in æstate, sed apud Serap. in uere. Et secundum aliquos dicuntur maciana à loco originis, sed uice illorum possumus uti succo pomorum acrium, quæ apud nos sunt, & etiam in æstate colliguntur. Debet hic enim succus esse frig. stip. aromat. reliqua sunt manifesta. Sed hic nota, quod Rasis in trochiscis istis non posuit crocum. Sed credo quod sit ille quem Auic. 1.1. tertij intendit reprehendere, sicut in multis aliis locis consuevit. Credo tamen inhærendo Auic. istos troch. fore præstantiores si adderetur tantum croci quantum est camphora, scilicet gra. 3. pro unoquoque aureo. Secunda pars habet duas partes. In prima curat tremorem cordis, & syncopim pendente à causa frig. cum trochiscis musc. In secunda curat eandem cum elect. diamus. Et partes patent elbane, id est, cardamomum minus. Et manifestum est, quod illi trochisci sunt cal. & sic. circa secundum gradum stipiticate participantis subtilitatis ui, aperiui, maxime confortatiui cordis, cerebri stomachi, & membrorum naturalium. Descriptio etiam diamusci est manifesta, & est calidum & sic. in secundo participans stipiticate subtilitatis ui, aperiui, confortatiui cordis, cerebri stomachi, & membrorum naturalium, in quo omnia ingredientia sunt cal. præter margaritas, corallus, karabæ, quorum conclusio superius posita fuit frigida cum melle de mirobol. kebulorum, id est, de kebulis conditis, qui multum ualent in confortatione membrorum principalium, & stomachi licet sint frig. Et de his est sermo apud Mes. distinet. 4. de conditis qui ipsos conditos summis laudibus extollit ad appetitum, & digestionem, rationis & sensus uigorationem, uisus clarificationem, & ad conseruandam iuuentutem.

Cura tremoris cordis. Sed nunc particulariter accedendo ad curam tremoris cordis præsuppositis generalibus. suprascriptis. Cura tremoris cordis naturalis per essentiam uel per communitatem sex exigit intentiones. Prima ordinat debitum regimen. Secunda digerit. Tertia euacuat. Quarta dinertit. Quinta confortat malam complexionem remouendo. Sexta corrigit accidentia. Prima intent. In tremore cordis calido sit aer frigidus magis aut minus secundum exigentiam sui contrarii. Imo oportet quod aliquando sit multum frigidus, ipsum irrorando cum aqua frig. & aceto, & apud potentem cum aqua ros. & aceto, & cum flabellis, & præsentia foliorum falcis, uitis, florum nenupharis, uiolarum & similium. Item fructuum frigidorum sicut pomorum, pirorum, & citon. Imo si possibile sit, sint strati eius circa aquas currentes, proprie quando in causa eius esset caliditas & sic. superflua. Et odoret frig. scilicet, flores nenupharis, rosas, uiol. & camphoram, sandalos. Et possunt aliqua ex his misceri cum aqua ros. & pauco aceto. Quibus posset addi paucum uini arom. ut uirtus frigidorum melius ad cor perueniat, & addat in confortatione calidi spiritualis aer enim inspiratus est efficax medicina cum immediate ad cor perueniat. Similiter contra, aer sit calidus in tremore frigidus. Ipsum alterando cum musco, laudano, croco, ligno aloes crudo, thure, garioph. gallia, iunipero, & similibus, & strati eorum & panni sint cum istis aromatizati. Propterea bonum est ut panni sui sint de seta & grana. Declinent autem ad sic. cum, uel ad humidum secundum exigentiam sui contrarii. Cui uero in calido sint alterati ad infigidandū cum acetosis cordialibus, ut acetositate citri, limonis, aranciorum, succo granat. ribes, prunis, & cerasis acetosis, & similibus. Item succ. pirorum & pomorum aromaticorum, & lac acetosum sine butyro est conueniens ex herbis eligantur cucurbita, lactuca, acetosella, endiuia, portulaca, & similia in calido. Sed in cholerico eligantur magis humida, in sanguinea declinent ad sic. cum, quapropter hæc humida condiantur cum aliquo ex succis suprascriptis, ad sic. declinantibus. Et ex granis possunt eligi aliqua frigida sicut hordeum, milium, far, prifana, hordeacea, & horum kist. condita tamen cum suprascriptis cordialibus. Ex carnibus eligantur pulli, & cæteræ carnes bene conditionatæ. Et per dices sunt propriæ. Conceduntur tamen ubi timeretur calis uirtutis. Sed constante uirtute ubi opus esset dicta tenui, uitandæ sunt. Similiter oua & uinum. Sed uice eius bibat uinum granatorum, aut syrupum acetosum, aut de granatis, aut de acetositate citri, aut limones cum aqua

aqua debite permixtos. Et si opus si uino sit aromaticum, & limphatum cum aqua acetosa ros. & similibus. Et si abhorret limphetur cum aqua bene conditionata. In frigida uero eligantur mētha, rosmarinus, salvia, melissa, borago, buglossa, foeniculus, petroselinus, & similia. Ex granis cicer, rizum, far, eorum Kist. & aromatizentur cum aromatib. calidis, de quibus supra, & proprie cinamomo, garioph. & croco. Et sint carnes magis ad calidum declinantes, sicut columborum turturum, turdorum proprie comedentium iuniperum, in quorum uentribus ponantur herbæ aromaticæ calidæ, & uinum eligatur uinosum clarum antiquum, ut muscatellinum, maluatium, tribanum, & similia boni odoris, & subtilia. Et si declinent ad dulcedinem erunt magis amica uirtuti & simili modus seruetur in reliquis rebus non naturalibus, ita ut totum regimen declinet ad contrarium discretæ. Et sit in omni dispositione cordis confortatiuum, & spirituum, & membrorum quorum communitate cor compatiatur. Secunda intentio est digestio, quam tamen necessitate cogente præcedit euacuatio, sicut cum materia est multa, aut maligna, aut in ipso corde, aut ipsi proxima, forte si ad ipsum deriuatur, ubi quocumque fuerit. Quod sæpe contingit in cordis passionibus. Euacuatio etiam sanguinis secundum plurimum præcedit digestionem. Syrupi autem & cætera digerentia sint contraria discretæ quantum ad qualitates primas, & sint incisua & subtiliatia in materia crassa, & uiscosa, & incrassantia in materia subtili, & sint confortatiua cordis, & membrorum quorum communitate cor patitur tam proprietate quam stituitate temperata. In sanguineo igitur & cholerico ualēt syrup. de acetositate citri, limonis, de ribes, de pomis, de piris, & de citonijs. Item syrup. de agresta ros. & uiol. Aquæ uero sunt sicut rosarum, uiolarum, acetosæ, nenupharis, boraginis, buglossæ, lupulorum, endiuicæ, cichoræ, capillorum ueneris. Item triasandali, diaboraginis, diabuglossatum, sacch. ros. uiolaceum. Et his possunt addi coralli, gemmæ, margaritæ. Sed in cholerico declinet ad humidum. In sanguineo ad siccum. In frigido uero phlegmatico oxymel simplex compositum syr. acet. compositus, de bisantijs, de corticibus citri sed in melancholico, de epithymo syrup. sapor, de fumoteræ. Aquæ autem sunt sicut buglossæ, melissæ, foeniculi, enulæ, rosmarini, boraginis, & possunt fieri diuersæ descriptiones syruporum decoquendo herbas suprascriptas, & addendo aromata cordialia calida aut frig. Item acetum, saccharum aut mel secundum exigentiam.

Tertia intentio est euacuatio complenda cum phlebotomia in sanguineo, & impendende ab alijs humoribus peccantibus cum sanguine, quæ phlebotomia debet fieri ex basilica dextra primo, deinde basilica sinistra si oportuerit. Si tamen retentio fluxus, hæmorrhoidarum, aut menstrualis esset in causa, inchoandum est à phlebotomia saphenarum, deinde properandum est ad phlebotomiam basilicæ dextræ aut sinistrae, aut utriusque. Quantitas autem sanguinis hauriendi est secundum exigentiam repletionis & uirtutis tolerantiam. Imo aliquando oportet ut sit copiosa usque ad syncopim exclusiue, scilicet, usque ad 28. 3. aut circa, sicut quādo timere de apostemate, aut subita suffocatione & morte, materia multa subito ad cor fluente, aut in inflammatione maxima cum esset opus cor refrigerare subito & notabiliter. Aegritudine tamen dante inducias melius est ut partiat, & huiusmodi euacuationes in tremore & syncopi faciendæ sunt ante paroxysmum ad prohibendum eius reditum. In paroxysmo autem hæc omittenda regulariter, & magis ad diuersiones est intendendum. In cholerico uero euacuamus cum decoctione fructuum, manna, cassia, diaprunis, composito & solutiue, electario de succo rosarum, electario de psilio, & similibus. Si autem timeretur de apostemate præstantius est procedere cum leuibus lenientibus notabiliter infrigidantibus, ne materia agitata amplius fluat ad cor, & ante aut præparetur ad phlebot. nam secundum plurimum ad uitandum apostema à quacunque causa fiat, conueniens est phlebot. & aliquando in sanguineo euacuamus cum lenientib. ad sanguinis mundificationem. In phlegmatico uero & proprie si fuerit phlegma uiscosum confer uomitum, cum optime stomachum mundificet, qui est lacuna phleg. & proprie stomacho nauicante. Et fiat post comestionem incidentium, subtilian-

tium uiscosorum, nauicam commouentium. Euacuatio tamen per secessum est conuenientior, quæ fieri debet cū agario, pilulis alephanginis, diaphoenicon, & similibus. In melancholico uero si fuerit melanch. mixta sanguini fiat phlebotomia. Sæpius autem contingit melanch. mixtam esse sanguini cum ipsa sit fex sanguinis, quàm choleram aut phlegma. Euacuatio autem melancholice fit cum fena, epithymo, mirobolanis indis, lapide lazuli, & similibus mixtis cum suis correctiuis. Et ex compositis est diasena, confectio hamech, pilulæ indæ, de lapide lazuli, & similes. Optimum autem ueliculum medicinarum soluentium melanch. est aqua lactis cū aqua medicinz suprascriptæ possunt distemperari. Semper tamen his solutiuis est admiscendum aliquid cordiale, ut uinum & aqua, de quibus supra, aut cum aquis cordialibus distemperentur. Cauendum tamen est ne ex immoderato usu sequatur fluxus aut excoriatio. Expertum Auic. ad melancholiam est ut fumantur mirobol. nig. & chebulorum, ana. pondus 3. i. epithymi 3. s. lapidis arm. 3. i. quartam, diamus. amar. 3. i. 3. fumantur in potu cum tanto uini odoriferi cum quo dissoluantur. Et quandoque sufficit assiduare administrationem hieræ picræ pondere aurei unius, cum pondere daich, de epithymo dando ipsum in potu cum oxymelle composito. Quarta intentio, scilicet, diuersio perficitur cum fortibus diuertentibus mediocribus aut leuibus secundum gradus fortitudinis eius. Est enim tremor aliquando ita fortis ut sequatur fridor dentium, contorsio oculorum, ablatio uocis, & similia. Aliquis est ita fortis sine tamen his accidentibus, ut audiatur eius pulsatio ab egro & circumstantib. Alius est, qui solum tangendo pectus percipitur. Et in primo casu oportet diuertere potenter. Et quando festinaret casus in syncopim, egro fiant frictions fortes, uentilationes, ligaturæ, incipiendo prope cor & descendendo fiant etiam suppositoria & clysteria secundum exigentiam. Et si timeretur aduentus apostematis fiat phlebotomia diuersiua, sed omittatur quantum est possibile. Similiter uentris solutio cum exoluentibus, ne forte materia agitata amplius fluente ad cor sequatur suffocatio & mors, aut forte syncopis ex uirtutis dissolutione. Tēpore autem quietis phlebotomiæ, & solutiones securius cōceduntur, & omnia genera diuersionum, cum quibus intendendum ad diuersionem materierum & uaporum à corde, & ipsorum euacuationem, & resolutionem prohibendo accidentia animi molesta, & quæcunque possunt attrahere materiam & uapores ad cor. Quinta intentio est confortatio cordis, quæ accommodanda est omnibus intentionibus suprascriptis. Imo complementia illa sunt confortantia. Licet enim confortatio cordis sit attendenda in omnibus eegritudinibus cuiuscunque membri: maxime tamen in passionibus eius. Et hæc intentio cum hoc quod confortat, sit remotiua malæ complexionis, & quorumcunque nocuentorum remanentium post euacuationes suprascriptas, quæ possunt addere in cordis debilitatem. Confortantia autem interius aut exterius applicita. Habeant singularem proprietatem ad cor. Secundo stipticitate moderata participant. Tercio sint sufficienter contraria discretæ cordis & obseruentur canones suprascripti in correctione siue permutatione malæ complexionis calidæ & frig. &c. Exterius applicita in tremore calido sunt huiusmodi. R. ros. uiol. sandalorum rub. citrinorum, & corallorum, ana. 3. i. florum boraginis & buglossæ, ana. 3. 5. croci, camph. ana. gran. 6. aquæ ros. aquæ acet. aquæ florum nenupharis, ana. 3. 2. aceti 3. i. uini, muscatellini, aut alterius uini odoriferi, 3. 5. Misce: Applicentur regioni cordis cum panano aut cendalo de grana in forma rotunda, aut quadrata satis magna, ut notabilem partem pectoris tegat & replicetur actu frigidum magis aut minus, aut tepidum secundum exigentiam temporum anni, & caliditatis ipsius cordis & fortitudinis aut debilitatis eius. Et possunt ex his fieri sacchuli & unctiones, & emplastra ad libitum. Sed in tremore frig. R. florum boraginis & buglossæ, an. M. i. rosarum, melif. rosmar. ozimi, gariophili, an. M. s. ferici, xilaloos xylobalami beē al. & rub. zedoariæ, doronigi, gariophilorum, cinnamomi nucis musc. corticum citri cassiæ, lignæ, ana. 3. s. musci, ambre, ana. gran. 3. aquæ buglossæ, aquæ melissæ, an. lib. mediam, uini muscatellini uel maluatii, 3. 3. aceti 3. s. Misce. Et si opus esset contemperare caliditatem suprascriptorum his potest addere

addere aquā rosaceam, sandalos, & corallos, & huiusmodi secundum exigentiam. Et potes facere unctiones cum oleo liliorum alborum, & cera, & paucis aceti, emplastra secundum libitum. Ergo discurre per medicinas cordiales de quibus supra, & elige calidas, frig. hum. & sic, aut temperatas secundum, quod est expediens tuo proposito, & debent applicari tam tempore quietis, quam tempore paroxysmi. Et completur etiam hac intentio cum sumptis, scilicet, syrups, aut rob. de acetositate citri, limonis, ribes, & ceteris tam à causa cal. quā frig. dictis superius in intent. 2. ad quam recurre. Item medicinæ Rasis expositæ superius sunt præstantes in curatione tremoris & syncopis tam à calida quā à causa frig. pendentis. Et Auic. aliquas describit medicinas, quarum una in tremore non uehementi & calido est hæc. R. doronigi partem unā, camph. 4. partem, sandali. 3. partem, margaritarum, scarabæ, coralli, xyloaloes, spodiij rosarum ana. medietatem partis buglossæ, partes. 2. conficiantur cum aqua malorum, & fiant inde trochisci, dosis est, 3. usque ad aureum. Descriptio alia Auic. fortior in extinguendo. R. sem. lactucarum sem. endiuiz, spodiij, rosarum, sandali, sem. portulacæ, buglossæ, coriandri sicci, coralli, Karabe, margaritarum, ana. partes 2. caphore 4. partē, dosis sit. 3. 2. Credo quod una sufficiat nisi in causa ualde forti, & potest exhiberi in forma pulueris cum. 3. 2. aquæ ros. Sed quia in hac descriptione nihil ponitur calidum possunt addi, 3. 2. uini moscatellini. Auic. tamen in fine cap. de cura tremoris calidi ponit descriptionem mirabilem metas transcendente: dicit quod si superfluat res, augmentetur inflammatio, & timeatur quod sit uestigium apostematis scilicet calidi, tunc fortasse est ibi necessarium, ut in potu des semen mandragoræ & opium. Et melius quidem est ut in potu tribuas de semine mandragoræ pōdus quartæ 3. unam, & de opio usque ad medietatem 3. unam, permixtis cum medicamine aromatizato ex musco, xyloaloe crudo camphora, & croco, secundum uirtutem & horam necessitatis. Auic. itaq; tribuit in una dosi mediam 3. opij, & quartam de semine mandragoræ, cum tamen ipse secundum canone capitulo de opio ponat dosim eius esse 2. dauich, & sunt 16. grana hordei. Amplius in eadem recepta ponit opium duplum ad semen mandragoræ contra canones dosandi medicinas: debet enim minus eleuatum in gradu poni in maiori dosi, præcipue in his de quorum exhibitione est magnus timor.

Respondet quidam intentionem Auic. esse conficere hæc medicinam, quæ non tota exhibeatur simul, sed quantum uidebitur opportunū. Hæc responsio est contraria uerbis Auic. & suæ intentioni. Respondit Gentilis, quod triplex est opij. Vnum quod colligitur per resudationem ex papauere Aegyptio nigro, & est ualde forte. Secundum fit ex capitibus papaueris contritis, & est leuius. Tertium fit ex semine lactucæ agrestis, & est leuissimum, & minus stupefactiuum, quā semen mandragoræ. Possumus ergo dicere quod Auic. intelligit de 2. & 3. opio, non autem de primo. Alia responsio Gentilis, quod opium datur ad multas intentiones. Aliquando ad stupefactiones. Aliquando ad sistendum catarrhum & fluxum uentris. Aliquando ad alterandum malam complexionem calidam fortem. In primis casibus communiter parum de eo sufficit, ut puta 3. aut 4. gran. Sed ad alterandum caliditatem fortem opus est, ut exhibeatur secundum resistentiam sui contrarij, caliditateque existente concedit Auic. dosim prædictam opij, & mandragoræ, præcipue corpore existente multorum spirituum & magnæ resistentiæ, tam ex parte caliditatis naturalis, quā accidentalis: nec est inconueniens ut exhibeatur huiusmodi medicina ita potens ad euitandum maximam ægritudinem omnino mortalem, & non est inconueniens, quod corpus ægrum magis resistat contrariis, quā ipsum sanum: tolerabit ergo dosim opij, quā tempore sanitatis non toleraret. Super hanc tamen medicinam non est audendum nisi prius fuerimus experti corpus similes medicinas tolerare facilius. Ego enim aliquando in sedatione doloris dedi quatuor 3. philonii romani. cum ante expertus fuisset duas non facere impressionem. Est ergo hic casus Auic. casus particularis rarissime contingens, sed pro somno inducendo aut catarrho sistendo, & similibus, non est opus ita fortiter stupefacientibus, cum eis communiter non sit contra-

rium tantæ resistentiæ. Medicinæ autem permutantes complexionem frig. apud Auic. sunt theriaca, mithridatum, diamusculum dulce, et amarū quod est calidius dulci, milium ambræ, id est, parua quæritas ambræ, quia calida & multum aromatica sicut etiam debet dari parua quantitas musci. Ideo authores in confectione medicinarum recipientium muscū, crocum, & similes ualde aromaticas ponunt paruum dosim ipsarum in comparatione ad alias, quasi superflua aromaticas sit nocens. Sexta autem intentio, scilicet, correctio accidentium perficitur secundum ipsorum exigentiam. Inter cætera prohibeatur syncopis succurrendo remedijs opportunis de quibus in capitulo proprio. Et stridori dentium succurrat ponendo aliquid molle inter dentes. Tremor autem pendes à mala complexionem sine materia exigit omnes intentiones supra scriptas præterquam digestionem, euacuationem, & diuersionem. Verum diuersio aliquando conuenit ad prohibendum fluxum humorum ad locum læsum præcipue cum humores in corpore superfluerint: patet itaque curatio eius ex supra scriptis. Tremor autem pendens à solutione continui non habet curam. Similiter pendens ab apostematibus iam factis in ipso uel eius capsula. Verum in principio antiquam fiat succurrendum est cum phlebotomijs copiosis, euacuationibus secundum exigentiam, & omni genere diuersionum. Item cum stipticis confortantibus & tumentibus cor ne recipiat humorem. Item remouendo causam fluxus humorum. Item in crassando, & etiam ipsos compingendo si fuerit oportunum ne facile sua subtilitate fluat. Propterea Auic. concedit stupefactiua. Et in his casibus opus est diæta tenuissima, sicut in alijs apostematibus membrorum interiorum. De eorum tamen cura actum est superius. Similiter dictum est de cura malæ compositionis siue sit oppilatio, siue sit malus situs. Et si pendeat à dolore cordis remouetur per remotionem causarum dolorum cordis, quarum cura statim est posita. Sed factus à nimia sensibilitate curatur prohibendo omnes causas potentes lædere cor. Item confortando ipsum sicut dictum fuit in intentione quinta. Tertio remittendo sensum cum usu præbentium nutrimentum crassum sicut carnes bouinæ, porcina, leguminum, & similia, & usu frigidorum, & humidorum sicut lactuca, endiuia, spinachia, & similia. Item casei & lactis. Factus à debilitate cordis curatur remouendo causas debilitatis. Item confortando ipsum conueniente regimine sex rerum, & etiam regimine medicinali si fuerit expediens sicut dictum fuit in quinta intentione. Sed factus à uentositate & uaporibus curatur sicut ille qui pendet à materia, & cum hoc resolutioni uentositatis & uaporum attendendum est, & in ipso confert phlebotomia basilicæ sinistræ. Factus autem per communitatem à toto sicut in febribus curatur curatione febrium, & confortatione cordis, & resistendo malitiæ complexionis impressæ, aut imprimendæ à febre, uel à causis eius quod secundum plurimum est calida, & indiget frigidis cordialibus interius & exterius applicatis, licet aliquando sit frigida sicut in syncopali humorsosa. Sed in tremore sequente crissum attendatur complemento crissu tuendo tamen cor secundum quod est expediens. Sequens autem dolorem cuiuscunque membri curatur per remotionem illius doloris membri, & cordis confortationem. Cura autem tremoris cordis facti per communitatem à membris particularibus exigit duplex regimen. Vnum est membri communicantis complendum euacuatione, diuersione, ab ipso membro remotione malæ complexionis, & cuiuscunque alterius nocimenti eius, & confortatione ut sit minora laudabilium humorum. Aliud debetur cordi complendum confortatione eius, & resistendo nocimento impresso, & imprimendo in ipsum secundum quod est expediens. Factus autem à uenenis sumptis curatur cum educatione eorum, uomitu, aut secessu aut utroque modo. In principio tamen nominatus est præmittendus cum sumptione olei, aut aquæ tepidæ, aut utriusque simul mixti, & fiat exquisitus, postea detur lenitiuum. Et attendatur confortationi cordis, & dentur bezahartica propria. Factus autem à morsu serpentum curatur attrahendo uenenum impressum in loco, fricando locum ut sanguis exeat, postea lauando cum aqua calida locum mortuum, & applicando pullum nouiter mortuum adhuc calidum. Et ut obuiet cum uisceribus aut applicando anum galline uiuentis

uentis, & tuendo partes superiores membri morfi cum aceto, & aqua rosata. Et confortando cor cum interius & exteriori applicitis. Et theriaca est optima in morfu uenenosorum sumpta & applicita. Sed tremor sequens alias causas primiti uas curatur cum remotione earum, & remotio nocimenti ab eis impressi, & cordis confortatione.

Cura syncope curabilis exigit duplex regimen. Vnum administrandum tempore paroxysmi. Alterum tempore quietis ad prohibendum reiterationem paroxysmi. Regimen administrandum tempore syncope diuersificatur secundum causas eius proprie secundum triplicem causam in diffinitione expressam. Si ergo causa syncope fuerit paucificatio spirituum, & non superfluat præter illos qui sunt in minera, intendendum est ipsorum regenerationi, uiuificationi, & prohibitioni resolutionis & paucificationis ipsorum, tam regimine sex rerum non naturalium, quam medicinali. Aer ergo declinet ad contrarium discrasie, & nocumendi quod facit paucificationem spirituum. Et sit boni odoris aromatizatus cum calidis aut frigidis secundum exigentiam contrarij corrigendi. Secundum plurimum tamen debet ad frigidum declinare, aut ad temperamentum nisi sit in causa frigiditas mortificans. Et similiter debent uelles & lecti aromatizari. Frigida autem sunt sicut rosa, uiola, camphora, & sandali, & poma, & pira, citonia, & cetera superius memorata. Calida autem sunt sicut muscus, ambra, crocus, gariophioli, cortex citri, gallia musc. & similia, quibus utendū est pro aere, uestibus, lectis aromatizandis. Odores autem magis conuenientes cæteris paribus sunt illi quibus agri delectantur quando enim delectantur odore citonii, piri, & pomi. Aliquando odore uini aquæ rosæ & similia. Commune tamen magni iuuamenti est quod sit ex uino odorifero aqua ros. muscata in quibus panis assus infusus. His autem possunt addi frigida sicut sandali, camphora, & similia. Et possunt addi calida sicut gariophi. muscus, & similia, & si acutum placeat potest addi parum aceti. Fiunt etiam poma odorifera calida, frigida, & temperata secundum exigentiam contrarij corrigendi, quarum descriptiones solennes posui in tractu de pestilentia, & de his est sermo apud Mesue in fine capituli de catarrho. Hi autem odores suauis sunt conuenientes ad nutriendum spiritus, siue potius ad fouendum ipsos sua similitudine: non tamen credo, quod uere nutriant. Non tamen conceduntur in præfocatione matricis, siue in syncope per communitatem à matrice, cum matrix moueatur ad odores bonos. Imo potius applicentur naribus syncopizata ex matricis odores foetidi: qui tamen sint conuenientes ori stomachi sicut odor calami uisti, qui est expertus in cura calidæ cholericæ, & similiter gypsi. In collo matricis supponantur odorifera sicut gallia muscata, & proprie cum paucio uino odori ferro, aut oleo liliorum alborum infuso in eis lichinio & supposito. Cibi autem & potus sint resumentes calidi, frigidi, aut temperati secundum exigentiam. Eligatur ergo uinum coloris aurei, & odoris aromatici subtile cum stipticitate quadam attingens dulcedinem, notabiliter uinosum aut mediocriter uinositas, ita ut sumens in ore fere subito sentiat fumositatem cum aromaticitate. In syncope tamen ab euacuatione potest esse coloris nigri ut sit crassius, & nutritilius prohibens resolutionem. Et debet exhiberi calefactum actū, & proprie ualde paucificatis in calore naturali, & causa frigida & si sit mixtum cum aqua carnis, imo non detur sine ipsa si ad sit multa fames & inanitio, uel panis sit in ipso dissolutus ne subito penetret omnino indigestum. Et potest aromatizari in calida cum aqua rosæ secum mixta. Item cum sandalis, citrinis, & similibus. Et in causa frigida cum paucio musci, cinamomi, gariophilorum, uel in causa calida secum misceatur syrappus acetosissimus citri. Et in frigida parum diamusci dulcis, uel misceatur cum aliis quibus æger magis delectetur, & ex maxime conuenientibus. Et proprie ubi stomachus commouetur est miua appropriata syncope posita ab Auic. in Antidotario mixta cum uino. Et cibatio sit frequens & pauca pro uice ab 3. i. usque ad 2. Et ad hanc intentionem est contusum pulli, oua forbilis, testiculij gallorum, & similia, quæ cito trāsmutentur, & quorum parum multum nutrit. Et cauedum est à uino potenti puro in notabili quantitate, ne cerebrum &

neruos percutiat, & ne præter modum inflammet proprie in causa calida: fortasse enim accidit ex eo permixtio rationis, aut spasmi, nisi aqua aut alio liquore temperetur. propterea dicit Auic. quando necessarium est in ægritudinibus acutis dare uinum propter syncopim melius siue magis conueniens est, ut sit inspidum, quia tale est pauciferum. Sed forte quis instabit quomodo potest syncopizatus aliquid sumere cum sit in eo destructus sensus & motus. Respondetur, quod per tempus syncope intelligo totum illud tempus in quo est actū syncope uel syncope proximum, cum nondum in totū cōualuit à syncope, licet loqui posset, & deglutire. Vidi enim plures syncopizantes decies in hora. Non tamen inter syncopim & syncopim omnino absoluebantur à nocumendo syncope. Et aliquando cadit tempus notabile inter paroxysmos syncope. Et hoc est quod dicit Auic. Et patiens quidem syncopim quandoque est in syncope, quandoque est in eo quod est inter syncopim & sanitatem, quandoque est in leui paroxysmo syncope. Hæc autem cibatio frequens, quæ conceditur in syncope sequente inanitionem & paucitatem spirituum non ita conceditur sequente retractionem spirituum ad cor, & multo minus in sequente præfocationem spirituum in corde & repletionem. Imo multum debent abstinere. Et forte nihil dari durante paroxysmo syncope, licet in omnibus aer & odores boni concedantur. Somnus apud Auic. prohibetur. Inquit enim patientes syncopim præcipiunt uigilare & demittere locutionem, quod uerum est in patientibus syncopim ex retractione spirituum, & ex præfocatione eius in corde, cum somnus trahat spiritus interius, & augeat præfocationem, sed in syncopizatis propter paucitatem spirituum sequentem euacuationem quancunque præter sudorem, credo somnum in paroxysmis syncope cōuenire, cum sistant omnes euacuationes præter sudorem, & maxime post cibum ad fortificandum digestionem. Quia tamen somnus est constans guineus syncope, est attendendum dum dormiunt qualis sit facies pulsus & anhelitus. Sed de hoc erit speciale dubium in fine capituli. Ex his sequitur exercitium non conuenire syncopizatis, cum apud Auic. præcipiatur ipsos demittere locutionem. Nam multo magis debent demittere alia exercitia quibus magis fatigantur & debilitentur. Frictiones tamen cōueniunt in syncopizatis propter retractionem spirituum & præfocationem spiritus in corde, non autem conueniunt in syncope sequente paucitatem spirituum, imo stent supini & non moueantur. Sed alii & præcipue syncopati ex præfocatione spiritus & retractione stent magis capite eleuato, & fricentur. Omnes tamen sunt altis uocibus uocandi & excitandi dum sunt actū in syncope, licet extra syncopim debeant permitti dormire qui patiuntur syncopim ex inanitione. Circa repletionem & inanitionem est sciendum, quod qui patiuntur syncopim propter paucitatem spirituum non debent inaniri aliquo genere euacuationis dum sunt in paroxysmis syncope, neque multum à cibis abstinere, imò, ut dictum est frequenter, & parum est exhibendum. Sed cæteri maxime patientes syncopim ex præfocatione propter multitudinem humorum existentium in corde aut repentiū ad cor debent abstinere & euacuari uomitu, suppositoriis, clysteriis, phlebotomiis secundum exigentiam in paroxysmis syncope, quæ tamen fiant cum cautela timore, & quando cætera non contulerint. Non tamen dentur uomitiua fortia aut medicinæ exoluentes & materiam agerantes, ne humores amplius ad cor præcipientur. Sed difficile est subuenire syncopizatis qui simul indigēt restauratione spirituum, & nociui euacuatione, sicut aliquando contingit. Et in hoc stat medicus prudentia ut utrique attendat. Sed ei magis de quo maior est suspitio. Sint tranquilli sperantes & gaudentes, uitanda sunt accidentia corpus exterminantia. Iuuantur rerum amabilium rememoratio & habitatione cum dilectis. Regimen autem medicinale tempore syncope est, ut aspergatur facies aqua frig. aut aqua ros. mixta cum paucio uini odoriferi: excitat enim à profunditate syncope, & est commune remedium omnibus. Et in omnib. speciebus syncope intendendum est ad remotionem causæ quantum fieri possunt secundum uirtutis tolerantiam. Si ergo syncope sequatur aliquam euacuationem sistenda est, non quidem cum opiatu si aliter fieri potest, sed aliis ingeniis, quæ uirtus potest tolerare, & cum hoc

hoc uirtus est cibis uiuificanda secundum canones suprascriptos. Et commune remedium in cibos, quæ sequuntur paucitatem spirituum est, ut fiat pororum cutis oppilatio prohibens spirituum resolutionem cum aquæ ros. ratione, euentatione & cum flabellis, & similib. & cum indimentis in quibus sit uirtus sandalorum, rosarum, & similium, & cum odore, & sorbitione frigidorum cordialium sicut acetositas citri cum aqua rosata, aut acetosæ. Nisi in causa sit frigus uehemens aut solutio fortis. Cum frigidis tamen semper sit mixtum ali quid calidi quo delectetur sicut musci aut croci, notabiliter tamen frigidis dominantibus, & iuxta hanc intentionem est melius ut uinum, & quicumque potus sit actus frigidus, non tamen ita ut fiat calidi extinctio. Illud autem quod supra dicebatur de potu calido actus obseruandum est ubi calidum naturale est ualde paucificatum, & maxime in causa frigida & in quibus multum durat syncopis, & quorum totum corpus infrigidatur. Et isti indigent inunctione extremitatum & stomachi cum oleis calidis aromatizatis. Et in hac syncopi sequente paucitatem spirituum assidue embrocatio extremitatum, & partium membrorum regalium cum aqua rosata, & cæteris frigidis cordialib. in quibus tamen aliquid modicum musci, croci aut uini odoriferi ponatur. Et si fuerit singultus aut nausea, tunc oportet ut uiuificetur caliditas infirmi, & adiuuetur natura eius commouendo guttur cum pen na excitando uomitum & commouendo spiritum ad exteriora. Et assidue clamores maximi circa ipsum, & stringantur digiti dolore inferendo, & fiat titillationes, & prouocantia sternutationem, & omnia intelliguntur quando est in actu syncopis ad excitandum ipsum à profunditate syncopis. Cumq; illa non ualent, & non sternutat, moritur. Et si syncopis est causa meri, & sit possibile ut expellatur cum uomitu facili, clysteri, aut phlebotomia, fiat istud. Et si est propter euacuationem ex partibus intrinsecis, non autem per poros cutis calefiant extremitates si sint frigide, & fricentur cum oleis calidis aromatizatis. Et quandoque necessarium est stringere ea ad reuocandum calorem exterius, & ad excitandum ægrum à profunditate syncopis. Sed multo magis hæc necessaria sunt ubi syncopis sequitur attractione spiritus ad cor aut præfocationem ipsius in corde. Et sistatur omnis euacuatio secundum quod oportet. Et attendatur uirtutis uiuificationi. Vnde in syncopi sequente choleriam passionem sumantur huiusmodi potus. R. Aquæ carnis proprie factæ per expressionem carniū .j. i. succi citoniorum, uini an. .j. s. galliæ musc. gran. .j. uel. .j. s. misce, & si syncopis sequitur sudorem uel aliam euacuationem & ex parte cutis, ungatur cutis cum oleis stipticis & aspergatur desuper puluis cō striditius sicut myrtus, lutum, chimolæa, cortices granatorū & similia frigida stiptica, & uiscosa, & nullo modo materia extrahatur exterius, sed in syncopi sequente euacuationem intrinsecam nullo modo huiusmodi approximentur. Augmentarent enim euacuationem illam comprimendo materiam interius. Et si fuerit causa doloris, & non sit possibilis eius sedatio, alio ingenio stupefac membrum dolorosum, sicut cura tur cholica cum philonio & similibus. Et si uenena fiat in causa, dentur bezahartica contra illa uenena. Et obseruetur canones suprascripti tam in uenenis sumptis quam in moribus uenenosorum. Et si causa syncopis fuerit repletio in ore stomachi, studendum est ut euomatur, quoniam sanat. Et oportet ut toleret famem & minuatur cibus. Et loco exercitii fiant fricationes totius corporis. Ita ut etiam in stomacho & uesica. Et non cogantur sumere aliquid nisi uinum prædictū, quod necessarium est in dispositione syncopis. Et medici stulti student in cibando cum existimando quod sit conueniens, & uiuificent uirtutem eius. Ipsi ergo suffocant caliditatem innatam & interficiunt ipsum. Sed conueniens est ut detur syrupus acet. mixtus cum aliquo subtilitate, sicut est decoctio hyssopi, si humor fuerit crassus & uiscosus. Si autem subtilis, post ipsius uomitum. Si fuerit facilis, detur aliquid repressiuū, sicut syrupus de granatis, de agresta & similes. Et in summa in quacunque specie syncopis attendatur remotioni causæ eius secundum quod est possibile. Ex prædictis ergo bre uiter collige duplex regimen. Vnum administrandum tempore paroxysmi syncopis siue æger sit in actuali syncopi, siue in dispositione media inter actualem syncopim, & sedationem

totalem accidētium syncopis. Alterum est administrandum sedatis omnino accidentibus syncopis. Primum autem si est in actuali syncopi, ut remoueat à profunditate syncopis cum asperione uiolenta aquæ frigide, ut rosaceæ, aut sibi proportionalis in facie eius, & cum clamoribus maximis circa ipsum, & cum titillationibus circa partes sensibiles, & inferendo dolores quosdam sicut digitos contorquendo, & similia operando circa ipsum, & approximando bonos odores nari bus & cordialia in regione cordis, nisi in ea quæ provenit à matrice in qua foetidi odores naribus apponantur, qui tamen confortent os stomachi & boni odores in collo matricis supponendi sunt. Item prouocando sternutationes, & si non sternutat non est spes salutis, & hæc omnia conueniunt in quacunque specie syncopis. Sed in alijs diuersificantur. Nam syncopizantes ex paucitate spirituum debent restaurari cibo & potu sicut dictū fuit, alij uero debent abstinere, & proprie cū syncopis sequitur materiam lædentem multitudinem, aut malignitatem, non autem paucitatem spirituum, & proprie cum spiritus in corde præfocatur. Sed in his conueniunt uomitus, clysteria, phlebotomizatio, uentosa, ligaturæ, frictiones, & omnia genera diuersionum, quæ non conueniunt in sequente spirituum paucitatem. Sed in nullis conueniunt solutiuia sumpta saltem notabilis fortitudinis. Omnes tamen conueniunt in remotione suæ causæ secundum quod est possibile in tempore illo. Et syncopizantes ex paucitate spirituum debent iace re supini. Sed syncopizantes propter retractionem spirituum aut præfocationem eorum in corde debent stare magis eleuati, præcipue quando syncopis sequeretur asthma & anhelitus præfocationem.

Regimen autem adhibendum cum totaliter accidētia sint sedata, licet remaneant causæ potentes reiterare syncopim, est omnino prosequendum secundum quod dictum fuit in cura tremoris. Nam causæ eadem quæ faciunt tremorem cordis, si augentur, faciunt syncopim. Est tamen remissius procedendum in syncopi in omnibus quæ possunt uirtutem debilitare. Cura lipothymizæ & casus uirtutis subito patere potest ex cura syncopis. Sed ut dictorum ueritas eluceat, sunt quedam dubia remouenda. Primo de intentione Gal. & Aui. tenendum est uomitum in syncopi competere quibusdam conditionibus seruatis. Primo quod uomens sit facilis ad uomitum. Secundo quod materia quæ facit syncopim sit in motu faciens nauseam & subuersionem taliter ut leui remedio sci licet impositione pennæ possit expelli, aut cum sumptione leuis uomitui, sicut aquæ tepidæ cui parum olei & acetis admixtum, neque sit alia causa manifesta uomitum impediens. Et huic sententiæ Gal. & Aui. taliter limitatæ, parum obstat rônes Auer. 2. Colliget, quas gratia breuitatis omitto, & quia pauci sunt momenti. Secundum dubium remouendum est propter dictum Aui. in fine cap. de syncopi. Patientes quidem syncopim præcipiunt uigilare & dimittere locutionem. Pro quo sciendum quod debent dimittere locutionem, quia labor duplex est in locutione spiritus resolutionis & uirtutem debilitans, unus in cogitatione, alter in motu membrorum spiritualium & reliquorum deferuentium locutioni. Attamen pro paruo tempore debent dimitti, imo cogi loqui ut releuentur magis à profunditate syncopis, sed cum notabiliter releuati sunt, prohibeatur locutio. Sed de uigiliis sciendum dictum Auic. posse intelligi, aut tempore actualis syncopis, aut tempore quietis. Sed de tempore quietis dicamus, primo quod uigiliæ aliquando conueniunt, aliquando disconueniunt, secundum diuersas causas syncopis. Si enim syncopis sequitur morsum, aut sumptionem uenenosorum, aut apostemata maligna uenenosa, sicut althoin & similia, aut febres pendentes à materia uenenosa sicut pestilentialia, syncopalem minutam, uigiliæ conueniunt, & somnus prohibendus, ne materia & uapores ueneni uadant ad cor, cum in somno fiat reditus sanguinis et spiritus ad cor, ut supra in cap. de subeth. Et Aristo. 3. de animalibus in cap. de sanguine & lacte, dicit quod signum reditus sanguinis ad intra est quod si scindatur cutis non exibat sanguis in dormiente sicut in uigilante, hoc tamen intelligendum est quantum ad principium somni, quia postea in processu panduntur sanguis & spiritus. Item Auic. 4. primi cap. de phlebotomia dicit, quod superfluitates in somno ad profunditatem corporis

trahuntur. Et propter hoc. 2. primi cap. de somno & uigilia, homo præterea cogitur uigilare multoties & somnum à se dimittere timore syncope & casus uirtutis. Item iuuamentum, somni quod esset in his casibus ad fortificandum digestionem est nullum, quia materia uenenosa non sunt digestibiles. Si autem syncope fieret à membris frigidis repletionalibus sicut in syncopali humorosa, somnus conceditur ad fortificandum digestionem. Propterea dicitur Auic. in cura syncopalis humorosa ponatur medietas temporis dormitioni, & medietas temporis fricationi si possibile est. Somnus enim iuuat ad digestionem humorum crudorum, & frictio resolutionem. Item in omni syncope sequente euacuationem somnus competit, præterquam in sequente sudorem, cum somnus omnes manifestas retineat euacuationes præter sudorem. Nisi forte sudor sequeretur nimiam pororum dilatationem. In quo casu somnus magis competit quod uigilia, cum magis iuuat ad pororum cutis contractionem quod uigilia. Huius autem signum est, quia corpus magis infrigidatur in partes extrinsecas in somno quam in uigilia, & e contra in uigiliis. Propterea pluribus indigemus operimentis in somno quam in uigilia, secunda primi. Si uero syncope sit à dolore corporeo somnus confert, sopit enim dolorem. Si uero pendeat ab accidentibus animi, somnus confert pro quanto sedat accidentia animi, & facit ad obliuionem, sed magis confert in his accidentibus, quæ trahunt spiritus ad exteriora, sicut gaudium, ira, & similia quam in trahentibus spiritum ad interiora, sicut timor, tristitia, & similia. Si uero in causa sit labor & fames adhibito cibo somnus confert, sed absque cibo nocet, apud Rasm in diuisionibus cap. de agitudine stomachi. Sed nota quod quamuis aliquibus syncopizantibus somnus concedatur, aliquibus uigilia, notamen credendum est quosdam eorum semper debere uigilare quosdam dormire, sed omnibus dum diu persenerat in quiete syncope, sunt somnus & uigilia necessaria, sed aliquibus magis somnus quam uigilia, aliquibus e contra. Et semper dum syncopizantes uigilant aut dormiant, sint medici, aut astantes qui semper noceant faciem, pulsum, & anhelitum, noceantque accidentia ex somno sequentia & uigilia & an syncope magis infestet in somno uel in uigilia. Et secundum exigentiam posset prouideri, si enim somnus contulerit permittantur dormire, si non euigilentur. Sed in actu syncope si ipsa sequatur attractionem spiritus ad cor, aut eorum in corde præfocacionem excitandi sunt, & proprie si pendeat à materia ledente sui multitudine aut malitia. Quod si sequatur paucitatem spiritus, & fuerit sine cibo quo restaurari possunt, euigilentur & cibentur, postea permittantur dormire. Si uero cibati dormiant in actu syncope, si tibi costet de somno, quod tamen est difficile, permittantur, & præcipue si præcesserint longa uigilia, sed semper attendatur facies, pulsus, & anhelitus, an tendant in melius & finantur dormire. Si uero in deterius euigilentur, & prouideantur secundum opportunitatem. Si uero tibi non constet de somno, excitentur à profunditate syncope, nam possent adeo profundari quod mors sequeretur.

De anatomia meri & stomachi. Cap. 77.

Iuxta morem nostrum. In primis præmittenda est anatomia meri, siue oesophagi & stomachi. Meri est canalis siue uia cibi ab ore ad stomachum & superfuiturum à stomacho ad os longa, stricta, rotunda, cum ore superius & epiglottide, & cum stomacho inferius continuata, iuxta spondiles sita, & duabus tunicis, cum uillis longitudinalibus, & latitudinalibus composita, ad deglutendum finaliter ordinatum. Pro eius diffinitionis declaratione sciendum quod cum meri habeat duas operationes pro toto communes, scilicet deglutire, & expellere quæ in uomitu expelluntur. Principalis operatio sua est deglutire. Et hanc leuiter perficit, primo quia est sibi naturalis, secundo, quia ad ipsum concurrunt utraque tunica interior neruosa in qua sunt uilli longitudinales deferuientes ad attractionem, & exterior carnosa, in qua sunt uilli latitudinales deferuientes ad expulsionem, attrahit enim primo per longitudinales, deinde quod attractum est paulatim expellit uersus stomachum per latitudinales. Et tertio quia graue facile tendit deorsum. E contra uero uomitus est difficilis, primo quia præter naturam, nam si fiat à natura sit ab ipsa præternaturaliter stimu-

lata, & non completur nisi per tunicam extrinsecam cum uillis longitudinalibus, & quia graue cum difficultate ascendit superius. In meri autem non fuerunt uilli transuersales, quia non ordinatur in retentionem. Quamuis aliqui dixerunt in ipso esse aliquos paucos transuersales, quia illud quod deglutitur & si sit liquidum paulatim descendit, quod arguit ibidem esse aliquam uirtutem retentiuiam, non enim descendit sicut in foramine. Primi tamen responderent hunc gradum descensum esse per uillos longitudinales, & latitudinales, nullo modo existentibus transuersalibus. Est autem meri longius quam sit canna pulmonis. cum transeat diaphragma usque ad 13. spondilem, ubi continuatur cum stomacho, & est situatum post cannam iuxta spondiles, quia canna debuit esse anterior, cum inspiratio aeris per eam ad pulmonem sit fere continua, quare hunc locum anteriorem sibi dignius uendicauit, ut sit ori magis continua per quam aer ingreditur. Et etiam cum sit cartilaginosa est magis tuta ab extrinsecis occurrentibus. Et cum meri descendunt duo nerui à tertio pari neruorum cerebri uenientes ad os stomachi ad dandum ipsi sensum, ut cum uacuum est percipiat inanitionem, & insurgat cibi & potus desiderium. Et non pertranseunt ad fundum eius cum illi non pertineat hæc sensatio. Stomachus est membrum instrumentale magnum rotundum ad figuram tendens arcualem, in medio corporis situm, ex duabus tunicis cum uillis longitudinalibus transuersalibus, & latitudinalibus compositum, duo habens orificia. Vnum superius cum meri. Alterum inferius cum intestino duodeno continuatum ad appetendum, & digerendum cibum pro toto prima digestionem finaliter ordinatum. Quod sit instrumentale manifestum est. Et magnitudinem eius arguit quantitas cibi in ipso contenti, licet dum continet cibum corrugetur & paruificetur, & est rotundum, quia hæc figura est capacissima & à nocentibus magis tuta. Tendit tamen ad figuram arcualem in modum cucurbitæ retortæ, cum os ipsius sit magis in sinistro & superius, fundus magis in dextro & inferius, quod factum fuit, quia ad os ipsius debet transmitti melancholia à splene ad famem excitandam, & fundus debuit esse in dextro, ut hepar super positum ei cum quinque penulis suis ipsam amplecteretur ad uigorandum eius digestionem, & quia cholera quæ in Kysti sub media pennula hepatis continetur, debet transire ad fundum eius ad uigorandum digestionem. Et quia in latere sinistro iuxta renem est intestinum colon circunvolutum occupans magnam partem, & in dextro sunt intestina gracilia parum loci occupantia, quare congruentius fuit, ut fundus in dextro, & os in sinistro locaretur. Est autem situm in medio corporis, habet enim de super cor mediante diaphragmate. Inferius mesenterium & intestina, à dextris hepar, à sinistris splenem cui superponitur anterioris zirbum, & siphax, & mirach. Posterius habet musculos dorsales, uenam chilis, & arteriam aorti descendentes, ex quibus patet ipsius colligantia. Est autem compositus ex duabus tunicis. Intrinseca neruosa densa & crassa cum immediate obuiet cibo, ne si esset mollis facile patiatur ab ipso. Exterior autem fuit carnosa minus densa & crassa adiuuans ad digestionem. Hæc autem debuit esse exterius, quia non est necessarium id quod digeritur contingi à digerente. Sed bene necessarium est id quod sentitur sensu tactus contingi à sentiente. Sunt autem in stomacho uilli longitudinales siti in superficie intrinseca tunice interioris ipsius stomachi, ordinati ad attrahendum cibum à meri, imo ipsum meri attrahit cibum ab ore, sicut & in uomitu stomachus & primus inchoans, meri autem sibi deferuit tanquam ei subordinatum. In superficie autem extrinseca tunice interioris, sunt uilli transuersales ordinati ad retinendum quod per uillos longitudinales est attractum, donec digestiua sua compleat operationem. In superficie autem tunice extrinsece sunt uilli latitudinales ordinati ad expellendum, quod in stomacho indigeat expulsiue, aut ad intestina per pyloron, aut ad extra cum uomitu per uiam oris & meri. Habet etiam stomachus duo orificia. Primum superius cum meri continuatum, quod est latius quam inferius continuatum cum duodeno dictum pyloron, quia res crassæ debent per superius transire ad stomachum. Sed res subtiles debent ire per pyloron ad intestina iam prædigesta in stomacho. Istorum autem orificiorum

Io. Arculani

5

primum

primum non est in parte suprema stomachi. Nec secundum in parte infima, ne fieret facilis descensus cibi ad inferiora ante digestionem. Imo natura ordinavit, ut magna pars fundi stomachi esset infra orificium inferius, ne cibis indigestus egrediatur. Et etiam ordinavit, ut magna pars oris stomachi esset supra orificium superius, ne si homo pedibus suspenderetur, cibis immediate per os egrediatur. Est tamen stomachus secundum os eius alligatus decimæ tertie spondili dorsi, quæ est uigesima numerando à suprema spondili. Et propterea medicina oris stomachi debent exterius circa 13. spondilem applicari, quia declinat os stomachi posteriùs sicut fundus declinat anterioriùs. Et secundum fundum eius est alligatus decimæ octavæ spondili dorsi, quæ est ultima quinque spondilium, alchatham. Et numerando à suprema spondili est uigesima quarta ita quod stomachus secundum os eius alligatus primæ spondili alchatham, & secundum fundum ultimæ. Est autem ordinatus ad appetendum cibum pro toto & digerendum ipsum prima digestionem, cum secunda digestio fit in hepate. Appetitus autem debetur ori stomachi sequens sensationem ei tributam per nervum descendente per meri à tertio pari nervorum cerebri. Digestio autem principaliter eius fundus debetur. Et sunt in eo uenæ quæ ad minima diuiduntur deferentes ei sanguinem quo nutritur. Et similiter sunt in eo arteriæ diuise, sed non ualde manifeste, & ex his patet complexio stomachi & meri, sunt enim frigida & sicca complexionis partibus nervosis in ipsis dominantibus. Potest autem pati omne genus ægritudinis, scilicet malam complexionem generis cuiuscunque, sine materia, & cum materia, aut imbibita, aut inuiscata, aut natante, aut apostemante. Et potest pati malam compositionem in creatura, quia superficies sua potest esse parum aspera, & per consequens lubrica, aut in uia sicut est oppilatio alicuius suorum orificiorum, aut in quantitate, quia fit nimis magnus, aut parvus. Item solutionem continui quæ si fit superficialis, curabilis, si uero utrinque penetrans, incurabilis. Apostema etiam potest pati cuiuscunque generis quod secundum plurimum est mortale, & maxime cum exituratur.

De vomitu.

Cap. 78.

Primo expediemus materiam uomitus, deinde agemus de cholericâ passione. Est ergo sciendum primo quod reperiuntur isti termini uomitus, subuersio, nausea, fastidium, siue abominatio significantes dispositiones, quarum una est uia in reliquam. Paruum enim nocumentum stomachi facit abominationem aut fastidium. Quod si augeatur facit nauseam, quæ est inclinatio ad subuersionem & uomitum. Si adhuc magis augeatur facit subuersionem, quæ est motus præter naturam stomachi ad expellendum per uiam oris, quantum nihil corpulentum expellatur. Et dicitur subuersio, quia fundus stomachi uertit superius uersus os eius, ac si deberet inuerti, uel forte quia mouetur motu compressionis incipiendo à parte inferiori uersus superius. Subuersio autem animi secundum antiquos est aut nauis, inseparabilis, aut destructio appetitus. Si autem magis augeatur & fit aliquid uomibile facit uomitum qui est motus præter naturam stomachi, cum quo expellitur aliquid corpulentum per uiam oris. Et istæ dispositiones ex omni parte sunt contrariæ appetitui.

Vomitum est duplex. Quidam quietus, qualis est ille qui accidit stomachicis facile uomentibus. Alius est acutus & æstuosus, qualis est in cholericâ passione & in his qui sumperunt uomitiua fortia, in prægnantibus, & in his qui propter stricturem pectoris, aut debilitatem uillorum latitudinalium, & tunica extrinsecæ stomachi difficulter uomunt. Item quidam uomitus est ceticus existens terminis multarum ægritudinum, sicut febrium acutarum, apostematum hepatis, quæ sunt in latere concauo & similium. Quidam symptomatikus sicut qui accidit in æcesione febrium, & etiam causis similibus. Item quidam periodicus, sicut qui sequitur periodos expulsionis melancholici ad os stomachi, & qui sequitur expulsionem sanguinis ad stomachum omni mense propter retentionem sanguinis menstrualis soliti eo tempore per matricem euacuari, & in diuersis diuersos seruant periodos, quibus frequenter in sua sanitate conferuatur. Quidam sine pe-

riodis. Item sumuntur species eius secundum causas obiectas, quæ uomitu expelluntur, sicut quidam est uomitus cholericus cholera naturali, aut non naturali, sicut utellina, prasinâ, æruginosa, & similibus. Quidam phlegmaticus diuersificatus secundum diuersas species phlegmatis. Quidam melancholicus. Quidam sanguineus secundum plurimum malus, & proprie cum febre, licet aliquando bonus, cum superfluit in quanto, aut malignitas ipsius expectatur, alius permixtus ex pluribus humoribus. Item alius cibalis, alius chilofus. Item alius in quo uermes & alique species expelluntur sicut in cholica, ileos. Alius fetidus sicut in prægnantibus. Item aliquis in quo caro uerrucosa, aut fistulosa expellitur abscessa à stomacho propter uehementiam conatus, aut à rebus incidentibus, aut abstergentibus. Item alius saniosus propter apostema ruptum in stomacho, aut ulcus eius, aut quia ad ipsum deriuatur ab exitibus, aut ulceribus membrorum uicinarum & ex his infertur quinta diuisio, quod aliquis est laudabilis aliquis illaudabilis, licet ois sit præter naturam.

Causæ uomitus sunt corporeæ, aut primitiue. Sed corporeæ duplices, aut per essentiam, aut per comunitatem. Causæ per essentiam sunt mala complexio cuiuscunque generis cum superfluit, sine materia, & cum materia sanguinea phlegmatica cholericâ melancholica aquosa & uentosa, & ceteris de quibus supra. Huiusmodi autem materię sunt, aut natantes, aut inuiscata, aut imbibita. Et faciunt uomitum puniendo grauando, aut extendendo. Et acuitas sensus oris stomachi, aliquando est in causa sequens complexionem calidam & siccam tantum. Item mala compositio sicut oppilatio pyloroni, & uermes qui sunt morbus in numero grauando, aut puniendo, & solutio continui, aut recens, aut antiqua, pendens à causa intrinseca, aut extrinseca. Item pustulæ & apostemata cuiuscunque generis & proprie in ore stomachi. Item dolor stomachi sequens malam complexionem, aut solutionem continui, aut ambas sicut in apostemate. Item debilitas stomachi sequens læsionem alicuius nature unius, aut plurimum, aut raritatem texturæ, aut paucitatem spirituum, per has causas stomachus facile ad uomitum paratur, si in eo reperiatur aliquid uomibile sicut cibum aut potus, aut aliquid ex superscriptis, imo et paratur ad susceptionem superfluitatū aliorum membrorum, & ad congregandum eas per uiam paulatim facta congestione. Istæ autem causæ superscriptæ faciunt uomitum frequenter si sint in stomacho res uomibiles. Si uero non, faciunt nauseam & subuersionem. Vomitus autem per comunitatem quoadquod est à toto, sicut in febribus. Qui quoadquod est criticus & terminus ipsarum, quoadquod symptomatikus sicut in peristentialibus, & est secundum plurimum malum mortem protendens. Sed in ceteris est secundum plurimum bonus, si per eum materia febris educitur. Si uero solum cibum, est ex toto genere malus. Et quoadquod est per coitatem à toto absque febre propter superfluum repletionem, aut cachochymiam cum debilitate stomachi recipientis, recipit. Nam superfluitatem à toto mediante hepate. Quoadquod fit uomitus per comunitatem à cerebro transmittenti ad stomachum materiam catarrhalem, aliquando per solam comunitatem absolutam sicut accidit in percussione capitis, apostematibus cerebri, & similibus, in quibus stomachus compatitur capiti propter nervos descendentes à 3. & 4. pari nervorum cerebri ad ipsum. Quoadquod fit per comunitatem à splene transmittente melancholicum, cum periodis aut sine periodis, & quoadquod solum superfluum infrigidando. Quoadquod fit per comunitatem ab hepate, & proprie à concauo eius & Kytti transmittentibus ei secundum plurimum sanguinem, aut choleram. Et quoadquod est communis absoluta per compulsionem stomachi ad hepatis, sicut in magno apostemate eius, si interueniat simplex alteratio, siue nocumentum mediante nervo utriusque communis. Quoadquod per comunitatem ab intestinis, aut per simplicem dolorem ipsius, aut quia uermes ascendant ab eis ad stomachum, aut foeces regurgitant ad eum sicut in cholica & ileo. Quoadquod per comunitatem à renibus & poris uritidibus in fortibus doloribus ipsorum, sicut est dolor calculi, quoadquod per comunitatem ad matricem sicut in retentione menstruum, aut naturaliter sicut in prægnante, aut præternaturaliter sicut in oppilatione, & propter reliqua nocumenta eius cui stomachus facile compatitur. Et in summa per comunitatem fere ab omnibus membris comunitate

munitate absoluta & non absoluta. Cause autem primitiue sunt, sicut aer superflue calid. aut frig. aut corruptus, sicut pestilentialis, & a cadaveribus mali odoris, licet prima impressio sit in corde, leditur tamē os stomachi, cordi copatiens sua propinquitate & nimia sensibilitate. Item cibus & potus suo odore, sapore, proprietate, quantitate nimia, mala præparatio ne, unduositate superflua & similibus stomacho disproportionatis, & proprie cum sumuntur absq; desiderio. Item motus agitatiuus post cibum. Item ira, tristitia, & similia animi accidentia, & proprie imaginatio alicuius rei obscenæ. Itē res extraneæ sicut percussio, casus, morsus uenenosorum, & sumptio uenenorum. Item dimissio obseruationis stomachi longo tempore consueta, sicut pelles circa ipsum consueta portari & similia. Hæ autem causæ leuiter imprimentes faciunt fastidium & abominationem. Sed fortius imprimen tes faciunt nauſeam, & subuersionem. Et adhuc fortius uomitū si res uomibilis in eo reperiatur. Cause uero nauſeæ, & subuersionis absque uomitu sunt aut absentia rei uomibilis, ut quia non adest, aut si adest, est imbibita, aut inuiscata, aut debilitas causæ imprimantis, aut impotentia ad uomendum propter debilitatem ægri, aut stomachi ineptitudinem & difficultatem ex causis supradictis, scilicet quia stricte pectoris, aut habet uillos latitudinales debiles, & sic de aliis causis facientibus stomachum impotentem & ineptum ad se cōstringendum, & mouendum ad superiora, & nimia stomachi lenitio, & relaxatio facit ipsum pronum ad fluxum per inferius & ineptum ad uomitum. Pro noticia causarum uomitus sanguinis est sciendum, quod sanguis qui uomitur immediate tenit à stomacho uel meri. Causa tamen eius aliquando est in ipso stomacho uel meri, ita ut sanguis qui euomitur profuatur ex substantia stomachi uel meri. Aliquando causa est in membris stomachi cōiunctis, & sanguis ab ipsis ad stomachum deriuatur, deinde uomitur. Causa autem primitiua est ruptura uenæ in stomacho sequēs laboriosum uomitum, aut sumptionem medicinarum, aut ciborum acutorum aut casum, offensionem, seu percussionem eius, aut apostema non maturum, ruptum, aut ulcus corrosiuum, aut fistulosum, aut sanguifuga adhaerens meri uel stomacho. Si uero ab aliis membris deriuatur ad ipsum, tunc uenit, aut à capite, & per colatorium descendens ad meri profuatur ad stomachum, aut deriuatur à splene per uiam expulſionis melancholice ad os stomachi, & tendit in nigrum, habens saporem ponticum, aut acetosum. Aut deriuatur ab hepate per mēſentericas ad ipsum terminatas, & quandoque regurgitat à matrice in retentione mēſtruum, & quandoque à toto cum est retenta euacuatio sang. naturalis, aut artificialis consueta, & quandoque cum superfluit propter membri mutilationem, aut conuersionem ad regimen sanguinis multiplicatiuum cum paucitate exercitii, & quandoque fit uomitus sanguinis à uirtute sana expellente superfluum quanti aut qualis. Et propter hoc est in uomitu duarum librarum sanguinis, aliquando tranquillitas & iuuamentum. Et quandoque fit à uirtute ægra critice, aut symptomatice sanguinem expellente, sicut in synochis, & quibusdam aliis febribus, & apostematibus, sanguine ad stomachū deriuato, qui aliquando est salubris & terminus egritudinis, sed ut plurimum perniciosus præcipue si sit cum febre, & ipsum non sequatur præcedentis egritudinis alienatio, & quandoque causa uomitus sanguinis est apostema ruptum in hepate, splene, & aliis membris stomachi communicantibus, & est secundum plurimum sanguis parum permixtus qui deriuatur ad stomachum per uias manifestas, aut occultas.

Signa prognostica uomitus, sunt fastidium & abominatio præcedens, tremor labii propter continuationem pelliculæ oris, cum pellicula oris stomachi, nauſea & subuersio & tensus, tractus hypochondriorum ad superiora. Signa demonstratiua nauſeæ, subuersionis uomitus habentur ex relatione ægri, & sunt sensui manifesta. Signa causarum primitiuarum sunt ipse causa primitiua, post quas sequutus est uomitus, & proprie cum non apparet ipsum ab aliis causis uerisimiliter pendere. Signa causarum uomitus per communiter sunt, quia præcesserunt nocumenta totius, aut membri alicuius cum quorum augmento fit & augetur uomitus, & decremento decreſcit, & ablatione augetur, & proprie cum

non apparent aliæ causæ primitiue, aut per essentiam à quibus uerisimiliter possit pendere. Signa causarum uomitus per essentiam sunt hæc, si enim sit à mala complexionē sine materia adest trillis sensatio, & proprie in ore stomachi quæ liate illius, & est sine grauitate, neq; habet eructationem saporis extranei, & frequenter habet nauſeam, & subuersionem absque uomitu nisi cum cibus sumitur & leditur ex quacunque re sumpta, & in frigida magis leditur digestio, in calida magis appetitus, & adest sitis. Sed humida & sicca cognoscuntur ex siti & priuatione eius. Item cognoscuntur ex causis præcedentibus. Item quia leditur à similibus & iuuatur à contrariis. Si uero sit materia, adest grauitas & cognoscitur materia per saporem eructationis redolentis amarum, dulce, acetosum, ponticum, foetidum, & similes proportionatos materiæ quæ est in stomacho. Item frequenter adest sitis, si in eo sint humores calidi per essentiam, aut putrefactionem. Sed multo magis manifestatur cum motu per saporem, odorem, & colorem eius quod uomitur. Item manifestantur per colorem linguæ, & accidentia quæ sunt sicut stupescitio dentium, & nocumento operationum stomachi, & si humores sint inuiscati aut imbibiti adest nauſea frequens, & subuersio absque uomitu. Signa acuti sensus oris stomachi sunt, quia leditur à quacunque re sumpta etiam debilis impressionis & est pronus in synopim propter leuia nocumenta stomachi, neque potest diu sitim aut famem tolerare. Signum oppilationis pyloroni sunt, tardus descensus cibi post cibi digestionem etiam si sit paucus & facilis, & proprie cum digestiua non est debilis neque adfuit aliæ causæ tarditatis descensus. Signa uermium in stomacho sunt, quia adest titillatio quadam & commotio quasi uoluntaria, sed de his inferius in proprio capitulo. Solutio uero continui in stomacho si recens est, cognoscitur per dolorem, sanguinis exitum per uomitum, aut per secessum. Si antiqua, per exitum saniei per easdem regiones, & quandoque sumitur aliquod acutum, sicut acetum, augetur dolor & mordicatio. Signa pustularum & apostematum ponentur inferius in capitulo proprio. Signa autem debilitatis stomachi comprehenduntur ex læsione operationum suarum. Sed raritas texturæ & paucitatis spirituum, quæ sunt causæ debilitatis sumuntur ex extenuatione corporis, & quia facile leditur à quacunque causa. Subtilitas autem humoris cognoscitur quia iuuatur à ponticis. Sed crassities, quia iuuatur à subtiliantibus. Sed multitudo humiditatis superflue cognoscitur ex nauſeatiuis satietatibus præcedentibus, multitudine saliuæ, multitudine egestionis, sed ex multitudine uomitus certificatur. Distinguitur inter sanguinem uenientem ex substantia meri, & uenientem ex substantia stomachi per locum doloris, si prouenerit causa ulceris & corrosione aut rupture. Si uero non adfit dolor, cognoscitur quod ex meri per paucitatem eius & impedimentum deglutionis, sed ex stomacho maior fuit quantitas, & non est impedimentum in deglutione. Item cognoscitur ex causis præcedentibus, & molestantibus stomachum, aut meri & sumptio aceti mordicando locum à quo sanguis emanat, distinguit locum. Si uero sit ex apertione orificiorum uenarum, aut resudatione in quibus non est dolor cognoscitur, quia per resudationem est paucus ualde, & ex apertione in primis paucus, deinde maior, sed in ruptura uenæ est aliquis dolor, & multus prima uice egreditur. Et illum qui est à corrosione significant signa ulceris quod præcessit, & sanguis ab eo egreditur in primis paulatim, deinde emanat res plurima ulcere ampliato. Signa autem ulceris sunt manifesta ex supraprescriptis, & fistulosum ex antiquitate cognoscitur. Sed apostema non maturum ruptum cognoscitur in capitulo proprio. Et quando ex sanguifuga cognoscitur ex præcedenti punctione iterata quando erat adhaerens. Itē ex sanguis subtili aquoso, & quia bibit aquam in qua habitabant sanguisuga. Signa autē sanguinis deriuati à toto, uel ab aliis membris ad stomachum sunt nocumenta totius, & aliorum membrorum præsentia absque nocumento stomachi cum absentia signorum exitus sanguinis à substantia stomachi, de quibus supra. Et si descendat à capite per colatorium, multoties ex eo aliquid spuendo cum rascatione, aut sine rascatione emittitur, & si à splene tendit in nigrum & est turbidum, & ha

Io. Arculani

S a bec

bet saporem acetosum aut ponticum. Sed ab hepate & reliquis partibus ueniens habet saporem proprium sanguinis. Cognoscitur autem à quibus membris proueniat ex præfessione nocumentorum illorum membrorum, & ex causis eius scilicet ex retentione sanguinis hæmorrhoidalis, & aut menstrualis fluere consueti, mutilatione membri, regimine sanguinis multiplicatio & similibus. Cognoscitur autem quod proueniat à sana uirtute cum nihil de esse suo molestetur patiens, & quod sanguis est satis laudabilis. Et criticus cognoscitur per sedationem ægritudinis præcedentis, symptomaticus autem non est cum huius alleviatione, imo secundum plurimum perniciosus.

Prognostica. Quando multiplicatur nausea in conualescentibus indicat conuersionem siue recidiam. Secundum. Vomitus in apostematibus hepatis, & proprie concaui & splenis proportionatus materiæ facienti apostema frequenter bonus. Similiter in eorum oppilationibus, in reliquis apostematibus secundum plurimum malus. Tertium. Vomitus in febribus proportionatus materiæ febris secundum plurimum bonus, & proprie in die critica nisi in pestilentia libus. Quartum, multoties accidit febricitanti spasmus, aut epilepsia, aut simile epilepsie subito & euomit humorem, ut est flos æris, aut indicum & euadit. Quintum, frequenter uomitus remouet singultum clamor. Sextum, ex administratione uomitus cum æqualitate seruantur renes, & curantur eorum & pedum nocumenta, & fit præseruatio à multis ægritudinibus. Cõfert enim uomitus in omnibus ægritudinibus quæ fouentur à materia in stomacho contenta, & confert in ægritudinibus propriis materialibus absque apostemate & ulcere. Item confert in ægritudinibus renum, uesicæ, & membrorum inferiorum, diuertit enim ab inferioribus & eradicat à superioribus. 4. primi cap. proprio. Et solutio uentris se habet e contrario. Et in omni ægritudine materiali maxime bonum est habere sollicitudinem de stomacho ut restitueretur eius operationes, curat enim & præseruat à pluribus ægritudinibus, & apud Hipp. & Auic. ad præseruandū administratur in mense bis duobus diebus proximis, ut unus suppleat in quo alter deficit, quod intelligitur in corporibus culpate sanis & facile uomentibus, & quibusdam sufficit bis in anno, scilicet uere & autumno, multiplicatio namque uomitus debilitat uirtutem stomachi & facit ipsam lacunam superfluitatum & iuuantior uomitus est post balneum, comestionem & potum copiosum. Septimum, uomitus cholericus purus est malus, significans superfluam caliditatem, & similiter phlegmaticus purus malus, significans superfluam frigiditatem. Sed laudabilior uomitus est in quo phlegma cholera est admixtum, qui duo humores non sunt multum distantes à phlegmate, & à cholera naturalibus. Hi enim sunt consueti in stomacho multiplicari, phlegma quidem per uia paulatim factæ congestionis, sed cholera per uiam defluxus. Vomitus autem foetidus niger, prasinus æruginosus, & diuersorum coloris, id est, in quo aggregantur fere oēs colores significans aggregationem multarum superfluitatum & difformem dispositionem hepatis, & totius est pessimus. Et prasinus & æruginosus significant caliditatem adurētem sibi plurimum. Sed uomitus ad nigredinem declinans sicut azurum & indicum sibi plurimum congelationem. Niger uero indifferenter caliditatem & frigiditatem. Verum quicumque horum est à caliditate est declinans ad splendorem & claritatem, & qui à frigiditate est absque splendore, nam in congelatione excluduntur partes diaphanæ, quæ non excluduntur in adustione. Et habenti apostema calidum in hepate accidit in primis uomitus cholericus, deinde prasinus, deinde æruginosus cui coniungitur singultus. Niger uero sibi plurimum fit à nocumento splenis, licet possit esse ab hepate, & proprie in apostemate eius propter superfluam adustionem ad quam quandoque fit transitus per uomitus cholericos suprascriptos. Octauum, dispositio mala & timorosa est, ut sit os stomachi subuersum, patiens syncopam & natura restricta. Nā id quod sedat uomitum addit ad constrictionem uentris & quod lenit uentrem addit in uomitum, & est dubium ne foeces uomitu educantur, quod est pessimum, nisi sit illud quod facit uomitum, humor subtilis cholericus. Curari enim poterit utraque dispositio cum aqua prunorum & tamarindorum,

cum cassia, manna, aqua hordei, & similibus. Et nota quod homo debilis stomachi, præcipue si fuerit multæ sensibilitatis cum uomitu syncopizet, sed minus hic accidit si cibum sumpserit. Nonum, uomitus sanguinis sequens ulcus stomachi, aut apostema non maturum, ruptum in eo, mortem significat. Sequens autem solutionem uenæ, apertionem orificii eius, aut resudationem, sanabilis, præcipue sine febre. Decimum, uomitus sanguinis cum febre notabili perseverante est malus, & secundum plurimum perniciosus. Sed sine febre quandoque bonus & terminus ægritudinis præcedentis, & quandoque ab ægritudinibus futuris præseruatiuus, ita ut in uomitu. 2. lib. sit tranquillitas & iuuamentum. Antequam accedat ad curam uomitus memorabo quasdam medicinas proprias, simplices & compositas, alteratiuas & solutiuas quibus in regimine uomitus & reliquarum dispositionum stomachi est utendum. Composita calida aromatica roseaceum, gariophilatum, nardinum, ceratum Alexandrinum Mesue, cyminata Alexandrina, confectio de xilaloos, de galanga, de citoniis, de scorïa Auicennæ. electarium de citro de myrto prælatorum lactificans. Aliud emplastrum, diaphenicon, oleum mastichinum, de absinthio, pilulæ stomatichæ, alephanginæ, rob. syrupus de absinthio, de mentha, de fumoterræ maior, de corticibus citri, suffus, ligni aloes, diarhodon aromaticus, theriaca magna, triphera minor communis Galen. trochisci de absinthio, de ros. hierapic. Gal. Frigida diacitonien, diarhodon, electarium de forbis, oleum citoniorum, rob de ribes, de berberis, de sumach, de citoniis, de piris, de pomis, de granatis, de citro syrupus de piris, de citoniis, de myrto, saccharum roseaceum. Calida simplicia absinthium, agaricum, aloes, ameos, calamentum, calamus aromaticus, cappares, cardamomum, cyminum, cinnamomum, cyperi, cupressi nuces, citrum conditum, & non conditum, cortex & acetositas, crocus incoriando stomachum, & fistici, galanga, gallia, gariophili, grana pini sumpta cum melle & saccharo, laudanum, macis, mastix, mentha, oliuæ, olibanum, oua, passulæ, pix, rheubarbarum, scorïa ferri uinum, uua passula, xilaloos, saccharum. Frigida, acetosa, acetum, aggregata, aqua ferrata, bellirici, berberis, citonia, corallus, coriandrum, emblici, endiuia syluestris & domestica, ferratum, scilicet uinum & aqua extinctionis eius, granata omnia, Karabæ, chebuli conditi, lac proprie caprinum, lactuca, mirobalani omnes, myrtus, mespilia, persica, pira, poma acria pontica, pruna damascena sicca, ribes, rosa, sorba, sumach, sinaragdos suspensus stomacho & portatus, pellicula interior stomachorum gallinarum. Temperata capillus uen. perdix. Quia uomitus est duplex, quidam artificialis ad præseruandum ab ægritudinibus futuris, & ad curandum ægritudines præsentis, quidam spontaneus. De regimine artificiali, sit primus sermo. In quo quædam sunt obseruanda ante uomitum, quædam in uomitu, quædam post uomitum. Hoc in primis præmissis quod non prouocetur uomitus in his qui sunt inepti ad uomitum, quorum conditiones uide quarta primi, capitulo proprio. Obseruanda ante uomitum sunt ista. Primum, ut insueti ad uomendum prius affueant leuibus uomitiis, ne subito fiat transitus ad inconueta multum corpus mutancia. Secundum, ut ante uomitum præcedat uentris lenitio, siue educatione materierum communium sponte siue artificialiter, sicut clysteri lenitio, & similibus. Tertium, ut ante uomitum cibetur cibis diuersarum uirtutum mixtis ex incisuiis, absteruiis, uiscosis, dulcibus, acetosis, sed maxime unguentosis. Item diuersis ex parte artificii, sicut frictis, asis elixis, & huiusmodi. Et si timeres uomitum futurum diminutum ex difficultate uenientis, uel ex humorum ineptitudine misceantur cum his cibis aliqua uomitum uigorantia, sicut eruca, raphanus, ficus sicca pingues, coepæ, porri, cum aqua hordei cum foecæ sua & melle, melones, cucumeres, mica panis azimi cum oleo. Atriplices cum seminibus suis, nuces cum melle, aut aliquod istorum, uinum dulce de quo copiose bibat, & sint hi cibi male masticati. Si tamen timeres uomitum non sequitur melius est ut cibis bonus permittatur. Quartum, ut stomachus & extrema sint sufficienter calefacta, similiter collum & par-

res pectoris, & tempus anni conuenientius, est tempus calidum. Et hora diei conuenientior, est merides, nisi magnus fuerit aestus, tunc eligatur hora tertiarum uel circa. Deinde fumat aliquod ex uomitiis inferius describendis tepidum, sed in hora uomitus uel parum ante moueatur moribus inordinatis, ut cibus in stomacho agitur. Et fasciet oculos, pilis ex toto superpositis, similiter uentrem leuiter usque ad umbilicum, sed transacta hora una cum uomituum incoeperit mouere, ponat digitum in ore, aut pennam anseris oleo intinctam & iteratis uicibus uomitum procuret, donec stomachus a cibo & superfluis mundificetur. Si autem uomituum fuerit ualde forte, sicut elleborus albus, est melius ut non precedat cibus, aut ualde paucus precedat. Consilium tamen, ut uomitui non transcendat mediocritatem. Situs autem conuenientior est, ut sedeat & inclinet caput & pectus secundum exigentiam. Quod si accidentia difficilia superuenerint, detur aqua calida, quoniam uomens aut uenter soluetur, & sedantur accidentia, & fiat clystere lenituum. Sed finito uomitu quiescat & lauatur ei facies cum aqua rosata, cui parum aceti sit admixtum. Lauetq; sibi os cum uino aut aqua, secundum exigentiam & tarder cibum & potum saltem per duas horas si potest. Et cum cibatur dentur res boni odoris, suauis saporis, paucae quantitates, boni nutrimenti, paucarum superfluitatum, facili digestione & satis facili penetrationis & dormiat, & non bibat aquam frigidam, neque alium potum ualde frigidum. Si autem uomitus superfluit succuratur, secundum quod dicitur in sequentibus, & si esset diminutus iteretur & corrigantur accidentia sequentia secundum opportunitatem. Aegritudines autem in quibus confert uomitus praeseruando aut curando, sunt aegritudines stomachi materiales, non apostemose educendo materiam contentam in eo, siue congestam siue deriuatam ad ipsum, rectificat enim appetitum, attractionem, digestionem & retentionem. Curat singultum clamor, dolorem stomachi, imo uomitum ipsum. Nocet autem in aegritudinibus eius immaterialibus, & apostematibus eius. Item uomitus curat febres praecipue criticas & symptomatice frequenter iuuat, & praecipue curat quartanam. Item curat lepra & malitiam cholerae & ulcera mala quae sunt in corpore. Item confert in epilepsia, apoplexia, sorda, uertigine, spasmo materiali & paralyti, tussi, asthma. Item multas curat aegritudines oculorum. Et breuiter omnes aegritudines, quae fouentur a materia existente in stomacho, praecipue phlegmaticas, in quibus maxime esse debemus solliciti de stomacho. Et confert in aegritudinibus renum, intestinorum, uesicae, matricis, podagrae & similia & prohibet generationem lapidis, stomachum enim integre mundificat, diuertit ab inferioribus, eradicat a superioribus. Et solutio uentris si habet e contra, licet stomachum & intestina mundificet. Nocet tamen uomitus cum superfluit, & nocet plurimum in aegritudinibus membrorum superiorum in quibus stomachus non communicatur. Vomitus autem leuius in causa calida sint unc. 5. aut 6. aquae hordei cum foete sua. Et fortius est ut huic addatur unc. 1. aceti, aut unc. 2. syrup. acetosi, & tantundem de aqua minuatur, in causa mixta ponatur loco syrupi oxymel compositum, aut scylliticum in eadem dosi. Et fortius his est succi raphani unc. 3. cum oxymellis simplicis unc. 2. Et adhuc fortius si in eo steterit infusus elleborus per diem naturalem. Elleborus quoque niger potest infundi in iure iulep, in aqua, & similibus, & fiet uomituum potens secundum tempus morae in re in qua infunditur, sed non transat drach. 1. neq; stet in infusione supra diem naturalem & crasso modo confusus. Et adhuc fortius ipso est elleborus niger in substantia, sed non detur ultra. 3. 1. cum aliquo liquore. Elleborum enim album natura nostri temporis non potest tolerare. Semen quoque atriplicis duarum drach. cum 3. 1. oxymellis simplicis & tribus aquae est satis forte ualens in causa calida. Et similiter flos genestae, & granum regum, cuius duae sunt species. s. magnum, & paruum, magnum dicitur kerua, est potens uomituum educens phlegma. Similiter capistrum arborum, uide dosim apud Mesue. Pro cuius uomitus sciendum est ipsum esse duplicem, s. cibalem sub cibali comprehendendo uomitum cuiuscunque rei in corpore. Aliquando humoralem, sub humoralis comprehendendo

do uomitum cuiuscunque rei corporeae, de quibus superius theorice actum est.

Cura uomitus cibalis exigit quinque intentiones. Prima, remouet causam uomitus. Secunda confortat stomachum cum propriis moderate stipticis participantibus. Tertia, prohibet humores ne fluant ad stomachum. Quarta, corrigit accidentia. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum. Si ergo pendeat ab aere, cibo & potu, & reliquis non naturalibus, de quibus supra, remoueat ipse & nocumentum per eas impressum cum contrariis & corrigentibus malam complexionem, & quodcunque nocumentum per eas inductum, cum interius & exterius applicitis quorum copia inferius ponetur, & cum eisdem complebitur.

Secunda intentio, stomachi confortando, si illa quae administrantur sunt propria stomacho & moderate stipticis participantia. Tertia autem, scilicet prohibitio humorum a fluxu cum eisdem stipticis perficitur, de quibus in secunda intentione. Item cum diuersionibus cum euacuatione, & sine secundum exigentiam humorum, qui uideantur uerisimiliter ad stomachum fluxuri, & ligaturarum manuum supra cubitos, & pedum supra genua, & uentosa posita super fundo stomachi conferunt ad retentionem. Et positio pedum in aqua calida retinet diuertendo, sicut positio ipsorum in frigida nocet congelando, & immobilizando. Quarta autem, scilicet correctio accidentium perficitur secundum ipsorum exigentiam, praecipue syncopis corrigatur, sicut dictum fuit in cap. precedente, & reliqua secundum quod dicitur in hoc cap. Quinta, autem perficitur praecipiendo regimen contrarium regimini quod fuit causa uomitus, & contrarium discrasiae in stomachum impressae, praecipue somnus prolixus conuenit. Et paucitas cibi & potus, boni chymi, facili digestionis, saporis delectabilis, satis cito penetrantis, confortantis stomachum tam proprietate, quam stipticitate temperata, contrarij discrasiae impressae. Praecipue uinum sit laudabile, placens patienti, & cibi aromatizati cum his, quae declinant ad calidum, aut frigidum secundum exigentiam, & amygdalae excorticatae contrita posita in ferculis conferunt & delectant. Et in uomitu calido confert kist fabarum & lentium condita cum aceto & brodium consumprum, factum secundum artem, cui admisceantur amygd. & aromatizatum secundum exigentiam discrasiae, in quo etiam aliquando ponitur panis bis coctus. Item laudantur fistici, cortices citri, aut aranciorum conditi, cappares in causa frigida, sed in calida praeparantur cum uino granatorum agresta, sive limonum citri, aranciorum, & similia, & marinata confecta, & coriandrum habet singularem proprietatem. Post cibum utatur piris, aut cyton. alsis, aut condit. Item diacitoniten & paru casei in fine mensae. Et eligantur carnes, pisces, & reliqua cibaria aegro placencia & bene conditionata, ieiunet saepe. Somnus multus etiam post cibum immediate ad cuius prouocationem confert sumere aquam carnis cum uino odorifero stiptico, & pauco pane bis cocto, & pauco pulueris coriandri, dormient enim & sudabunt. Quies animi & corporis proprie post cibum donec a stomacho amplexetur, & res terrefacientes prohibent uomitum dum est in fieri, sicut aspersio uiolenta faciei cum aqua frigida, & clamare, & eum terrefacere ne uomat, & uerecundia, & similia animam diuertentia a perceptione obiecti facientis uomere. Si uero pendeat a percussione super stomacho, aut in membro stomacho communicante, curetur percussio secundum quod oportet & remoueat nocumentum stomacho impressum & confortetur stomachus, & prohibeantur humores, ne fluant ad stomachum, neque ad membrum stomacho communicans cum phlebotomia, & ceteris diuersionibus. Corrigantur accidentia secundum quod oportet & ordinetur regimen conueniens habendo respectum ad percussione, uomitum & causam eius. Quod si pendeat a uenenosis sumptis educantur illa uomitu & secessu, & dentur bezahartica propria contra illa & stomachus, & membra nobilia confortentur. Si uero a morsu uenenosorum curetur locus morsus secundum quod oportet, & supra locum morsum ponantur stiptica cum debita ligatura prohibentia transitum ueneni ad loca nobilia & confortetur stomachus, & membra nobilia. Si uero uomitus

Io. Arculani

S 3 mitus

mitus cibalis fuerit per cōmunitatem à toto, aut à membris particularibus, sicut cerebro, hepate, splene, &c. Quinque similes iam dictis exiguntur intentiones. Prima corrigit dispositionem totius, aut membri communicantis. Secūda, corrigit dispositionem stomachi ipsum confortando. Tertia, prohibet ne humores fluant. Quarta corrigit accidentia. Quinta, ordinat regimen. Prima autem intentio completur curando febrem, & cetera nocumenta totius cum quibus oportet, cauendo tamen in eorum curatione quantum est possibile ab his quæ lædunt stomachum, sicut solutiuia fortia, & reliqua, quæ stomachum debilitant. Similiter debent curari dispositiones cerebri, sicut dolor, apostema, pectusio, & similia. Item dispositio reliquorum membrorum sibi communicantium, cauendo ut supra, in eorum curatione ab his quæ lædunt stomachum, quantum est possibile. Secundo, iuxta secundam intentionem confortetur stomachus cum sumptis interius & exterius applicitis, ut puta nocumenta ipsius corrigitibus, quæ tamen non noceant, aut parum noceant toti, aut membris sibi communicantibus. Tercio, prohibetur fluxus humorum ad stomachum, tum confortando ipsum ut supra, tum diuertendo & euacuando secundum quod fuerit expediens, habendo semper respectum ad dispositiones membri communicantis humorem, uerisimiliter fluxurum, & stomachi dispositionem. Quarta, corrigitur accidentia secundum quod oportet, ut dicitur in cap. hoc. Quinto, ordinetur regimen sex rerum habendo respectum ad stomachum, ratione cuius debet exhiberi paucus cibus, & conditionatus, ut supra. Et somnus debet esse multus, & multo magis habeatur respectus ad dispositionem totius, & membri communicantis. Similiter si uomitus cibalis fuerit per essentiam in stomacho, quinque similes exiguntur intentiones. Prima, est remotio causæ stomachi facientis uomere. Secunda, stomachi confortatio. Tertia, prohibetur ne humores fluant. Quarta, accidentium correctio. Quinta, debitum regimen. Si ergo causa uomitus cibalis fuerit mala complexio sine materia alteretur cum contrariis interius & exterius applicitis, quæ sunt propria stomacho. Si uero fuerit cum materia, primo materia euacuatur, secundo dyscrasia cum contrariis corrigitur. Si uero in causa fuerint uermes, attendatur curæ ipsorum secundum quod dicitur in proprio capitulo. Si uero oppilatio in pylorum, remoueaturs causa oppilationis. Et si causa fuerit apostema, aut pustula curetur, sicut dicitur capitulo sequenti. Et si fuerit ulcus & corrosio mundificetur & consolidetur. Si uero dolor fuerit in causa mitigetur. Et si raritas texturæ intendatur unioni & confortationi stomachi, & eius corrugationi. Et causis uomitus remotis, stomachus iuxta secundam intentionem confortetur. Et si ambæ intentiones, scilicet remotio causæ, & confortatio simul perfici poterunt, erit præstantius. Mala autem complexio calida stomachi sine materia, cum infrascriptis remouenda est. Et cum eisdem stomachus confortari potest, & uomitus prohiberi. R. olei cytoniorum, ros. omphacini, ana. ʒ. i. ros. antheræ, corallorum rub. myrti, ana. ʒ. i. galliæ muscatæ, mastichis ana. ʒ. i. aceti modicum, ceræ quantum sufficit, fiat unctio. Et si uis magis infrigidare his adde succi acetosæ. ʒ. i. & fac bullire cum oleis & aceto, ad succi & aceti consumptionem, & postea adde pulueres, & fac unguentum. Et fortius imprimens est sacculus factus ex pulueribus infrascriptis, & figuratis secundum formam stomachi, & imballitus qui infundatur in aqua rosacea dupla ad acetum, & optime expressa, & actu notabiliter frigidus applicetur multoties, præcipue ubi esset superfluitas caliditatis & esset opus forti retentione, sicut in cholerica passione, post sacculi amotionem sequatur unctio, de qua supra. Posset etiam fieri cerotum dissoluendo, mastichis. ʒ. i. cum oleis infrascriptis & aceto, & addendo pulueres infrascriptos, præter mastichem, & extendatur super corio scutalis figuræ ad quantitatem stomachi. Sumenda in fine mensæ, sunt diacitonem de saccharo sine speciebus, aut pyrum, aut cytonium assum conditum. Si uero in causa esset mala complexio frigida. R. thuris, mastichis, galliæ muscatæ, ana. ʒ. i. garioph. menthæ, rosarum, corallorum, ablinthii, calami aromatici, galan. ana. ʒ. s. olei mastichini, olei

de spica, ana. ʒ. i. uini stiptici potentis odoriferi. ʒ. i. aceti acuti modicum, scilicet. ʒ. s. ceræ quantum sufficit, bulliant olea, uinum, & acetum ad consumptionem uini & aceti, & fiat unguentum cum quo notabiliter regio stomachi ungatur. Ex eisdem possunt fieri sacculi, qui infundantur in uino nigro, stiptico potenti, quadruplo ad acetum acutum, & sacculus in ipsis notabiliter calidis infundatur, & optime expressus regioni stomachi applicetur ter aut pluries, post eius amotionem sequatur unctio, de qua supra. Cerotum ad hanc intentionem. R. pulueris infrascripti. ʒ. i. picis græcæ, mastichis, resinæ, laudani, ana. ʒ. s. ceræ quantum sufficit, dissoluantur ad lentum ignem, & cum oleo infrascripto quantum sufficit & ʒ. s. aceti, & addendo pulueres, fiat cerotum tenax & applicetur, ut supra prius suffumigando ipsum cum ligno aloes. Hæc enim simul complent primam intentionem & secundam. Et in fine mensæ sumat diacitonem cum speciebus, & similia. Si uero esset lapsus ad humiditatem utatur notabiliter siccis, sicut cypero, nucis curpressi, & similibus. Si uero ad siccum permisceantur humi. cum siccis & stipticis, ut natura dirigat humida contra sic. & stiptica ad retentionem. Si uero humores fuerint in stomacho fauentes malam complexionem educantur uomitu & secessu primo deinde mala complexio corrigitur, & stomachus confortetur. Vomitus autem si materia fuerit natans, fiat cum impositione digiti, aut penne in ore, aut cum leuibus uomitiuis, quorum descriptio superius præcessit. Similiter solutur uenter, si uomitu educi non possunt cum solutiuis leuibus stomacho non nocentibus, sicut materia cholerica, cum rheubarbaro. Phlegmatica cum pilulis alexiphanginis, aut stomatichis. Mixta ex his cum hiera simplici in forma pilularum, si fuerit natans. Si uero imbibita, aut in uiscata cum hiera simplici in forma electuarii, de qua dicitur. ʒ. i. Est tamen melius si fuerit imbibita, aut inuiscata, ut præmittantur digestiua, abstergentia & incidentia, sicut syrupus acetosus in cholerica, & oxymel simplex in phlegmatica cum aqua saccharata in æquali dosi cum syrupo, uel accipiantur sine aquis, ut diuturniorem moram contrahant in stomacho & melius inuiscentur in stomachi superficie. Et si opus fuerit fortiori abstergente, accipiantur oxymel compositum, aut scylliticum, & possunt misceri cum aqua decoctionis cinnamomi. Materia uero melancholica euacuetur cum dialena, aut sena, aut epithymo consolatis cum zingibere & paucis salis gemmæ, & q. misceantur cum paucis iure galli, aut aqua casei, nirololani nigri permixti, cum aliis solutiuis, euacuando confortant & uomitum sistunt, postea dyscrasia stomachi corrigitur, & stomachus confortetur. Corriganter autem accidentia iuxta quartam intentionem, secundum quod oportet. Quinta autem intentio perficitur faciendo regimen declinare in contrarium dyscrasie, & cibus sit paucus, facilis digestionis, boni chimito penetrans, boni odoris, placens patienti, & confortatiuus stomachi, & parum bibat, dormiat multum, & immedie post cibum, & quiescat, & aspergatur facies, si uellet uomere, & terrefiat ne uomat, & hiant ligaturæ in extremis, & uentosa stomacho superponatur, & extrema in aqua calida, aut frigida imponentur secundum exigentiam reliquarum circumstantiarum. Curationes autem uermium, apostematum, pustularum, & ulcerum, & dolorum stomachi ponentur in sequentibus. Oppilatio autem pylorum, si naturalis, curam non habet. Si uero pendeat ab humore crasso & uiscoso, secundum quod est ut plurimum, curatur cum abstergentibus & incisuiis, quæ parum antescrpta sunt. Item cum exhibitione hieræ picæ in forma electuarii.

Raritas autem texturæ stomachi curatur intendendo unioni partium eius & confortationi ipsius, & eius incoriationi, & euendo a solutiuis, & faciendibus uomere & proprie fortibus, & a ualde resoluentibus & exiccantibus. Sint ergo exterius applicita propria, & stiptica, & contraria dyscrasie ipsius, sed non multum excedentia in qualitatibus primis acti, aut potentia, de quibus statim sermo præcessit. Similiter interius sumpta sint, proprie moderate stiptica uiscositare participata, hæc enim stomachum iuuant & incoriant, sicut cytonium, thus, mastix, crocus, & pellicula intrinsecæ in stomacho gallinarum con-

conueniunt cum proprietate sua, & uinum suauis stipticum in pauca quantitate sumptum, & seruet reliquum regimen sex rerum, de quo supra. Si uero uomitus fuerit humoralis, tunc est duplex, criticus aut symptomaticus. In uomitu critico finatur natura operari, si uerisimiliter ex digestionis praecedenti & uirtutis tolerantia uideatur fore sufficiens, nec est cibo, aut alio modo impedienda. Si uero fuerit diminutus adiuuetur cum leuibus, tantum, quae ex dictis in uomitu artificiali elici possunt, si uero superfluis constringatur cum auxiliis inferius scribendis. Si uero fuerit symptomaticus, aut erit solum ex humoribus, in stomacho congestis, aut aliud de deriuatis. Si primum, quinque requiruntur intentiones. Prima, est humoris in stomacho congesti, uomitus, aut secessus, aut utroque modo euacuatio, & ad euacuandum humores imbibitos, aut inuiscatos, magis confert uomitus, quam solutio. Secunda, est correctio discrasiae stomachi quae est causa confectionis, & similiter stomachi confortatio. Tertia, est prohibitio, ne humores a membris circumstantibus fluant ad stomachum. Quarta, accidentium correctio. Quinta, debitum regimen sex rerum non naturalium. Quae omnes intentiones complende sunt, sicut dictum fuit in uomitu cibali a mala co-plexione cum materia. Si uero fuerit symptomaticus ex humoribus ad stomachum, aliunde deriuatis, septem exigunt intentiones. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia regit membrum mittens. Quarta fluxum intercipit. Quinta regit stomachum recipientem. Sexta corrigit accidentia. Septima ordinat regimen sex rerum non naturalium. Pro prima intentione est sciendum, quod si uomitus fuerit qualis oportet, quem uirtus bene toleret, finatur natura operari, uomitus namque curat uomitum, sicut fluxus fluxum. Propterea uomitus in principio paroxysmorum est finendus, prohibet enim paroxysmum, aut minuit, quarta primi. Si uero fuerit uomitus non qualis oportet, aut uirtus non bene eum toleret, est sistendus modis infra scriptis penes supra scriptas intentiones, si ergo repletio fuerit in toto, & fuerit aequalis omnium humorum, id est, proportionalis, aut sanguis domineatur, fiat phlebotomia de uena communis, aut de saphenis, precipue si retentio sanguinis menstrualis, aut haemorrhoidalis fuerit in causa. Si uero fuerit dominium aliorum humorum abique peccato sanguinis euacuentur secundum ipsorum exigentiam euacuantiibus integratis ex suis minoratiis, digesti uis, & eradicatiis, etiam iteratis secundum exigentiam. Sint tamen tales quod stomachum non laedant, aut parum laedant, propterea uitanda sunt solutiuia fortia, & proprie non correctia, digestiua propria in cholerico sunt oxilacchara syrup, de agresta, de granatis, de citro, de limonibus, de papaue re, qui prohibet effusionem materiem ad stomachum, syrup, endiuiae, de cytoniis. Aquae uero sunt, sicut endiuiae, lupuli, acetosae, hepaticae, plantaginis. Sed in phlegmatico, & mixto, syrup, de metha, de abinthio, mel rosae, aqua methae, abinthij in melancholico, syrup, de bizantiis, de epithymo, de fumo terrae, aqua scolopendriae, buglossae, &c. Sed aqua hordei excocti ualeat in cholerico, & mixto pluribus modis, scilicet infrigidando, humectando, aperiendo, prouocando urinam, leniendo uentrem, & si fecerit uomitum confert educere causam, & est optima in curatione febrium, & educatione cholerae praesinae, eruginosae, & humorum adustorum, ita ut frequenter sit medicina solennis in curatione fluxus, & uomitus cholerici & mixti & cum ipsa possumus multas medicinas permiscere secundum exigentiam, & maxime ualeat in materiis corruptis quarum querimus eradicationem. Solutiua uero sunt, sicut rheubarbarum, & myrobalani citrini, in cholerico pilulae alephanginae. In phlegmatico pilulae de reubarbaro, & stomatichae in mixto, & senna myrobalani in di. Epithimum in melancholico, & posset fortificari, addendo magis exoluentia secundum exigentiam. Secunda autem intentio, scilicet diuersio perficitur cum ligatura pedum supragenua, & manuum supra cubitos. Item cum uentosis in natibus & coxis. Item super umbilico & regione hepatis, & splenis, & proprie quando ab eis partibus materia stomacho communicaretur. Clysteria quoque leuia, aut acuta secundum exigentiam iuuant ad diuersionem. Lotiones quoque pedum, & brachiorum cum aqua calida sunt ad hanc intentionem. Et ad hanc intentionem sunt prouocatio urinae, & sudoris,

sanguinis menstrualis, haemorrhoidalis, & similia. Sed pro tertia intentione scilicet regimine, membri mittentis debemus tria facere. Primo ab ipso superflua euacuare. Secundo, discrasiam eius corrigere. Tercio, ipsam confortare. Si ergo splen fuerit in causa ab ipso euacuabimus melancholiam, si hepar & kystis maxime sanguinem, & cholerae, si matrix menstrua nisi fuerit praegrans, & si retentio sanguinis haemorrhoidalis fuerit in causa, ipsum prouocabimus, & sic de ceteris, discrasiam autem horum membrorum corrigemus, & similia, confortabimus cum contrariis propriis moderata stipticitate participantibus. Fluxus autem intercipitur iuxta quartam intentionem oppilando uiam transitus humorum ad stomachum, & humores ipsos incrassando, & compingendo, & quia stomachus recipit humores a toto mediante hepate, super regione hepatis, stomachi, & partium adiacentium sunt ponenda stiptica propria illis membris, & cum hoc contraria ipsorum discrasiae.

Et conuenientia ad hoc sunt unguenta, & sacculi superius descripti, quibus possunt addi apud necessitatem maioris in frigidationis sandali, spodium, camphora & similia. Et ubi calescere opus sit, thus, mastix, spica, nuxes cupressi, & similia humores etiam incrassentur, & compingantur, & uia claudantur cum interius sumptis stipticis, & uiscosis, & apud maiorem necessitatem stupefacientibus. Et ex leuibus propriis in causa calida sunt rob, aut syrupus de granatis, & similiter de citoniis descriptione Rasi in hoc cap. de uomitu & cholericapalsione. Item trochisci de olibano ab eo descripti in eodem cap. & ualent in causa mixta. Confectio quoque de cytoniis descriptione Mes. in suo Antidotario distinctione prima, & incipit, confectio de citoniis bona confortans stomachum & faciens digestionem, &c. est preciosa, & docet ibidem ordinare eam in causa mixta, & causa calida. Et multiplicado calida ualebit in causa frigida. Et si opus fuerit stupefacere detur syrupus de papauere uel. 5. 3. trochiscorum de olibano & addatur opii, eroci, ana, gran. i. aut plus secundum exigentiam. Haec autem debent sumi per s. horam antecibum, & per maius tempus, sed opiata saltem per duas horas aut, Et positio extremitatum in aqua frigida est ad hanc intentionem, & proprie in causa calida.

Regimen autem stomachi recipientis iuxta quintam intentionem perficitur. Primo educendo materiam in stomacho existentem uomitu, & secessu, aut utroque modo secundum quod uidebitur magis expediens. Secundo stomachum confortando cum propriis stipticis discrasiae suae contrariis. Confortantia autem stomachum, & uomitum prohibentia in causa frigida sunt syrupus de metha, de abinthio cum aqua cinam, garioph, galanga, & similia. Item diacitoniten cum speciebus in fine menle. Et in causa calida muiua cytoniorum syrupus de ribes, de piris cum aqua calibeata. Et in fine menle diacitoniten de saccharo. Et ad hanc intentionem sunt multa electaria, trochisci, pulueres sparsim ab authoribus colligendi. Applicanda autem exterius sufficienter dicta fuerunt cum ageremus de uomitu cibali. Et ex expertis apud Auic. in causa frigida. R. galliae, xilaloos crudi, gariophili, partes aequales sumat de eo in potu, exempli gratia, 3. i. usque ad 2. cum uino cytoniorum. Et si huic addatur pulegii pars una est praestantius si aeger non abhorreat. Et cauendum est ad stipticis uentre existente stiptico nisi prius leniatur. Et apud Auic. camphorae inest proprietas sistendi uomitum in causa calida, sumpta in potu cum rob stipticis, & odorata, & lenita & remouet nauseam. Et quando sint humores mali in stomacho, dentur in principio mensae lubricantia. In fine stiptica confortantia. Et trochisci stellae sunt potentes in sistendo uomitum, & reliqua opiata. Sed non sunt administranda, nisi cum reliqua non sufficiunt & bene correctae incipiendo a dosi parua distanter a cibo. Si uero materia a capite ad stomachum deriuetur.

Prima intentio est cura catarrhi, de qua superius proprio cap. Secunda est stomachi regimen, quod manifestum est ex dictis. Si uero materia a splene ad stomachum deriuetur, similes obseruandae sunt intentiones de euacuatione, diuersione humoris melancholici, & sic de ceteris. Verum ea quae complent has intentiones diuersificantur secundum humores & discrasiae exigentiam, quae omnia possunt patere ex iam dictis.

Io. Arculani S 4 Etis

Etis. Et idem regimen seruandum est in cura uomitus, à quo cunque membro sit communicatio. Accidentia autem iuxta sextam intentionem corrigatur secundum quod oportet. Et regimen sex rerum iuxta septimam ordinetur, secundum quod dictum est in uomitu cibali, hic tamen canon in cibando obseruetur. Quod si euomat reiteretur cibus, sed bene conditionatus, ut supra, & in modica quantitate. Et quoties euomit toties reiteretur, nam tandem una uice retinebit. Et idem canon sit in medicinis, & narratur ab Auic. in proprio cap. sumptus à Gal. 6. interiorum, secundo cap. quod quidam homines incessanter appetunt cibum, & quoties sumunt expellunt ipsum per inferius, aut superius, & sunt in continuo exercitio comedendi, & expellendi cibum, & uiuunt uita sanorum non tamen uiuerent, nisi aliquid retineret. Similiter est auis comedens locustas continue, & continue eas euomens in toto tempore in quo recipit eas. Idem faciebat quidam gulosus in patria mea, scilicet Verona multum famosus, qui multoties in die comedeat, & toties euomebat, ut nouo cibo delectaretur. Vomitus pręgnantis contingens per communitatem à matrice propter retentionem mēstruorum communiter est magis infestans à secundo mēse usque ad quartum. Ante enim mēsem secundum parum de sanguine mēstrua li retentum est. Sed post quartum foetus aucto multum sanguinis cedit in foetus nutrimentum. Hic ergo si fieri potest esset curandus eisdem septem intentionibus, de quibus supra.

Sed prima intentio, scilicet euacuatio prohibetur, nisi à quarto usque ad septimum, quarta aphorismorum. Veruntamen phlebotomia magis suspecta est, quanto maior est foetus, quinta aphorismorum. Sed solutio uentris in primis mēsis, scilicet usque ad tres inclusiue suspecta est, cum eo tempore ligamenta foetus sint debilia, & à sexto mēse supra similiter suspecta, propter foetus nimiam grauitatem. Concedi tamen possunt solutiua facilia, sicut rheubarbarum, & mirobolani, casia manna, & similia. Licet omnia aliquid suspicionis ingerant. Et Auic. 21. tertij, concedit polypodium exiccatum. Diuersiones etiam fieri possent iuxta secundam intentionem cum clysteribus leuibus, sicut ex brodio carniū, oleo, sale, saccharo rub. uel melle, & posset poni casia, similiter ligaturæ manuum supra cubitos. Item uentosa magna super umbilico, hæc tamen non sunt plurimum continuanda.

Correctio autem dispositionum membri mittentis, scilicet matricis, iuxta tertiam intentionem nō debet fieri, oportet enim prouocare mēstrua, quorum prouocatio faceret abortum. Quarta autem intentio, scilicet fluxus interceptio suspecta est ne materia ad stomachum fluxura retineatur, & retenta putreat, & ad membrum aliquod apostemandum conuertatur, est enim minus malum ut uomitu educatur. Confortatio autem stomachi iuxta quintam intentionem male fieri potest, cum materia ad ipsum continue deriuetur. Confortatio nanque applicata interius aut exterius cum sint stiptica stomacho existente pleno superfuitatibus sunt causa retentionis illorum superfluatorum in stomacho, & consequenter causa maioris conturbationis & angustię. Quare oportet alterum duorum fieri, aut materiam ad intestina deriuari cum clysteribus, de quibus supra, & aliquando solutiuis suprascriptis leuibus, & cum diæta uentrem leniente, sicut passulis, ficubus, uitellis ouorum, saccharo, brodio carniū laudabiliū & similibus sumptis in principio mēse. Aut oportet uomitum finire & ipsum facilitare, uomitus nanque materię in stomacho contentę ante cibi sumptionem erit causa quietis stomachi & appetitus. Et quod cibus in stomacho retineatur & bonę digestionis eius, neque natura ex hoc uomitu etiam quatuor aut pluribus mēstrisbus cōtinuatis tantum terretur, quantum terretur ex uomitu à causa pręternaturali pēdente. Et nota quod aqua hordei sumpta in mane calida aut uentrem lenit, aut uomitum faciliat. Et sit. 4. 3. usque ad. 6. Si tamen sumpto cibo inclinaretur ad uomitum retineatur aspergendo faciem cum aqua frigida, & apponendo stomacho aliquid constrictiuum ex suprascriptis. Et in fine mēse sumendo cytonium, aut pirum, aut aliud simile stomachi confortatiuum, aut constrictiuum, & apponatur uentosa super umbilico, & similia. Si tamen euomerent, euomant complete cibum & humores, deinde cibus iteretur cōfortando sto-

machum, ut supra, & toties cibetur, donec aliquid retineat. Et miua cytoniorum cum bolo armeno sedat uomitum. Et syrupus de agresta, & acetositas citri sunt propria in uomitu pręgnantis à causa calida. Corrigantur accidentia iuxta sextam intentionem secundum ipsum exigentiam. Et regimen sex rerum ordinetur, sicut dictum fuit superius. In hoc tamen habet differentiam pręgnans à ceteris uomentibus, quia oportet magis complacere appetitui illius, quàm ceterorum. Et uinum odoriferum paucum subtile & rectificans appetitum earum nauseam & uomitum. Et sinapis excitat appetitum deiectum per pręsentiam humorum, frigidorum, crassorum, & uiscosorum. Et caseus afflatus excitat appetitum & sedat uomitum. Et cytonia afflata in quibus sint scissa frusta xiloaloes indi in fine mēse sistant uomitum, & ualent ad appetitum. Vomitus sanguinis si fuerit à uirtute sana expellet superflua, aut fuerit criticus, sinatur natura operari quousque æger toleret bene. Alius uero sistendus est, pro cuius cura recurre ad capit. de spuro sanguinis. Omnes enim intentiones & medicinę ibidem posite sunt ad hunc locum offerendę. Non est nisi hæc differentia, quia sicut ibi eligimus medicinas pectorales, ita hic eligantur medicinę stomachales. Aui. tamen describit remedium expertum. R. acatix, seminum rosarum, terrę sigillatę, & balsamitarum, ana. 3. i. opij gran. 5. sem. hyoscyami alb. gra. 8. gummi arabicę, 3. i. succi arnoglossę, uel uirgę pastoris. 3. s. Si uolumus dulcorare possumus addere iulep, ros. 3. i. Si uero uolumus ipsum in forma solida ponatur cum suprascriptis pulueribus, sicut quantum sufficit, pro formandis trochiscis his utere secundum exigentiam. Potest enim ex his exhiberi à. 3. s. usque ad. 1. & s. distemperatis cum uino stiptico multę commixtionis cum aqua calibea, aut cum aqua plantaginis, uel accipiantur in forma pilularū, & post eas bibatur aliquid ex suprascriptis.

Vomitus autem sanguinis sequens ulcera, aut apostemata rupta curatur cura ulcerum, aut apostematum, de qua infra, admiscendo medicinis ulcerum sanguinem confringentia. Et si à capite descenderit, cura potest patere ex cura fluxus sanguinis narium. Cura uomitus, aut spuri sanguinis pendens à sanguisuga manifestabitur in sequentibus in quodam cap. proprio.

De cholerica pafsione. Cap. 79.

Terminus cholerica pafsio apud Alexandrum & Simonem descendit à *χολα* & *δυσ* Grace, quod est intestinum latine. Sed penes hos melius scriberetur cholerica quàm cholera. Sed apud alios Græcos nostri temporis hic terminus est corruptus cum potius deberet dici celiaca *κοιλία* enim Græce, idem est quod uenter Latine. Vnde celiaca pafsio, id est, uentralis pafsio, quia *κοιλία* Græci scribunt per *ο*, diphthongum, cui Latine *œ*, diphthongum correspondet, melius scriberetur celiaca, quàm ciliaca. Est autē descriptiue motus uehemens materiem ex indigestione corruptam ad expellendum eam à corpore cum labore, & acuitate uirtutis expulsuę, in tantum ut frequenter fiat uomitus & secessus simul, una uia non sufficiente ad egressum huius materię propter sui multitudinem, & acuitatē expulsiuam præter modum stimulantem.

Species sumuntur secundum diuersas species exeuntium. Sunt enim quædam aquosa de genere phlegmatis. Quædam cholerica & diuersarum specierum, & proprie corruptarum sicut cholera prasinæ, eruginosę, & similia. Quædam melancholica corrupta frequenter adustione participantia diuersarum naturarum & colorum. Causę eius sunt omnia quę corrumpunt digestionem, imo digestionem, siue sint cibi mali facile corruptibiles, sicut proprie lac, chrysolilla, melones, & similia, siue sit ciborum quantitas superflua, aut mala preparatio, aut malus ordo, aut tempus incongruum cum ponitur indigestum super indigesto, aut tempus anni, & proprie æstas & autumnus. Et aer in sua substantia corruptus, & ea quę accidentaliter occurrunt, sicut coitus, balneum, exercitium indebitum, accidentia animi immoderata & proprie tempore non congrua. Et multiplicatur ex potu aquę frigidę in ieiunio sequente cibum crassum. Corruptuntur quoque digestionem, quę sunt causa cholericę pafsionis propter nocumenta ipsorum digerentium, scilicet stomachi, & hepatis cum sunt læsa per essentiam secundum aliquam suarum naturarum,

turarum, aut omnes, aut per communitatem, uel à toto, uel à singulis membris communitate absolute uel non absolute, sed de causis corruptæ digestiōis in sequenti ca. uberius age.

Signa. Incipit in primis cum lenitate, deinde statim auge-
tur cum dolore & punctione in stomacho & intestinis. Et
quæ sunt minus maligna in primis secundum plurimum ex-
pelluntur, sicut cibi corrupti, deinde humores aquosi, & cho-
lerici citrini, tandem uirides præsini, & eruginosi, & nigri,
& tandem perducit ad fluxum uentris, qui est sicut lotura car-
nium recentium, & interdum habet dolorem pungitiuum &
quandoque perducit ad karatim alcurat, & sunt frustra subti-
lia ex substantia intestinorum, quæ educuntur in dysenteria.
Accidentia eius sunt sitis, cuius tolerantia iuuat, & bibere
aquam frigidam nocet, dolor, & punctio, & uigiliarum instā-
tia à principio usque ad finem, sed in processu perducit ad spā-
sum & singultum, & tandem ad casum pulsum, sudorem frigi-
dum, & mortem, & hoc usque ad septimum. Est enim passio
peracuta, cuius terminus est ad mortem, uel ad salutem à 4.
usque ad 7. dies.

Prognostica. Primum qui hanc passionem frequenter in-
currunt, facilius eam tolerant materia non existente rāta nec
ita maligna. Qui uero raro difficulter saluantur ex causis cō-
trariis, propterea infantes facilius saluantur quā reliqui, quia
eam frequentius ceteris incurunt. Et quia uirtutes suæ natu-
rales sunt fortissimæ. Secundum, cum uentum est ad casum
uirtutis, frigiditatem extremorum, spāsum & singultum in
fine, nō est spes salutis. In principio uero sic, cum tunc sequat-
ur punctioem & dolorem & fortem pugnam, in fine uero
uirtutis debilitatem, & corporis consumptionem. Tertium,
multoties cum restringitur cholericā passio, declinat mate-
ria subito ad uias urinæ, & accedit ardor urinæ. Quartum,
hæc passio secundum plurimum est salubris si debite tractetur,
sed non apud tardos, negligentes, aut imperitos, celerita-
te enim indiget.

Cum punctio, et tristitia alicui superuenierit, affuerit
cum ea, uel post eam uomitus, et uentris solutio, & aqua
calida multoties continē in potu tribuatur. & si ad
huc perseverauerit uomitus, & uentris fluxus; aqua calida
iterum deur: sedabitur enim passio. cum autem egritudo
quieuerit, balneum ingrediatur æger, in quo per unius ho-
re spatium moretur. egressus autem de balneo leui alatur
nutrimento: deinde dormiat.

SCHOLIA.

Cum punctio] Rasis textus sic legitur Cum Parus dolor, punctio, & tri-
stitia. hæc sunt signa colicæ proximæ. Vomitus, & uentris solutio] comitan-
tur colicam. Aqua calida] conuenit humores acutos, debilem reddit stoma-
chi contentum ad continendum & excitat expulsiuum. Balneum ingredia-
tur] quod attrahit humores, & reliqua non euacuat. Vnius horæ spatium]
facis esset fortē tertia pars. Leui alatur nutrimento] ob stomachi ualitudi-
nem. Dormiat] ut materia quiescat.

Hoc capitulum habet duas partes. In prima curat cholericā
eam passionem quando est debilis. In secunda ibi. Sed licet
uomitibus & uentris fluxus curat ipsam quando est fortis. Itē
prima in duas. Nam prima curat ipsam in principio, augmen-
to, & statu. In secunda parte ibi. Cum autem egritudo. Curat
ipsam in declinatione. De prima parte ponens signa cholericæ
passionis dicit. Cum punctio, scilicet, stomachi, & intesti-
norum, tristitia, quæ est quedam conturbatio & anxietas sto-
matica, & cum ea uel post ipsam fuerit uomitus, & uentris
solutio aliquando simul una uia non sufficiente ob multitudi-
nem materiæ, aut ipsius acuitatem præter modum naturam
stimulantem, aliquando successiue una immediate post reli-
quam aqua calida in principio & etiam in augmento & sta-
tu, ipsa perseverante est multoties, & in magna quantitate
tribuenda, lauat enim stomachum & intestina ab his humori-
bus eorum acuitatem remittens. Et nota pro solenni reme-
dio huius aquæ exhibitæ, ualere non solum in cholericā pas-
sione, sed in omni uomitu & fluxu & anxietate stomatichā
ab humoribus calidis contingente si oportune afferatur, ita
ut frequenter sola ad curam sufficiat. In secunda parte curat
ad uentum est ad declinationem per balneum aquæ dulcis
ad sistendum uomitum & fluxum, diuertendo materias à cen-

tro ad circumferentiam, & ad corpus humedatū superflue
per huiusmodi euacuationes exiecatum. Et nutrimentum de-
bet esse facilis digestiōis, boni chimi, cito penetrans, pau-
carum superfluitatum, stomachi & intestinorum confortati-
uum, sicut succus & contusum carnis pulli, aut perdicis, & fi-
milium, & proprie post assationem, & modicum uini subti-
lis aliquantulum stiptici.

Quod licet uomitus, & uentris solutio uehementes fiant:
& symptomata terrefactientia superuenierint, non tamen est
timendum: imo cum medicaminibus quæ ego nominabo, suc-
currendū in principio itaq; † trochisci de olibano cum aqua,
& niue, & rob granatorum dentur semel. qui iterum sunt
etiam dandi: si uomitus non cessauerit. duo quoque adiuto-
ria, & coxæ in supremis partibus ligentur & aqua niue in-
frigidata super crura, & pedes fundatur, & in ipsam etiam
inmittantur. tūter quoque ex sandalis, ros. camphora, gal-
lia, aqua rosea confersis epithimetur. & pannus aqua ro-
sacea in niue infrigidata infusus desuper ponatur. qui post-
quam tepescit fuerit, est remouendus: & alius ut prius de
super mittendus. ad potandum autem paulatim tribuatur
uinum uetus temperatum cum rob granatorum. & quando
uomuerit: iterum tribuatur panem quoque in succo grana-
torum infusum cogendus est sumere cum uino & comedere.
quem si uomuerit, iterum dandus est, donec quiescat.

In hac parte curat cholericā dum est fortis. Et habet qua-
tuor partes. In prima facit, quod dictum est. In secunda ibi.
Quod si syncopis. Curat syncopē superuenientem. In tertia
ibi. Quicquid autem. Ordinatur diætā proprie conuenientē
in declinatione. In quarta parte ibi. Trochisci dicti de oliba-
no. Describit quasdam medicinas, de quibus fecerat mentio-
nem. In prima parte dicit, non esse timendum, esto quod uo-
mitus & fluxus uentris fiant uehementer & superueniant sym-
ptomata, id est accidentia horrenda, sed ad remedia properā-
dum, ut infra. Sed nota quod statim à principio & antequam
huiusmodi remedia fiant, debet exhiberi aqua calida in ma-
gna quantitate & multoties, ut dictum est superius. In pri-
mis exhibet unum de trochiscis, de olibano, quorum descrip-
tio ponetur statim, ponderantem aur. i. distemperatum cū
3. i. aquæ frigidissimæ, & 3. s. rob de granatis, & si uomitus
non cessauerit iteretur eiusdem medicinæ exhibitio, magis
enim debemus esse solliciti de retentione uomitus, quā flu-
xu uentris. Quod si abhorrent hunc modum sumēdi hos tro-
chiscos possunt exhiberi in forma pilularum, & post eorum
sumptionem bibatur liquor suprascriptus, habent enim in re-
stringendo uomitum singularem proprietatem. Secundum
remedium, ut duo adiutoria & coxæ in supremis partibus eo-
rum stringantur fortiter, ut ratione doloris materia diuertatur,
& ut maior dolor tristē sensationem denigret. Tertio,
aqua frigidissima super crura embrocetur & in ipsa etiā mit-
tantur pedes ad compingendum & incrassandum materiā,
ut fiat inepta fluxui. Et Gerardus de Solo laudat manutergium
in aqua frigida infusum, & post expressionem collo ap-
plicitum, quia nervi uenientes à cerebro ad stomachum con-
gelantur, unde cessat tristis sensatio in ore stomachi, quæ est
causa uomitus, & clauditur meri. Quarta epithymetur sto-
machus cum hoc. R. rosarum, & proprie syluestrium stiptica-
rum, sandalorum rub. ana. 3. 2. camphoræ. 3. s. galliæ mulsatæ.
3. i. aquæ rosatæ ad conficiendum quātum sufficit: hoc in mo-
dum unguenti cum quo stomachus ungatur, postea pannus
infusus in aqua rosata frigidissima actu loco inuncto suppo-
natur & sæpe replicetur. Expediens tamen esset ut pecia in-
fusa in medicamine prædicto cui multa aqua rosata esset ad-
mixta & expressa stomacho sæpe applicetur ne tepescat. Sed
hoc medicamen non omnibus conuenit, sed solum stomachi
discrasiam calidam habentibus cum fortitudine caloris inna-
ti. Quinto, iubet in potu dari uinum granatorum cum uino
ueteri mixtum ad uigorandum uirtutem & confortandum
stomachi retentiuam & prohibendum cibi corruptionem ra-
tione acetositatis, dosi sit ab 3. i. uel quantum uidebitur di-
cretionis medici, & per uinum uetus intelligo uinum depu-
ratum,

ratur, contra mustum distinctum. & sit stipticum aliquid
& non ualde crassum. Et si uomuerit iterum exhibeatur, do-
nec retineat. Et panis in uino granatorum infusus similiter
exhibeatur loco cibi. Et bibatur uinum in quo est infusus.
Quem si uomuerit, iteretur donec retineatur, hanc discrasia
calidam stomachi remouent, & confortando humores uenie-
tes ad os stomachi prohibent.

S C H O L I A.

Trochisci de olibano sunt dandi, cum supradicta medicamenta non con-
tulerint. Ligantur ut humores ad illas partes ligatas confungiant. Venter
epithimetur, & alij dorsum os stomachi respiciens, ut confortetur. Vinu ue-
tus in materia frigida confert solum, sed in calida cum rob granato.

*Quod, si syncopis superuenerit, muscum cum rob grana-
torum, uel cum uino dare conueniens est, uim inferendo: &
succus carnis hœdine, & pullina cum pauco cytoniorum
succo, & uino mixtus in potu est tribuendus. pulli præterea
sunt affandi, & ante nares ipsius descendi. thus etiam da-
dum est, ut masticet ipsum, & paulatim traiciat. & postre-
mo bolum corascenum cõditum cum camphora tribuatur.*

In hac parte curat syncopim superuenientem, tum ratio-
ne uaporum malignorum cordi communicantium, tum ratio-
ne compassionis cordis ori stomachi, tum propter pau-
citatem spirituum sequentem euacuationem superfluum. Primo,
exhibet uinum cum musco, ut puta. 1. 3. uini odoriferi sub-
tilis cum. 4. granis musci, sed melius est, ut huic addatur. s. 3.
aut. 3. 1. uini cytoniorum, uel alicuius similis frigidi ualentis
in stomachi confortatione. Secundo, exhibet cibum resump-
tium, restauratum spirituum in breui tempore, propter
facilem eius digestionem & penetrationem, & stomachi cõ-
fortationem. Cuius sit hæc descriptio. 1. 3. succi carnis hœ-
dinæ, uel pullinæ, aut alicuius uis bene conditionatæ. 3. 2. ui-
ni cytoniorum, uini subtilis aromatici aliqui dulcedine par-
ticipantis ana. 3. 1. misce & totum debite calidum, uel quan-
tum sumere potest, ita ut non uomat exhibeatur in potu. Ter-
tio, confortat ægrum bonis odoribus, sicut pullis affatis, &
contractis appositis prope nares, sed bonum est ut unicui-
que præsentetur sibi placentes. Quarto, iubet pro confortati-
one stomachi, & retentione uomitus, thus masticari &
deglutiri, aut si eius masticatione abhorret, deglutiat ab-
que masticatione. Quinto, bolum corascenum, qui non est
apud nos, cuius loco accipimus masticis, boli armeni ana. 3. 1.
camphoræ ana, gran. 2. usque ad. 4. & formare pilulas cum
uino cytoniorum. cytonia enim, & quæ ex cytoniis sunt, cõ-
ferunt secundum omnem modum administrationis, & fere
omnes excedunt medicinas in hoc casu.

*Quicquid autem de huius passionis cura nunc usque dixi-
mus, donec uomitus sedatur, & stomachus cibum recipiat, fie-
ri conuenit. postquam uero stomachus ipsius retinere pote-
rit, nutriendus est æger: et parum uini ueteris in potu sumat
bene redolentis: & dormire incipiat.*

In hac parte ordinat dietam conuenientem, & proprie
uomitu sedato: quæ debet esse crassior quam ante. Sed tamẽ
omnia quæ exhibentur, sint pauca in quantitate, facili diges-
tionis, boni chimi, paucarum superfluitatum, quorum pau-
cum, multum nutriet, stomachi & membrorum nobilium cõ-
fortatiua, odoris & saporis boni, ægro placentia: etiam præ-
cipit somnum, qui tamen est cõueniens in toto curæ proces-
su, minoratis superfluitatibus, & proprie post cibi & potus,
aut alicuius medicinalis sumptionem.

*Trochisci de olibano dicti ad uomitum. Recipe boli cora-
sceni, thuris, amborum ana. drach. 1. o. cubebæ, cardamomi
amborum ana. drach. 2. & s. camphoræ, galliæ, gar. omniũ
ana. 6. drach. 1. fiant trochisci pondere aur. 1. hi enim uomi-
tui multum conferunt. Rob de malis granatis, succus malo-
rum granatorum acetosorum sumatur, & per noctem unã
aut amplius dimittatur, donec quod crassum est in fundo re-
sedeat, & deinde coquatur, & dispumetur donec iulep simili-
tudinem habeat, in quo ab igne disposito adhuc tamen cali-
do menthæ uiridis stiptes mittantur, & in ipso manere per-*

*mittantur, quousque infrigidatur. Cumque infrigidatum
fuerit extrahantur, ad cuius similitudinem syrupus de cy-
ton. et syrupus de malis macianis fieri conuenit. Si autem uo-
mitus hora alia inualuerit nimis, & superfluerit magna ue-
tosa stomacho superponatur.*

In hac parte describit quasdam medicinas, de quibus fecit
rat mentionem, quarum descriptiones sunt istæ. 1. 3. boli cora-
sceni, loco eius pone masticis, boli armeni, thuris, ana. 3. 5.
charabæ, cardamomi, ana. 3. 1. & grana. 1. 5. camphoræ, galliæ
muschatæ, garioph. ana, gran. quinque, formentum trochisci
aur. 1. cum aqua acetosæ, aut rob de granatis infra scriptis, de
quibus detur unus in forma pilularum, post cuius sumptionem
sumatur parum eiusdem rob cum pauco aquæ calibeat. De
scriptio rob de granatis. succus granatorum dimittatur resi-
dere per noctem, deinde subtile accipiat & bulliat, & di-
spumetur donec iulep similitudinẽ habuerit, in quo ab igne
deposito adhuc calido, myrti uiridis stiptes ponantur & in
ipso dimittantur manere donec infrigidetur, postea extraha-
tur, & reseruetur, ad cuius similitudinem syrup. de cytoniis,
aut malis macianis fieri conuenit & sunt proprii ad uomitum
& ad fluxum. Vltimo, uentolam magnam ad sistendum
uomitum stomacho superponit.

Cura huius persæpe difficilis est & indiget medico con-
stante, & experto quem non terreant accidentia. Et in sum-
ma quinque exigit intentiones. Prima causam remouet eni-
quando humiditates corruptas, quæ sunt in stomacho, & in
intestinis, nec non cachochimiam in toto existentem, præci-
pue in uenis membrorum naturalium secundæ & tertie di-
gestionis dolorem & punctiorem stomachi & intestinorum
sedando. Secunda, diuertit. Tertia, humores incrassat, uias &
ductus constringit, tandem stupefaciendo si fuerit necessa-
rium, & cum hoc stomachum & intestina confortat ne reci-
pian. Quarta, accidentia corrigit. Quinta, ordinat debitum
regimen sex rerum. In primis si fuerit dolor & punctio in
stomacho & in intestinis cum nausea & inclinatione ad uo-
mitum aut secessum uentris cum inceperit, præmittatur cly-
stere ex. 1. 5. 3. aquæ hordei, & 3. 4. olei communis. 3. 1. sacch-
rub. & uno uittello oui. Aut si uideantur humores frigidi ma-
gis dominari fiat clystere ex. 3. 2. 5. aquæ pauci mellis, quo eda-
cto bibat aquæ calidæ, aut aquæ hordei. 3. 6. Et si appareat do-
minium humorum frigidorum aquæ pauci mellis tantundẽ,
cui posset addi. 3. s. cymini præparati, enim proprium, hæc
enim aqua materias & cibos corruptos, uel per secessum,
uel uomitum purgabit. Post hoc si uomitus & fluxus simul
incipiunt, aut alter eorum sinatur natura operari, quousque
bene ferat, & proprie his euacuationibus existentibus pro-
portionatis uirtuti & cacochimix. Quod si fuerit impropor-
tionatæ cacochimix, ut quia nimis panæ, aut nimis tarda,
adiuuatur aut cum clysteris, de quibus supra, aut uomiti-
bus leuibus. sicut si. 3. 4. aquæ hordei admisceantur. 3. 2. oximel-
lis, & tepidum sumatur, adiuuatur etiam uomitus digitis in
ore inpositis, aut penna oleo intincta & similiter imposita.
Et omnino uitetur fortia solutiua & uomitiua, & omnia sto-
machum relaxantia sicut olea. Et omnino cauendum est ne
uterque simul artificialiter prouocetur, fierent enim motus
contrarii sese impediētes. Sed nunc adiuuatur unus, nunc
alter secundum naturalem inclinationem ad illum. Si uero
fuerint improporcionatæ uirtuti, quia nimis superfluant, mi-
norentur & constringantur. Et similiter si fuerint coniunctæ
accidentibus molestis sicut dolor, punctio & similia, mitige-
tur & corrigantur, sicut infra dicitur. Sumptio enim aquæ
calidæ, aut aquæ hordei, in causa calida, aut aquæ pauci mel-
lis in causa frigida, in magna quantitate fluxum faciliat &
dolorem & punctiorem lenit. Et similiter cum his clysteriza-
tio, & proprie addendo oleum rosæ aut uiolaceum, aut adipẽ
renum capræ, & similia. Nam hæc intestina confortant, dolo-
rem sedant, excoitationem prohibet, & expertus sum quod
huiusmodi aquæ calefactæ sumptæ in potu, & clysterizati-
o modo iam dicto, non solum modo in cholericis passionibus,
sed in multis aliis fluxibus etiam optime cõferunt in princi-
pio. Secunda intentio perficitur cum ligatione brachiorum
supra cubitos satis dolorosa, quæ multoties permutetur nunc
parum infra, nunc parum supra, necnon cum positione uen-
tolarum

rosarum in pulpis spatularum sine scarificatione & in dorso, uentose quoque posite super hepate & splene fluxum & uomitum retinent, materiam uenientem ad stomachum & intestina prohibendo, & debent esse uentose magnæ. Et ad sedandum uomitum confert ligatura coxarum supra genua. licet in fluxu non conferat cum moueat materias ad inferiora. Sudoris quoque prouocatio egregie confert si fieri potest, ad quem prouocandum elaboretur summo aqua calidam, de qua supra, sed sit notabiliter calida, & cum quinta parte uini subtilis uinofa mixta. Et æger bene pannis cooperiatur, dormiat iuxta posse, anhelitus quoque retentio ad sudorem iuuat quæ si non suffecerint ponatur in balneo aquæ calidæ constanti uirtute in quo tamen parum moram trahat, ne debilef, & egrediens de balneo sicceatur, & dormiat. Cæteræ quoque euacuationes sibi confuetæ iuxta posse prouocentur, nam diuertendo euacuant. Tertia autem intentio, scilicet constrictio, perficitur cum inferius dicendis. Sed apud me sanum consilium est, ut elaboretur in primis in retentione uomitus, & sinatur uenter fluere, quæ uomitur retentio fiat si possibile est secunda die, & postea euacuata materia quantum uidebitur oportunitatem per secessum, elaboretur in uentris constrictione. Constrictio autem uomitus fiat aspergendo faciem ægri aqua frigida dum uult uomere, & apponendo super stomacho res stipticas confortantes notabiliter frigidæ actus & potentia in causa calida, ut. R. sandalorum rub. rosarum rub. semen rosarum ana. 3. camphoræ gran. quinque galliæ mulsæ. 3. 1. aquæ rosæ. 4. aceti. 3. 1. s. misce, & petreæ duplæ aut philtum in modum scuti figuratum secundum quantitatem stomachi infundatur in hoc liquore actus frigidus, imo etiam apud necessitatem in niue infrigido stomacho applicetur, & sæpe reiteretur ne super calefiat. Et his potest addi succum acetosæ, & succus plantaginis apud maiorem necessitatem infrigidationis, & si frigidior uelis frigiditatem temperare potes præscriptis addere succum menthæ. Et nota quod masticæ dissolutus cum oleo cytoniorum, & aceto, & extensus super corio ad modum ceroti est efficax in retinendo uomitum. Et si opus esset maiori infrigidatione posset addi semen rosarum & sandali, & similia. Gerardus de Sollo facit cerotum optimum efficax ualde. R. laudani, masticæ. ana. quartam. s. oliban. 3. s. sandali al. & rub. sumach. berberis. ana. 3. 1. antheræ, corallorum, acatiæ, hypochistidos, plidiæ, balauftiæ, ana. 3. s. terebinthinæ quantum sufficit ad tenacitatem, puluerizanda puluerizentur, & cum pistello misceantur omnia malaxando cum oleo rosaceo, et fiat cerotum ad modum scuti secundum quantitatem stomachi. Et si uomitus esset fortis fiant duo, unum ponatur ante, reliquum post, scilicet circa. 1. 3. spondilem. Nam orificium stomachi magis declinat ad partem posteriorem, sed quia spondiles prohibent penerationem uirtutis medicinarum à parte posteriori, ideo magis ponimus ante. Et dicit se uidisse emplastrum positum à parte posteriori sistens uomitum, & non à parte anteriori. Item describit istud. R. succi plantaginis, aquæ rosatæ de stipticis, quia ista est magis stiptica, ana. quartam. 1. aceti. 3. s. sumach. berber. ana. 3. 3. masticis, oliban. ana. 3. 1. farinæ lentium quantum sufficit, puluerizanda puluerizentur, & misceantur omnia, & fiat emplastrum mediocriter liquidum & super stomachum ponatur, & dicit se uidisse quandam uetulam, quæ acceperat de pane cocto & pistauit bene & acceperat. 3. 2. pulueris masticis, & miscuit totum, & posuit in sacculo, & istum sacculum calefecit manibus, & posuit super stomachum patientis & statim fuit retentus. Sed melius est hanc medicinam sic conficere, & est experta, medulla panis torrefiat & infundatur in uino nigro, stiptico, aceto, succo menthæ, ana. & postea contundantur in mortario addendo masticen & galliam muscatam, & semen rosæ aut sandalos, aut corallus, aut alias medicinas stipticas, quæ tibi magis placuerint, aut plures ex his simul secundum intentionem quam quæris & est efficax & expertum. Et ex his possunt fieri unguenta calida aut frigida, aut mixta secundum exigentiam. Cum enim humores peccantes sunt frigidi, & complexio naturalis frigida elige calida stiptica, quæ etiam actus calida applicentur, & cum resse habet econtrario, applica frigida stiptica actus & potentia. Cum uero res medio modo se ha-

bet, medium teneatur ut applicando stiptica, temperata & stiptica permixta ex calidis & frigidis, ita ut ad medium proportionatum reducat. Nunquam tamen applicentur nisi actus calida aut frigida, non autem tepida: tepidum namque dissoluit robur stomachi. Et quidam dissolunt masticen cum albumine oui, & extensum super corio applicant stomacho, & dicunt esse efficax & ultimum ad retinendum uomitum, sed de curatione uomitus dictum est superius quantum est oportunitatem. Sed retento uomitu elaborandum est, ut uenter moderate fluat quousque cacochimia sit reducta, aut quousque uirtus tolerare potest, postea elaborandum est in constrictione pro quo complendo humores in crassentur, uix & ductus oppilantur cum interius sumptis, sicut rob & syrupus de cytoniis & granatis de ribes, de myrto cum aqua plantaginis, aut calibeata, electuarium de sorbis, & similia. Et exterius applicita sunt cerota, emplastra, & unctiones, de quibus sermo præcessit. & ex conuenientibus propriis est ut ungatur uenter cum oleo rosaceo notabiliter calido, scilicet quantum sufferre potest, postea desuper aspergatur hic puluis. R. sem. ros. 3. 2. galliæ mulsæ, masticis, ana. 3. 1. misce, & super loco uncto aspergatur. Sed de his uberius agetur in cap. de fluxu uentris. Et ex appropriatis est aqua andachocæ id est trifolii. Quarta intentio, scilicet accidentium correctio perficitur cum his quæ dicta sunt in textu, sed pro sitis sedatione non est bibenda nisi aqua calida, aut sugatur aliquid succi granati: potus enim nimius & præcipue actus frigidus mulcum nocet. Syncopi autem intendatur cum aspergione aquæ frigidæ in faciem & potu pauci uini subtilis odoriferi non multum uinofa & lymphati, & sumptione aquæ carnis, & similibus, in quibus parum musci ponatur, & si extrema infrigidentur, calefiant cum pannis calidis. Singultui autem & proprie ex inanitione subueniatur cum frigidis stomachum confortantibus, euacuationem prohibentibus, sicut uinum, & myia cytoniorum, & exterius applicetur emplastrum ex cytoniis decoctis in aqua calibeata cum paucis aceti ad penetrandum & stringendum, & his possent addi rosæ & sandali, de quibus supra, & cibetur sæpe parum cum aqua carnis, & huiusmodi boni chimi facili digestio, alterati cum frigidis confortantibus & stringentibus. Spasmo autem subueniatur ungendo nucham & partem spasmatam ex oleo rosæ. uiol. pinguedine porci recentis. & medulla uituli decies loti cum aqua frig. & tempore frigido ex oleo amygdal. Et specialis intentio circa mandibulas spasmatas ut eleuentur cum mento ad superiora & rectificentur in contrarium in spasmi inungendo eas cum humectantibus, de quibus supra. Regimen autem sex rerum est, ut non comedant nec bibant uirtute constante nisi mundificatione pro magna parte facta. Interim tamen semper confortentur bonis odoribus sibi placentibus: plurimi enim fructuum odoribus delectantur, aliqui odore uini, unicuique concedatur odor, qui sibi magis placet, & ante mundificationem, si sitiuerint colluant sibi os, aut lambendo sumant succum granatorum & cytoniorum, & similia: tolerantia enim sitis confert, & si non possunt abstinere à cibo, sumant parum aquæ carnis aut confusi, aut pristinæ, & similia, & parum uini pauciferi, lymphati ut uirtus sustentetur. Declinante autem ægritudine detur confusum pulli, & panis in uino infusus, & carnes auium landabilium, & similia, & pira, & citronia, & huiusmodi, & bibat uinum nigrum, stipticum, lymphatum, cum aqua calibeata. Rasis autem exhibet uinum uetus, id est clarum, & depuratum cum succo granatorum aut cytoniorum. Et si uomeret, iterum detur donec retineat & parum pro uice, præcipue parum bibat, & in summa utatur cibis boni chimi calidis aut frigidis secundum exigentiam, sed omnia sint stomachi & membrorum principalium confortatiua, multum dormiat præcipue sumpto cibo, quiescat animo & corpore.

SCHOLIUM.

Stomacho superposito id est, infra stomachum, ut materia descendendo attrahatur. quemadmodum supra, a uentris fluxum sistere uolumus.

De

De nocimento digestionis. Cap. 20.

Circa rubricam more consueto est sciendum, quod debilitas digestionis primo quæ debetur fudo stomachi est mutatio ipsius à dispositione naturali per corruptionem, diminutionem, & ablationem. Corruptio autem ipsius fit quadruplex, nam cibus receptus in stomacho aut accit, aut adurit, aut putrescit, aut acquirit aliquam qualitatem non proportionalem ad aliquam qualitatem consuetarum. Diminuitur autem apud quosdam dupliciter per remissionem aut intentionem cibo diminute aut superflue decocto: ita tamen ut non corrumpatur aliquo modorum supra scriptorum. Quorum error apud alios facile reprehenditur, cum digestio sit æquatio eius quod digeritur in ordine ad nutritionem, quæto autem aliquid magis æquatur in ordine ad nutritionem, tanto magis & melius digeritur. Non itaque digestio potest lædi per intensiorem. Et confirmatur, quia digestio fit à calore æquali multiplicato in quanto apud Galenum. 1. Aphor. Aphor. 1. 5. quanto ergo erit æqualior magis, & melius digeretur. Item. 4. metho. digestio est completio in unoquoque humido à proprio naturali calido ex oppositis passivis, ergo quanto magis complebitur & ultimabitur erit perfectior. Item omnis digestio in iuuatuo ordinatur in generationem uel perfectionem mixti & non in corruptionem, omnis superflua decoctio ordinatur in corruptionem, ergo nulla superflua decoctio est digestio: oppositum autem contingit in operationibus uirtutum ministrantium nutritioni: possunt enim lædi per intensiorem & remissionem. Digestio tamen est diminuta dupliciter, aut quia tarda, aut quia non completa: nec tamen ex his fit corruptio ad acetosum. Sed contra, sicut potest esse diminuta à complemento absque corruptione ad acetosum, ita potest esse aucta supra complementum absque corruptione ad fumosum, ergo cum non possit reponi in alia specie erit digestio læsa per intensiorem. Et confirmatur, quia sicut est in artificialibus, ita est in naturalibus sed contingit artificio aliquid maius aut minus decoqui absque hoc quod corrumpatur, ergo &c. Item. 4. metho. contingit pempasim lædi in maius & minus. Credo opinionem utramque posse defendi, & forte non est contradictio, nisi in uerbis: utraque enim concederet decoctionem posse lædi per intensiorem & remissionem absque corruptione, & quolibet concederet æquationem & debitam permutationem humidi cum secco in ordine ad nutritionem, aut mixti generationem & perfectionem non posse lædi per intensiorem. Et facientes differentiam inter magis digeri & perfectius digeri forte sentiunt hoc idem: si enim quanto æquatio esset fortior, tanto digestio esset intensior, tunc faciet transitum subitum ab intensius digestionem ad non gradum digestionis, ubi ponatur fortificari digestionem, donec digestibile aduratur. Aufertur autem digestio, cibo non immutato aliquo modorum supra scriptorum, aut leuissime immutato, ita ut aliquando etiam post longam retentionem amoueatur aut egeratur non permutata ab ea dispositione in qua assumptus est.

Causæ nocimenti digestionis sunt duplices primitiue & corporeæ. Et primitiue sunt aut extraneæ, sicut percussio stomachi, aut membri stomacho communicantis. Item morbus, sumptio aut applicatio uenenosorum. Balneum calidum post cibum conuertens calidum exterius, aut frigidum caliditatem extinguens. Aut non sunt extraneæ, sicut sumptus à sex rebus non naturalibus. Aer nanque superflue lapsus in qualitatibus primis aut corruptus, aut habes uapores malos admixtos, sicut cadauerum, & similia foetentium est causa nocimenti, scilicet, corruptionis, aut diminutionis, digestionis. Similiter cibus. Aut quia superflue ut bene digeri non possit & corrumpitur ad acetosum: maxime si stomachus sit frigidus, aut diminute digeritur, uel est tam paucæ quantitatis, ut aduratur & corrumpatur ad fumosum in stomacho calido, aut nimis decoquitur. Secundo, propter qualitatem superflue, sicut mel in dulcedine cum notabili caliditate, & corrumpuntur magis ad fumosum, aut superfluitatem in frigidationis, & diminute digeritur, aut corrumpitur ad acetosum, sicut lactuca, papauer, & similia, aut superfluitatem in humi, sicut perfica, pepones, & similia, & putrescant in stomacho calido & acetosantur in frigido, & e contrario siccitas

superflua corrumpit magis ad fumosum, si coniuncta sit caliditati superflue. Tertio, ratione modi substantiæ tenuis, sicut lac, oua, cerasa, & similia, quæ facile putrescant. Sicut contra quæ sunt crassæ substantiæ, tardè digeruntur & diminute corrumpuntur ad acetosum, sicut caro bubali, pira spissæ substantiæ, & similia. Quarto, quia sunt contraria appetitui, sicut oleaginea, foetida, pinguedines, rancida, crocus, & similia, quæ magis corrumpuntur ad fumosum & putridum. Quinto, quando currunt proprietates contrariæ, aut à tota specie, sicut inter carnes crudas & hominem, aut insequentem materiam, sicut aliqui abhorrent uinum, aliqui caseum. Et amicus meus soluebatur comestione cancrorum. Ista ergo proprietates siue actiue siue passiuæ, sunt causa nocimenti digestionis, scilicet, corruptionis, aut diminutionis, & male possunt remoueri, licet aliquando contigerit non habentem uinum postea bibisse. Et imprudenter operantur, qui student has proprietates específicas, aut insequentem materiam permutare, & magis falluntur & ineptius operantur, qui exhibent uinum, aut aliud in proprietatem alicui contrariam quantumcunque cognouerint illud in qualitates manifestas fore conueniens, proprietates enim in omnibus siue específicas, siue insequentem materiam, est super omnes dispositiones manifestas obseruanda, & uniuersaliter hic modus ampliatur ad quicumque cibum & potum alicui horribilem ratione odoris, saporis, cruditatis, & similia. Sexto quando cibus sumitur non in hora sua, sicut cum stomachus est repletus humoribus superfluis, aut cum sumitur cibo præcedente nondum perfecte digesto, uel si sumitur ante consuetum exercitium, uel expulsionem superfluitatis, etiam si non sint in stomacho dummodo sint alterantes stomachum. Septimo propter errorem in ordine assumendi: sicut enim cibus difficilis digestionis crassus & stipticus præmittitur faciliori ad digerendum, subtile, & lubrico, quapropter errant qui præmittunt carnes ouis, nisi sint duræ, & lac coagulatum, & cerasa, & uuas, & ferculum comedunt in fine mensæ, & elixum ceteris paribus post assatum. Octauo, quando cibi diuersi comeduntur, ut liquida assata, fruxa, elixa, artocleæ. Item multum diuersa ex parte saporum, nec non ex parte modi substantiæ, mala super omnia est commixtio salorum cum dulcibus, & assatorum uel frixorum cum rebus facilis corruptionis, sicut miscere pisces salitos, caseum salitum, pisces frixos cum ouis aut lacte. Et hi pro parte corrumpuntur, pro parte diminute digeruntur. Nono, propter malitiā artificis, sicut cibus male coctus, aut pisces qui post coctionem steterint suffocati. Decimo, quando faciens eructionem, quia uentrosabilis, aliis præponitur cibus. Tunc enim uentrositas alios commouet cibos, & permiscet nec finit stomachum bene alios amplexari, propterea raphanus, & similia sunt comedenda in fine non in principio. Undecimo, quando esset male substantiæ non corrigibilis à uirtute, sicut fungi & cibi qui putruerunt. Contra illos qui comedunt perdoes & quales foetentes, & isti corrumpuntur ad foetidum, & qualitatem malam non consuetam. Duodecimo, quando est multus potus in comparatione ad cibum, aut e contra. Sed ex parte somni post cibum, sicut digestio iuuatur calore intus reuocato, ita minuitur aut corrumpitur cum homo uigilat tempore somni, calore exterius moto ad instrumenta motus & sensus uoluntarii. Repletio quoque superflua & non exiens in stomacho, sed in membris ipsi communicantibus impedit stomachi digestionem, calorem innatum suffocando, sicut nimia inanitio ipsum paucificando. Motus quoque laboriosus post cibum minuit aut corrumpit digestionem, tum cibum agitando, ut non bene amplectatur à stomacho, tum calorem trahendo ad instrumenta motus. Leuis tamen deambulatio iuuat faciendo cibum ad fundum descendere stomachi. Et e contra quies post cibum iuuat ad digestionem, prolongata etiam completa digestionem, minuit digestionem calorem hebetando. Coitus autem post cibum impedit digestionem, & multiplicat, maxime nocet. Accidentia quoque animi immoderata, immoderate mouentia spiritus interius aut exterius, aut simul exterius & interius, sicut passio dicta elleni digestionem impediunt. Spes uero & gaudium moderatum digestionem iuuant.

Causæ uero corporeæ sunt duplices per essentiam aut per communitatem. Per essentiam quidem Aut in compositione, sicut

sicut si stomachus peccaret quantitate, existens nimis magnus aut parvus, aut figura existens figuræ rotundæ, cum debeat esse figuræ oblongæ, sicut cucurbita retorta, aut si esset nimis tenuis, aut raræ substantiæ, aut esset nimis asper, aut lenis in superficie, licet huius speciei compositionis æqualitas immediate deferuiat retentioni, mediate digestionem. Similiter lapsus in complexionem impedit digestionem. Sed inter omnes lapsus ad frigidum & sicum cum digestionem maxime inuenitur calido & humido, iuxta Aphor. Quicunque ventres habent humidus iuuenes existentes melius commutant siccis habentibus. Lapsus autem in passius cum temperie actiuarum parum impedit digestionem, nisi proportionetur ad materias. Humiditas quidem cum præsentia materiæ, & siccitas cum consumptione & aræfactione: sunt enim hæc qualitates passiuæ pauca impressionis, neque multum possunt intendi sine lapsu actiuarum. Materiæ ergo in stomacho superfluentes, cuiuscunque generis impediunt digestionem, siue in stomacho contentæ, siue aliunde deriuatæ. Et similiter uentositates aut cibum corrumpendo cum admiscetur aut minuendo, quia non sunt stomachi parietes sufficienter cibo adherere: bona. n. cōprehensio stomachi super cibum, est cā bonæ digestionis nisi sit grauatiua sed grauatiua facit retentionem cōprimendo & nō sit ita bona digestio, licet cibum citius descendat, & non sit cum ea eructatio & rugitus, sed calidæ ex his magis corrumpuntur, imo cum stomachus est calidus absque materia aut cum materia cholericæ effusa ex hepate ad ipsum propter multitudinem generationis eius in ipso per uiam fellis, corrumpuntur in ipso cibi leues, & digeruntur fortes & crassi, sicut est caro uaccina: frigida uero diminuit, corrumpunt, & interdum auferunt. Sed materia saniosa plurimum corrumpit ad foetidum. Similiter solutio continui, recens aut antiqua, apostemata, bothor, digestionem impediunt diminuendo aut corrumpendo. Et nota digestionem dupliciter posse à sua operatione impediri, tam propter defectum in instrumento, quod est complexio calida & humida moderate, quam in organo quod est fundus stomachi, & defectus in his lædit digestiua per se & immediate. Sed aliquando læditur mediate & per accidens propter defectum continue læso pyloron ab humiditate superflua, aut irritato caliditate excessiua pungente & stimulante, siue sint cum materia siue sine, quare non tantopere retentionem retinet, donec digestiua sua ui compleat operationem, & aliquando propter superfluitatem appetitiuæ, quæ debetur ori stomachi secundum plurimum à frigiditate superflua contingente, quare etiam superfluit attractiua, & consequenter fit comestio superflua in comparatione ad digestionem. Sed per communiter impeditur digestio aut à toto sicut in febribus, hydropse, crisi, & similibus, & per communiter à membris particularibus, sicut à cerebro, à spiritalibus membris, splene, hepate, intestinis, renibus, uesica, melenterio, zirbo, neruis, iuncturis, mirach, matrice, & similibus communitate absoluta aut non absoluta. Et inter communiter absolutam cōputatur priuatio transmissio eius quod deberet transmitti, sicut in fluxu sanguineo læditur stomachus, spiritu sufficienti ad ipsum non transmissio. Signa nocumenti digestionis in se & absolute sumuntur ex grauitate & mala toleratiā cibi, etiam si paucus sit aut mediocris. Item ex multiplicata uentositate per superius aut inferius, aut ex rugitu, tardo descensu cibi ex stomacho, nisi fuerit lubricus aut addit alia causa lubricans. Item ex pauca corporis refectione, palliditate faciei, multo sputo cum debilitas digestionis longo tempore prolongatur. Item ex uisu, relatu ægri, & altantium: uidemus enim post longā retentionem cibi in stomacho ipsum egredi per superius aut inferius, nihil aut parum à sua dispositione permutatum, quod est euidentis signum primæ digestionis ablatæ. Et si digestio est diminuta notabiliter, eructatio post octauam aut decimam horam redolet odorem cibi, & forte adest nausea, eructatio, & astuatio anhelitus, & si corrupta ad acetosum, foetidum, aut fumosum, aut ad qualitatem non consuetam, eructatio redolet illud ad quod corrupta est. Signa causarum primitiuarum sunt præfessio earum, & subsequutio huius nocumenti digestionis, uerisimiliter causæ præcedenti proportionalis. Et quod quotiescunque talis impedit causa, tale se-

quitur nocumentum, & quando non præcedit, non sequitur huiusmodi nocumentum. Signa autem malarum dispositionum stomachi, scilicet malæ complexionis, compositionis, solutionis cōtinuitatis, apostematum, patere possunt ex his, quæ dicta sunt in capitulo de uomitu, & similiter signa uento sitatis. Sed malam complexionem frigidam aut humidam, significant paucitas sitis & constans appetitus ad cibum, albedo linguæ, sapor oris insipidus aut acris, eructatio acris aut insipida, tardus descensus cibi, pallor faciei cum albedine. Et contra malam complexionem calidæ, & sic, significant sitis, paucitas appetitus ad cibum, sapor oris, & similiter eructatio amara foetens aut fumosa. Color linguæ tendens in citrinum aut fuscum, pallor faciei cum citrinitate, & similia, & uentositatem significant rugitus & extensio, & ipsius per superius aut inferius expulso. Signa reliquarum dispositionum in capitulo de uomitu perquirantur. Signa autem fortis compressionis stomachi supra cibum absque bonitate digestionis sunt, quod compressio est tremula absque euentu rugitus & eructatione. Item adest extensio & singultus cum impotentia perficiendi ipsum. Item adest conturbatio, grauitas, desiderium minuendi grauitatem cum constrictione, & aliquando cibis uelociter descendit absque complemento digestionis. Materiæ uero corruptæ ultra signa sui generis, de quibus supra, cognoscuntur ex foetore, sapore horribili, inconstueto, nausea, uomitu singultu, syncope, & similibus accidentibus malignis, & si huiusmodi materiæ congerantur in stomacho significant huiusmodi nocumenta continua, aut cum pauca interpolatione. quod si interpolatio fuerit plurimum dierum, materiæ ille erunt aliunde uenientes: quod autem sit membrum mittens, cognoscitur per nocumenta ipsius, quæ præcesserunt, & per materias in stomacho repperatas naturæ illius membri proportionales. Si uero communitas sit absoluta sola præfessio nocumentorum illius membri est signum, & proprie cum non uideatur nocumentum illud esse per essentiam, aut ab alia causa pendere. Signa autem tenuitatis stomachi, & raritatis texturæ sunt dolores & aliæ ægritudines in stomacho prolongatæ, & debilitas digestionis cum debilitate appetitus, & corporis extenuatio.

Prognostica. Primum. Nocumentum digestionis stomachi est mater fere omnium ægritudinum materialium, propterea dicitur quod plures interficit crapula quam gladius.

Secundum. Nocumentum digestionis primæ notabile est causa nocumenti digestionis secundæ, dico notabile, quia si fuit paruum corrigitur per bonam monoculi & hepatis dispositionem. Tertium. Digestio prima corrupta est causa ægritudinum quæ sequuntur corruptionem tertie aut quartæ digestionis, cū ipsa corrumpendo secundam digestionem sit causa corruptionis digestionis tertie & quartæ. Aegritudines autem quæ immediate sequuntur nocumentum digestionis primæ sunt sicut lienteria & hydropis tympantes, & quæ sequuntur nocumenta secunde, sicut sunt alcites, fluxus humoralis, apostemata, & similes, & quæ sequuntur, nocumentum tertie, & quartæ sunt sicut scabies, lepra, hypofarça, albaras, & morphæa. Quartum. Quod est origo ægritudinum chronicarum multiplicando materias crassas & multas cum debilitate uirtutis. Est enim causa epilepsie, melancholie mirachie, & corruptio digestionis multoties est causa prurituum. Quintum. Digestio corrupta in conualescentibus prognosticatur recidiam, arguit enim multiplicatas superfluitates quæ sunt causæ recidiam. Sextum. Debilitas digestionis primæ multiplicat phlegma uerū aut non uerū: quia chylus indigestus est similis phlegmati in substantia, colore, uisco sitate, frigiditate, quapropter facile cōuertitur in aliquā substantiam similem phlegmati, quod tamen non credo esse uerum phlegma. Est etiam causa phlegmatis ueri quia ex chilo diminute digesto plus conuertitur in phlegma, in secunda digestionem, quæ si esset bene digestus, propterea in omnibus ægritudinibus phlegmaticis, maxime debet esse intentio in confortatione digestionis. Secundo, debilitas digestionis perducit ad rigorem & frigus extremitatum, & uelut commotione principij paroxysmi febris, quia calor reuocatur ad intra ut fortius digeratur, & hoc licet sit bonū per uiam causæ, quia reuocatio interius fortificat digestionem: est tamē malum per

Io. Arculan

T

uiam

uiam signi, significat enim aut paucitatem caloris, & consequenter debilitatem virtutis digestiue, aut absolutam, aut saltem in comparatione ad cibum digerendum. Septimū. No cumentum digestionis sequens debilitatem virtutis aut malitiam complexionis confirmatam, difficillime recipit curationem. Et apud Auic. in libro mortis uelocis dicitur, quod si super oculos eius, qui habet nauseatiam, satietatem & tarditatem digestionis appareat bothor nigra similis ciceri & rubeat pars eius, & sit uiridis pars altera, tunc ipse incipit cum diminutione rationis, & moritur in septima decima: significatur enim per diuersitates colorum diuersæ materiæ malignæ, quarum partem paruum natura symptomatice expellit, reliquum remanens interimit.

Quam stomachi debilitas cum pauca siti, & tarda cibi de stomacho descensione, & acido ructu fuerit fuerintq; omnia accidentia hæc parua, nec fuerint vetusta, stomachus ex trochis. de ros. est curandus, de quibus æger quotidie in mane pondus aurei, 1. s. clem 3. 1. decoct. de seminibus, sumat. Decoctio autem de seminibus hæc est, sumantur cym. nabathi & ameos, bulliant in mina aque, donec aqua fiat rub. de qua postea cum trochiscis de ros. ut prædictum est, in potu tribuatur. trochif. uerò de ros. sunt qui Recipe pulueris ros. rub. 3. 3. xilaloos, spicæ, mastichis, xilocastra, schinanthi, cinnamomi, absinthij omnium ana drach. 1. & conspergantur ex uino ueteri, et informentur trochif. nutriatur uerò ex his, quæ cito digeruntur, & paucorum sunt humorum, ac paucarum superfluitatū: quæ etiam ex redolentibus, et seminibus sunt condita, sicut sunt galangæ, & mutagenat. Ipse quoque ante comestionem multo utatur exercitio, & aquam minus solito bibat, & post comestionem multum dormiat. de uino quoque ueteri, & pauco parum bibat. totamq; nutritionem minuat.

Diuiditur hoc cap. in partes tres. In prima curat debilitatem digestionis à frigid. In secunda parte curat debilitatem digestionis à calid. In tertia curat ipsam pendentem à caliditate cui coniuncta est corporis siccitas & arefactio, secunda ibi. Quod si digestiue debilitas, tertia ibi. Si autem cum hoc diximus. Prima in duas. In prima ponit signa debilitatis digestionis à frig. In secunda curam, secunda ibi. Fuerintq; hæc accidentia. In prima ponit tria signa debilitatis digestionis pendentis à frigid. Primum pauca sitim. Secundum tardam cibi descensionem ex stomacho, ipso cibo tarde digesto. Tertium est ructus acidus, quæ omnia arguunt diminutā aut corruptam digestionē à frigidityte. Secunda uero pars diuiditur in duas. In prima ponit curam debilitatis digestionis cū est remissa, & non est antiqua. In secunda, enim est intensa & ueterata, secunda ibi. Quod si hæc accidentia. In prima parte pro cura debilitatis digestionis remissa & non inueterata pendentis à frigidityte, ponit sex remedia. Primum est trochif. de ros. de quibus patiens debet sumere in mane stomacho ieiuno aureum. 1. s. Hos autem trochif. debet distemperare cum 3. 1. decoct. de seminib. uel sumat primo trochif. in forma pilularum, deinde bibat decoctionem, quæ decoct. debet esse pauca quantitatis, ut puta. 3. 1. ne faciat trochif. ex stomacho lubricare. Decoctio autem fit ex cymino nabathi, idest regionis illius, & ameos ana. 3. 1. quæ crasso modo confusa, bulliant in mina aque, quæ est pondus centum drach. donec aqua rub. fiat, ut puta ad consumptionem medietatis & coletur, est enim calid. & sic. stomachalis, uentositatum resolutiua, ingredientia autem trochif. omnia sunt calid. Et sunt præter rosas stomachalia & digestionem confortantia, xilaloos, idest ligni aloes, xilocastra, idest, cassia lignea, cætera nota sunt. Tertio nutriatur ex his quæ sunt faciles digestionis, boni chymi, boni odoris placentis, & paucarum superfluitatum. paucorum humorum, idest, quæ non sunt liquida, brodiola. Ex quo infertur qd hic curat debilitatē digestionis pendentis à frig. cum humi. Si enim frig. coniungeretur siccitas superflua humida actu & potentia conuenirent, & sint cōdita cum speciebus redolentibus, sicut galangæ, & mutagenat, qui sunt cibi apud Arabes cōditi cum aromatibus. Quarto ante sum-

ptionem cibi exercitetur notabiliter. Quinto bibat uinum antiquū odoriferum, cal. & siccum, sed in pauca quantitate, & parū aut nihil aque bibat, & comedat minus solito. Et sexto post comestionem multum dormiat ad perficiendū digestionē.

Quod, si hæc accidentia uetusta fuerint, electarium diacymini, et dialibani amborum ana aurei. 1. pondus, cū uinc. 1. ueteris uini puri in potu sumat. regimen autem eius sit, ut prædiximus. Electarium diacyminum. Recipe cymini carmeni, drach. 1. 0. 0. zingib. 3. 2. 0. pip. drac. 1. 0. sol. ruta, baurach, panis amborum ana drach. 1. 0. hæc omnia cum melle despumato conficiantur, & detur cum hoc elect. si uenter strictus fuerit. quod, si uenter solutus fuerit; electarium dialibanum est dandum, cuius descriptio in capite de uentris solutione continetur. si aut hæc non suffecerint, squama ferri cum uino tribuatur. scoræ autem ferri confectio hæc est. Recipe sem. apij, sem. feniculi, anisi, cymini. ameos, aniudem, orig. cheisim, carui, seminum coriand. melanopiperis, macropiperis, cinnamo. thuris, spicæ, gariophyl. nucis mus. cyperi, zingib. omnium ana, pondus aurei. 1. scoræ aurei. 1. 0. omnibus sexcuplum uini addatur: & coquantur, donec ad medietatem redeant, & coletur. deinde æger de hoc syrupo, postquam colabitur; pondus drach. 3. 0. quotidie sumat, & nutritionem alleuet. quod per tres hebdomadas faciens caueat sibi ab acetosis, & à fructibus recentibus, & aqua frigida: uinum uerò mensuratē bibat. emplastrum, quod stomachum confortat, & calefacit. Recipe styracem, spicam, absinthium, schinanthum, calamum aromaticum, mastichen, ex his cum uino ueteri, & succo cytoniorum confertis emplastrum super stomachum ponatur. ad hoc præterea confert, ut stomachus frictio inungatur ex oleo, quod fit ex spica nardi, et cypero, aut lana carminata in prædicto oleo calefacto inuoluta super stomachum ponatur, & cum panno ligetur. æger quoque uinum uetus bibat, aut minum, aut hydromel. minua autem hoc modo fit succus cytoniorum mizorum sumatur, & per diem, & noctem, ut residere possit dimittatur, & coletur: deinde eius, quod clarū est, partes due sumatur, sacch. pars una, uini ueteris. 1. et incipiat eo qui suauiter, & dispumari, donec in inulep similitudinē transeat. postea pro unaquaque lib. ex toto sumantur zingib. spic. cinnamomi, gariophyl. omnium ana, drach. 1. mastichis drach. 2. omnia puluerizata in panno ligentur, et intus dum calidum est mittantur: & cum infrigidari ceperit; pannus extrahatur, & exprimatur: deinde syrupus recondatur.

Nunc curat nocumentū digestiue intentum & inueteratū pēdens à frigidityte. Et ordinat quinque remedia. Primum est hoc. Recipe diacymini, dialibani ana, aurei unius, sumatur stomacho ieiuno pluribus diebus cum uinc. 1. uini ueteris, siue distemperetur adinuicem siue bibatur post ipsum uinum. Subdit postea quod si uenter est stipticus utatur diacymino. Est enim aliquantulum solutiuum non quidem à proprietate, sed merito quorundam pungentium, & stimulantium, sicut piper, & baurach. Quo etiam modo uinum granatorum ponitur ab Auic. prima quarti, cap. de curatione generali febrium inter solutiuum, licet forte etiam soluat comprimendo, si uenter sit solutus utatur dialibano, cuius descriptio est in cap. de fluxu uentris, notabiliter enim stringit propter balauftias: si autem uenter medio modo se habet, possunt adinuicem componi, sicut hic docet Rafis. Descriptio autem ista diacymini est satis nota, est enim notabiliter calid. & sicc. stomachi confortatiuum, & uentositatis resolutiuum. Baurach arabicæ, aphronitron Græcæ, est spuma niri Latine. hic tamen per baurach panis credo Rafim intelligere saltem panis, pro quo uide Mesue cap. de speciebus salis ipsum salē panis inter quatuor species famosas salis numerat. Secundū remedium est decoctio scoræ ferri, quæ multū confortat stomachum, & hepar, & exiccat inter oia humiditates superfluas,

superflua, est enim sicca in tertio, & super alias scorias, remouet mollificationem cocta cum uino, & secum permiscet plurima calida & sicca propria in stomachi confortatione. Aniden, id est, radix herbae, de qua fit asla keyfin, id est, leuisticum, melano piper, id est, nigrum piper, macropiper, id est, longum piper, cetera nota sunt. Continuat uisum huius per tres hebdomadas, quia haec malicia complexionis cum est inueterata, & fixa non facile remouetur. Tertium est, ut caueat ab acetosis, & acribus, à fructibus recentibus ab aqua frigida, & similibus frigidis, & humidis, & bibat uinum uetus mensurate. Quartum est emplastrum confortans stomachum, & calefaciens, cuius descriptio est satis nota. Sed ut hoc emplastrum sit tenax, oportet multiplicare mastichen super alios pulueres. Laudatur etiam approximatio olei facti ex spica nardi, & ciperio, in quo debite calefacto, lana, aut phyltrum infusum & optime expressum stomacho applicetur & ligetur. Quintum est, ut in potu sumat uinum uetus, aut miuam, aut hydromel, si non biberit uinum. Describit autem miuam cyton, quae est nunc in communi usu, quā aromatizat ad hoc, ut magis calefaciat, & confortet stomachum. Et omnia nota sunt.

Quod, si digestiua debilitas fuerit cum multa siti, & paucorum ciborum appetitu, & fetido ructu, syrupus acetosus de citonijs bibatur. Recipe suc. citoniorum acetosorum partem unam, saccha. albi partem unam, aceti clarissimi quartam partem unius. cognatur omnia simul, donec inspissentur. est autem syrupus iste stomachi confortatiuus, & ad has suas peragendas operationes inuatiuus, et uehementiam incensionis, & inflammationis, quae est in stomacho, sedat. aegri uero nutritio sit res, in qua simul congregantur acetositas, & stipticitas; ut caro cum succo uuae acerbae cocta, & cum malis macianis similiter cocta, & cum ribes, & facta ex aluquem, & almosi, et illis similia ex cibis. de isto praeterea detur puluere pluries, ut transglutiat. qui recipit rosam. rub. drachmas decem, spodijs drachmas tres, semen coriandri, drachmas. 5. Dosis eius sit drachmae duae cum suc. granati muzi, & cum syrupo de citonijs acetosis.

In hac parte curat nocumentum digestiuae siue sit diminuta per intensionem, siue sit corrupta à calid. superflua, cuius signa sunt multa sitis, paucorum ciborum appetitus, ructus fetidus & reliqua signa superioris dicta. Pro qua corrigenda conceditur syrupum acetosum de cytoniis, cuius descriptio nota est. Et ipsum sicut est ueritas summis laudibus extollit. Et praeter laudes quas ipsi attribuit prohibet transitu cholerae ad stomachum, quae multoties corrumpit digestionem. Dieta autem sit frigida. & utatur acetosis, & stipticis quae nominat in textu, & satis nota sunt. Aluquem, & almosi sunt condimenta rerum, sicut gelatina, limonea, myrrea, & similia acetosa, & stiptica. Ordinatur praeterea pulueris frigidum, & siccum, & stipticum, cuius descriptio, & inuatiua satis nota sunt.

S C H O L I A.

Fetido ructu declaratur cibus corruptus, & adustus. Saccha albi] ne ab aceto stomachus legetur.

Si autem cum hoc, quod diximus, fuerit in corpore extenuatio, & inflammatio; aegro lac, & aqua hordei danda sunt. ipse quoque ex herbis humectantibus nutriendus est; & sunt lactuca, malua, cucurbita, citrulli, carnes bendorum, & agnorum lactantium, & pisces recentes. balneum praeterea antequam comedat, & postquam comederit, & tinam quotidie ingrediatur. & uinum clarum ualde temperatum bibat, & assidue utatur quiete. & motum, & exercitium uitet. sitq; totum eius regimen ut eius, qui corporis crassitiam adipisci desiderat. & si cum hac dispositione inflammatio fuerit, & incensio uehementissima; stomachus, & ex rebus frigidis est liniendus: & aqua hordei danda. sitque eius regimen, ut becticam habentis.

S C H O L I A.

Lac. malua, &c.] pauca quantitas exhibetur: nirtus enim stomachi ferè excitata digestiua debilior redderetur. Postquam comederit] hoc est, facta digestionem in uentri culo, & hepate. Vinum clarum] non crassum; quia cum siccitate coniungitur meatu obstruendo. Ex rebus frigidis est liniendus] ut oleo omphacino, & cydoniorum quemadmodum multo Rasis. v. continentis.

Curat debilitatem digestiuae à calid. cum corporis extenuatione per frigid. & humid. exterius, & interius applicita. Et intedit infrigidare, & humectare, tam qualitatiue, quam substantificè. Et quae dicit nota sunt. Lac est optimum si non adfit febris putrida, sed aegro putride febrientie uitandum est lac. Balneum aquae dulcis conceditur, sicut conceditur in hectica, & ad eandem intentiones. Et licet Rasis concedat ipsum ante cibum, & post cibum, credo tamen ipsum magis conuenire cibo praedigesto quo ad primam, & secundam digestionem, scilicet quando nutrimentum debet ad membra delegari. Imò credo balneum cibo non digesto saltè quo ad primam digestionem magis obesse, quam prodesse. Cetera nota sunt. Differentia autem inter balneum & tinam est, quia tina est uas in quo balneatur. Balneum autem est locus constructus ex tribus casis in quo balneantur. Tina ergo potest esse in balneo, & extra balneum. Cura nocumenti digestionis primae, si pendeat à causa primitiua, sex exigit intentiones. Prima, remouet causam primitiuam, & nocumentum ab ea impressum. Secunda, educit cibum corruptum si affuerit, & cetera quae sunt in stomacho adiuuantia ad corruptionem. Tertia, corrigit malam dispositionem stomachi, ipsum confortando, & etiam hepar quod est sedes, & principium uirtutis naturalis. Quarta, prohibet fluxum humorum ad stomachum. Quinta, corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Si ergo pendeat à uulnere, uel contusione in stomacho, aut in membro ipsi communicante, curentur secundum quod oportet, iuxta primam intentionem. Et si sumperit uenenosa, uomitu educantur, aut secessu cum medicinis lenientibus, & dentur bezzarica contra illa uenenosa, & stomachus, & membra nobilia confortentur, & similiter si applicita fuerint, remoueantur, & nocumentum per ipsa impressum, & similiter curetur morsus uenenosorum, & nocumenta per ipsum impressa, sicut saepe dictum fuit. Si uero pendeat ab aere, cibo, & potu, & reliquis rebus non naturalibus inconuenienter applicitis, remoueantur causae illae, & nocumentum per ipsas impressum, & inducatur regimen contrarium. Et quia regimen malum in cibo, & potu secundum modos. 1. 2. suprascriptos est frequentius in causa, ipsius correctioni attendatur maxime. Et si cibus in stomacho fuerit corruptus, iuxta secundam intentionem educatur quam citius fieri potest. Et similiter humores sibi commixti cum uomitu, aut secessu. Vomitus tamè est promptior ad educendum in stomacho contenta. Non est tamen uomitus frequentandus, ne stomachus fiat lacuna superfluitatum. Et si non potest fieri, aut non sufficiant, dentur solutua lenia, sicut calsia pilulae alephanginae, stomachicae. Et diatriopipereon est proprium in corruptione ad acetosum. Et quaedam propria inferius describuntur. Postea iuxta tertiam intentionem corrigatur stomachi discrasia. Et digestiua eius confortetur cum contrariis propriis confortantibus stomachum, tam proprietate, quam stipticitate temperatis, & multa ualde propria, & solennia describuntur à Rasi in littera superius exposita, tam interius, quam exterius applicanda. Et multa excellentia addam inferius. Prohibetur autem fluxus humorum ad stomachum, iuxta quartam intentionem ipsum confortando, ut statim dictum est, & etiam diuertendo cum euacuatione, aut sine, secundum exigentiam. Corriganter autem accidentia iuxta quintam intentionem. Et ordinatur regimen sex rerum in contrarium discrasiae secundum quod dicitur in sequentibus. Si uero nocumentum digestionis fuerit per essentiam, quinque exiguntur intentiones. Prima, educit cibum corruptum, & humores sibi admixtos. Secunda, corrigit discrasiam stomachi, & ceteras causas digestiuam debilitantes, ipsum confortando. Tertia, prohibet humores ne fluant ad stomachum. Quarta, corrigit accidentia. Quinta, ordinat debitum regimen. Prima intentio perficitur, ut supra dictum fuit. Secunda uero perficitur secundum exigentiam causae corrigendae, si. n. quantitas stomachi aucta, aut diminuta, aut malicia figurae fuerint in causa, permu-

Io. Arculani

T 2 cari

tari non possunt, sed cibus est moderandus, ut sit facilis digestio, mediocris quantitatis, in stomacho tamen paruo debet esse paucæ quantitatis, & debet pluries sumi in die, ut sufficiat ad nutritionem. Raritas autem, & tenuitas substantiæ aliquid emendari potest cum propriis moderate stipticis, & aliquid uiscosis stomachum incoarctantibus, de quibus sermo præcessit in cura uomitus, & cibi sint faciles digestionis, & moderate quantitatis. Asperitas autem superflua corrigatur cum lenientibus sumptis in principio mensæ, sicut sunt iura pingua, & fercula aliquid brodia, pruna matura, uua, ficus, & similia sumpta in principio, & e contra lenitas corrigatur utendo stipticis, tam interius, quam exterius applicitis. Dificrasia uero corrigatur cum contrariis propriis moderate stipticis interius, aut exterius applicitis, de quibus egit Rasis in litera, & multa præstantia inferius describentur. Sed tertia intentio perficienda est, ut statim dictum est. Quarta autem, & quinta intentio perficitur, ut dicetur inferius. Si uero nocumtum primæ digestionis fuerit per communiatem à membro aliquo, uel à toto sex exigat intentiones. Prima, rectificat corpus, aut membrum mittens euacuando, & diuertendo, tam ab eo, quam à stomacho, & secundo difcrasiam membri mittentis corrigendo, & cum hoc ipsum confortando, ut fiat minera laudabilis chimi. Secunda, educit cibum corruptum, & superfluum, quæ sunt in stomacho. Tertia, corrigit eius difcrasiam ipsum confortando. Quarta, prohibet humores à fluxu. Quinta, corrigit accidentia. Sexta, ordinat regimen conueniens. Prima intentio completur euacuando à toto, aut à membro particulari mittente cum phlebotomia, aut solutiuis secundum quod uidebitur expediens. Sint tamen solutiua talia, quod non debilitent multum stomachum, sicut est proprium solutiuiorum exoluentium, & similiter diuertantur materiæ, tam à membro mittente, quam à stomacho recipiente cum euacuatione, & sine euacuatione secundum quod uidebitur expedire. Et difcrasia membri mittentis corrigatur, & simul etiā confortetur cum contrariis sibi propriis moderate stipticis non oppilantibus. Secunda intentio, scilicet educio cibi corrupti completur, uomitu cum aliquo ex uomitiuis calidis aut frigidis forti, aut debili, quæ descripta fuerunt superius in capitulo de uomitu, & si sufficiat sola impositio digiti, aut pennæ in ore iterata multoties non procedatur ad fortiora. Et si hæc intentio uomitus compleri non possit, dentur solutiua, aut lenientia, sicut casia, aut manna, aut electiue soluentia, sicut pilulæ alephanginæ, aut stomachicæ, rhenbarbarum, aloes lotus, cui myrobolanorum, aut masticis potest addi. Sint enim talia, ut euacuando confortent, ne uirtus sua transeat stomachum, & melaicas. Hippocr. dixit quod aloes hepaticus cum aqua absinthii, uel artemisæ propinata stomacho ieiuno, sanat stomachum ab omni languore educendo ab eo materias fraudulentas. Confortat cerebrum, & uiscera mundificat, uermes occidit & educit, sanat apostem, stomachi, & uiscerum & mundificat hepar. Pilulæ confortantes stomachum in omni eius languore, & læsione intrinseca, nec permittunt humorem putrescere in eo, sed abstergunt. Et qui utitur eis diebus singulis sanus permanebit à dolore stomachi, & capitis. Et sunt salubres oculis, & eis qui tristantur. Et est medicina matricis uitiosæ, & aliorum uiscerum. Recipe masticis drach. 4. aloes electi, unc. decē, agarici boni, unc. tres. Et est melius, ut preparetur cum oxy melle, sed confice cum succo alimiliæ. Dosis à ʒ. uno usque ad drachmam unam per horam ante coenam, uel cum uadit dormitum. Corrigitur autem difcrasia stomachi, & simul confortatur cum contrariis propriis moderate stipticis, quæ dicta sunt in textu. Et ex simplicibus propriis in hac intentione calidis sunt gariophili, mentha, cinnamomum, mastic, passulæ, algalæ, xyloaloes, zingib. macis, galanga, pelliculæ intrinsecæ stomachorum gallinarum, & inter cætera uinum aromaticum, & per maxime iuuat digestionem. Ex compositis calidis sunt aromaticum rosatum, diagalaga, diacinnamomum, diatriopipereon, & confectiones magnæ, sicut theriaca, & mithridatum.

Electarium nobile apud Franciscum de Pedomontium confortans stomachum, & digestionem à causa frigida. Recipe galangæ, nucis muscatæ, cardamomi, ana drac. duas,

anchos, id est floris roris marini drachmas quatuor, menthæ, halasæ, ana drach. tres, syrupus de mētha, uel de corticibus citri quantum sufficit, & in corruptione ad acetosum confert mastic, & cum est fortis conferunt magnificæ, & ultimæ summitates schinathi cum carui. Ex frigidis autem sunt rosæ, coriandrum præparatum, coralli, sandali, labrusca, citoni. & est singulare. Ex compositis diarhodon abbatis, miua acetola, & similia, & multæ sunt species trochiscorum in hac dispositione proprie. Et exterius applicita ad hoc conferunt, sicut emplastra, & unctiones, ceratas, sacculi, fomēta, quorum descriptio superius posita est in capite de uomitu. Verū in hoc est differentia, quia restringentia uomitus debent esse magis stiptica, imò notabiliter stiptica, hæc uero moderate. Duo autem sunt quæ confortant omnia membra, unum à complexionem, & est oleum rosaceum, quod penes Galenum calefacta infrigidat, & frigida calefacit, alterum à proprietate, & est terra sigillata. Et ex confortantibus corpus, & omnia membra est exercitium moderatum. Sed quarta intentio, scilicet prohibitio fluxus humorum cum eisdem completur, sed aliquantulum magis stipticis, necnon cum diuersionibus, cum euacuatione, & sine si fuerit expediens. Corrigantur autem iuxta quintam intentionem nocumēta totius, & cuiuscunque membri sequentia nocumēta digestionis primæ, quæ possunt esse plura, cum sit digestio ferè omnium ægritudinum materialium. Quæ qualiter debeant corrigi, perquiratur in propriis capitulis dictis, & dicendis. Præcipue corrigatur nocumētum hepatis, si adsit. Et etiam si non adsit, præcipue intendatur ipsius confortationi. Est enim sedes, & principium uirtutis naturalis maxime iuuans stomachum ad suas operationes perficiendas, & eructatio acida illi co corrigitur cum sumptione zingib. conditi, aut non conditi. Aer autem iuxta sextam intentionem ordinetur in contrarium difcrasie, sed fit boni odoris ægro placentis. Et fit notabiliter indutus secundum exigentiam temporis. Verum in difcrasia frigida, & humida, pannos magis calidos induat, præcipue teneat partes stomachi, & intestinorum notabiliter calidas, sicut cum pelle uulturis, aut sacculo ex pennis cigni, anseris, uel anatis. Et minus calida est pellis agni. Et adhuc minus est pannus de grana. Neque gerat indumentum circa stomachum multum stricte nec multum lata. Similiter dicta ordinetur in contrarium duodecim illorum modorum, qui sunt causa nocumēti digestionis, de quibus supra, & declinet in contrarium lapsus secundum unam aut plures qualitates, intense, aut remisse secundum exigentiam lapsus corrigendi. Cibi tamen calidi & humidi, subtilis substantiæ sunt communiter magis cæteris digestioni proportionati. Quod si nocumēti digestionis fuerit propter diminutionem calidi absque lapsu graduali, sicut quando stomachus est tenuis, raræ texturæ, aut scirrhus est euulsus, aut similes causæ, sint cibi, & potus faciles digestionis temperati, aut aliquid ad calidum declinantes, quorum quantitas minoretur, & sint aliquid stiptici. Et si contra fuerit multitudo calid. absque lapsu graduali sint aliquantulum difficilius digestionis, & notabilis quantitatis temperati, aut aliquantulum ad frigidum declinantes. Et Auicenna in stomacho calido, prohibet cibos subiles, & concedit crassos, scilicet carniū uaccinarum conditarum cum aceto. Potus autem calidi, & sicci sint sicut uinum uinum uinum, uetus, odoriferum, uinum autem uinum nouum est calidum & humidum, & proprie si dulcescit, sed uinum pauciferum acre est frigidum & siccum. Vinum autem pauciferum inspidum est frigidum & humidum. Aqua mellis cum pauco pipere est calida & sicca notabiliter, sed simplex minoris est caliditatis & siccitatis. Aqua hordei, & aqua destillationis per arenam, aut aliter bene conditionata est frigida & humida. Similiter mixta cum rulep uiola. Sed uinum granatorum, agrestis, fuc. berberis, limonum, citri, arantii, sunt frigidi & sicci, quibus possunt uti in potu cum debita quantitate aquæ, & possunt cum saccharo dulcorari, frigid. & humid. sunt sicut succus prunorum, & cerasorum aerium. Herbe autem quibus possunt uti declinantes ad caliditatem & siccitatem, sunt sicut mentha, & salvia, ferpillus rosmarinus, feniculus, petroselinum, & similia. Sed frigida & humida sunt sicut lactuca, endiuia, cichorea, portula-

ca, cucurbita, & similes. Sed calida & humida sunt sicut borago, & buglossa. Frigida & sicca, sicut acetosa, plantago, coriandrum. Ex granis frigidis & siccis sunt, sicut milium, panicum, kist fabarum, & lentium. Ex calidis & siccis, cicera, & ipsorum kist, rizum. Sed calida & humida, frumentum, far. Frigida & humida, kist hordei, ptisana hordeacea, robilia. Ex carnibus eligantur carnes animum, & quadrupedum bene conditionatæ, scilicet quæ sint boni chimi, facili digestio- nis, paucarum superfluitatum. Sylvestres communiter sunt sicciores domesticis, licet quales sint superflue humiditatis, & concedantur elixæ in dyscrasia sicca, & assatæ in dyscrasia humida. Ex piscibus similiter eligantur parui, petrosi, agiles, degentes in aquis bene conditionatis, & habentes squam- mas. Ona conueniunt, nisi timeatur eorum corruptio ad foe- tidum, & sint debite præparata, & in stomacho ualde calido melius est, ut sint dura, & cum aliquo frigido condita. Lac- optime conuenit in lapsu ad calidum & sicum, nisi adsit fe- bris, & similiter caseus recens non salitus. Sed in dyscrasia fri- gida & humida caseus antiquus conuenit modicæ quantitat- is in fine mensæ, & aliquando parum salis in principio butyrum, & oleum, sed maxime amygdalarum dulcium conuenit in di- scrasia sicca. Sapores sicut piperata, sinapis, & similes con- ueniunt in dyscrasia frigida & humida. Et sapor ex amyga- lis, & passulis in frig. & sic. Et sapores acetosi suprascripti, quidam in calida & humida, quidam in calida & sicca, sicut fa- cti ex prunis, & marinata. Fructus conuenientes in causa ca- lida in fine mensæ sunt pira, & cironia cocta, aut condita. Si- militer diacitonien, & coriandrum semiconfectum. Sed in causa frigida fistici, & allana parum torrefactæ, & passulæ, & possunt concedi in fine mensæ, & in principio diacitonien cum aromatibus calidis in fine mensæ. Aromata autem sunt illa, de quibus superius dictum est, & maxime piper in causa frigida. Regule obseruandæ in cibatione sunt eductio cibo corrupto per superius, uel inferius per diem naturalem à ci- bo abstineat, & prolixè dormiat. Deinde comedat, sed parum, & res non aptas corruptioni. Et in præseruando & curando optime ualet, ut non comedat nisi præcedente cibi digestio- ne celebrata. Surgat à mensa cum reliquiis famis. Non mul- tiplicentur cibaria in mensa una. Notabiliter comedat ante- quam bibat. Deinde satis frequenter bibat usque ad finem mensæ, sit tamen potus proportionatus cibo. Et in fine men- sæ fumet aliquid confortatiuum oris stomachi, sicut diacito- nien, aut simile, & post ipsum non bibat, nec bibat extra ho- ras cibationum. Sit eius somnus multus, & maxime noctur- nus, & sit continuus, & sufficiens. Somnus etiam meridianus ipsi conceditur maxime à medio Maii usque ad medium Au- gusti, nisi aliquid particulare obstat, sed dormire non inci- piat, nisi distanter à cibo per horam, & dormiat primo su- per latere dextro, ut melius cibum ad fundum descendat, se- cundo super sinistro, ut hepar comprimat ipsum amplecten- do cum quinque pennulis suis, sic enim melius adiuuat ad di- gestionem, & tandem super dextro somnum compleat, ut fa- cilius chilis melius transeat ad hepar. Procuret omnes eua- cuationes à natura institutas. Coitum non exerceat, nisi nat- uraliter multum stimulat, sed nullo modo immediate post cibum, & tempore digestionis, Caueat a sudore. Exercitiu an- te cibum conuenit, post cibum quiescat. Leuis tamen de- ambulatio concedi potest, nisi stomachus sit ualde debilis, in quo casu omnis motus nocet, imò uociferatio. Spes, & gau- dium moderatum sibi conuenit, cetera animi accidentia ui- tanda sunt, aliqui tamen dicunt digesti- onem quartam melius compleri in uigiliis, quam in somno propter conuersionem caloris ad exteriora tempore uigiliarum. Et penes Auic. am- plexari infantem propinquum ad hoc, ut polluat fecundum lon- gitudinem noctis est de rebus magis iuuantibus ad digestio- nem. Et similiter catulum canis, aut cattum masculum nig- rum. Cuius contrarium habetur in de Somno, & à Galeno de Accidenti. Nam & si minor calor sit in exterioribus tem- pore somni, quàm tempore uigiliarum, est tamen tatus, ut una cum eorum complexione sufficiat ad digestionem quartam, quæ est faciliior, quàm prima, aut secunda. Præterea mēbra intrinseca indigēt, ut digestio quarta in eis celebretur, quo- rum cura debet esse maior absolute. Itaque ad quatuor dige- stiones magis adiuuat somnus, quàm uigilia, &c.

Dolor stomachi qui est sensus nocuus eiusdem multi- pliciter distinguitur. Aut ratione saxe essentiae, quia aliquis est grauatiuus, aliquis extensiuus, aliquis per- foratiuus, aliquis pungitiuus, aut mordicatiuus. Aut ratio- ne loci, quia aliquis est in toto, aliquis est in parte, ut in ori- ficio eius uel in fundo. Et quilibet est intensus, & remissus, continuus, & interpolatus, periodicus, aut sine periodicis. Causa cuiuscunque doloris immediata est mala complexio diuersa, aut solutio continui recens, aut antiqua, sed mala complexio est calida, frigida, sicca, aut composita sine ma- teria, aut cum materia calida, mordicatiua, adustina, aut fri- gida phlegmatica, aut melancholica. Et hæ materia faciunt dolorem, aut alterando, aut soluendo continuum, aut exten- suum, cum continetur in loco amplo, aut perforatiuum cum con- tineat in loco angusto, sicut inter tunicas stomachi. Aposte- ma autem est utroque modo doloris, cum aggreget in se malam complexionem, & solutionem continui, & dolor sequens ipsum est pungitiuus, & mordicatiuus, si pendeat à materia acuta. Extensiuus, & grauatiuus si pendeat à materia mul- ta, & aliquando pulsatiuus dum maturatur, & pungitiuus, & perforatiuus dum est proximus eruptioni. Causæ autem mediatæ doloris sunt duplices, primitiue, aut corporeæ, primitiue quidem sicut percussio, casus, aut offensio stoma- chi, aut membri stomacho communicantis, sicut cerebrum, nerui, aut intestina, & similia. Aer uero frigidus, uentus, inordinatio in cibo, & potu secundum aliquem modorum duodecim in capitulo præcedenti positorum, & sic de aliis sex rebus non naturalibus inconuenienter applicitis, præci- pue potus aquæ in hora non conuenienti, est aliquando cau- sa uehementis doloris. Corporeæ autem sunt duplices, per communitatem, aut per essentiam. Per communitatem quidem à toto, sicut in febrilibus, aut crisi, aut à membro par- ticulari, sicut cerebro communicante ipsi, aut absolute, aut mittendo materiam catarrhalem, similiter à neruis secun- dum plurimum communitate absoluta. Item à splene, aut superflue infrigidando, aut transmittendo materiam melan- cholicam, & ab hepate, & kisti mittentibus materiam cholericam. Item ab intestinis eleuatis uermibus, uentostate, aut foecibus ad stomachum. Et per communitatem à renibus, sicut in dolore calculi, & est secundum plurimum communitas absoluta. Item per communitatem à matrice, à retentione menstruum. Item per retentionem sangui- nis hæmorrhoidalis fluere consueti, & breuiter stomachus potest recipere superfluitates à quocunque membro me- diante hepate. Per essentiam uero causæ doloris stoma- chi, sunt causæ immediatæ doloris, de quibus supra, scilicet mala complexio, solutio continui & aposte. Sed causa remotior frequenter accidens est, nocumentum digestionis per quod corrumpitur cibum ad fumum, foetidum, aut ace- tosum, & multiplicatur uentositas, & phlegm. per indige- stionem, quæ omnia dyscrasiano stomachum, aut extenden- do, sunt causa doloris. Mala quoque digestio cum debilita- te expulsionis est causa quod apostema in stomacho per uiam pau- latim factæ congestio generetur. Hic autem ponam cau- sas quorundam particularium dolorum frequenter contin- gentium. Sunt enim aliqui famelici, qui incurrunt dolo- rem stomachi, & cum comedunt sedatur. Huius causa est ef- fusio materierum mordicantium ad stomachum, quando uac- cuus est à cibo, quæ aliquando sunt melancholice, acetosæ effu- sæ ad os stomachi à splene per uiam naturalem consuetam, sed nocet, aut quia plures, aut acetosiores quàm in dispositione naturali consueuerunt. Sed frequentius sunt cholerice effu- sæ à kisti ad fundum stomachi per porum felleum ad ipsum terminatum in maiori quantitate, quàm debeat in dispositio- ne naturali. Inquit enim Auic. tolerare famem, stomachum putridis replet humoribus. Sedatur autem post comestione cibo comprimente hos humores ad fundum stomachi, & for- te extra per pylorum, & hoc contingit si non ualde multæ sunt & in stomacho illo sit facilis effusio contentorum in ipso ad intestina, aut merito compositionis, aut alterius dispositio- nis. Secundo sunt aliqui quibus post tres, aut quatuor horas postquam comederunt, & aliquando post .10. horas inco-

pit dolor, & non sedatur nisi cum uomitu rei acetosæ, quæ est quoddam aggregatum ex humore phleg. aut melancholico acris, & ex ipso cibo corrupto ad acetosum, aut cum descensione totali eius quod in stomacho continetur. Et aliquando hic dolor remanet per longum tempus, ut puta per diem naturalem, & supra. Causa autem primi est melanch. acris, aut phleg. acetosum, quæ existit in fundo stomachi manent quæta. Et secundi causa est cholera manens similiter quæta in fundo stomachi. Cum autem cibus sumitur ascendunt & cum ipso permiscuntur, & corrumpunt ipsum. Sedatur ergo primus cum uomitu rei acetosæ. Secundus pendens à cholera cum descensu ipsius simul cum cibo, est enim prior sua stimulatione ad hoc, ut effundatur extra stomachum quam melanchol. remanent autem sic longo tempore, aut quia non uomitur, aut quia non complete uomitur, neque complete descendit, nisi post longum tempus. Et aliquando humor imbibitur, aut apostemat, & sic dolor diu permanet. Tertio sunt aliqui quibus accidit dolor stomachi cum comedunt, & sedatur post digestionem, & apud Auiacen. Plurimi eorum sunt melanchol. & patientes melanchol. mirachiam. Cuius doloris causa est uentositatis eleuata à materia melancholica. Sedatur autem post digestionem chilo simul cum humore melanchol. descendente ad intestina. Quarto, sunt aliqui, qui post cibationem incurrunt ardorem stomachi cum eructationibus arsiuis tendentibus in acetosum secundum plurimum, & sedatur post digestionem. Huius causa est corruptio cibi ad acetosum secundum plurimum, & aliquando ad putridum, uel fumosum, & tunc eructatio redolet odorem fumi, aut rei fortentis. Et primus ardor tendens ad acetosum pendet à mala complexione frig. sine materia, aut cum materia phleg. acetosa, uel melanchol. non multa. Secundus uero ardor à calid. sine materia, aut cum materia calid. secundum plurimum cholericam corrumpente cibum ad putridum, aut fumosum, & hoc est rarius, & aliquando hoc contingit propter multitudinem comestionis, aut iterationem eius absque fame uera, & aliquando propter comestionem rerum acetosarum, aut acrim in stomacho frigidum, aut calidarum acutarum in stomacho calido, sicut aliorum, & similia. Huius ardoris, & dolorum, de quibus supra, causa immediata potest esse humor, aut cibus corruptus, necnon uapores, & uentositates ab ipso eleuari. Quinto, aliqui post somnum incurrunt dolorem stomachi, cuius causa est materia catarrhalis descendens ad stomachum in somno, & uomitu sedat materia catarrhalis ab eo expulsa, dolor stomachi aliquando permutatur ad cerebrum, aliquando ad uentos, aliquando ad cor, aliquando ad iuncturas, & intestina. Signa. dolor stomachi cognoscitur ex relatu ægri. Similiter signa specierum distinguuntur penes doloris essentiam, quibus nomina sunt imposita, ex ipsa natura rei, habentur ex relatu eiusdem, si compos mentis sit. Si uero non, oportet ad notitiam earum peruenire ex notitia propriarum causarum cuiuscunque doloris. Cognoscitur autem in qua parte stomachi sit dolor, similiter ex relatu ægri. Si n. est in ore stomachi, dolor est in parte superiori infra malum grauatum per duos digitos, magis læditur appetitus, & fortis adest singultus, & aliquando communicatur dorso circa. 13. spondilem eius, quæ est supra umbilicum per duos digitos, & magis læditur digestio, & si dolor est in ore & fundo, dolor in amobus locis sentitur, & simul læditur appetitus, & digestio. Sed nota quod si dolor esset in parte anteriori stomachi tactus inuenit dolorem. Si uero in posteriori minime, nisi cum fortissima compressione. Distinguitur autem dolor fundi stomachi à dolore colon superæquitante ipsum, quia in colica est fortis retentio fecum, & uentositatum, & cum educuntur subito sedatur. Hæc autem non sunt in dolore stomachi, sed e contrario uomitus sedat dolorem stomachi parum conferens in colica. Aliæ species doloris similiter cognoscuntur ex relatu ægri, & astantium. Solutio continui si recens sit uera, & manifesta cognoscitur ex sanguine fluente. Si uero antiqua ex sanie, uomitu, aut per secessum expulsa, aut reliquis signis læsionis stomachi. Sed mala complexio cum materia, & sine materia cuiuscunque generis, cognoscitur per signa superius dicta in cap. de uomitu, & in cap. de de-

bilitate digestionis, superfluum enim esset eadem toties reiterare. Ventositas autem cognoscitur ex rugitu, & eructatione, & quia ad eius expulsiorem per superius, aut inferius sequitur doloris alleviatio, & frequenter dolor permutatur. De apostem. uero specialiter agetur in hoc cap. Causæ primitiæ sunt cibi signa, & quia quodcumque similes causæ præcesserunt, similis sequutus est effectus, scilicet dolor stomachi. Dolor autem, aut per communitatem à toto, aut à membro particulari cognoscitur ex præcesione nocumentorum totius, aut membri communicantis, cum quorum augmento augetur, & decremento decrescit, & ablatione aufertur. Item ex affectibus sequentibus nocumenta membri communicantis, qui sunt causa doloris stomachi, sicut exempli gratia in communitate cerebri ad sunt signa descensus catarrhi ad stomachum, & in communitate splenis fluxus melanchol. ad stomachum, & sic de cæteris. Nocumentum autem digestionis quod frequenter est causa doloris stomachi, cognoscitur ex dictis in præcedenti cap. Cognoscitur autem dolorem, aut materiam eius permutare ad cerebrum, neruos, cor, iuncturas, aut intestina, ex sedatione doloris stomachi, & aduentione læsionis in membro, ad quod sit permutatio, scilicet scotomiza, paralysis, syncopis, doloris iuncturarum colicæ.

Prognostica. Primum, dolor stomachi nisi sit pendens ab ulcere, aut aposte. secundum plurimum curatur, exigit tamen medicum diligentem, & expertum. Secundum, multa sensibilitas stomachi cum defluxu materierum acutarum ad ipsum, est quandoque causa doloris intolerabilis perducens ad syncopim. Tertium, cum permutatur ad cor, quandoque subito interficit. Quartum, cum prolongatur dolor stomachi, timendum est ne ducat ad apostema eius. Quintum, licet dolor stomachi multiplicetur in prægantis, & in quibus mēstrua retinentur portendit tamen aliquando præfocacionem matricis, materis, uaporibus, aut uentositatibus eleuatis ad stomachum, & ad diaphragma. Sextum, apud Auiac. in libro mortis scilicet dicitur, quod quando apparet cum dolore stomachi super pede dextrum quoddam simile uesciæ moritur patientis. 27. & ex signo illius est quod appetit res dulces. Vescica enim illa, quam debemus credere esse phlegmaticam, similiter cum appetit rerum dulcium, scilicet uehementis dulcedinis arguit dolorem stomachi pendere à phlegmate acetoso, stomachus enim præternaturaliter dispositus appetit contraria. Sed crisis illa permutationis diminuta arguit uirtutem debilem & materiam inobediētem, ex quibus cum aliis malis signis, quæ hic debemus supponere, arguendum est ipsum esse moriturum. Statuit autem ipsi, 27. quæ est una ex ceticis morborum tropicorum, licet possit mori, & ante, & post secundum diuersas circumstantias. Septimum signum est si habet dolorem uentris, id est stomachi, & apparet super supercilium eius uestigium, & bothor nigrum simile fabæ, deinde fit ulcus, tunc ipse morietur, & his quidem accidunt subeth, & multitudo somni propter frigus sue ægritudinis. Significatur enim ex his materiam hanc facientem dolorem stomachi esse frigidam, & permutari ad cerebrum, quia sequitur subeth, fit autem bothor in cilio natura tentante expellere materiam ascendente ad loca ignobilia, sed cum non possit ipsam nisi diminute expellere maior pars eius ad cerebrum permutata interficit, ulceratur uero quia licet radicaliter frigida sit, adustione tamē participat, & forte magis facit subeth multitudine oppilado, quam propter frigus suæ complexionis.

SI cum dolore stomachi adsunt turbatio, & nauſea; Sægro aqua tepida in potu est tribuenda, & ut uomat præcipiendum. & si hoc non suffecerit; uenter ex hie rapicra soluat, quæ Rec. pulueris ros. rub. spice, mastichis, xilobalsami, carpobalsami, cinnam. xilocaſtie assari omnium, ana. drachmas quinque, aloes scotrēſis duplum omnium quod bene tritum, misceas cum medicinis tritis, et cum panno sericino subtilissimè cribellatis, quarum trituratio cum aloes secundo iteretur. cuius dosi sit à pondere duorum aureorum usque ad drachmas duas. ægro quoque quotidie detur panis in uino, & succo mali granati infusus: & in syrupo acetoso de citonijs.

Diuiditur

Diuiditur hoc capitulum in quatuor partes. In prima agit de dolore stomachi ab humore calido. In secunda quando est à uentositate, ibi. Quod si cum dolore. In tertia, quando est ab apostematibus, ibi. Si autem cum dolore. In quarta parte dicit esse opus medico erudito ad curandum dolorem stomachi, & hepatis in fine capituli, ibi. Ad dolorem tamen stomachi. Prima in quatuor. primo ponit signa, secundo curam per uomitum. ibi. Aegro aqua tepida. tertio per solutionem uentris. ibi. Et si hoc non sufficiat, quarto per dietam. ibi. Aegro quotidie. De duabus primis partibus dicit, si cum dolore stomachi fuerit turbatio, id est, conturbatio, & anxietas stomachica, & nausea, id est inclinatio ad uomitum pendentes, scilicet ab humoribus calidis, scilicet cholera uitellina, citrina, prasinia, & similibus, aegro aqua tepida est in potu tribuenda, scilicet sex uncias, aut circa, huic tamen posset addi aliquid aceti ad incidendum, & magis stimulantium, expulsiuum, aut. 3. 2. oxymellis simplicis, si humor esset crassior, & uiscosior, & precipiendum est, ut uomat, digitum, aut pennam in oleo tepido intinctam multoties imponendo in gutture, donec exquisitè materia euacuetur. In tertia parte dicit, quod si hoc non suffecerit ad curam doloris, aut quia uomitus non possit fieri, aut quia factus non sufficit ad eradicationem materię, uenter est soluendus cū hierapicra dando ex ea 2. drac. usque ad 2. aur. una tamen drachm. aut unus aure. hominibus regionis nostrę communiter sufficit. Et melius est, ut ex hoc puluere conficiantur pilulę, ut facilius sumi possint. descriptio hęc nota est, & omnia ingredientia sunt calida & secca, præter rosas, & sunt stomachum confortantia, & nihil hic ponitur solutiuum, nisi 2. loc. Et habet hęc hiera hoc præcipuum, apud Auicē. 14. tertii cap. de cachexia, ut educat superfluitates stomachi reseruat humiditatibus innatis. Et eius conferentia non est solum in euacuatione humoris cholerici, sed etiam phlegmatici: & aliquando hi pulueres cum melle permiscuntur in modum electarij, & potest exhiberi ex eo unc. 1. & humoribus existentibus, imbibitis, aut inuisicatis erit maior eius conferentia quàm in forma pilularum. Credo tamen quod in dolore pendente à cholera pura subtili magis obesset inflammando, quàm iuuaret euacuando. Deur itaque in cholera crassa, aut in cholera mixta cum phlegmate, immo etiā in phlegmate solo in stomacho natante inuisicato, & imbibito optime confert. In dolore autem punitiuo pendente à cholera subtili magis confert rheubarbarum, & myrobolani citrini, aut manna, aut casia cum decoctione myroba. citrinorum, xyloballami, id est ligni ballami, carpoballami, id est fructus ballami, xylocasie, id est casie lignee, cetera nota sunt. Ultimo ordinans dietam, dicit quod detur panis infusus in uino, scilicet uuarum, & succo mali granati ad contemperandum caliditatem uini, & detur etiam panis infusus in uino, & syrupo de citoniis, id est facto ex succo cytoniorum acetorum, cum debita quantitate sacchari, & possunt hęc omnia ad libitum inuicem permisceri.

SCHOLIA.

Vt uomat] si materia raras: quoniam facile educetur: si uero non: purgetur uentriculus tantum. Rec. pul.] hiera hęc differt multum ab ea, quę Gal. docuit. 7. therap. ut calida remittatur interperies. Panis] hęc uicis ratio humores acutos subtiliat, atque digerit.

Quod, si cum dolore & ructuum multitudine, & extensio, atque singultus; aegro electarium diacyminum, & diacalamenthum, & alia cōfectiones, quę uentositatem dissoluere consueuerunt, quę in capitulo de colica nominabimus danda erunt. cibaria uerò eius sint calagia, & mutagenath cum seminibus. uini ueteris puri parum bibat. & utatur motu: & ingrediatur balneum. Stomachus quoque ex oleo de neriden, ut diximus, in panno inuoluto naporetur.

SCHOLION.

Ructuum multitudine, & extensio, atque singultus sunt signa uentositatis, & per resolutionem, & exiccationem curatur, ut per medicamenta à Rasi posita patet.

In hac secunda parte curans dolorem stomachi à uentositate. Primo, ponit tria signa, scilicet ructuum multitudinem, extensionem id est, dolorem extensiuum, singultum, scilicet sequentem uentositatem. Secundo, dat medicinas dissoluentes uentositatem, scilicet diacyminum, diacalamenthum, & cetera huiusmodi, quę dissolunt uentositatem, de quibus in capitulo de colica dicitur, sicut est electarium de bacis lauri, ante tamen horum carminantium exhibitionem conueniens est, ut præcedat euacuatio humorum ex quibus uentofitas generatur uomitus, aut secessu, & cibi sui sint, sicut calagia, id est, cibus, qui fit ex pulmone, corde, & hepate incisis minutim, & cum oleo frixis, in quo post remotionem prædictorum ponitur parum aceti, oua, & parum croci, mutagenath, id est, cibus, qui fit in caziola, aut sartagine cōditus cum seminibus carminantibus uentositatem, sicut anisum, ammi, cyminum, & similia, parum uini ueteris potentis dandum est, & non in multa quantitate. Exerceatur stomacho ieiunio, post cibum quiescat, ingrediatur balneum, scilicet aerium, aut balneum naturale, aut artificiale carminatiuum uentositatum, non autem balneum aquę simplicis. Stomachus quoque uaporetur cum panno, aut philtro infuso in oleo de neriden. i. de spica, qui expressus optime, & notabiliter calidus stomacho pluries applicetur, & hoc fiat stomacho ieiunio.

Placet mihi gratia clarioris doctrinę, primo expedire materiam de dolore stomachi ab omnibus causis contingētib; præterquam ab apostematibus stomachi, deinde de apostematibus eius specialem faciam sermonem. Sed antequam ordinam curam doloris stomachi, cum ipse multoties à uentofitate contingat, & sequatur stomachi inflationem, placet de inflatione, & rugitu aliqua summam dicere. Est autem inflatio extensio alicuius partis à uentofitate in ipsa comprehensa manente quæta. Rugitus uero est sonitus uentofitatis in aliqua parte commotę abque ipsius expulsiōe, quę si à stomacho per os expelleretur, sequitur eructatio, si uero ab intestinis per anum sequitur trulla. Inflationem autem distinguere potest secundum magnitudinem & paucitatem extensionis. Sed rugitus distinguitur secundum quantitatem eius, & differentiam sonorum, multiplicatur tamen propter multitudinem uentofitatis, & loci angustiam. Et ex oppositis causis paucificatur. Propterea multiplicatur magis in intestinis subtilibus, quàm in crassis, aut stomacho. Sed ex parte soni, quia grauis est sonitus, cum est in loco amplo, sicut in stomacho, aut in intestinis crassis, & est acutus, cum est in intestinis gracilibus. Item aliquando est clarus cum uentofitati non permiscetur humiditas. Et ex opposita causa redditur non clarus, quapropter claritas sonitus in intestinis significat mundificationem intestinorum, aut exiccationem fœcis. Quia causa immediata inflationis, & rugitus est uentofitas, opus est ut causas uentofitatis absolnamus. Causa autem uentofitatis in stomacho, & in intestinis est duplex, efficiens, & materialis. Formalem, & finalem, philosophis relinquo. Et uterque est duplex corporea, & primitiua. Corporea duplex per essentiam, & per communitatem. Causa autem efficiens uentofitatem est caliditas diminuta, nam sexto de accidenti, & morbo. & 3. Colliger, cap. primo, & 13. tertii cap. de inflatione, uentofitas non à forti calore multiplicatur, quia resoluitur insensibiliter, nec à forti frigore, quia frigus prohibet elevationem uaporum. Et similiter uentofitates. 20. tertii cap. de causis diminutionis coitus, caliditas, & frigiditas sunt contrarię uentofitati, & ideo in fortissimis caloribus, & frigoribus in mundo non apparet uentus. Similiter contingit in corpore nostro, quod nec in forti calore propter resolutionem insensibilem, nec in forti frigore prohibente subtiliationem, uapor, aut uentofitas generabitur, & si cibus, uel materia uentofabilis reperiatur. Quapropter fit à caliditate media inter resoluentem, & non agentem, ita ut agat, sed non resoluat unde ex cibo uel humore de se non uentofol dicta caliditas generabit uentofitatem. Et propter hoc in corporibus aëris, uel sanis debilibus multiplicatur uentofitas, & in fortibus sanis minime uel parum, licet utantur rebus uentofis. Contra. Primo, in fortissimo calore, sicut febrientium multiplicatur uentofitas, ergo positio falsa. Secundo. Si calor fortis conuertit materiam in uaporem, resolutioni insensibili aptissimum, cum non sit transitus de extremo ad extremum.

Io. Arculan

T 4

mum

num sine medio, erit deuenire ad mediocritatem substantiæ uentositati proportionatam. Tercio. Calori debili difficilius est ex humore uentositatem generare, quam uentositatem genitam resolvere, sed facit primum, ergo faciet secundum. quapropter non erit causa inflationis, aut rugitus, sicut nec calor fortis. Quarto. Calor quantuncunq; diminutus in corpore humano conuertit humidum in uaporem, ergo, &c. Assumptum probatur, quia cum nullo calore corporis uiuentis est admixta tanta frigiditas quanta reperitur in aere hyemali congelante, sed tamen ille conuertit humidum in uaporem, ergo, &c. Et confirmatur, quia in moriente, tam in ægitudinibus acutis, quam in chronicis multiplicatur aliquando uentositatis usq; ad finem uitæ, in quibus calor diminuitur usq; ad gradum cum quo non stat uita. Assumptum manifestum est ex sententia Auicennæ in capite de synocha, & experientia comprobatur in tympanite. Ad primum dicitur, quod per calorem fortem non intelligitur calor intensus, sed fortis iustitiam, qui exigit tres conditiones, prima, quod sit facis intensus, secunda, quod sit cum notabili multitudine caliditatis, tertia, quod sit forme humanæ bene proportionatus cuius est instrumentum, talis aut non est calor febrientium. Ad secundum dicitur, quod fiet transitus à substantia humoris ad substantiam uaporis per medium proportionatum generationi uentositatis. Et consequenter, quod uentositatis generabitur si materia illa erit proportionata generationi uentositatis, sicut phlegma, aut melanch. aut multi cibi, de quibus infra, sed tamen illa uentositatis, quæ erit medium transitus, ita cito in uaporem conuertetur, & resoluetur, ut non possit facere inflationem, aut rugitum, cuius consideratio pertinet ad medicum. Ad tertium negatur maior, & dicitur, quod licet sit maior distantia inter substantiam humoris, siue cibi, & substantiam uentositatis, quam inter substantiam uentositatis, & uaporis, tamen membrum calidum propter meliorem applicationem ad cibum, uel humorem, quam ad uentositatem in ambitu alicuius receptaculi cõtenam, potest facere primum, & non secundum: sunt etiam aliæ responsiones, quas gratia breuitatis omitto. Ad quartum dicitur, quod calor quantuncunq; remissus in inuentu conuertit humidum in uaporem, generando ipsum ex parte aquea. Ex quo tamen non sequitur quod debeat generare uentositatem, quæ generatur ex parte crassa terreæ alicuius cibi uel humoris, sicut nec in mundo tempore magni frigoris generatur uentus, licet generetur multitudo uaporum, aut si in corpore nostro generetur uentositatis, illa esset modica non apta facere inflationem, aut rugitum à medico considerandum. Uentositatis namq; generatur ex parte crassa terreæ, uapor autem ex parte aquea, sed exhalatio ex parte ignea, & aerea. quapropter cæteris paribus difficilius est uentum, quam uaporem, aut exhalationem generare. Et ad confirmationem dicitur, quod in multis ægitudinibus generatur uentositatis usque ad finem uitæ, imò etiam post finem uitæ, nam corpora putrescentia multoties intumescunt, & per calorem putredinalem uaporibus, & uentositatibus eleuatis, & sub cute ab eis densitate retentis, & cõsequenter sequitur, quod calor tendentis in mortem potest intendi cum putrefactis, & consequenter negatur, quod in hoc casu diminuat, imò intenditur, sicut quando homo etiam combureretur, intenditur ad gradum cum quo non stat uita. In moriente autem ex tympanite credo quod uentositatis non generetur propter finem uitæ ob defectum caloris. Secunda causa uentositatis sunt cibi, & potus naturaliter uetosi, quia in ipsis est humid. extraneæ, sicut uinum dulce, turbidum. Item omnes herbe recentes. Item omnes fructus humidi, & ex non humidis sunt auellana, & castanea, & ex piscibus cancri, & omnia conchilia, ex leguminibus fabæ, faseoli, cicera, lentes, item mel. Contingit autem quod aliquando cibis sit uentosus, sed uelox motus eius de stomacho ad intestina, uel de intestinis ad hep. par, aut uelox descensus eius ad extra, facit quod non multiplicetur ex eo uentositatis, nisi forte modica. Tertia causa est res superueniens debilitans digestionem, dato quod in se sit fortis neque sumpta sit res uentosa, sicut potus aquæ frigide, motus inordinatus, coitus, accidia animi molesta. Et multoties fit frigus superueniens corpori exterius causa inflationis, & rugitus uentositatis ex qua repletur corpus, propte-

rea quia debilitat caliditatem operantem in materia, & facit operationem eius mediam, id est diminutam à cõplemto digestionis eius, cuius operatio est digestio humiditatis, & medietas operationis est uaporatio. Quarta causa est aliquando cibis calidus, & proprie susceptus in stomacho calido, qui patiens à caliditate improporionata præter modum euaporat, aut forte ipse sui caliditate aliquas humiditates à quibus obuiat in uapores crassos, & uentositates conuertit, unde piper, cuminum, allia, & huiusmodi sunt frequenter causa multiplicatæ uentositatis. Quinta causa est uacuitas stomachi à cibo, unde calor non inueniens cibum circa quæ se conuertat, conuertitur super humiditates, quæ sunt in stomacho uel intestinis, ipsas conuertentes in fumum, uapores, & uentositates, propterea in fame multi incurrunt torsiones, rugitus, & eructationes, & quandoque inflationes, & quandoque propter caliditatem expeditam à cibo mouetur uirtutes naturales, & mouetur aer effusus in spaciis, & mouetur cum eo residuum uaporum humiditatum, & est sicut uentositatis. Sexta causa sunt ægitudines splenis, & multiplicatio melancholia, quæ uentositatur, & facit rugitum, & inflationem, tam stomacho pleno, quam uacuo, & est deterior uentositatis phlegmatica, licet uentositatis phlegmatica sit pluris euentus. Quod autem melancholia uentositatur habetur tertio problemate primo, & quarto problematum, problemate tertio, & ad hanc reducit melancholia mirachia, quæ est causa multiplicationis uentositatis, tum debilitando digestiuum, unde cibis uentositatur, tum quia melancholia præcipitur ad stomachum, & intestina ex qua uentositatis generatur. Septima causa est multiplicatio phlegmatis in stomacho & intestinis, quod uentositatur est causa rugitus, & inflationis, & uehementis doloris stomachi, & intestinorum. Cholera etiam crassa uentofari potest, sed minus quam melancholia. & melancholia rarius, quam phlegma. licet uentofitas melancholiae ris sit deterior. Cause autem corporis remotiores, sunt debilitates digest. malæ cõplexiones, ulcera, apost. oppilationes, raritas textura, & similia. Et cause primitiue sunt inordinatum regimen in sex rebus non naturalibus, & annexis: cuius rememoratio in curis iam dictis præcessit. Signa. Inflatio, & rugitus, cognoscuntur ex relatu ægri. Sed cause siue si sint primitiue, sicut cibi inflatiui, potus aquæ, & similia cognoscuntur, quia sciuntur quod cibi illi sunt inflatiui, & quandoque sumantur sequitur inflatio, & rugitus, & sic de singulis causis primitiuis, & quod bono regimine obseruato non sequitur huiusmodi. Item quod hæc accidentia sunt leuia, & facile sedantur utputa homine eructante bis, aut ter. diminutio autem caloris cognoscitur per lationem digestionis etiã bono obseruato regimine. humores autem peccantes, qui sunt materia uentositatum cognoscuntur per ipsorum expulsionem, uomitus, aut secessu, per saporem eructationis, & alia signa sæpe superius dicta, & apud Auic. differentia inter inflationem melancholiae. & illam, quæ est ex humoribus malis, crudis, est quod inflatio melancholiae est cum siccitate: illa uero cum humiditate. Prognostica apud Auicennam. Primum, quando multiplicatur inflatio in uentribus conualescentium indicat cõuersionem, & reciduum, significat enim debilitatem digestionis, uel materias uentofabiles, quorum quodlibet sufficit ad reciduum, modo non fuerit ex parte ciborum. Secundum plurimum ægitudines Almeriachati, id est, mirach, & mesenterii sequuntur uehementem caliditatem stomachi, & oppilationes uiarum cibi ad corpus. quare reddit, & retinetur in partibus stomachi, & corruptus facit eructationem acetosam, & accidit uomitus stupefaciens dentes, cibo acetosato simul cum melancholia euomito, præcipue si communicat splen, & est egestio humida, id est, liquida chilo non potente transire ad hep. par, & in crassatur sangu. quia tendit in melancholicum, & quandoque est illic apost. faciens uaporem melancholicum, & facit euenire melancholiam, quæ dicitur mirachia. Vbi uero esset uehementia caliditatis stomachi, & splen non communicaret, fieret potius corruptio cibi ad fumum. Cura doloris stomachi à mala cõplexione sine materia curatur cum contrariis exterius, & interius applicitis, tam cibilibus, quam medicinalibus. Ex herbis ergo in calida conceduntur lactuca, endiuia, portulaca, cucurbita, & similes.

les. Ex granis milium, panicum, hordeum, spelta, lentes, & similia, aut ipsorum kist. Ex carnibus alcubugi, idest, perdicis, & alduragi, idest, turtures, & similes. Ex piscibus, paruis, petrosi, & similes bene conditionati, & proprie elixi in aceto, & conceditur lac, & proprie acetosum, & maxime de quo extractum est butyrum. Item conceditur aqua frigida, & proprie his, qui ex potu eius ledi non consueverunt & non consuetis aqua, uolentibus potare uinum datur apud Rasim permixtum cum uino granatorum aut cum syrupo facto ex suc. citoniorum acetosorum. Ex medicaminibus conuenit syrupus acetosus simplex, rob de agresta, de citoniis, de granatis, & similia satis nota, & ex trochiscis, trochisci de spodio, & similes, & exterius frigid. applicentur, & si pendeat a frigida, calida acta, & potentia interius, & exterius sunt applicanda, sicut diagalanga, diatriopipeleon, & similia. Si uero a siccitate humectetur qualitate, & substantificet interius, & exterius, & balneum aqua dulcis est conueniens, & potus uini eiusdem anni notabiliter lymphatus, & lac, & iura pinguis pullorum conueniunt, & similia. Si uero pendeat a mala complexione cum materia aliunde stomacho communita exiguuntur sex intentiones. Prima euacuat. Secunda diuertit. Tertia regit membrum mittens. Quarta stomachum suscipientem. Quinta curat accidentia. Sexta ordinat debiti regimen. Vbi uero dolor sit per essentiam in stomacho solum exiguntur quinque ex suprascriptis: non enim opus est exigere membrum mittens, & hac intelliguntur ubi dolor non sit tantus, ut ordinem curae praeruaricet, sed ubi modum excederet. Prima intentio est doloris sedatio, quo sedato restus ordo curationis prosequendus est secundum intentionem suprascriptam, quod dolorem uere sedat causas remouendo. Dolor uero si fortis, & intollerabilis fuerit ab initio sedatur cum anodinis, sicut cum sacculis ex floribus chamamilla, meliloci ros. absinthio, & similibus, qui sacculi possunt calefieri super latere calid. asperso uino, & stomacho applicari, aut infundantur in aqua calida cui parum uini sit admixtum, & expressi debite calidi stomacho applicentur. Similiter sacculi ex fursure, atrimento, milio, & sale sunt praestantes, & proprie si uentositas sit in causa, uesica quoque plenae decoctione huiusmodi anodinarum debite calida sunt praestantes. Similiter philtera in ea infusa, & expressa super toto stomacho applicata, opus enim est, ut magnam partem occupent, unctiones quoque & emplastra eiusdem intentionis post fomentationem applicata sunt praestantes. Sed his non sufficientibus ad sedationem, dantur stupefacientia, sicut in causa frigida philonium a. 3. s. usque ad unam cum paucis uino suauiter distemperatum, & in causa calida tantumde requiei descriptione Nicolai cum aqua saccharata distemperata, aut una pilula de cynoglossa, & frequenter confueui coniungere stupefacientia cum solutiuis, ut simul uera cura, & mendo sa perficiatur, sicut. 3. s. pilula de cynoglossa cum. 3. 2. alephangina in causa phleg. aut cum tantundem aloes loti in cholera crassa, aut materia mixta ex cholera, & phlegm. aut cum. 3. 2. pilularum indarum in melanchol. & si non haberentur pilulae de cynoglossa ponantur cum suprascriptis gran. 2. opii, & tantundem croci, aut castor. Similiter possemus coniungere medicinas liquidas, sicut philonium cum diaphonicon, & similibus, secundum desiderium patientis. Sed pro cura ordinaria, primo debemus ordiri ab euacuatione, ergo praemittatur clystere lenitium si fuerit stipticus, postea praecipiatu uomitus si nauseauerit, & sit facilis ad uomitum, hic enim est promptior ad educendum materias, quae sunt in stomacho, quam uentris solutio. Non tamen inchoandum est cum fortibus, sed cum lenibus, sicut cum impositione digiti, aut pennae in ore, aut cum sumptione aquae tepidae cum aceto, aut oxymelle simplici, & similibus, semper adiuvando cum impositione digiti, aut pennae in ore, & hoc non sufficiente ad curam, soluat uenter cum lenibus si materia stomacho aliunde communicetur, sicut cum casia, marina, aut rheubarbaro materia existente cholerica subtili. Si uero cholera fuerit crassa, aut fuerit cholera mixta cum phleg. soluat uenter cum hiera pira, aut in forma pilularum, aut in forma electarii praecipue si fuerit imbibita, aut inuiscata. Et phleg. cum pilulis alephanginis, aut stomachicis. Et melancholia cum fena, & epithymo, & mirobolanis indis. Si uero materia aliunde deri-

uetur, soluat uenter cum fortioribus propriis, tam membro mittenti, quam recipienti, & cum hoc eligentibus materia peccantem sicut cerebro, aut aliis membris communicantibus materiam cholicam, dantur pilulae aureae, sed mixtae cum tertia parte mirobol. citrinorum. Aut materia existente phlegmatica pilulae cochis, aut hiera composita Galeni, & possunt permisceri cum mirobolanis chebulis, et diaphenicon est ad hanc intentionem. Et si materia fuerit mixta, dantur pilulae aggregatae, & materia existente melancholica pilulae inde, quibus possunt permisceri mirobolani indi in modica quantitate, semper enim cum his exoluentibus, debet misceri in dispositionibus stomachi aliquid stipticum, stomachi confortatum, ne facile recipiat materia aliunde ad ipsum uenientem, sicut rheubar. mirob. & similia. Est etiam melius in principio, nondum digesta materia, incipere cum medicinis benedictis leuiter soluentibus, nisi uenter difficulter soluat uenter. Digestiua autem in materia cholerica subtili sunt, sicut syrupus de agresta, de granat. de citonijs, acetosus cum aqua endiuia, maxime ubi hepar communicet. Et in cholera crassa, aut cholera mixta cum phleg. syr. acetosus, oximel simplex, syrupus de metha, de absinthio cum aquis endiuia, absinthij, & similia. Et materia existente valde crassa, aut viscosa, oxymel compositum scylliticum cum aqua absinthij, prassij, & similia. Et in materia frigida non viscosa mel ros. Sed in materia melancholica syrupus de epithymo, et de fumoterra, si fuerit adulta cum aqua buglossae, scolopendriae, & similia. Sed digesta materia eradicetur cum fortibus. Phleb. autem conceditur ubi timetur aduentus apostematis, aut ubi sanguis esset in causa, sed maxime fiat ex uena deferuiente membro mittenti. Si uero nullum esset mittens fiat ex basilica. Secundo uero intentio, scilicet diuersio perficitur cum frictionibus, ligaturis, ventosationibus, clysteribus, caputpurgiis, & sic de singulis diuertentibus, tam a membro mittente, quam incipiente. Tunc autem interest eligere diuersiones proprias secundum quodque membrum mittens, tam cum euacuatione, quam sine. Clystera tamen sunt communis iuuamenti, tam respectu stomachi, quam respectu cuiusque mittentis. Tertia autem intentio, si regimen membri mittentis tribus perficitur. si euacuatione sibi propria, unde si matrix propter retentionem menstruum fuerit in causa prouocatur, nisi sit praegnans. Quod si praegnans fuerit educatur materia a matrice ad stomachum deriuata uomitu, aut secessu, neque constingantur in stomacho, sicut plerique faciunt, propterea clystera abstergentia, & lenientia conueniunt, & sumat in potu syrupum acetosum saccharinum, aut mellinum. Cauendum tamen est a phlebot. quantum est possibile, & medicinis exoluentibus, & prouocantibus, in ceteris procedat, sicut in non praegnantibus. Similiter sanguis hemorrhoidalis prouocetur si eius retentio fuerit in causa, & sic de ceteris. Qualiter autem a matrice, & singulis membris mittentibus debeant euacuari, patuit in prima intentione. Secundo remoueantur nocuenta membrorum mittentium. si male complexiones cum interius, uel exterius applicitis secundum exigentiam, & oppilationes, & sic de ceteris nocuentis, & cum eisdem uirtutes ipsorum confortentur. Quarta autem intentio, si regimen stomachi recipientis perficitur, primo euacuando contenta in eo uomitu aut secessu si fuerit causa doloris. Secundo discrasiam eius corrigendo & simul ipsum confortando cum propriis modis rata stipticitate participantibus. Tercio dolorem sedando cum anodinis, aut stupefacientibus de quibus antea parum dictum fuit, inferius autem describam propria ad hanc intentionem. Curentur autem accidentia iuxta intentionem, si instantia uigiliarum, syncopis & similia secundum ipsorum exigentiam, sicut dictum fuit in cap. propriis. Sed pro sexta intentione, si regimine sex rerum non naturalium, declinet aer in contrarium discrasiae, stomachus tamen satis calid. teneatur, sicut est necessarium in passionibus membrorum uero uosorum, magis tamen in discrasia frigida, quam calida. Similiter cibus & potus declinet in contrarium discrasiae, & sit paucus in quantitate, boni chimi, paucorum superfluitatium, facilis digestionis, uelocis penetrationis, & gustui delectabilis, & proprius in confortatione stomachi, & sedatione doloris eius sicut pellicula intrinseca stomachorum gallinarum, & non comedat, aut bibat, nisi praecedente cibi digestionem celebra-

celebrata, non tamen famem toleret, præcipue si à cholera, uel melancholia contigerit. Somnus sit prolixus, & dormiat quando potest, maxime enim iuuat in sedatione doloris: pro curentur euacuationes à natura institutæ, & uenter teneatur potius lubricus quàm strictus. Non coeat nisi naturaliter multum stimulatus. Exercitetur stomacho ieiuno. Post cibum quiescat, sit sperans, & gaudens, iram, tristitiam, timorem, & huiusmodi accidentia molesta fugiat. Cura doloris uentosi exigit quatuor intentiones. Prima remouet causam, tam factiuam, quàm conseruatiuam uentositatum. Secunda uentositatem carminat, & stomachum confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat debitum regimen. Si ergo causa uentositatis fuerit debilitas innati caloris, confortetur cum exterius & interius applicitis, sicut cum pellibus, & facculis stomacho applicitis, de quibus supra in debilitate digestiua. Cauendum tamen est maxime cum corpus est extenuatum ne præter modum calefiat, licet enim forte calor intendatur gradualiter, forte diminueretur in quanto humido, & spiritibus resolutis: & sint hæc calida confortantia, tam proprietate, quàm stipicitate temperata, sicut uinum bene conditionatum, aromaticum ros. diagalanga, confectiones magnæ, sicut theriaca, & mithridatum. Si uero causa fuerit cibus & potus uentofabilis, aut potus aquæ, & familia extrinseca remoueat, & inducatur regimen contrarium, Et si appetitus ægri fertur in cibum sua frigidityte nocentem, corrigatur cum calidis carminantibus uentositatē, sicut diagalanga, diacyminum sumptum in principio mense. Aut ipse cibus corrigatur cum aromatibus calidis, sicut galaga, pipere, zingib. & similib. Et contra si cibus esset calidus sumendus in stomacho calido, sumant in principio mensæ diarhodon, tria sandolos, & similia. Aut corrigatur cibus cal. cum agrestia, uino granatorum, & similibus. Et si cibus sit habens humiditatem extrinsecā paulatim exicetur in umbra, aut sole secundum quod res exiccandæ habent plus, aut minus de humiditate extranea, & secundum diuersum modum substantiæ, unde uiz, & fructus exiccentur in sole, sed rosæ, & uiole, & similia, tenuia substantiæ exiccentur in umbra. Si uero causa uentositatis fuerit cibus calidus, agens in humiditates in stomacho, aut intestinis repertus, aut quia calor in stomacho uacuo à cibo expedite conuertit se circa eandem, aut quia uapores humiditatum coniunguntur cum aere etiam à colore comoto, oportet illa superflua à stomacho & intestinis euacuare, postea discrasiam stomachi secundum exigentiam corrigit. Si uero causa uentositatis fuerit materia in stomacho congesta euacuetur uomitu aut secessu. Si uero fuerit aliud de ad stomachum deriuata curetur sicut dictum fuit superius in cura doloris stomachi à mala complexionem cum materia aliunde deriuata. Secunda intentio, scilicet, carminatio uentositatis & ipsiseductio, perficitur primo leniendo uentrem ut sit uia libera uentositati cum clystere ex brodio pingui, oleo communi aut anethino, & 2. 3. mellis, aut exhibeatur. 3. 1. pilularum alephanginarum, aut de hiera simplici: postea carminetur uentofitas exhibendo diacyminum, diagalanga, diatrion pipereon, electarium de baccis lauri, aut exhibedo decoctionem ameos, cymini, fiseleos, rutæ, baccarum lauri, galangæ, carui, dauci, anisi, & similiū cum melle ros. aut oximelle. Et pilulæ istæ sunt præstantes simul soluentes, & carminantes uentofitatem. 3. pilularum alephanginarum. 3. s. specierum diacimini, galangæ, castorei, an. 3. s. formentur pilulæ & exhibeantur stomacho ieiuno. Similiter galanga, zingib. aristol. rot. zedoaria singulariter aut coniunctim cum uino porteti antiquo exhibita, scilicet, à 3. s. usque ad unam cum 3. 1. uini suprascripti. Et castorei à 3. 1. usque ad 3. s. cum pauco aceti potarum, aut cum pauco oximellis simplicis est mirabile. Ex applicitis exterius est unctio ex oleo rutaceo, de spica, laurino, de Kerua, & similibus, aspergendo super locū inunctum aliquem ex pulueribus suprascriptis, uel cū oleis suprascriptis commiscendo. Et cum oleis suprascriptis, aut decoctione rerum suprascriptarum carminantium uentofitatem, potest stomachus fomentari cum philtro, spongia, lana, & similibus in suprascriptis oleis, aut decoctione debite calidis infusis, debite espreis & applicitis: postquam applicationem ter aut quater ungatur cū aliquo ex suprascriptis, & emplastrum de baccis lauri est in hac dispositione pro-

prium. Item cum melle & lana crassa modo incisa, & pulueribus suprascriptis carminantibus uentofitatē fit emplastrū conueniens, & balnea mineralia laudantur, & unctio uetris ex castoreo dissoluto cū oleo antiquo, aut aliquibus ex oleis suprascriptis est mirabile, & uaporatio cum milio torrefacto, & uino potenti asperso est conueniens in doloribus à uentofitate pauca & subtili. Et uentofa magna sine scarificatione undiq; comprehendens umbilicum sic dimissa hora diuidia, & longiori tempore est mirabilis sedatione doloris uentosi. Corriganur accidentia iuxta tertiam intentionem secundum quod fuerit expediens. Sed pro quarta intentione aer declinet ad calidum, & teneatur stomachus cum pannis notabiliter calidis. Sit parcius in cibo & potu, & uinum eius sit antiquum & mediocris saporis & uinofatis, & in discrasia multū frigida sit notabiliter uinofum. Et cibi declinent ad calidum & siccum, allia cōcta in confectis sunt sublimia, aromata sint huiusmodi. 3. cinnamomi. 3. s. zingib. galangæ, pipere an. 3. 2. croci. 3. 1. misce & reliquum regimē sex rerum non naturalium obseruetur ut supra, & ex his facile patere potest cura multitudinis eructationis. Cura autem particularium dolorum, de quibus supra perficitur ut in fra. Si ergo dolor fuerit propter tractum materiæ ad stomachum cholericæ aut melancholicæ tempore famis. Primo huiusmodi materiæ euacuentur uomitu aut secessu, scilicet per eam regionem quæ uideatur habiliior, & quam natura magis tentarit. Secundo, materiæ ad aliam regionem deriuentur, scilicet ad intestina cum clysteribus, & similibus, aut uentofæ sine scarificatione super splene aut hepate ponantur ut prohibeant raptum materiæ ad stomachum. Tercio, stomachus confortetur, ne recipiat, cum interius & exterius applicitis, ut cum diarhodon, aut aromatico ros. & similibus, secundum humoris & discrasie exigentiam semper per horam aut mediam ante cibum sumendo aliquid ex suprascriptis prohibentibus tractum materiæ ad stomachum, aut bucellā panis infusam in uino granatorum, agrestia, aut uino citonorum acetosorum, cholera repente ad stomachum: sed melancholia repente, aromaticum ros. aut bucellam panis in uino nigro stipico infusam. Et cibentur tempestiue ut potius præueniant famem, quàm fames præueniat eos. Et tempore doloris uomitus prouocetur, cibo existente in stomacho uel non existente, ut humor educatur uel procurretur eius exitus per inferius.

Cura autem reliquorum dolorum particulariū per essentiam, aut per communitatem perficitur eisdem sex intentionibus, quæ superius dictæ fuerunt in cura doloris à mala complexionem cum materia. Nec opus est in his singulariter secū dum unamquamque speciem sermonem prolongare.

Cura autem doloris stomachi pendētis à causa primitiua est. Primo, causa primitiua remoueat & nocumentum per ipsam impressum, & inducatur regimen contrarium. Secundo, stomachus confortetur cum propriis moderata stipicitate participantibus. Tercio, corrigantur accidentia. Quarto, ordinetur regimen contrarium nocuenti in stomachum, per causam primitiuam impressi. Quod si dolor ad membrū ignobilius ipso permutetur, sicut ad intestina aut ad iuncturas, & similia, adiuuetur illa permutatio fricando membrum illud aliud ad quod permutatur, & uias aperiendo ut facilius fiat permutatio, & breuiter omnibus aliis ingeniis adiuuantibus permutationem illam. Si uero permutetur ad membrum nobilius sicut ad cor cerebrium, similia, impediatur illa permutatio trahendo ad contrarium cum phlebotomiis uentofationibus tam cum scarificatione, quàm sine, & cæteris modis diuersionum, tam euacuatione, quàm sine. Et membrum illud ad quod fit permutatio confortetur ne recipiat, uizque e intermedie claudantur. Hic uero subiungam quasdam medicinas proprias in cura dolorum stomachi incipiendo ab eis, quæ sumuntur ab intra. Terebinthina sumpta cum uino potenti calido, aut si post eius sumptionem uinum bibatur in doloribus proprie pendētibus à causa frigida, dosis eius est ab 3. 1. usque ad 3. 1. s. Similiter aqua uitæ. 3. 1. uel 2. confert in causa frigida potentissime. Aut. Dolor qui accidit post cibū & non sedatur nisi uomitu est dolor malus, & rectius quidem est ut sumatur omni die aliquid mellis ante cibum, & ut consideres causas illius

ex

tur emplastra, unguenta, aut cerata secundum exigentiam²²⁷ fomenta etiam cum oleo de spica, aut masticchino, aut laurino, ros, aut chamæmilino, de absinthio, & similibus sunt præstantia. Vnguētum confortans (stomachum, remouens oppilationes, dolores, & uentositates. Reci. olei nardini, lib. i. bulliant cum samplicio trito ebullit. una, postea adde ceræ 3.3. & fiat unguentum addendo masticchen, myrrhæ, terebinthinæ, laudani, an. 3. i. unge. & supersperge puluerem anisi & rofarum, & superimpono faldellam lanæ succidæ panno lineo subtili inuolutam debite calidam. Aliud in causa calida. Rubei rofarum, olei myrrhini, olei citroni, ana. 3. i. rofarum 3.3. corallorum rubeorum, ana. 3.2. mastichis, olibanis, pice, ana. 3. i. aceti modicum, ceræ quantum sufficit, fiat unctio mollis: & si opus est arcere uomitum, supersperge puluerem rofarum, granatorum, & galliam muscatā. Aliud cōueniens. Lana minutim incisa incorporetur cum sufficienti quantitate mellis ad ignem, & supersperge pulueres calidos aut frigidos confortantes, resolutes uentositates, carminantes, &c. secundum exigentiam extensum super petia applicetur. Item placenta cocta debite calida scindatur per medium, & superspergatur oleum aliquod debite calefactum, uirtualiter calidum aut frigidum, confortatiuum, resolutiuum aut uentositatis carminatiuum, & similes pulueres ad eandem intentionem secundum exigentiam necessitatis bene incorporando & applicetur, & hæc occupent magnam quantitatem uentris.

Cap. 82

Causæ autem eorum quædam sunt primitiue, sicut casus & percussio, violentæ medicinæ & propriæ exoluentes, aut uomitum prouocantes, stomachum inflammantes & excedentes. Similiter cibi mali ex omni genere, de quibus supra. Corpore uero sunt uomitus frequentes & laboriosi, dolores prolongati & propriæ cum corporis repletionē, & cacochymia, & hæc causæ secundum plurimum generant apostematata calida per uia defluxus. Apostemata uero phlegmatica, licet generari possint per uia defluxus ex causis superscriptis, aliquando tamen paulatim congeruntur debilitata stomachi digestiua & expulsiua, & propriæ cum homo multum comedit & ociatur, & interueniunt reliquæ causæ multiplicantes materias crassas, & eas in uasis & ulceribus concitantes. melancholica uero raro sunt incipiendo frequentius, permutando ex apostematibus calidis & propriæ sanguineis, etiam aliquid fieri rarius ex apostem. phlegmaticis. Signa sunt primo communia, sicut dolor continuus longo tempore perseverans, quamuis regimen fiat bonum. Minor tamen in apostematibus frigidis grauitas notabilis, sed minor in cholerico: tumor sensu perceptus, & male tolerat compressio nem, nisi apostema sit posterius, tensio, & durities, & maior in melancholico & sanguineo, minor in phlegmatico & cholerico, feb. continua, licet remissa in apostematibus frigidis, æstio digestiois, aut appetitus, aut urina quæ. Sextum non tolerat cibis mediocriter quâritatis, ne dum quod magnæ, propriæ si est in interiori tunica, quâ quicunque cibis comprimit, ita ut sentiatu molestia, dolor.

lor, inquietudo dum in stomacho est, & quousq; exierit, & quanto cibis est maioris quantitatis, grauitatis, duritiei, acuitatis, tanto magis molestat, ita ut cogatur virtus nisi multum defecta sit cum uomitu uel secessu expellere: posset tamen cibis esse ita leuis, ita paucus & remittens malam complexionem stomachi, ut parum inferret molestiam & retineretur. Signa uero specierum distinctarum ex parte causæ materialis in qua sunt, quia si est in ore stomachi dolor est magnus & proprie statim post assumptionem cibi, & tumor prope malum granatum, nocumentum appetitus magnum cum frequenti nausea, subnersione, & uomitu, & ex concomitantibus frequenter sunt spasmus cum alienatione si est calidum, uel cum subeth & stupore si est frigidum. Item frequenter sequitur pulsus cordis, frigiditas extremitatum, sudor frigidus, & tremor cordis, & syncopis, & sunt ualde mala. Si uero sit in fundo stomachi, dolor est minor & excresecit, non immediate post cibum, sed per horam post eius sumptionem tumor & dolor prope umbilicum per duos digitos aut tres aliquando declinans magis uersus dextrum, aliquando uersus sinistrum, & magis læditur digestio quam appetitus. Si uero sit anterior magis subiacet sensui, & dolor in parte anteriori sentitur & non tolerat compressionem. Si uero posterior est e contrario & dolor sentitur posterior. Si uero sit in omnibus partibus sunt accidentia in omnibus partibus communia. Apostemata significatur calida per inflammationem totius & adustionem, quæ communicatur ori & linguae. Et urina & egestionis sunt plurimum cum tinctura & aliis signis arguentibus caliditatem. Dolor intensus pun-gitiuus si fuerit à cholera. Et extensiuus & grauius si fuerit à sanguine, feb. intensa, quia membrum nobile & uicinum cordi. Alienatio propter uapores ascendentes, & magnam colligantiam cum cerebro per neruos descendentes ad stomachum à quarto pari neruorum cerebri, corruptio coloris, & pulsus tendens in ferrum. Frigida uero phlegmatica significant dolor perseverans, emissus tamen, inquietudo & febris remissa nisi apostema suppuretur, quod raro accidit: non enim credo apostema notabile nobilis membri vicini cordi à feb. euacuari, humiditas lubrica, idest, fluida in ore, color albus cum palliditate, paucitas sitis, malicia digestionis & paucitas appetitus. Melancholica uero significat durities pulsus, corporis extenuatio, grauitas notabilis, color, & lingua fulca, longa duratio, & præcesserunt apostemata calida, sanguinea secundum plurimum & aliquando phlegmatica, raro enim fit incipiendo multitudo uarietatis duritiei à duritie aliorum apostematum stomachi cum cætera non euacuentur à duritie quadam & tensione, sed hæc intensior & manifestior & magis sapiens naturam duritiei, quam tensionis. Aliter multitudo uarietatis duritiei, quia durities sua est ualde difformis cum non uniformiter omnes partes indurentur. Si uero fuerit cæcerosum præter supra scripta ad sunt dolor fulmineus, sitis intensa, feb. notabilis, & inflammatio, & multa accidentia timorosa, de quibus supra, & cum ulceratur emitteur uirus foetens, & ad sunt signa ulceris. Signa uero mutationis sunt corporis extenuatio, multiplicatio, fluxus uentris, & uomitus, febris & doloris excresecientia, minoratio urinae, & apostemate exiturato minorantur humoresmodi accidentia, & comprimendo sentitur mollities cum antea durities sensata fuerit. Cumq; uult erumpi redeunt dolores & pungitiui & perforatiui. Item multiplicatur inquietudo & multa ex accidentibus supra scriptis. Cum erupit est dolor sedatur, sed pulsus debilitatur & facies pallescit, & forte sequitur lipothymia aut syncopis, & non sentitur amplius tumor consuetus, & si erumpit interius egreditur sanies, uomitu aut secessu. Si uero exterius in uacuitate uen. sanies colligitur in inguinibus.

Prognostica. Primum. quodcumque apostema stomachi notabile cum confirmatur secundum plurimum interficit, sed calidum uelocius quam frigidum, propterea in eius cura ab initio sollicitè intendatur. Secundum cuius apostema notabile exituratur est propinquior desperationi quam spei. Tertium in nullo apostemate canceroso paruo siue magno est spes salutis.

De ulceribus stomachi. Cap. 83.

Quid nominis & quid rei ulceris stomachi sunt satis manifesta. Species enim eorum distinguuntur secundum diuersitatem particulæ patientis sicut de apostematibus superius dictum fuit. Et distinguitur secundum suam essentiam, ita ut quædam sint munda à quibus profuit sanies laudabilis. Quædam sordida à quibus profuit sanies crassa sordides dicta. Quædam uirulenta à quibus profuit sanies subtilis. Quædam putrida existentia cum substantia corrupta à quibus sanies foetens egreditur. Quædam corrosiua à quibus simul cum sanie aut post saniem sanguis egreditur, & hæc quandoque sunt cancerosa, quandoque sunt fistulæ in stomacho licet rarissime cum non tantas dent inducias, ut cum profunditate fiat in eis caro callosa, & quandoque sunt coniuncta malæ complexionis apostemati, quandoque non. Causæ ulcerum stomachi sunt apostemata & borthor post eruptionem. Item catarrhi calidi cum perseverant corrodoendo aut putrefaciendo. Item humores acuti ab hepate aut à reliquis membris mediate hepate deriuati ad stomachum, licet quandoque à splene ad stomachum deriuetur absque transitu per hepate. Et quandoque humores in stomacho congesti tandem corrosidentes & putrefaciennes non nunquam cibi & medicinae acutæ, item percussiones.

Signa specierum ulcerum sunt satis ex dictis manifesta. Similiter signa causarum corporearum ut catarrhi ex capitulo proprio cognoscuntur, similiter reliqui humores cholericus sanguineus aut melancholicus, similiter ex splene aut ab hepate, aut residuo corporis mediante hepate deriuati cognoscuntur ex natura humoris & ex nocumentis perceptis in membris mittentibus. Cognoscuntur autem humores esse in stomacho congesti ex grauitate & cæteris nocumentis stomachi fere continuis. Quod autem ulcera perdecant à medicinis & cibis acutis, & reliquis causis primitiuis eorum præcessione cognoscitur. Sed distinguitur inter ulcus stomachi & intestinorum gracilium, licet plerumq; conueniant in egestionem saniei & corticum subtilium. Primo, quia dolor stomachi sentitur distanter ab umbilico uersus superius, saltem per duos digitos, dolor intestinorum circa umbilicum uel infra. Secundo, quia frequenter in ulceribus stomachi & meri adest uomitus saniei & corticum, qui non adest in ulceribus intestinorum. Tertio ex nocumento percepto in descensu cibi & proprie acuti sicut sinapis aut acetis, & etiam cum descendit ad fundum qui non sentitur in intestinis nisi post longum spacium, scilicet, cum exiit pylorion. Quarto, ex foetore eructationis redolentis saniem, sensato in ulcere stomachi & non intestinorum. Quinto, ex eleuatione uaporis facietis incurrere siccitatem linguæ manifestius, quam in ulcere intestinorum licet etiam in ulceribus intestinorum quandoque exiccentur. Sexto, quia rarius egeruntur cortices in ulcere stomachi, quam intestinorum & gracilium, licet sint crassiores & latiores quam cortices ipsorum. Distinguitur autem inter ulcus meri & stomachi, quia in ulcere meri sentitur dolor, posterior in collo & inter spatulas, & uerificat dispositionem eius transitus deglutiti, quoniam significat locum dolorosum cum præsentia eius, & quandoque pertransit hunc locum parumper. Sed ulcus factum in ore stomachi significat quod dolor est in inferioribus pectoris & supremis uentris, & est uehementior propter oris stomachi sensibilitatem & deglutitū significat ipsum cum pertransitione pectoris, & plurimum eius declinat ad mirach & minoratur ex eo anhelitus, infrigidatur corpus & proprie extrema, & perducit ad syncopim plurimū. uerum factum in fundo stomachi significat exitus corticis ulceris eius in egestionem absque excoriatione intestinorum, & inuentio doloris post quietem eius, quod sumptum est in inferioribus stomachi. Dolor tamen est parus in comparatione ad dolorem oris stomachi, nec sequuntur accidentia ita seua, ex his facile distingui potest inter apostemata stomachi & ulcera eius.

Prognostica. Ulcera stomachi & meri superficialia noua facile curantur, sed profunda & antiqua difficillime, & frequenter cura est impossibilis secundum Auic. & quando stomachus disrumpitur non euadit nisi pauci à ruptura parui. Si autem

Si autem cum dolore stomachi fuerit se b. & apostema manifestum, & cum tangitur sentitur caliditas, & ager prius ex basilica phlebotometur, & loco dolenti duo superponantur sandali & ros. et camphora cum aqua ros. & succo citoniorum. nutrimentum vero eius non sit nisi sola hordei aqua, & custodiatur a carne, & uino, & confectio nib. quæ de melle sunt, & bibat succum granatorum mutorum, & rob. de fructibus frigidis. cumque caloris uehementia sedata fuerit, & agro cassia sist. cum succo endiuie dissoluta, ac bullita, & despumata ad bibendum detur.

In hac tertia parte principali superius diuisa ponit curam doloris stomachi ab apostemate & habet duas partes. In prima ponit curam doloris ab apostemate calido. Secundo ab apostemate frigido ibi. Cum autem apostema. Prima iterum in duas. Nam primo curat apostema cal. nondum conuersum in duritiem. Secundo curat ipsum, postquam induratum est, ibi. Cum autem ageritudo. In prima parte, positus quibusdam signis apostematis calidi, quæ sunt febris notabilis, apostema manifeste cognitum per duritiem, grauitatem, dolorem notabilem, continuum, & similia, de quibus supra, & per sensationem caliditatis in regione stomachi tam a medico tangente quam ab agro curat quatuor instrumentis. Primo per phlebot. basilicæ, de qua agitur, cum ordinata curam. Secundo per epithima stomachi superponendum frigidum, stipticum reperculsiuum, cuius descriptio sic ordinatur. R. aquæ ros. lib. s. succi citoniorum, 5. sandali al. & rub. rosarum rub. an. 3. 2. camphoræ, 5. s. aut. 1. si maior fuerit caliditas misce, & petia siue philterum aut lana in eo infusa non multum frigida applicetur, & saltem quater in die naturali replicetur. Tertio, per diatam, quæ sit sola aqua hordei exhibitæ ter in die naturali aut per aqua hordei copiosius commedunt. Et abstineat a carne & uino & confectio nibus, quæ sunt de melle & omnibus calidis, bibat uinum granatorum mutorum, & rob. de fructibus frigidis sicut de agrella, citoniorum, de ribes, & similia, & temperentur cum aqua cocta. Quarto, cum uehementia caliditatis sedata fuerit per medicinas supra scriptas detur flos cassiæ cum succo endiuie dissoluta, bullita, & despumata, cuius hæc est descriptio. R. flos cassiæ lib. 1. succi endiuie per residentiam depurati lib. s. cum quo trahatur cassia supra scripta bulliat ad lentum ignem de spumando donec acquirant mediocritatem substantiæ, & possint ad libitum cum saccharo tabazet dulcorari. huius dosi sit 3. i. uel circa. Confert educendo materias communes, in frigidans, confortans & dolorem sedans & potest exhiberi bis in hebdomada aut quando uidebitur secundum oportunitatem, & exhibeatur calidum sicut est, aut cum aliqua aqua distemperatum, quæ magis uideatur oportuna.

S C H O L I A.

Ex basilica phlebotometur si fuit apostema sit calidum, et sanguineum, siue bilioium confert sanguinis mistio sed ex quo basilica tunc prudentia est. Superponantur sand. &c. talia constringunt uentriculi meatus, adducunt robur, & uirtutem, & prohibent humorum fluxus. Custodiatur a carne ne spiritus, & humores inflamentur.

Cum autem ageritudo dies elongati fuerint, & calor omnino quieuerit, si remanserit apostema cum duritie, & hoc emplastro epithimetur locus. quod Rec. t. uiolarum siccarum, drach. 1. 0. rosarum rub. drach. 5. spice odoriferæ, masticiæ, amborum, an. drac. 3. cyperi, scbinanthi, calami aromatici, omnium, an. drach. 2. farina senug. drach. 2. 0. flos chamæmille, seminis maluaui albi, farine hord. omnium an. drach. 1. 0. conspergantur omnia ex mucilagine sem. lini, deinde locus oleo de neriden tepesfacto infusus emplastre ex predictis per 4. horas antequam comedat. & postquam cibis fuerit digestus, & stomachus fuerit euacuatus, ex oleo de neriden cum lana, ut diximus, uaporetur. confectio olei nardini simplicis. Rec. olei de ben. lib. 1. spice, unc. 5. masticiæ costi, cyperi, scbinanthi, calami aromatici om-

nium, an. octaua unc. unius. omnia hæc puluerizata in prædicto oleo posita ad solem per hebdomadam unam, uasis ore clauso dimittantur: deinde colentur, & exprimantur sices, & scophe, quæ in manib. remanserint emplastris admisceantur, optime enim erunt.

In hac parte curat apostema cal. de quo supra uersum in duritiem cuius duritiei causa potest esse triplex, aut inepta resolutio, aut nimia in frigidatio, aut materiæ etherogeneitas, cui accidit ut partes subtiles resoluantur aut exprimantur remanente terreo. Et curat per emplastrum & unctionem. Descriptio emplastri nota est. Declinat leuiter ad calidum, resoluit, mollicat, & confortat, & est excellens in casu. Vnctio autem est oleum de neriden, id est, de spica calid. & sic confortatium stomachi proprietate & stipticitate moderatis. In quorum approximatione docet hunc ordinem seruari. Primo euaporetur stomachus cum lana suta super pecia ad figuram stomachi infusa in oleo prædicto debite calidobis aut ter. Postea emplastrum superponatur debite calidum & fascietur & hæc fiant per quatuor horas aut pauciores ante cibum, cibo præfenti iam digesto bis in die naturali. Descriptio olei de spica est satis nota, credo præstantius esse ut loco olei de ben quod est quoddam granum, de quo apud Mes. notabiliter calidum & siccum acciperetur oleum sesaminum sicut facit Mesue.

S C H O L I O N.

R. uiol. 7 humore pauco fluente, & antea medicamentis ferè resolutis hoc emplastrum maxime confert.

Cum autem apostema in stomacho inueterauerit, trochisci de spica erunt dandi. qui recipiunt florum scbinanthi, xilocaissæ, rauescen, calami aromat. spice omnium ana. drach. 3. croci myrrhæ, anisi, costi, piperis, omnium ana. drach. 1. bdellii nari, drach. 3. masticiæ, drach. 2. ammoniaci drach. 1. informantur troch. quorum unusquisque ponderet aur. 1. ex quib. unus quotidie cum uino cocto detur. emplastrum quoque istud fiat, quod Rec. bdellii mollis, drach. 1. 0. ammoniaci, drach. 5. sem. behen, sem. apij, amborum, ana. drach. 1. 0. spice, masticiæ nigri amborum, ana. drach. 5. cere, drach. 3. olei de neriden, drach. 1. 5. gumme uino dissoluantur, deinde omnia coniungantur, & fiat ex eis emplastrum.

In parte præfenti curat apostema stomachi frig. Et primo cum troch. de spica, quorum descriptio nota est, qui calefaciunt, exiccant, confortant, & mollicant, maxime cum uino cocto distemperati & sumpti saltem per tres horas ante cibo præcedenti digesto. Secundo cum emplastro, cuius descriptio nota est, & est proprium in resolutione apost. & stomachi confortatione: hæc tamen duæ medicinae magis resoluunt quam mollicent. quapropter apostemate existente duro, si opus fuerit magis mollicare his addo mollicentia, sicut adipes, medullas, mucilagines, oleum amygdalinum, sesaminum, & similia secundum exigentiam, & regimen in cibo & potu proportionantur regimini medicinali.

S C H O L I O N.

Recipiunt florum medicamentum est resoluens, mollicans, & stipticum confortans, & iure quidem man in morbis antiquis (ut uult Aulic.) stiptica cum resolutibus, & mollicantibus sunt necessaria. quapropter remissa in temperie calida, uel frigida stante, uel melancholica talia sunt admodum utilia.

Ad do lorem tamen stomachi, & hepatis curandum medicus ualde eruditus est necessarius, qui ipsorum diligenter attendat dispositiones, nos tamen aggregationes, & summas ad hoc conferentes iam diximus, sicut in quantum potuimus in hoc abbreviauerimus sermonem.

In hac quarta parte & ultima dicit, quod pro curandis stomachi & hepatis dispositionibus sunt necessarii medici ualde eruditi & experti: nisi enim cito succuratur, ab initio uana deinceps erit omnis cura. qualiter ergo facient iuuenes parum docti & inexperti? Cura apostematum stomachi

Io. Arculani

V

chi

chi triplex exigit regimen. Primum debetur causæ antecedenti, secundum coniunctæ, tertium est commune utriq; curans accidentia, & ordinans regimen sex rerum. Primum regimen completur tribus intentionib; euacuatione, diuersione, & materiæ fluentis interceptione. Pro prima intentione, scilicet, euacuatione, sciendum est, quod fere nunquā est exculatio à phlebot. uel ab aliquo gerere uicem phlebot. in cura apostematum stomachi & cuiuscunq; alterius mēbri nobilis quæ generantur per uiam defluxus, siue calida sint, siue frigida. Et multo magis confert phlebot. q̄ uentris solutio aut uomitibus, & proprie in apostematib; stomachi. Imo in his uomitibus est aptus multo magis obesse, q̄ prodesse. Et uentris solutio parum proderit, imo nocebit, nisi sit limitata & conditionata, ut inferius dicitur. Ad phlebot. autem & reliquum genus curationis est properandum statim ab initio: cū enim apostema notabiliter creuerit cura erit cassa & uana. Ergo cum primum occurrat fac phlebot. præmissio clysteri lenituius oportuerit. Quantitas autē sang. hauriendi, & electio uenarum phlebot. sumuntur à uirtute, repletionē, magnitudine doloris & apostemate & ipsius tempore. Omnib; ergo his consentientib; fiat phlebot. copiosa, inchoatio à uenis magis distantib; & parum post phlebotomando magis propinquas. Vbi autē hæc dissentirent fiat phlebotomia parua, & ex uena basilica eiusdem lateris. Sed his mediocriter consentientibus phlebotometur primo basilica lateris contrarij & hauriantur 8. 3. sang. Et per 12. horas post aut circa phlebotometur basilica eiusdē lateris, hauriendo 4. 3. sang. Aut ambæ simul phlebotomentur hauriendo 10. 3. sang. uel circa. Si tñ retentio sang. menstrualis aut hæmorrhoidalis esset in causa, primo phlebotomentur saphenæ, postea basilica eiusdē lateris. Euacuaciones autē aliorum humorū fiant diebus sequētib; sēcū humorum exigentiam. Cholera cū flore calsiæ mixto cum fūco aut aqua endiuiz ut dixit Rasis, aut calsiā uel manna distemperetur cū aqua fructuum, sprunorum, tamarindorū, uiol. & sem. endiuiz. Non autē mirobol. citrin. quia nimis stipticant & exasperant. Neq; cum medicinis exoluentib; nisi in materia uenosa aut furiosa. Imo istæ lenientes sint leues & notabiliter in frigidates. Et alij humores soluantur cum lenibus secundum ipsorū exigentiam in quibus semper misceantur stomachū confortantia tā proprietate quā in stipticitate moderata, quæ omnia ex multis dictis possunt faciliter elici. Credo tñ præstantius esse ut fiat solutio cū medicinis lenientibus sicut in apostem. phlegmatico cū 3. 1. floris calsiæ detractæ cum decoctione florū chamæmilæ & meliloti, & in melancholico trahatur calsiā suprascripta cū decoctione sene, & epithymi cum pauco zingib;. Si aut huiusmodi liquida abhorreret, sumat pilulas alephāginas, & similia lenia respicientia humorem euacuandum. Diuerso autē cōplet cum clysterib; uariandis sēcū exigentiā materiæ, cum uentosis, prouocatione sang. narium, menstrualis aut hæmorrhoidalis, & similibus. Fluxus aut interceptionio fiat cōpingendo & incrassando materiam fluentē si fuerit subtilis. Itē claudendo uias medias inter membrū mittens, & stomachum cū stipticis super uis illis applicitis, quæ sunt magis aut minus frigida secundum materiæ & discrasie exigentiā, quæ autem sint huiusmodi ex sequentibus apparebit: nam repercussiuā de quibus statim dicitur complent hanc intentionem.

Secundum regimen statim à principio exequendū præmissa phlebotomia exigit tres intentiones repercussionem in principio. In augmento usq; ad mediū status repercussionē cū resolutione & maturatiuā. Tertia est resolutio pura, aut pura maturatio conneniens deinceps. Verum in materia frigida magis solliciti sumus de resolutione & minus de repercussione. Econtrario in materia calida. Et in melancholica magis de mollificatione q̄ de resolutione. Econtra in phlegmatica. Prima completur in causa calida in qua de repercussione maxime debemus esse solliciti cum epithimate Rasis ex sandalis aqua ros. cāphora, uino citon. quæ medicina fuit superius dosata & declarata. Illi possent addi coralli, spodiū, labrusca, balauia, schinanthum, & similia, & ex pluribus iā dictis possunt fieri unguenta cū oleo ros. myrtilino citoniorum, & similibus cum cera & aceto. Quibus apud necessitatem maioris in frigidationis posset addi modicum camphoræ, & possunt fieri emplastra quæ potentius operantur pro-

pter maiorem multitudinem formæ, cum suprascriptis pulueribus miscendo farinam hordeaceam, fabarum, lentes, excorticatas, carnes citoniorum, cortices cucurbitæ, portulacas, plantaginem, & similia, & parū schinanthi aut absinthii & impinguando cum aliquo aut plurib; ex oleis suprascriptis & addendo parum aceti. Et pro hac intentione complenda sunt etiam repercussiuā interius sumēda sicut miua citoniorum, syrūp. de ribes, de portulaca, uiol. nenupharinis, de piris, de granatis, de agresta. Et apud maiorem necessitatē in frigidandi & sedandi dolorem, syrūp. de papauere. Multum tamen frigida uitanda sunt quantum est possibile. Cōpingūt enim & prohibent materiæ resudationem. Sed hæc in principio in quo materia adhuc pauca fuit minus uerenda sunt, & proprie si fuerit subtilis. Aquæ autem sunt sicut endiuiz, solatri, lactucæ, portulacæ, plantaginis. Sed in causa frig. repercussiuā sint stiptica aliquid ad calid. declinātia, uel mi fceantur calida cum frigidis sicut oleum ros. aut citoniorum cum oleo mastichino, de absinthio, uel de mentha. Cum quibus addito aceto pro sexta parte poterimus epithimare stomachum. Aut ex his cum pauco aceti & cera possimus conficere unguentum, addendo etiam ad libitum puluerem rosarum, myrti, mastichis, & absinthii, ciperi, calami aromatici, & similia. Sed interius conueniunt syr. de mentha cum iulep. ros. Item syr. acet. cum absinthio longo tempore in eo infuso. Item syr. acet. cum melle ros. Aquæ autem sunt sicut cichoreæ, menthæ, lupulorum, & similia singulariter aut coniunctim secundum quod uidebitur expediens. Secunda intentio huius secundi regiminis perficitur miscendo cū suprascriptis repercussiuis in causa cal. aliqua leuia resolutiua subdominantia, ut flores chamæmilæ, meliloti, absinthii, schinanthum, passulas, ficus, capillos uen. farinam fœnugræci, sem. lini, parum croci, & similia. Sed in causa frig. repercussiuis conuenientibus in ea addemus resolutiua calidastipticitate tamē aliqua participantia, sicut oleum de spica, mastichinum, spicam, sem. apij, mast. bdellii, ammoniaci, & similia. Et emplastrum Rasis, quod dicit conuenire in apostemate cum induratur est conueniens in hoc tempore, quod fit ex uiolis, rosas, spica, mastiche, &c. Et in hoc tempore conueniunt oleum ros. oleum mastichini, & de spica simul mixta. Et si apostema tenderet in uiam maturationis, his possunt addi aliqua iuuantia ad maturationem sicut mucilagine malua uisci, fœnugræci, sem. lini, pinguedinis gallinæ in materia calida. Sed anatis, anseris, & hiscopū humidam, in materia frigida, & cœsyp. cerotum descriptione Philagrii apud Mesue. Et similiter emplastrum de meliloti resoluunt, mollificant, & maturant, ualentia magis in materia frig. Et in materia phlegmatica Auic. laudat hoc emplastrum. R. polii, meliloti, amomi, chamæmilæ, anethi, an. 3. 10. absinthii, spicæ, an. 3. 7. aloes, 3. 8. mastichis, 3. 10. thuris, 3. 8. radices althææ, 3. 15. ammoniaci, oppopanacis, styrac. an. 3. 10. adipis anseris & gallinæ, ana. 5. 2. ceræ rubæ lib. 5. misce & fac unguentum gummis in uino dissolutis. Polium autem de quo supra est planctus, cuius longitudo est circa palmum quam Plinius & Isidorus mirabilem prædicant, folia enim eius manne cādida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspicuntur, calida in secundo, sicca in tercio. Sed in materia melancholica apud Auic. ponatur in emplastris medulla ossium cerui, medulla cruris uaccini, & pinguedo gibbi camelorum, & ex confectis ad hoc & in dubelati, est istud R. meliloti, fœnugræci, chamæmilæ, baccarum lauri, althææ, absinthii, ana. partem. 1. ammoniaci, thuris, an. duas, tertias partis dissoluantur, gum. istæ, scilicet, ammoniacum & thus in decoctione 20. ficuū cum uino & melle, deinde coniunge cum eis reliquæ, est enim mirabile. Huic si uis magis mollificare addas medullā uituli, adipem, ol. amygd. dul. mucilagine malua uisci, sem. lini, & similia. Ammoniacum cum pinguedine gallinæ, & oleo mastichino dissolutum, mollificat, resoluit, & confortat. Et emplastrū Rasis in præfati cap. de bdellio, ammoniaco, &c. Est optimū in materia frigida ad mollificandū & resoluendū, licet magis ad resoluendū. Tua autē interest huiusmodi medicinas famosas traditas ab authoribus modificare secundū exigentiā. Et cum uis repercutere & caliditate aliorū temperare adde ol. ros. & aceti: cū uero mollificare, adipem, medullas, & mucilagine: cum uero caliditate superflue temperare

perare uiolas, ol. uiol. & farinam hord. & similia. Et poteris ex medicinis suprascriptis conficere unguenta, emplastra, decoctiones, linimenta, cum quibus stomachus potest fomentari varias habentes uirtutes secundum exigentiam. Sed interius medicina, quæ sumitur in uirtute sint eorum quæ exterius applicantur. Similiter debet proportionari regimen sex rerum, præcipue in cibo & potu. Qualia autem debent esse repercussiuua sumpta interius in materia calida & frigida, dictum est superius. Sed resolutiuua in apostemate phlegmatico sunt sicut diagalanga, diacinaonum, & multi trochisci sicut de rheubarbaro, de absinthio, & similes. Et Rasis in textu exhibet trochiscos de spica cum uino cocto & sunt proprii. Sed in materia mixta ex cholera & phlegmate, diarrhodon abbatis, & aromaticum ros. magis phleg. dominant. Item trochisci de rosis trochisci diarrhodon & similes. Sed in apostemate melanch. fauonia, id est, oleum, amigdalinum cum sacch. Item decoctio chamamilla, & decoctio meliloti & hislopi, & quadoq; decoquimus passulas cum aliquo isto- rum. Nam apud Auic. chamamilla bibitur propter apostemata uiscerum spissa, & absinthium confert duritiebus intrinsecis in emplastro positum aut bibitur, & tua inter est permiscere huiusmodi secundum exigentiam temporum, & mixtionem materierum, & si uideamus apostema suppurandum esse interius, & exterius multiplicemus mollificancia supra resolutiuua. Sed apostemate maturato intentio est ipsum erum pere. Melior autem eruptio, licet raro contingat, est ut uenter ex directo stomachi intumeat, & ibi rumpatur ut sanies profluat exterius: hæc autem operatio melius fiet cum rasorio fricto paulatim profundando donec sanies exeat & fiat foramen paruum ne multitudo saniei subito effluat, & spiritibus exhalantibus mors subsequatur. Secunda eruptio minus bona est ut rumpatur interius: nam per secessum & uomitum facile purgari poterit. Et ad hanc faciendam ualent motus uiolenti sicut reuolutio impetuosa super stomachum. Item uomitus, tussis fortis, & sternutatio, & medicina interius sumpta abstergentes, mordicantes & mollificantes, sicut decoctio ficuum passularum cum pauco pipere, aut cum pauco coepe narcisci & orobi, aut radices ieros & similia bullitorum cum suprascriptis & melle. Deterior autem omnium est ut rumpatur ad concauum ventris inferioris, tum quia medicina pro curatione ulcerum male poterunt applicari, tum quia forte oportet scindere in inguinibus ubi materia colligetur. Postea curetur ulcus secundum quod oportet mundificando & consolidando. Et tñ magna differentia inter ulcera noua superficialia & antiquata. In primis enim sola consolidatio sufficit perficienda cum aqua albuminis oui, cum qua potest dragaganthum, gummi arab. bol. arm. thus, mastix, & similia permisceri, aut huiusmodi pulueres miscantur cum aqua hordei, aut lacte, aut uino citoniorum, & stomacho ieiuno deglutiantur, aut huiusmodi misceantur cum iulep, aut saccharo ros. Et succus plantaginis cum bolo armeno est mirabilis, & proprie si adest dyscrasia calida. Si uero, ulcera fuerint magis profunda & sordida aut uirulenta primo mundificentur. Sordida quidem cum abstergentibus notabiliter & exiccantibus sicut aqua mellis sacch. hordei aut passularum singulariter aut coniunctim. Virulenta uero cum exiccantibus, paucæ absterfionis sicut aqua plantaginis, aut ferrata cum melle ros. aut sacch. ros. Deinde consolidentur cum his, quæ statim dicta sunt superius, aut cum aqua calibeata & saccharo ros. sub quadruplo ad aquam. Quibus potest addi ad maiorem consolidationem thus, mastix, bolus armenus, dragaganthum, & similia. Et his medicinalibus utendum stomacho ieiuno. Licet et cibaria debet medicinis proportionari. Vnde de tempore mundificationis duntur ptilana hordeacea, Kist hordei, cicerum, & orobi, fabarum & similia. Et potus sit uinum album, & cum aqua hordei, sacchari, aut passularum, tempore consolidationis Kist, rizi, panicii, mili, lentium, prima aqua abiecta, & similia, potus sit uinum nigrum stipticum, aqua ferrata. Si uero ulcus fuerit putridum mundificetur, primo substantia putrida. Vnde si orificiū est exterius possumus applicare cum stuello unguentum cerealeos, aut Aegyptiacū usq; ad remotionem substantiæ corruptæ. Si uero orificiū sit interius, laudat Auic. hieram picram non tanquā solutiuum, sed uelut absterfium & mundificatiuum. Ideo in pau-

ca quantitate debet administrari cum aqua hordei, aut mellis, aut sacchari. Nec ad mundificandum substantiam corruptā debemus per os exhibere corrosiuua, sed solum mundificatiua domestica. Secundo substantia deperdita restauretur cum dragaganto, gummi Arabico, thure, mastiche, corallis, spodio & similibus, exhibitis cum aqua saccharata, hordei, ferrata, uino nigro stiptico, & similibus. Ultimo sigillantur cum notabiliter exiccantibus, sicut cornu cerui usto, lapide hæmatitis loto cum aqua plantaginis, balauftiis, & similib. exhibitis cum aqua plantaginis, balauftiis, & similib. exhibitis cum aqua ferrata, & possunt cum iulep, aut saccharo ros. dulcorari. Et conglutinatiua post mundificationem iuuant cooperiendo membrum, & defendendo ne ab aliis cibis, aut humoribus lædatur. Lac autem complet multa ex his intentionibus abstergendo, & proprie cum melle, aut saccharo permixtum, & est optimum consolidatiuum, & proprie calibeatum, aut permixtum cum pulueribus consolidantibus, de quibus supra, & cum hoc est remotiuum malæ complexionis calidæ proprie acetosum. Et ad has intentiones ualeat syrup. & iulep, & rob, sicut de agresta, de citoniis, de piris, & similes. Item mel. ros. & possunt misceri cum mundificatibus, & substantiam deperditam regenerantibus, & cicatrizantibus secundum exigentiam. Et si ulcus sit in meri huiusmodi in quibus sermo præcessit misceantur cum his, quæ habent tardare descensum medicinarum per meri, & sint mixta cum inuisantibus facientibus ipsa adhærere superfici ei meri, ut per moram & meliorem applicationem melius imprimant, præterea exhibeantur in forma electarii, & confectionis solidæ, sicut diadragaganthum, & similia, & paulatim deglutiantur, & in descensu longam morā contrahant. Quod si ulcus corrosiuum fuerit, nihil est præstantius quàm succus plantaginis cum bolo arm. Et si adsit fluxus sanguinis cum his misceatur lapis hæmatitis lotus, trochisci de charabe, de terra sigil. & similia. Et si fuerit necessarium soluere uentrem, solutur cum leuibis, sicut manna, casia, mirobalanis, & similibus. Curen- tur autem accidentia secundum ipsorum exigentiam. Solutio quidem uentris cum trochiscis de spodio, cum sem. acetosæ, & rob, stipticis, & aqua sauc, id est, hordei torrefacti. Vomitus autem curetur sicut dictum fuit in cap. proprio, dicta autem proportionetur intentionibus regiminis particularis, ut dentur mundificantiæ, incarnantiæ, aut carnē generantiæ, & sigillantiæ secundum exigentiam intentionis perficiendæ.

De singultu. Cap. 84.

Singultus Græce lymos, Arabice alfoach. Et apud Aui. descriptiue est motus diuersus compositus, sicut spasmus constrictiuus cum tensione dilatatiua existens in ore stomachi, aut toto corpore eius, aut meri, ex quo aggregatur seipsum cum spasma fugiens a nocente si fuerit nocens, aut præparatus ad motum fortis expulsiōis sequentis ipsum sicut accidit ei qui uult, & assimilatur alicui modorum motus tussis, quæ est in pulmone & uelamine ad expellendū humorem, aut si non sit nocens, imo sit secundum semitā superfluitatis siccitatis mouētis ad similitudinē aliquā sicut spasmus, & natura moueat ad dilationem & nō obediāt illud, & succurrat ei. Dicitur primo motus diuersus, scilicet motibus naturalibus. Compositus scilicet ex contractione & dilatione in quo est contractio & tensio dilatatoria. Sicut spasmus constrictiuus, cum tensione dilatatiua, id est, sicut spasmus in fieri in quo est contractio & tensio dilatatiua, non autē in spasmio facto, quia singultus non est uere spasmus, cum neque meri, neque stomachus sint membra lacertosa. Est autem spasmus passio membri lacertosi, ut superius declaratum fuit in cap. de spasmio. In ore stomachi uel meri, uel in toto corpore stomachi, cum aliquando solum os stomachi, aliquando meri cum ore stomachi, aliquando totus stomachus singultet, licet principaliter singultus, & tremor ori stomachi tanquam parti sensibilibus approprietur. Ex quo aggregatur ad seipsum cum spasmio, id est, cum contractione, fugiens a nocente si fuerit nocens, aut præparatus ad motum fortis expulsiōis sequentis ipsum, scilicet spasmus, id est, contractionem. Sicut accidit ei qui uult, id est, in motu uoluntario sicut in proiciendo lapidem. Et assimilatur alicui modorum motus tussis, non uoluntariæ. Quæ scilicet tussis, est in pulmone & uelamine, id est, diaphragmate, ad expellendum humorem, si adsit in stomacho humor expellendus, aut ad expellendum aliud, si ad sit

Io. Arculani

V 2

si ad sit

si adfit aliud læsurum, quod non sit humor, sicut superflua siccitas in stomacho cōtrahens, sicut spasmus de inanitione. Et natura moueat ad dilatationem & nō obediāt illud, scilicet siccitas. Et succurat ei, uirtus nanque dilatat, sed siccitas cōtrahit & constringit. Et sic in singultu de inanitione sūt duo motus oppositi, scilicet dilatio facta à uirtute, & constrictio à siccitate facta, & etiam à uirtute sentiente nociū quē primo se dilatat, ut deinde impetuosius constringendo melius nociū excutiat. Pro cuius definitionis declaratione, notandum primo quod in expulsiōe duo reperiunt motus. Vnus est pura contractio, sicut in expulsiōe cibi digesti à stomacho per pylorū, contrahendo enim se expellit ipsum ad intestina. Alius est impulsio quādā quando post contractionem, uel simul cum ea est etiam impulsio membri, ut manu expellente lapidem manus mouetur ad sequendū motum lapidis per certum spaciū. In singultu ergo est uterque istorum motuum oris stomachi meri, uel totius corporis stomachi contractiū & impulsū, ideo dixit compositus. Secundo notandum quod assimilatur singultum tussi, & cum sternutatione assimilatur tussi, ut superius ostensum fuit, sequitur quod singultus etiam assimilatur sternutationi. Assimilatio autem est in hoc, quia in tussi primus motus est dilatio pulmonis, diaphragmatis, & pectoris ut pulmo impleatur aere, ut adiuuet pulmonem ad expellendum, postea est constrictio pulmonis, pectoris, & diaphragmatis cum impulsione ad superiora, ut simul cum adiutorio aeris subleuantis humor expellatur. Et hi duo motus sunt in cerebro sternutante. Primo dilatio cerebri ut aere impleatur. Secundo constrictio cum impulsione aeris & humiditatis expellenda sicut in singultu uomitus, & subuersione sunt isti duo motus. Primo dilatio oris stomachi, meri, uel totius stomachi, nō quidem ad recipiendum aliquid in adiutorium, sicut in tussi & sternutatione, sed ad impetuosius attrahendum cū impulsione, sicut uolentes proicere lapidem, retrahunt manum posterius ut impetuosius moueatur ad proiciendum. Secundo est motus contractionis stomachi cum impulsione ad expellendum. Sed contra sequitur diffinitionem istam uomitus & subuersioni competere. Dicitur quod licet in motibus iam dictis multum simulentur singultui. Est tamē differentia in hoc, quia motus iam dicti precipue posterior, scilicet contractio cum impulsione sunt in singultu cum uibratione, sed in uomitu & subuersione, sine uibratione. Notandum tertio, quod motus contractionis membri est propter duas causas. Vna ut fugiat, licet post fugam aut fugiēdo expellat, sicut manus ab igne combusta fugit se retrahēs, licet postea se concurat ad expellendum. Secunda ut non fugiat, sed ut fortius expellat, sicut uolens fortiter lapidem proicere, manum retrahit simul cum lapide, ut impetuosius manum extendat ad proiciendum lapidem. Et hæc duæ causæ contractionis membri sunt imaginabiles in cerebro laborante epilepsia, aut sternutatione, & in pulmone tussiente, & stomacho singultante, cum non à re nocente, præter modum læduntur, & stimulentur, intentio contractionis est ad fugam nociui, unde potest esse quod huiusmodi membra primo se contrahant antequam dilatentur, & forte in illa contractione absque potenti dilatatione expellent nociuum. Si uero à re lædente parum stimulentur possibile est ut contrahantur non ad fugam, sed ad expellendum rem lædentem, sed in hoc casu prius se dilatant antequam contrahant, ut deinde impetuosius se attrahendo nociuum expellant, maxime hoc fiet cum id nociuum cum difficultate expelletur, licet enim huiusmodi membra in his operationibus, non tantum discursu, diriguntur tamen ut placuit Auer. Ab intelligentia non errante.

Notandum quarto pro declaratione prædictæ diffinitionis & dictorum Auic. in presenti capitulo differentiam esse inter rem lædentem & rem nocentem. Res enim lædens est parum lædens, & non multum deiciens uirtutem, ita ut uirtus stimulata remaneat tantæ potentie ut possit facere singultum, & duos motus ad ipsius integrationem concurrentes. Sed res nocens est intensè lædens, & ita uirtutē deiciens, ut non possit facere hos duos motus singultus integrantes, & facit tremorē, id est motum tremulum oris stomachi. Si cut etiā res parum lædens cor facit pulsū cordis in quo cor

mouetur motu constrictiōe & dilatatiōe fortibus ad expulsiōem nociui. Et res nocens facit tremorem cordis, in quo cor debilitatum nō potest moueri motibus fortibus, sed tremore faciendo motus paruos & inordinatos. Quæ res nocens si ulterius augeatur, inducit syncopim & tandem mortem. Et licet causæ singultus possint esse multæ fortes, semper tamen sunt minores, & minus lædentes in eadem specie causæ, & cum maiori fortitudine uirtutis quàm causæ tremoris stomachi. Ideo uidemus singultum de inanitione mortalem, & similiter alios singultus cum quibus æger ducitur ad mortem deficere, & remanere motum tremulum. Item etiam in corde prius deficere pulsū quàm tremorem. Nota tñ tremorem oris stomachi frequenter fieri in ipso dum est siccum sensibilibissimum & debile. Et simile de tremore cordis existimandū est. Auic. tñ in hoc cap. aliquando his terminis lædens & nocens, utitur ut synonymis. Aliquādo uidetur appropriare nocens causis facientibus singultum replendo, aut stimulo, sed lædens magis siccitatē & causis facientibus singultum inahiendo, sed de his non est habenda cura. Notandum quinto quod singultus est leuior motus, quàm uomitus propter duo. Primum quia leuis causa non potens facere uomitum facit singultum, quæ postea aucta faciet uomitum. Item quia in singultu secundum plurimum solum mouetur os stomachi, sed in uomitu os & fundus. Singultus est duplex proportionatus ad materiam, & nō proportionatus. Et proportionatus ad materiam duplex, quidam de repletionē, quidam de inanitione sicut de spasmō dictum fuit, & est aphoril. 39. sextæ particule. Quanquam non sit omnino similiter iudicandum de spasmō & singultu. Potest enim aliquis spasmus esse solum de repletionē, aliquis solum de inanitione, aliquis solum non proportionatus ad materiam. Quorum primi causa immediata effectiua est sola materia replens, secundi sola siccitas, tertii sola uirtus stimulata contrahens. Sed ad omnem singultum necessario concurrunt uirtus, cum sit compositus ex duobus motibus dilatatione & constrictiōe, qui non possunt causari neque à siccitate sola, neque à materia repleta sola, sed necessarium est unicuique istorum cogere uirtutem. Verum à uirtute sola possunt ambo motus perfici, nō concurrente aliqua alia causa, tanquam causa immediata. Et sic potest esse aliquis singultus solum non proportionatus ad materiam, sed nullus potest esse solum de inanitione, neque aliquis solum de repletionē.

Causæ singultus quædam sunt per essentiam, quædam per communitatem quædam primiciæ. Per essentiam sicut mala complexio siens siue materia calida siue frigida, uel sicca, calida mordicando frigida per contrarietatem. Item per contractionem & corrugationem quam facit in ore stomachi. Sicca autem si non fuerit confirmata quolibet humectante curatur. Confirmata difficile sed secundum plurimum est cū materia aut calida pungente, aut frigida grauante, aut mordicante si fuerit phlegma acetosum, aut corrugante & constringente si fuerit phlegma ponticum, aut melancholia quæ etiam exiccando iuuat ad singultum. Bothor quoque & ulcera in ore stomachi quandoque sunt in causa. Et quandoque singultus causæ sunt reliquæ uomitus, quæ remanserunt in ore stomachi imbibitæ uel adhærentes, ideo sepe singultus sequitur uomitum, et aliquando antecedit cum materia sit pauca, aut parum stimulans, & non sufficit ad uomitum quæ postea aucta facit uomitum. Item uentositates existens in ore stomachi est aliquando in causa, aut extendendo, aut sua acuitate stimulo, siue sit in stomacho genita ex humoribus, aut ci bis uentofabilibus, siue aliunde ad stomachum deriuata. Per communitatem uero à toto sicut in febribus calefaciēdo, aut exiccando, aut uapores uel humores acutos ori stomachi communicando quod maxime accidit in principiis paroxysmorum materia petente interiora. Item in crisi. in quibus materia, uel uapores ori stomachi communicant. Aut per communitatem à cerebro sicut in percussione capitis & in phrenesi in quibus per neruos reuerfos comparitur os stomachi, & est mortale secundum plurimum. Aut per communitatem ab hepate sicut in apost. eius, & proprie conuati comunicando, aut qualitatem solum sicut caliditatem, aut siccitatem & est deterius, aut cholera per ieiuniū, aut nocuentum solum per neruū colligantem stomachum cum hepate. Et

Et quomodo cunque fiat hæc communitas, oportet apostema esse magnum propter distantiam oris stomachi à concavo hepatis. Et de hoc loquitur aphorismus 16. septimæ particulæ. In phlegmone hepatis singultus malum. Aut per communitatem ab intestinis dum laborant uermibus, aut apostematib. aut materiis cuiuscunque generis uelut in cholica, & ileos, ut aphor. 10. secunde particulæ. In ileos nomitus & singultus malum. Item per communitatem à matrice in retentione menstruum, partu, abortu & similib. Item à uescicis, renib. & aliis membris oris stomachi communicare potestibus. Causæ uero primitiæ sunt, sicut aer frigidus. Item res comedæ sedentes acuitate, sicut res acetosæ, sinapis, diapiperon, helleborus, & cibus corruptus ad qualitatem acutam. Item cibi uentosabiles, aut multitudine sua aggrauantes. Item fames longa os stomachi exiccando, & quæcunque possunt os stomachi præter modum exicare, sicut euacuationes superflue & similia. Signa. Differt singultus à tremore oris stomachi, quia in singultu adfunt duo motus integrantes, scilicet dilatatio & contractio fortes & integri, sed in tremore diminuti, est enim motus tremulus ori stomacho, & est cum maiori uirtutis debilitate. Quod autem fit de repletione cognoscitur per grauitatem stomachi, extensionem, uomitum, subuersionem, & similibus, & quia subito, id est, in paruo tempore accidit & excrecit, & præcesserunt causæ replentes stomachum primitiæ, aut corporeæ, iuuatur fame, & reliquis inanientibus, nocetur à contrariis. Sed qui est de inanitione paulatim accidit & excrecit, & præcesserunt causæ inanientes, sicut febres acutæ, euacuationes fortes factæ in paruo tempore. Iuuatur ab humectantibus tam qualitatibus quam substantiis nocetur à contrariis. Sed non proportionatus ad materiam cognoscitur, quia nullæ tales causæ inanientes, aut replentes præcesserunt. Sed causæ tantummodo stimulant, & istæ secundum plurimum sunt primitiæ, aut lædentes os stomachi per communitatem non transmittendo humores, aut mala complexio in ore stomachi sine materia, ulcus, aut bothor. Sed ne confurgat error. Nota quod aliquando in febribus acutis & euacuationibus humores acuti commoti fluentes ad os stomachi causant singultum, quem medici propter causas præcedentes credunt esse de inanitione cum sit de repletionem, aut forte non proportionate ad materiam, sed de hoc certificamur prouocando uomitum, si enim uomitus stomachum mundificat, sedat singultum non est de inanitione. Si uero non sedatur, imo additur est de inanitione. Similiter si tolerantia sitis sedat, est de repletionem contra de inanitione. Sed qui fit per essentiam cognoscitur, quia est continuus aut cum pauca interpositione, sed mala complexio sine materia & cum materia cognoscitur per signa superiora posita in cap. de uomitu. Similiter ulcera, bothor, & apostema ex dictis in cap. de apostematibus, & ulceribus stomachi, & quia singultus sequens apostema uomitu non sedatur. Sed uentositas cognoscitur extensione absque grauitate, & quia eructatio ex carminantibus uentositatem facile sedatur. Sed qui fit per communitatem alicuius membri, aut communitate totius cognoscitur, quia non est continuus & præcesserunt nocimenta totius, aut membri communicantis cum quorum augmento augeat & decremento minuitur. Causæ autem primitiæ cognoscuntur ex earum præcesione cum similitudine effectuum.

Prognostica. Primum. Singultus malum protenditur, & secundum plurimum mortem in multis casibus. In apostemate hepatis, ileos, uulnere, aut apostemate cerebri. Secundum est aphor. trigessim. quartæ particulæ, nam singultus non cessans in uomitu, nec post uomitum, & oculorum rubedo notabilis significant apostema in stomacho, aut in radice nerui uenientis ex cerebro ad ipsum, aut in cerebro ipso, & sequitur ambo, scilicet apostema cerebri, & apostema stomachi, rubedo oculi per communitatem nerui uenientis à cerebro ad stomachum. Sed distinguitur inter utrumque per accidia apostematum cerebri, & accidentia apostematis stomachi. Tertium est Auic. in libro signorum mortis uelocis qui fuit Hip. Dicitur quod quando accidit singultus uehemens habenti apostema in latere dextro, ægritudines à natura, id est, à consuetudine præ magnitudine sua, uel quia sit singul-

tus habens solam contractionem propter fugam rei nocentis absque causa cognita, quia causa huiusmodi singultus diffculter cognoscitur, licet causa triplex reddita sit superius. Egreditur anima ex singulis ante ortum solis, id est, citissimè, significatur enim apostema magnum hepatis communicans nocumentum, non solum ori stomachi, sed cordi. Quartum. Qui cum singultu habet punctionem, uomitum, & currez, id est, spasmodum & destructionem rationis moritur, scilicet ualde cito. Significatur enim nocumentum esse tantum in stomacho, quod etiam maximum cerebro communicat. Quintum. Singultus de inanitione qui humectantibus non facile sedatur mortalis præcipue si spasmus ipsi coniunctus fuerit. Significat enim siccitatem fixam. Sextum. Reliqui singultus, qui neque inanitionem neque apostema sequuntur secundum plurimum salubres, &c.

Cum singultus post crassi cibi comestionem, aut uini ualde temperati adbibitionem superuenerit; aqua calida in qua cyminum, & mentha, & menthastrum, & parum thuris bullierint multoties in potu est sumenda, & agro ut dormiat est præcipiendum, & uenter uaporandus, & ieiunandum est ei. cum autem per multos dies à comestione abstinerit; iubendum est balneum saepe ingredi. deinde paucis cibis desiccantibus tamen est alendus, sicut sunt calagie & mutagenath cum seminibus, & puri uini parum in potu tribuendum. Et si hoc non suffecerit trochisci isti dandi sunt qui dicuntur de thure. Rec. thuris drach. 5. enule drach. 3. menthastrum sol. ruta sicca amborum aqua. drach. 2. sem. sisimbrij drach. 3. s. informetur trochisci ex eis pondere aur. 1. ex quibus unus in die cum apozemate cymini tribuatur.

Diuiditur præsens cap. in tres partes. Primo curat singultum à uentositate. Secundo de inanitione. Tertio dicit in cura singultus conuenire sternutationem & anhelitus retentionem. Secunda ibi. Quod si singultus, tertia in fine cap. ibi. Singultus propterea. De prima parte dicit. Cum singultus superuenerit post comestionem, cibi crassi, id est, propter suam substantiam crassam difficilis digestionis, sicut sunt fabæ, castaneæ, caro bufali, & similia, & post potum uini ualde temperati cum aqua, quia debilitando digestionem est causa uentositatis, & uos supplete quæcunque possunt multiplicare uentositatem, sicut cibi habentes humidum superfluum uentosabile sicut herbaræ & similia. Et sicut humores phlegmatici, aut melancholici in stomacho congesti, aut ad ipsum deriuati qui sunt apti uentofari. In his enim casibus post eductionem cibi, aut humoris uentosabilis cum abstinentia, cum euacuationibus oportunis, detur aqua huiusmodi calida. R. cymini, methæ, scilicet hortulanæ domesticæ, calidæ & siccæ, menthastrum, scilicet siluestris, adhuc calidioris & siccioris, licet mentha Romana habens folia longiora, & latiora sit adhuc magis calida, añ. 3. thuris. 3. 1. quæ omnia sicca bulliant in tribus lib. aquæ ad consumptionem medietatis & coletur, de qua accipiat stomacho ieiuno. 3. 3. & bonum est ut secum misceantur. 3. 2. diacymini, aut diagalangæ, aut parum fac. & sumatur debite calida tribus, aut quatuor diebus, & tardetur cibis per quatuor horas, aut quinq; & post eius sumptionem dormiat ad libitum, confere enim somnus & maxime stomacho ieiuno, hæc enim tria, scilicet fames, somnus, & exercitium optime cōferunt ad resolutionem uentositatis. Et uenter uaporandus est cum carminantibus uentositatem, sicut sacculis, fomentis, & huiusmodi, & hic debet per multos dies à cibo abstinerere, id est, parum comedere, potest balneum ingredi, scilicet, aut balneum actu & potentia calidum, sicut thermæ quæ præter uirtutem sulphuream qua omnes participant, sunt et participant uirtute ferrea, aut simili stomachi confortatiua. Cibi autem sui sint calefacientes, desiccantes, pauci in quantitate, sicut calagie et mutagenath, id est, cibi facti ex carnibus frixis in fartagine conditi cum seminibus, scilicet anisi, feniculi, & similibus, & aliquibus aromatis inter quæ præstantissimum est, galanga, & bibat parum uini uinosi puri, aut mediocris potentie, nam multum fortificat digestionem. His autem non sufficientibus ad curam decur huiusmodi trochisci. R. thuris. 3. 5. enule. 3. 3. menthastrum. 3. 3. Ioh. Arculani V 3 liorum

liorum rutæ sicæ an. 3. 2. foliorū nemen, id est, serpilli. 3. 3. s. formetur trochisci pondere aur. 1. Ex quib. unus in die exhibeatur cum apozemate, id est, decoctione cymini, hæc omnia calida sunt, & sicca uentositatem carminantia. Et per ista intelligit electaria calida famosa, sicut diacuminum, diagalaga, diatriopiperon, dialibanum, electarium de baccis lauri, & similia, & gariophili apud Auicem. appropriantur singultui.

SCHOLIA.

Ve dormiat est præcipiendum nam somnus auget calorem naturalem, qui uentos excludit. Est uaporandus legunt aliqui ligandus: puluinar enim præcipue anatis pluma factum uirtutem digestiuam reddit.

Quod, si singultus post feb. acciderit, fueritque cum eo tribulatio, aut nausea, aut sitis, aut in ore siccitas, aqua calida egro multoties tribuenda erit, non tamen repente, sed paulatim. & si sedatus non fuerit; aqua hordei cum oleo de amygdalis dulcibus detur. Spondiles quoque colli, & dorsi ex oleo tepido inungantur, & fricentur, & mucilago psylli cum iulep, & succo granati in potu tribuatur.

In parte ista curat singultum de inanitione. Et quæ dicit nota sunt, tribulatio, id est, cōturbatio & anxietas stomachi.

SCHOLIA.

Non tamen repente, sed paulatim si enim multa aqua & subito exhibeatur, uel de stomacho statim descenderet, uel singultum citius. Spondiles colli, & dorsi inungantur quoniam meri, & os stomachi maiori uinculo tenentur in parte posteriori, quam anteriori.

Singultui præterea, & sternutationi confert retinere anhelitum.

In hac parte dicit, quod sternutatio confert in singultu, quia confert conuulsando totum corpus, & stomachū, remouet materiā ab ore stomachi iuxta aphor. 13. sextæ part. culæ. A singultu habito sternutatio superueniens soluit aggritudinem. Et ex eodem fundamento tussis, & omnes fortes motus conferunt. Sed retentio anhelitus confert, quia corde inflammato inflammantur partes circumstantes, unde fit uentositatis & humorum resolutio. Propterea hæc intelligitur de singultu pendente à materia, uel uentositate.

Cura singultus à mala complexionem sine materia patet ex sæpe dictis superius, sola enim alteratione cum contrariis interius & exterius applicitis indiget, quæ tamen stomachum confortant, tam proprietate quam stipticitate moderata. Si tamen siccitas sequens humidi consumptionem propter febres acutas, aut euacuationes faceret singultum de inanitione, dux exiguntur intentiones. Prima est remotio, aut sedatio causæ exiccantis quod oportet. Secunda est, huiusmodi totius corporis, sed maxime stomachi qualitatiua, aut substantifica cum interius & exterius applicitis. Quæ dux intentiones iuxta posse complendæ sunt simul, sicut cum aqua hordei excorticati, cui syrupus uiol. posset addi, & parum uini granatorum dulcium, aut mizorum, aut uini citoniorum, si fluxus uentris esset in causa, non existente febre putrida, lac est sublime, & stante fluxu posset calibeari. Et detur aqua carnis, & iura carniū resumptiua alterata, secundū quod oportet & bibat uinum non antiquum aliquantulum dulce mixturæ permixtionis cum aqua hordei, & balneetur in aqua dulci tepida, & stomachus epithimetur cum oleo rosato, citoniorum, & similibus, & cibetur sæpe parum pro uice, & multum dormiat. Et si opus est uentris lenitione, fiat clystere cum lacte, aut aqua hordei, & oleo uiolato. Et si maiori in frigidatione opus sit, addatur succus cucurbitæ. Et apud Rasmungantur spondiles colli & dorsi cum oleo, sed proprie uiolaceo, & detur mucilago, psylli cum iulep, & succo granati, & oleum amygdalarum dulcium est optimum secundū omnem modum administrationis cauate non existente magno. Si uero singultus pendeat ab humoribus imbibitis natiuitibus, & inuiscatis, siue in stomacho congestis, siue alium de transmissis octo exiguntur intentiones.

Prima est digestio secundum humoris exigentiā, debent enim digestiua esse quantum ad qualitates primas contraria discrasia membri mittentis stomachi & humoris. quantum ad secundas incisua, si fuerint uiscosi, subtiliatiua, si crassi in-

uiscatiua, si fuerint subtile imbibiti, ut inuiscata cum eis euellant ipsos à membri superficie, & respiciant per uirtutes terreas & quartas, tam stomachum quam humores peccantes, imo membra mittentia quorum descriptiones possunt patere ex superscriptis. Secunda intentio est euacuatio materiæ peccantis tam uomitu quam secessu etiam reiterata secundum opportunitatem. Tertia intentio est diuersio cum clysteribus, ligaturis ex tremorum & ipsorum lotionibus. Item balneis diuertentibus materias ad cutem, & eas per poros cutis resoluentibus siue sint balnea aquea, siue aerea, item uentosis. Et apud Auicem in singultu antiquato ponantur uentose super stomachum sine scarificatione, & super dorso circa 13. spondilem ubi incipit os stomachi. Et post uentosas ponantur rubificantiæ ad attrahendum materias ad cutem. In quo casu inueni uescicatoria conuenire super eisdem locis applicita, nec minus etiam conferunt si ponantur super membris mittentibus, hæc tamen sunt de illis quæ debent postponi. Et in hac intentione ualent diuretica & aperientia porū felleum, sicut cum seminibus maioribus, decoctione radicū, asparagi, apii. Item aqua lupulorum, hordei excorticati, capillorum uen. cuscute, & similia, quæ secundum materiam diuersitatem sint diuersificanda. Quarta intentio est excussio materiæ ab ore stomachi, aut diuersio materiæ præter uomitum & secessum, de quibus supra. Conueniunt motus laboriosi sicut uociferatio alterius, aut clamor proprius, & ira timor, gaudium, tristitia, aspersio aque frigide improuise, cōuersio animi fortis ad aliquid audiendum, aut contemplandum, commotio corporis magna, currendo, saltando, equitudo, tussis, sternutatio, retentio anhelitus, & similia. Hæc enim aut materiam ab ore stomachi excutunt, aut corpus inflammando resoluunt, aut animam diuertunt, ut non percipiat tristitiam oris stomachi sensationem. Et ex hoc genere sunt dolores, secundum aliam partem corporis, iuxta aphorismum secundæ part. culæ. Quicumque dolentes &c. Quinta est obtusio sensus oris stomachi, maxime exequenda materia existente acuta sua acuitate pungens, & stimulan, & in stomacho acuti sensus, quæ intentio aliqui cōplectur cum humidis maxime unctuosius, ut butyro, brodis pinguis. Vel fiat electaria longiorē morā in ore stomachi cōtrahentia, ut R. diadragacanthi frigidi. 3. 1. butyri recetis sine sale, se. papaueris albi, sebesten, iniubarū ana. 3. 1. milce, & si hæc nō suffecerint misceantur cum his narcotica, sicut semen hyoscyami albi, camphora, semen lactuæ, mucilago psylli, & similia. Et possunt huiusmodi cum saccharo uiol. incorporari. Et apud maiorem necessitatem detur parum requiei, aut philonii, & huiusmodi opiata sine aliquo liquore exhibeantur, ut diuturniorem moram contrahant in ore stomachi, aut exterius applicentur aliqua opiata in ore stomachi. Hæc autem opiata, siue interius, siue exterius caute applicentur, ne nocuerint cordi communicentur, neque posterius circa 13. spondilem applicentur ne membrorum inferiorum sensus, aut motus impediatur. Sexta intentio est stomachi confortatio simul corrigendo malam complexionem in stomacho derelictam post humoris euacuationem. Septima est correctio accidentium perficienda secundum exigentiā. Ad has tamen intentiones sunt trochisci huiusmodi. R. costi, croci, rosarum recetium, mastic. spicæ ana. aur. 4. assari aur. 2. aloes, opii ana. aur. 1. conficiantur cum succo psylli, & bibatur ex eis medieta aur. psyllium enim & opium stupefaciunt, spica confortat & resolut, assarū inclinat humiditates ad partes urinæ, educēs eas per uias illas, aloes inclinat illas ad uiam fœcis, & extrahit eas per eam, costus, & crocus maturant & confortant calefacientes. propter hoc ergo sunt trochisci isti conferentes ualde singultui uehementi & subuersioni animæ, & sunt à me experti.

Octaua & ultima intentio est debitum regimen sex rerum quod tendat in contrarium discrasia. Aer ergo in discrasia frigida & humida declinet ad calidum & siccum, in calida & sic. ad frigidum & humidum, & sit boni odoris. Similiter dicta in calida & sic. sit frigida & humida cum aliquali stipticitate. atque portulacis, cucur. lactuæ, spinachis, endiuia, boragine, blite, acetosæ, farre, panicio, milio, robiliis, & similibus. Sed condiantur cum agrella, uino granatorum aut citoniorum, cum puluere coriandri, rosarum, sandalorū, &

& similia, & gelatina, limonea, myrtea conueniunt, & comedat carnes laudabiles, similiter alteratas, bibat aquam si confectus sit, aut eam bene toleret, si uero non, bibat uinum paruisimum optime limphatum. Sed in causa frigida, & humida dicta declinet ad calidum & sicum, unde utatur caparibus, foeniculo, petroselino, serpillio, iure cicerum, & similia, & condiantur cum aromatibus, sicut pipere, cinamomo, galanga, zing, croco, gariophilis, & similibus, & sit uinum antiquum uinolum purum, tamen parua quantitate, & similiter reliquum regimen ordinetur in contrarium discrasie. Cura autem apostematum bothor, & ulcerum patet ex dictis in cap. praesenti. Et similiter patet ex cap. praecedenti cura singultus a uerofitate. Si uero singultus sit per communitatem a toto, uel a membris particularibus cura patet ex his quae dicta sunt statim superius in cura malae complexionis cum materia siue in stomacho congesta, siue aliunde deriuata: praecipua enim intentio est habenda ad membra communicantia ut superflua eorum euacuentur, & mala complexio oppilatio, cetera nocumenta corrigantur, & tandem confortentur. Si uero singultus pendeat a causis primitiuis, ut puta ab aere laedente a sua caliditate aut frigida, locetur in aere contrario dispositioni impressae, & discrasia in stomacho impressa cum contrariis alteretur, ipsum confortando & praeriuando ne humores fluant ad stomachum. Et si sit a cibo corrupto, cura patet ex dictis in cap. de debilitate digestionis, & si pendeat a cibo acuto, aut medicina acuta mordicante os stomachi, primo uomitu aut secessu educatur, & eius acuitas frangatur cum sumptione aquae tepidae, aut aquae hordei in notabili quantitate scilicet usque ad .i. lib. uel duas. Et si fuerit necessitas maioris absterfionis, addantur in decoctione passulorum transmarinae paruae, nigrae, uel huiusmodi aquae misceantur cum syrupo acetoso, aut oximelle simplici. Et si pro educatione horum ciborum, & medicinarum acutarum necnon humorum ad stomachum defluxorum esset opus aliquo leniente, detur cassia, & manna cum decoctione prunorum, tamarindorum, sebesten, & similia lenientium, & lubricantium. Secundo corrigatur discrasia stomachi, & confortetur cum interius sumptis, sicut cum munda citoniorum, rob de granatis aut de citoniis, & syrupo de citoniis, quibus aliquid syrapi acet. addi potest ad incidendum & abstergendum, si quid imbibitum & inuiscatum in stomacho remanisset. Et exterius applicitis, sicut cum oleo rosato, de citoniis, & similibus. Et prohibeantur humores a fluxu, tum quietando eos somno & quiete, tum diuertendo secundum exigentiam, & corrigantur accidentia, & ordinetur debitum regimen in contrarium discrasiae. Si uero singultus pendeat a cibo crasso, uentofabili, aut habente humiditatem superfluum, aut a potu uini multum lymphati, aut crassi, multum similiter uentofabili, cura sufficiens dicta est in expositione textus circa principium capituli.

De appetitus laesione.

Cap. 36.

Appetitus qui est desiderium animatum cibi, aut potus sequens tristem sensationem oris stomachi est duplex. Alter cibi, & dicitur fames, quae descriptiue est appetitus calidi & sicci. Alter potus, & dicitur sitis, & est appetitus frigidi & humidus. Vterque laeditur tripliciter. Ablate quando omnino nihil appetitur, diminuitur dupliciter, per intensionem & remissionem. Per remissionem quidem cum minus appetitur quam sit necessarium pro nutritione corporis, & humectatione. Aut quando aliqua appetitur, aliqua non, ex his quae secundum naturam debent appeti siue cibalia, siue potabilia. Per intensionem uero quando magis appetitur quam possit digerere aut quam sit expediens pro nutritione & corporis humectatione. Et huiusmodi appetitus quando est ad cibum dicitur appetitus caninus. Sed quando ad potum dicitur sitis superflua. Et ex hoc genere est appetitus intolerabilis: sunt enim quidam qui dum famem notabiliter patiuntur incurrunt syncopim, cholera repente ad os stomachi, aut spiritibus praeter modum resolutis, aut incurrunt dolorem stomachi, & capitis: ista sunt corpora cholericum aut sicca tantum, acuti sensus, habentia poros latos & humidum facile resolubile. Et quaedam horum sunt corpora exuberantis carnis, habentia multum de calido & humido, sed habent ipsum subtile cum latitudine pororum, & omnis

eius calor innatus est fortis ualde, aut plurimus, & ualde debilis non potest famem tolerare. Bulimus autem est fames membrorum cum satietate stomachi. Sed appetitus corruptus, est appetitus quorundam quae non debent appeti ab aliquo indiuiduo de specie humana naturaliter disposito. Nunc uero sequendo ordinem Auic. Primo agatur de diminutione & ablatione famis. Secundo de corruptione eius. Tercio de appetitu canino, & de intolerabili. Quarto de bulimo. Quinto de siti. Causa diminutionis & ablationis famis potest esse omne genus malae complexionis in ore stomachi siue materia cum superfluit, caliditas quidem a quacunque causa pendeat, siue corporea, siue primitiua rarefaciendo raritate opposita corrugationi. Secundo attrahendo humores ad os stomachi, qui replendo famem deiciunt.

Tercio quia non finit os stomachi pati frigiditatem sequentem naturalem resolutionem, & aduentum melancholiae ad famem excitandam: frigiditas uero licet non excedens multum, excitat appetitum, quapropter inueniuntur Septentrionales ex uentis, & Hyems ex temporibus uehementiores ad excitandum appetitum, & qui iter peragunt in hiue uehementiores est appetitus ualde. Attamen cum superfluit est magis inter ceteras qualitates destruens appetitum, mortificando duas uirtutes, scilicet sensibilem & attractiuam, sed hoc est raro. Humiditas uero & siccitas sunt in hac re paucae impressionis, magis ad sitim minuendam & excitandam facientes quam ad famem. Humores quoque cuiuscunque generis cum superfluit in ore stomachi famem auferunt, aut minuunt, sed calidi magis, e contrario sitim excitantes, frigidi uero licet sitim minuant, & interdum famem excitent dum sunt pauci & non multi praeter naturales, & proprie phlegma parum acre, & melancholia pontica, attamen cum superfluit in praeternaturalitate aut multitudine auferunt, & minuunt nauasam, subuersionem, aut uomitum excitantes. Similiter ulcera, bothor, & apostemata in stomacho famem impediunt, sitim si calida fuerint excitantia. Diminutio quoque & ablatio sensus oris stomachi, siue sequatur aliquam ex causis supra scriptis per essentiam in ore stomachi, siue per communitatem a cerebro, aut tertio pari, aut sexto neruorum cerebri sitim & famem simul auferunt, aut minuit, per communitatem uero aut a toto, sicut in febris in quibus caliditas ori stomachi communicata, praeter modum calefacit, & exicat, sitim augens, famem minuens, aut auferens propter causas superius dictas, & aliquando repletio humorum qualitate aut quantitate peccantium in uenis facit ipsas fugere ab attractione & potius laborare ad expulsionem, quo modo in syncopali humorosa deicitur appetitus, & in multis aliis laborantibus non solum febris, sed aliis generibus agitudinum. Vidi enim mulierem laborantem fluxu uentris nihil comedisse, neque bibisse per octo dies nisi aquam frigidam, quae tamen superuixit. Similiter Teutonicum quendam febrientem nihil comedisse in .28. diebus cum omnia penitus abhorreret, sed solum bibisse uinum, quod euenit, quia eorum uena humoribus superfluis praeter modum erant repleta. Et hoc modo quandoque deficit appetitus praegnantium, & in quibus menstrua retinentur, quomodo etiam ursi per totam hyemam abstinent a cibo. Aliquando deficit appetitus propter debilitatem attractiuam membrorum, sicut in febriculis & aliis egris multum debilibus, in quibus membrorum uirtus attractiua deficit, non quidem ob defectum resolutionis, sed propter attractiuae impotentiam. Et aliquando deficit propter paucitatem resolutionis, sicut in frigidis ualde complexionaliter, aut atatiue, quomodo serpentes, ranæ, & cetera animalia debilis caloris in hyeme stant sine cibo, quia calor eorum sopitur & minuitur, ita ut quasi sola respiratione contenti: & nutritionem quasi nullam faciat, per communitatem uero a membris particularibus, sicut catarrhus a capite descendens, si figuratur in ore stomachi, aut inuisceatur & adhæreat deicit appetitum, & quandoque facit appetere contraria, scilicet incidentia, & subtiliantia si fuerit crassus & uiscosus. Item per communitatem a neruis uenientibus ad dandum sensum & motum ori stomachi, scilicet sexto pari, tollitur desiderium cum non percipiat succionem, neque melancholia impressionem. Item per communitatem a splene cum melancholia non transmittitur ad os stomachi, aut cum super-

Io. Arculani

V 4

fluc

siue transmittitur, aut nimis acris: Item per communitatem ab hepate cum debilitatur eius attractiua post fluxum sanguinis, aut alias euacuationes, aut cum ipsum, aut mesaraicę apostemantur, aut oppilantur, sicut in hydrope, aut etiam cum oppilantur uenę quę sunt post hepar. Item per communitatem ab intestinis sicut in colica & ileos, in quibus appetitus ad cibum deletur & sitis intenditur causis inferius ponendis in cap. propriis. Item propter uermes existentes in intestinis uiuentes, aut mortuos qui suis uaporibus nocent ori stomachi, & sic ascendunt ad stomachum multo magis uomitum excitando, licet aliquando chilum sugendo faciant appetitum caninum, ut infra in cap. proprio. Item per communitatem à corde, sicut cum oppressum est ueneno, aut sicut in pestilentiali prius cum os stomachi propter propinquitatem & maximam sensibilitatem facile compatitur. Propterea magna prostratio appetitus in principio uniuersali febris absque manifesta læsione ipsius oris stomachi est signum satis efficax super febrem pestilentialem. Item per communitatem à matrice & quibuscunque membris potentibus communicare stomacho communitate absoluta & non absoluta. Cause autem primitiue sunt, sicut caliditas aut frig. aeris superflua, aut ipsius occulta malitia, foetor superfluus & similia. Item cibi & proprie ualde pingues & unctiosi, aut superflue dulces & humidi, uigilię superflue resoluendo, & tandem infrigidando, licet forte in principio calefaciant. Somnus uero hebetando & multiplicando superfluitates, licet somnus & uigilię aliquando faciant appetitum caninum, ut infra. Item quandoque inanitio superflua debilitando, sicut econtra repletio superflua os stomachi replendo. Similiter motus & quies cum superfluunt, necnon animi accidentia ualde excedentia. Item res extraneę potentes occurrere. Et ex his dictis patet solutio problematis. Quare sumptio cibi aut potus aliquando suscitatur appetitum. Facit enim illud remouendo nocumentum stomachi quo appetitus obtundebatur, siue illud sit qualitas prima, ipsum corrumpendo sua contrarietate actuali aut potentiali, siue sit humor inuiscatus ipsum abstergendo, ab oris stomachi superficie, siue sit nimia raritas partes inuendo, siue sit defectus sensus oris stomachi ipsum excitando, siue sit defectus melancholię debentis fluere ad os stomachi pro fame excitanda, ut quia sumatur aliquid poticum supplens uices eius, propterea non omnis cibus aut potus excitat appetitum, sed tantum qui remouet causam appetitum obtundentem. Et cause de quibus supra cum sunt debiles minuunt appetitum. Auctę uero & magnificatę ipsum destrunt.

Signa malę complexionis sine materia sunt, quia non adest grauitas, neque uomitus humoralis, nec eructatio redolens aliquem saporem extraneum & species malę complexionis cognoscitur ex causis precedentibus, calefacientibus infrigidantibus, humectantibus, aut exiccantibus. Item sensatio illius malę complexionis in ore stomachi, & iuuatur contrariis, nocetur à similibus, humores autem cognoscuntur per saporem & calorem in ore perceptum, & eructationem præsentantem ipsos stomacho ieiuno, & per sitim si sint calidi & certificatur per eorum uomitum, & si humor est crassus & uiscosus, adest appetitus incidentium & subtrahentium, & nausea frequens, & limositas oris & linguę, & debilitas digestiōis.

Signa ulcerum stomachi superius posita, scilicet dolor, & egressus saniei uomitus, aut secessu, mollificatio uentris, paruitas morę cibi in stomacho, mordicatio cum sumitur aliquid acutum, signa apostematis superius posita sunt.

Signa obtusionis sensus oris stomachi sunt, quia deficit famę & sitis, & non percipit aliud stomachi nocumentum & res acutę nõ faciunt mordicationem neque singultum sicut diatrion piperon, syrupus scilliticus & similia sumpta stomacho ieiuno, & forte aliquod nocumentum cerebri, aut neruorum præcessit. Quod autem sit per communitatem à toto sicut in febris, ex febris ipsis cognoscitur, & quia sitis adest secundum plurimum, & si humores in febris stomacho communicentur cognoscitur ex signis statim superius positis, & etiam cuiusmodi humores sint. Quod autem sit ex repletionē humorum in toto, cognoscitur ex signis repletionis colligendis secunda primi cap. proprio, scilicet ex regi-

mine præcedente tumore uenarum, crassitie urinx, plenitudine pulsus, somnolentia, pigritia corporis, multitudine egestionis, & quia euacuatione, abstinentia, & exercitio iuuatur. Quod autem sit propter impotentiam attractiue membrorum cognoscitur ex corporis debilitate, & consumptione. Si uero membra non attrahant propter paucitatem resolutionis cognoscitur, quia forte corpora illa ualde frigida sunt complexionaliter, aut ætatiuē: aut aliter notabiliter infrigidata sunt. Et quia propter abstinentiam corpus non consumitur. Quod autem sit per communitatem a cerebro & neruis, cognoscitur ex nocumento ipsorum. Et si in causa sit catharrus, cognoscitur ex signis catharri, de quibus in capite proprio. Quod autem sit propter defectum melancholię transmittentis à splene ad os stomachi cognoscitur: quia si sumat pontica, aut acetosa appetitus excitatur, supplente enim uicem melancholię, & facit credere hanc significationem magnitudo splenis propter retentionem eius quod oportet ut effundatur. Quod si superfluat melancholia, aut si minus acris cognoscitur ex uomitu melancholię & sapore acetoso potico, ingetudine, et alteratiōe caloris corporis, & linguę ad nigredinem. Quod autem sit per communitatem ab hepate propter nocumentum attractiue cognoscitur, quia adlunt cause eius, scilicet mala complexio frigida, superflua euacuatio & proprie sanguinis, & aliquando, apostema, aut oppilatio eius, aut mesaraicarum, & quia non apparent alię cause. Signa autem oppilationis uisus quę sunt, post hepar sunt color malus & corporis consumptio: quia prohibetur sanguis penetrare ad membra, & cutis supficiem, & non apparent alię signa. Oppilatio autem hepatis cognoscitur ex grauitate, tensione, & quia frequenter adest fluxus. Quod autem sit per communitatem ab intestinis sicut in colica & uermibus cognoscitur ex signis inferius in propriis capitulis ponendis. Quod autem sit per communitatem à corde cognoscitur ex nocumentis ipsius, de quibus supra. Sed quod sit per communitatem à matrice cognoscitur, quia forte est prægnans, aut alia ex causa retenta sunt menstrua, aut forte adlunt alia nocumenta matricis, de quibus infra. Similiter quod sit per communitatem à quocunque alio membro cognoscitur per nocumenta ipsius cum quorū augmento augetur nocumentum appetitus, & decremento decrefcit, & ablatione aufertur.

Cause autem primitiue seipsas ostendunt: & quod quandoque tales cause adlunt talis sequitur effectus.

Prognostica. Primum, cum appetitus conualescentium non est bonus, aut cadit significat reciduationem, nisi sit per sanguinis paucitatem & debilitatem corporis. Secundum casus appetitus in ægritudinebus cronici est significatio ualde mala, imo nunquam uidi aliquem cuius appetitus destructio perseverauerit in ægritudine chronica & remissa qui euaderet, similiter contra, constantia appetitus in ægritudine chronica & intensa magnam affert spem salutis.

Cura diminutionis & ablationis appetitus exigit quatuor intentiones. Prima est remotio cause. Secunda appetitus excitatio. Tertia accidentium correctio. Quarta regimē sex rerum. Si ergo pendeat à mala complexionē sine materia remoueat causa ipsa aut imprimens aut conseruans, & qualitas impressa in stomachum cum contrariis interius & exterius applicitis propriis stomachum confortantibus, de quibus statim. Sed in mala complexionē cum materia, digeratur primo materia si fuerit cholerica cum syrupo acetoso simplici, oxisaccharo, de acetositate citri, limonum, de granatis, cauendo tamen à multum stipticis, & cum aquis endiuę, lupulorum, hepaticę, acetosę, & similibus. Sed phlegmatica cum oximelle simplici & composito, scillitico, melle rosaceo, syrupo de mentha, de abinthio, & aquis menthę, abinthii, foenic. & miua cytoniorum cum melle est propria. Sed in melancholica adluta cum syrupo de fumoterrę, de bisantii, & in non adluta cum syrupo de epithymo, syrupo saporis, & aquis lupulorum, boraginis, buglossę, scolop. & hæc digestiua respiciant præter materiam tam membrum mittens quā recipiens. Cauendum tamen ne digestiua sint ualde stiptica in principio & proprie in materia crassa & uiscosa, poltea euacuetur materia calida cum rhabarbaro, mirobol. citrinis, manna, prunis, tamarindis, electario de psilio, de succo rosę. Sed

Sed frigida cū alefanginis, pillulis stomatichis, de hiera simplicis, myrobolanis, kebulis conditis qui suscitant appetitum, sed melancholica cum polypodio, stoeade, epithymo, sena, dialena, electario hamech, pillulis indis & respiciant tam membrum mittens quā recipiens. Caueantur tamen iuxta posse fortia exoluentia, debilitant enim stomachum & membra nobilia. Aliquando euacuamus cū uomitiuis & est promprior euacuatio & magis festina quā uentris solutio, eligantur ergo uomitiua quæ uideantur magis opportuna. Sed de his ample in cap. de uomitu dictum est, & maxime fiat uomitus in his qui inclinati sunt ad uomitum & facile uomunt, imo etiam excitatio uomitus cum digitis impositis confert excitando uirtutem quamuis non uomant, & mirabiliter confert uomitus ei, cuius appetitus prostratus est in dulcibus & unctuosus, & appetit acetosa & acuta. Appetit enim contraria dispositioni suæ præternaturali, est itaque uerisimile destructionem appetitus sui pendere ab humore crasso & uiscoso, & hæc prima intentio etiā completur cum diuersione quæ fiat tam à membro mittente quā recipiente. eligantur ergo modi diuersi magis opportuni siue fiant sine euacuatione, sicut ligaturæ, frictions, uentofationes, lotiones, & similes, siue fiant cum euacuatione, sicut clysteria, prouocatio sudoris urinæ & huiusmodi. Si uero nocumentum appetitus pendeat ab apostematibus, borhor aut ulceribus in stomacho curentur sicut dictum est in capite proprio. Si uero pendeat adminutione aut ablatione sensus oris stomachi remoueaturo causa diminutionis aut ablationis, siue fuerit aliqua ægritudo cerebri siue ægritudo neruorum sicut paralyfis. Et de his superius in propriis capitulis sufficienter dictum est, siue fuerit mala complexio in ore stomachi aut humor in uiscatus in eius superficie, & de eorum cura statim dictum est. Si uero fuerit per communitatem à toto sicut in febribus humoralibus curentur digerendo & euacuando secundum quod expedit. Et qualitas stomachi impressa alteretur cum cōtrariis. Si uero humores stomachi communicati sunt euacuentur uomitu aut secessu, deinde tueatur stomachus, & confortetur ne recipiat cum propriis moderata stipticitate participantibus, appetitum excitantibus, & si pendeat à feb. hecicis curentur ipsæ, & dispositio stomachi impressa cum frigidis, humidis, stomachum confortantibus, & hecicis senectutis cum humidis & calidis aut temperatis in actiuis, & cum frictione & balneo perfecta & secunda digestione ut nutrimentum ad membra attrahatur. Et si fugit in toto repleto aut cacochimia sicut in scabie & lepra, phleboto metur aut euacuetur secundum quod oportet & membra nobilia & propria naturalia rectificentur & confortentur & in synopali humorosa in qua est repletio humorum crudorum obseruentur præcepta Auicennæ prima quarti capite proprio. Et frictions fortes & diurnæ in ea conferunt & in omnibus in quibus est necessarium superfluitate resolueri, & nutrimentum ad membra trahere, aut calorem sopitū excitare. Et si fuerit per communitatem à cerebro sicut in catarrho præmittatur cura cathartici. Et si quid ad stomachum defluerit educatur uomitu aut secessu, & postea stomachus confortetur eius discrasiam alterando. Et si fuerit per communitatem à splene superfluum transmittente melancholiā digeratur, euacuetur & diuertatur ad intestina clysteribus & solutiuis exhibitis, & si fuerit defectus melancholiæ in ore stomachi confortetur splen, aperiatur uena quæ est inter splenem & stomachum cum decoctione epithymi, polypodii, lupulorum, capilli ueneris, scolopendriæ, corticum radicum capparum & similia bibita, uel cum uesica faciendo fomentationes & fiant fricationes in loco transitus illius uenæ, & ali quando uomitus prouocetur proprie cum his in quibus sit uirtus ellebori & capparum, & trochisci de capparibus sunt ad propositum hoc, & si fuerit per communitatem ab hepate sicut in fluxibus curetur secundum quod dicitur in sequenti bus, & similiter oppilationes & apostemata, postea hepar & stomachus confortetur. Et similiter si fuerit per communitatem à corde curentur ægritudines cordis sicut dictum fuit superius, & per communitatem ab intestinis sicut in cholica & uernibus & à matrice, & à quocunque membro sibi communicante, curetur primo dispositiones membri communicantis, deinde stomachus rectificetur, uerum quia in pre-

gnante, menstrua non possunt prouocari, attendatur dispositioni stomachi, secundum quod est possibile, hoc tamen superius dictum est in cap. de uomitu quantum est opportunū. Nocumentum autem appetitus à causis, primitiuis curatur remouendo causas primitiuis & nocumentum stomacho impressum, postea discrasiam stomachi corrigendo, & ipsum confortando secundum quod oportet, & sic absoluta sit prima intentio quæ est remotio causæ diminutionis & ablationis appetitus. Secunda intentio scilicet confortatio oris stomachi & totius, & appetitus excitatio, perficitur octo modis infra scriptis, quæ perficiunt causas concurrentes ad ueram famē, quæ causæ sunt membrorum inanitio, ipsorum attractio à uenis, uenarum ab hepate, hepatis mediantibus meseraicis ab intestinis et stomacho, oris stomachi inanitio, melancholiæ à splene ad os stomachi deriuatio, tristis sensatio in ore stomachi, ad quæ sequitur, fames siue cibi desiderium. Si ergo membro non inaniantur forte propter pororum oppilationem aut debilitatem caloris resoluens & consequenter membra non attrahant à uenis nec uenæ ab hepate, nec hepar à stomacho, siat fricationes membrorum etiam iteratæ si oportuerit & proprie post somnum, & iam perfecta prima & secunda digestionem quādo scilicet est tempus distribuendi sanguinem ad membra, adhuc etiam conferunt balnea aerea & aqua dulcis & omnia que confortant quatuor digestiones. Secundus modus est procurare ut chilus cito penetret ad hepar, & adhuc ualent quæcunque remouent oppilationes & sunt subtilis substantiæ facile penetrantis sicut uinum uetus subtile, diacalamentum, mithridatum, theriaca in causa frigida, sed in calida triafandali, diarhodon abbatis post quæ bibatur parum uini limphati. Tertius modus est prouocare ut cerebrum sit bene dispositum & mundum à superfluitatibus cum spiritu temperamento & multitudine, & in summa uigore uirtutem animalem ad quem modum causa existerente frigida ualet theriaca, mithridatum, uinum uetus, diamuscum, diambra, diapiridis arcoticon zingiber conditum, secacal conditum. Confectio anacardina in causa multum frigida, Item acorus conditus, diacori & omnia quæ confortant neruos & neruosa. Et ex his aliquid potest teneri in ore quæ lambendo deglutitur. Sed in causa calida iulep & sacchar. ros. quib. aliquid diamusci aut simile possit permisceri. Vnctiones quoque applicitæ parti posteriori capitis in collo usque ad. 13. spondilem uigoroando neruum descendentem ad os stomachi, & ipsum os ad hoc conferunt.

Quartus modus est attrahere melancholicam ad os stomachi si defecerit, quæ attractio qualiter debeat procurari dictum est superius, & si hoc fieri non possit dentur aliqua uicem eius suppleantia, quæ excitent illam uirtutem sopitam, sicut in causa frigida, allium, piper album, nigrum enim minus est ultimum nisi materia esset nimis frigida, zing. cappares, oliuæ conditæ, pisces saliti, almuri, quod fit hoc modo. Accipiantur farinæ hordei partes duæ, salis pars una milcæ tur simul, & fiant fugaciæ siue panis depressus & ponantur in furno, usquequo comburantur paulatim intus & extra, postea frangantur, quælibet in tres aut quatuor partes & positæ primo in uase uitreo iterum ponantur in furno usque mane & istud est almuri, licet sint & alii modi. hoc possumus uti permiscendo cum aceto aut aliis modis, qui gustui magis placeant, hæc tamen calida non proprie suppleant uicem melancholiæ nisi quodam modo generali cum melancholia sit frigida pontica, sed in causa calida acetum, agresta, acetositas citri, citranguli, limones, uinum granatorum, berberis & similia, & ex his possunt fieri syrup. & possunt fieri condita sicut marinata, & aliquando facimus sapores addendo saccharum & mel, aut passulas & aromata ad libitum. Et quandoque cum his ponimus exiccantia sicut nuces, & similia. Ista enim pontica suppleant uicem melancholiæ, in frigidando & stipticando, & uillos longos uniendo quibus meliori sit attractio quintus modus est per abstersionem humoris inuiscati in ore stomachi, in superficie oris stomachi, ad quod conferunt cœpæ coctæ aut crudæ cum aceto, & aromatibus conditæ, & cui placet datur oleum. Item oximel simplex, aut scilliticum, & syrupus, & quæcunque absterunt & incidunt. Sed in causa calida, aqua decoctionis hordei, & passularum cum lacte, seminum communium frigidorum. Item ualent exiccantia humilitatis

miditatis stomachi, & proprie quando est subtilis, sicut panis biscoctus, & furfuraceus stomacho ieiuno. Et ad hanc intentionem laudat Auic. fauich hordei ablutam, cum aqua & aceto. Fit autem fauich hordei, accipiendo hordeum nouum antequam plena maturitate induretur, & ponit in uase aëneo uel terreo uitreato, & est melius, & super ignem leuiter torrefit, deinde fricetur & uentiletur, donec totus cortex recedat, quo cocto utuntur ad placitum, & in hoc casu laudatur uomitus cum oximelle & balnea bibita, quæ deponunt phlegma ex stomacho. Item exercitium stomacho ieiuno & longa abstinentia. Sextus modus est cum odoriferis ægro placentibus, sicut citonia, pira, poma, limones, arancii, citri, persica, pipiones assati, & cum uino citoniorum, & gariophyllis conditi. Et odor panis nouiter extracti de furno, & in summa ingenient in faciendo cibos odoriferos, saporosos, ægro placentes, & uideat alios comedere res diuersorum modorum. Septimus modus perficitur per ea, quæ à proprietate confortant. Inter quæ absinthium obtinet principatum suscitans appetitum mortuum. Secundo mentha, rob, & syrupus eius. Rob menthæ apud Auicem. Terantur granata, acerola cum corticibus suis, & de succo eorum accipiantur partes duæ, succi menthæ pars una, mellis aut sacch. pars una, siue quantum sufficit, ad faciendum gustui placidum, & est singulare, sed præparandum ad ignem facilitate, ut fiat bona commissio, cuius dosis in ieiuno sit cocleariū unum, deinde thus, mastix, gallia muscata, xiloloës, calamus aromaticus, banciae idest pastinacæ, schinanthum. Sed in causa calida, citonia cruda cocta condita. Item succus eorum, diacitonem, & apud Mesue confectio de citoniis facta cum succo citoniorum & ualet sine speciebus in causa calida. Sed cum speciebus quas ibi ponit ualet in causa frigida. Et quandoque potus aquæ frigide, in quantitate quæ non mortificet calorem innatum, rectificat appetitum, & proprie in consuetis. Medicamen proprium in conualescentibus ex febris. Recipe rosarū drachmas decem, sumach drachmas duas, cardamomi drachmam. 1. fiant ex eis trochisci. 2. drach. facit enim appetitum, & sedat sitim. Octauus modus est permiscere plura ex istis secundum diuersas intentiones, ita tamen ut opponantur causæ siue lapsui qui fuerit in ore stomachi & non solum compleatur huiusmodi per sumpta, imo quandoque per exterius applicata sicut fomenta, unctiones, cerata, & emplastra, quæ opponuntur lapsui, & sint excitantia appetitum, & non solum ponantur in ore stomachi, imo super toto stomacho, & ex propriis est ut coquatur citonium in uino nigro stipiteo cū pauco aceti, postea addatur panis biscoctus siue assatus & succus menthæ, piper longum, mastix, schinanthus, thus & similia, & potest fieri calidum aut frigidum, secundum exigentiam lapsus. Aliquando etiam rectificamus gustum linguæ, cum collutionibus, & his quæ masticantur, sicut cum uino optimo odorifero ægro placenti. Aliquando cum aceto aut oximelle. Aliquando facimus ipsos masticare passulas, nuces, auellanas, pineas præparatas, fistica, aliquando panem, & postea masticatum expuere ut humores & limositates in lingua inuisitate remoueantur. Pro tertia intentione, scilicet correctio accidentium sunt tria, quæ aliquando sequuntur ad nocuentem appetitum scilicet diminutio aut corruptio digestionis, de cuius curatione sermo præcessit. Item macrefactio, cui subuenitur dando cibos facili digestionis de eius curatione sermo præcessit. Item macrefactio, cui subuenitur, dādo cibos facili digestionis, citæ penetrationis, & multæ nutritibilitatis quæ gustui ægri sint conformia, quantum est possibile. Tercio aliquando casus appetitus perducit ad syncopim. Et cura eius apud Auic. est approximatio odoramentorum delectabilium, sicut hœdus lactens, & gallina assata. Et prohibeatur ei somnus, & cibetur cum conualescit, pane infuso in uino, & sumat sorbitionem uelocis nutrimenti. Pro quarta intentione regimen sex rerum declinet in contrarium causæ deficientis appetitum & sit excitans appetitum omnibus modis possibilibus, de quibus supra, uideatur itaque multum pinguiæ & oleaginea rancia, & quæcunque malo odore, aut sapore, aut alia mala qualitate participantia, & proprie ægro displicentia, & uideatur crocus, & eligantur quæ sunt boni odoris, saporis, & proprie placentia, & habentia tam qualitates manifestas, quam occultas ad hoc conuenientes, de qui-

bus in secunda intentione sufficienter dictum est, & obseruetur canones conuenientes in cibatione, scilicet ut non comedat, nisi præcedente cibi digestionē celebrata. Vnde fit notabilis distantia inter unam cibationem & alteram, imo prohibetur cibis spatio longo, & proprie in mala complexionē frigida materiali phlegmatica, ut materia illa resoluitur, aut aliter expellatur, ut per longam abstinentiam sequatur fames, sicut etiam aliquando somno longe tempore prohibito, postea sequitur somnus fortis, quo concessio fit in ipso profundatio. Et inter cetera non multiplicetur potus, sicut communiter faciunt, qui non possunt comedere. Ceteræ res non naturales taliter ordinentur ut non sint contrariæ causæ deiciendi appetitum.

De corruptione appetitus. Cap. 37.

Appetitus corruptus est appetitus rerum diuersarum à consuetis humanæ speciei. Et est duplex quidam minus corruptus, sicut qui declinat ad acerosum & acutum, & appetunt aliquando faciem aceti, aliquando calcem & similia. Quidam magis corruptus declinat ad excitatum, ualde sicum, sicut est lutum sicum, carbones, & restes ualorum, gipsum & similia. Et quandoque est declinatus ad aliquam inconsecta speciei humanæ, licet consuetæ aliis speciebus, quæ omnia eueniunt propter humores in stomacho exstantes affectos mala qualitate manifestas, uel occultas, diuersas à consuetis, faciente ipsos appetere cibos aliorum animalium, & quandoque res nulli animali consuetas, uidi enim quandam comedentem carnes crudas, quandam melicam & speltam. Et quandoque, ut supra appetunt res nulli speciei consuetas.

Causa huiusmodi est, quia stomachus præternaturaliter dispositus appetit contraria dispositioni præternaturali stomacho impressæ ut ipsam fugat & corrumpant, crasso autem & uiscoso opponuntur subtiliantia & incidentia. Sed humiditati superflua lubrica opponuntur exiccantia. Quod autem appetunt magis carbones, aut gipsum, quam panem utilitatum, qui est sicus & notabiliter exiccans, speciei humanæ consuetus, aut quod non appetat indifferenter omnia exiccantia æqualis incensionis & potentie sibi cognita equaliter non prouenit nisi ex quadam proprietate currere inter unum contrarium, & non alterum. Hic autem appetitus, licet possit accidere indiuiduis speciei humanæ, utriusque sexus propter multiplices uarias, & inconsectas humorum corruptorum dispositiones in stomachis ipsorum repertis, ex cibis & potibus corruptis, nec non ex causis corporeis accidere potentibus, frequentius tamen accidit prægnantibus in secundo aut tertio mense, propter retentionem menstruum, & ipsorum corruptorum stomacho communicationem. In primo namque mense retenta sunt pauca, & non admodum corrupta, sed supra tertium plurima eorum cedunt in nutrimentum foetus foetu iam magnificato, quare non ita superflua, ut stomacho communicentur, imo apud Auic. hic appetitus corruptus plus accidit in eis quam ipsius destructio.

Signa satis nota sunt & humor corrumpens appetitum cognoscitur ex odore, calore, sapore, eructuatione & similibus.

Prognostica. Primum, hic appetitus apud Auic. nominatur periculum, quia potest esse signum, & causa periculorum ægritudinum, & nominatur discrimen, idest, differetia, distinguitur enim per ipsum prægnans à non prægnante. Secundum hic appetitus secundum plurimum curatur, nisi sit à principis generationis contractus. Aliquando tamen est cura difficilis quæ non nisi longo tempore perficitur.

Cura huius est quatuor res præcedentes in cura prostrationis appetitus. Prima remouet causam. Secunda os stomachi, imo totum stomachum rectificat. Tertia curat accidentia. Quarta ordinat regimen. Pro prima intentione euacuantur sunt humores corrupti uomitu, aut secessu. Vomitus tamē est promptior uia si nauseauerit, & sit facilis ad uomitum, qui perficiendus est cum uomitiuis, de quibus sæpe dictum est. Item cum solutionibus integratis ex suis minoratiuis, digestiuis & eradicatiuis. Digestiua autem opponantur humori corrupto, tam secundum qualitates primas quam secundas, secundum plurimum enim humores huiusmodi sunt frigidi, propterea digestiua debent esse calida, ac frequenter sunt crassi, & uiscosi, & tunc digestiua debent esse incidentia & subtiliantia

subtiliantia sicut oximel: scilicet compositum & scilliticum, & quandoque sunt subtiles, fluxibiles, & digerentia debent esse exiccantia, abque incisione & subtiliatione, sicut mel rosatum. Et appetitus corruptus indicat, qualia debent esse digerentia, debent enim esse conformia appetitui stomachi, cum ipse appetat contraria dispositioni, præternaturali suæ. Solutiua autem sint propria, contra humorem peccantem. Et polipodium est proprium in appetitu luti & in prægnantibus. Et hierapicra obtinet principatum tam in humoribus crassis quam subtilibus inuiscatis, aut imbibitis, cuius dosis est unc. 1. pilulæ etiam sicut alephang. & stomachicæ & electarium de alchaf, descriptione Mes. est proprium & conceditur prægnantibus. Et mirbal. confortant stomachum, dosis eius est circa 4. drach. & aqua mellis pluribus diebus exhibitæ quantitas. 5. 3. aut plurium, lauat & mundificat stomachum & intestina à superfluitatibus in eis contentis, similiter aqua thermarum bibita sicut aqua Poretæ. Debent etiam humores diuersti sicut dictum fuit in capitulo præcedenti. Et de bonis auxiliis in curatione eius est ut accipiat res quæ appetitur sicut lutum & misceatur cum quibusdam uomitiuis, sicut sunt pinguedines rancidæ, oleagineæ. Et quædam à proprietate uomitum prouocantia sicut succ. raphani, aut drach. 1. el lebori aut pulueris, in liquore in quo est res quæ appetitur dissoluta infundantur taliter ut euomat, sic enim deicietur aut auferetur appetitus ille, & hoc modo facimus abhorre uinum illos, qui libenter bibunt, & inebriantur multum infundendo elloborum in uino taliter ut euomant. Secunda intentio perscitur cum corrigentibus discrasiam stomachi & ipsum confortantibus, ex quibus est aromaticum rosarium descriptione Gabrielis. Item diacinnamomum, & aliquæ triphæz, sunt ad hanc intentionem amygdalæ amaræ, uinum ponticum coctum usque ad medietatem, de quo bibatur in mane per hebdomadam unam. 3. 3. Et ruta est mirabilis iuuamenti. Item ameos, cyminum, & mastix commixta masticeatur. & belliricorum, embli. ana. 3. 8. nucis henden, quæ apud Auic. est terra granosa sicut cicer. 3. 1. mastix. 3. 8. cardamomi maioris, ameos zing. ana. 3. 1. fiat electarium cum melle, & deitur ad quantitatem nucis ante cibum & post. Pro tertia intentione scilicet, correctione accidentium, oportet aliquando curare digestionem corruptam quæ aliquando sequitur ad hunc appetitum corruptum, quapropter oportet euacuare huiusmodi cibos malos, quæ ab his appetuntur. Et secundo si assumpti fuerint statim ipsos educere uomitu, aut secessu, aut utroque modo. Et tertio digestionem corruptam si acciderit curare secundum doctrinam datam in capitulo præcedente. Regimen sex rerum declinet in contrarium discrasie. Cauendum est ab aere corrupto. Cibi conuenientes sunt pulli columbarum: aflati, farina amyli in iure carniū laudabilium cum sale condita, succio salorum, uinum ponticum. Et apud Aui. in secunda mensa uti ameos est ualde mirabile & similiter amyg. amaræ, fisticis, passulis, chrisomelis, castaneis, & inter omnes herbas ruta est præstantissima, & inter omnes species, piper, zingiber, & reliquum regimen sit contrarium discrasie, & humori corrupto, & procuret summopere ut bona fiat digestio.

De appetitu canino.

Cap. 88.

Appetitus caninus, licet apud quosdam sub appetitu corrupto reponatur, cum non conueniat alicui individuo de specie humana naturaliter disposito, imo uidetur transcendere naturam humanam, & sequi naturam canum uel luporum à quibus nomen sumpsit, unde apud istos non est inconueniens eundem appetitum ladi corruptæ & diminute per intensiorem. Attamen iuxta diffinitionem appetitus corrupti superius per me datam conformem menti Auic non est appetitus caninus sub corrupto appetitu ponendus, imo sub appetitu diminuto lasso per intensiorem nisi forte appetitus corruptus modum transcederet in appetitum res discoruenientes speciei humanæ, post quarum summationem non satiatur, tunc enim idem esset appetitus caninus & corruptus, licet secundum distinctas rationes. Est autem appetitus caninus appetitus intensus & pluris quam possit digeri & post eius summationem non satiatur. Hic appetitus est duplex, quidam qui sequitur causas quasi naturales aut neutrales sicut appetitus multum uigilantium & eorum qui

famem multo tempore perpessi sunt & superflue se exercitatum & balneatorum siue in balneis calidis resoluentibus siue in aquis frig. calorem intrinsecum per antiperistalticum fortificantibus & iter agentium per niues & aquas. Item conualescentium à longis ægitudinibus quæ arefecerunt corpus. Item euacuationem à natura uel ab arte, & ex hoc genere est appetitus sequens caliditatem fortem in ore stomachi, siue sit innata intrinseca siue extrinseca ab aere, quæ caliditas non sit debilitans nec inflamman, sed faciens id quod facit succio uenarum meseraicarum attrahendo in uirtute hepatis ad quem sequitur frigiditas propter resolutionem humiditatis substantificæ, & ex hoc genere est caliditas existens in totum si sit naturalis & notabiliter resoluens. Si uero ista caliditas esset præternaturalis causans famem præter modum resoluendo tunc appetitus esset præternaturalis, & sub hoc præternaturali reponitur iste qui sequitur debilitatem contentiæ cibi propter quem corpus non nutritur, & sub hoc præternaturali reponitur qui sequitur catarrhum descendente ad stomachum, qui non imbibitur in ore stomachi, neque etiam replet stomachum, sed solum infrigidat frigiditate excitante famem, & si catarrhus iste esset potius uel acetosus adhuc magis excitaret famem. Et sub hoc appetitu præternaturali comprehenditur ille qui sequitur succionem humiditatis cibalis à uermibus, aut quando stimulo faciunt ipsam descendere ut exeat sicut in lienteria. Quapropter corpus non nutritur, unde necessarium est sequi famem, præcipue si non ascendant ad stomachum turbantes & pungentes os stomachi, ita ut prouocent nauseam. Hi autem uermes aliquando corrumpunt appetitum sua mala qualitate potius occulta quam manifesta, quapropter secundum diuersos ipsorum effectus & applicationes aliquando minuunt, imo destruunt appetitum aliquando augent, aliquando corrumpunt appetitum. Et sub hoc genere comprehenditur sequens phlegma acetosum in stomacho congestum, aut aliunde deriuatum, aut melancholicam acrem, aut ponticam à splene ad os stomachi deriuatam, licet forte hic appetitus nisi modum excederet sub naturali, aut quasi naturali comprehendere posset, ducunt enim hi humores frequenter ad appetitum caninum. Primo, quia deponunt uiscositatem ab ore stomachi cuius præsentia impeditur appetitus. Secundo, quia corrugant os stomachi quæ corrugatio suscitatur appetitum. Tertio, quia inspissant, uniunt & fortificant uillos longitudinales quibus fit attractio, frigus quoque intensum aeris corrigendo & inspissando uillos longitudinales potest esse causa huius appetitus, sicut accidit iter agentibus per aquas & per niues, licet fortificando calorem intrinsecum per antiperistalticum hoc possit accidere sicut ab initio dictum fuit. Et in summa si hæc causæ fuerint naturales & quasi naturales, faciunt appetitum caninum naturalem aut quasi naturalem. Si uero multum præternaturales faciunt ipsam ægitudinalem, licet hic appetitus & omnes causæ eius non absoluantur ab aliqua præternaturalitate. Et ex his manifestæ sunt species & causæ appetitus canini. Signa. Appetitus caninus cognoscitur, quia est intensus. Et si homo eum sequatur, est necessarium iuxta Ras. cibum egredi indigestum per superius aut inferius, plus enim iuxta descriptionem superius datam appetitur quam possit digeri. Causæ autem primitiuæ, scilicet, uigilie, exercitium, balneatio, frigiditas aeris, aut superflua eius caliditas resoluens, longa fames & similes cognoscuntur, quia cum adsunt aut præcesserunt, secundum plurimum sequitur hic appetitus caninus. Et quia non adsunt aliæ causæ à quibus possunt pendere. Causæ autem per communitatem à toto sicut in cōualescentibus ex longis ægitudinibus resolutis & arefactis. Et sicut in habentibus calorem fortem naturalem aut præternaturalem præter modum resoluentem, & sicut in euacuatione superflua à natura uel arte cognoscuntur. Primo, ex præcessione illarum ægitudinum & corporis arefactione. Secundo ex caliditate forti tactu percepta cum colore rub. aut tendente in citrinum, & robore corporis, si caliditas illa fuerit naturalis, si uero fuerit præternaturalis, erit mordacior debita cum debilitate corporis & imperfessione operationum.

Signa tamen complexionis posita sunt secunda primi, ad quæ recurrit. Tertio uero ex præcessione euacuationum spontanearum aut artificialium. Et cum his & omnibus causis præ-

ter

ter modum resoluentibus secundum plurimum uenter est stipticus, quia natura retinet feces ut exurget, quicquid potest licet aliquando actualis fluxus posset esse causa appetitus canini. Catarhi autem cognoscuntur ex dictis superius in capitulo proprio, quod fluunt secundum plurimum non solum ad stomachum, imo etiam ad pulmonem, uerum existimo ipsos raro esse in causa cum magis sint apti appetitum destruerem quam intendere.

Signa uermium ponuntur infra. Signa autem causarum quæ sunt proprie ori stomachi sumuntur hoc modo, caliditas superflua oris stomachi comprehenditur ex siti, cum non solum exiccat humidum substantificum, sed etiam roridum, & est uenter stipticus, & est sine acetositate & rugitu, & similibus frigiditatem significantibus. Et contraria signa sunt dominantia, & si hæc dispositiones fuerint naturales appetunt similia, si uero præternaturales contraria, sed humor acetosus in stomacho cognoscitur ex eructatione, sapore, odore, non minus, redolentibus saporem acetosum, & quod homo non appetat aquam, neque res frigida, & si est phlegma, color linguæ est albus, & sputum album acetosum, & color faciei albus, & similia quæ sunt signa phlegmatis, & si est melancholia, color linguæ est fulcus, & sapor in ore representans enim acredine declinat ad ponticitatem, & forte adunt nocumen tum splenis, & signa eius qui est ex debilitate contentiæ in stomacho & in corpore sunt egressio festina cibi indigesti. Et si adsit debilitas contentiæ aliorum membrorum adsunt fluxus aliorum generum, & fortasse perueniunt ad sanguinolentam egestionem, & ad eandem quæ est sicut lotura carnis secundum plurimum, tamen his fluxibus dum acti sunt coniunguntur deiectionis appetitus.

Prognostica. Primum, appetitus caninus perducit ad bulimium, facit enim ut multus cibus sumatur, qui sumptus non potest digeri, & sic est necessarium iuxta Rasis ipsum indigestum egredi uomitu aut secessu & multas humiditates præternaturales in stomacho congeri & corpus non nutrir, quapropter sequitur bulimus qui est fames membrorum cum satietate stomachi, & ducit ad subeth propter multitudinem uaporum phlegmaticorum caput repletum, qui eleuantur ab humiditatibus phlegmaticis in stomacho congestis. Et ex eadem causa potest ducere ad mortem uaporibus illis eleuatis ad caput, in humiditatem phlegmaticam condensatis & facientibus apostema lichargicum, & etiam quia corpus non debite nutritur unde exiccat & arefit. Secundum, hic appetitus caninus secundum plurimum curatur.

Cum aliquis famem assidue patitur, & cibus post comestionem adeo grauatur, ut aut uomere, aut per inferiorem regionem ipsum eijcere cogatur & rixi dandū est ei quod dum coquitur ex liquore, qui fuit ab agno, qui in furno assatur, impingatur, & cauda, & ei similia, nec non ex omni cibo qui unctuosus est. & uinum uetus purum dandum, de quo quantum poterit, bibat. deinde præcipiendum est ei, ut euomat: & hoc regimen seruandum est donec sanetur. quod, & si nec cibus eum grauatur, nec ipsum euomit, nec per secessum expellit, carnes uaccinae sunt dandæ, & frumentum coctum, ut puls, & rixi cum lacte, & aquam frigidam in potu sumat: & in aere frigido moretur. hac autem agitudine laborans nihil acetosum, & stipticum, nec acutum comedat: sed dulcibus, & unctuosus solum utatur.

SCHOLIA.

Rixi &c. I cibi pingues relaxant adeo partes oris stomachi, ut nausea faciat; te capiat. Vinum uetus multum uomitum promouet: paucum uerò debiles humores resouit. Quod si uictus ratio appetitui correspondet describitur. Hac autem agitudine laborans iubet nil acetosum, nil stipticum, nec acutum dari; cum hæc corrugant uentriculum: & sic appetitum commouent.

Diuiditur hoc capitulum in partes duas. In prima parte determinat de appetitu canino pendente à causa frigida. In secunda de appetitu canino à causa calida. secunda ibi. Quod si neque cibus. Prima in duas. Primo ponit signa eius. Secundo curam, secunda ibi. Rixi est ei dandum. Quæ dicit in pri-

ma parte nota sunt ex superscriptis. In secunda parte curat appetitum caninum exhibendo rizum impingatum cum pinguedine cadente ex agnoidum assatur & exhibet carnes ualde pingues, sicut carnes existentes in caudis agnorum quæ sunt ualde pingues: hæc enim ualde pinguis, & similiter oleaginea destruit appetitum, postea dat uinum uetus in magna quantitate, corrigit enim malam complexionem frigidam, postea iubet uomitum prouocari, ut humor acetosus in stomacho existens educatur, & hoc multoties debet fieri donec sanetur, non tamen debet uomere omnem cibum, quia sic non nutritur. Sed exempli gratia, comedat & bibat copiose in prandio, ex his quæ dicta sunt aut similibus, postea euomat. Sed in coenis ex his unctuosus parum comedat, & uinum uetus bibat in moderata quantitate & illud retineat, & hoc pluribus diebus faciendum est donec sanetur. In secunda parte curans appetitum caninum à causa calida dicit, quod si cibus eum non grauatur, nec per uomitum aut secessum emittat. Ex quibus significatur calorem naturalem esse sortem, & bene digerentem, sed superflue resoluentem, danda sunt ea quæ sunt difficilis digestionis, & solidi & uiscoli nutrimenti, ne facile resoluantur, & cum hoc ad frigidum declinantia, & reperiatur complexio superflue calida sicut est frumentum coctum, ut puls optime coctum, est enim parum distans à temperamento uersus calidum temperatum in passiuis & ipsum clixatum sicut hic præcipitur. est apud Auic. tardæ digestionis, inflatum, plurimi nutrimenti super omnia alia genera. Et rizum calidum, & siccum coctum cum lacte, ad temperandum eius caliditatem, & bibat aquam frigidam, & moretur in aere frigido, de quo tamen est dubium ne per antiperistalsim fortificet calorem intrinsecum iuxta Aphorif. Ventres uere & hyeme calidissimi sunt natura. Sed credo Rasis non uelle debilitare digestionem, imo potius fortificare, sed bene prohiberet nimiam resolutionem humiditatis, quæ multo magis fit in aere calido quam frigido. Et si bene consideremus hic appetitus caninus est naturalis aut quasi. Vltimo dicit, quod laborantes huiusmodi appetitu non debent uti acetosis stipticis aut acutis, hæc enim excitant appetitum. Et in his qui habent fortitudinem caloris, cauendum est ab his quæ sunt facilis digestionis & pauca quantitatis, ne digestio corrumpatur ad fumosum.

Superest ut ordinetur cura appetitus canini, qui à quacunque causa pendeat exigit quinque intentiones. Prima, est remotio causæ. Secunda, appetitus obtusio. Tertia, stomachi confortatio. Quarta, correctio accidentium. Quinta, regimen sex rerum. Si ergo pendeat à causis primitiuis remoueantur, & nouementum si quod est per ipsas impressum, ut puta si fuerit à superfluis uigiliis, inducatur somnus aliquantulum superfluum, non tamen multum in longitudine & profunditate unius somni, imo in pluribus uicibus satisfiat, ita ut ubi conueit dormire semel in die naturali, dormiat bis & ter secundum opportunitatem. Similiter si sequatur longam famem detur cibus copiosus non quidem una uice, quia non posset digeri, sed potius pluribus uicibus inter quas tantum tempus mediet quod præcedens cibus possit digeri, & si sequatur superfluum exercitium inducatur quies opportuna eodem modo in reliquis. secundo appetitus obtundatur, & aliæ intentiones perficiantur, ut infra. Si uero appetitus caninus sit per communitatem à toto aut ab aliis membris, exiguntur quinque intentiones similes superscriptis, quarum prima est remotio causæ, uerbi gratia, in arefæctis ex longis ægitudinibus intendatur restorationi exhibendo cibum copiosum non in una uice, sed in pluribus uicibus, qui sit facilis digestionis, boni chimi & paucarum superfluitatum. Sed in habentibus calorem sortem præter modum resoluentem intendatur ipsius remissioni tam regimine cibali, quam medicinali, sicut cum syrups, confectionibus, electariis, aquis, epithimatis, emplastri infrigidantibus, quæ satis nota sunt. Et cum cibus frigidus sicut lactuca, acetosa, endiuia, portul. & dentur cibi præbentes nutrimentum crassum & multum, sicut frumentum, rizum, carnes grossæ, & similes, iuxta textum Rasis. & in omnibus in quibus appetitus caninus sequitur nimiam resolutionem, sunt pori cutis inspicilandi cum stipticis, sicut oleum myrtinum cum cera dissolutum, & sicut alumen dissolutum cum aceto, & ut abluatur aqua

aqua frig. nisi timetur caloris extinctio. Quod si sequatur, euacuationes superfluas sistendæ sunt, & similiter si sequatur debilitatem contentiæ membrorum confortanda est sicut dicitur in fluxibus. Et similiter si catarrhus fuerit in causa curetur sicut dictum est in c. proprio, & uermes similiter sicut dicitur inferius. Si uero causæ fuerint propriæ sicut caliditas aut frigiditas curetur cum contrariis interioribus & exterius regioni stomachi applicitis quæ ex superscriptis satis nota sunt, & phlegma acetosum, & melancholia acris pontica in ore stomachi educatur aut cum uomitu, est enim promptior uia, & sic iubet Rasis in litera, aut cum solutiuis, sicut sunt pilulæ alephanginæ, stomachicæ, hiera simplex & similes, phlegmate existente in causa, quibus præmittantur digestiua sicut oximel simplex, compositum, scilliticum, mel, & aquæ proportionales, & melancholia cum sena, epithimo, mirob. indis, diafenæ quibus præmittantur digestiua sicut syr. de epithimo, labor, & similes cum aquis proportionabilibus. & hæc digestiua & euacuat. respiciant tam membrum mittens quam recipiens. Et quandoque sanguine melancholico existente multo, aut splene apostemato confert phlebotomia basilicæ, & aliquando uentrosio super splenem confert probibendo transitum melancholici ad stomachum, & in summa à quibuscunque causis pendente exequenda sunt quinque intentiones superscriptæ. Quarum prima est remotio causæ complenda, ut dictum est. Secunda intentio, scilicet, obtrusio appetitus perficitur multis modis. Primo luadendo eis ut rationi obsequantur & non appetitui. Secundo, quod medicus faciat illis in mensa præsentari quantum est ipsis sufficiens & nihil aliud & cum comederint illud, abstineant ne præsentia obiecti eorum accendatur appetitus & intendatur. Tercio, quod sumpto cibo quantum uideretur sufficiens surgant à mensa & ad alias cogitationes se transferant. Quarto, si hæc non suffecerint sicut accidit in pueris, & quibuscumque aliis qui non obsequuntur rationi, nec sunt aliquo pacto tolerantiores famem cum surrexerunt à mensa, dentur aliis quæ paulatim comedant, quæ parum grauent stomachum, sicut aliquas passulas & auellanas aut philticos & similia, quæ ipsi rumpant, aut interim paulatim aliqua pauca comedendo appetitus sopiatur. Quinto, his non sufficientibus dentur in princ. aut in medio mensæ cibi potabiles sicut, brodium: hi enim appetitum magis obtundunt & non grauant digestionem. Sexto, his non sufficientibus dentur cibi fastidiosi ut insipidi, primo non cum sale & cæteris, non secundum consuetudinem debite conditi, deinde pingues aut dulces, & proprie pinguedine aut dulcedine fastidiosa. Cauendo ab acetosis, ponticis, stipticis, acutis, falsis. Septimo, sopiendo aut debilitando os stomachi cum intese frigiditas aut multum uiscosis adhaerentibus ori stomachi ægro dando foetida aut res habentes odores ægro displicentes. Item rancida aut aliquid putrefacta, quæ sint pinguis os stomachi digregantia & relaxantia. Et inter cætera ponatur multus crocus pro condimento suorum ciborum & potuum. Item pineæ antiquæ aut nuces rancidæ, & similia multum appetitum deiciunt, butyrum quoque deicit appetitum, & proprie quando fuerit antiquum horridi odoris & saporis. Et in summa omnia multum pinguis & oleaginea deiciunt appetitum. Vinum autem sit mediocriter potentia non stipticum, acre aut ponticum, de quo multum bibat siue intentio fuerit uomere, siue intentio sit depositio humoris uiscosi ex ore stomachi. Sed ratione uomitus prouocandi detur post alia cibalia abominabilia & ad uomitum disponetia aut simul cum ipsis. Sed ratione resolutionis aut dispositionis humoris uiscosi ex ore stomachi det stomacho ieiuno ne aliis cibis impeditum debilius operetur. Et si bibatur calidum ratione utriusque intentionis magis conuenit. Auic. tamen quando adest fluxus prohibet omne uinum: stipticum namque & acetosum augeat appetitum, sed amarum addit in solutione uentris forte quod insipida sicut quædam ferrariensis conuenient. Octauo, deicitur appetitus cum exterius applicitis sicut fomentationes ex mollificantibus ex decoctione malua uisci, malua, scænuæ, sc. lini, & similia, uel uesica plena huiusmodi decoctione tepida ori stomachi applicet. Item unctiones ex pinguedine mucilaginis, medullis & oleis mollificantibus cum butyro, & si huiusmodi exhibean-

tur per os amplius deiciunt appetitum. Cauendum tamen est summopere ne ex horum applicatione aut sumptione destruat appetitus. Est enim deterior destructio appetitus quam appetitus caninus. Tertia autem intentio, scilicet, confortatio stomachi perficitur cum moderate stipticis habentibus proprietatem ab ipso, & contrariis eius discrasia interioribus sumptis & exterius applicitis, non tamen exiccantibus appetitum quæ possunt patere ex superius dictis, & proprie in cap. de debilitate digestionis. Et muscus & laudanum confortant stomachum, & non augent appetitum, similiter crocus confortat stomachum & deicit appetitum.

Quarta intentio, scilicet, correctio accidentium perficitur sumptis ipsorum exigentiam. Vomitus quidem cura præcessit superius in i. cap. de dispositionibus stomachi, & similiter cura debilitatis digestionis in secundo. Et cura bulimi statim sequitur. Sed de fluxu uentris cuiuscunque generis agitur in sequentibus: hæc enim sunt accidentia quæ aliquando sequuntur appetitum caninum. Pro quinta intentione aer & reliquum regimen sex rerum declinet in contrarium discrasia, & melius est partiri cibum quam multum una uice exhibere. Et cauendum est ab acetosis, acutis, ponticis, stipticis & amaris. Et utendum est dulcibus, unctuosus & insipidis. Et apud Auic. uicellus oui induratus per affationem confert in fine mensæ. Somnus longus & multa quies conueniunt. Et ioci & ludi, & meditationes diuertentes animum à comestione & ciborum consideratione, & reliquum regimen magis speciale potest patere ex superscriptis in hoc capitulo.

De Bulimo.

Cap. 89.

Bulimus aliter dictus fames uaccina est descriptiue apud Auic. fames membrorum cum satietate stomachi. Sunt namque membra famelica indigentia nutrimento, sed stomachus respuit ipsum, & non habet species nisi modos diferentes secundum intensum & remissum.

Causæ bulimi sunt duplices, sicut duo sunt inclusa in quiditate eius. Vnum est membrorum desiderium sequens ipsorum inanitionem. Quæcumque ergo possunt esse causa inanitionis membrorum, possunt esse causa saltem partialis bulimi. Reliquum est satietas stomachi, id est, deiectionis siue destructio appetitus ac si stomachus esset satur. Quæcumque ergo causæ possunt minuire aut destruere appetitum, possunt esse causa saltem partialis bulimi. Bulimus itaque exigit causas quæ utriusque faciunt, scilicet, membrorum inanitionem & deiectionem appetitus. Istæ ergo causæ aliquando sunt unæ, id est, quæ una & eadem causa facit utrumque, sicut appetitus caninus modo superius declarato: facit enim ut multus cibum sumatur qui sumptus non potest digerere, & sic membra inaniantur, & cum hoc non digesto est causa nauseæ satietatis & deiectionis appetitus. Itæ frigus intensum explei gratia in agentibus iter per niues est aliqua causa congelationis oris stomachi & mortificationis uirtutis sentitque & attractiue eius. & tunc per antipéristasin potuit aliorum membrorum calorem fortificare. Item febres aliquando membra inaniantur, & tunc humores à quibus pendent ad stomachum repentes appetitum deiciunt. Item debilitas digestionis facit ut superfluitates in stomacho congerantur, & eadem facit ut deficiente nutrimento corpus inaniantur, & sic de singulis. Aliquid pendet à diuersis causis, nam potest obtundi appetitus per nocumentum nervorum cerebri uenientium, ad dandum ipsi sensum, aut propter catarrhum in ore stomachi inuisum, & tunc ex aliis causis corpus inaniri, & tunc per reliquas causas discurre, quæ possunt elici ex cap. destructionis, aut diminutionis appetitus, & ex hoc cap. appetitus canini.

Signa cuiuscunque causæ patet ex superscriptis in dictis capitulis. Signa namque inanitionis membrorum sumuntur à macie, complexionem calidam resoluente, & similibus. Sed signa causarum destructionis aut diminutionis appetitus positi sunt in capitulo proprio.

Prognostica. Primum bulimus quandoque ducit ad syncope, tum propter corporis inanitionem, tum propter nocumentum oris stomachi, cui cor compatitur. Secundum. Licet bulimus secundum plurimum curetur: tamen si longo tempore perseueret secundum plurimum ducit ad interitum etiam sine causa ualde manifesta. Cura exigit quatuor intentiones. Prima est remotio causæ uel causarum tam destructionis appetitus stomachi quam inanitionis aliorum

Io. Arculani

X

membrorum.

membrorum. Quæ causæ qualiter debeant remoueri, patet ex dictis superscriptis duobus. cap. scilicet in cap. destructio nis appetitus, & in cap. appetitus canini. Secundo est appetitus excitatio & oris stomachi confortatio, quæ qualiter de beat compleri manifestum est ex dictis in cura appetitus canini. Et inter cætera in lapsu calido administrantur odorifera sicut citonia, poma odorifera, arancia, limones, & quæ sunt ex ipsis & cum speciebus odoriferis sicut coriandri præparati, rosæ, flores lambrusæ, & camphora & similia, & in lapsu frigido gariophili, cinamomum, uinum odoriferum cum mica panis assata & aspersa gariophilis, & similibus, aromaticis, aut cum tortellis de feni, id est, pane biscocto infuso in uino optimo & comesto. Exterius etiam stomacho applicata ad hoc conferunt quæ sunt stiptica aromatica cum proprietate appetitum excitantia, declinatia ad contrarium lapsus, quæ apposita sunt superius in cap. destructionis appetitus. Pro tertia intentione corrigenda est syncopis aspergendo faciem cum aqua frigida, & ponendo sub naribus odorifera, & non finendo ipsos dormire & excitando ipsos à profunditate syncopis cum ligaturis, euulsionibus aliorum piloris, aut aliquo alio modo leuem dolorem inferendo, & cum titillationibus, & similibus ingeniis & cum euadunt à syncopi cibentur pane infuso in uino odorifero ne redeat syncopis. Et si possibile est prohibeatur antequam fiat cibando eos cum stipticis odoriferis suo lapsui contrariis. Quarta autem intentio, scilicet regimen sex rerum patere potest ex dictis cap. destructionis appetitus, & appetitus canini: debet enim declinare ad contrarium discripiæ.

Fames autem syncopalis iuxta Auic. est ut patientes ipsam non sint tolerantes seipsos cum sint famelici, cumque tardatur eis cibus superuenit eis syncopis & casus uirtutis.

Causæ enim sunt debilitas aut nimia sensibilitas oris stomachi, cui cor facile compatitur. Item nimia resolutio sequens aut fortem caliditatem, aut humidam substantiam & humorum subtilitatem aut raritatem texturæ & pororum latitudinē. Signa nota sunt ex superscriptis. Prognosticum. Fami syncopali facile subuenitur. famis syncopalis curatur cura syncopis & cura appetitus canini.

Et in summa cura uertitur circa duo, unum est ad curandum ipsos in dispositione syncopis, & de hoc sufficiens sermo præcessit in cap. syncopis, & in capitulo de bulimo. Aliud est ad curandum ipsos cum euadunt à syncopi, imo potius antequam ipsam incurrant si cognoscitur eius aduentus apud Auic. cibandi sunt pane infrigidato in uino, syrupo de fructibus, sed forte delectabilis erit si cum uino odorifero misceatur uinum citoniorum in quo panis infusus actu frigidus sumatur, aut si maior fuerit caliditas, misceatur cum uino uinum granatorum, aut uinum crispinum, aut de berberis, aut succus acetosifatis citri, limonum & similibus. & prohibeantur à somno plurimo, & non tardetur eis cibus, & cibentur frigidis actu.

De siti.

Cap. 90.

Sitis iuxta superscripta est descriptiue appetitus frigidus & humidus. Et est duplex. Quædam naturalis sequens causas efficiētes naturales, scilicet, uirtutis & caloris naturalis actionem, & propter fines à natura intētos, qui sunt humidus, & roridi, restauratio ciborum in stomacho melior commixtio, & consequenter melior digestio chili ad hepar & sanguinis ad membra melior penetratio, & quarto madefactio in locis necessariis sicut in lingua, gutture, pulmone, iuncturis, & similibus. Quædam sitis est præter naturalis. De cuius curatione hic agendum est, quæ potest ladi diminute, ablata & corrupte. Et diminutio dupliciter per intensiōem, & remissionem. Sed de ipsa læsa per intensiōem prius agendum est. Quæ est duplex, quædam enim est sitis intensissima in qua appetitur potus frigidissimus. Alia multa in qua appetitur potus multus, licet non ualde frigidus quarum causæ sunt distinctæ, quæ poterunt elici ex dicendis. Causa immediata cuiuscunque sitis est tristis sensatio sequens consumptionē humidis roridi in ore stomachi. Causæ uero mediæ quædam sunt extrinsecæ sicut aer æstuosus & ualde siccus, uinum potens, antiquum, calidum & sic. quod apud Gal. 2. interiorum perduxit serum notarij ad instantiam uigiliarum, alienatio-

nem & febrim, & tadem ad mortem. Item aquæ salæ de quibus Gal. ibidem. Et tempore meo quidam Quirinus nobilis Venetus cum tempestate impulsus pertransiisset Gades Herculeos cum. 60. socijs, solum cum quinq; socijs superuixit. Reliqui enim seruo sitis compulsi biberunt aquam salam, & mortui sunt solutione uentris superueniente, & dysenteria cum siti continua usque ad ultimum anhelitum. Ipse autem cum quinq; socijs qui superuixerunt biberunt urinam propriam ab aqua salâ abstinentes. Item cibi calidi acuti, sicut allium, piper, & similes. Item cibi salsi, sicut carnes, caseus, & pisces saliti. Item res crassæ, & uiscosæ faciunt sitim, quia natura quærit ipsas expellere lotionem, incisionem, & subtilisationem, ad quæ peragenda quærit potum in auxilium, & pisces saliti sunt causa sitis his tribus modis, quia crassi, quia uiscosi, & quia salsi. Item amara faciunt sitim, quia calida exiccantia, & dulcia quia inflammantur. Item, quia aliqua eorum acuitate participant sicut mel & ficus, item stiptica & pontica, quia expriment humorem ab ore stomachi comprimendo, & multitudo cibi cum paucitate potus est causa sitis. Item omnia putrefacta in stomacho sunt causa sitis. Item fomus longus superflue calefaciendo, & uigiliæ multæ nimium exiccando. Et fomus super crapulam & cibos calidos, quorum auget caliditatem, intendit sitim, licet fomus fortificando digestionem aliquando sedat sitim iuxta Aphor. 28. quintæ particulæ. Qui biberent appetunt. Quandoque enim superuenit sitis labore digestionis, quæ somnus sedat fortificando digestionem, & aliquando humectando sicut qui contingit ex siccitate meri, licet sitis præcipue fortis ex alijs causis cōtingens parum somno sedetur, sed potius potu. Item multitudo locutionis, exercitium longum aut intensum. Et accidentia animi corpus inflammantia aut exiccantia faciunt sitim sicut ira, tristitia, timor. Et sitis a morfu quorundam uenenosorum tam a proprietate quæ a qualitate manifesta ipsam exiccantem. Et uinum aut cibi in quo mortuæ sunt uiperæ faciunt sitim quæ nullo ingenio sedatur, insuper accidit sitis per communiatem a toto sicut in febribus & crisi, imo sitis significat crism significando commotionem antecedentem crism. Et quandoque in solutione uentris fit sitis, siue sit spontanea siue medicina solutiva, imo sitis sequens solutionem pharmaci significat secundum plurimum complementum operationis, licet quandoque antecedit propter caliditatem ipsius & siccitatem stomachi, quandoque tardetur ex causis contrariis, & per communiatem a membris particularibus, sicut a cerebro cum præter modum supercalefit aut apostemat, & proprie apostemate calido. Item per communiatem a membris spiritualibus sicut à pulmone, corde, & similibus, cum præter modum inflammatur. Item per communiatem à meri, fundo stomachi, intestino ieiuno & cæteris, cum præter modum calefiunt & exiccantur. Item per communiatem à renibus & cæteris membris urinalibus, sicut in diabete & apostematibus, & ulceribus renum, & uesciæ. Item per communiatem ab apostemate cum inflammatur & apostemat, aut cum oppilatur, siue oppilatio sit in ipso, aut in meseraicis, aut in uenis, quæ sunt ultra hepar prohibens transitum humiditatis debent membra humectare, & hoc modo accidit sitis in hydropo & colica in ileos. Et inter cætera fundus stomachi & meri plus communicat ori stomachi, quia sibi continua & post ipsa cor & pulmo, quia uiciniora ori stomachi, licet hepar sit propinquius fundo. Postea intestina, &c. quæ supercalefacta aut exiccata possunt esse causa supercalefactionis aut exiccationis oris stomachi. insuper accidit sitis per proprietatem in ore stomachi. propter caliditatem aut siccitatem eius superfluum sine materia aut cum materia per se calida, aut per putrefactionem materia imbibita, inuiscata, aut apostemata.

Signa causæ primitiue cognoscuntur ex sui præcessione, & ex similitudine effectuum naturæ suæ, & quando non adsunt causæ corporeæ à quibus possit sitis pendere. Causæ uero per communiatem à toto aut membris particularibus cognoscuntur ex nocuentis totius, aut membrorum particularium cum quorum augmento augetur sitis, diminutione diminuitur. Oppilationes autem cognoscuntur, quia si sint in hepate aut meseraicis aut uenis quæ sunt ultra hepar secundum plurimum adeit uentris solutio, si sit in intestinis

testinis adest uomitus, & prohibitio, secessus, & signum factæ causæ diabæticæ, est sitis uehemens quam non sedet potus aquæ, imo cum bibitur emittitur cum urina, & redit sitis, quare sunt sitis & prouocatio urinae sese comunicantes & æquales. Signa uero eius quæ sit communitate pulmonis, & membrorum spiritalium, sunt quod eam sedat attractio aeris frig. & uigiliæ conferunt ei resoluendo uapores, & somnus addit in ea accelerando uapores. Et siccio aquæ paulatim magis confert in sedando eam, quam forbere eam subito aliqua parte eius ad cannam resudante, quæ in subito descensu non resudaret, imo assumptio aquæ plurimæ subito quandoque congelat superfluitatem quæ deinde calescit & additur sitis in duplo, & sic expulsio sitis addit in sitim, quare non inuatur ab eis quibus inuabatur in princ. Et causæ proprie stomachi, scilicet calid. & siccitas sine materia, & cum materia cognoscuntur per ea quæ sepe dicta sunt in præcedentibus cap.

Prognostica. Primum. Quando aggregantur in ægritudine acutis sitis uehemens, & siccitas uehemens, est malum ualde. Secundum. Si sitis debite regatur secundum plurimū curatur aut temperatur. Cura sitis exigit quinque intentiones. Prima remouet causam sitis. Secunda sedat sitim. Tertia confortat stomachum. Quarta corrigit æccidentia. Quinta ordinat debitum regimen sex rerum. Si ergo causæ fuerint primitiue sicut aer æstuosus, uinum potens, aqua falsa, cibi falsi, aut acuti, res crassæ & uiscosæ, & similia, remoueat & inducatur regimen contrarium. Et res comedæ aut imbibitæ in stomacho existentes uomitu & secessu educantur cum aqua tepida sumpta in notabili quantitate, deinde remoueatursi discrasia per causas primitiuas impressa cum cõtrariis interius & exterius applicitis, quæ possunt esse manifesta ex sepe dictis, sed magis ex statim dicendis. Similiter si superfluitas somni aut uigiliæ fuerit in causa, nimia locutio, & exercitium, & æccidentia animi remoueantur, & inducatur regimen contrarium. Si uero pendeat à morfu uenenosorum, aut sumptione eorum sumpta educantur uomitu aut secessu, aut utriusque festinanter, & frangatur ipsorum audacia & uenenositas, & dentur bezahartica propria. Et similiter resistatur morfui ipsorum extrahendo uenenum extra, & prohibendo ipsum inclusum cum defensus supra locum applicitis, & intendatur cõfortationi membrorum nobilium, & ad remotionem discrasia sibi impressa cū contrariis habentibus proprietatem ad illud quæ supra quarto & octauo Alman. perquirenda sunt. Si uero sit per communitatem à toto sicut in febribus attendatur curæ febrium fm quod oportet, & uindandus est potus in principiis paroxysmorum & exacerbationum, quantum est possibile, sed sitis mitiganda est aliis ingeniis de quibus infra, similiter in crisi uitandus est multus potus ne materia impediatur, imo finatur operari & adiuuatur secundum quod oportet, similiter in siti per communitatem à membris particularibus attendatur correctioni, dispositioni membri comunicantis, & sitis mitigetur remediis opportunis de quib. infra. Sed si fuerit per communitatem à pulmone & membris spiritalibus, cū superflue calescunt aut excantur, intendatur ipsorum in frigidationi cum inspiratione aeris notabiliter frigid. & in hoc casu multum conferunt retenta in ore, & quæ labiunt declinantia notabiliter ad frig. & hum. Et aqua frig. lambendo sumpta. & si fuerit per proprietatem in ore stomachi propter malam complexionem calid. aut sic. in ore stomachi corrigatur cum cõtrariis, & si fuerit materia educatur uomitu aut secessu secundū quod oportet. Nunc uero iuxta secundam intentionem quæ est sitis sedatio memorabo octo modos sedandi sitim, quibus procedendum est, nunc cum uno, nunc cum altero aut pluribus simul secundum diuersitatem causarum sitis. Primus modus est cum his quæ olfacimus, aut super quibus anhelamus, sicut odorando poma, pira, citronia, rosas, uiolas, flores nenupharis, folia falicis, & similia, aut anhelando super aqua frigidissima, & hic modus maxime confert in siti sequente superflua calefactionem cerebri & membrorum spiritalium. Secundus modus est, per retenta in ore sicut frustum anguriz, cucumeris, melonis, cucurbitæ, prunarum, arancii, citri, pomi, & similia, qui prius sine infusi in aqua frigidissima & sepe iterata. Item saccharum cand. chrysalu & liquiritia, & hic mo-

dos maxime ualet in siti sequente calefactionem aut exiccationem meri, canna pulmonis aut membrorum spiritalium. Tertius modus est per collutiones & gargarismata cū aqua frigida sola, aut cui admixtum sit aliquid uini granatorum, aut aceti, aut succi citri, aut arancii, & similia de his quæ bibuntur pro sedatione sitis, & hoc maxime ualet in siti sequente dispositiones capitis maxime quando colluendo aut gargari zando facimus liquorem ascendere ad superiora uersus colatorium. Similiter in siti sequente dispositiones meri, canna pulmonis & spiritalium. Quartus modus est, epithematata aut unctiones frigidas circa gulam, collum, & spondiles usque ad. 9. & malum granatum cum lacte, aqua endiuia, acetosa, nenupharis, lactuca, quibus aliquid aceti potest admisceri ad penetrandum, aut ol. uiol. nenupharinum cū pauco ceræ & aceti: & hic modus ualet in siti merito cuiuscunque membri contingentis, cuius regio ungitur aut epithimatur, ita, quod si contingerit merito hepatis, renum & aliorum eorum inunctio aut epithimatio conferret. Similiter in siti per proprietatem in ore stomachi. Quintus modus est, cum somno fortificando digestionem, tamen per eius debilitatem accidit sitis, similiter humectando meri iuxta Aphorism. superius alleg. Similiter uigiliæ aliquando sedant sitim resoluendo uapores, qui in somno accelerantur. Sextus modus est, cum bibitis quæ in mala complexione calida & sicca, sine materia debent esse frigida actu & potetia. Sed ubi adsit materia cholerica aut falsa, aut alterius generis potius conueniunt actu calida, & proprie ubi materia sit imbibita aut inuiscata, quæ lauando abiciant materiam à superficie oris stomachi, sicut aqua calida simplex, aut decoctionis hordei, aut liquiritiæ, aut passularum: nec obstat quod dicitur tertio regiminis acutorum, quod aqua calida inflammatur, & in cholera conuertitur. Similiter prima quarti de cura febrium pestilentialium, aqua in pauca quantitate excitat caliditate, intelligitur quādo non est tanta, ut possit humores à stomachi superficie abluere, aut ad intellectum Auic. quando cõsequenter & paulatim exhibita tota conuertitur in uapores corpus inflammātes propter uehementiam caloris febrilis, non est enim extinctiūm tanto calori proportionatum, sed ubi sufficit humores à stomachi superficie abluere est conueniens. Aqua uero frigida forte noceret humores compingendo, & amplius eos circa superficie stomachi inuiscando, potus autem conuenientes præter supra scriptos qui aliquando sunt exhibendi actu calidi, aliquando frigidi, sunt infrascripti. Aqua hordei cum iulep uiolarum, aut iulep rosar. Item aqua cõcta mixta cum saccharo, & uino granatorum dulcium in materia frigida, uel mazorum aut acetosorum in materia calida. Similiter mucilagines, semina citoniorum, uel psyllii cum aqua hordei & saccharo, ubi non timeretur uentris lubricitas, similiter succi fructuum acetosorum, sicut acetositas limonum, citri, arancii, pomorum, pirorum, prunorum, marascharum, extremitates uitis soli aut bibiti cum saccharo & tamarindi sunt proprii ad hoc, & resistentes feruori materiæ cholericæ & sanguinis & debite dulcorati cum saccharo non stupefaciunt dentes. Et iulep facti cum huiusmodi acetosis optime conueniunt. Et à fide digno habui & expertum sum aquam frigidam cum debita quāitate aceti gustui sumetis proportionata esse optimum sitis extinctiūm. Verum diuersi potus eligantur secundum diuersitatem materiz. In materia phlegmatica mel ros. oximel simplex, syrupus acetosus simplex; in cholerica oxysacchara, syrupus acetosus, syrupus de acetositate citri, limonis, arancii, diaprunis simplex, syrupus uiolaceus. Et rob ex supra scriptis magis extinguunt sitim, sicut de berberis, de agresta, de citro, de limonibus, de sumach, de pomis, de piris, & similibus, quæ cum aqua saccharata possunt exhiberi & aliquando exhibemus aquas sublimatas, sicut endiuia, acetosa, rosarum, & similia. Quæ debent esse sublimatæ ad uaporem aque, siue ad balneum mariz. Et non ad ignem sicut communiter fit. Primæ enim sunt præstantes habentes odorem & uim rerum quæ sublimantur. Secundæ uero habentes odorem adustionis, siue declinantes ad fumosum sunt pauci inuamenti. Eius signum, quia non seruant odorem proprium. Quæ distillantur & quæ extrahuntur ex rebus frigidis minus in frigidant quā debent. Et quæ ex calidis ma-

Io. Arculani X 313

gis calefaciunt quam debent. Et cum hoc nulla feruant odo-
rem uim & proprietates rerum à quibus per distillationem
extrahuntur. Et suo malo odore & sapore displicent fac-
ientes agros renuētes uſum earum, & sic parum proficiūt.
Cæteris enim paribus magis iuuat cibus & medicina pla-
cens, quam displicens iuxta Aphorif. Parum deterior cib⁹.
Quapropter medici multum deberent eſſe uigilantes ut fie-
rent huiusmodi aquæ. Imo cæteræ medicinæ ſecūdum quod
oportet, cum aliquando oporteat iſtis aquis uti non tantum
ut medicinalibus, ſed loco potus ſicut in hydrope colica, &
ſimilibus, in quibus aqua omnino prohibetur, & aliquando
propter diſcrasiam calidam non poterimus uti uino. His er-
go potibus ſitis ſedatiuis aliquando utimur in parua quanti-
tate aut mediocri, aliquando in magna, aut una uice, aut plu-
ribus uicibus, non tantum propter ſitim quantum propter
cauſam ſitis, ſicut in cauſone, tertiana continua, ſynocha,
febre peſtentiali, in quibus de aqua aut alio potu infrigi-
dante exhibetur quantum bibere poſſunt. & hic modus ma-
xime ualet in extinguiſione ſitis per proprietatem in ore ſto-
machi & per communitatem à toto & à membris, quorum
diſcrasias oſtomiachi præter modum caleſcit & exiccatur, &
etiam ſi pendeat à cauſis primitiuis, de quibus ſupra. Sep-
timus modus eſt ſtupefaciendo aliquid ſenſum oris ſto-
machi cum intenſe frigidis actū & potentia, ſicut cum ſyr-
electariis, in quibus ſit uirtus ſeminis lactucæ, & proprie
nigræ, papaueris albi & nigri, mandragoræ, hyoſcyami uſ-
que ad opium, ſed de opio in modiciſſima quantitate, & hic
modus ualet in ſiti à quacunque cauſa contingente. Oſta-
uus modus eſt conuertendo mentem ad alia multum tange-
tia, ita ut ſitis obliuiſcatur, & hic modus ualet in ſiti ab om-
ni cauſa contingente ſi parua ſit. Tertia intentio, ſcilicet
confortatio ſtomachi perſicitur cum interius & exterius ap-
plicatis propriis, contrariis diſcrasie, habentibus ſtiptici-
tatem moderatam, de quibus ſuperius. Accidentia autem iux-
ta quartam intentionem corrigantur ſecūdum quod opor-
tet. Regimen uero ſex rerum iuxta quintam declinet in con-
trarium diſcrasie. Nunc uero, quia diminutio aut ablatio
ſitis eſt ſignum peſſimum, & proprie in ægri tudinibus acu-
tis, cauſas ipſius breuiter percurramus. Primitiua quidem
ſunt ſicut aer ſuperflue humidus, cibi quoque ſuperflue hu-
meſcentes actū & potentia. Somnus nimius, pauca inani-
tio, & quies corporea & animalis. Per communitatem au-
tem à toto ſicut ſunt ſuperflua repletio humiditatum phleg-
maticarum, paucitas repletionis, aut propter craſſitatem &
uiſcoſitatem humidi, aut propter ſtricturam pororum, &
paucitatem caloris. Per communitatem autem à capite eſt
aliquando cararbus phlegmaticus fluens ad os ſtomachi.
Aliquando nocumētum cerebri propter quod impeditur
ſenſatio oris ſtomachi, ſicut aliquando in epilepſia, lithar-
gia, & ſimilibus, aliquando paralyſis tertii aut ſexti paris
neruorum cerebri ſimiliter impediens debitum ſenſum oris
ſtomachi. Item quodcunque membrum poteſt communi-
care humiditatem ſuperflua ori ſtomachi, poteſt ſitim im-
pedire. Per eſſentiam uero ſunt humiditates ſuperflue ſi-
ne materia aut cum materia phlegmatica, imbibita, inui-
ſcata, natante in ore ſtomachi. Item quicunque lapſus com-
plexionis potens debitum ſenſum oris ſtomachi impedire,
quomodo aliquando in febribus acutis ſit tanta aduſtio in
ore ſtomachi, ut ſenſus eius prohibeatur, eius ſigna, quia
tota lingua eſt nigra & arefacta, tamen potum abhorrent.

Prognofica. Primū, quando in ægri tudinibus intenſiuis
ſicut febres acutæ & apoſtemata calida abhorretur potus,
eſt malum tam per uiam cauſæ, quia abſtinētia à potu eſt cau-
ſa arefactionis, quam per uiam ſigni, quia ſignificatur deſtru-
ctionem ſenſus oris ſtomachi, aut ſiccitatem & caliditatem
in eo factas & habitatas, propter quod non appetit cōtra-
ria, ſcilicet frigida & humida. Secundum, quando cūcunque adſunt
uehementes cauſæ ſitis & non eſt ſitis, eſt ualde malum & fre-
quenter pernicioſum.

Cura diminutionis aut ablationis ſitis exigit quinque in-
tentiones proportionales ſupraſcriptis in cap. præcedenti.
Prima eſt remotio cauſarum diminutionis ſitis. Quæ in-
tentio qualiter debeat compleri, patere poteſt ex dictis in
præcedenti cap. intentione prima. Secunda excitatio ſitis.

complenda oſto modis proportionalibus ſupraſcriptis in
præcedenti cap. Contrariorum enim eadem eſt diſciplina.
Cauendum tamen eſt ne excitando ſitim augeamus cauſam
diminutionis ſitis, ſicut ſi diminutio ſitis proueniret ex adu-
ſtione oris ſtomachi, & pro excitanda ſiti daremus calida &
ſicca, imo in hoc caſu & ſimilibus intendendum eſt cauſæ, &
quamuis non ſit potus eſt uiolenter exhibendus cauſa di-
minutionis ſitis contrarius. Tertia eſt confortatio ſto-
machi complenda cum propriis moderata ſtipticitate partici-
pantibus & contrariis cauſis diminutionis ſitis, & ſitim exci-
tantibus, niſi excitantia ſitim augeant cauſam ſitis, in hoc e-
nim caſu, ut ſupra dictum eſt, eſt cauſæ intendendum. Quar-
ta uero, ſi correctio accidentium perſicitur ſim ipſorum exi-
gentiam, puta corporis exiccatio remoueat cum potu di-
ſcrasie contrario uiolenter exhibitio.

Regimen autem ſex rerum declinet in contrarium cauſæ,
& cum hoc iuuat ad excitandum ſitim, niſi ſitim excitantia
cauſam augeant, in quo caſu intenditur cauſæ. Appetitus
autem corruptus ad potum, qui ſitis corrupta dici poteſt, ſi-
cut quando quis appeteret bibere urinam aut oleum, aut a-
quam marinam quantum ad quid rei, ſpecies, cauſas, ſigna,
prognofica, & curam patere poteſt ex his quæ dicta ſunt ſu-
perius in cap. de appetitu corrupto, ad cibum.

De anatomia hepatis. Cap. 91.

Iuxta conſuetudinem, præmittenda eſt anatomia hepatis.
Hepar deſcribitur eſt membrum principale magnum, ſi-
guræ lunaris in latere dextro ſub coſtis mendofis colloca-
tum, ex carne rubea, panniculo inuolente & ſuſpendente
uenis, quarum eſt principium ſecūdum medicos, unico ner-
uo, & unica arteria compoſitum, ex latere gibboſo & conca-
uo integratum uirtutis, & ſpiritus naturalis ſedes, & princi-
pium ad generandum ſanguinem ex chilo ordinatum. Eſt e-
nim primum membrum principale, cum ſit per propriū tem-
peramentum alicuius inſtrumentum uirtutis naturalis, ſcilicet,
& ſpiritus naturalis neceſſarii ad indiuidui conſeruatio-
nem. Et eſt magnum, imo maius quam in cæteris animali-
bus reſpectu ſuæ molis, quia debuit homo plurima calidita-
te & humid. abundare. Et quamuis Auic. dicat, quod anima-
lia multum comedentia & debilis cordis habent hepar ma-
gnum. Attamen non quamuis ſit fortis cordis habet hepar
magnum multi ſanguinis generatiuum, qui debuit in magna
quantitate in uenis contineri pro nutritione, quia nutritio
debit eſſe continua, non autem generatio ſanguinis debuit
eſſe continua, ſicut neque generatio chili, neque coſectio
debit eſſe continua. Eſt ſiguræ lunaris, id eſt, maior q̄ me-
dia luna, ſed nondum completa, cuius cōuexum eſt ſuperius,
concauum inferius, propterea apoſtemata hepatis ſunt ſigu-
ræ lunaris in qua differunt ab apoſtemate lacertorū uentris,
quod eſt ſiguræ longæ ſi ſit in longitudinibus. Et ſimiliter
in tranſuerſalibus & latitudinalibus eſt ſiguræ tendentis ſe-
cūdum latum, aut tranſuerſum uentris ſecūdum inceſſum
ipſorum. Eſt autem in latere dextro ſub coſtis mendofis col-
locatū, quia pars dextra debuit eſſe calidior ſiniſtra. Et quæ-
uis in mortuo cum anatomizatur appareat hepar multū ele-
uatum & multum comprimens diaphragma, quia tunc mem-
bra uitalia ſunt inanita calido exhalante, tñ non eſt ſic cum
diaphragma extremis coſtis iungatur, quapropter hepar ſub
diaphragmate continetur infra coſtas mendofas. Componi-
tur autem ex carne rubea quæ eſt ſicut ſanguis coagulatus à
calido & non à frigido, quæ caro in ipſo dominatur, & habet
panniculum inuolentem & ſuſpendentem generatum ex li-
gamento & neruo unico à cerebro uenientem. Ligamentum
autem uenit ex coſtis dorſi quibus hepar alligatur, licet dia-
phragmati ab eius concauo, cuius quinque rami tranſeunt ad
quinque pennulas hepatis, & ſubdiuiduntur & contextuntur
ad inuicem ad modum retis, cuius uacuitates replet caro he-
patis iam dicta. Rami etiā ipſius capillares uadunt uerſus
gibbum hepatis & ſecūdum ſuas extremitates obuiant ex-
tremitatibus ramorum uenæ chilis uenientium uerſus con-
cauum, ut ſanguis in hoc tranſitu per anguſta loca bene diger-
atur & perſiciat. Ex hoc apparet hepar eſſe ualde pronū in
oppilationes. Hæc aut facta fuerunt ut minimū chili ab hep-
te contangeretur, ut bona fieret ſanguificatio. Non aut ſic
fuit in ſtomacho, imo cibus tanquam in quodam uale colle-

ſtus

Quis est. Tum quia cibus erat crassus & non potuisset per loca angusta transire. Tum quia chylificatio non est ita perfecta digestio sicut sanguificatio. Ab hac autem uena portæ oriuntur multi rami egredientes hepar, quorum sex sunt manifesti. Vnus transiit ad nutriendum partem dextram stomachi inferiorem. Secundus transiit ad splenem deferens sanguinem melancholicum & est ualde manifestus. Tertius transiit ad nutriendum superiorem partem stomachi dextram. Quartus transiit ad nutriendum zirkum pro parte, & pro parte ad intestinum rectum. Quintus uadit ad colon. Sextus ad ilia & intestina gracilia. Et qui uadunt ad intestina componunt meseraicas per quas hepar fugit chilum ab intestinis. Agibbo autem oritur uena chilis & medicos ab Auic. dicta cœcaca, licet forte dignius sit propter causas supradictas in corde ut à corde oriatur, habet autem unicum neruum à cerebro uenientem ad constituendum panniculum ut det ipsi sensum, sicut & unica arteria uenit ad ipsum à corde ad dandum uirtutem uitalem. Est autem integratum ex latere gibboso quod est superius & concauo inferius, & est pennulatum, scilicet, quinque pennulis, licet non in omnibus sint manifestæ, quibus amplectitur stomachum ad uigorandum eius digestionem. Et habet uirtutes quatuor naturales, attractiuam, retentiuam, digestiuam, & expulsiuam. Attrahit enim chilum mediantibus meseraicis. Retinet ipsum donec sit in sanguinem conuersum per uillos transuersales, digerit per calorem eius principaliter fundatum in carne rubea, eius propterea sanguis est rubeus quamuis generetur ex chilo albo, expellit autem sanguinem per uenam chilis ad cor & reliqua membra. Sed superfluitatem cholicam ad Kistim felis mediante porro felleo existente sub pennula eius, superfluitatem melancholicam expellit ad splenem mediante ramo uenæ portæ, de quo supra. Aquositate uero ad renes per uenas emulgentes, meseraice tamen licet principaliter per eas attrahat hepar chilum habent tamen præter uirtutem attractiuam aliqualem uirtutem sanguificatiuam in uirtute hepatis sicut & uasa spermatica immutant sanguinem uerus naturam spermatis antequam ueniat ad testiculos. & ad hanc sententiam confirmandam Auic. 4. terti, cap. primo in fine, multas adiicit rationes, quas inutile esset prosequi. Reliqua posita in diffinitione sunt manifesta. Et ex his ita patet quod hepar est calidæ & humidæ complexionis. Et potest pati omne genus ægritudinum simplicis & compositæ, scilicet, malam complexionem cuiuscunque generis sine materia & cum materia. Item species malæ compositionis & proprie oppilationes, nec non solutionem continui etiam salubrem plusquam multa alia membra nobilitant, tum quia quietum, tum quia carnosum, & quia est sedes & principium uirtutis naturalis quæ fit consolidatio. Item potest pati apostema & uescicæ quæ rumpuntur, & consequenter debilitatem suam uirtutem quæ sequuntur aliquam aut plures ex ægritudinibus suprascriptis, propter quam aliquando corporis extenuatio, dolores, histeria, & similes. Ego uero præter tria capitula Rasis pro completiori doctrina intendo agere de debilitate hepatis & oppilationibus eius. Item de apostematibus & ulceribus eius. Nam hæc frequenter eueniunt. De fluxu autem hepatico loquar, cum agam de passionibus intestinorum. Reliquarum autem ægritudinum hepatis cura erit ex his manifesta. Sed ante omnia pro habendo ingenium curatiuum ægritudinum hepatis ponendi sunt aliqui canones seruandi in cura dispositionum eius. Primus est, quod medicinæ exhibendo per os dentur quando completa est digestio prima & secunda, & superfluitates harum digestionum sunt expulsiæ, & proprie hic canon obseruandus est quando exhibentur medicinæ aperitiuæ. Nam tunc temporis hepar est præparatum ad suscipiendum operationem medicinæ, & ad regulandum ipsam, quia tunc non est circa aliud occupatum & de aperitiuis maior est ratio, quia possunt secum trahere de chilo indigesto. Tempus autem primæ digestionis est circa horas octo. Tempus autem secundæ digestionis est secundum plurimum subduplum, & quia secundum plurimum nondum finita prima incipit secunda, communis terminus ambarum sunt decem horæ, licet isti termini non possint bene limitari propter diuersitatem corporum ciborum, & consuetudinum. Si tamé plus

differtur, non est inconueniens nisi in solutiuis, quæ non debent dari in fame, sed statim post complementum primæ & secundæ digestionis. Secundus canon, ut cum omnibus medicinis aperitiuis, quibus indigemus in morbis hepatis materialibus apostemosis, sicut in oppilationibus misceantur medicinæ moderata stipticitate confortantes, nisi forte timeremus siccitatem superfluum in propriis. Oportet enim semper intendere ad confortationem membri principalis, quæ maxime completur cum propriis moderata stipticitate participantibus. Tertius canon, quia subtilian-tium medicinarum, licet sint aperitiuæ, proprietas est ut au-cuant sanguinem, sicut aqua radicum aperitiuarum, & quan-doque generent humores diuersos disconuenientes per adu-sionem, & quandoque conuertant humores in lapideitate, sequi debent medicinæ lenitiuæ sicut calsia, & similes, ut mundificent, adustionem prohibeant, & petrificationem.

Quartus canon. uitata est omnis superflua calefactio & om-nis superflua in frigidatio. Primo, quia hepar est membrum principale indigens magna custodia, unde. 48. primi, cap. 1. Super membra principalia cum fortibus medicinis non fa-ciemus aliquid in quo sit ambigendum, quanto magis pote-rimus, ne nocumentum toti commune faciamus. Primo, quia nocumentum principalium est toti commune. Secun-do, quia alia non principalia à principalibus iuuantur. Ipsa uero principalia non sic iuuantur nisi à corde. Tertio, quia superflue calida colligunt substantiam hepatis quæ est lassa & debilis compaginis, indurant, & in lapidem conuertunt.

Hepar etiam est inclinatum ad lapsum calidum, sed inten-sæ frigida oppilant meatus & maxime uenas hepatis, & pro-prie capillares quæ sibi obuiant cum sint angustæ aptissime oppilationi. Item frigida inimicantur uirtutibus principa-libus hepatis maxime digestiue & attractiue, oportet ita-que illa commenfurare, unde quamuis merito dilcrasæ gra-tiæ gratia exempli deberentur cal. aut frig. in tertio, propter causas hic suprascriptas administrantur solum talia in secun-do. Ad quod adiuvat propinquitas hepatis ad uias susce-ptionis per os, scilicet, propinquitas ad stomachum, & ad ea quæ immittuntur per inferiores, scilicet, propinquitas ad intestina, & etiam propinquitas hepatis ad ea quæ exterius apponuntur, cum non sit multum profundum, sed sub si-phac immediate. Quintus canon. dum in frigidamus hepar cum notabiliter in frigidantibus semper secum admisceatur calida appropriata, sicut absinthium & schinanthum, tum propter causam dictam, tum etiam quia natura dirigit fri-gi. contra discrasiam cal. & calida ad confortandum calidum naturale, scilicet spiritum, & proprie si hæ medicinæ non fuerint fermentatæ, qui canon superius est traditus in dispo-sitionib. cordis dum esset sermo de trochiscis, de camph. & debet obseruari in curatione dispositionum omnium mem-brorum nobilium. Sextus canon. omnes medicinæ quæ pro curandis dispositionibus hepatis administrantur secun-dum substantiam suam, debent esse subtilissimæ tritæ, ut pos-sint peruenire ad meatus angustos ipsius, proprie in oppila-tionibus. Quapropter trochisci sunt subtiliter terendi & miscendi cum liquidis ut penetrare possint. Septimus can-on aperire debemus & urinam prouocare quando materia est in gibbo contenta, quia gibbus uis urinæ communicat, & uentrem soluere quando materia est in concauo, quoniam concauum intestinis communicat mediante uena portæ. Octauus can. Vitentur omnes causæ debilitatis digestiue stomachi superius memoratæ in cap. suo. Debilitas nanque stomachi præparat ad debilitatem hepatis. Et uideatur potus aque, & proprie in ieiuno, & post coitum balneum & exercitium, nec non post omnes euacuationes fortes, nam tunc calor est debilis, & aqua frigida quandoque ipsum to-taliter extinguit & sequitur hydrops & mors. Quod si uo-luntas affuerit assumendi aquam sumatur cum uino uel ace-ro aut aliquo ualep, & sumatur paulatim, & hoc in casibus ipsam exigentibus. Danda tamen est aqua ueri frigoris in aliquibus casibus & in magna quantitate, & subito, id est, in ualde paruo tempore, sicut in pestilentialibus, caufonide, sy-nocha inflatiua, nam pauca & consequenter exhibita fortal-se excitaret caliditatem, & hoc colligitur prima. 4. cap. de curatione febrium in generali, & cap. de cura pestilentiali.

Io. Arculani

X 3 li.

1, & danda est aliquando post copiosam phlebotomiam in sy nocha, sed per temporis interuallum, & non est inconueniens quod corpus intente febrius minus laedatur à frigidis quam ipsum sanum. Nonus canon. In dispositionibus hepatis uidentur uiscosa, sicut caseus, pisces uiscosi, pastilia, frumentum coctum, & similia. Item ea quæ sunt fortis stipticitatis sicut castaneæ, pira immaturæ, sorbæ, melsila, nisi in casibus quibus oporteret uirtutem retentiuam confortare sicut in fluxibus. Vitenturque dulcia cum sint oppilatiua, & proprie quando cum dulcedine uiscositate participant sicut uinum dulce & sapa, ubi uero cum dulcedine essent abstergenda, sicut mel & saccharum non ita nocere possunt, imò in multis casibus iuuare, & similiter quando essent incisiva. Et uinum dulce est oppilatiuum pulmonis conueniens ad abstergendum, & mundificandum, partes pectorales, cuius ratio est, quia uinum dulce attrahit ad hepar non gradatim, propterea quia hepar diligit ipsum, quia dulce, & propter suam penetrationem ex hoc quod est potus, quare non moratur in stomacho quantitate qua se paratur foex ab eo secundum moram aliarum rerum crassarum, imò superuenit hepati cum crassitudine sua & inuenit uias ad ipsum paratas, quoniam uix quæ sunt inter stomachum & hepar sunt amplæ secundum comparationem ad illud quod est de uenis sparsis in hepate. Amplius cum comprehenditur in hepate non moratur quantitate qua separatur & digeratur, imò expellitur subtile in uenas strictas uelocitate suæ penetrationis, & dimittit sedimen propter contractionem uic. In pulmone uero res est e contrario quoniam superuenit ei uinum cum iam colatum est, aut ex uia meatuum meri secundum semitam residuationis ex meatibus strictis ad amplos, aut ex uena concaua cum iam dimisit foecem, & uadit cum iam est colatum & trahit ex meatibus strictis ad amplos, quare colatur uice altera, & non sunt reliquæ causæ attractionis uelocis eius ad pulmonem quæ sunt in hepate. Medicinæ uero conuenientes hepatis sunt. Primo, illa in quibus est amaritudo cum uirtute aperitiua sicut absinthium, marubium, endiuia syluestris, cichorea. Secundo illa in quibus est operatio cum stipticitate sicut rhabarbarum. Tercio, illa in quibus est apertio cum stipticitate, aromaticitate prohibere putrefactionem sicut cinamomum, summitates schinathi. Quarto, abstergenda, lauatiua, mundificatiua uirus mali sicut aqua hord. cum saccharo. Quinto, mollificantiæ, & lenientia cum stipticitate & confortatione sicut crocus. Sexto, quæ cum conditione prædicta sunt suauia sicut passula. Et si cum prædictis conditionibus sint uelocis penetrationis sicut uinum subtile odoriferum conferunt hepaticibus, in quibus non est caliditas uehementis, & quando medicinæ aggregant conditionibus prædictis aut pluribus ipsarum suauitatem, tunc amantur hepatis sicut passæ, ficus, auellana, & proprie quando non sunt putrescibilia sicut cera, & dulcia sunt conuenientiæ hepatis quod non est aptum oppilari, nec in eo multiplicari. Ideo dulcia, calida, crassa, sicut sapa sunt hepatis nocibilia, & proprie calido apto oppilationi. Et omnes species endiuie conueniunt hepatis inflammato cum frigidityte, aperitione, stipticitate & proprietate. Propterea bonum est ut misceantur cum aliqua medicina habente qualitatem contrariam, sic enim summe iuuabunt & nullo modo nocebunt sicut si misceantur cum melle aut aqua mellis. Unde quandoque exsiccantur & sumuntur in potu cum aqua mellis, & conferunt ualde, & educunt humorem frigidum cum urina. In dispositione tamen notabiliter calida dimittatur cichorea, & quæ sunt uehementis amaritudinis, minus enim ad frigidum declinant, licet magis aperiant, propterea in oppilationibus, & humore existente crasso magis conueniunt. Et fistici sunt multi iuuamenti, propter suam stipticitatem aromaticitatem, & mundificationem uiarum cibi. Verum, quia sunt uehementer calidi, non conferunt nisi in hepate frigido. Sed auellana sunt conuenientes omnibus hepaticibus, quoniam ipsæ non sunt uehementis caliditatis, & sunt aperitiuæ, & chi mus earum est bonus. Sed debent esse aliquantulum torrefactæ, aliter faciunt sodā præcipue recentes, quia in ipsis est humiditas uentofabilis. Item hepar adipis, id est, lupi secundum aliquos, uel si adipis differt a lupo, eius tamen hepar est in uirtute hepatis lupi. Item carnes limaciarum conferunt cum proprietate quæ frigida sunt & humida. Caro autem testudinis est propria & magis propinqua æqualitati, & ambæ conferunt he-

cticis, sed quia uiscosæ sunt, & habent quandam humiditatem superfluum, & proprie limaciæ bonum est, ut ante coctionem lauetur cum lixiuio aut uino, aceto, sale, & similibus. Et conferunt hepatis exsiccatum & inflammato dando nutrimentum frigidum & humidum & constans non facile euaporabile, & proprie si non sit oppilatum, sano tamen hepatis perdis sunt saniores.

De debilitate hepatis Cap. 92.

Quamuis Rasis de debilitate hepatis explicite non loquatur, tamen pro complemento doctrine decreuit de ea facere capitulum cum pluries contingat, & sit frequenter causa reliquarum ægritudinum eius. Debilitas hepatis descriptiue est eius impotentia ad suas perficiendum operationes, & proprie digestiue absque manifesta causa ex apostemate, solutione continui in eo, & similibus causis ualde manifestis: dicitur autem proprie digestiue, quia licet hepar debilitatum secundum attractionem, retentionem, aut expulsiuam debeat dici debile, tamen nomen debilitatis importat debilitatem principalis operationis eius quæ est digestio, cui ceteræ subseruiunt, dicitur absque manifesta causa, quia si adset aliqua manifesta causa, sicut apostema, solutio continui, & similes, ab illis dispositio sua sumpsisset denominationem, & non à nomine accidentis quod est debilitas, sequens tamen aliam quam eius ægritudinem aut neutralitatem, sicut etiam conualescentem ex febre, decimus debilem & non febrientem. Quando ergo hepar esset neutrum conualescentiæ, aut decidentiæ sicut esset neutralitas complexionis, compositionis unitatis aut apostematis, aut ægrotaret ægritudine difficulter cognoscibili, diceremus ipsum esse debile, non denominando ipsum ab aliqua tali ægritudine aut neutralitate. Cum quælibet talis sit immanifesta, propterea Galenus, 5. interiorum 7. cap. inquit. Hepaticus, id est, debilis secundum hepar. Est ille in cuius hepatis operationibus est debilitas absque re manifesta ex apostemate aut dubelari, id est, ulcere uel apostemate maturato, licet in uirtute debilitas hepatis sequatur quantum ad quid rei. Licet aliter posset describi quod est diminutio aut corruptio unius aut plurium operationum eius, & proprie digestiue absque manifesta causa.

Species debilitatis hepatis quedam est noua, quedam est antiqua, quedam remissa, quedam intensa. Item quodque est debilitas unius uirtutis tantum, quandoque plurium aut omnium. Et plurimum quidem debilitatur attractiua ex frigore, retentiua ex humiditate, expulsiua ex siccitate.

Causæ quedam sunt primitiuæ, quedam per communitatē, quedam per essentiam. Primitiuæ extraneæ sunt sicut percussio, calus, & offensio super hepate. Item lesio à rebus uenenois, & similes. Non extraneæ sunt quæ sumuntur à rebus non naturalibus indebite applicitis. Per coitatem uero, aut à toto sicut in febribus, aut à membris particularibus ipsi contrahunt, sicut Kystis fellis, quando non trahit choleram ab hepate, aut propter oppilationem aut debilitatem, aut quando esset ea præter modum repleta hepar superflue calefaciens. Aut à splene quando non trahit melancholiam ex causis eisdem, aut quando esset præter modum ipse repletus, hepar superflue infrigidans. Aut à renibus & uesica, quando non trahunt aquositatem ex similibus causis. Similiter à matrice quoniam propter superfluum fluxum menstruum infrigidatur hepar, aut propter uehementem retentionem eorum, & corrumpitur per ipsam sanguis hepatis, sicut etiam propter fluxum superfluum sanguinis hæmorrhoidalis, aut eius retentionem accidit hepatis debilitas. Et simile accidit in quocunque superfluo fluxu sanguinis. Aliquando per communitatē à stomacho communicante hepatis chilum diminuit digestum aut corruptum. Item per communitatē ab intestinis cum laedunt aliquo nocumento notabili. Et quando accidit inter ea & inter se propter multitudinem phlegmatis uiscosi existens in eis aut in uis inter ea & fel oppilatio & non mundificatur cholera ab hepate & intestina remanent plena foecibus, quare non recipiunt illud quod uadit ad ea ex sanguine & aliis humoribus. Et hoc multoties accidit in colica, & aliquando propter communitatē membrorum pectoris, quibus propter uicinitatem & maximam colligantiam hepatis facile compatitur. Et breuiter per communitatē à quocunque

quocunque membro potente hepar notabiliter lēdere. Aliquando uero causa sunt per essentiam in hepate propter malam complexionem cuiuscunque generis cum materia aut sine materia, aut propter apostema sanguineum, erysipelas, sephiros & cancrum aut undiniam, id est, apostema phlegmaticum molle, aut propter solutionem continui cum sanie aut sine sanie, aut propter putrefactionem accidentem ei, aut propter oppilationem de qua erit sequens capi. aut exitum sanguinis superfluum ex eo propter rupturam uenarum aut causam aliam.

Signa sumuntur ex multis. Primo ex calore, quia color citrinus significat caliditatem hepatis, & color albus, pallidus ipsius frigiditatem. Et uiridis obscurus adhuc maiorem frigiditatem quod potest esse dupliciter, aut quia hepar diserasiatum ad cal. multiplicat choleraem citrinantem cutim, & diserasiatum ad frig. phlegma pallescens cum albedine. Et diserasiatum ad frigidum & sic cum melancholiam, per cuius presentiam color cutis fit uiridis obscurus, aut forte fit color uiridis obscurus, quoniam cum dominio humorum frigidum paucificantur spiritus debentes sanguinem illustrare unde color sanguinis fit obscurus, licet hæc mutatio coloris sanguinis etiam possit esse per simplicem alterationem hepatis absque noua humorum generatione: est autem obscurus propter defectum spiritus naturalis debentis humores aut cutim illustrare, & cuius color est optimus habet hepatis sanum. Et quamuis Aricen. dicat quod medicus expertus cognoscit hepaticum & stomachicum per colorem non egens significatione alia, credo tamen difficile esse per colorem solum distinguere inter hepaticum & stomachicum, tamen quia nocuumtum stomachi frequenter facit colorem malum nocendi hepati, licet possibile sit contrarium sicut in syncope per communitatem à stomacho, tamen quia color ex defectu utriusque provenientes sunt similes, propterea ad distinguendum inter utrumque oportet considerare actiones læsas aut exeuntia utriusque pertinentia, hæc tamen quæ dicta sunt de significando per colorem intelliguntur seruatim conditionibus Galen. 2. techn. quod color non fit alteratus ab aere aut ab aliis causis extrinsecis, & quod humores non sint in interioribus oculis, ut habetur. 2. commento primæ particulæ Aphorif. Verum nocuumtum hepatis per essentiam potius facit colorem malum, quam nocuumtum stomachi per essentiam cum nocuumtum stomachi plurimum faciat colorem malum nocendo hepati. Secundum signum est sumptum ex egestionem aut urina quæ sunt sicut lotura carnis. Quæ licet significant principaliter aut secundum plurimum debilitatem digestiua, quia digestiua debilis non bene transmutat chylum in sanguinem quare fit sicut lotura carnis recentis cum ipse existens albus non complete rubifecit. Possunt tamen & precipue egestio similis loturæ carnis esse propter defectum in attractiua non attrahente ipsum ad centrum hepatis, sed dimittit ipsum in mesentericis, quæ licet habeant aliquam uirtutem significatiuam, tamen illa est diminuta. Tertio, potest esse ex defectu retentiua non tanto tempore retinētis donec digestiua suam compleat operationem. Quarto, ex acuitate uirtutis expulsiua expellētis ipsum ad intestina ante quam digestiua hepatis complete eum transmutauerit. Nam ex quacunque causa acciderit hæc diminuta transmutatio chily in sanguinem natura expellit ipsum tanquam superfluum, & maxime ad intestina, quia hæc uia est sibi aptior & minoris nocuenti, potest etiam fieri urina sicut lotura carnis ex defectu digestiua hepatis non bene transmutantis nec separantis aquositatem à sanguine, & propter hanc causam quandoque apparet in stomachicis. Similiter ex nocuumto expulsiua expellētis ad renes ante completam sanguificationem, & tertio retentiua non tantum retinētis donec digestiua perfecte sanguificauerit, & propter has causas accidit aliquando mictus sicut lotura carnis, frequentius tamen sequitur debilitatem digestiua. Et apud Auic. iste fluxus uentris lauatiua in fine suo permutatur ad alteram speciem, & fit in habente complexionem calidam uirulentus, id est, sicut uirulentia quæ cum albedine quadam tendit in rubedinem uel citrinitatem, deinde fit sicut foex uini paribus subtilibus resolutis, & fit sicut sanguis adustus qui tendit ad nigredinem, licet ante hunc frequenter multi-

plicetur solutio uentris cum cholera pura. Sed in habente lapsum ad frigidum fit post fluxum qui est sicut lotura carnis fluxus qui est sicut sanguis congelatus. Et perueniunt ambo simul ad educendum res diuersarum qualitarum, & substantiarum. Sed magis in habente complexionem frigidam, calor nanque propter intensiorem acuitatis suæ tribuit unam formam aduersionis agendo in passum magis uniformiter. Sed frigiditas minoris acuitatis aliquam partem magis possibilem cogelando immutat dando colorem & modum substantiæ secundum sui exigentiam. Aliam uero partem magis resistentem alterat corrumpendo eius complexionem & calorem proprium, cui postea succedit calor extraneus putrefaciens, & dat ei colorem & modum substantiæ differentis à primis.

Tertium signum est dolor leuis extensus usque ad furculas dum penetret chylus in hepar: nam sicut stomachus debilis grauatur sumpto cibo, ita hepar ex chilo. Sed ista grauitas non ita percipitur in hepate sicut in stomacho cum non sit tanta sensibilitas: percipitur tamen ab his quæ diligenter considerant accidentia sua, & ex his significamus debilitatem hepatis absolute & proprie digestiua.

Sed signa causarum primitiuarum sumantur, ut infra. Quod enim debilitas hepatis pendeat à causis primitiuis, cognoscitur ex earum præcessione, ut quia aqua frigida potata fuerit & similes, & consequutione debilitatis hepatis. Et quod quodcumque præcesserunt similes cause, sequuta est similis debilitas. Et regimine sex rerum in melius mutato, multoties facile corrigitur hepatis debilitas. Quod uero debilitas hepatis sit per communitatem sicut in febribus cognoscitur, quia præcesserunt, & proprie febres chronice, quæ debilitant etiam paucificando calidum, licet non remittendæ: sit enim bona digestio à caliditate naturali & æquali multiplicata in quanto. Sed illam quæ sit communitate fellis significat color ictericus, & quandoque est cum eo egestio alba, quando est oppilatio inter fel & intestina. Facta uero communitate splenis significatur per ægri tudines splenis, & per colorem in quo uincit nigredo. Stomaticha uero significat per malitiam digestionis & nocuumtum stomachi non solum præsentia, sed etiam quæ præcesserunt. Et illa quæ est per communitatem ab intestinis significatur per puncturam eorum, uentositates, rugitus & per cholicam, & quæ sunt illis similia. Et quæ est communitate renum, aut uesicæ significatur per alterationem dispositionis urine ab eo quod oportet secundum naturam, & per declinationem formæ ad malitiam, & hydroposim. Et illam quæ sit propter membra pectoris significat malicia anhelitus, & tussis sicca, & quandoque sentit habens eam in suspensoriis hepatis, aut pulmonis, aut utriusque grauitatem, aut tensionem. Et quæ est per communitatem à matrice significatur per retentionem menstruum, aut fluxum superfluum, aut alias eius ægri tudines. Et similiter quæ est per communitatem ab hæmorrhoidibus significatur per fluxum superfluum, aut retentionem sanguinis hæmorrhoidalis.

Signa uero debilitatis hepatis per essentiam sunt ut infra. Mala nanque complexio calida, frigida, humida, aut sicca, significatur per complexionem hepatis naturales, facilius nanque labitur quodcumque membrum ad lapsum præternaturalem sibi similem quam ad contrarium. Item ex præcessione regiminis cui mala complexio sequens attestatur sicut causa effectui, & quod nocetur à similibus iuuatur à contrariis, & calida cognoscitur per colorem citrinum & frigida per colorem album pallidum, humida per molliem & lenitatem, & sicca per alperitatem. Item calida multiplicat humores adustos, frigida crassos, tardi motus, sicca paucos & crassos, humida aquosos. Signa autem oppilationum apostematum solutæ continuitatis sicut manifesta in capitulis fequentibus. Sed signa debilitatis cuiuscunque uirtutis sunt in frascripta. Primo si digestiua minuitur, sanguis existens in toto erit diminutus digestus, ut quia phlegmaticus sicut in hypofarca uel aquosus sicut in ascite. Aut supflue decoctus & sic erit cholericus, aut adustus. Ut plurimum tamē in ascite digestiua corrumpitur, cum multum eius quod deberet in sanguinem conuerti, conuerteretur in aquositatem, sed ablatio digestiua cognoscitur per exitum chylis, scilicet in quantitate

Io. Arculani X 4 tate

tate in qua intravit hepar. Sed cum eius ablatione non credo hominem longo tempore posse uiuere, sicut nec absque cibo. Sed hoc signum ex exitu chili video fallax cum possit sequi ad nocumentum digestiue stomachi, & generaliter quoniam est chilis inconueniens pro nutrimento corporis, & sic non attrahatur ab hepate & descendat. Item potest sequi oppilationem meseraicarum. Item debilitatem attractiue hepatis & meseraicarum. Item debilitatem contentiue hepatis, quare regreditur sicut intravit, inter quas causas huius effectus, scilicet fluxus chili productiue, licet sit difficile distinguere credo tamen hoc modo distinguendum esse. Nam si prouenit ex nocumento stomachi, adfunt & precesserunt nocumenta stomachi. Item chilis ille apparet male immutatus in modo substantiæ, uel colore existens forte difformis in partibus suis, & cum eo associatur lienteria. Si uero sequantur oppilationes meseraicarum adfunt signa oppilationum earum causarum, de quibus infra. Si sequitur debilitatem attractiue hepatis ualde cito egreditur celebrata. 1. digestionem cum non attrahitur ad hepar, & in hoc maxime differt a fluxu chilo sequente ablationem digestiue cum post celebratam digestionem stomachi notabile tempus interuenit antequam egrediatur, cum oporteat ipsum ingredi hepar, & regredi antequam fluat exterius. Si uero sequitur debilitatem retentiue hepatis statu bonitate digestiue & attractiue cognoscitur, quia est aliquid immutatus uersus colorem sanguinis cum aliquanto tempore in hepate, aut meseraicis moretur, in quo tempore per actionem digestiue immutatur. Est & alia differentia, quia cum aufertur digestiua apparent signa frigiditatis secundum plurimum. Cum uero læditur contentiua apparent signa humiditatis, & ex similibus signis distinguitur inter diminutam digestionem sanguinis cum aliquanto tempore in hepate, aut meseraicis manet & debilitatem digestiue hepatis, & contentiue eius. Sed de his statim dicetur ubi rursus. Sed corruptio digestiue hepatis & fluxus rerum corruptarum cognoscitur item ex generatione aquositate superflue sicut in ascite & multiplicatione uentositatis sicut in tympanite, & ex multiplicatione phlegmatis superflui, & multum distans a natura sanguinis sicut in aliqua hypofarcta, & fluxus lotius potest esse tam a diminuta quam a corrupta digestionem. Si enim sit ex chilo diminuta uersio in sanguinem est a diminuta digestionem, si uero sit ab aquositate sanguinis permixta cum impotentia discretiue erit a corrupta digestionem cognoscitur tamen corrupta digestio hepatis magis ex urina quam ex egestionem, quia in gibbo sit humorum generatio aut saltem perfectio & aquositate sequestratio. Cum ergo apparet urina malæ substantiæ confusa in qua non apparet sequestratio uel hypostasis, aut quando apparet urina sanguinolenta non ex defectu membrorum urinae significatur corrupta digestio, aut ualde diminuta. Significatur etiam corrupta digestio per sanguinem corruptum, quia sit in putredine uersus, aut in melancholiam per superfluum infrigidationem aut adustionem, sicut cum apparent egestionem, sicut uini foetis, & cognoscitur sanguis corruptus in phlebotomia cum est diuersorum colorum cum uiriditate quadam, sed cognoscitur eius diminuta digestio in phlebotomia, quia tendit in albedinem cum admixtione multi phlegmatis & aquositatis & superflue decoctus tendit in citrinum cum nigredine quadam & mixtum multæ cholerae. Debilitas uero siue diminutio attractiue significatur per egestionem humidam lenem. Item quando apparet urina boni coloris & stomachus est sanus, tunc per hæc tria certificatur debilitas attractiue. Item debilitas in toto & macrefactio a paucitate sanguinis significat debilitatem attractiue. Retentiue uero debilitatem significant nocumenta digestiue cui ipsa retentiua subordinatur, sicut penetratio sanguinis diminuta decocti in membrum significat debilitatem retentiue, licet plus digestiue. Item apparitio sanguinis in toto mixti cum superfluitatibus suis, scilicet phlegmate, cholera, melancholia, & aquositate, significat debilitatem retentiue, ita ut sit color citrinus per cholera, albus per phlegma, fuscus per melancholiam, & mollieties per aquositatem. Et minuitur urina, quia aquositas mittitur ad totum, & minuitur necessitas assellandi, quia cholera debens inuare expulsiuam intestinorum mittitur ad totum. Et minuitur appetitus, quia deficit aduentus melanco-

lia, quæ excitat appetitum. Ista enim omnia non sunt nisi quia non tanto tempore retinetur massa sanguinea in hepate, quod possit fieri sequestratio, unde aliquando fit hydrops digestiua debilitata, aut retentiua, & aliquando fit colica foecalis, aut phlegmatica, quia deficit mudificatium intestinorum quod cholera.

Expulsiue uero debilitatem significamus, similiter quia san guinis superfluitates remanent permixtae sanguini, & nulla sufficienter expellitur ad locum suum. Sed corruptionem expulsiue significamus, quando superfluitates expelluntur quod non debent, sicut aquositas ad stomachum, & sic de aliis, & cum ex debilitate retentiue, & expulsiue, aliquando prouenerunt similes effectus, & accidentia, similiter debet distinguui inter utranque per causas sue debilitatis, cum enim uideamus dominium humiditatis, debemus potius credere debilitatem expulsiue iuxta dicta superius.

Sed dubitatur quare debili existente retentiua, humores alii a sanguine magis expelluntur cum sanguine ad totum quam expellantur ad loca propria, scilicet cholera ad Kistim, melancholia ad splenem, aquositas ad renes, cum potius deberet esse oppositum Kisti, & reliquis receptaculis hos humores naturaliter attrahentibus. Respondetur duplex esse tempus retentionis. Vnum quod primum, in quo humores generantur, aut acquirunt suas formas substantiales. Secundum in quo postquam geniti sunt localiter separantur, & certum est, quod est difficilior retentiue his duobus temporibus retinere quod primo tempore tantum, & est facilius expulsiue totam massam humoralem expellere ad uenam chilis, & consequenter ad totum corpus quam singulos horum ad sua receptacula expellere. Quapropter in paruo tempore posset facere primum & non secundum. Est etiam possibile & forte frequenter contingens quod retentiua sit ita debilis, ut non possit tanto tempore retinere, in quo ex chilo sint quatuor humores geniti secundum suas formas substantiales, sed solum acquiescuerunt dispositiones quasdam diminutas facientes pro introductione sue forme, & tunc expulsiua mittit eos imperfectos ad uenam chilis, aut totum corpus. Et in utroque casu minorabitur separatio cum superfluitatibus ad loca propria. Et in utroque casu aggregabitur in corpore mollicies cum citrinitate, ac cum albedine, & nigredine permixta, sicut dicit Auicenna. quia in corpore tunc est massa humoralis in qua non sunt humores actu per suas formas substantiales, sed solum sunt adepti aliquas dispositiones pro formis suis in confuso, sicut in abortibus triginta dierum apparet lineationes, & similitudines membrorum exteriorum, licet membra non sint integre formata. Et hæc quæ dicta sunt intelligi debent de notabili parte ipsius massæ humoralis, non de tota, quia si tota massa esset taliter imperfecta non credo uitam posse nisi paruo tempore permanere, cum nihil nutriet nisi sit, aut fuerit formaliter humor. Est enim certum talem massam, si non sint humores esse chylum.

Secundum dubium, quod est deterius an operationem aut ferri an corrumpi uel diminui. Pro quo sciendum quod nocumenta harum operationum possunt dupliciter considerari, aut quantum ad causam producentem eas, aut quantum ad nocumenta quæ reliquuntur. Si primo modo consideretur nocumentum ablationis est deterius, deinde diminutionis, ultimo corruptionis, quia ablatio, & diminutio, & proprie nutritiue, & digestiue sunt a frigiditate, quæ aufert omnem uirtutem si est fortis, licet frequentius attractiuiam & digestiuiam. Et ipsa facit maius nocumentum quam caliditas, quæ est corruptens secundum plurimum.

Si uero consideretur secundo modo nocumentum corruptionis est deterius, deinde ablationis, deinde diminutionis. Et ratio, quia difficilior est aut corrupte digestam corrigi quam nullo modo digestam, aut diminutæ, quia non attenditur malitia maior, aut minor, nisi inquantum sunt magis, aut minus remota ab hoc, ut perficiatur. Et cerum est, quod sanguis corruptus magis distat, ut fiat bonus, quam sanguis diminutus, aut nullo modo digestus, & hoc modo potest esse concordia inter Auicennam, qui dixit, quod nocumentum digestionis, quod est ablatio est deterius, deinde diminutio, minus uero corruptio, scilicet quantum ad causam, & inter Serapionem quæso breuiarii, primo capitulo dicentem, quod nocumentum, quod

quod est corruptio est deterius, deinde ablationis, deinde diminutionis, scilicet quantum ad posse corrigi.

Prognostica. Primum, nocumentum digestiue hepatis est factiuium, aut constructiuium ferè omnium ægritudinum, tam materialium, quàm immaterialium. Secundum. Debilitas hepatis notabilis cum fuerit antiquata difficillimè, aut nunquam emendatur.

Cura debilitatis hepatis habet quatuor intentiones. Prima est remotio causæ debilitantis ipsam. Secunda est ipsius confortatio. Tertia accidentium correctio. Quarta debiti regimen sex rerum. Prima intentio. Si causa fuerit primitiua remoue ipsam, & nocumentum per ipsam hepati impressum, sicut exempli gratia. Si potus aquæ frigida fuerit in causa prohibe ipsam, & potet uinum. Et similiter remoue frigiditatem hepatis, & membris naturalibus, impressum cum calidis interius & exterius applicis, & idem fit iudicium de reliquis causis primitiuis. Si uero debilitas hepatis sit per communiatem à toto sicut in febribus, cura febres secūdū quod oportet, & remoue discrasiam hepati impressam cum contrariis ipsam confortantibus, tam proprietate, quàm stipicitate moderatis, & aromaticitate qua gaudent spiritus. Si uero fuerit per communiatem ab aliquo membro corrigere illius membri dispositionem, primo euacuando, & diuertendo, tam ab eo quàm ab hepate, si quid humoris fuerit in causa. Secundo malam illius membri dispositionem corrigendo. Et tertio ipsam confortando, ut fiat minora laudabilis chimia, remoue etiam nocumentum hepati impressum per membrum communicans. Quod si debilitas hepatis fuerit per essentiam propter malam complexionem, malam compositionem, solum continuitatem, aut apostema remoue iuxta posse ægritudinem illam qua debilitatur. Et in summa omnia hæc sunt ad perficiendum primam intentionem, quæ est remotio causæ debilitantis hepatis. Cum quibus autè hæc intentio perficiatur, potest esse manifestum ex curis ægritudinum hepatis positis, & ponendis, necnon ex curis ægritudinum totius membrorum particularium, quibus hepar communicatur. Debilitas namque ipsarum est accidens remouendū per remotionem ægritudinis facientis ipsam. Secundo intentio, scilicet hepatis confortatio, quæ proprie pertinet huic capitulo perficienda est cum infra scriptis. Primum est calefactio subtilis, idest leuis, ut seruetur complexio naturalis hepatis, aut spirituum, uel subtilis, idest, cum subtilibus in substantia habentibus uirtutem penetratiuam, sicut in schinantho, cypero, croco. Secundum est aperiatio etiam leuis, quia ferè semper est timor de oppilationibus, & hæc reperitur in fisticis, absinthio, marrubio. Tertiū est maturatio sicut in croco. Quartum lenificatio, sicut in passulis, & uino granatorū dulcium. Quintum absterio sicut in aqua hordei ex corticaci aut mellis. Sextum incisio, sicut in uino granatorum mazorū & acetosorum. Septimum est stipticus moderate, sicut in schinantho, absinthio, rosæ, & similibus. Octauum prohibitio putrefactionis, sicut in cinnamomo cassia lignea. Nonum exiccatio, sicut in spodio. Decimum mundificatio uirus, sicut cum melle, & uino subtili. Undecimum cum proprietate, sicut in spica, hepate adip. carne limaciarum, & rhabarbaro. Duodecimum cum amicitia currere inter hepar, & medicinas propter multas causas, sicut in passulis. Non dico tamen quod in omnibus casibus pro confirmatione hepatis his omnibus indigeamus, sed hæc memorata sunt, ut his utamur, quæ proposito nostro magis deferuiūt. Et ut sciamus uerificare receptas auctorum componētium antidota ex diuersis simplicibus habebimus plures, aut omnes has intentiones. Quamuis sit possibile quod in uno simplici plures ex his conditionibus reperiantur, ut patet habenti noticiam simplicium.

Præter hoc esto memor pro confortatione hepatis multum attendere confortationi spirituum ipsos multiplicando. Et omnibus nouem modis ipsos confortato, de quibus fuit sermo in capitulo de melancholia. Ipsi enim sunt cuiuscunque uirtutis instrumentum ad suas perficiendas operationes.

Item præter hæc esto memor diligenter considerare, quæ uirtus sit læsa principaliter, & ipsius confortationi magis attendere, & proprie digestiue, cui reliquæ subserviunt. Attractiua enim confortatur calido & sicco, retentiua frigido & sicco. Digestiua calido & humido, aut cum temperamento

palsiuarum. Expulsiua calido & humido, licet magis humido quàm calido. Et digestiua magis calido quàm humido, et quæ temperamento palsiuarum. Retentiua uero magis sicco quàm frigido, & attractiua magis calido quàm sicco. His ergo utere quæ tuo proposito de feruiant secundum exigentiam uirtutis læsæ.

Ultimo non solum attende confortationi hepatis. Sed eorū membrorū quæ debent trahere superfluitates ab hepate, quæ sunt renes, splen, kistis, fellis, & intestina, licet ipsa non ita immediate hepati deferuiant, sicut reliqua tria.

Sed superest, ut ponamus quedam antidota iuuantia in confortatione hepatis. Excellens in causa frigida, est diagalanga descriptione Mesue. Et diarthodon abbatis in causa calida. Ex syrups in causa frigida, syrupus de absinthio syrupus acetosus. Sed in causa calida, syrupus bizantinus. Ex trochiscis in causa frigida, trochisci de ligno aloes, trochisci rhabarbaro, sed in causa calida, trochisci de sandalis, de berberis. Et Rasis in capitulo de dolore hepatis describit medicinas elegantissimas in confortatione hepatis, tam in causa calida, quàm in frigida. Auicenna uero describit medicamen acceptum à Gal. multum in debilitate hepatis laudatum. R. passularum enucleatarum, aur. 25. croci, aur. 1. calami aromatici, aur. 2. bdellii iudaici aur. 2. s. cinnamomi, aur. 1. cassiæ lignæ medietatem aurei, spicæ, aur. 3. schinanthi, aur. 2. s. myrrhæ, aur. 4. gummi albotin, aur. 4. darfesceam, idest, arboris granati syluestris, aur. 2. loco cuius ponitur zylocaracta, mellis, aur. 1. 6. uini subtilis quantum sufficit, & quandoque ponimus in ipso opium, & semen hyocyami albi, scilicet cum adfuerit signa superflue caliditatis, & hanc receptam uerificat Auicenna in textu Gal.

Electarium ualens in causa frigida mirabiliter confortans hepar, & mundificans canales eius, & urinam prouocans. R. ligni aloes, rosarum, spicæ nardi, cinnamomi, ana. 3. 2. lacæ, rhabarbari, cariophylli, ana. 3. s. asari, anisi, maioranæ, mastichis, gummi, balsami, ana. 3. 3. sumeni, schinanthi, spodii, ana. 3. 1. chamepyrthos, cuscute, ana. 3. 2. confice cum syrupo de ligno aloes.

Evaporatio in causa frigida. R. cinnamomi, cassiæ lignæ, ana. 3. s. spicæ 3. 1. absinthii, eupatorii, ana. 3. 5. bulliant in uino odorifero stiptico in quo sunt commixtæ tortellæ, idest, panis biscoctus, & parum olei de neriden, infundatur lana, uel philterū in hoc liquore, & fiet euaporatio. Sed in causa calida. R. endiuiz M. i. sanda. alb. & rub. spodii, ana. 3. 3. cuscute, absinthii, ana. 3. s. bulliant in aqua ros. in qua sit quarta pars uini granatorum, aut parum aceti, & fiat euaporatio ut supra, sed ubi ē fortis caliditatis, melius ē, ut sit actu frigida.

Unguentum in causa frigida. R. succ. eupatorii 5. 2. spicæ 3. 2. olei de spica 2. bulliant ad consumptionem succi, & addendo spicam in fine cum pauco aceti, & cera sufficienti fiat unguentum. Sed in causa calida. R. sandalorum alborum, & rubeorum, spodii, ana. 3. 1. spicæ 3. 1. succi endiuiz, olei ros. ana. 3. 1. bulliant succus, & oleum ad consumptionem succi, & cum pauco aceti, & cera sufficienti fiat unguentum.

Multæ aliæ medicinæ sunt ad hanc intentionem, quas causa breuitatis omitto. Medicinæ tamen Rasis in cap. de dolore hepatis sunt præstantissimæ. Attende tamen præcepta Auicenna in proprio capitulo de debilitate hepatis.

Nam cum uides debilitari digestiuiam, conforta cum eis in quibus est stipicitas & caliditas cum mensura, idest, non excessiua, & aromaticitate, & sit in eis maturatio, sicut sunt medicinæ compositæ ex eis, quæ sunt sicut spica, folium, nux muscata, coriandrum, cardamomum, mastix, calamus aromaticus, cyperi, & similia. Et si fuerit proueniens à retentiua adde de stipicitate, & minue de caliditate, aut conforta humilmodi medicinas cum medicinis oppositis eis cum infrigidatiuis. sicut sunt balaustiz, rosæ, & hypocistis, & si fuerit debilitas in attractiua, conforta cum eis in quibus est stipicitas parua, tanta, scilicet quod uirtutem hepatis conferuet, & sit in eis caliditas, & aromaticitas, & stude in aperiutione oppilationum. Et si fuerit debilitas in expulsiua conforta cum calefacientibus, & humectantibus aromaticis, & calefac splenem, renes, & uiscera cum sibi propriis, & aperi poros suæ meatus per quos superfluitas ad hæc membra expelluntur. Et quia cuiuscunque uirtutis debilitas potest ab omni mala complexione

complexione contingere est necessarium ut magis confyderes maliciam complexionis ledentis uirtutem, quam uirtutis lzfionem, cum oporteat uirtutem confortare per remotiorem causam ledentis. Vnde oportet aliquando digestiuam, & attractiuam confortare cum infrigidantibus, licet secundum plurimum debilitentur a frigore. Et passula conferunt in debilitate hepatis, ita ut prohibeant solutionem uentris similem aquae carnis.

De oppilatione hepatis. Cap. 94.

Oppilatio hepatis est morbus in uis eius prohibens crassum humiditatis naturalis, aut superflue quae per ipsum naturaliter transire consuevit.

Et est triplex, quaedam in poris subtilitatis eius per quos transit nutrimentum ipsi proprium, quaedam in uenis eius per quas transit nutrimentum toti commune, quaedam in poris, siue meatibus per quos superfluitates expelluntur.

Causae primae apud Auicennam, est crassities sanguinis, qui nutrit hepar, aut debilitas expulsus cum uehementia attractiuae eius, quapropter neque superfluitates hepatis, quae rescantur in digestionem quartam, sufficienter expelluntur, & nutrimentum proprium attrahitur indigestum.

Causae autem remotiores sunt cibi praebentes nutrimentum crassum, & quaecunque possunt debilitare expulsuam, & fortificare attractiuam. Causae autem oppilationis, quae est in uenis sunt, quia creatae sunt strictae, aut inuolutae a generatione. Vnde ex omni parua re oppilantur. Aut quia sunt ex tempore contractae, & secundum plurimum rami portae oppilantur quoniam materia oppilans peruenit ad ipsos, primo per illud quod tollitur a ramis ipsius in ramos uenae chilis sibi obuiantes, quapropter sex in ipsis relinquitur ipsos oppilans, propterea plurimum oppilationum est in latere concauo, licet etiam quicquid sunt in gibbo, & oppilationes istae, quae sunt in ueni hepatis, aut sunt coarctatoriae ab humore multo crasso, aut uisoso genito, ex cibis sibi proportionalibus concurrente debilitate digestiuae, & expulsus alicuius complexionis maliciam insequente, cibi autem isti sunt, sicut carnes crassae, & res quae comeduntur in appetitu corrupto, sicut carbonem gypsum, & similia non proportionata humanae speciei, item sicut fungi, & quaedam genera pomorum nutrimenti crassi, & sicut zarror, id est, forbae, & similia. Aliquando istae oppilationes sunt attenuatoriae sequentes apostema, uentositatem, aut qualitatem contractiuam.

Carnosae uero nunquam, aut rarissimae sunt, quia orificia uenarum sunt neruosa, super quorum substantia nihil tale generatur, & si super aliquo oritur non communicatur omnibus aut pluribus, & iam dictum est in dispositionibus pulmonis, quod res quae sunt crassae, & oppilantes hepar, non oppilant membra quae sunt post hepar cum digerunt in hepate, sicut frumentum conglutinatum, & uinum dulce, & similia.

Oppilationes autem quae sunt in meatibus expulsionis, superfluitatum dicuntur cum agemus de dispositionibus fellis, & splenis, ipse tamen a consimilibus causis proueniunt, & sunt triplices, coarctatoriae, attenuatoriae, & carnosae, sicut praecedentes. Signa oppilationis in hepate sunt. Primum color citrinus, uel pallidus in toto corpore, quoniam sanguis bonus in quantitate sufficienti ad corporis superficiem non accedit, sed subtile potius aquositate, uel cholerae mixtum attrahentibus membris inanitis. Secundum est grauitas in hypochondrio dextro, tum propter materiam oppilantem, tum propter materiam ex oppilationem retentam, imo apud Auicennam prima, est maior grauitas in oppilationem quam in apostemate, quod uerificatur si oppilatio sit magna, aut in uis transitus humorum & superfluitatum, apostema uero, neque humorum nec superfluitatum transitum est impediens. Sed ubi cetera sunt paria ex parte quantitatis, & loci ac reliquorum credo maiorem esse grauitatem in apostemate quam in oppilationem, cum ceteris paribus materia sit magis in apostemate in uno loco collecta, & sit magis grauitas. Tertium est impedimentum anhelitus, & proprie cum dilatatur propter compressionem diaphragmatis ab hepate oppilato, & ipsius tractionem inferius. Quod maxime uerificatur cum oppilatio est gibbo, haec tamen signa sunt communia apostemati hepatis, & oppilationi inter quae febris distinguit, quae necessaria associatur apostemati hepatis, & non oppilationi.

Quartum signum est fluxus uentris ex materie crasse regurgitatione, oppilationem sibi transitum impediens, & urinae multitudo, & subtiliatur propter subtile aequum multiplicatum ex indigestione, penetrans, hepate pellente, & membris attrahentibus si hepatis, & totius corporis ariditas non obstat. Sed signa distinctiua inter oppilationem pororum transitus nutrimenti proprii, & oppilationem uenarum sunt, quia in oppilationem uenarum praedicta signa sequuntur a principio, & corporis consumptio, sed in oppilationem pororum transitus nutrimenti illa non sunt a principio, sed apparet in principio multiplicatio sanguinis in uenis, & color rubeus in cute, quia sanguis non accedit ad nutriendum hepar. Sed si oppilatio esset in poris, siue uis purgationis superfluitatum ab hepate, scilicet in uis purgationis cholerae ab hepate ad cystem fellis, & melancholiz ad splenem apparet in sanguine multiplicatio cholerae, & melancholiz cum colore citrino nigro, aut mixto in cute. Sed de his uberius agetur in sequenti bus. Signa uero distinctiua inter oppilationem uenae chilis, aut ramorum eius, & oppilationem uenae portae, & ramorum eius sunt, quia oppilationem uenae chilis & ramorum eius, sequitur fluxus uentris sanguinis, & humorum iam generatorum in porta, siue concauo hepatis, non potentium penetrare ad membra oppilationem chilis transitum impediens ad ambicium totius, & proprie quantum ad partem eorum crassam. Quare regurgitant ad portam, deinde per meseraicas ad intestina, & sit urinae subtilis multiplicatio cum tinctura propter debilitatem digestionis hepatis multiplicantis aquositatem, & propter transitum subtilis partis sanguinis, & aquositatis non bene a sanguine discrete membris attrahentibus. Crassities quoque ac durities hypochondrii dextri est sensui manifesta. Sed oppilationem existente in porta & ramis eius sit fluxus chilosus, aut humorum diminute digestorum, nam si sit oppilatio in meseraicis, quae sunt rami uenae portae terminatae ad intestina sit fluxus materiae chilosae, si uero sit in porta, & ramis eius contentis in hepate sit fluxus humorum diminute digestorum, & aliquando sicut lotura carnis chilo ualde diminute decocto, & aliquando fluxus partim chilosus, partim humoralis, & non apparet crassities, aut tensio sensui manifesta in hypochondrio dextro. Signa autem distinctiua inter oppilationem portae, & ramorum eius, & debilitatem ipsius hepatis, quamuis conueniunt fluxu chilo manifestata sunt ex capitulo praecedente. Quod autem oppilatio sit coarctatoria a multitudine humorum cognoscitur ex signis plethorae, de quibus. 2. primi, additis signis generalibus oppilationis superscriptis. Quod uero pendeat ab humore crasso, aut uisoso, cognoscitur ex signis cacochimiae, de quibus. 2. primi, additis signis oppilationis superscriptis. Item cognoscitur ex regimine praecedenti, & malicia digestionis, ex quibus si multiplicetur uentositas apparebit crassities, & tensio augeri, aut minui subito, uel in breui. Si uero non semper tensio, & crassities permanentur equales, ad quod iuuabit regiminis debiti uariatio, & mixtio humorum egestionibus, uel urinis apparens. Si uero oppilatio est attenuatoria, ut quia uis hepatis creatae fuerunt strictae, cognoscitur ex diuturnitate passionis, etiam a principio generationis contractae cum fortitudine retentiae, & debilitate expulsus. Si uero oppilatio attenuatoria sequatur apostema, aut alia causam uiam attenuantem, siue corporea, siue incorporea illorum signa apparebunt, de quibus infra. Si uero oppilatio fuerit carnosae, ex pustula, bochor, uel uerruca oppilatio non erit uniuersalis, imo in paucis uenis, & sic signa oppilationis erunt debilia. Et cum hoc cura parum proderit, aut, nihil, si fuerit a uerruca, aut carne addita.

Prognostica. Primum. Oppilationes hepatis sunt matres omnium aegritudinum. Secundum. Cum prolongatur difficultas, aut impossibilis est curatio, & multoties perducit ad putrefactiones facientes accidere febres, aut apostemata perducunt ad hydropisum. Et ad generationem uentositatis facientis accidere dolores prauros. Tertium. Multoties confortatur natura ad expellendas materias oppilationum seipsa, uel arte. Et egrediuntur, aut in egestionem, si fuerit oppilatio in latere concauo, aut in urina si fuerit oppilatio in latere gibbo, humores permixti crassi, & soluitur oppilatio. Quartum. Oppilatio naturalis a generatione contracta non recipit

recipit curam, præseruari tamen potest qui hanc patitur cū bono regimine ab incurſu ægritudinis quæ oppilationes ſe qui conſuerunt. Accidentis uero noua ſecundum plurimū facile curatur.

Cura oppilationum hepatis exigit quatuor intentiones. Prima cauſam oppilantem hepar remouet. Secunda ipſum confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat debi- tum regimen ſex rerum. Prima intentio perficitur ſecun- dum diuerſitatem cauſæ oppilantis. Si ergo oppilatio fuerit à multitudine, euacua, aut cum phlebotomia, ſi ſanguis fue- rit uincē, aut alii humores peccauerint cum ſanguine. Quæ phlebotomia fiat à ueni cōmuni, repletionē exiſtēte in toto aut à ſaphenis. Si in cauſa fuerit retentio ſanguis menſtru- alis, aut hæmorrhoidalis, poſtea phlebotometur baſilica, aut ſaluatella dextra. Si uero repletio non fuerit communis, ſed propria hepatis ſufficit phlebotomia ſolius baſilicæ aut ſalu- tellæ, poſtea alii humores euacuentur ſecundum quod oportet. Si uero cauſa oppilationis fuerit humor craſſus, & uiſco- ſus, prius digere, deinde euacua. Diſſoluta autem in primis ſint inciuſa, abſterſua, ſubtiliata, abſque magna apertione aut puocatione, poſtea ſint magis aperitiua. Euacuatio au- tem fiat cum ſolutiuſis, ſi oppilatio fuerit in concauo. Si uero in gibbo cum diureticis, & fortiter aperientibus. Diſſoluta autem conuenientia à principio ſunt, ſicut ſyrupus acetofus ſimplex, ſaccharinus, aut melinus cum aquis endiuiz, aut ab- ſinthii, aut ſimilibus pauca aperitiis. Deinde in proceſſu cum ſyrupo acetofſo compoſito mellino, aut ſaccharino, oxy- melle, ſcyllitico, & aquis cuſcutæ, capilli uenæ, ſari, rubæ, & ſimilibus calidis, & frigidis, aut propinquis æqualitati ſecun- dum exigentiam. Pro quo ſciendum eſt quod medicinz aper- tiuæ, quædam ſunt ſimplices, quædam compoſitæ, & utrun- que quædam frigida, quædam calida, quædam æqualitati ui- cinæ. Frigida quædam ſunt ſicut endiuia hortulana, & cam- peſtris, quæ eſt taraxacon, & aqua plantaginis cum foliis, & radicibus ſuis, & omnia prouocantia cum inſtigatione, ſi- cut ſemina communia frigida, quibus utendum eſt in oppila- tione cum caliditate. Et ex compoſitis, ſyrupus bizantinus, ſyrupus acetofſus compoſitus, licet forte conuenientius in- ter æqualitati propinqua poſſent numerari. Calidæ uero ſunt diuretica fortia, ut alarum, taphia, petroſelinum ariſtolochia rubea tinctorum, iris, ſiſtici, agaricus, epichymus, ſcylla, po- lum, ſpica, centaurea minor, & ſuccus eius, gentiana. Et ex compoſitis ſyrupus acetofſus cū rubæ, & melle, oximel ſcylli- ticum, oximel compoſitum, & hæc ſunt ſupra caliditatem pri- mi gradus. temperatæ autem uicine temperamento ſunt, lu- pulis, lacca, cuſcutæ, capil. uen. & ſunt ambo aperitiua ualde eam æqualitate ualentia, tam in oppilatione cum caliditate, quam cum frigidityte. Sed calidæ circa primum gradum, quæ ſunt proxime immediate ſupraſcriptis, ſunt rhabarbarum, ab- ſinthium, eupatorium, cimæ ſchiananthi, amygdalæ amaræ, ſuc- cus ſoenic. chamæpithæ. & proprie quando oppilatio eſſet in uis ſtriſtis, acetum ſcylliticum, aſparagi, & ſimiles. Et ua- lent in oppilatione frigida cum uino, aut aqua ſeminum cali- dorum, Et in calida cum aqua endiuiz, cuſcutæ, quæ proprie aperit oppilationes ſplenis. Item cū decoctione ſeminum frigidiorum communium, uel etiam ſine his. Non enim curan- dum eſt de inflammatione cum iuuamentum aperitionis præ- ualeat nocumento quod eſſicit earum calor inſtammando, eo quod ad extinguendū eſt facilis poſt aperitionem. Et nota quod medicinz ſupraſcriptæ non ſolum ualent ſumptæ inter- rius, ſed etiam exte- rius applicatæ ſecundum opportunitatē. Et multas medicinas cōpoſitas inuenies in antidotariis huius propoſito deſeruiētes calidas, frigidas, & temperatas ex ge- nere decoctionum, ſyruporum, electariorum, trochiſcorum, unguentorum & ſimilium, quibus utere ſecundum neceſſita- tem, & multas tuapte componere potes. Si uero oppilatio eſſet attenuatoria à generatione contracta, utputa natura- lis ſtriſtura uenarum curam non habet. Cauendum tamē eſt ab his, quæ poſſunt eſſe cauſa alterius accidentalis oppilatio- nis. Sed cura oppilationis attenuatoriæ ſequens alicuius cō- plexionis malitiā patere poſſet ex cap. præcedenti. Cura ue- ro oppilationis ſequentiſ apſtema hepatis manifeſta erit ex cap. ſequenti. De cura autem oppilationum exiſtentium in meatibus expulſionis ſuperfluitatem agetur in cap. de icte

ritia, & de dolore ſplenis. Secunda uero intentio, ſcilicet he- patis confortatio perficitur cum medicinis diētis in cap. præ- cedenti, cauendo tamen à multum ſtipticis, aut uiſcoſis, & omnibus quæ poſſent oppilationem renouare, aut augere. Tertia intentio, ſcilicet correctio accidentium perficitur cu- rando, & præſeruando ab omnibus ægritudinibus, quarum oppilatio hepatis poſſet eſſe cauſa, hæc autem ſunt plurimæ, quarum curam perquire in capitulo præcedenti, & ſequenti ſed pro quarta intentione cauendum eſt à ſuperflue ſtipticis ponticis, uiſcoſis, & multum dulcibus, & præbentibus nutri- mentum craſſum, & frequenter utendum eſt inciuſis, ſubti- liantibus, abſtergentibus, & ſummopere elaborandum eſt, ut fiat bona diſſolutio, tam in prima quam in ſecūda. Quapro- pter utatur his quæ bene poſſent digerere, & non ſuperfluat in quantitate. Nec comedat niſi præcedentis cibi diſſolutione celebrata. Non multiplicet cibaria in menſa una. Surgat à menſa cum reliquiis famis. Primo notabiliter comedat ante quam bibat, deinde frequenter bibat, & parum pro uice. Ca- ueat ab aqua frigida, & cibis, & potibus, actu, aut potentia ualde frigidis. Somnus ſit ſeptem horarum, aut circa, ut fiat bona diſſolutio, & ſit nocturnus, meridianus guſti dormiat p- horam in meridie. Procuret euacuationes, à natura inſtitu- tas. Poſt cibum quieſcat, & exercitetur perfecta prima diſſo- lutione, & ſit ſperans, & gaudens, & fugiat ſolitudinem, tri- ſtitiā, timorem, iram, et ſimilia corpus exterminantia. Et ſit indutus uestibus mediocriter calidis ſecundum temporum exigentiam.

De apoſtemate hepatis. Cap. 95.

Apoſtema hepatis, quantum ad quid nominis, & quid rei eſt ſatis manifeſtum. Sed pro notitia ſpecierum eſt ſciendum, quod apoſtematum, quæ accidunt in re- gione hepatis, quædam accidunt in ipſo hepate, quæ- dam in lacertis poſitis ſuper hepar, quædam accidunt in me- ſeraicis, & meſenterio. Sed eorum quæ accidunt in hepate, quædam accidunt in partibus ſuperioribus eius, ſcilicet in gibbo, quædam in partibus inferioribus, ſcilicet in concauo. Item quædam accidunt in ſuſpenſoriis, & panniculis eius, quædam in uenis eius, quædam in ipſius ſubſtantia. Plures ta- men accidunt in ipſius ſubſtantia, & quandoque communi- cant pluribus partibus ſimul. Diſtinguuntur præterea ex parte materiæ effectiuæ concurrentis ad ipſorum generatio- nem. Nam aliquod eſt ſanguineum, ſiue phlegmonides dube- lati, aut non dubelati, id eſt, colligens, & non colligens quod- dam eſt cholericum, quoddam eſt phlegmaticum, quoddam melancholicum eſt duplex, quoddam ex melancholia aduſta de genere ſephiroſ, quoddam ex melancholia aduſta de genere cancorum, quoddam eſt inflatium, uetofum, & fre- quenter apoſtemata hepatis ſunt mixta. Cauſa apoſtema- tum hepatis per eſſentiam ſunt mala complexio calida mali- gnans humores, & ipſos attrahens, qui non debite regulati faciunt apoſtemata. Item mala complexio frigida debilitans diſſolutiua & expulſiua eſt cauſa cur apoſtema congera- tur in hepate. ſuperflua quoque attractio hepatis eſt cauſa, cur attractum non bene regulatur, & faciat apoſtema. Oppi- latio quoque retinens humores & ſuperfluitates eſt cauſa, cur indebite figantur in hepate, præcipue oppilatio in parte hepatis terminata ad porum ſelleum, qui eſt ſub media pen- nulla hepatis. Dolores quoque hepatis frequenter cauſant apoſtema attrahendo materiā ad locum dolentem, & ſic apoſt. per uiam deſluxus, aliquando debilitando ſunt cauſa, ut apoſtema paulatim congeratur. Per communiatem uero, aut à kiſti fellis cum oppilatur, aut aliter efficitur impotens ad expellendum choleram per meatus conuenientes, unde regurgitans ad hepar eſt cauſa apoſtematis. Similiter per cō- munitatem ad ſplenem cum oppilatur, aut apoſtematur, & ſi- militer cum oppilatur uia deferens melancholiam ad ſplenē Item per communiatem ad ſtomachum cum læditur, & ma- xime ſecundum diſſolutiua, unde non præparatur chylus he- pati conueniens, ut inde ſanguinis, & humores laudabiles fiant. Item per communiatem à membris ſpiritualibus, inte- ſtinis, renibus, matrice, maxime in retentione menſtruum & per communiatem ab ano cum retinetur ſanguis hæmor- rhoidalis. Cauſa autem primitiua ſunt caſus, percufſio, of- fenſio

senfio hepatis. Item cibi superflue calidius aut frigidi, crassi, uiscosi, & quæcunque possunt hepar ledere. Apostemata hepatis terminantur quadrupliciter. Aut enim resoluitur. Aut suppurantur. Aut indurantur. Aut permurantur, & si permurantur ad membra ignobilia, sicut ad splenem est bonum, & contra, si permurantur ad magis nobilia, malum. Et quandoque critice expelluntur, aut cum sudore, prouocatione urinae, aut fluxus sanguinarius, cum est in gibbo, & si est in cavo facit crism cum sudore, uomitu, aut solutione uentris. Signa. Primo ponam signa distinctiua inter apostema hepatis, & pleuresim, licet in multis similes sint, & proprie cum pleuresis est in costis mendosis lateris dextri. Primum est ex parte doloris, quia in pleuresi dolor est sub costis uersus pulmonem, in apost. hepatis infra costas uersus ancham. Secundum in apostemate hepatis non est sputum cum tussi in principio, neque in processu. Sed in pleuresi est sputum cum tussi saltem in processu. Tertium, in pleuresi est pulsus ferrinus, in apostemate hepatis undosus. Quartum, in pleuresi est dolor pungitius satis intensus, in apostemate hepatis grauatus, id est, remissus nisi causa doloris sit in panniculo. Quintum, in pleuresi est magna anhelitus malicia, sed in apostemate hepatis nulla aut pauca. Sextum, in apostemate hepatis est color multum à naturali mutatus, in pleuresi parum, aut nihil. Signa uero distinctiua inter apostema mirach et apostema hepatis sunt. Quia tumor in apostemate mirach leui compressione sentitur, sed apostema hepatis nisi cum magna compressione, est. n. hepar positum in profundo. Itē tumor in apostemate mirach, plerumque subiacer uisui. Sed in apostemate hepatis minime, nisi forte esset in gibbo, & maximæ quantitatis, & in macilento. Tertium ex parte figuræ, nam lacertus apostematus est longitudinalis, latitudinalis, aut transversalis, & apostema est illius figuræ incedens secundum situm, n. uiculi & assimilatur caudæ muris, cuius una pars est subtilis, altera crassa. sic enim est figura lacerti, est enim crassior in origine sua, quàm uersus medium uentris. Sed apostema hepatis est lunare habens figuram semicirculi, aut maiorem, sic enim est figura hepatis. Quartum apostema musculi non facit accidētia ex siti, febre, alteratione coloris, aut formæ, quæ sequuntur ad apostema hepatis. Quintum, cum uides mirach extenuari, & tendere in fuscum iudica quod apostema est in hepate, hæc enim sequuntur defectum nutrimenti, qui non fit nisi ex nocumento hepatis. Est tamen sciendum huiusmodi apostemata mirach, quandoque facere hydropem nocendo hepati, maxime quando sunt in parte mirach, superposita hepati propter compressionem, uiciniam, & colligantiam. Distinguitur autem apostema hepatis ab apostemate meseraicarum, licet in signis multum communicent, scilicet febre, grauitate, dolore, & similibus, quia apostema meseraicarum est cum minori febre, minori grauitate, & sequitur ad ipsum fluxus chilofus secundum plurimum, quod non sequitur ad apostema hepatis, & ad ipsum est magis apta sequi extenuatio quàm cachexia, aut hydrops quæ frequenter sequitur apostema hepatis. Neque tactui subiacer, sicut apostema hepatis. Signa uero apostematis hepatis sunt infrascripta. Primum grauitas notabilis in apostemate hepatis, & maior quàm in oppilatione cæteris paribus, licet in oppilatione magna possit esse maior grauitas, quàm in apostemate paruo, si cut uoluit Auic. secunda primi. Secundum dolor multo maior in apostemate hepatis, quàm oppilatione ratione solutionis continui, quæ est in apostemate, & non in oppilatione. Tertium signum est mutatio formæ, & coloris ualde notabilis, non enim stat bonus color sine præsentia boni sanguinis, cuius defectus sequitur ad apostema hepatis. Minus tamen mala mutatio est in phlegmone hepatis, imò aliquando uidetur habitudo, & color factus bonus propter sanguinis inflammationem facientem faciem rubere. Attramen si bene notabitur uidebitur notabiliter mutata in uiuiditate oculorum, & in forma, & si forte tanta mutatio non appareat à principio parum post apparebit. Quartum signum est attractio furculæ, & humeri dextri ad inferiora, quia hepar grauitas trahit suspensorium alligatum dorso. Quintum, quia habentes apostema magnum, & proprie calidum non possunt dormire, imò parum iacere super latere dextro, quia hepar comprimitur à stomacho, & ab intestinis, nec possunt iacere

super sinistro, quia hepar grauitas, imò etiam grauat eos situs resupinus, licet minus cæteris. Signa uero distinctiua inter apostema gibbi, aut concaui sunt. Quia tractus inuenit ipsum comprimendo in extremitate costarum hypochondrii dextri cum est in gibbo, non autem cum est in concauo nisi forte in macilento habente apostema magnum, & cum forti compressione. Secundo inuenitur maior grauitas in apostemate gibbi quàm concaui, tum, quia hepar per gibbum apprehenditur, tum quia concauum stomacho sustentatur.

Tertio in apostemate gibbi est restrictio anhelitus, quia gibbus apostematus comprimendo diaphragma, & pulmonem facit tussim siccam, quæ non accidit in apostemate concaui. Quarto minoratur urina in apostemate gibbi, imò cum est magnum aliquando retinetur propter oppilationem atque uicatoriam sequentem ipsum, & aliquando propter debilitatem expulsiuæ. Sed hoc non accidit in apostemate concaui, sed e contra in apostemate concaui adfunt aliqua accidentia quæ deficiunt in apostemate gibbi. Primum, singultus quando apostema est magnum propter colligantiam oris stomachi in concauo hepatis mediante neruo subtili. Secundum, dolor magnus quando sumitur cibis notabilis, nel aliter stomachus extenditur, quia stomachus extensus comprimit concauum hepatis, & non gibbum. Et in summa per apostema concaui stomachus multum læditur, & e contra per apostema gibbi multum læduntur spiritalia, maxime pulmo, & diaphragma. Quod si apostema est in gibbo, & concauo apparent omnia accidentia suprascripta, & si apostema est in panniculo, est dolor uehementior, & tractus humeri deorsum plus, & maxime si est in suspensorio. Signa uero specierum apostematis hepatis distinctarum penes materiam, efficiētē ipsa sunt infrascripta. Si apostema sit cholicum dictum almefer parua est grauitas, & paruus tumor, sed inflammatio, & mordicatio magna. Item citrinitas linguæ, deinde denigratio cum asperitate, & est febris fortis, continua, exacerbans de tertio in tertium. Et pulsus est durus, magis ferrinus quàm undosus multum uelox, & frequens, sed non ualde magnus. Sitis intensa, & inuatur à frigidis, & humidis. Si uero fuerit apostema sanguineum dictum phlegmon significatur per rubedinem faciei, & exuberationem uenarum, & pulsus est plenus, magnus, uelox, & frequens, magis undosus, quàm ferrinus. Et maior est tumor, & minor grauitas. Dolor est grauatiuss, extensius magis quàm pungitius febris continua conclusa, & non inuatur à ualde frigidis, & humidis, sicut cholicum, sed apostema phlegmaticum significatur per inflationem quandam, & lenitatem cutis, plumbeitatem coloris. Et non est in loco sensata durities, licet sit grauitas, & est pulsus leuis. Et non est sitis, neque nigredo linguæ, neque febris notabilis, sed apostema melancholicum est duplex, quoddam à melancholia adusta, & est cancer, quoddam à melancholia non adusta, & est de genere sephiros, & utrumque quandoque fit incipiendo, quandoque permutando ex apostemate sanguineo, aut ex aliis. Signa communia sunt. Primum durities manifesta in loco sensata proprie si fuerit in gibbo. Secundum grauitas notabiliter. Tertium extenuatio mirach, unde manifeste repræsentatur ipsius figura lunaris prope ratio ad hydropem, hypofarcam, aut ascitem. Extenuatio corporis, casus appetitus, tenebrositas coloris, aut minoratio urinae. Signa uero distinguunt inter sephiros, & cancerum sunt, quia in cancro est febris notabilis in sephiros remissa. In cancro dolor notabilis, proprie fulmineus, in sephiros nullus si sit purum, si uero non purum etiam non est dolor, nisi leuis apud magnum motum corporis, aut fortem compressionem super locum apostematum, aut cum stomachus est plenus cibo comprimens ipsum, & summa omnia accidentia sunt fortiora, in cancro, sicut inquietudo, casus appetitus singultus, nausea, maior extenuatio & similia. Signa uero quæ fiant incipiendo sunt, quia non præcessit apostema alterius speciei, sed solum aliqua causa primitiua, aut corporea non de genere apostematis. Quod uero fiat permutando e contra cognoscitur, quia præcessit apostema alterius speciei, & maxime sanguineum, illud enim inter cætera facile permutat in duritiem, & lapideitatem, & proprie cum in fine applicantur super eo notabiliter frigida, & stiptica, hepar nunque uelociter oppilatur, & induratur. Apostema uero uen-

tosum

tosum, cognoscitur ex dolore extensio absq; grauedine cum pauca, aut nulla febre. Dispositiones quoq; naturales, & non naturales, sicut ætas, complexio, regimen præcedens, & similia ducunt in notitiam materiæ apostematis. Nam in habentibus symbolum facilius est transitus.

De dubelati hepatis.

Cap. 96.

Dubelati, de quo est hic sermo, fit cū in apostematibus materia in uno loco colligitur, & sanatur, propterea maxime sequitur apostema sanguineū, cum illud inter cætera maxime murationi paratum sit. Signa futuræ murationis sunt, quia auxilia debite facta non proficiunt. imò accidentia, sicut febris, dolor grauis, sitis, inquietudo, instantia uigiliarum, & similia augendo procedunt, & diu perseuerant. Cunque hæc accidentia notabiliter fortificantur iam murationio incipit, & tamen aliquando accidunt rigores diuersi materia per putrefactionem exacuatæ lædente magis mēbra sensibilia sibi proxima. Item læditur apud respirationem, nedum à statione super latera materia in unum collecta magis grauitate. Non autem fit dolor pulsatiui, sicut in reliquis apostematibus existentibus in membris arteriosis cum maturatur, quia ad hepar non uenit nisi arteria parua. Sed nota quod durities pulsus, secundum Auicē. tertia quarti cap. de significatione exituræ intrinsecæ, est testimonium magni exituræ, aut dubelati in uisceribus, dicit enim. Et quando apparet signum exituræ & dubelati in uisceribus, & non induratur pulsus, nō iudices penitus quod exitura sit interior, huiusmodi enim fortasse nō erit in uisceribus, imò in siphac quod continet uiscera. Cum autem facta est sanies, tunc remittuntur omnia accidentia, nisi grauitas, quæ fit maior, materia magis in uno loco congregata. Et comprimendo inuenitur, lenitas siue mollietas, cum prius sentiretur durities. Cum autem eruptio appropinquat, tunc redit dolor, & pūctio, & febris crescit, & grauitas fit maior. Cum autem accidit rigor subito, & sedat grauitas & dolor, tunc eruptio facta est, & tunc si non fuerit facta eruptio ad uērem, sanies egrediens ex apostemate euacuatur, aut per meseraicas ad intestina, & egreditur cum egestione, si fuerit in concauo, aut per uenam chilis descendentem, & emulgentes ad renes, & uescam, & egreditur cum urina, si fuerit in gibbo, aut euacuatur in concauitatem uentris, si eruptio facta sit ad uentrem. Et tunc materia colligitur in inguinibus, maxime in inguine dextro. Et forte post eruptionem materia existente melancholica accidit pulsus cordis, & syncopis, et fortasse mors propter resolutionem uirtutis, aut saltem accidet debilitas uirtutis manifesta. Sanies autem egrediens, significat situm dubelati hepatis. Nam si tendit in nigrum significat ipsum fuisse profundum in substantia hepatis. Si uero rēdit in albedinem, significat ipsum fuisse factum prope panniculum, cuius color albedo attestatur. Et ex ipsius saniei colore, substantia, odore, multitudine, significantur signa effacia salutis, & mortis, licet secundum plurimum huiusmodi dubelati hepatis sint mortalia.

Prognostica. Primum, apostema lateris gibbosi est deterius apostemate lateris concaui. Secundum, permutatio apostematis hepatis ad splenem bonum, ecōtra malum. Tertium, singultus sequens apostema hepatis secundum plurimū mortem prænūciat. Quartum, secundum plurimum apostemata hepatis cum prolongantur ducunt ad hydropisum. Quintum, cum apostema hepatis sequitur solutio uentris, est mortale. Sextum, non euadit aliquis ab apostemate duro quiescente confirmato in hepate, multominus sanabile est apostema durum non quiescens, quod est cancer. uelocius. n. interficat. Septimum, exitura notabilis in hepate est propinquior desperationi quā spei. Octauum secundum plurimum apostemata hepatis sanantur si debite regantur, & maxime si non sit error in principio.

Cura apostematis hepatis exigit triplex regimen. Primum debitum causæ antecedenti. Secundum debitum causæ coniunctæ. Tertium commune utriq;.

Primum completur duabus intentionibus, scilicet euacuatione, & diuersione. Secundum uero exigit repercussionem in principio, sed in augmento usq; ad medium status repercussionem cum resolutionis, deinceps uero resolutionem solam, si tendit in uiam resolutionis, si uero in uiam murationis, adiungetur. Tertium uero re-

gimen cōpletur cura accidentium, & regimine sex rerū naturalium. Sed pro complendis his intentionibus duo canones maxime obseruentur. Primus quod medicus sit festinus in cura apostematis hepatis, & proprie calidi, plures ex superscriptis intentiones simul complendo, nisi. n. succurratur à principio, & festine secundum quod oportet, & similiter in cura cuiuscūque apostematis calidi membri ualde nobilis secundum plurimum cura erit irrita, & uana. Secundus canon, quod maxime intendatur prohibitioni augmenti, & prohibitioni murationis. cauendum tamen ne induretur, est enim ualde proum in duritiem. Prima intentio, scilicet euacuatio in principio cuiuscūque apostematis hepatis completur phlebotomia, nisi fuerit prohibitio fortis, sicut ætas infantia, aut ultimū senii, aut quia corpus fuerit ualde exanguē, & apostema pendeat ab humore choleræ aut phlegmatico, melancholico, nullo modo peccante cum sanguine, & nō apto euacuari cum phlebotomia, imò potius per phlebotomiam timeretur cholerae bullitio, aut frigidorum cruditas, licet in infante, & ultimo sene forte, nati dextre, posset applicari sanguifuga aut uentosa cum scarificatione. In ceteris casibus competit phlebotomia, quæ repletionem existente multam, cuius repletionis causa fuerit retentio sanguinis mēstrualis, aut hæmorrhoidalis, fiat ex saphenis, & hauriatur notabilis quantitas sanguinis, deinde sequenti die phlebotometur basilica dextra hauriēdo notabilem quantitatem sanguinis, uirtute tolerante, proprie si apostema fuerit sanguineum. Si uero repletio fuerit multa, cuius tamen causa non fuerit retentio sanguinis mēstrualis, aut hæmorrhoidalis, primo phlebotometur basilica sinistra, deinde eadem die, uel sequenti phlebotometur basilica dextra, aut saluatella dextra, si uolueris magis diuertere, & timueris debilitatem. Auicē. tamen si nō reperitur basilica docet phlebotomare communem, aut cephalicam. Communiter tamē, quia repletio non est plurima, sufficit phlebotomia basilicæ, aut saluatellæ eiusdem lateris. Et si uirtus est fortis extrahatur sanguis quātum oportet una uice, & si non fuerit fortis uirtus, partiatur, & non applices stiptica reperculsiua, quæ conueniunt in principio, nisi præcedente phlebotomia, aut si non competit phlebotomia, nisi præcedat alia euacuatio. Nam fm Auicē. quando non phlebotomas, & dimittis materiam in hepate, & administras stiptica, & apocruistica proculdubio induratur apostema. Et si administras resolutiua non est dubium, quin moueatur dolor. Aliæ autem euacuationes in cholerico phlegmatico melancholico, aut mixto sunt faciendæ per uentrem, fm qd oportet, & proprie quando sunt in concauo. Nam in apostemate gibbi parum opus est solutione, sed magis prouocatione per urinam. In cholerico quidem conueniunt clystera ex decoctione maluarum uiol. endiuiz, scariolæ, hepaticæ, & similibus cum oleo uiol. sale, & melle uiolaceo, quibus possunt addi electaria solutiua, de quibus infra secundum exigentiam. Sumenda autem sunt sicut aqua endiuiz infusionis duarum. 3. rhabarbari cum. 1. 5. mannæ, aut sex. 3. cassiæ, & succus rosa. absinthii, & eupatorii, uiolæ, aloes sed sit lotus, pruna, tamarind. mirabol. Auicē. uicuperat propter stipticitatem. Electaria autem conuenientia, cum opus est magis soluere sunt electarium de psillio, aut de succo ros. cāius. 3. s. cum superscripta infusione posset misceri. Cauendum tamen est in apostematibus à uehementer soluentibus, debilitant enim hepar, & materias agitant, & amplius ad locum apostematatum interdum fluere faciūt. Est igitur melior multiplicatio numeri quā quantitas. In phlegmatico autem fiat decoctio pro clystere ex chamæmilla, meliloto, sceniculo, petroselinio, asparago, lupulis, cuscuthæ, & similibus quibus posset agaricus turbit, carthamus, & similia solutiua, in decoctione addi, his etiam potest addi electarium indum, hiera simplex, cōposita, logodion, & similia antidota solutiua, secundum exigentiam. Fiant tamen in principio clystera leuia, postea gradatim fortificetur secundum qd oportet. Sumenda autem sunt sicut pilulæ de rhabarbaro, cui agaricus addi potest. Item cassia distemperata cum aqua absinthii, aut eupatorii infusionis turbit, aut pauci sacch. Item cassia cum paucis electariis indi, & aquis superscriptis. Item pilulæ de hiera, stomaticæ, alephanginæ. In melancholico autem fiant ex cuscutha, chamædry, chamæpity. itegca-

Io. Arculani

Y de,

de, agarico, fena, & folliculis eius, corticibus, capparis, & po-
natur in clysteribus, sal indum, diafenā, electarium, hamech,
& similia secundum exigentiam. Sumenda autem sunt præ-
dicta electaria cum casia distemperata, cum decoctione ali-
quorum ex superscriptis, sicut cuscutha, fena, epithymi, qui-
bus potest addi, semen endiuia, passula, & similia item fena
solum sumpta cum aqua lactis infusionis sem. endiuia, & cu-
scutha. Sunt etiam pilula inda de lapide lazuli, de lapide ar-
meno deferuientis huic proposito. Digestiua autem in cho-
lerico sunt oxifacchara, acetosus, syrup. s. de granatis, de en-
diuia, de agresta, ros. uiol. de acetositate citri, limonis cum
aqua endiuia, & hepaticæ, uiol. lupulorum, solatri, alchechē-
gi, acetosæ, portulacæ, plantag. papa. & similes. Item huius-
modi aquæ infusionis specierum diarrhodon abbatis, tria-
dalorum cum sacch. sufficienti. Digestiua in apostemate hep-
atis phlegmatico sunt mel rosatum, oximel simplex, cōpo-
situm cum aqua absinthij, eupatorii, & similibus, digestiua
uero in apostemate melancholico à melancholia adusta, sunt
syrupus bizantinus, de pomis dulcibus, de fumoterra, cum
aqua endiuia, hepaticæ, & similibus frigidis & humidis. Sed
in apostemate melancholico à melancholia non adusta syr-
de eupatorio cum aqua buglossæ, boraginis, aut cum deco-
ctione passularum, tamarisci, & similibus, & elaborandū est,
ut euacuationes sint integræ ex minoratiuo, digestino, &
eradicatiuo, etiam iteratis secundum exigentiam. Diuersio
autem iuxta secundam intentionem fiat cum clysteribus de
quibus supra. Item cum appositione uentrosarum in naribus,
pulpis spargularum cum scarificatione, aut sine. Item cum pro-
uocatione sanguinis menstrualis hæmorrhoidalis, aut sangui-
nis narium, si retentus fuerit præter consuetudinem. Item
cum lotionibus crurium, & similibus. Regiminis autē particula
rum prima intētio, scilicet repercussio potest compleri per
sumpta, & applicata. Pro qua intentione debite complenda,
sciendum primo quod repercussiuū, & si sint magnæ neces-
sitaris, sunt tamē magni timoris, primo quia hepar habet uias
ualde angustas, & timor est de oppilatione maiori, secundo
cum repercussio sint luptica, & materiam incuneantia, timor
est de apostematis induratione, tertio quia prohibent
resudationem multoties in apostematibus intrinsecis neces-
sariam, quarto quia sunt causa retentionis cholera, quæ est
magna causa faciens, aut fouens apostemata calida in hepate.
Ex quibus inferitur. Primo quod ipsa debent esse in stipti-
citate remissa, licet possint esse notabiliter frigida secundū
exigentiam sui contrarii. Secundo quod nisi humor aposte-
mans sit ualde calidus, & subtilis, sicut cholera naturalis de-
bent esse mixta cum aperitiuis, lenitiuis, uel incisuiis. Ter-
tio quod oportet resolutiua citius applicare in apostemati-
bus hepatis calidi s quam in aliis apostematibus calidis alio-
rum membrorum, in quibus resolutiua sunt dominantia ual-
de, in medio augmenti, uel in fine repercussiuus commiscen-
tur, sed in his in principio augmenti debent commisceri. In
resolutiuis est timor, & nocumentum. Primo quia dissoluūt
uirtutem, & substantiam hepatis, quæ est sanguis coagulatus.
Item apostema lapideant, & indurant resoluendo partes sub-
tiles, quod est facile in hepate, ut supra dictum est in cap. de
oppilationibus. Quare oportet, ut inter hoc teneatur me-
dium quod est difficile. Et hæc sunt uerba Gal. 13. therapeu.
12. cap. hic ab Alman. posita. Sed consilium meum in tenen-
do hoc medium, ut operemur sine errore, uel cum paucis,
est ut alterum duorum faciamus, aut quod utamur medici-
nis non multum eleuatis in grad. secundum qualitates pri-
mas, neque secundum qualitates secundas, sicut est stipticas,
resolutio & similes. Aut si uolumus his uti propter excellen-
tiam sui contrarii sint aliquantulum refractæ cum medicinis si-
bi contrariis quas melius est non esse fermentatas, ut natura
possit ipsas dirigere contra sua contraria. exempla autem ita
tim ponentur. Est autem sciendum, quod stiptica interius
sumpta, magis sunt apta nocere in apostemate concaui, quā
gibbi, quia citius sibi occurrunt, & cum maiori stipticitate,
cum magis occurrant cum suis partibus terreis. Secun-
do sciendum stiptica applicando non debere esse notabili-
ter frigida actu, tunc enim difficilis esset suæ uirtutis pene-
tratio, frigiditate actuali porositates obstruente, quapropter
petiz, uel philtrum in medicinis applicandis infusum aliquā-

diu in manu teneatur, ut illa frigiditas tepescat, sed in apo-
stemate frigiditas debent esse calida actu non superflua. In-
terius etiam sumpta debent esse actu calida, nisi in casu excessi-
uæ caliditatis cum subtilitate humorum, frigida autem, &
calida interius fumenda sunt pro parte posita cum posuimus
digestiua. Tua autem interest uti eis, tam interius, quam
exteriorius secundum can. datos. utendo, scilicet his quæ non
sunt ualde excessiua, secundum qualitates primas, aut secun-
das, aut si fuerint excessiua refrangendo ea cum contrariis.
Vnde si syrup. fuerit stipticus, sicut rosaceus, de acresta, de
acetositate citri, & similes refrangatur cum syrup. uiola. de
nenuphare, aut cum aqua endiuia, nenupharis, uiol. & simi-
libus. Similiter si aqua fuerit minus frigida, sicut aqua sola-
tri refrangatur cum aqua cichoreæ, capil. uen. & similibus te-
peratis, aut minus frigidis. Similiter si syrup. fuerit nimis
calid. aut nimis resolutiuus, sicut oximel compositum misce-
tur cum syrup. de bizantiis, melle, passularum, & similibus.
Item can. obseruandus est in applicandis exteriorius. Vnde
in speciebus ceroti sandalini ponitur parum croci, aut schi-
nanthi, aut spicæ, & similibus contemperantium superfluum
frigiditatem, similiter in emplastris stipticis regioni hepa-
tis applicandis, ut puta factis ex ros. burapastoris, carne ci-
ton. & similibus, ponatur aliquid chamæmillæ, meliloti, me-
dullæ uituli, & similibus. Similiter in resolutiuis ponatur
aliquid mollificatiuum, aut incisuum, sicut in succo eupat-
torij, aut absinthij & similibus resolutiuis ponatur ali-
quid mucilaginis, maluaufici, fœnugræci aut sem. lini, uel
aliquid medullæ, aut pinguedinis, item ponatur aliquid ace-
ti. Epithyma conueniens in principio apostematis sangui-
nei. R. aquæ ros. aquæ endiuia, ana. 3. 2. ace. 5. 1. sanda. rub.
3. 2. spodi. 3. 1. misce, & cum petia, aut philtro infuso in eo
applicetur ipsis aliquantulum inter manus tepescatis. Vntio.
R. olei ros. 5. 1. specierum ceroti sandalini. 3. 2. acet. modicū,
ceræ quantum sufficit, fiat unctio, sed in erysipelate cum his
misceantur magis infrigidantia, sicut succus solatri, semper-
uiuæ, campho. & similia, & existente magno caumate ponan-
tur actu frigida. Sed in augmento apostematis sanguinei
cum superscriptis misceatur aliquid olei de spica, mastic-
ni, aut chamomelini, & parum mucilaginis maluaufici, fœ-
nug. aut sem. lini, uel parum medullæ uituli, aut pinguedinis
alicuius, aut olei sesam. aut olei amygd. dul. & ita gradatim
quanto magis procedit augeantur resolutiua addēdo etiam
quædam mollificantiā. sed in erysipelate etiam usque ad de-
clinationem non sunt addenda calida resolutiua, quod mollifi-
cantia nisi in modica quantitate, & in fine principij aposte-
matis sanguinei conuenit emplastrū factum ex cytoniis tri-
tis, cum far. hord. cū aqua ros. pauco aceti, aut citonia in ace-
to decocta, aut aqua tripla ad acetū, quibus potest addi oleū
ros. & sand. hæc. n. sub forma emplastri fortius imprimūt, sed
postea in processu addantur prædictis oleū de spica, mastic-
pinguedines, medullæ, aut mucil. fm. exigentiam. Ex Anicē.
collige emplastrū hoc expertum, & laudabile conueniens in
statu, & declinatione. R. thyracis liquidæ, ceræ. ana. darchi-
meth. 10. masticis, croci, amomi. ana. darchim. 4. olei de ar-
bore masticis, olei ros. ana. darchim. 2. uini cotylas duas, &
mediā. Est autē darchimet pondus. 3. 1. sed cotyla pondus. 8.
3. hoc medicamen hoc modo cōficiendum est, bulliant uinū,
& olea simul ad consumptionē uini, & cum ipsis misceantur
reliqua, & reducat ad formā unguenti. Quod si apostema
fuerit phlegmaticum epithimetur in principio regio hepa-
tis hoc epithimate. R. olei ro. de spica, olei mastic. acet. an.
3. 1. misce, & petia, uel philtrū in eo infusum exprimatur, &
aliquantulum inter manus calefiat, & applicetur, uel fiat unctio
ex prædictis addendo ceræ quantū sufficit. Sed in augmento
dimittatur oleum ros. & acetum fit subquadruplum ad olea,
& applicetur ut supra, sed in statu cum prædictis succus eu-
patorii misceatur, & si opus est maiori resolutione cum ali-
quali mollificatione supponatur emplastrum de meliloto.
Interim tamen cum aquis, syrupis, & electariis, clysteribus,
& similibus, & in hac dispositione propriis adiunctur, quæ
prouocent apostemate existente in gibbo, & per uentrem
educant apostemate existente in concauo, & ex prouocan-
tibus est oximel compositum cum aqua fœni. apii, aspa-
ragi, & similibus. Item dialacea, diacureuma, quæ si uideantur

meseraicas terminatas ad stomachum non possit esse effusio saniei ad ipsum, cum etiam tuncdem sanguinem effundi ab hepate ad stomachum, imo stomachus recipit superfluitates totius mediante hepate. Si ergo sanies effundatur ad stomachum, uel ad intestina sumat in potu aquam mellis, debite calidam, ut fiat mundificatio stomachi, & intestinorum, necnō ulceris à sanie. Et attendatur uomitus, aut uentris solutio in cum lenibus mundificantibus regiones illas maxime natura tentante euacuatione per easdem. Si uero erumpitur ad renes, & ad uescam, sumat aquam mellis cum lacte seminum communium frigidorum. Vbi adsit notabilis caliditas, uel et ponantur grana alchechengi ad bulliendum, dum fit aqua mellis. Si uero esset remissa caliditas ponantur radices aparagapi, & similia diuretica ad bulliendum, dum fit aqua mellis. Si uero sanies contineatur in inguine, & sit notabilis quantitas, ut non sit uersimiliter resolutio, perforetur uenter ubi est sanies cauendo lectionem musculi, ita ut perforetur sphac nominatū ab Auic. burabaton. Et sit foramen paruum in quo ponatur cannula pro extractione saniei si fuerit expediens. Et paulatim extrahatur secundum quod extrahitur in extractione aque hydropicorum. Postea intendatur consolidatio cum thure, mastiche, san. drach. bolo. arm. charab. & similia quæ sumantur cum aqua mellis, aut sacchari, aut endiuia, plantaginis, & similia. Et in toto curæ processu corriganter accidentia, iuxta primam intentionem tertii regiminis, secundum quod fuerit expediens. Vltima aut intentio tertii regiminis perficitur, ut infra. Regimen enim sex rerum non naturalium in apostematibus calidis, debet esse frigidum, sed magis in cholerico, quam in sanguineo, & in frigidis debet esse calidum, humidum in melancholico, siccū in phlegmatico, uide primo in calid. eligatur aer frigid. uel præparetur artificialiter modis supradictis. Et huic oppositum eligatur in frigidis, uel præparetur cum igne, & similibus. Dieta sit frigida, & ualde tenuis, sicut aqua hordei, cum pauco iulep uiolati, uel sit aqua facchia. Ita ut usque ad tertium nihil aliud detur nisi forte prisa, quæ etiam continuetur usque ad septimum, uel detur ius pulli parui cum agresta, uel uino granatorum, donec perueniatur ad extremitates pullarum, & olera, ut lactuca, atriplices, spinachia, endiuia, & hepatica. Et si opus erit panis fiat ex hordeo, uel farre, aut ex farina frumenti non omnino à futuribus depurata, uinum nō conceditur, nisi forte pauciferm, cui aqua permixta sit sexcupla. Procedente tamen tempore, & proprie cum uentum est ad declinationem, dieta magis incrassetur. Et liberius uinum concedi potest subtile non dulce. Sit quietus animo & corpore, somnus iuuat ad digestionem, & doloris sedationē & ratione huius deberet esse longus, nocet tamen attrahendo materias, eligatur ergo medicorū, scilicet septem horarum, aut circa. Credo tamen minus malum esse declinare ad somnum prolixiorem quam oportet, & ad breuiorem quam oportet, præcipue in apostematibus calidis, in quibus multum impeditur somnus. In frigidis uero similiter dieta debet esse subtilis, licet non tantum quantum in calidis ad præhibendum augmentum, & digerendum humorem. Nam facta diminutione in humoribus non fiet tantus fluxus, sed debet esse circa temperiem aut declinas ad calidum, sicut prisa, panis lotus, quæ si præparentur cum schinantho erunt erunt præstantiora, postea præparentur cum croco, passulis, & aliis digerentibus. Venter sit potius lenis, quam striclus. Et procurentur alia euacuationes naturales & etiam nō naturales sibi consueta sicut fluxus hæmorrhoidalis & ulcus recti consuetum & similia. Somnus sit septem horarum, aut circa. Quiescat animo & corpore. Cura apostematum mirach & lacerorum uentris inferioris est proxima curatio nisi apostematum hepatis. Vnde eadem medicinx & eiusdem intentionis conueniunt in utrisque. Et non est differentia, nisi quia in his debemus audacius repercutere in principio, & proprie in augmento, & audacius resolueri in statu, & declinatione quam in apostematibus hepatis. Medicinx ergo postea in apost. hepatis his accommodantur in exequendo intentiones similes tam uniuersales quam particulares. Cura apost. meseraicæ sive mesenterii est similis curationi apost. concauitatis hepatis.

De dolore hepatis. Cap. 97.

CVM quis malè fuerit coloratus, & cum hoc malum habuerit formam, habueritq; dolorem in dextro latere apud costas posteriores, & fuerit eius malus color citrinus, et fuerit cū hoc in ore siccitas, et sitis uehemens,

Hoc cap. intitulatum de dolore hepatis est primum inter cap. dispositionum hepatis, de quib. agit Rasis in parte præfenti, quia dolor quantum ad quid nominis aut quid rei est satis manifestus. Diuiditur hoc cap. in partes. 3. In 1. determinat de dolore à causa cal. In 2. de dolore à causa frig. In 3. pro cura apostematum hepatis remittit nos ad curam apostematum stomachi. 2. ibi. Quod si malus color 3. ibi. Si autem aposte. in hepate fiant. Prima in duas. In. 1. ponuntur aliqua signa aposte. cal. in hepate. Secundo curam. 2. ibi. Aqua hordei. In. 2. dicit, cum aliquis fuerit male coloratus, & cum hoc fuerit malæ figuræ. i. habitudinis siue formæ, & habuerit dolorem in latere dextro apud costas posteriores, quæ dicuntur mendosæ, & color suus malus fuerit citr. & fuerit in ore sic. et sitis uehemens. Quæ duo signa postrema arguunt dominium caliditatis cum materia colerica, supple tu hic, dolor prouenit à causa calida.

Aqua † hordei, & succi herbarum; ut endiuie, & solatri, & cuscute cum syrupo acetofo, de saccharo alb. factio in potu tribuatur. Emplastrum † quoq; ex 2. sandalis, & rosif, & camp. & aqua ros. cum panno lineo loco superponatur. quod hoc modo fiat. Pannus in prædictis inuolutus superponatur: cumq; tepere inceperit, remoueat, & alius loco eius apponatur. in potu præterea sumat † granatorum succum, & rob, qui in frigidare consueuerunt. Hic quoq; à vino, & à confectiionibus, quæ de melle sunt sibi caueat, & à cibis calefacientibus. & sumat trochiscos de berberis. qui recipit succi berberis drachmas decem, seminis endiuie, seminis citrulli, portulacæ, seminis omnium. ana drach. tres, rosarum drachmas duas ravedseni, drachmam vnam, spicæ drachmam semis. informantur trochisci pondere aurci vnius, ex quibus detur vnus cum syrupo acetofo de saccharo, aut cum succo granati. venter quoque, si necesse fuerit, cum succo fructuum soluatur; ut sunt pruna, & tamarindi, & saccharo albo.

Hic ponit curam. Primo cum aqua hordei, & succis endiuie, solatri, cuscute, mixtis cum syrupo acetofo, simpliciter factio ex saccharo albo, quæ in potu tribuatur. Aqua quidem hordei per se ne forte mixta cum syrup. acetofo in stomacho acetosetur. Succus vero singulariter aut coniunctim mixti cū syrup. acetofo. Sunt enim aperitiui hepatis, confortatiui, & primi duo frigidi. Sed succus cuscute, circa temperiem notabiliter aperitiuus oppilationum, & proprie pori fellei. Secundo emplastrum, idest, epithyma ex duobus sandalis, ana, 3. 2. ros. 3. 1. camphoræ, 3. s. aquæ ros. 3. in quo infundatur pannus & aliquid compressus regioni hepatis applicetur notabiliter frigidus. Et cum tepere coeperit remoueas & alius actu frigidus super ponatur. ait enim Auic. per frigiditatem actuale & potentialem caliditas hepatis superflua temperetur. Tercio in potu sumat vinum granatorum, scilicet mazorum aut acrium & similiter rob, idest, succos per decoctionem aut ad solem inspissatos qui frigidi sint sicut rob de agresta, de acetositate citri, limonis & similibus cum aqua endiuie, hepaticæ & similibus, aut cum aqua cocta cum saccharo. Quarto à vino confectiionibus de melle & cibis calefacientibus abstineat. Quinto sumat trochiscos de berberis. Quorum descriptio. R. suc. berberis frig. & sic. in fine tertij sem. endiuie, citrulli, portul. an. 3. 3. ros. 3. 2. ravedseni. 3. 1. spicæ. 3. s. informantur trochisci pondere aur. 1. ex quib. detur vnus cū syrupo acetofo, de sacch. aut cū succo granati. Sexto venter, si necesse est cū succo fructuum soluatur, si haberi potest. si uero non. R. prunorum, tamarindorum, ana. 3. 3. incidantur & infundantur in una lib. aquæ et media per decem horas, deinde bulliant, donec remaneat tertia pars aquæ & coletur sufficienter exprimendo & ca-

lida in potu exhibeatur & cum saccharo dulcoretur.

S C H O L I A.

Aqua hordei in calida hepatis intemperie licet sit necesse frigiditas medicamentis uti; tamen, cum virtus hepatis totam hominis vitam taceatur, atque conferret; oportet eius vires rescire, & augere medicamine parum frigido, stiptico, abstergente, & aperiente. Emplastrum quoque hepati valde inflammato confert. Granatorum succum qui quæ locum habeant inter dulcia, & acetosa.

Quod, si malus color, qui est cum dolore hepatis; fuerit albus, medius uidelicet inter eum, qui est cum fluxibilitate: & eum, qui est cum tumore, fueritq; cum eo uentris solutio, & palpebrarum, atque extremitatum tumor; trochisci † de ravedseni cum syrupo acetofo de melle in potu dandi sunt. Rec. spicæ mastichis, succi eupatorii, succi absinthij, seminis fœniculi, anisi omnium ana drach. 2. ravedseni drach. 1. o. informantur trochisci pondere aur. vnius, ex quibus vnus in potu omni die tribuatur. Sumantur præterea mastix, spica, cyperi, schinanthus, calamus, arom. croc. myrrha. deinde mirrha, & mastix in vino dissoluta cum alijs misceantur, & ex eis emplastrum hepati superponatur. Ager † verò à cibis frigidis, & crassis abstineat. si autem hæc non suffecerint; trochisci de lacca cum apozemate de radicibus sunt dandi. Trochisci autem de lacca sunt isti. Rec. lacca, ravedseni amborum ana drach. 3. spicæ, seminis apij, ameos, mastichis, schinanthi, sem. iuniperi, amygdalarum amararum, costi amari, rubæ, succi eupatorii, asari, aristol. rotum, gentiane omnium. ana. drach. 1. s. informantur ex his trochisci pondere aurei unius. Apozema de radicibus. Rec. corticum radicem apij, fœniculi amborum, ana drach. 1. o. sem. apij, sem. fœniculi, florum, schinanthi, ameos, omnium ana. dra. 5. ros. rub. spicæ odoriferæ amborum ana drach. 3. coquantur in lib. 1. donec ad tertiam redeant, & detur in potu cum prædictis trochiscis.

Hic ponit curam, quando est à causa frigida. primo per trochiscos de rheubarbaro, & emplastrum, secundo per regimen vitæ, tertio per trochiscos de lacca quos describit, & describit etiam decoctionem unam, quam uult dari cum dictis trochiscis. secunda ibi. Ager uero. tertia ibi. Si autem hæc. In prima parte dicit, quod si malus color, qui est cum dolore hepatis fuerit albus attestans phlegmaticum, medius, uidelicet inter eum, qui est cum fluxibilitate, id est, magna mollicitæ, qualis est mollicitis reperta in hypofarca supra, & paruam mollietatem qualis est mollicitis phlegmatici naturaliter dispositi, & medius etiam inter illum, qui est cum tumore hypofartico, & illum qui est in phlegmatico naturaliter disposito. Iste enim color, de quo est hic sermo, est proprie color cazetici qui est medius inter colorem hypofarcæ, & naturalem phlegmatici, sicut etiam mollicitis & tumor sunt medij. Quod si fuerint cum eo uentris solutio, & palpebrarum, atque extremitatum tumor, sicut aliquando accidit, trochisci de ravedseni cum oximelle dandi sunt in potu Rec. spicæ, mastichis, succi eupatorii, succi absinthij, sem. fœniculi, anisi. an. 3. 2. raved. id est, rhubarbarum, 3. 1. o. informantur trochisci pondere unius aur. ex quibus in potu omni die sumatur cū aliquo liquore proprio, sicut aqua absinthij, eupatorii, aut apozema statim describendum. Sumatur præterea. hic describitur emplastrum, Rec. spicæ, mastichis, cyperi, schinanthi, calami, arom. ana. 3. 2. croci. 3. 1. mirrhe 3. 2. conficiatur hoc modo, mirrha, & mastix in uino dissoluantur & cum alijs misceantur, & hepati superponatur. Et si non esset bene tenax, addatur plus de mastiche & mirrha. Ager uero à cibis crassis & frigidis abstineat. Si autem hæc non suffecerint trochisci de lacca cum apozemate, id est, decoctione de radicibus dandi sunt, qui Recip. lacca, ravedseni, amborum ana. 3. 3. spicæ. sem. apij, ameos mastichis, schinanthi, sem. iuniperi, amygdalarum amararum, costi amari, quia calidior rubæ, succi eupatorii, asari, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, ana. 3. unam semis, informantur trochisci ponderis, aurei. 1. Ex quibus detur vnus cum apozemate de radicibus quod recipit, corticum radicem apij, fœniculi, ana.

li, ana. 3. 10. sem. apii, sem. feniculi florum schinanthi, ameos ana. 3. 5. rosarum rub. spica odorifera, ana. 3. 3. coquantur in lib. 1. aquæ donec redeat ad tertiam, & detur in potu cū prædictis trochiscis. Certe ego non credo tantam quantitatem rerum in una lib. posse decoqui, immo uix sufficerent tres lib. ex quo collige magnam quantitatem rerum debere poni in decoctione, cuius oppositum faciunt moderni. Sed mihi uidentur antiqui & moderni tenere extrema. complexionones istarum medicinarum sunt sæpe declarata superius.

SCHOLIA.

Trochisci de rauerfeni &c. sed uilius esset anea humores corrigere, & euacuare: postea exhibere trochiscos. Aeger si cibis frigidis, & crassis abstineat ne meatus obstruantur hepatis.

Si autem apostemata in hepate fiant, eorum cura erit, ut apostematum, quæ in stomacho generantur.

Rasis in parte præfenti pro cura apostematum hepatis remittit nos ad capitulum de cura apostematis stomachi. Dolor hepatis aut est perforatius & fit à uentositate aut uapore crasso sub panniculo contento paruum spacium occupante. Aut est extensiuum & fit à uentositate, aut uapore satis magnum spacium occupante, aut ab humore multo extendente. Aut est pungitiuus, & fit ab humore acuto panniculum punge. Aut est grauius, & fit ab humore multo aut crasso siue apostemet siue non. Sunt & aliæ species dolorum, sed hæc communiter accidunt hepati.

Sed pro notitia causarum est sciendum, quod causa immoderata doloris eius est solutio continui, aut mala complexio panniculo communicata, cum hepar quantum ad eius carnem non sentiat. Prima autem causa solutionis continui est uentositas, aut uapor crassus extendens panniculum & faciès inflationem. Qui uapor & uentositas non inueniunt exitum, aut propter multitudinem, aut propter oppilationem. Causæ autem uaporum & uentositatum & consequenter inflationis hepatis sunt sicut in inflatione stomachi dictum est. Aut ex parte ciborum & proprie illorum quæ in secunda digestionem uentofantur, quorum uentofitas in hepate retinetur faciès eius inflationem, sicut illa quæ generatur in tertia digestionem est causa erectionis uirgæ. Aut sunt ex parte caliditatis medix inter resolutem insensibiliter, & non potentem humidum uentofare, plurimum tamen causa materialis est multitudo phlegmatis aut melancholiz, ubicumque sit in hepate, uenis, stomacho uel splene. Secunda causa solutionis continui aut male complexionis & consequenter doloris est multitudo humorum aut eorum acuitas absque quod apostemet. Tertia causa est apostema calidum aut durum. Nam phlegmaticum raro facit dolori notabilem. Quarta causa est motus criticus aut symptomaticus humorum qui dolorem faciunt aut suis uaporibus, aut quia ipsimet moti ad hepar impiendo extendunt, & simul faciunt malam complexionem & solutionem continui. Quinta causa est oppilatio. Sexta debilitas. Sciendum tamen, quod quando dolor hepatis est fortis, aut est ab apostemate, aut à uentositate, & si est ab apostemate est febris & granitas. Si uero à uentositate, non est febris neque grauitas, et talem dolorem resoluit febris iuxta aph. 49. septimæ particulæ. Quibusque circumdolet hepar his febris superueniens soluit dolorem. Signa uentositatis & inflationis sunt tensio quædam in hepate, & additio festina & mutatio, proprium enim uentositati est cito augeri & minui, mutari & interpolare & ibi non est grauitas, neque alteratur cū ea forma nisi uentofitas habeat materiam fouentem, & quandoque compressio sedat eam, similiter carminantia si ipsa uentofitas non habet materiam. Signa uero malarum complexionum, hepatis debilitatis, oppilationis apostematum patent ex cap. præcedentibus. Crisis uero cognoscitur ex præcedenti ægritudine quæ cum ea terminatur.

Prognostica. Primum. Dolor hepatis sanatur si ægritudine à quibus pendet sanari possunt. Secundum est ex lib. Hippocratis inuenio in sepulchro, quando est dolor hepatis cum pruritu uehementi in camadati, id est in collo uel postiori parte capitis & pollice pedis, & apparet bothor simile fabæ in collo moritur talis in quinto, ante ortum solis, & accidit ipsi difficultas urinae cum distillatione propter oppila-

tionem in collo uescicæ, propter nocumentum lacerti eius. Et ratio huius est, quia hic dolor fit ab humoribus malignis, qui sunt oppilatiui, ideo fit difficultas urinae & in ipsis est caliditas & bauracitas, unde eleuantur uapores, qui faciunt pruritum in locis dictis, & natura tentat materiam expellere, & non potest nisi paruum partem permutare, cuius signum est bothor in collo, ergo significatur, cum hæc ægritudo sit acuta, quod natura cito succumbet, in fine quarti, ideo moritur ante ortum solis quinti diei.

Cura doloris hepatis si sequatur uapores & uentofitates inflantes & extendentes exigit sex intentiones. Prima euacuatio euacuatione integrata ex minoratio, digestio, & eradicatione, etiam iteratis si fuerit expediens. Secunda diuertit cum clysteribus, & aliis generibus diuersorum. Tertia aperit uias ut uentofitas ubere possit exire. Quarta uentofitates resoluit hepar confortando. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum. Sumat pro minoratio iuxta primam intentionem septem pilulas de rhabarbaro, aut de eupatorio, aut de alchechengi. Et pro digestio syrupum acetosum compositum aut oximel compositum cū aqua absinthij cichoreæ & similibus, & pro eradicatione pilulas de rauid aut aggregatiuas aut electarium indum. Pro secunda intentione utatur clysteribus carminantibus uentofitatem, & euacuantibus humores, ex quibus uentofitas generatur. Et aliquando ponantur uentofæ sub hepate. Sed pro tertia utatur dialacca, aut diacurcuma & si uiderentur nimis calidæ cum diarhodon temperentur. Sed pro quarta utatur fomentis resolutibus uentofitatem, sicut est fomentatio cum oleo de spica, aut cum decoctione in uino, aut aqua carminantium uentofitatem sicut spica, antherum, ruta & similia, aut cum sacculis ex milio aut furfure correfacti, aut uino aspersis, & apud Auicennam consideretur, ad quod latus declinet uentofitas, nam si extenditur dolor ad partes intestinorum, tunc solue uentrem prius cum prædictis, deinde de solue uentofitatem, & si extenditur ad diaphragma, ossa pectoris, & dorsum administra diuretica sicut dialacca &c. Deinde resolutia uentofitatem prædictam. Sed pro quinta intentione corriganur accidentia secundum exigentiam. Pro sexta uero apud Auicennam conuenit unum purum in ieiunio, sed in modica quantitate, uet potum aquæ frigidæ, sit parcus in cibo & potu, qui tamen declinent ad calidum & secum secundum plurimum, & utatur aperitiuis & carminantibus uentofitatem, & uet multiplicanti uentofitatem & oppilati, sed de his dictum est in passionibus stomachi, & dicitur in colica uentofa & tympanite, inter cætera notabiliter exercetur stomacho ieiunio. Doloris autem prædicti à reliquis causis, si à mala complexionem sine materia & cum materia, ab apostematibus, ab oppilationibus & debilitate, cura patere potest ex capitulis præcedentibus & pro magna parte patet ex textu Rasis. Auicenna tamen appropriat quædam in cura doloris hepatis, sicut trochiscos de rhabarbaro, confectiorem de rhabarbaro, diacurcuma & similia, quæ lege in eo in proprio capitulo.

De Icteria.

Cap. 98.

SI cum icteritia. Quia icteritia secundum plurimum causatur uitio Kystis fellis, ideo de ipsius anatomia iuxta morem consuetum agendum est. Kystis fellis, quæ descriptiue est membrum instrumentale paruum, figuræ oblongæ ad rotunditatem tendentis sub media pennula hepatis collocatum ex una pellicula, neruo, arteria & uena compositum ex fundo, & collo trifurcato integratum, ad mundificandum choleram à sanguine, ipsamque ad fundum stomachi pro uigoranda digestionem expellendum, ad intestinum duodenum, pro uigoranda expulsionem finaliter ordinatum. Est quidē instrumentale, quia compositum & ad operationes, pro conseruatione indiuidui, necessarias totique communes ordinatum. Paruum quidem saltem in comparatione ad splenem, cum minor sit quantitas cholerae quam melancholiz. Est autem figuræ oblongæ, sic enim aptius diuidi potest in collum & fundum eius. Tendit autem ad rotunditatem, quia hæc figura est omnium capacissima & à nocuentis magis tuta, & est collocatum sub media pennula hepatis quantum ad fundum, licet collum à medio hepatis origine trahat. Hoc enim conueniens fuit, ut cholera superflua posset apertius ad ipsum purgari, in

10. Arculani

Y 3 medio

medio enim hepatis perficitur digestio, & in ea parte cholera refectio. Et ex hoc patet cōcordia Gal. 5. de iuuentis membrorum dicentis Kyrtis fellis in medio collocari inter uenas, quæ deferunt chylum ad hepar, id est, meseraicas & uenas, quæ deferunt sanguinem ad membra, id est, uenam chylum. Hoc enim intelligitur de collo eius, quantum ad ipsius originem: non autem de fundo, & est composita ex unica pellicula habente tres species uillorum, sola enim sibi sufficit ex unico neruo, & unica arteria neniētibz ad ipsam ad dandum ipsi sensum & uitam, & hi sunt rami nerui & arteriæ, qui delegati sunt à cerebro & corde ad hepar, uena autem ipsam nutrienda descendit ab hepate. Est autem integrata ex fundo ad continendum cholera in modum sacculi, & collo eius trifurcata. Prima autem pars colli continua fundo fert cholera ad fundum, & ipsam refert cum expellenda est ad stomachum, & ad intestina, propterea dixit Gale. 3. uirtutum naturalium, quod Kyrtis per idem collum attrahit cholera & expellit. Hoc autem collum bifurcatur. Vna pars tendit ad medium hepatis siue melius ab ipso oritur, quæ solum est cholera ad Kistim delatua. Alter autem ramus tendit uersus fundum stomachi, & intestinum duodenum, & bifurcatur in quibusdam, una eius pars, quæ est minor, uadit ad fundum stomachi, ad uigorandum digestionē. Altera autem pars, & maior uadit ad duodenum ad uigorandum expulsiuam intestinorum propterea feces sunt citrinæ. Si autem contingat quod maior est ramus, in quibusdam tendens ad stomachum, illi sunt infelices à generatione cum fere quotidie cholera euomant, & sunt stricti secundum uentrem. Postea in definitione exprimuntur tres fines Kyrtis fellis. Vnus ad mundificandum cholera in sanguine ne nutritionem impediatur. Secundus est ad uigorandum digestionem stomachi. Tercius ad uigorandum expulsiuam intestinorum. Et ex his patet, quia Kyrtis fellis est complexionis calidæ & siccæ, quantum ad complexionem innatam, ætuationem per influentem, & potest pati omne genus ægritudinis simplicis, & compositæ, præcipue frequenter patitur oppilationem, ad quam sequitur icteritia de qua Ras. agit in præfati capitulo. Icteritia dicta est ab æu icteri croceo colore. Et est auis, quæ comedit ficus. Vnde Plinius. Icteris uocatur auis à colore, quæ spectetur ab icterico sanari illud malum tradunt & æuem mori, à quibusdam dicitur morbus arcuatus, ab iri arcu propter colorum uarietatem. Icteritia descriptiue apud Auicē. 1. 5. tertij est alteratio coloris foeda, ad citrinitatem tendens, aut nigredinem propter cursum humoris citrini aut nigri ad eum & quæ sequuntur eam. Icteritia est triplex citrina, nigra, & uiridis. Citrina pender à cholera citrina. Nigra à cholera nigra, siue melancholia. Viridis à cholera uiridis, uel ab utriusque simul mixtis. Ex colore enim citrino admixto colori nigro resultat color uiridis. His ergo duobus humoribus ueniētibz ad cutem causatur icteritia uiridis. Quamquam sit imaginabile à cholera uiridi præsina uel zinaria sparsa, ad cutem fieri icteritiam uiridem. De hac tamen cum rarissime contingat per paucos auctores faciunt mentionem. Hi autem humores si putrescerent facerent febres, cholera quidem tertianam, melancholia quartanam, ambæ simul utranque.

Causæ autem citrinæ. Secundum plurimum est ex parte hepatis, & Kistis fellis. Et causa nigra est ex plene. Et quandoque accidit ex hepate, cum superfluat eius caliditas. Et quandoque accidit ut sit causa citrina aut nigra simul complexio communis corpori cum superfluit in caliditate, conuertitur enim sanguis partim in cholera, partim in melancholia per aduersionem. Sed loquamur prius de causis citrinæ. Causæ ergo icteritiæ citrinæ sunt, aut multitudo cholera & generationis eius, aut prohibitio euacuationis eius. Causæ autem multitudinis cholera sunt primitiua, aut corporea. Et primitiua aliquæ sunt extraneæ, sicut morsus serpentis qui dicitur generati, morsus tyri uel uespæ grossæ, & punctura pediculi uulturis, & res bibite sicut fel leopardi & uiperæ quando non interficiunt statim, & ita sunt omnes medicinæ fortissimæ caliditatis adurendo sanguinem in cholera. Sunt autem quedam non extraneæ sumptæ ex sex generibus rerum sicut æstas & aer ualde calidus & siccus & uenti similes, & influxus coelestes, sol, ignis, & huiusmo-

di. Item potus calidi sicut nimum, potus aquæ nitis, & aqua multi mellis, & omnia notabiliter dulcia & amara & acuta, & maxime res cal. subtilis substantiæ quæ sunt aptæ superflue decoqui. Item ex parte artificij sicut res fixæ aut superflue assatæ, ex his enim est apta multa cholera generari. Item uigilia superflua & exercitium intensum & maxime sub æstu solis aut circa materiam adustiam. Similiter accidentia animi multum inflammantia sicut ira, & timor &c. Causæ autem corporeæ sunt, aut propter totum aut propter hepar, licet stomachus coadiuuat & cor, & cum multum sunt calidi. Propter totum quidem sicut quando totum corpus multum supercalefit à febre, aut ex alijs causis. Subtile enim sanguis conuertitur in cholera. Et quandoque cholera cum multa est & acuta, natura stimulata critice aut symptomatice expellit ad cutem sicut plerumque accidit in febribus cholericis iuxta Aphorif. 62. quartæ particula. Quibusque febribus in septima aut nona, aut undecima, aut decima quarta die icteritia superuenit bonum, si non dextrum hypochondrium durum fiat. Si uero fit non est bonum, & tunc fit subito icteritia. Quandoque fit paulatim quando illud quod de cholera paulatim generatur, ad cutem transmittitur & non resoluitur propter spissitudinem cutis, uel crassitatem materiei, uel prohibitionem resolutionis ab aere frigido, & proprie quando sunt uenti septentrionales. Similiter contingit in retentione sudoris à quacunque causa fiat. Propter hepar uero quando est calidissima complexionis, & tunc fere semper homo est aliquantulum ictericus, aut quando superflue calefit, sicut in febribus & apostematibus calidis. Aliquando etiam supercalefit hepar supernaturaliter propter longam moram cholera in ipso, aut propter oppilationem, aut debilitatem expulsiuæ suæ, aut debilitatem attractiua Kyrtis. Et ita de alijs causis præter modum inflammantibus hepar, ut panni calidi, clystera calida quibus aliquando utimur in colica, aquæ uicis, & potius reliqui superflue calidi. Prohibitio autem euacuationis est, aut ab hepate, aut à Kyrti, aut ab intestinis, aut ab alijs membris. Ab hepate quidem, quia uirtus eius expulsiua aut separatiua siue discretiua est debilis propter aliquam eius ægritudinem, aut forte, quia oppilatum est propter causas oppilationis supra scriptas, aut facta est oppilatio in principio uel circa principium canalis, per quem Kyrtis recipit cholera ab hepate siue illa oppilatio sit coniuncta apostemati siue nō. Ex parte uero kyrtis sumuntur causæ multipliciter aut propter debilitatem attractiua eius aut intensionem eius, unde attrahit multum uice una, & impletur nimis & extenditur præter modum, & sic debilitatur maxime secundum uillos longitudinales & latitudinales, ut neque possit expellere neque attrahere. Item aliquando accidit propter nimis festinam attractionem, quod aliquod phlegma simul cum cholera attrahitur nondum facta perfecta separatione in hepate, quapropter fit oppilatio, aut in meatu per quem cholera attrahitur ad ipsam, aut per quem expellitur ad stomachum aut ad intestina. Quapropter huiusmodi oppilatio potest esse in triplici meatu, scilicet, aut in illo per quem attrahit ab hepate, aut per quem expellit ad fundum stomachi, aut per quem expellit ad intestina. Sed per communatatem ab intestinis fit icteritia, quando oppilatur extremitas meatus Kyrtis fellis ad ieiunum propter phlegmata, quæ sunt in ipsis intestinis obturantia orificium dicti meatus, uel dum ipsa intestina sunt oppilata ut in colica & ileos dicitur. Cholera etiam crassa replens intestina potest esse causa, cur cholera existens in kyrti non ueniat ad intestina quamuis meatus sit apertus. Et in hoc casu aliquando cholera in intestinis retenta ascendit ad stomachum per reuolutiones intestinorum, & fit ardor in stomacho, & corruptio digestionis, uertigo & similia. Et in his casibus non habens descensum per intestina reuertitur ad hepar, & postea spargitur cum sanguine per totum, & est causa icteritiæ. Hoc autem est ualde raro, & non nisi sopita expulsiua uel destructa sopito, aut destructo intestinorum sensu, uel etiam destructa operatione uillorum latitudinalium ipsorum intestinorum, quando aliquando accidit propter nimiam ipsorum extensionem, unde colica est causa icteritiæ & antecedit eam, & aliquando icteritia antecedit

dit colicam, quando propter oppilationem aut aliam causam cholera retenta non uenit ad intestina ad stimulandum expulsiuam, & lauandum intestina, & pendens ambæ, scilicet icteritia, & colica ab eadem causa communi, ut puta ab oppilationem pori fellei uenientis ad intestina, ultimo fit per communitatem ab aliis membris, sicut quando propter oppilationem pororum cutis prohibetur cholera resolutio. Icteritia nigra in causis similatur icteritiae citrinæ. Est enim quandoque propter multitudinem melancholiz, quandoque propter prohibitionem euacuationis eius. Causæ uero multiplicationis eius, quandoque sunt primitiue sicut caliditas aeris adurens & frigiditas congelans, necnon cibaria proportionata generationi melancholiz, de quibus dictum est in cap. de melancholia. Causæ corporeæ sunt superflua caliditas hepatis aut totius adurens sanguinem, & crassum eius conuertens in melancholiam. Aut eorum superflua frigiditas congelando sanguinem denigrans & in melancholiam conuertens. Causæ autem calefacientes & in frigidantes possunt esse primitiue iam dictæ & corporeæ sicut febres adurentes & totius frigiditas superflua maxime siccitati coniuncta. Item aliquando hæc icteritia est critica sicut in febribus quartanis aut ægritudine splenis, & fit in paruo tempore cum uirtus expellens est fortis & materia non multum crassa. Aliquando uero fit in longo tempore melancholia, paulatim generata & paulatim ad cutim expulsa. Secundo icteritia nigra fit propter prohibitionem euacuationis sequentem debilitatem discretiue & expulsiue hepatis, aut debilitatem attractiue splenis aut nimiam eius repletionem. Aut oppilationem rami uenæ portæ deferentis melancholiam ad splenem, aut oppilationem meatus à splene ad os stomachi, aut propter oppilationem intestinorum aut mesentericarum, quæ ab ipsa terminantur. Ego autem uidi icteritiā nigram sequentem gibbositatem per quam fiebat tanta compressio super splenem, ut non posset recipere melancholiam sibi ab hepate delegatam, aliquando duæ icteritiæ, scilicet, citrina & nigra simul coniunguntur propter causas & nocumenta communia hepatis kylli fellis & splenis, aut quia duæ cholerae ex sanguine generantur per eius aduersionem, uel cum sanguine commiscuntur & sparguntur in toto. Signa icteritiæ secundum eius tres species sunt manifesta uisui. Manifestatur autem secundum plurimum in coniunctiua oculi propter eius albedinem facientem, ut omne minimum uestigiū in ea facile & subito appareat. Sed opus est ut ponamus signa cuiuscunque propria & causarū eius incipiendo ab icteritia citrina. Primum signum ferre commune omni icteritiæ citrinæ est urinae citrinitas propter mixtionem cholerae cum ea, imo interdum tanta fit cholerae admixtio cum aquositate urinali, ut urina appareat nigra & stante icteritia quanto magis tingitur tanto maior significatur fortitudo expulsiue hepatis, licet melius esset ut expelleretur ad intestina. Secundo minoratur appetitus propter caliditatem & horribilitatem cholerae, & contra multiplicatur sitis. Tercio, corpus exiccatur & extenuatur. Quarto, fit paulatim nisi icteritia sit critica. Quinto, fit pulsus paruus & durus propter debilitatem uirtutis & arteriæ exiccationem à caliditate & siccitate superflua & mala restauratione, non est tamen uelox, quia uirtus non est ita fortis ut uelocitate possit propter malitiam complexionis, & hæc sunt signa icteritiæ citrinæ absolute fere communia cuiuscunque icteritiæ citrinæ. Signa uero causarum sumuntur hoc modo. Nam si fuerint primitiue earum præcessio & nocumentum ex eis in corpore derelictum declarant eas, nam si fuerit morsus animalis uenenosus, ipse morsus est signum & aduentus icteritiæ satis festinus, & similiter si sumplerit uenenosam ipsam præcessio. Aduentus festinus icteritiæ & reliqua accidentia ueneni significant ipsam. Item non apparent alia causæ icteritiæ. Et similiter significant reliquæ causæ primitiue ex earum præcessione & nocumento ex ipsis derelicto. Et quia non apparent præter eas alia causæ icteritiæ. Causæ uero corporeæ cognoscuntur hoc modo. Nam si fuerit icteritia propter nocumentum totius, significatur ex ægritudinibus totius sicut sunt febres, quæ adurendo subtile sanguinis conuertunt in cholera. Aut forte debilitatio uirtutem prohibent separationem cholerae à sanguine, & hæc icteritia fit paulatim. Et non apparet feces albæ sicut in icte-

ritia sequente oppilationem, imo fere omnia exeuntia apparent citrina, nec apparet grauedo quæ sentitur in oppilationibus. Signa uero malarum complexionum hepatis debilitantis suam uirtutem, oppilationum & apostematum eius dicta fuerunt superius cum pertractata fuerunt eius ægritudines. Cognoscitur autem pendere à caliditate superflua hepatis si bi naturali, quia fere semper est homo aliquoties ictericus. Tertia uero significatur per ægritudines præcedentes in quibus uerisimiliter talis crisis potest & conuenit fieri. Hæc autem sunt febres cholericae iuxta Aphor. 6. 2. sextæ particulæ superius allegatum. Et est cum pluribus conditionibus laudabilis crisis. Secundo, quia forte coniungitur nausea subuersio & forte aliquis uomitus aut secessus cholericus, instantia uigiliæ, paruitas appetitus, lingua siccitas & amaritudo cibi, quæ omnia fiunt ex agitatione materiæ cholericae, imo ali quando fiet anhelitus restrictio, & diuersitas in uaporibus à materia agitata eleuatis prouenientibus ad pulmonem. Et forte per eosdem nocebitur cor, & fiet pulsus diuersus & fit in paruo tempore. Symptomata uero cognoscitur per eadem signa, sed cum est paucis aut nullis conditionibus laudabilis crisis. Cum uero cholera non expellitur ad cutim critique aut symptomatice fit icteritia paulatim & in longo tempore. Et hæc ut plurimum sunt signa icteritiæ sequentis multiplicationem cholerae, quibus omnibus signum commune est quod omnia exeuntia sunt citrina. Ad differentiationem icteritiarum quæ sequuntur prohibitionem euacuationis cholerae in quibus fere nunquam omnia exeuntia sunt citrina. Prohibitio autem euacuationis cholerae, quæ sequuntur aut debilitatem discretiue & expulsiue hepatis & debilitatem discretiue kylli aut expulsiue eius, aut oppilationem, cognoscitur hoc modo. Nam si sequatur debilitatem uirtutum de quibus supra, icteritia fit paulatim & in longo tempore neque est ualde intensa, & feces non apparent albæ sicut in oppilationibus, imo medio modo se habentes inter albedinem & citrinitatem. Item ad sunt signa debilitatis uirtutum hepatis, de quibus in proprio capitulo sufficienter actum est. Signa uero debilitatis kylli cum constantia hepatis sunt, quia urina fit multum citrina, & in paruo tempore & icteritia satis intensa, neque apparent reliqua nocumenta hepatis. Oppilatiue uero signa sumuntur hoc modo. Nam si oppilatio fuerit in poro felleo existente sub media pennula per quem cholera delegatur ad kyllum cognoscitur, quia adest grauitas in hepate & inflatio propter retentionem cholerae in eo. Et prius fit icteritia & urina citrina, postea feces dealbantur. Si uero oppilatio fuerit in poro felleo terminato ad duodenum prius apparent feces albæ, postea fit urina citrina, & icteritia & forte commouetur nausea, subuersio & uomitus cholera retenta & deriuata ad stomachum, & uenter strigitur, & forte fit colica, cuius causa est oppilatio iam dicta. Cognoscitur autem quod colica sit causa icteritiæ quando ipsa præcedit icteritiā. Cognoscitur autem quod sit oppilatio in poro felleo terminato ad stomachum ex diminutione digestionis stomachi, & quod non repræsentatur amaritudo in ore secundum quod consueuit, & cum hoc icteritia est remissa, & fit in longo tempore & feces sunt citrinæ.

Signa uero causæ oppilationis sumuntur hoc modo. Nam si causa est humor crassus significatur per regimen præcedens. Et si causa eius est nascencia rei alicuius in meatu, aut eius incarnatio significabitur per asiduationem icteritiæ, & per asiduationem signorum oppilationis, & paucitas iuuamenti per administrationem clysteriorum & reliquorum apparentium, & si oppilatio fuerit attenuatoria sequens apostema membra uicini aut aliud simile cognoscitur per signa apostematis illius membri, aut alterius similis ægritudinis potestis oppilare attenuatoriæ.

Prognostica. Primum, in omni oppilationem meatus hepatis ad fel, aut meatus fellis ad intestina, quæ ex incarnatione ut poro siue carne orta in meatu non speratur sanitas. Secundum plurimum uelocius generatur icteritia citrina quā nigra, quia facilius & uelocius à causis extraneis generatur cholera quā melancholia. Tertium, sicut icteritia citrina est frequens crisis ægritudinum hepatis, & kylli fellis ægritudinum cholericarum, ita icteritia nigra splenis & melancholicarum. Quartum, in illo qui habet icteritiā

Io. Arculani Y 4 factam

factam & non curatur neque materia expellitur est timor. Nam pluribus eorum accidit mors subita materia repente communicata cordi aut alteri membro nobili. Quintum. Est Aphor. 62. quartæ particulæ. Quibusunque in febribus in septima aut nona aut 12. aut 14. die icteritia superuenit bonum si dextrum hypochondrium non durum fiat. Si uero durum fiat non bonum. Sextum. Hippocr. dixit in his que referuntur ad ipsum quod icteritiæ species est mala, quando in urina patientis ipsa est similitudo orobi, id est, corpusculorum generatorum per adustionem, & est profundatio in uentre propter exiccationem & tremor, & impotentia locutionis propter debilitatem uirtutis animalis interficit enim in 14. uel circa secundum tenorē uirtutis. Septimum. Quando diu remanet urina alba aut parum tincta icteritia non curata, est timendum quod habens eam cadat in hydropisim, significatur enim quod oppilatio est ex frigore.

Quod icteritia sit nigra sensui manifestum est, cuius causa coniuncta semper est melancholia. Hæc autem secundum plurimum prouenit uitio splenis, potest tamen uitio totius & hepatis prouenire. Sed icteritia nigra undecunque proueniat frequenter mirach est extensum cum dolore & grauedine propter multiplicationem uentositatis & crassitiem humoris. Et secundum plurimum natura est constricta, licet quandoque non, cum melancholia est adusta stimulans expulsiuam. Et tertio est digestio mala & deterior quam appetitus. Et quarto est cum ea malitia animæ, id est, male cogitationes & tristitia, & malitia animæ, id est, oris stomachi. Et uarietas, id est, error in uirtutibus. comprehensius propter uapores melancholicos petentes cor & cerebrum. Quinto, egreditur quandoque sudor niger sicut in citrina egreditur sudor citrinus. Sed quod hæc icteritia sit uitio splenis cognoscitur. Primo, quia est uehementioris nigredinis quam proueniens uitio totius, aut hepatis. Secundo, durities, magnitudo splenis & dolores eius, qui sunt in sinistro latere separant eam ab ea, quæ uitio totius & hepatis contingit. Tertio, quia licet in splenetica sit quandoque egestio & urina nigra cum superfluo nocumentum eius, tamen secundum plurimum non est in ea urina nigra. Sed in ea, quæ uitio totius aut hepatis accidit fere semper est urina nigra. Item præcesserunt nocumenta totius aut hepatis cum incolumitate splenis & e contrario cum est splenetica. Sed distinguitur inter eam, quæ prouenit uitio totius ab ea quæ uitio hepatis, quia in illa præcesserunt nocumenta totius sicut febres adurætes, aut superflua totius frigiditas, & in proueniente uitio hepatis præcesserunt ægri tudines eius sicut malæ complexionēs, oppilationes, apostemata, & debilitas discretiue & expulsiue hepatis sequens aliquam ægri tudinē eius. Factam uero propter oppilationem in meatibus significant grauitas uehemens & difficultas dormiendo super latus sinistrum. Sed facta propter apostema durum splenis significant grauitas, tumor & durities ipsius. Sed in facta propter debilitatem attractiue splenis nihil tale accidit. & nota quod secundum plurimum quando est debilitas attractiue splenis, aut est oppilatio in meatu per quem transit melancholia ad splenem, splen non est tumidus, & contra, quando est oppilatio in meatu per quem natura expellit melancholiam ad os stomachi est splen tumidus. Facta autem uitio hepatis significatur, quia prima nocumenta fuerunt in hepate, quorum signa superius præcesserunt cum incolumitate splenis. Et non est nigredo pura sicut in splenetica licet quandoque nigredo in hepatica sit magis luminosa cum melancholia est adusta reseruatis in ea quibusdam partibus igneis. E contrario melancholia splenetica est terrea opaca, & significat ipsum nocumentum in urina. Et si fuerit corruptio, id est, digestio corrupta hepatis per quam generatur melancholia propter dominium caliditatis & siccitatis erit nigredo icteritiæ decliuus ad citrinitatem. Et si fuerit illic dominium caliditatis & humiditatis erit nigredo cum rubedine, & si fuerit dominium frigiditatis & siccitatis uincente frigore, nigredo declinabit ad uiriditatem, sed siccitate uincente declinabit ad nigredinem, & si fuerit dominium frigid. & humiditatis uincente declinabit ad citrinitatem quandam, sed frigiditate uincente ad uiriditatem. Splenetice uero color

unus, scilicet, nigredo pura absque declinatione & alios colores diuersificantur etiam colores icteritiæ melancholicæ secundum diuersitatem specierum melancholicæ, scilicet, sanguinæ, cholericæ, phlegmaticæ, & melancholicæ, quæ tanta diuersitas non reperitur in splenetica.

Prognostica. Primum, icteritia nigra est rarioris euentus quam icteritia citrina. Secundum, icteritia nigra magis prolongatur, & cæteris paribus difficilius curatur quam citrina. Tertium, icteritia nigra est frequenter crisis ægri tudinum splenis melancholicarum. Et nota quod quadoque aggregatur utraque icteritia simul, quia cholera & ei quod ipsum admiscetur ex sanguine accidit adusto, & sit nigra aliquantulum, & aliquantulum remanet de citrinitate priori. Et quandoque componuntur ambo humores simul, quia in hepate & splene simul est nocumentum. Et tertio, quia sanguis per adustionem secundum partem subtilē uertitur in cholera, & secundum partem crassam in melancholia, & ex his duabus icteritiis simul mixtis est plurimum confurgit color uiridis, licet sit imaginabile icteritiam uiridem à cholera uiridi pendere, scilicet, prasinam aut cinerem. Huius autem icteritiæ uiridis signa possunt ex dictis elici & similiter prognostica.

Si cum icteritia fuerit febris, sic. endiuia, & solatri & aqua bord. ægro in potu tribuatur. ipse quoque ex cucurbita, & chrysosolachana, & citrullis et his similibus herbis frigiditati attrinentibus nutriendus est. & syrupum acetosum ex fortissimo aceto in potu sumat. hepatis præterea emplastrum ex duobus sandalis est superponendum. ei uero ter ex succo prunorum & sacch. soluendus. quæ si non suffecerint, trochisci de camphora cum succo granatorum dandi sunt. Trochisci de camphora. Rec. sacchari spodij, rosarum rub. omnium, ana drach. 3. sem. endiuia, sem. citrullorum, cucurbitæ, lactuce, portulacæ, sem. ex omnibus sandalis rub. omnium an. drach. 1. formetur ex his trochisci ponere drach. 2. ex quibus quotidie unus cum sexta drach. de camphora detur. si autem æger uenas habuerit plenas fueritque diu ex quo minutus non fuerit, phlebotometur.

Hoc cap. diuiditur in tres partes. In prima curat icteritiā cum febre. In secunda icteritiā sine febre. In tertia docet remouere colorem maxime in oculis remanentē. secunda ibi. Quod si icteritia fuerit sine febre. tertia ibi. Si autē icteritia in oculis remanserit. In prima parte curat hanc icteritiā cū febre septem auxiliis. Primo. & succi endiuia, 3. i. succi solatri 3. s. aquæ hordei 3. 3. misce, his ad libitū posset addi parū sacchari, hæc mixtio sumatur quatuor aut quinque diebus, & ualet in icteritia cū febre siue sit coniuncta oppilationi siue non. Secundo quod nutriatur ex cucurbita aut chrysosolachana, quæ est aureum olus à colore aureo. Nam *ῥαχανὸν* aurum & *λαχανὸν* olus. Et est attritplex, frigida est & humida in primo, & apud aliquos teporata citrullis, & similibus, sicut cucumerus, anguria quæ sunt frigida. Tertio, sumat syrupum acetosum simplicem ex fortissimo aceto, est enim magis aperitiuus, & potest ipsum sumere cum aqua endiuia, & in oppilatione melior est cum aqua cuscute. Quarto hepatis superponat emplastrum ex duobus sandalis, scilicet, albis, rub. Item sicut cerotum sandalinum descrip. Mesue.

Quinto, ueter ex succo prunorum quatuor aut quinq. 3. & saccharo soluendus est, & si non habeatur succ. fiat decoctio, licet sit maioris quantitatis usque ad 6. 3. Sexto, trochisci de camphora dandi sunt, quorum descriptionē uide in textu. Et pro duabus. 3. trochif. misce 6. 3. unius de camphora. Sed cōter sufficeret medietas huius dosis nisi corpus sit robustum naturaliter & præternaturaliter notabiliter calidum. Septimo, si uenas habuerit plenas, fuerit diu ex quo non minutus fuerit, phlebotometur, scilicet ex dextra basilica.

SCHOLIA

Si cum icteritia fuerit febris, icteritiæ causa est abundantia bilis, uel sanguinis biliosi à calida hepatis intemperie proficiscens, & quandoque à nebris extremis ideo describit ea, quæ extinguunt hepatis inflammationem. Emplastrum ex duobus sandalis hepatis obstructions efficit. quare id sequatur tantum hepate accenso. Trochisci de camphora post purgationes dandi.

quod

Quod, si icteritia fuerit sine febre, uenter ex his pilulis solatur, quæ Rec. aloes drach. 1. scammonæ quartam drach. 1. agarici partes duas drach. 1. unius : succis eupatorii tertiam 3. unius, ex his cum succo endiuivæ mixtis fiant pilulæ & sufficient ad dosim. Deinde dantur trochisci de lacca cū apozemate de radicibus.

Hic curat icteritiam sine febre, & proprie oppilationi coniunctam duobus auxiliis. Primo, soluit ventrem cum his pilulis. 3. aloes. 3. 1. scammonæ quartam. 3. unius, agarici partes duas unius 3. idest, 3. 2. succi eupatorii tertiam 3. unius, ex his cum succo endiuivæ mixtis fiant pilulæ & sufficient ad dosim uiam, sed erit magna, ita ut in multis sufficeret medietas, simul enim euacuat choleram & phlegma quod oppilat. Secundo, dantur trochisci de lacca cum apozemate, idest, decoctione de radicibus, de qua in capitulo præcedenti. Hi enim dantur ad oppilandum.

Si autem icteritia in oculis remanserit, ager fortissimum acetum paulatim olfaciat, et balneum ingrediatur, eius quoque oculis, qui icteritiam cum feb. patitur, aqua ros. mittenda est. icteritia præterea ualde confert, ut ager per tres hebdomadas serum bibat.

Hic remouet icteritiam in oculis existentem 4. auxiliis. Primo odorando acetum fortissimum, cuius uapores iuuat ad resolutionem. Secundo balneum ingrediatur, scilicet aquæ dulcis debite calidum, similiter ad resoluendum humorem facientem icteritiam sub forma sudoris educendum. Tertio immittit oculis patientis icteritiam cum febre aquam rosaceam ad confortandum & infrigidandum. Quarto bibat serum per tres hebdomadas debite calidum fumendo tres aut quatuor 3. pro uice, confert enim choleram euacuando.

SCHOLIION

Recip. aloes 3. leui medicina ad grauem, qualis est hæc, ascende.

Ordo curæ & primo icteritiæ.

Quia icteritia citrina à duabus causis in genere contingit, altera est choleræ multiplicatio. Altera prohibitio euacuationis eius. Primo curabimus sequentem multiplicationem choleræ. Secundo sequentem prohibitionem euacuationis eius.

Curat icteritiæ sequentis multiplicationem choleræ, exigit sex intentiones. Prima remouet causas multiplicationis eius. Secunda euacuat ipsam multiplicatam. Tertia corrigit diserasiam membrorum & cætera eorum nocumenta, quæ remanserunt ipsa confortando, ne iterum multiplicetur. Quarta remouet citrinitatem ab oculis & à toto. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum. Vbi tamen cholera esset præter modum multiplicata, intentio secunda, quæ est choleræ euacuatio, debet esse prima, tum quia tanta multitudo choleræ non dat iudicium, tum quia iuuat ad sui ipsius multiplicationem. Si ergo causæ fuerint primitiæ, iuxta primam intentionem remouendæ sunt, & nocumenta per ipsas impressa, unde intendatur morui uene nosorum trahendo uenenum exterius cum applicitis super loco morso, sicut culus gallinæ uinētis. Et sicut animalia nouiter mortua per medium secta, & emplastra propria secundum quodlibet uenenosum. Item partes supra locum morsum tueantur cum frigidis & stipticis, sicut aqua rosacea, aceto & succis infrigidantibus propriis cum debita strictura. Et confortetur cor & membra nobilia. Et dantur bezahartica propria contra illa. Et remouetur caliditas & siccitas superflua per uenensam impressam. Similiter si uenena fuerint sumpta procuretur eorum uomitus & secessus. Et frangatur ipsorum acuitas cum propriis. Et tueantur membra nobilia. Et extingatur membrorum & humorum superflua caliditas. Id est iudicium in reliquis causis primitiis. Similiter causæ corporeæ per communiter à toto remoueantur, sicut febres cum quibus oportet. Et secundum plurimum opus est extinctiuis cum febres illæ sua caliditate superflua, subtile sanguinis in choleram conuertant.

Opus etiam est euacuatione, aut cum phlebotomia aut solutius & reliquis secundum quod præcipiatur in capitulis propriis. Crisis autem choleræ ad eum non est impedienda,

quæ plerumque fit in febribus iuxta aphor. 62. quartæ particulæ. Imo potius adiuuanda cum aspectu rerum citrinarum, & etiam induendo uestes citrinas & reliquis auxiliis, & cū hoc studendū est in ipsius educatione per poros cutis, cum frictione, balneo & similibus auxiliis occulte aut manifeste sub forma sudoris choleram educuntibus. Si uero causa multiplicationis choleræ fuerit caliditas superflua hepatis aut totius, naturalis aut præter naturam, aut etiam cuiuscunque alterius membri studendum est in remotione eius, & inductione dispositionis contrariæ. Complentia autem hanc intentionem sunt infrigidantia magis aut minus potentia, secundum exigentiam sui contrarii, dispositiones tamē naturales magis paulatim permittendæ sunt, quàm præternaturales. Cū hoc tamen semper cauendum ab oppilatione. Eligatur ergo regimen sex rerum, declinans ad frigidum & humidum, de quo infra in sexta intentione. Item regimen medicinale complendum cum his, quæ interius sumuntur sicut syrup. acetosus simplex, oxisaccharas, syrup. de granatis, de acetositate citri limonis & similes, cum aquis endiuivæ, lactucæ, hepaticæ, acetosæ & similibus, quæ aliquando possunt aromatizari cum infusione sandalorum & similibus, electaria conuenientia sunt sicut triasandali, diarrhodon abbatis. Trochisci conuenientes sunt sicut trochisci de camphora de quibus in textu. Et ex succis conuenientibus est succus solatri, endiuivæ, acetosæ, qui possunt sumi cum aqua hordei. Item succus granatorum, succus berberis, acetositas citri & limonis. Applicanda autem exterius sunt, sicut cerorum sandalinum, applicandum hepati. Item epithymata cum sandalis, & spodio, aqua endiuivæ, hepaticæ, rosaceæ, aceto similiter applicanda hepati. Item infrigidans Gal. applicandum renibus. Item cordialia applicanda cordi, de quibus omnibus superius dictum est. Et cum his etiam horum membrorum uirtutes confortabuntur.

Secunda intentio, scilicet choleræ euacuatio perficitur cū manna aut calsia distemperatus cū infusione prunorum & tamarindorum. Item cum infusione rhabarbari, & cū cum ipso sumpto in substantia. Et fortiora sunt electarij succi rosarum, electarium de psilio, pilulæ aureæ, aloes lotus & nutritus cū aqua endiuivæ & solatri euacuat choleram crassam. Succus rosæ euacuat choleram & aperit oppilationes, est tamen calidus. Tertiam autem intentionem complet ea, quæ dicta sunt in prima intentione, quæ replicanda sunt si fuerit expediens. Quarta autem intentio, scilicet remotio citrinitatis ab oculis & toto completur iuxta textum cum odore aceti. Item cum balneo in aqua dulci & aceto, quæ omnia iuuant ad choleræ resolutionem. Si tamen fuerit notabilis caliditas, & proprie febrilis, aqua rosacea oculis imponatur. Quinta autem intentio, scilicet correctio aciditium perficitur, secundum ipsorum exigentiam, ita ut non solum præsentia curentur, sed etiam futura uerisimiliter suspecta prohibeantur. Sed pro sexta intentione, aer declinet ad frigidum, non tamen superflue, ne poros oppilando choleræ resolutionem impediat. Vitentur omnia choleram multiplicantia sicut dulcia, amara, salia, acuta, unctuosas, uinum potens, imo omne uinum nisi particularis conditio obstat, aut forte sit ex nudis declinantibus ad frigidum, sit album subtile, & cum aqua bene conditionata sufficienter limphetur, uitentur omnia stiptica oppilantia. Ex herbis conuenientibus sunt sicut lactuca, endiuia, portulaca, scariola, hepatica, sed possunt misceri cum modico sceniculi & petroselinii. Item asparagi & lupuli conueniunt, cucurbita, cucumeres & similia frigida, & humida. & si sunt salata, possunt condiri cum aceto, uino granatorum, agrestis & similibus. Et ex his ferulis conueniunt hordeum, far, præsana hordeacea, ex carnisbus eligantur, quæ sunt facili digestionis, boni chimi, pauca rum superfluitatum & pisces parui petrosi, & similes bene conditionati, concedi possent elixi aut asfi & conditi cum declinantibus ad frigidum sicut sunt supra scripta, & succus arancii, limonis & citri, & caro ericii est propria & caro limaciarum. Ex fructibus conceduntur poma persica, pruna, melones, angurie, & cerasa & similia ad frigidum declinantia, somnus sit facis prolixus, exercitium paruum, procuret euacuationes naturales, sit sperans & gaudens, uitet iram & accidentia animi inflammantia.

Cura

Cura ictericiæ propter prohibitionem euacuationis cholerae.

Quod si ictericia sequatur prohibitionem euacuationis cholerae, tunc est dupliciter, aut propter debilitatem uirtutis hepatis aut kystis fellis, aut propter oppilationem. Quod si sequatur debilitatem cura patere potest ex his, quæ dicta sunt in cap. de cura debilitatis hepatis. Si uero oppilationem, exiguntur sex intentiones. Prima remouet causam oppilantem. Secunda cholera ex oppilatione retentam euacuat. Tertia corrigit diserasiam membrorum, ipsam confortando. Quarta remouet citrinitatem ab oculis & à toto. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum. Pro prima intentione. Si causa oppilans fuerit phlegma aut cholera crassa sicut est secundum plurimum fumatur. 3. 1. aloes in forma pilularum per horam ante cenam, & est efficax si continuetur alternis diebus. Si uero fuerit nimis debile in cõparatione ad eum qui solui debet, fortificetur cum tribus aut quatuor gran. diagridij, aut fumatur solutiuum expertum ab Anic. R. aloes. 3. 1. scamoneæ gran. 4. salis naptici gran. 15. ruberæ tinctorum. agar. ana. 3. s. misce, & fiant pilulae, & sunt dos. una. Et fumen da est cum custodia. Aliud in forma liquida. fumatur electarii succi ros. 3. 1. s. electarii indi uel diaphoeniconis tantundem, uel quantum uidebitur expediens cum sero caprino distemperetur, & fumatur cum custodia. Quod si huiusmodi solutiuum fumeretur cum infusione aloes aut rhabarbari præstantius operarentur. Aliquo ergo aut pluribus ex his utere secundum quod tibi uideatur expediens. Et hæc simul causam oppilantem euacuat, & cholera ex oppilatione retentam iuxta secundam intentionem. Item uomitus confert in omni ictericia euacuando & diuerendo.

Phlebotomia quoque basilicæ & saluæ manus dextre inuatur in aperitione oppilationis maxime sanguine abundante. Et ad aperiendum oppilationes, & ad mundificandum cannales ualet syrupus bizantinus, cum aqua cuscute. Item succus rosarum duarum. 3. cum aqua endiuicæ & cuscute. an. 3. 1. & ex expertis est huiusmodi. R. uini albi subtilis, pauciferi aut mediæ uinositatis, aqua endiuicæ, an. lib. 1. cuscute, præslij, recentium, ana Man. 1. bulliant simul ad consumptionem tertie partis, sed cuscuta ponatur in fine, & coletur de qua colatura dentur. 3. 3. aut. 4. cum una. 3. syrupi acetosi simplicis, præcedente tamen aliqua euacuatione, cum his de quibus supra. Et de syrupis propriis ad mundificandū cannales, & aperiendum oppilationes est syrupus de endiuicæ, de bisantiis. Syrupus acetosus simplex saccharinus aut mellinus, syrupus acetosus compositus, oximel compositus, & scilliticum si materia est multa, & crassa, ut in senibus & pinguibus. Aquæ autem sunt endiuicæ, pichoreæ, lupulorum, cuscute, scolopendrie, capillorum ueneris, raphani, apij, foeniculi, petroselinij, asparagi, bruci, de quibus in cura oppilationis hepatis, & aliquando cum his admiscemus pulueres subtilissimos aperitiuorum, aut cuscute ruberæ tinctorum, asari, gentianæ, & similia. Item conueniunt decoctiones huiusmodi aperiens, & sunt fortiores aquis distillationis sicut decoctio capilli nen. & ruberæ tinctorum, feminum aperiens est tamen dubium in aperitiuis, ne materia tanta feratur ad uias urinæ quod excoriet, istorum tamen aperiens est uariis usus apud medicos modernos, aliqui dant succos, aliqui inscicerum, in quo decocta sunt aperiens, aliqui electaria, ut diarrhodon, dialacca, diacurcuma cum aquis decoctionis distillationis aut expressionis. Tu uero utere fortibus aut debilibus, magis aut minus calidis aut frigidis, secundum exigentiam. Si uero causa oppilationis fuerit apostema in hepate, aut in aliquo ramo kystis cura patet ex dictis in cura apostematis hepatis, & inter cætera præmittat phlebotomia. Si uero oppilatio eēt carnosa parua est spes curæ, licet quandoque naturæ beneficio caro illa cum mollis est remoueat, & dicunt quidam ad hanc ualere succū portulacæ, & succum foliorum raphani, & aquam acetosam, de quibus pro quoque accipiat, lib. s. & bulliant simul ad consumptionem tertie partis, & coletur, quibus addatur orobi cõtriti, seminis melonis, seminis raphani, an. 3. 2. costi, mirthæ, an. 3. 3. & est pro tribus uicibus. Quod si oppilatio sit à siccitate cum lenitibus & humectantibus aperienda est sicut cum syrupo uio. 3.

1. mixto cum mucilagine feminis citoniorum, sem. psylli, feminis maluarum, an. 3. 1. distemperatis cum tribus. 3. decoctionis prunorum, sebesten & similia, & cum his possit misceri manna aut casia si opus esset solutione, uomitus quoque quandoque inuatur in aperitione oppilationis. Secunda uero intentio perficitur cum solutiuis, de quibus supra & ex fortibus & præstatis sunt electarium de psilio, & electarium succ. ros. sed aperta oppilatione leuioribus utendum est, ne forte perducerent ad disenteriam, sufficit ergo aloes lotos, infusio rhabarbari in sero caprino, & similia, aut de his fortibus detur modica quantitas. Tertia uero intentio perficitur secundum plurimum cum frigidis confortantibus membra naturalia, sicut diarrhodon abbatibus, triandali & similia.

Quarta autem intentio, & quinta perficitur cum his, quæ dicta sunt in cura ictericiæ sequentis multitudinem cholerae. Sexta autem intentio, scilicet regimen sex rerum perficitur similiter sicut dictum fuit in cura ictericiæ sequentis multiplicationem cholerae, his additis quod in cura huius oppilationis non oportet ita infrigidare, & magis cauendum est à crasis uiscosis stipicis oppilatis, & magis utendum est incisuiis, subtiliat iuis, abstergeatibus, & appetitiuis, propterea in hac acetum magis conuenit, quam uinum granatorum aut accesta, & ius ciccerum, radices & semina aperiens liberius conceduntur.

Quia ictericia nigra à duabus causis in genere contingit. Prima, est multiplicatio cholerae nigra. Secunda, prohibitio euacuationis eius, duplex erit regimen curatiuum, primum cõtra ictericiam sequentem cholerae nigrae multiplicationem, secundum contra ictericiam sequentem prohibitionem euacuationis eius. Primum regimen habet sex intentiones. Prima remouet causas multiplicationis cholerae nigrae. Secunda euacuat ipsam multiplicatam. Tertia corrigit diserasiam membrorum & cætera eorum nocumenta quæ remanserunt, ne iterum multiplicentur. Quarta remouet nigredinem ab oculis à toto. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat debitum regimen sex rerum. Vbi tamē cholera nigra esset præter modum multiplicata, secunda intentio. s. melancholia euacuatio deberet eē prima propter causas superius dictas in cura citrinæ. Pro executione ergo primæ intentionis remoueantur omnes causæ primitiue melancholiæ multiplicantes siue fuerint primitiue extraneæ, sicut uenæ, siue non extraneæ sumptæ ex sex generibus rerum, remouenturque causæ corporeæ, sicut febres adurentes, febres inordinate uagantes aut quartanæ necnō malæ complexionis cordis & membrorum naturalium quæ aliquando superflua casualitate & sicc. melancholiam adstant multiplicantes, aliquando frigiditate & sicc. melancholiam non adstant. Et aliquando apostemata membrorum naturalium, scilicet hepatis aut splenis sunt in causa, quæ ægritudines qualiter sint curandæ, uide prima quarti quantum ad febres, sed quantum ad reliquas dispositiones hepatis collige ex dictis superius in cura dispositionum hepatis, & ex dicendis inferius in cura dispositionum splenis. Et si in causa fuerit crisis per quam materia ad cutem expellatur adiuuanda est, sicut superius in citrina. Secunda intentio perficitur minorando materiam, cum fena, epithymo, polypodio, & similib. maxime sumptis cum sero caprino, aut iure pulli, aut decoct. passularum. Item dirigendo melancholiam cum syr. de pomis dulcibus, si fuerit adusta, & epithymo si non adusta, qui sumantur cum sero caprino aut decoct. passularum, florum boragin. aut buglosse, & Aui. laudat euacuando decoct. epithymi, cuius meliorem descriptionem collige à Mesue dist. 7. Et à Rasi in capite. de melancholia. Et confectio hamech euacuat melancholiam adustam, sed non adustam diafene, & pilulae indæ, de lapide lazuli, & similes, sed de his uberius in dispositionibus splenis. Sed tertiam intentionem complent ea, quæ perficiunt primam intentionem, quæ sunt replicanda, si fuerit expediens. Est. n. mala complexio cordis & membrorum naturalium remouenda cum contrariis sumptis & applicitis quæ huiusmodi membra confortent, tum proprietate, tum moderata stipicitate. Quarta autem intentio similiter. Quinta perficitur cum proportionalibus, quæ dicta sunt in perficiendo quartam & quintam intentionem pro cura ictericiæ citrinæ. Sed pro sexta intentione intendatur multiplicationi boni

sanguinis & paucificatione melancholice cum aere sereno declinante ad humidum temperato in actiuis aut leniter ad frigidum declinante impendente à melancholia adusta, aut leniter ad calidum in pendente à melancholia non adusta, & carnes sint iuvenes bene conditionatæ, quæ potius comedantur elixæ. Et uitelli ouorum sint proprii & cerebella hædorum, uideantur caules, lentes, & alia legumina salita omnia & sicca. Et somnus sit prolixus, exercitium moderatum, & accidia animi, quæ iocunditatem afferant. Et superfluitates solite expellantur per conuenientes regiones.

Secundum autem regimen contra icteritiam sequentem prohibitionem euacuationis cholerae nigrae. Si prohibitio euacuationis sequatur debilitatè uirtutum hepatis aut splenis attendatur eorum confortationi, cum propriis utriusque membro, prius remotis causis debilitantibus utrunque. Et ex propriis confortantibus splenem, & cum hoc aperientibus oppilationes sunt capparæ, scolopendria, tamariscus, semina agni casti, sed de his in dispositionibus eius agatur uberior. Et si splen propter debilitatem non attraheret, ponatur sub ipso emplastrum attractiuum calidum, sicut emplastrum de fermento de descriptione Mes. cum hoc enim quod attrahit, inuat mirabiliter ad resolutionem humoris melancholici in splene contenti, & diminutionem eius. Item super regione splenis fiant uentosa sine scarificatione ad attrahendum melancholiam ad splenem. Quod si prohibeatur euacuatio melancholice propter oppilationes exiguntur sex intentiones proportionales illis quæ dictæ sunt in cura icteritiae citrinæ à simili causa proueniente. Digeratur ergo primo materia oppilans, & etiam humor melancholicus ex oppilatione retentus cum oximelle simplici, syrupo de epithymo, cum aquis scolopendriae, tamarisci & similibus, deinde euacuetur cum his, quæ superius dicta sunt. Postea meatus aperiantur cum foribus, & scolopendriae, tamarisci corticum radicum capparis, seminis agni casti, seminis endiuiae, seminis portulacæ, ana. Man. 1. epithymi. Man. 2. bulliant in tribus libris aquæ cum quinque aut sex uncis mellis & tribus uncis aceti acuti ad consumptionem medietatis & coletur. Et clarificetur, sed epithymus ponatur ad bulliendum in fine de qua debite calida dentur quatuor aut quinque 3. quotidie in mane stomacho ieiuno, & cum hac posset misceri syrupus acetosus compositus, aut oximel compositum ad libitum. Et si apostema splenis esset in causa attendatur curationi eius secundum quod dicitur. Et ex propriis est phlebotomia saluatiellæ sinistræ. Et cum his completa est prima intentio, quæ est remotio oppilationis & secunda quæ est euacuatio melancholice ex oppilatione retentæ. Reliqua autem quatuor intentiones, scilicet correctio discrasie membrorum, remotio nigredinis ab oculis & à toto, accidentium correctio, & regimen sex rerum patere possunt ex dictis. Si uero istæ duæ icteritiæ componerentur simul, tunc similiter componantur utriusque conuenientia prout causæ indicauerint æqualiter uel una fortius altera, & sic completum sit hoc capitulum difficile de icteritia.

De cachexia.

Cum uenter. Quia cachexia antecedit hydropem de ea in primis agendum est. cachexia dicta à κακεία græce, idem sonante, quod mala habitudo latine. Est descriptiue mala habitudo præuia in hydropem, species ipsius possunt assignari tres secundum tres species hydropis, quas antecedit de quibus agitur. Causa eius est uitium corruptionis digestionis hepatis. Nam cum erit completa corruptio digestionis hepatis, fiet una ex tribus speciebus hydropis. Causæ itaque fortes de quibus agitur, quæ faciunt aliquam speciem hydropis, cum sunt leues & initiantes faciunt cachexiam. Tenendum tamen est posse fieri hydropem & ascitem aut tympanitem absque quod præcedat cachexia, licet de hypofarce, id non credam fore possibile. Cum quo tamen tenendum est cuiuscunque hydropis causas successiue augeri, faciunt tamen aliquando hydropem non præcedente cachexia cum sunt fortes accelerantes hydropem. Et quædam apud Auic. accidit cachexia propter aggregationem aquæ in pulmone, & sit forma patientis eam similis formæ hy-

dropis. Quod etiam de reliquis egritudinibus pulmonis posset affirmari. Nam dum ducunt ad hydropem. 10. tertii, etiam possunt ducere ad cachexiam.

Signa. Primum permutatio coloris faciei & corporis ad albedinem & citrinitatem. Secundum est inflatio in palpebris & extremitatibus, scilicet manuum & pedum, qui aliquando spargitur in totum corpus, maxime quando antecedit speciem hydropis dictam hypofarcam. Tertium quia licet sit in ea initium corruptionis digestionis hepatis, & aliquando stomachi, frequenter tamen appetitus est fortis. Quartum apud Auic. natura, id est, uenter in sua retentione & resolutione secundum ordines, id est, lenis & strictus, secundum quod naturaliter consuevit esse. Aliter aliquando fluit uenter, aliquando cōstringitur, secundum ordines, id est, ordinatè quo ad tempus secundum aggregationem materię, nunc stringitur, & ipsius expulsionem, & tunc soluitur. Quintum. Et similiter est dispositio syncopis, scilicet ueræ aut lypothymia, quandoque in aliquibus secundum effumationem materię malignæ ad cor. Sextum. Et uigiliarum & elongationis eius &c. id est, aliquando præter modum uigilant, aliquando bene dormiunt, aut forte nimis secundum diuersitatem materię effumantis ad cerebrum. Septimum. Et elongationis eius ad uias, id est, non bene possunt ambulare. Aliter sunt elongati à uis suis id est, ab operationibus sibi naturaliter consuetis. Octauum. Et minoratur cum ea urina, & sudor, superfluitatibus proprie aquosis retentis, & non expulsis per regiones consuetas. Et hæc quandoque cachexia antecedit ascitem aut hypofarcam, & multiplicetur uentositas, & fortis sit inflatio mirach, quandoque antecedit ascitem aut hypofarcam, quandoque autem antecedit tympanitem. Nonum. Et quandoque inflantur testiculi, id est, oscheum maxime in antecedente ascitem. Decimum. Et cum accidit ulcus sit difficilis consolidatio propter multiplicationem superfluitatum malarum & minorationem boni sanguinis.

Vndecimum. Et accidit in commissuris, scilicet capitis & gingiuis caliditas, & pruritus propter uaporem corruptum ascendentem, sed magis petit commissuras facies in parte illa pruritus, quia per illas uapor egreditur ad gingiuam matrem ualde sensibilem facies in ea pruritus cum caliditate. Similiter gingiue pruriunt & calent, quia ratione suæ substantiæ sunt facile passibiles. Duodecimum. Fit corpus debile mollificatum materiis petentibus instrumenta motus.

Prognosticum. Hæc passio curatur nisi pendeat à causa in corrigibili sicut esset apostema pulmonis, & aqua retenta in eo, apostema hepatis, stomachi, & similia.

De hydropisi.

Cap. 99.

Hydropsiue hydropis penes Theodorum Priscianum libro 3. dicta ab ὕδωρ græce idem sonante, quod aqua latine & ὕδωρ passio, quasi aquæ passio, eo quod in triplici eius specie adest aqua. In ascite multa. In tympanite pauca. In hypofarce phlegma molle aquæ proportionatum. Et descriptiue apud Auic. 14. tertii cap. proprio est egritudo materialis, cuius causa est materia exuberans frigida ingrediens membra & crescit per eam, aut membra manifesta omnia, aut loca uacua partium, in quibus sunt regimen nutrimenti & humoris. Est quidem egritudo materialis cum sit apostema aquosum quo ad ascitem, uentosum quo ad tympanitem, phlegmaticum quo ad hypofarcam. Ideo subdit. Cuius causa, scilicet immediata efficiens est materia exuberans frigida. Sunt enim aquositas, uentositas, & phlegma frigida, licet forte habeant aliquam caliditatem accidentalem, quæ materiæ ingrediuntur membra, & crescunt, id est, tumet per eam, aut membra manifesta, id est, extrinseca omnia quo ad hypofarcam, aut loca uacua, id est, uenter inferior cōtentiui membrorum naturalium, qui quo ad ascitem impletur aquositate, & quo ad tympanitem uentositate, & in his membris naturalibus sunt regimen nutrimenti maxime in hepate, & sunt humores cum ipso, & per ipsum humores generentur. Est etiam humor melancholicus in splene, cholericus in Kisti. Tres sunt species hydropis distinctæ secundum causam triplicem immediatam materialem, scilicet cum qua non ex qua, quia cum hydrops sit accidens non habet causam materialem ex qua. Una est ascites cuius causa est aquositas à prædominio. Tympanites est secunda, cuius causa

causa

causa est uentofitas à prædominio. Tertia hypofarca cuius causa est phlegma aquosum. Et dicitur ascites ab ἀσцитες græce, quod est uter latine, est enim uelut uter plenus aqua. Hypofarca dicitur de hypo quod est sub & ὀσφρ caro quasi sub carne, quia in ea tumescit tota caro & cutis extrinseca, & forte etiam pro magna parte caro intrinseca ut dicitur in causis, & hæc uocat leuco phlegmatica à leuco, quod est albu, & phlegma, quia fit à phlegmate albo. Tertia dicitur tympanites ad similitudinem tympani.

Causæ immediatæ sunt tres iam dictæ. Causa remotior est debilitas, aut corruptio digestiue hepatis cum hæc sit necessaria in quacunque hydropo, per quam multiplicatur, aut fouentur aliquæ, aut plures ex suprascriptis materiis. Ex quo infertur quod si per stomachum multiplicaretur uentofitas extendens uentrem inferiorem non concurrente nocumento hepatis non esset tympanites.

Similiter si rupto porro uritide, aut homine altera ex causis non potente mingere, sicut uidi in una prægnante implere tur uenter inferior aqua non concurrente nocumento hepatis, non esset ascites. Similiter si propter frigiditatem extrinsecam membrorum aut usum ciborum frigidorum, aut frigiditatem stomachi non bene chilificantis nutrimentum non conueniens ad poros membrorum attrahentium, sed non unitum esset causa tumoris qualis in hypofarca non diceretur tumor ille hypofarca, quia non concurreret nocumentum hepatis, propterea in descriptione addendum est, quod est ægritudo materialis pendens à nocumento digestiue hepatis, appropriatur enim hæc ægritudo hepatis, sicut febres cordi. Ex quibus sequitur quod si uenter esset tumidus, aut membra manifesta omnia in casibus suprascriptis, ille tumor non esset hydrops, qui postea nocito hepate per causas suprascriptas dicitur hydrops, quamuis non pendeat ab errore digestiue hepatis nisi in conseruari. Causa remota est debilitas, uel corruptio digestiue hepatis, cuius causa est aliqua ægritudo eius, aut per essentiam, sicut mala complexio cuiuscunque generis sine materia & cum materia. Item mala compositio sicut paruitas hepatis, oppilatio, solutio continui, licet raro, apostema uero frequenter calidum, frig. molle & duru, quandoque oppilans orificium uenæ ascendentes per communicationem uero, aut à toto, sicut in febribus chronicis, aut aduentis, quæ paucificando calorem innatum hepar debilitant, & faciunt digestiuam ipsius errare, ut pro sanguine generet phlegma, aquositate, aut uentofitatem. Calor namque hepatis & etiam totius quandoque paulatim resoluitur, quandoque uelociter extinguitur, quæ extinctio potest esse tam à calido superfluo, sicut à febribus acutis quam à frigido, sicut à potu aquæ frigide & hyemæ, & post balneum, exercitium, & coitum. Item ab omni exiccante & humectate superfluo. Item omnes euacuationes superflue paucificant calorem, innatum, sicut euacuationes per sudorem, urinam, solutionem uentris cum rasura intestinorum, aut sine. Item per mēstrua, hæmorrhoidas, fluxum sanguinis narium, & euacuatio sanguinis superflua quocunque modo, aut per quacunque regionem, hæc enim paucificando calorem innatum debilitant hepar, & faciunt eius digestiuam errare. Nocibilior omnium euacuationum est euacuatio sang. Per communicationem uero à membris particularibus, sicut à pulmone & diaphragmate apostemantur, aut cum pulmo est plenus aquæ, aut cum aliquid eorum superflue calefit, aut infrigidatur, nam decima terti, cap. de apostematibus accidentibus pulmone multoties quidem perducunt ægritudines pulmonis ad ægritudines hepatis, sicut perducit uehementia frigiditatis eius, & uehementia caliditatis eius ad hydropisim, & similiter uelaminis, id est, diaphragmatis. Similiter cum empyema in pectore diuturnatur, aliquando propter frigus stomachi, & malitiam complexionis eius. Et proprie cum succedit fluxus uentris sanguinolentus, aut est propter meseraicam, id est, nocumentum in mesenterio. Aut propter communicationem splenis, aut propter magnitudinem suam, aut propter apostema durum in ipso, aut leuia calida. Aut quia non bene mundificat hepar à melancholia, aut quia nimis completur ea. Et sic impletum nocet stomacho superflue infrigidando ipsum, est enim ipsi contrarius, aut nocet ei acredine melacholiz, quæ est in ipso insicciendo sanguinem, aut faciendo ipsum

acrescere, aut forte quia cum melancholia attrahit etiam multum de sanguine. Vnde uirtus digestiue hepatis debilitatur. Et quandoque communitate renum, scilicet propter caliditatem superfluum, aut frigiditatem, aut propter eorum oppilationem, aut duritiem, quare non attrahunt aquositate, aut propter ægritudines intestinorum & proprie monoculi quia est propinquum hepatis. Item propter uescicam & matricem multis ex causis satis notis. Non enim hæc membra causant hydropem solum communicando malam complexionem hepatis, imo propter eorum oppilationes, dolores & apostemata, & aliquando communicando materiam ipsi sicut sæpe facit matrix cum oppilatur. Et quandoque per communicationem fisteris cum sang. hæmorrhoidalis fluere consuetus retinetur. Et plurimum communicant membra foecis concauitati, & membra pro retentione, scilicet urinæ, & anhelitus gibbositati, & quandoque læditur hepar læsione educete ad hydropem, propter apostema siphac tegentis hepar, uerum plurimæ communitates perducentes ad hydropem, sunt communicationes cum renibus, orbo, splene, mesenterio, & stomacho, & causa in orbo de quo minus uidetur est, quia ordinatus est in complementum primæ digestionis. Causa autem primitiua sunt in ordinatum regimen sex rerum non naturalium, quod manifestabitur ordinando regimen conueniens pro cura hydropis. Item causæ extraneæ, sicut percussio, casus, & offensio super hepar, & similia. Sed dubitat Auicenna species hydropis est deterior, in quo dubio tenendum est cum Auicenna. ascitem esse deteriorem secundum plurimum, tum quia prouenit à deterioribus causis, sicut sunt apostemata hepatis febres malignæ fortissimæ, sicut impressiones à causis primitiuis, & quia debilitas digestiue faciens aquositate est maior, quia si aquositas generetur à frigiditate hepatis non generatur nisi à magna, à qua non generatur phlegma aquosum, neque uentus sed à minori. Si uero à caliditate generetur superflua, hoc est, quia caliditas naturalis paucificatur in quanto per resolutionem proprii humiditatis, & spirituum multo magis quam in tympanite, aut hypofarca.

Secundo quia aquositas in uentre congregata difficiliter educitur, quæ uentofitas, ut manifestum est propter maiorem crassitatem, & difficiliter quæ phlegma, quia licet phlegma sit crassius, est tamen à minima dispersum per uniuersam corporis superficiem, unde minus causæ resoluenti resistit & ciliat partem eius calidum resoluens melius applicatur, & econtra in ascite. Tercio quia accidentia sequentia ascitem & causa eius sunt deteriora. Istis uehementibus grauedo corporis, suffocatio, syncopis, materia aquea quæ implet concauitatem existente & resudante ad spiritalia. Et propter ascensum uaporum corruptorum ad omnia membra nobilia. Tenendo secundo cum Auicenna, quod hypofarca semper plurimum est minus malæ cæteris, propter tres causas contrarias suprascriptas. Ex quibus infertur tympanitem esse mediam secundum malitiam, & quæ licet in qualibet ex tribus speciebus reperiatur aliqua mortalis, & aliqua salubris, semper plurimum tamen minus mortalis & magis salubris est hypofarca, contra ascitem, sed tympanites media. Contra determinationem instatur. Primo quia in hypofarca nocumentum est in omnibus membris, cum sit causa in ea ut plurimum corruptio digestionis tertie, quæ est in omnium membrorum uenis. Nam ubi deberet generari humiditas prima de secundis generatur humiditas phlegmatica inconueniens pro nutrimento membrorum. Item læditur digestio quarta omnium membrorum, quia nutrimentum inconueniens attrahitur in porositate membrorum & non unitur neque assimilatur, & cum hoc est nocumentum digestionis secundæ, sicut in cæteris quæ aliquando sequitur defectum digestionis primæ. Et confirmatur quia omnia membra nobilia & ignobilia tument propter causas dictas, & sic omnia multum læduntur. Secundo instatur quod tympanites sit deterior cæteris, quia sicut se habet uentus ad aquam, & phlegma in comparatione ad sanguinem laudabile ita digestio per quam generatur uentus ad digestionem, per quam generatur bonus sanguis, sed uentus magis distat à sanguine laudabili quam aqua & phlegma, ergo similiter digestio per quam uentus generatur magis distat ab optima digestionem generante bonum sanguinem, quæ digestionem per quam generatur aquositas

aquositas, & phlegma maior manifesta, quæ affectus & cæ sunt proportionales, siue sites i bonitate & malitia, sed minor, probat quia uentus in modo substantiæ magis distat à sanguine quàm aquositas & phlegma, ut manifestum est. Item magis in complexione cum sit frigidus & siccus, sed aquositas & phlegma frigida & humida, unde conueniunt cum sanguine in humiditate. Ex quo sequitur: quod tympanites, cuius causa coniuncta est uentus sit deterior cæteris, quia quanto aliquid magis distat ab optimo in aliquo genere illud est deterius. Tercio instatur quod tympanites sit minus mala cæteris tum quia uentositas facillime resoluitur, secundo quia à leui causa generatur tam ex parte ciborum quàm ex parte caliditatis. Vnde non significat tantum lapsum quantum alia duæ. Tercio non communicatur nocumentum uniuersale toti, sicut in hypofarca. Ad primum conceditur, quod nocumentum est in omnibus membris in hypofarca, sed ex hoc non sequitur, quod sit cæteris deterior cum similiter in aliis duabus nocumentum sit in omnibus membris scilicet omnium membrorum fortis exicatio substantifica, quæ non est in hypofarca. Præterea nocumentum commune non semper est deterius nocumento particulari, sicut in lepra, quæ est cancer uniuersalis comparata cancro particulari, quæ est deterior & non sanabilis, nisi cum euulsione membri cancerati, tertia quarti, capitulo de cancro, & capitulo de lepra. Lepra autem multoties sanatur membris non amputatis, ita etiam de febre comparata aliis egritudinibus particularibus. Et ad confirmationem, dicitur quod quamuis lædantur tres digestionis, secunda, tertia, & quarta diminute aut corrupte, tamen secundum plurimum læsio secundæ in tympanite & asci te est deterior, & minus corrigibilis quàm læsio trium in hypofarca, & pendens à fortiori causa & minus corrigibili. Et ad secundam confirmationem dicitur non omnia membra tumere, sed bene manifesta ignobilis & forte caro cuti propinqua, sed cor, pulmo, hepar, & cætera nobilia non tument, & quamuis nutrimentum secum plurimum eius sit incoueniens tamen membra nobilia quod ex nutrimento est conuenientius attrahunt ipsum, uenientia & assimiliantia, & residuum pro ignobilibus relinquunt, & forte illud quod attrahunt aliquantulum periciunt. Et si multum excreueret malitia nutrimenti, forte tument membra nobilia & tadem sequeretur mors. Ad secundam rationem negatur maior generaliter sumpta, sed bene conceditur quod si sicut leui habet uentus ad aquam & phlegma in malitia in comparatione ad sanguinem bonum, ita se habet digestio generatiua uenti ad digestionem generatiuam aquæ & phlegmatis. Vnde sicut uentus faciens tympanitem est medius in malitia & difficultate extractionis inter aquam & phlegma. Ita per digestio quæ generatur uentus est medius in malitia inter duas alias digestiones, non tamen est medius in modo substantiæ & in complexione, nec oportet in omnibus affectum assimilari causæ, præcipue illi quæ non est talis. Ad tertiam sequendo conclusiones dictas, dicitur quod licet uentus cæteris paribus facilius resoluitur quàm phlegma, & quàm aquositas, tamen uentositas multa conclusa in uentre difficilius euacuatur quàm phlegma per membra ad minima diuisum propter causas superscriptas. Ad secundum negatur quod leui causa generatur, uno secundum plurimum sit à corruptione primæ & secundæ digestionis à fortiori causa proveniente quàm nocumenta secundæ, tertiæ, aut quartæ digestionis facientis hypofarcam. Ad tertiam patet ex dictis, qualiter sit respondendum. Si quæ autem sint autoritates quæ sonant contrarium determinationis. Aut dic quod fuerunt opinioniones contrariæ opinioni Auic. uel si forte dixerunt hypofarcam esse deterius intellexerunt ratione cõminutatis nocumenti toti, aut maiori parti corporis. Si uero dixerint tympanitem deterius, intellexerunt ratione maioris distantiæ uenti à sanguine laudabili in complexione & modo substantiæ quàm phlegmatis, aut aquositas, & intellexerunt de tympanite sequente febres acutas, sicut sanguinem pestilentialem, & similes Auic. uero intellexit alciut esse deterius, eo quod sit magis mortalis & minus salubris quàm reliqua. Hypofarcam uero e contra & tympanitem mediam, & hanc sententiam iam dictam in comparatione hypofarcæ, & tympanitis affirmat magis experientia quàm ratio. Ego uero in diebus uite meæ uidi paucas hypofar-

cas & multas tympanites, & utraq; secundum plurimum sanatas præter quasdam tympanites, siue ueras, siue non ueras euenientes in febribus acutis quasi subito & in propinquitate mortis, alciutes uero cum multis uiderim paucas uidi sanari. Nunc uero agamus in speciali de causis specierum hydropis, & primo alciutes, quæ cum fiat ab aquositate expulsa ad concauitatem uentris inferioris. Primo ponam causas multiplicationis eius. 2. deriuationis eius ad concauitatem iam dictam, et cur non fluat per uias consuetas, per quas si copiose fluere non fieret alciutes.

Causæ ergo multiplicationis sunt ex parte materiæ agentis, ac extrinsecorum. Ex parte materiæ sunt potus aque, aut uinum multum limphatū. Itē cibi superflue humidi & aquosissimi, sicut cerasa, persica, pira, poma, cucurbitula, angur, melones, uinæ immaturæ, & similia. Ex parte uero agentis, debilitas aut corruptio digestiue hepatis, de quibus dictum fuit in cap. de debilitate hepatis. Sed ex parte extrinsecorum, sicut aer humidus & frig. qui circumdat & inspiratur ab his qui habitant loca terrena, & carceres, & meatus subterraneos longo tempore, & qui habitant in uallibus & balneantur in aquis, aut bibunt eas, & proprie post exercitium, balneum, aut coitum. Causæ uero sparsionis eius in uentrem sunt, aut ex parte hepatis, aut renum uel uesicæ, uel ex parte ipsius aquæ. Ex parte hepatis quando eius expulsiua est debilitata, ita ut non possit expellere ad uias urinæ, aut corrupta, quare expellit ad uentrem quod non debet, uel forte in uena magna, uel emulgentib. est oppilatio, aut in gibbo hepatis, quare aquositas non potest penetrare. Aut in gibbo hepatis est apostema, & proprie durum ex parte renum, quia in renibus sit oppilatio, uel apostema, propter quod aqua non potens penetrare regurgitat ad hepar, uel forte eorum attractiua debilitetur, uel fiant in ipsis ulcera dolorosa. Ita ut propter dolorem aut ardorem ex urina fugiant ab attractione. Similiter intelligatur de uesica & poris uritidibus. Ex parte uero aquæ quod sit tantæ quantitatis quod superet expulsiuam hepatis, & sequelstratiuam quare remanet cum sanguine, & penetrat postea per uenas, & proprie per uenas mirach, & residando penetrat in concauitatem mirach. Et hæc est una de uitiis quibus aqua penetrat per cõcauitatē mirach, scilicet aqua penetrat per uenas communes mirach uel perueniens ad uenas, quæ ascendunt ad sumem, per quas mingit foetus in utero sudando cadat in concauitatem, & quod hæc penetratio licet mirabilis sit possibilib. patet quia medicinx cholericæ aliqui penetrant p spondyles ad nuchā, per quam penetrationē sequitur paralysis, ut superscriptum est in paralysis. Secunda uia quod penetrat per meseraicas, & ex eis residat ad concauitatem, sed certe facilius esset eius penetratio ad concauitatem intestinorum, sed hoc accideret quando esset exuberans. Tertia uia quod ab ipso hepate residet ad concauitatem. Quarta si aliqua uia uel meatus frangeretur, sicut uena aliqua de prædictis, aut forte unus ex poris uritidibus. Et per scissuram illam fluere ad concauitatem. Causæ uero speciales hypofarcæ præter coniunctam, quæ est appositio nutrimenti in poris, sed non unio propter phlegmaticitatem suā. Vnde tument membra exteriora, est corruptio digestionis tertiæ, scilicet quæ fit in uenis ad phlegmaticitatem. Vnde generatur prima humiditas de secundis phlegmatica cruda inepta ad nutritionem. Et semper concurrit nocumentum digestionis secundæ, aut aliquando primæ similiter declinat ad phlegmaticitatem & cruditatem. Causæ uero corruptionis harum digestionum sunt male complexionis horum membrorum frigida & hum. aliquando oppilationes, aut apostemata frigida maxime in hepate. Item infrigidationes & oppilationes in membris exterioribus obtundentes calorem innatum, & prohibentes superflua euaporare. Causæ autē primitiue sunt stomacho in aere uehementer ut in carceribus, cameris terrenis, & locis paludosis, & similibus, de quibus supra. Itē cibi frigidi & humidi superscripti, potus aquosissimi, res uiscosæ, & similia. Et quandoque in causa est caliditas colligans & liquefaciens carnes. Quapropter humores liquefacti peruenientes ad renes oppilat eos crassitie suæ, unde non potentes descendere spargitur per corpus & fit hypofarca. Tympanitis uero causæ sunt secundum plurimum corruptio digestionis primæ. Cuius causa est debilitas digestiue sto-

Io. Arculani Z machi

machi uel quia materia, id est, cibis qui sumitur est uentofabilis, caliditas enim stomachi debilis operationem debilem faciens in cibo, facit, ut cum peruenit ad hepar conuertatur in uaporem, aut uentositatem eo quod non est præparatus in conuersionem sanguinis, quia non habet eliquationem bonam cum permixtione partium subtilium cum crassis. Vnde separatæ uentofantur facilius. Secunda causa est debilitas caloris hepatis quæ agit in cibum, uel materias humores sibi uicinas ita ut non sufficiat transmutare & agere in eas nisi euaporando. Tertia causa est caliditas intensa in stomacho & hepate extranea, quæ agit in cibos humidus actione disproportionali antequam calor eorum, ut naturalis incipiat digerere. Vnde conuertit eos in uaporem & uentositatem. Quarta causa est multus usus ciborum uentofabilium, ut sunt legumina recentia, fabæ, fæoli, allium, cœpe, porri, fructus humidi, lac, acresta, uinum granatorum, & similia. Sed hoc sciendum quod digestio quæ generatur uentofitas, & similiter caliditas eam generans dicitur corrupta, quia generatur aliquid non habens rationem humoris, hæc autem uentofitas generatur ex cibo assumpto. Aliquando ex humiditatibus repertis in stomacho, intestinis, hepate & partibus uicinis à caliditate extranea ipsas subtiliant in uapore crassum, aut uentositatem. Item sciendum quod in febribus pestilentialibus, imo in multis acutis pestilentialibus, sicut in synocha & similibus fit inflatio uentris & tympanites, cum representatione soni tympani, & hoc fit à caliditate forti, sed debili in quantum naturalis à multitudine materierum, aut crudarum per uiam indigestionis multiplicatur aut corruptarum per malignam putredinem, quæ per actionem huius caliditatis uentofantur, & euaporantur, sed non resoluuntur, quia maior est eorum multiplicatio quam resolutio, & est malum signum, & semper plurimum mortale.

Signa primo ponuntur communia fere omnibus hydropicis. Deinde de signis cuiusque speciei specialibus agam.

Primum, est mutatio coloris à naturali uiuido ad malum diuersum, tamen secundum complexionem hepatis. In frigida enim mutatur ad album plumbeum, in calida citrinum qui aliquando non aduertenti apparebit rubeus rubedine sana. Sed si bene & distincte notabitur, uidebitur in oculis mutatio à uiuiditate sana, & à pulchritudine in sinu oculorum & circumferentia maxillarum: & in his coloribus bene caueant medici ne decipiantur. Secundum signum est inflatio oculorum, pedum, & interdum manuum nisi in tympanite. Sed in hypofarca plus: quod prouenit propter humiditates & uapores crassos comunicatos partibus extremis nisi in tympanite, ubi nullus tumor nisi in uentre reperitur. Manus autem non ita inflantur sicut pedes, quia fonti caloris, propinquiores, per quem fit resolutio, uirtutum naturalium confortatio, & cum hoc propter fortitudinem expulsiuæ non recipiunt superflua. Secundo quia frequentius mouentur. Tertio quia humores graues amplius sunt parati descendere, contingit tamen aliquando unum crurium plus altero tumescere, uel ex maiori eius debilitate, uel quia materia in membris superioribus eiusdem lateris magis continetur. Tertium signum est sitis intensa in omnibus speciebus hydropis calidæ. Primo in tympanite cum non restauretur humidum, sed corpus arefiat. In ascite propter uapores ab aqua eleuatos calidos, siue ex putredine, siue ex mixtione cholæræ cum ea quâdo, si aquositas est citrina, qui uapores petunt superiora. Et quia non restauratur humidum, roridum conueniens, sed mala aquositas. Similiter in hypofarca ex causis similibus. Quartum deiectio appetitus aquæ, nisi accidat quæcunque illarum à frigidityte, & proprie à potu aquæ frigidæ non à sua hora. Quintum in omnibus minoratur urina & proprie in ascite, deinde in hypofarca & in pluribus rubet propter paucitatem suam, ita ut à pauca cholera sit apta tingi. Item tingitur propter paucitatem separationis aquositas à sanguine & cholera. Quapropter ex citrinitate, aut rubedine urina non est iudicanda hydropis calida, nisi esset uehementia tincturæ cum mediocri quantitate urinae, & satis bona substantia. Ex quibus infertur tincturâ urinae non esse propter causas nuper dictas signum hydropis calidæ, nisi cum duabus conditionibus superscriptis. Aqua uero, quæ in uentre congrega-

tur non est ita tincta sicut illa quæ mingitur. Primo quia non tandiu remanet in hepate sicut illa quæ mingitur.

Secundo quia refudat per porositates angustas. Vnde depuratur. Sextum febres in hydropicis sunt tepidæ, quia humiditates istæ leuiter putrent. Septimum accidunt in eis bothor, quæ eruptæ emittunt aquam citrinam quod magis uerificatur in postremis materia iam malignata. Octauum multiplicatur egestio sanguinolenta in hypofarca & tympanite, hepate debilitato non sufficiente transmutare chilum in bonum sanguinem. Vnde transmutatur in rem quasi mediam inter chilum & sanguinem assemblatam loturæ carnis recentis. Talis enim renouitur à membris cum non sit bona ad nutriendum, & mittitur ad intestina. Ipsa uero apparet plus in tympanite & hypofarca, quia in eis chilus amplius transmutatur uersus sanguinem, in ascite enim sola fit aquæ generatio. Et si quid sanguinis generatur, illud modicum, & si non bonum, pro nutrimento membrorum audiorum retinetur. Et hæc sunt signa communia hydropis.

Signa uero causarum sunt hæc. Si enim pedeatur à causa calida adest sitis, magna inflammatio, citrinitas uel rubedo, amaritudo oris, uomitus citrinus, aut uiridis, corporis notabilis exiccatio, defectus appetitus cibi, tinctura notabilis urinae, cum conditionibus superscriptis, & aliquando ardor ipsius, frigiditatis superflue contraria sunt signa.

Si uero pedeatur ab oppilatione, aut apostemate signa præcesserunt in capitulis propriis.

Si uero fuerit à solatione continui, signa sunt causæ ipsius primitiue, sicut casus, percussio, offensio in regione hepatis, ad quas sequitur contusio, ulcus, apostema, & similia quæ per signa propria cognoscuntur. Et si fuerit per communem à toto sicut in febribus, febres ipsæ, quæ adfuerunt & præcesserunt sunt signa. Et si fuerint arsiuæ forte adest liquefactio tam in egestione quam in urina, aut in altera, & forte erit egestio uirulenta, & urina sicut lotura carnis, aut fortasse præcessit.

Si uero hydrops sequatur aliquam notabilem euacuationem, & proprie sanguinis ipsius, præcessio est signum & pallor faciei.

Si uero fuerit per communem à membris particularibus, sicut à pulmone, & cæteris membris spiritualibus stomacho, splene, mesenterio, intestinis, membris, urina, matrice, cognoscitur per præcessionem ægritudinum illorum membrorum cum quarum augmento augendo præcessit.

Causæ uero primitiue & proprie, quæ diu præcesserunt significant se ipsas, & proprie quando non apparet aliqua causa corporea per essentiam aut per communem, quæ uerisimiliter sit in causa.

Species uero hydropis habent signa propria per quæ ab inuicem distinguuntur. Primum signum ascitis est grauitas sensibilis in uentre. Secundum, cum percutitur non est eifonitus, sicut in tympanite, sed quando communetur auditur sonus aquæ commotæ, similiter quando habens eam permouatur de latere ad latus, non sicut in tympanite & hypofarca. Tertium, tactus eius est tactus utris pleni aqua, non utris pleni uento. Quartum, non magnificantur cum ea omnia membra sicut in hypofarca, imo superiora arefiunt, & inferiora sicut pedes inflantur, ita ut aliquando inflatur uirga & oscheus. In tympanite uero omnia arefiunt. Quintum, cutis uentris & crurium est humida, extensa, lucens cum aquositate supposita. Sextum, est paucitas urinae magis quam reliquis. Septimum, pulsus est paruus, frequens, declinans ad duritiem cum aliquanta tensione propter tensionem uelaminum, & quâdoque in fine declinat ad lenitatem propter multitudinem humiditatis. Octauum, quâdo est hydropis ascitis eueniens subito, & maxime post lapidem exeuntem absque causis manifestis nocumeti hepatis, una uiarum urinae est distructa, sicut etiâ pori uritides, aut uesica, inter quas distinguitur per locum doloris.

Sed signum proprium subiaccens uisui, per quod species hydropis inter se distinguuntur, & etiam distinguuntur à mola matricis, & pregnatione, est ut resupines patientem, & uideas si totus uenter sit extensus, an solum ab umbilico infra. Si primum est hydrops. Si est secundum pregnationem uel mola. Postea si uenter totus est extensus consideranda an superior pars uentris deprimatur, & latera extendantur & tunc est ascites. Si uero pars superior eleuetur, & proprie umbilico

umbilico exeunte, latera uero non extendantur est tympanites. Huius exemplum habes in duobus uescis, siue duobus utribus, quorum unus sit plenus uento, alter aqua, si uero uenter non appareat multum eleuatus, & cum premittitur cum digito remanet uestigium est hypofarca, & maxime quando finis tumor est in reliquis membris. Sed mola distinguitur ab impregnatione per signa, quae dicuntur in capitulis suis. Signa hypofarcae. Primum, inflatio in toto corpore sicut accidit in corpore mortui. Secundum, impinguntur membra omnia apparenter. Et proprie facies & partes superiores nutrimento phlegmatico petere superiora propter cerebrum. Tertium, cum premantur digiti in omni parte corporis remanet uestigium. Quartum, non est in uentre eius de inflatione & commotione quod est in uentre ascitis, nec de inflatione & exitu fuminis, id est, umbilici & partium propinquarum, quod est in tympanite. Quintum, & sequuntur eam fluxus uentris sanguinolentus & lenitas naturae tendens in albedinem, scilicet phlegmaticam, quod signum uerificatum fuit in signis generalibus. Sextum, & quandoque pulsus eius est undosus, lenis propter multam humiditatem.

Prognosticum Auic. auctoritate aliorum, quando in facie hypofarcae, aut manu sinistra eius sit molities, id est, paralytis & accidit in principio accidetis pruritus in naso, moritur in secundo die, aut in tertio. Significatur enim magna corruptio, unde fit uaporum corruptorum eleuatio ad superiora, qui faciunt pruritus in naso, quare stante tanta corruptione cum debilitate uirtutis significata per paralytim moritur festina. Signa tympanitis. Primum egreditur in easumen notabiliter. Secundum, non est in ea grauitas sicut in ascite. Tertium, est in uentre maior tensio quam in ascite, imo uenter est sicut corda tensa. Quartum, & non est in ipsa pinguedo, id est inflatio cum mollicie aliorum membrorum, sicut in hypofarca, imo tendunt ad arefactionem. Quintum, & cum uenter percussus auditur sonitus uentris pleni aere non uentris pleni aqua. Sextum, & est appetens eructatione semper, & inuatur ex ea propter exitum uentositatis. Septimum, & eius pulsus est longior pulsus aliorum hydropticorum propter tensionem cum fortitudine uirtutis in comparatione ad ascitem. Vt propter hoc appareat durus, uelox, frequens, cum propter inobedientiam instrumenti non possit satisfacere cum magnitudine, est facis fortis cum uirtute non debilitat sicut in ascite. Octauum, & non est inflatio in ea omnium membrorum, sicut in hypofarca, nec pedum, sicut in ascite causa patet ex dictis.

Prognosticum. Primum, homo de quo uehementius timetur cum accidit ei hydropsis est ille, cuius complexio naturalis est calida & sic non enim aegrotat in contrarium suae complexionis nisi propter fortem causam. Secundum, hydropsis adueniens propter duritiam splenis, est magis salua quam ueniens propter duritiam hepatis, imo est in qua speratur curatio. Tertium, quando dominatur materia hydropsis adeo ut faciat accidere dyspnoeam, id est, difficultatem & costrictionem anhelitus, & solutionem uentris significatur propinquitas mortis in tribus diebus. Si autem nocentur anhelitus propter malam complexionem officialem, id est, membrorum officialem, sicut diaphragmatis pulmonis, non est ita malum sicut propter multitudinem materiz. Quartum, ulcera maligna oris & gingiuarum, & reliquarum partium, accidentia in processu, iam uirtute defecta propter malitiam uaporum & sanguinis, significant mortem non multum distare. Quintum. Quando descendit ex hydroptico quod est sicut caro pronuntiat mortem eius, forte enim illud descendens ex hepate significat eius corruptionem. Sextum. Si alicui habenti melancholiam accidat hydropsis curatur per aduentum hydropsis, quoniam humectatur. Septimum. Fluxus uentris hydroptico superueniens mortalis nisi euacuetur causa hydropsis. Octauum. Venter siccus in hydrope est melior quam lenis, & proprie si hydropsis proueniat ex nocumento renum & membrorum urinae. Nam in hoc sic lenis uenter propter reuersionem humiditatis ad intestina. Et siccatas uentris est maior in hydrope sequente nocumeta membrorum anteriorum, & quando sunt, & foemoralia sunt carnosae est melius, significat fortitudinem & tolerantiam solutionis, & his possunt exhiberi solutua fortia. No-

nū. Omnia ulcera in hydropsi sunt difficilis curationis. Decimū. Omnis hydropsis sequens peripneumoniā est mortalis. Undecimū. Hydropsis ascitis est enim plurimū mortalis, sed hypofarca, & tympanites enim plurimū salubris, nisi tympanites quasi subita sequens aegritudines acutas, sicut synochas pestilentiales, & similes quae fere semper est mortalis. Duodecimū. Omnis hydropsis in acuta febre malum, secundo prognostic.

Cum uenter post hepatis dolorem, & feb. augmenta-
ri coeperit, & quod est ab umbilico usque ad femur
exterius prominuerit, & cutis, quae est ibi, subtiliari,
& albere uisa fuerit, & cum uenter mouetur, auditur sonus
quasi aquae in uase non pleno moto, & si cum his urina fue-
rit rubra; parua est habenda fiducia, & proprie si uirtutis
non affuerit fortitudo.

Hoc capitulum diuiditur in tres partes. In prima Rasis cu-
rat ascitem. In secunda hypofarcam. In tertia tympanitem.
Secunda ibi. Quod si in palpebris, tertia ibi. Si uero uenter.
Prima in 2. Primo ponit signa ascitis. 2. curā. Secunda ibi. His
tamē. In prima parte ponit quatuor signa. Primum quod ue-
ter post hepatis dolores qui sequuntur ad apostemata, aut al-
lias eius aegritudines coeperit tumere ita ab umbilico usque
femur exterius eminuerit, imo etiam super umbilicum, li-
cet minus. Secundum quod cutis uentris uisa fuerit albe-
& subtiliari quasi tensa a re alba. Tertium cum uenter moue-
tur auditur sonus aquae in uase non pleno moto, haec tamen
significant hydropsim, ascitem. Quartum & si cum his urina
fuerit rub. scilicet notabiliter & cum conditionibus supra-
scriptis, scilicet quod non fuerit ualde pauca, nec male sub-
stantia quae significant & ipsam pendere a causa calida. Et co-
sequenter parum sperandum esse & maxime uirtute existe-
te debili cum deterius sit hydrops calida quam frig. haec qua-
tuor significant ascitem mortalem.

SCHOLION

Cum uenter aduertendum est Rasis citum signa ascitis describere, quae
nondum sit confirmata; ut medicus opem ferre possit: nam confirmata per
se est nota, & plerumque incurabilis.

Hic tamen si uirtus fortis fuerit, & uenter uehementer
siccus; pilulae de ravedeni quae recipiunt mezereon danda
sunt: quae recipiunt ravedeni, succi eupatorii, sem. endiuiae om-
nium ana. drach. 3. agar. drach. 5. mezereon drach. 10. fiant
ex his pilulae, quarum dos sit drach. 2. s. ex quibus quaque
hebdomada dos sit una sumatur. quod si uirtus fuerit debilis,
trochisci de mezereon dandi sunt. qui Rec. sem. endiuiae drach.
10. mezereon drach. 1. & 2. tertias agarici, succi eupa-
torii similiter tantundem, rosarum, sem. citrullorum ambo-
rum ana. drach. 2. & s. ex his omnibus fiant trochisci 10. de
quibus unus in die cum syrup. acet. de saccharo dandus est.
si autem uenter fuerit solutus; dentur trochisci de berberis
cum syrup. acet. eger quoque nutriatur ex zibregi: & bibat
syrupum acetosum de citonijs. & si uentris solutio uehemens
fuerit; citoniorum rob solum dandum est.

Hic curat ascitem primo a causa calida. secundo a causa
frigida, secunda ibi. Si autem cum his. In prima parte po-
nit tria remedia. Primum uirtute existente forti, & uen-
tre sicco pilulae de ravedeni, de rhabarbaro in quibus po-
nitur mezereon. R. ravedeni. sed loco ipsius accipimus
rhabarbarum, & est melius, succi eupatorii, sem. endiuiae
ana. 3. 3. agar. 3. 5. mezereon. 3. 10. fiant pilulae. quarum
dos est 3. 2. s. & quaque hebdomada sumatur dos sit infra
cum custodia. Si uero uirtus fuerit debilis dentur trochi-
sci de mezereon. ut R. sem. endiuiae 3. 10. mezereon, aga-
rici, succi eupatorii ana. 3. 1. & 2. 3. rosarum sem. citrullo-
rum ana. 3. 2. s. ex his fiant trochisci 10. de quibus unus in
die cum syrup. acet. de saccharo dandus, trochisci isti sunt
leues, sed pilulae fortes & non danda nisi uirtute existen-
te forti. Est enim mezereon calidum & sic. in quarto ex-
coriatium, serofum, inflammabile, consumptium & dis-
solutium uirtutis, educens aquam citrinam cum fortitu-
dine, cuius dos. substantia est 2. 3. s. usque ad unam & no-
cet hepati nisi rectificetur, sed semen endiuiae, & succus eu-
patorii

Io. Arculani Z 2 patorii,

patorii, & semen citrulli ipsum rectificat, mezereon tamen bonum communiter non reperitur apud nos. Secundum remedium, quod si uenter fuerit lubricus dentur trochisci de berberis cum syrupo acetoso, infrigidant enim & stringunt.

Tertius, quod æger nutriatur ex zibei uel zibrebegi, qui est cibus factus ex carne cocta, & ouis simul mixtis, & bibat syrupo acetosum de cytron. Et si uentris solutio uehementis fuerit, cytoniorum rob solum dādū est ad uentris constrictionem.

SCHOLIA.

Et uenter uehementē siccus scias uelim aliquādo à causa calida duci posse uentris fluxus; quādo dum si uirtute renum attractiua debili existente paucis humor aquosus ad eas fluere & multus intestina opprimeret, uel si cum hepate læsus esset uentriculus, aut mēterium. Mezereon] nocet hydro pilis à caliditate facta. Si autem fuerit uenter solutus] id est lubricus dentur trochisci cum syrupo ex aceto cytoniorum.

Si autem cum hac passione non fuit urina rub. nec calor; pilule istæ dandæ sunt, quæ. Recip. mezereon, sagapeni amborum ana drach. s. salis indi, fimi columbi amborum ana. s. drach. i. pilulæ enim istæ aquam uehementer descendere faciunt. Trochisci præterea de lacca cum apozemate de radicibus dandi sunt. Emplastrum asciti conueniens. Recip. fari. hord. cyperi, stercoreis bouini ueteris, baurach. bol. ar. omnium partes æquales ex his omnibus tritis fiat epithyma super uentrem. huius namq; proprietas est aquæ magnam partem exsiccare.

Hic curat ascitem à causa frigida per tres medicinas. Prima medicina est. Quod si cum hac passione non fuerit urina rub. nec calor scilicet febrilis, aut complexionalis superfluis pilulæ istæ dādæ sunt. R. mezereon, sagapeni cal. in tertio, sic. in secundo educēs humores crassos & uiscosos, & aquam citrinam an. 3. s. salis indi cal. & sic. in tertio, soluentis melancholiam & humores uiscosos, fimi columbini calidi in quarto soluentis pungendo & dissoluendo ana. 3. s. fiant pilulæ & sunt dosis una, & potenter soluent aquam. in aliquibus tamen libris non sunt sal indum, neq; fimi columbinus, credo illos textus meliores. Secunda medicina est, ut dentur trochisci de lacca cum decoctione de radicibus quorum descriptio præcessit in cap. de dolore hepatis, aperiant oppilationes & prouocant. Tertia medicina est hæc. R. farinæ hord. cyperi, stercoreis bouini ueteris, baurach. bol. arm. omnium ana. partes æquales fiat epithyma super uentrem, permiscendo cum aliquo liquore, sicut esset aqua cineris & uinum album. Inuat enim in resoluendo aquam.

Quod, si in palpebris, & extremitatibus fuerit apostema molle, & testiculi apostemantur, faciesq; ac totum corpus mollitie quadam teneatur; erit tunc hydropisis species, quæ hypofarca uocatur. ægro itaque hac specie laboranti trochisci de lacca cum apozemate de radicibus sunt tribuendi. & uenter quaque hebdomada ex 4 pilulis de rhabar. est soluendus. & patiens in arena calida est sepeliendus. ei quoque est præcipiendum, ut exercitio utatur: & famem, & sitim sepe patiat.

Hic curat hypofarcam dicens: quod si in palpebris & extremitatibus fuerit apostema molle, & testiculi apostemantur, id est, oscheim, & forte testiculi cum eo, & facies & totum corpus sit factum molle cum quodam tumore; quæ omnia sunt signa hypofarce. Pro curâ hac ægritudine laborantis sunt tribuendi trochisci de lacca cum decoctione de radicibus ad mundificandum corpus per uiam urinæ, & aperient dum oppilationes, & frequenter exhibeant. Et uenter quaque hebdomada soluendus cum pilulis de rhabarbaro, quæ possunt fortificari reformando eas cum succo ireos. Pilulæ tamen de raved. Melue sunt fortiores. Et factis euacuationibus patiens in arena calida sepeliatur ad resoluendum phlegma aquosum. Et exercitetur stomacho ieiuno. Et fac sepe famelicat & sitiat.

SCHOLION.

Ex pilulis de rhabarbaro plurimum ualent in hypofarca: cōfert quidem, inquit Auic. uentris solutio, uel maxime cum pilulis de rhabarbaro: nam non solum hos purgant humores; sed etiam hepatis obstructa aperiunt, & usq; uirum excitant.

Si uerò uenter inflatus fuerit, ac tensus, & cum percussatur sonum reddit ut tympanum; hydropisis species adesse significabitur, quæ tympanites dicitur. quam qui patitur, à comestione olerum abstinere debet, atque eorum omnium, quæ uentositatis sunt generatiua. uenter quoque omni die ex panico t est uaporandus: & uentose super uentrem ponenda. medicamina tumorem dissoluentia danda sunt; ut diacyminum, & electarium de baccis lauri, quod in cap. de iliaca nominabimus. æger præterea exercitio uti assuescat: & famem pati. ex collyrijs, quæ uentositatem dissolunt, quorum faciemus mentionem, si subiiciat. uenter quoque mantili, donec incipiat rubere, fricetur: & ex oleo rutaceo clysterizetur.

In parte ista curat tympanitem dicens: Quod si uenter inflatus ac tensus fuerit, & cum percussatur sonat ut tympanum, est species hydropis dicta tympanites & tu supple reliqua signa tympanitis superius allegata sine posita. Sed pro cura, debet abstinere à comestione olerum & omnium quæ uentositatis sunt generatiua. Pro quo nota omnia olera eē uentosa, licet aliqua eorum carminent uentositatem, sicut ruta.

Secundo est euaporandus cum panico, aut milio & proprie torrefactis. Tertio uentose super uentrem sunt ponenda. Quarto medicamina uentositatem dissoluentia danda sunt, sicut diacyminum, electarium de baccis lauri, cuius descriptio ponitur in cap. de colica. Quinto æger multum exercitetur stomacho ieiuno. Sexto patiat famem & sitim. Septimo collyria uentositatem dissoluentia, de quibus agitur in cap. de colica subiiciantur. Octauo uenter cum panico fricetur donec rubere incipiat. Nonum ex oleo rutaceo clysterizetur.

SCHOLIA.

Sonum reddit ut tympanum] cum uentus aggregetur inde per extensionem fit uenter siccus, & durus. Est uaporandus] uenter in materia calida, & sicca uentriculum, & intestina infestante: sed in frigida, & pituitosa potius est elementer soluendus.

Ordo curæ.

Via cura cachexiæ non differt à cura hydropisis nisi secundum magis & minus, ideo de ambarum curatione simul agendum est. Harum itaq; cura sex exit intentiones. Prima ordinat debitū regimen sex rerum.

Secunda minorat superflua. Tertia digerit, aperit, & membra naturalia confortat eorum diffectionem corrigendo. Quarta eradicat. Quinta corrigit accidia. Sexta remouet causas reciduiationis, quia est multum reciduialis.

Regimen autem sex rerum non naturalium debet tendere in contrarium causæ facientis hydropem, ideo habet diuersificari secundum diuersitatem specierum hydropis & causarum suarum, debet ergo in causa calida declinare ad frigidum, in frigida ad calidum, sed secundum plurimum ad siccum. Et semper magno opere ad confortationem stomachi, & hepatis, & membrorum naturalium. Aer ergo sit clarus declinans ad siccum, quapropter habitet in solari non in loco terreno humido, & sit calidus in frigida, & frigidus in calida, magis tamen cæteris paribus declinet ad calidum in frigida, quam ad frigidum in calida cum in omni hydropse opus sit causam coniunctam resolueret. Vitetur aer uentofus & aquosus. In cibo & potu obseruentur hæ conditiones. Prima ut sit parcus in utroque, quapropter non comedat nisi præcedentis cibi digestionem celebrata, & nisi notabiliter fameat constante appetitu, similiter non bibat nisi multum situerit. Sunt. n. fa mes & sitis summum remediū in hac ægritudine, & proprie sitis. Quapropter non comedant, neque bibant extra prandium & coenam imo si bene possent tolerare conueniens esset ut non cibaretur nisi semel in die. Secunda ut non multiplacent cibaria in mensa una. Tertia ut surgant à mensa cū reliquis famis. Quarta ut notabiliter comedant antequam bibant, & nullo pacto bibant aquam. Et si necessitas aliqua cogeret ad aquam misceatur cū uino per. 3. aut. 4. horas antequam bibat, & ante potum præcedat cibus, ut tardius penetret ad hepar. Quod si patiens non biberet uinū à proprietate quadam individuali sibi horrendum non cogatur ad ipsum, sed potius bibat aquam endiuiz, aut absinthii cum syrupo

po acetoso simplici, saccharino, aut mellino, aut saltē aquam calibeatam, est enim aqua summopere uitanda secundum omnem modum administrationis. Vinum tamen in causa notabiliter calida nocet nisi sit ualde pauciferū, unde forte præstantior est aqua endiuia, aut ius galli & proprie decrepiti, sed in causa frigida sit potius subtile antiquum clarū, de quo tamen parum bibat, & melius est album quàm nigrum. Panis hordeaceus est melior quàm triticeus. Si uero abhorret ipsum comedat triticeum, non omnino à fursuribus depuratum, bene coctum & salitum, cui si administratur semen endiuia, aut foeniculi, aut anisi erit præstator. Ex salatis conueniunt in causa calida endiuia, cichorea, lupuli, in frigida, cappares, foeniculi, petros. carota, præsium, apium, asparagi in utraque, & sint debite coctæ, & cum paucio aceto, & oleo conditæ asparagi tamen cum solo sale condiantur. Sed in tympanite olera & proprie recentia uitanda sunt. Ex ferculis conueniunt ius cicero, & phaseolorum, & decoctiones radicū, & semen aperientium, & caulium, & quæ sunt ex pane, aut ouis absque cascio, & quæ sunt ex enula & sit cocta in iure laudabilem carniū infra scriptarum, uideatur tamen si per se uisus brodiorum. Ex carniū conueniunt perdices, phaseani, frangulini, turtures, turdi, alaudæ. Aues paræ degentes in arboribus & pratis, columbi uolare incipientes, ex quadrupedibus hœdi, cuniculi, capreoli, lepores, &c. quæ comedantur in prandio elixæ, in coenis assæ, hepata galinarum optime conueniunt super prunis cocta non multum, pisces uideantur, sed caro limaciū conuenit, oua conueniunt secundum omnem modum administrationis, & sint mollia non per decoctionem indurata, uideatur lac, caseus, & lacticia omnia, butyro, & oleo raro utatur. Ex saporibus conuenit in frigida mustarda, & sapor ex passulis, & sapor ex aromatibus: in calida acresta, uinum granatorum, de berberis & quæ cum his sunt. Aromata conueniunt in frigida sunt cinnamomum, zingib. piper, grana longa, crocus, & similia, sed in calida sandali, spodium, coriandrum. Fructus conueniunt in frigida, sunt passulæ, fistica, auellana torrefactæ, sed in calida granata mura. Somnus sit nocturnus sex horarum, aut circa. Exercitium & proprie stomacho ieiuno est eis utile. Et proprie ambulando per loca arenosa, sicca, & per montes usq; ad sudorem qui continue abstergetur. Et tunc caueant à uentis, & post exercitium stent in sole capite protecto & aliis membris discooperitis. Accidentia animi conueniunt, sicut lites, ira, sollicitudo, & similia exiccantia, cauendum est ab accidentibus quibus corrumpitur digestio, sicut tristitia, timor, & similia, hæc autem exiccantia magis conueniunt in ascite, & hypofarca, minus in tympanite. Sollicite procuret omnes euacuationes naturales, imo etiā non naturales, sicut uomitus si eis fuerit conueniens, est enim euacuatio sibi conueniens. Pro secunda intentione quæ est minoratio huiusmodi canon. obseruentur. Primus, quod diuersi humores euacuentur crassi, subtiles, cholericis, phlegmaticis, aliquando melancholicis proprie cū splen est in causa. Sed in ascite maxime aquositas, in hypofarca phlegma, in tympanite diuersi secundum diuersitatem humorum qui in uentositatem subtiliantur, sed frequentius phlegma, deinde melancholia, licet aliquando ex chilo immediate generetur uentositas. Causæ autem tantæ diuersitatis humorum est eterogenitas chili cum errore digestiæ. Secundus, quod solutiua ista parum sint læsua membrorum nobilium maxime stomachi & hepatis, ut quia sunt leuia sicut benedicta, hiera simplex, pilulæ de rhubarbaro, de eupatorio, aut si opus est fortibus sint bene correctæ, & mixta etiam cum his, quæ stomachum & hepar confortant sicut ligno aloes crudo, schinantho, & similibus. Tertius, frequēs sit euacuatio ne materia multum exuberet, non tamen pro uice sit copiosa ne uirtus adiiciatur. Quartus, post solutionem dentur aliqua confortantia stomachum & hepar stipticitate moderata, proprietate & aromaticitate. Quintus, non conuenit phlebotomia ratione hydropis, tum quia materia hydropis, & proprie ascitis, aut tympanitis non est multum apta educi cum phlebotomia, materia uero hypofarche fortasse magis, tum quia phlebotomia paucifecat calorem innatum per quem hepatis & stomachi digestio perficitur, tum quia paucio existente sanguine in corpore phlebotomia pro

hibetur, quarta primi, cap. de phlebotomia. Verum aliquando competit ratione causæ, ut puta apostematis hepatis, in cuius principio debet fieri phlebotomia, sed post principium minus competit phlebotomia, quàm si esset apostema solum sine hydropo. Secundo, si causa hydropis esset retentio sanguinis menstrualis aut hæmorrhoidalis fluere consueri, tunc ex saphenis faciēda est phlebotomia aut huiusmodi sanguis prouocetur, similiter dico de sanguine retento, per aliam regionem fluere consueto, in his casibus faciēda est phlebotomia, nisi sit fortis indicatio in contrarium, phlebotomia tamen magis toleratur in hypofarca quàm in cæteris, quia plurimum materiæ hypofarche in uenis continetur, licet paucitas sanguinis huic obstat. Et si consilium tuum sit de phlebotomando, prius materiæ aliæ multum dominantes sunt minorandæ, postea phlebotomandum, & sic fiat phlebotomia lata, & proprie in hypofarca ut phlegma cum sanguine possit educi. Sextus uomitus aliquando conuenit ad mundificandum superflua in stomacho contenta, quæ digestionem impediunt, & proprie stomacho nausente qui fieri potest stomacho ieiuno, & post sumptionem alicuius cibi iuuantis ad uomitum. Septimus, clysteria conueniunt in euacuando causam antecedentem & coniunctam hydropis. Item in euacuando materias quibus stomachus & hepar debilitatur. In clysteribus ergo possunt poni solutiua secundum exigentiam materiarum euacuandarum. Item possunt poni aperitiua alterantia secundum exigentiam causæ hydropis. Ego enim in clysteribus aliquoties pono succum ireos in ascite & in tympanite electarium de bacis lauri, & in hypofarca hieralogodion, electarium indum, benedictam, & similia. Solutiua ergo exhibenda sunt hiera simplex ualens in calida & frigida. Sed in frigida magis, quæ educit superflua & referuat humiditatem innatis. Quod si humores fuerint crassiores, secum misceatur tertia pars agarici preparati, & fortiora sunt hieralogodion, hiera diacolocynthidos, & electariū indum, & hæc ualent in cachexia & omnibus speciebus hydropis, sed in ascite proprie sunt pilulæ de rauid cum mezereon, quæ sunt primæ pilulæ descriptæ à Rasi, ualentes in ascite, calida uirtute existente forti, sed incipias à 3. i. si autem uirtus fuerit debilior des trochiscos ab ipso descriptos etiā ualentes in causa calida, & detur trochiscus unus, pilulæ tamen de mezereon M. sunt forte in his præstantiores. Ego tamen in his pilulis de mezereon pauca inueni utilitatem, quod euenit, quia non habemus bonum mezereon, & in causa frigida Rasi iubet dari pilulas de mezereon cū sagapeno. Ego uero in ascite do succum ireos facta residentia à 3. 2. usq; ad 6. cum tantundem aquæ mellis aut aquæ casei, & si fuerit uehemens caliditas cum his misceo. 3. i. sandalorum uel tantundem specierum tria sandalorum aut saltē in fundo. 3. i. postea extraho facta bona expressione. Vbi autem in fluxibili uentre leuiores sufficiant, do pilulas de rhubarbaro, aut de eupatorio descriptione Mes. in ascite & hypofarca, & si uolo fortificare eas reformo cum succo ireos & sunt optimæ. Item pilulæ de rauid Mesue sunt præstantes, ius etiam galli decrepiti cum polypodio & anetho confert & leniter soluit & alchechengi, almezereon, alscibram descriptione Mes. dist. 3. sunt efficacia. Sed pro tertia intentione, quæ digerit, aperit, & membra naturalia confortat, sunt obseruandi isti cañ. Primus canon digestiua sint calida aut frigida secundum exigentiam sui contrarii. Sed quo ad uirtutes secundas sint subtiliatiua, abstersiua, incisua, apertiua, prouocatiua secundum quod oportet, sed quo ad uirtutes tertias sint membrorum naturalium confortatiua tam proprietate quàm stipticitate moderata. Hæc autem facilius complemus in complexione frigida quàm in cal. tum quia securius possumus calefacere q̄ infrigidare: tum quia magis efficacia, & à proprietate magis operatiua reperiuntur cal. quàm frigida, & propter hanc causam facilius curatur hydrops frigida quàm cal. Itē, quia ut dictum fuit in prognosticis, hydrops cū sit morbus frigidus, quo ad causam coniunctam materialem, prouenit à fortiori causa in hepate calido quàm frig. Et eo magis si sequatur discrasiam calidam cum ratione discrasie calidæ, quæ est causa antecedens, oportet calefacere, iuxta eū parua habēda est fiducia in hydropo à causa calida nisi adsit uirtutis fortitudo. Secundus ca-

Io. Arculani Z 3 non.

non, quod in hydropo est morbus ualde chronicus oportet digestiua, imo omne genus medicinarum permutare, tñ quia morbus uariatur in decursu per tempora sua, secundo oportet uariare secundum diuersitatem temporum anni, tertio secundum uarietatem uirtutis, quarto dato quod in superscriptis nulla fieret uariatio oportet uariare compositiones medicinarum, quæ tamen sint similis uirtutis habentes diuersa materialia, & diuersos modos ne natura asuefiat, tñ ne medicinz huiusmodi tedium afferant ægro. propterea cū uno tempore fuerimus usi syr. alio tempore utamur aquis, postea confectionibus, postea electariis, postea epithematibus, unctionibus, emplastris, cerotis, & similibus, & hæc aliquando sint similis uirtutis, aliquando differentis gradualiter aut formaliter secundum exigentiam. Item oportet uariare medicinas secundum diuersitatem intentionum, ut nunc digerere, euacuare, aut per nrinam, aut per sudorem, aut per uomitū aut per fluxum uentris & similibus modis. Nunc uero confortare, oportet enim hoc modo medicinas alterare. Quid enim prodesset semper euacuare & non confortare cū membra naturalia debilia iterum regenerant aquam phlegma & uentositates, neque iuuaret confortatio absque euacuatione, nec tamen unius modi euacuatio iuuat, imo oportet diuersas tentare & magis illas sequi, quæ magis conferunt. Tertius canon, cum compleuerimus unum ordinem medicinarum, ut puta minoratiuum, digestiuum, eradicatiuum, confortatiuum, sinamus naturam aliquanto tempore quiescere sine medicinis cum sola diæta conueniente, cuius temporis longitudo & breuitas debet prudentia medici mēsurari, & hoc ne natura terreatur ex tam continuo usu medicinarum. In hydropo ergo frigida ualet syr. de absinthio, qui cū hoc quod non est multum calidus confortatiuus membrorum naturalium & aperitiuus, deinde syrupus acetosus diarrhodon, & syr. de eupatorio, qui est his calidior & magis aperitiuus, & si opus esset incisione & abstersione cum his miscetur aliquid oximellis simplicis aut oximellis compositi si fuerit opus magis aperire & prouocare, & syr. acetosus aut oximel simplex, si opus fuerit magis calefacere, in quo steterit infusum absinthii uidelicet ad incisionem, abstersionem, aperitionem, & confortationem. Aquæ autem his proportionales sunt aqua absinthii, prassii, culcutæ, capil. ueneris, asparagorum, foenic. apii, & similia. Et aliquando datur sine syr. alicuius confectionis aut electarii proprii in hac dispositione, sicut diarrhodon abbatis, aromaticum rosarum, diacurcuma, dialacca, in qua est species ad omnem hydropem, diamorula, diacostum, confectio de raudeseni. Ex trochiscis autem conuenientibus sunt trochisci de ros. de absinthio, de lacca. Item trochisci de raudeseni descripti à Rasi in capitulo de dolore hepatis, & trochisci de rhabarbaro Me sue. Item trochisci de eupatorio, de capparibus maxime ualentes in hydropo sequente oppilationem splenis. Ex epithematibus, unctionibus, & emplastris sunt, quæ dicta sunt in cap. de debilitate hepatis. Sed in hydropo calida ualet syrupus endiuizæ, syrupus de bizantiis, oxifacchara, syrupus de granatis. Aquæ uero sunt aqua endiuizæ, hepaticæ, lupulorum, capil. ueneris, quæ est temperata, & quando non est magna caliditas cum his frigidis possumus admiscere aliquam calidam ex aquis aut syrupis superscriptis. Nam natura tagax dirigit frigida contra malam complexionem calidam, & calida ad confortandum spiritum & calorem innatum, quod est intelligendum tam in his, quæ interius sumuntur, quam in his, quæ exterius applicantur. Ex confectionibus uero sunt triaandali, diarrhodon abbatis. Ex trochiscis sunt trochisci de berberis descripti à Rasi in cap. de dolore hepatis. Trochisci de camphora, caumate existente magno. Applicando autem exterius confortatione hepatis calid. & frigid. descripta sunt in cap. de debilitate hepatis & de dolore ipsius, ad quod recurre. Quod si oppilationes fuerint fortes & multum traxerint ad se curam, utere his, quæ sunt magis aperientia, quorum sermo præcessit sicut dialacca, diacurcuma, & similia, & si uideantur nimis calida misce cum diarrhodon abbatis, & similibus infrigidantibus, & pro his recurre ad capitulum de cura oppilationum quod præcessit, pro quibus aperiendis non solum profunt sumpta, sed etiam clysterizata sicut clysteria ex radicibus & semini-

bus aperitiuis, mensura tamen sit in aperientibus & prouocantibus ne forte superflue prouocando induceret excoriationem. Aut ne forte in tympanite multiplicarent uentositatem propter superfluum caliditatem, ideo Auicenna post administrationem fortium diureticorum docet administrare ius gallinæ pinguis ut incoriet uias urinæ & ardorem remoueat. Prouocantia tamen fortia magis sunt necessaria in ascite & hypofarca, minus in tympanite, sufficiunt enim leuia, quæ ducunt materiam in uentositates conuertibilem, sed iura sunt magis necessaria carminantia uentositatem, & ex medicinis communis iuuamenti in omnibus speciebus hydropsis sunt urinæ infantum, quæ cum saccharo bibantur usque ad 5. 3. pro uice, & autores aliqui laudant urinas proprias. Item ad hæc omnia ualet uinum album decoctionis absinthii, marubii, endiuizæ, cichoreæ, culcutæ, & similia, & urina leporis cum spica nardi est propria, est enim urina leporis & humana ualde mirabilis in dispositionibus frigidis hepatis & splenis. Sed pro quarta intentione, quæ est eradicatio materiæ hydropsis tam antecedentis quam coniunctæ diuersa sunt instrumenta & auxilia secundum diuersas species hydropsis. In ascite quidem sex modis eius materiam eradicamus. Primo, per solutionem uentris. Secundo, per urinam. Tertio, per sudorem. Quarto, euacuando per uenas umbilicales. Quinto, per resolutionem insensibilem. Sexto, per uescicationem cauteria & sectionem. Primus modus, scilicet euacuatio per uentris solutionem, completur cum aqua distillationis corticis mediani samburci. Item cum solutiuis superius positis in minoratione, quæ fuit intentio secunda, & si opus est augeatur ipsarum dosis, aut frequentius iterentur. Et fortius illis est succus cucumeris asinini. Extrahatur ergo succus ex fructu cucumeris asinini absque uolentia postquam est maturus quod cognoscitur ex citrinitate sibi adueniente in fine æstatis, & permittatur depurari per residuum, deinde quod depuratum est permittatur exiccari, insudando in eo pro unaquaque uncia 3. 1. specierum alephanginarum in peria subtili, quæ cum extrahantur exprimantur, ut uirtus earum ingrediatur in succum, & secum pro unaquaque uncia dum est exiccatus, aut quasi miscetur 3. 1. dragachanti, aut bdellii. Et reseruetur, qui exhibeatur post sex menses. Et dosis eius est a 3. s. usque. 1. reformata una aut duabus pilulis, & potest educit aqua. Succus tamen ireos est magis domesticus quo communiter utor, aut cum aqua mellis, ut supra, aut in his qui facile soluantur reformando pilulas de rhabarbaro, aut de raue: cum clysteria quoque in quibus ponuntur huiusmodi aqua educta, sicut in quibus ponitur succus ireos, & similia, conferunt ad hoc, & potest de his in clysteribus poni maior quantitas, quam in exhibitis per os. Secundo minoratur materia ascitis per urinam cum apozemate de radicibus Rasis in cap. de dolore hepatis, aut cū diacurcuma aut dialacca, cuius dosis est a 3. 1. usque ad 3. cum aqua apii, aut asparagorum, & pauco uini subtilis, & si uiderentur nimis calida secū miscetur tantumdem diarrhodon abbatis, aut aliquid triaandalorum, & continentur pluribus diebus, & fortius est iustum aut litontripon cuius parum potest cum his permisceri, & secundum Gal. 3. complexionum medicamen de cataridibus correctis per aduersionem, aut per gummi cerasorum admixtionem ualet educendo multitudinem humiditatis, sed non detur nisi gran. s. & posset cum superscriptis misceri. Tertio modo minoratur per euacuantia per sudorem, sicut sunt balnea ignea sicut fumus, balnea aerea, sicut stufa ualent educendo multitudinem humiditatis, quibus theutonici plurimum utuntur. Et balnea aquea sicut thermæ, & receptio fumorum thermarum. Et ex sumptis est medicamen de asia, cuius sumatur drachmam unam cum uncia una, aut pluribus uini subtilis calidi, post cuius sumptionem bene pannis cooperiatur, & dormiat, & retentio anhelitus, & abstersio sudoris iuuat ad prouocandum sudorem. Item iuuat post sumptionem sudatiui si stufetur sub pannis aspergendo laterem calidum existentem prope ipsum in aliquo bacili, aut alio uase, sed aspergatur cum aqua decoctionis anethi, baccarum lauri, sulfuris, aut similia prouocantium sudorem. Quarto, euacuatur per uenas umbilicales ponendo uentosas super umbilico, & emplastra attrahentia, & dilatantia. Quinto per

per resolutionem insensibilem, sicut cum emplastris uentris superpositis sicut est factum ex stercore uaccino, & caprarum pascentium herbas siccas, quibus aliquid salis, & sulfuris addi potest. Item stercus caprarum mixtum cum urina infantum. Item stercus columbarum, bacce lauri, ireos, elleborus mixta cum praedictis stercorebus, & proprie cum urina camelorum, & equorum, & est forte. Item limacia contrita posita super uentrem, & dimissa donec exiccetur, similiter ostraca, & lapis pumex est mirabilis, & huiusmodi possunt misceri cum lixurio, & paucis aceti, sed caue cum huiusmodi admixturas in hydropse calida, ne hepar inflammetur. Quapropter huiusmodi non administrantur super regione hepatis, immo super regione hepatis dum haec fuerint applicetur ceruicem sandalinum, aut aliquod epithyma infrigidans. Emplastrum tamen Rafis est conueniens, & parum calefacit. Crura & coxae tumida similiter exiccantur cum spongiis infusis in lixurio facto ex cinere uitae, & spiritum caulium, & similia calefacientium, & exiccantium, quae spongiae calidae actu & optime expressae applicentur partibus tumidis cum bona ligatura, & solutione. Sexto, euacuatur aquositas in ascite cum uescicatoriis, quae sunt in uentre, aut in cruribus ubi est maior tumor cum maiori mollitie, & fieri possunt cum pede coruino contrito super loco stricte ligato, & sic retento per decem, aut duodecim horas. Ego uero communiter utor cantharidibus contritis permixtis cum fermento, cum aceto fortis, ita ut plurimum cantharidarum contingat locum, & ligentur cum bona strictione, & sic dimittantur per decem horas, aut circa, & illa ulceratio coheret ut aperta de tertio in tertium, & imponendo asphodillos mixtos cum cantharidibus. Caetera uero actualia, aut potentialia fiant in locis eisdem, quae penetrant cutem ueram, & remota escara conseruentur aperta per sexaginta dies ad quorum aperitionis conseruationem confert in ulcere tenere granum ciceris, aut ceram, & super ulcere tenere diachylon, & possunt fieri in pluribus locis uetris in parte inferiori in quibus sit maior tensio, & mollicies. Albucais uero cauterizat in circui uilicili cum quatuor cauteriis, similiter hepar, & splenem & stomachum, & dimittit ea aperta longo tempore, penetrat parum ultra cutem, & foramina sunt ad quantitatem ciceris. incisiones uero fiant in bursa testiculorum quando est plena aqua in ea parte in qua est aquositas, aut in ambabus, si fuerit in ambabus, & fiat cum lanceta foramen paruum, ita ut aqua residuo egrediatur. Et quandoque pungimus eam in pluribus locis cum acubus, ut aqua habeat resudationes plures, & si bursa non est plena aqua elaboretur, ut aqua fluat ad eam a uentre cum motibus corporis, & sternutationibus, si in ea ponatur seton esset praestantius. Si uero suprascripta non sufficiant ad curam, & cum magna institia fueris requisitus de extractione aquae per sectionem uentris praemissa prognosticatione de periculo mortis, patiente existente forti, non sene, neque habente tussim, nec fluxum, aut aliud accedens, quod sectionem impediat auctoritate Albucais, Haliab, & Auiceni. ipsum incide a parte anteriori sub umbilico per digitos si hydropis sit causa intestinorum, non quidem directe sub umbilico, ne incidantur musculi longitudinales, sed aliquantum lateraliter, si uero causa splenis incide a parte sinistra, si uero causa hepatis incide in parte dextra non quidem ex directo umbilici, sed infra per tres digitos, aut circa, & modus est, ut patiens sedeat, & sit minister post dorsum eius sustinens ipsum, & cum manibus aquam ad locum incisionis ducens, deinde tu pelle uentris trahere superius per spatium unius digiti, aut amplius & ibi cum rasorio paruo perfora usque ad locum uacuum faciendi foramen paruum, ita tamen, ut aqua exire possit, & tunc extracto modico de aqua, tanto, scilicet, quod uideas, quod possit exire, pellem descendere dimittas, ut claudat foramen, & diligenter liga ne aqua exire possit. Et postea aegrum cibum & in lecto reponere, postea quotidie semel in die pellem trahere superius, aegro sedente, aut iacente supino, & imposita cannula aquam extrahe paulatim quantum uirtus bene tolerat. Et melius apud Auiceni. est infra subsistere quam nimis euacuare, est enim ad omnem euacuationem aptus sequi casus uirtutis, & tandem aqua pro magna parte extracta, uulnus suae, & consolida. Quod si quid remaserit cum auxiliis dictis extrahatur, & in hoc tempore, attende confortationi uirtu-

tis, & rectificationi discrasiae membrorum naturalium, non enim hoc tempore opus est alia euacuatione, & hoc tempore sollicitus sis ne aqua inopinata egrediatur bene foramen obdurando. Nam iuxta aphorismum uigessimum septimum sextae particulae. Quicumque empyici, aut hydropici utuntur, aut inciduntur sanie, aut aqua multa fluente repente pereunt. Propterea semper postquam medicati sunt singulis debus taliter siue ut ut uulnus sit superius, & sit bene obstrictum. Sed in hypofarce materiam eradicamus tantum quatuor modis, scilicet per solutionem uentris, per urinam, per sudorem, & insensibiliter. Primus uero modus completur cum pilulis de hiera simplici, de rhabarbaro, de eupatorio, & fortiores sunt hiera composita Gal. hiera logodion, hiera diacolocynthis, electarium indum, & ubi phlegma esset aquosum pilula leues suprascriptae reformatae cum succo ireos essent praestantes, per urinam uero, & per sudorem eradicamus materiam cum dictis in ascite. Insensibiliter uero, & etiam per sudorem eradicamus faciendo ipsos stare in sole calido, regendo tamen caput, & faciem. Item sepeliendo in arena calida. Sed in tympanite similiter quatuor modis dictis in hypofarce materia eradicamus, per solutionem uentris cum leuiores ex medicinis dictis in hypofarce. Item cum pilulis alephaginis, & si inesset melancholia, quae in uentositatem conuerteretur, euacuatur cum senna, & epithymo, aut cum suprascriptis miscantur. Clysteria tamen de quibus statim agitur forte sunt efficaciora, & si forte coniungeretur tympanites cum ascite solutiuia suprascripta reformentur cum succo irreos. & similiter per urinam minoramus cum leuiores ex suprascriptis in hypofarce, sed per sudorem cum eisdem. Insensibiliter uero multis modis. Primo cum clysteribus carminantibus uentositatem, licet haec aliquando minorent materiam sensibilibus, sicut factis ex decoctione anethi, anisi carui, zameos, ruta, & similia cum qua decoctione possunt misceri 3. duae electarii de bacis lauri. Et si uideretur nimis calidum cum decoctione suprascripta ponatur ad bulliendum maluarum, blitis, matrum uolarum, ana M. i. aut quantum uidebitur & potest addi oleum rutaceum, aut de spica. Secundo, uenter uaporetur cum pannicio, & milio torrefactis, aut ungatur cum oleo rutaceo, aut de spica calido. Ventosa quoque latiorificia super uentrem ponantur. Item dentur medicamina uentositatem dissoluentia, sicut diacyminum, electarium de bacis lauri. Item collyria uentositatem carminantia, de quibus in colica, superponantur, exercitetur stomacho ieiuno, famem, & sitim patiantur, & uenter aliquando stomacho ieiuno cum panno aspero fricetur donec rubeat. Accidit uero corrigatur iuxta quintam intentionem secundum quod oportet. sitis quidem cum acibus in ore recentis, aut os colluendo & si non potest abstinere a potu, bibat aquas sublimationum cum syrupo acetofo, oxifacchara, & similibus, sed prohis recurre ad capitulum de siti. Sed deiectioni appetitus subueniatur cum acetosis appetitum excitantibus, & similibus quae egro placent, & proprie in principio mensae. Sed de prohibendum reciduationem iuxta ultimam intentionem obseruetur regimen suprascriptum, maxime quantum ad tres intentiones, scilicet regimen sex rerum, minorationem materiae, ne aliquando superflueret, sed cum leuibus, sed maxime attendatur ad confirmationem stomachi, & hepatis, & proprie cum cibis conuenientibus, tam proprietate, quam secundum qualitates manifestas. Et aliqui quibuldam electariis, aut confectionibus propriis, & sic est finis huius difficultis capituli.

De anatomia splenis.

Q Via Rafis hic agit de passionibus splenis iuxta consuetudinem est eius anatomia praemittenda. Splen est membrum instrumentale, mediocri quantitate figurae quadrangularis, in sinistro latere sub costis mendosis locatum, ex carne spongiosa, uenis, & arteriis multis, & crasis panniculo inuolvente compositum, dorso, & costis mendosis mediantibus panniculis orientibus a siphac alligatum, cum corde, cum diaphragmate, hepate, & mesenterio, zirbo, & stomacho colligatum, ad contra operandum cordi, & hepati, melancholiam, quae ab hepate, & sanguinem mundificandum, ipsumque pro fame excitanda ad os stomachi transmittendum finaliter ordinatum. Est quidem instrumentale propter causas dictas. Est figura quadrangularis fusi-

Io. Arculani Z 4 perius

perius crassior inferius subtilior in modum linguæ, locatur in latere sinistro sub costis mendosis, sed non ita alte sicut hepatis, componitur ex carne spongiosa, ut facile recipiat humorem melancholicum crassum, in cuius receptionem est ordinatus. Habet autem uenam magnam uenientem ad ipsum à uena portæ, à qua descendit unus ramus in medio transitus eius ad mesenterium ad ipsum nutriendum, deferens ad ipsum sanguinem aquosior, & humidior. postea quando ista uena approximatur spleni, iterum unus ramus ramificatur ab ea, qui uadit ad nutriendum partem inferiorem stomachi finistram, postea ueniens ad concavitatem splenis ramificatur in duos ramos inferiorem, & superiorem. inferior descendit ad nutriendum zirbum quantum ad partem finistram, sed superior transiens per concavitatem splenis emittit duos ramos, quorum primus peruenit ad partem superiorem finistram stomachi ad nutriendum. Alter uero circa orificium stomachi peruenit ad portandum melancholiam, quæ emulgeando profluit ad os stomachi ad excitandum appetitum. Quod uero ex hac uena remanet in splene ipsum nutrit. Ex quibus apparet splenem mediante hac uena colligari hepatis, mesenterio, zirbo, & stomacho, cui multum appropinquat secundum eius concavum. Et secundum conuexum costis, & diaphragmati.

Colligantiam autem habet cum corde per arterias, quæ ad ipsum ueniunt ab arteria aorti, quæ in dorso est infra diaphragma, à quibus arteriis stomachus multum calefit in latere sinistro, siue à splene merito istarum arteriarum, & hæc fuit una causa, quare arteriæ multæ, & magnæ ueniunt ad splenem. Et alia causa fuit, ut calore istarum arteriarum sanguis crassus, qui nutritur spleni, subtilietur, & digeratur, panniculus autem inuolvens ipsum, similiter panniculus suspendens ipsum cum dorso, & costis mendosis ortum habet à siphac. Tres autem fines in descriptione positi sunt satis noti. Ex quibus inferitur quod si splen non recipiat, & retineat melancholiam sufficienter, non potest debite caliditati hepatis, & cordis contrariari. Et est causa arefactionis cordis, & hepatis. Si uero superflue, ipsa præter modum infrigidat, imò propter superfluitatem melancholiam est aliquando causa hydropisis, & tremoris cordis. Item si non mundificet hepar, & sanguinem à melancholia est causa febrium, & apostematum melancholicorum, panni, lepræ, ictericæ nigrae, lentiginum nigrarum, elephantia, morphæ nigrae, uaricum, & melancholiarum, & similia. Si uero melancholiam receptam non expellat ad os stomachi deficit appetitus, & forte melancholia retenta splen intumescit, & apostematatur. Si uero ipsam superflue quantitatis perpellat ad os stomachi, & sit pontica est causa intensionis appetitus. Si uero nimis superflue expellat ad os stomachi, aut sit nimis acris quamuis in moderata quantitate est causa nauseæ, subuersionis, & uomitus. Et quandoque fluens ad intestina facit excoarctationem melancholicam mortiferam. Et ex istis apparet figura, quantitas, numerus, situs, substantia, colligantia, & operationes principales in quas ordinatur. Et apparet complexio est enim quo ad complexionem innatam calidæ, & humidæ complexionis, licet merito nutrimenti, & melancholiarum quam recipit sit frigidæ, & siccæ complexionis. Et consequenter apparet quas ægritudines potest pati, quia oppilationem, tumorem, & similia, & quæ ægritudines possint merito ipsius in humano corpore accidere. Item quod in actu practico pro resoluendis tumoribus eius mediocriter resoluta sunt applicanda, licet enim fortia competere ratione humoris. Nimum tamen substantiam eius mollem exterminarent, & exiccarent, & forte resolutis partibus subtilibus crassam petrificarent, & secundo, quod mollescantia, & incidentia debent cum resolutis partibus permisceri pro tumoribus, & oppilationibus eius curandis.

Sermo uniuersalis de ægritudinibus splenis.

Spleni accidunt omnes species ægritudinum simplicium & compositarum, scilicet mala complexio simplex, & composita, sine materia, & cum materia, mala compositio sicut oppilatio, solutio, continui apostematata, & tumores non apostematosi, tensio à uentofitate, & dolor. Harum causarum, signa, & prognostica sicut manifesta ex cap. sequenti.

Sed notandum primo, quod quando splen magnificatur extenuatur corpus, quia destruitur uirtus hepatis digestiua propter superfluum in frigidationem, quare minoratur sanguinis generatio. Amplius splen propter magnitudinem suam attrahit plurimum de sanguine hepatis, quare ipsum amplius debilitatur. Contra autem splenis extenuatio significando bonitatem hepatis, significat bonitatem humorum, sicut e contra, magnitudo eius significat humorum malitiam. Secundo sciendum, quod ægritudines splenis ducunt ad febres commixtas, sicut ipsæ quandoque ex eis generantur, generantur namque ex tertiana non pura, febribus pestilentialibus, & febribus compositis, sicut est hæmorrhæica, duplex tertiana, & similes, quæ quandoque sunt inordinatæ uagantes multatis humoribus per aduersionem in qualitatibus, quantitatibus, & formis, unde non seruant suos periodos, uerum continuata aduersione, conuersi in melancholiam, tandem faciunt quartanam, iuxta Hippoc. 3. prognost. febribus inordinatæ uagantibus, quartanæ sunt futuræ maxime circa autumnum, ægritudines itaque splenis, & febres huiusmodi sese mutuo fouent & augent, plurimæ itaque ægritudines splenis sunt autumnales, & faciunt colorem habentis eas decliuem ad citritatem, & nigredinem.

Tertio notandum, quod ægritudines splenis, quandoque augent appetitum cum sunt remissæ, quandoque destruant ipsum cum sunt intensæ. Et quædamque cogunt in fine digestionis ad euendum rem acetosam ex qua ebullit terra propter superfluum eius acredinem, & hæc res euomit non est nisi melancholia acris cum cibo ad acetosum corrupto permixta. Et propter hoc non sequitur dolor neque aliud nocuum notabile. Si enim dolor, aut aliud nocuum præfuit forte sanatur. Si uero non præfuit post hunc uomitum non sequitur.

Quarto notandum, quod urina sanguinea, id est, rubra, obscura, crassa, est bona in fine, id est, in processu ægritudinum splenis, quæ sunt à sanguine melancholico crasso. Et forte est crisis, & significat eam crisis, similiter urina crassa in qua est scæx, & uiscositas, similis uiscositati, id est, feci sanguinis, quæ est melancholia, est bona in ægritudinibus melancholicis magis puris significans eam crism, & ægritudinem quæ sequuntur eas. Signa malarum complexionum splenis. Calidam significat sitis, & inflammatio sentata in latere sinistro. Item fortitudo uirtutis attrahentis melancholiam, quia attrahit citius quam debet, id est, ante completam humorum generationem, & quia attrahit quod non debet, scilicet alios humores præter melancholiam, & inuenitur splen magis tumidus quam debet esse. Sed frigidam significat debilitas attractionis eius. Unde deficit spleni melancholia quam debet stomacho mittere & eius defectu sequitur casus appetitus, & iteratio fastidiosis satietatis propter duo. Primo, quia comedit sine appetitu, & quoties sumit cibum fastidit. Secundo, quia splen frigidus infrigidat stomachum unde crudificatur cibus in stomacho, & ex hoc sequitur fastidiosa satietas ex præsentia cibi crudi in stomacho. Itæ sequitur multitudo rugitus & eructationis, quia materia melancholica propter paucitatem caliditatis uentofatur. Et enim melancholia uentosa iuxta dicta superius. Item quia debilis caliditas stomachi facit cibum euaporare, & uentofari. Sed mala complexio sicca significatur per asperitatem, duriciem, & debilitatem corporis, crassitatem sanguinis, & uehementiam nigredinis corporis, & sanguinis. Sed humidam significat lenitas lateris finistri mollities corporis, & nigredo declinans ad albedinem plumbeam.

Prognosticum. Mala complexio in principio facile curatur, sed confirmata difficulter.

Cura huius est proxima curationi malæ complexionis hepatis. Unde intentiones quæ ibidè posite sunt huic capitulo accomodentur. Verum medicina splenis debent esse fortiores, & magis penetrantes, quia est membrum minus nobile, & magis in profundo positum. Et humor est crassior, & magis resistens. Acquiritur autem eis fortitudo per intensionem, & multitudinem formæ, penetratio autem per admixtionem aceti, & utraq; secum permiscendo aliqua uiscosa, & cum hoc propria sicut ammoniacum, ut uirtus non exaleat. Et hæc uera sunt, tamen de his quæ applicantur exterius, quæ de his quæ sumuntur interius. Sumpta enim interius, tam alterantia, quam euacuanti

tia magis distant à splene, quàm ab hepate. Nam oportet eas penetrare per hepar ad splenem, quare oportet eas esse fortiores, & penetrabiliores. Et humor est magis resistens digestionibus, & euacuationibus, in splene tamen uti debemus medicinis sibi propriis. Cappares enim, & scolopendria multum sibi sunt appropriata. Vnde. 13. therapeu. cap. penultimo, quale est pharmacum absinthium hepatis, tale spleni scolopendria. Ex frigidis autem est semen endiuiz, & portulacæ. Et si phlebotomia fuerit necessaria phlebotometur ad euacuandum multitudinem de basilica sinistra in brachio. Sed materia existente pauca, & uirtute debili, & ubi opus sit magis diuertere, phlebotometur saluatella. Et communiter fiat phlebotomia lata. In multitudine tamen superflua aliquando phlebotomantur saphenæ, & quando in causa esset retentio menstruum, & hamorrhoidarum. Phlebotomantur etiam aliquando quidem timore conuersionis materię ad caput, & existente magna plethoria. Sed de medicinis tam alteratibus, quàm euacuantibus uberius inferius agetur.

De dolore splenis. Cap. 100.

Quia Rasius indulgens breuitati facit solum unum capitulum inticulatum de dolore splenis, conabor omnes eius agitudines in hoc capitulum perstringere. Dolor splenis qui est tristis sensatio eiusdem in existens ei per panniculū non per carnem spongiosam eius est quintuplex, pungitiuus, perforatiuus, extensiuus, grauatiuus, & pulsatiuus. Inest enim ei dolor pulsatiuus magis quàm in hepate propter multitudinem, & magnitudinem arteriarum quæ sunt in ipso, & non in hepate. Causa immediata cuiusque doloris est mala complexio, aut solutio continui. Aut utraque simul sicut in aposte. eius. Tumor autem non apostemosus, siue sit humoralis, siue uentosus non est causa doloris immediata, sed solū mediante mala complexione, aut solutione continui sequente extensionem, similiter eius oppilatio. Mala autem complexio existens causa doloris eius potest esse calid, & frigid, & sic, sine materia. Sed cum materia potest esse cuiusque generis, sed secundum plurimū cum materia est melancholica, aut sanguinea. Raro cholerica aut phlegmatica. Huius autem malæ complexionis causæ quandoque sunt primitiue, sicut aliq, aut plures ex sex rebus non naturalibus, aut extraneis. Quandoque corporeæ sequitur enim dominium humorum qui sunt in ipso, aut eius oppilationem. Et quandoque fit, aut fouetur per communitatem, aut à toto, sicut in febribus, hydrope, lepra, & similibus, aut à membris particularibus, sicut hepate, matrice, & aliis. Apostemata splenis, quia sunt causa doloris eius, de ipsis erit sermo, & etiā de duritie, & tumore splenis, quæ sunt infra apostema.

Apostema splenis quantum ad quid nominis, & quid rei est satis ex dictis manifestū. Et differt à tumore & duritie non apostemosa per solutionem continui, quæ est in apostemate, & non in duritie & tumore non apostemoso. Nam in his materia continetur in porositatibus splenis non faciēs eorū solutionem, sed in apostemate in pluribus porositatibus solutis, propter crassitū, aut maiore multitudinē materię extendētis. & hoc est deterius, fit una concavitas in qua materia continetur.

Apostemata splenis dupliciter distinguuntur, scilicet penes materiam. Et sicut plurimum sunt melancholica dura, & et raro sunt mollia phlegmatica, & cholerica. Sanguinea uero sunt aliquando incidendo, sed plurimum ad duritiem permutantur, quoniam sanguis ad splenem ueniens est spissus. Secundo distinguuntur penes figuram. Nam figure eorū sunt quatuor, scilicet rotunda, aut ad rotunditatem tendens, secundum quatuor, scilicet tertia, longa crassa, quarta, longa subtilis. Et in prima sequitur maiorem multitudinem materię, quàm secunda, & tertia maiorem multitudinem, & crassitiem quàm quarta, & sunt duæ postremæ secundum figuram, & situm splenis. Et splenicus dicitur qui habet duritiem in splene suo, aut apostematosus, aut infra apostema ex quo infertur, non ex simili causa aliquem denominari splenicum, & hepaticum, nam hepaticus dicitur, qui habet agitudinem occultam in hepate suo modo superius exposito, sed splenicus dicitur, qui habet duritiem in splene suo.

Causæ apostematū & duritiē splenis, quædam sunt primitiue, sicut indebitum regimen sex rerum, ut puta aer crassus, & turbidus. Item uinum crassum, & reliqua cibaria multiplicantiā melancholiam, & sanguinem melancholicum.

Ex quibus causis fit, ut Ferrariæ multi sint spleneticī. Quædam sunt corporeæ, aut per essentiam, sicut debilitas expulsiuæ splenis, aut fortitudo attractiuæ eius. Item oppilatio uenarum per quam deferretur melancholia ad os stomachi, debilitas digestiue eius non debite subtiliantis, & digerentis nutritiū tum proprium potest esse in causa. Per communitatem uero aut à toto, sicut in febribus diuersis, & inordinate uagantibus, quæ multoties in quartanam mutantur. Item per communitatem à membris particularibus, sicut ab hepate propter caliditatem, aut frigiditatem superflua cum siccitate multiplicante melancholiam. Item per communitatem à matrice in retentione menstruum. Tumores splenis terminantur quintupliciter. Nam aut resoluuntur insensibiliter. Aut euacuantur sensibiliter per uomitum, urinam aut secessum. Aut indurantur sic perpetuo remanentia. Aut permurantur ad hepar, aut ad alia membra nobilia, aut ignobilia sicut ad cutem, & sicut apostemata difficilis suppurationis, & forte fit aliquando icteritia nigra. Aut maturantur, & postea erumpunt. Signa communia omni apostemati splenis sunt grauedo, magnitudo, aut dolor extensiuus communicans ulque ad diaphragma in latere sinistro, & quandoque cum magnificatur apostema ascendit dolor ulque ad furculam, & humerū sinistrum, propter communitatem furculæ cum diaphragmate, & humero sinistro. Secundo, quandoque facit anhelitum duplam secundum formam anhelitus fetus infantis, quoniam apostema impedit diaphragma ne uadat in motu anhelitus, quare stat subito propter lationem, deinde redit, & dum non est apostema magnum non comprimit diaphragma, nam communicatio splenis ad diaphragma minor est communicatione stomachi ad diaphragma, ut patet ex anatomia, sed stomachus non comprimit diaphragma nisi dum est multum plenus cibo, aut aliter multum extensus, ergo similiter splen non comprimit diaphragma nisi dum est multum tumidus. Ideo sensus aliquando comprehendit inflationem splenis. Et tamen anhelitus non comprimitur. Tercio, quandoque accidit ex apostemate splenis, quādo est in inferiori parte eius, ut subtilietur sanguis, quoniam splen mundificat sanguinem à fœce sua, scilicet melancholia, quæ est fœx sanguinis, & ru beant pedes, & genua patientis, quæ rubedo non ita accideret si apostema esset in superiori parte splenis, eo quod com primeret uiam per quam deferretur melancholia ad os stomachi. Vnde sanguis non posset ita depurari à fœce sua, & accidit extremitati nasi, & auris spleneticis, ut resplendant propter causam superscriptam.

Signa autem distinctiua inter apostema splenis, & tensionem à uentositate sunt quatuor. Primum, quia in inflatione non est grauitas. Secundum quod incessus, & exercitium facit splenem apostematatum dolere, sed dolorem sedat in inflatione uentositatem resoluendo. Tercium, quia in inflatione adest rugitus, qui non est in aposte. etiam eructatio per quam alleuiatur. Quartum, quia in inflatione non est febris quæ est in apostemate. Sed tumor non apostemosus differt ab apostemoso per carentiam febris continuz, & quia omnia eius accidentia sunt leuiora.

Signa autem specierum apostematatum splenis distincta secundum humorum uarietatem sunt hæc, nam apostemata calida præter accidentia dicta communia omnia apostemati communicant in quatuor, scilicet in inflatione sensata, in splene, siti, & febre, & urinx tintura. Verum in eo quod est cholericum, inflammatio est uehemētior, sitis fortior & grauedo minor. Et dolor est magis pungitiuus quàm extensiuus, & color cum rubedine tendit in citrinitatem, sed in sanguineo econtra. Sed in apostematibus duris, maligna fit anima, ex cogitatione radiosa commouetur tristitia, & uarietas, scilicet mentis, non tamen sit hic uarietas, & commixtio sensus nisi materia melancholica plurimum dominante, quia materia non mouetur ad caput. Sed fit commixtio sensus per communitatem splenis ad diaphragma, & diaphragmatis ad cerebrum. Et quandoque denigratur lingua in duritie splenis, & sentitur durities absque rugitu cum premitur nisi aggregetur eius inflatio, &

non est cum ea febris continua, imò quandoque est interpolata, & proprie quartana. Verum in apostemate, & proprie magno est febris continua forte habens excrecentias de quarto in quartum. Et quandoque cum his duritiis multiplicatur ulcera crurium, & corroduntur dentes, & gingivæ propter crassitudinem sanguinis, qui descendit ad crura ipsa ulcerans, & corruptionem uaporis, qui ascendit in omnes partes gingivarum, & dentium. Et quādoque fit in ulceribus crurium crisis ipsius, pluribus namque eorum, qui splenem habet, cum accidant exercitia laboriosa, attrahitur materia ad crura, & euadunt, & secundum plurimum bothor quædam dicta ab Aui. anithan antecedunt illa. Urina autem splenetici est sicut sani secundum plurimum, sed cum exercet se ipsum subtiliatur melancholia, & permiscetur cum urina, & fit nigra, quæ nigredo non est merito renum, nam si esset causa renum, esset multoties non precedente exercitio, cum oporteat urinam transire per renes, & plurima phlebotomia apostemat splenem euacuando subtili, crasso remanente, propterea bonum est, ut in regimine splenetici fiat phlebotomia lata, & autumnus est inimicus splenetici. Signa uero duritiei splenis sequentis apostema calidum sumuntur ex accidentibus apostematis calidis, quæ præcesserunt, & accidentibus duritiei quæ secuta est. Signa autem apostematum phlegmaticorum sunt lenitas tactus: albedo coloris tendens ad nigredinem cum reliquis signis apostematum eius. Signa uero apostematum splenis distinctorum secundum figuram sumuntur ex ipsa figura.

Prognostica. Primum, si spleneticus inuenit dolorē interescum in ipso splene est maior species salutis, significatur enim melancholia non esse ualde crassam, ita ut prius membrum sensu faciendo sepius purum. Secundum, si acciderit fluxus uentris cum sanguine aliquādo bonum: forte erit crisis eius. Quod si perseverauerit aduenit ei lubricitas hydropica, & morietur. Tertium, qui habet catarrhum non habet splenem, nam catarrhus significat dominium humiditatis cum quo non multiplicatur melancholia. Quartum sumptum ex libro Hippocratis, habens dolorē in splene suo cum fluit per uentrem sanguis rubeus significans magnam compassionem hepatis spleni, & apparent in eo ulcera alba non dolorosa, eo quod non participant acuitate moritur in die secundo, significatur enim magna debilitas hepatis, & totius propter euacuationem boni sanguinis, & remanentiam malarum materierum frigidarum, ex quibus corpus non est aptum nutriri, quarum pars aliqua symptomatice expellitur ad crura ulcerans illa. Si uero non moritur, cadit appetitus propter multam calidi naturalis diminutionem. Quintum, quandoque terminatur apostemata splenis, fluxus sanguinis narium, & proprie ex latere sinistro, & apostematibus apud aures difficilis suppurationis, & apertionis propter crassitatem materie. Sextum, laudabilior urina eorum est crassa sanguinea, & urina in qua est foex uiscosa significat sanitatem splenis, & destructionem eius, & cum in urina febricitantis habentis splenem apparuerit, sicut suspensio sanguinis, id est, hypostasis sanguinea à sanguine melancholico destruitur splen eius, id est, egritudo eius. Septimum, apostema hepatis permutari ad apostema splenis est ualde bonum, & e contrario ualde malum. Octauum, & multoties confortatur splen subito per seipsum, aut propter istud quod confortat ipsum, & præualeat super totum istud, quod est in ipso de materia mala, & solutione educit eam seculentam, sicut foex oliuarum, & significatur quod est ex splene, & non ex hepate, quia splen habet eius ægritudinem, non autem hepar. Item deumitio splenis post hanc euacuationem. Nonum, uehementis appetitus sequens splenem est ualde melior, quam eius destructio sequens multitudinem melancholiz, aut malitiam.

Cura apostematum splenis exigit triplex regimen. Primum, debetur causæ antecedenti complendum euacuatione, & diuersione. Secundum, causæ coniunctæ complendum repercussione in principio. In augmento repercussione mixta resolutioni. In statu, & declinatione sola resolutione. Et hoc si tendat in uiam resolutionis. Si uero in uiam maturationis adiungetur. Tertiū regimen, est accidentium correctio. Prima intentio, scilicet euacuatio completur secundum plurimum in principio cum phlebotomia, quæ materia existente

multa proprie dominante sanguine communiter faciēda est ex basilica dextra, & hauriantur. 6. 3. sang. aut circa, postea si expedierit fiat ex saluarella sinistra, de qua dicit Aui. debere dimitti per se cōstringi, si cōstringitur ante casum uirtutis. Si tamen in causa esset retentio mēstruorum, aut sanguinis, hæc morrhoidalis consueti fluere præmittatur phlebotomia salphenarum, deinde phlebotometur basilica sinistra, aut saluarella sinistra. Communiter tamen sufficit phlebotomia basilicæ, aut saluellæ sinistra. Rasis tamen prælegit phlebotomiam saluellæ sinistra, & fiat foramen latum. Et si uenter non est lenis, præmittatur ante phlebotomiam lenitio uentris scilicet cum clysteri. Postea euacuentur alii humores secundum exigentiam, communiter præmittendo digestionē, quæ materia existente calida perficiatur cum hoc. R. syrapi acetosi simplici. 3. i. iulep. ros. 3. s. aquæ decoct. infrascriptæ. 3. 3. misce. R. sem. portul. sem. endi. ana. 3. s. & tamarisci, & scolopendriæ. an. drach. i. bul. in. i. lib. aquæ ad consumptionem medietatis, & coletur. Sed Ras. dat trochiscos de agnocasto cum syrupo acetoso, & sunt præstantes. Syrupus Gerardi de Solo. R. corticum radicum capparis, mediani corticis tamarisci, geniste, an. 3. i. endiuia, scariola, portulacæ, scolopendriæ, capil. uene. recentium, ana. M. quatuor sem. communium frigidorum mundatorum, sem. portulac. sem. apii, sem. brusci, sem. asparagi, ana. unc. i. liquiritiæ ratiæ, uuarum passula. enucleatarū, ana. unc. i. mellis electi quartam unam, sacchari quartas tres, temperentur cum aceto per noctem, & fiat syrupus clarificatus usque ad quartas quinque, sed hoc magis uidelicet in materia mixta. Solutium sit huiusmodi. R. tamarisci foliorum, florum boraginis, florum buglossæ, unc. s. passularum mundatarum ab arillis, drach. 6. anisorum, drach. i. polypodii, epithymi, ana. unc. s. bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad consumptionem medietatis, & coletur, quæ decoctio colata trium 3. misceatur cum drach. i. senæ, & calida exhibeat in potu debita seruata custodia, uel cum hac distemperentur diasenæ, drach. 3. hamech. drach. i. & calida exhibeatur. Item possunt fieri pilulæ ex aloë. 3. s. senæ. zing. gran. 2. quæ reformentur cum electario hamech, & sunt faciles. Si uero apostema pedit à materia frigida absque febre detur hoc digestium. R. syrup. de epithymo, oximellis compositi, ana. unc. i. aquæ scolopendriæ. 3. 3. misce. Aliud ex inuentione propria quo communiter utor, est huiusmodi. R. corticum radicum capparis, scolopendriæ, tamarisci, sem. agni casti ana. 3. s. passula. 3. i. epithymi, drach. 6. bulliant in 3. lib. aquæ ad consumptionem medietatis, sed epithymum ponatur ad bulliendum in fine, quæ decoctio colata cum bona expressione misceatur cum syrupo de epithymo, & oximellis simplicis, ana. 3. 3. & clarificetur. Materia etiam existente digesta, & pro parte minorata melius est oximel compositum, & Gerardus de Solo ponit digestium longe compositionis huic proposito deferuiens. Ego tamen existimo una cum principe, quinto casu. istarum medicinarum esse melius plurimo earum, licet oppositum senserit Auenzoar, & Auer. Solutium sit diasenæ de quo datur. 3. i. distemperata cum aliqua ex decoctionibus supra scriptis. Ex pilulis conueniunt indæ, pilulæ de lapide lazuli, pilulæ de lapide armeno, ex hieris conueniunt hiera rufini, hiera diacolocynthidos, & similes. Et si peccet phlegma conuenit electarium indum. Et si humores sint mixti, solutua sint mixta, aut detur solutium illos simul euacuans, & in humoribus adultis uidelicet confectio hamech. Item pilulæ de fumoterra, & melius est iterare solutium quam dare solutium multū una uice euacuans. Diuersio tamen iuxta secundam intentionem completur cum clysteribus factis ex decoctionibus eorum, quæ respiciunt splenem. Et prouocatio hæmorrhoidarum est conueniens diuersum. Item conueniunt alię diuersiones communes, de quibus sæpe dictum est, & hæc dux intentiones in toto processu morbi sunt exequendæ, ut semper materia minoretur, est enim difficilis ductio. Sed prima intentio secundi regiminis, scilicet repercussio maxime conuenit in apostematibus calidis in principio. Et tutius hæc scriptica ad ministrantur in apostematibus splenis quam hepatis. Primum, quia uia per quam recipit splen est latior, scilicet ramus uenæ portæ. Secundo, quia splen est membrum ignobilius quam hepar. Tercio, quia in eo non sunt tot meatus angusti, do

de quorum oppilatione timeamus, quot sunt in hepate. Et hoc maxime conueniunt in principio administranda, tã interius, quã exterius, sicut in hepate dictũ fuit. Et sunt diuersificanda secundum materiam, apostemati tamen duro non conueniunt huiusmodi stiptica. Vnde in materia calida conuenit iulep rosaceum, aut frup. acetosus simplex cum aqua decoctionis, sem. endiuiz, & portulacæ, & capillorum ueneris, sed in materia frigida mel rosatum cum oximel. simplici, & aqua capilli uene. & hæc simul digerunt, & repercutiunt. Exterius autem applicanda sunt, oleum rosa. cum tertia parte aceti in calida, sed in frigida his potest addi parũ olei mastichini, postea in processu his admisceatur oleum de cappariis. Tandem deueniendum est ad hanc unctionem qua com munitur utor. R. olei de cappariis, drach. 6. medullæ vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti, ana. 3. 2. aceti modicum, ceræ quantum sufficit, & est mihi experta. Et nota quod acetum est conueniens ferè in omni materia, & in toto curæ processu saltem cum aliis mixtum, imò Rasis in præfenti cap. applicat ipsum solum in materia calida, iuuat enim in principio ad repercussionem in omni materia in augmento ad repercussionem, & resolutionem, & ad faciem dum uirtutes aliarum medicinarum penetrare, sed deinceps iuuat ad resolutionem, mollificationem, & ad faciendum uirtutes aliarum medicinarum penetrare, acetum enim mollificat apostemata dura, & proprie uapor eius. Similiter sumptum interius conuenit, ut plurimum incidens humores crassos, & faciens uirtutes aliarum medicinarum penetrare, indigemus enim propter crassitatem, & uiscosam humorem in toto curæ processu incisione, & absterisione. Ex mirabilibus autem ad resolutionem huiusmodi apostematum, est emplastrum de fermento Mesue mihi expertum, cuius est hæc descriptio. R. ammoniaci, bdellii, sicum siccarum, ana. 3. s. fermenti in aceto salito dissoluti, 3. 2. bdellium, & ammoniacum in aceto dissoluantur, & misceantur simul cum sicubus, & addatur soliorũ rutæ, tamarisci, salis natri, an. 3. 1. & misce bene incorporado, & applicetur, & proprie post aliqualem mollificationem, & ad eradicationem materiæ, cum cætera non contulerint ualet unum, aut plura cauteria actualia, aut potentialia penetrantia cutem, quæ per tres, aut quatuor menses conferuntur aperta. Si uero apostema tendat in maturatorem adiuuetur cum diachylone, & similibus, sed attende maturantia esse diuersificanda secundum diuersitatem materierum. In materiis. n. calidis conuenit maluaifcus, farina sem. lini, scenugræci, ficus pingues, oleum sesaminum, & similia parum calida, sed in frigidis magis calida. Vnde his addantur radices ieros coctæ, & præparate, & materia existente melancholica ponantur multum mollificantia, non tamen multum calida, sicut medullæ, mucillagines, maluaifcus, foenugræci, sem. lini, & similia, deinde studendum est eruptioni cum moribus, & addendo suprascriptis emplastris cepe narcissi coctum, q. optime iuuat ad erumpendum, & post eruptionem intendendum est mundificationi ulcers & tandem consolidati, sicut dictum fuit in apostematibus renũ. & si eruptio fieret ad uentrem, & sanies colligeretur in inguine sinistro, sicut aliquando uidit, studendum est in eius resolutione. Quæ si resolutioni nõ obediunt extrahatur locum perforado. Accidantia uero iuxta primam intentionem tertii regiminis corrigantur secundum quod oportet. Præcipue dolor à cuius sedatione interdum præ magnitudine sua coacte oportet incipere cum unctionibus, fomentis, sacculis, emplastris, uescis, & similibus semper utendo propriis. Et si anodina sufficiunt bene est, si uero non, transeundum est ad stupefacientia, tam sumpta, quã applicata. Regimen autem sex rerum non naturalium tendat in contrarium discrasie, & humoris facientis apostema. Sed ut plurimum diæta debet esse tenuis in principio ad prohibendum augmentum apostematis, sed cum apostema, & huiusmodi dispositione melancholicæ prolongantur, regimen debet esse impinguium non oppilans, neque incrassans sanguinem ut minoretur melancholia. Vnde unum sit subtile album unius anni tamen pauciferum, aut multæ uentositatis secundum exigentiam, & panis bene conditionatus non azimus, aut autopyrus. Multus potus aquæ coiter uitandus est, & sit aqua bene conditionata, sicut aqua pluuialis destillata per arenã. Similiter eligantur

carnes pingues boni chimi, & elix. Quæ conueniunt mollia non indurata. Et pro salata utatur capparis, aut endiuia, aut cichorea cocta, lupulis, asparagis, & similibus, & cõdiantur cū aceto, passulæ conueniunt, uiterur caseus, & omne lac præter lac camelarũ, quia apud Auic. i. aperitiuũ, siue propter paucitatem, siue à proprietate. Vnde secundo cañ. confert pluribus ægritudinibus hepatis, & splenis, & reliquũ regimen ordinatur in contrarium humoris, & discrasie. Et nota quod sunt quædam conferentia à proprietate quibus frequenter utendum est, tam in regimine cibali, quã medicinali, sicut splen asini, aut pulli equi ambo exiccati, & puluerizati dati in quantitate, drach. 1. uel plus cū uino subtili aromatico à proprietate ualet mirabiliter. Itẽ nespertilio pinguis, & decolatus, & exiccatus in furno, in uase uitreo, & puluerizatus exhibitus quantitate trium. 3. cū uino, aut aceto est curatio experta. Item ponatur folia, & uirgulta tamarisci ad bulliendũ in mu sto, aut ad decoquendum in ferculis suis, & ita possent poni reliqua à proprietate respicientia splenẽ, sicut scolopendria, capparis, capillus ueneris, rubea, acorus, bacchara, &c.

De oppilatione splenis.

Quadoq; oppilatur uia per quam splen recipit melancholiam. Cuius signum, quia splen nõ est tumidus tumore ab humore proueniẽte, imò potius extenuatur. Quandoq; oppilatur uia per quã mittitur melancholia ad os stomachi. Cuius signũ, quia splen est tumidus cum recipiat melancholiam, & non expellat, neq; fames excitatur sicut consueuit. Cuius oppilationis causa quicquid est uentositatis, quadoq; est apostema, quicquid humores multi crassi, aut uiscoli absq; apostemate. Signa uentositatis sunt extensio uehemens cum lenitate. Sed apostemata sunt signa apostematis, de quibus. Sed oppilationes aliæ sunt cum grauedine absq; signis apostematis. Curationes sunt illæ eadem, quæ sunt fortes ex curationibus oppilationum hepatis, de quibus in proprio cap. Sed sunt magis proprie contra humores melancholicos.

De inflatione splenis.

Inflatio splenis est tensio, & eminentia eius à uentositate. Cuius signa sunt tensio, & eminentia quæ cedit comprimenti, sed subito reuertitur, sicut in uescica plena uentro, & non est grauitas, & durities solida, sicut in apostematibus, & quandoque cum premitur sentitur rugitus. Cura inflationis splenis perficitur cū eiusdem medicinis quibus curatur durities, siue tumor non apostemosus splenis. Indiget enim aperitiuis, absterisuiis, & resolutiuis cum uirtute stiptica maiori, quã in duritie splenis, quoniam materia uentosa est leuis de cuius restrictione parum timemus. Et cū hoc stipticitas facit ad confortationem splenis, qui confortatus melius resoluit uentositatem minusq; eam recipit, aut materiam eius. Medicinæ autem magis conuenientes sunt, sicut agnus castus, cyminum, ruta, semẽ eius, ameos, & his similia, cum quibus decoctis in aqua, aut uino subtili, aut in utroque potest splen fomentari. Quibus etiam aliquid acuti aceti addi potest, & ex eisdem possunt fieri unguenta cū oleo de cappariis, de ruta, de spica, uino subtili, & pauco aceti faciendo bullire olea cum uino, & aceto ad consumptionem uini & aceti, postea addendo ceram, & pulueres, nec hic mollificantibus opus est, sicut in duritie. Et inuatur multum ex positione uentosarum ignitarum super splene, hæc tamen faciendæ sunt præmissa euacuatione cum his quæ dicta sunt.

Et oportet, ut saniem toleret, & patiat cibum, & abstinat ab aqua quantum potest, & bibat uinum subtile anti quum, & non dormiat immediate post cibum, sed tardet donec extensio stomachi sedata est. Quod si extensionem dolorosam senserit comprimat super ipsam, & ingenietur ad egestionem, & postea dormiat, & utatur trochiscis de cappariis, trochiscis de agno casto fomentetur splen stomacho ieiuno cum fileris infusus in aceto decoctionis corticum radicum capparis, sulfuris, tamarisci, scolopendria, semine agni casti, nucis, cupressi, & rutæ. Et Rasis in textu ponit medicinas excellentes ad hanc intentionem. Tu autem intere est uti medicinis minus calidis cum adest febris, & magis calidis in eius absentia. Et ex his tãdem patet cura doloris splenis, de quo intitulatũ est capitulum Rasis. Nã dolor sequitur malam complexionem, aut solutam cõtinuitatem, aut humorem, aut oppilationem, aut inflationem, quorum omnium

omnium cura præcessit. Ergo cū cura doloris sit triplex, una per remotionem causæ, secunda per anodina, tertia per stupefacientia. Prima iam manifesta est. Nam pender ex cura egritudinum, quæ sunt causa doloris, quarum cura iam absoluta est. Quod si forte dolor non daret inducias sui magnitudine, ut cura regulari procedere non possis, tentetur itatim cura cum anodinis, sicut floribus chamæmillæ, meliloti, aneti, seminis lini, fenugræci, althææ, parietaria, quibus quædam propria addantur, sicut scolopendria, tamariscus, & similia faciendū ex his unctiones emplastra, facculos, fomenta, & similia. Quibus si non alleuiatur procedatur ad stupefacientia sumpta, aut applicita, iuxta tamen cum his, quæ appropriantur spleni.

Si cum dolore splenis fuerit calor, & urina rubedo, & febris; æger t ex his trochiscis sumat. Trochisci de agno casto. Recipe seminis agni casti, seminis tamarisci amborum, ana. drach. 10. seminis endiuie, seminis portulacæ amborum, ana. drachm. 5. ex his fiant trochisci, de quibus detur quotidie unus cum syrupo aceto. de saccharo cuius pondus sit drach. 3. Aeger uero si repletus fuerit; ex saluarella, quæ est in sinistra manu, phlebotometur. Splen quoque ex frustro filitri aceto calido infusus embrocetur, & obferuetur a rebus dulcibus, & cibis crassis.

Hoc capitulum de dolore splenis diuiditur in tres partes. In prima agit de dolore splenis à causa calida. In secunda à causa frigida materiali. In tertia agit de ipso pendente à uentositate, secunda ibi. Quod si cum prædicta ægritudine, tertia ibi. Si autem splen tensus fuerit, prima in duas. In prima ponit signa doloris splenis à causa calida. In secunda curam: secunda ibi. Aeger. Primum signum est calor sensatus in splene, & ex præsentia materiæ calidæ contentæ in splene causantis malani complexionem diuersam. Secundum est rubedo urinae ex parte materiæ calidæ mixta cum urina. Tertium est febris putrida ex materiæ putrente in splene ad cor effluuantes, aut ephimera pendens à calefacto esse spirituum propter dolorem, aut materiæ caliditatem, hæc autem febris non ita est apta pendere à materiæ frigida. Hic ponit quatuor auxilia pro cura huius doloris à causa calida. Primum est trochisci de agno casto, quorum est hæc compositio, R. seminis agni casti, seminis tamarisci calidorum, & sicce. ana. 3. 10. seminis endiuie, seminis portulacæ, frigidorum & humid. ana. 3. 5. Ex his puluerizatis fiant trochisci cū aceto, aut syrupo acer. ex quibus quotidie unus trium. 3. detur cum syrupo acetoso de saccharo, & potest addi aqua endiuie in infusionis tamarisci, ut sint potabiles, infirigidant enim, materiæ subtiliant, & confortant. Secundū auxilium est phlebotomia saluellæ sinistræ ad minorandum materiæ, tam antecedentem, quam coniunctam, & fiat foramen laeum, ut humor crassus possit exire, ab hac tamen prius est inchoandum, & similiter ab alijs euacuationibus si opus fuerit. Tertium est embrocatio, siue fomentum regionis splenis ex filitro infuso in aceto calido a cuto, infirigidat enim, incidit, & resoluit. Quartum est regimen in cibo & potu, prohibens à comestione rerum dulcium ne humor cholericus multiplicetur, & à rebus crassis, ne multiplicetur sanguis crassus.

S C H O L I A.

Aeger ex his trochiscis sumat prius per clysteres lenito uentre, uentriculo, ac uis communibus leuiter purgato. Ex saluella phlebotometur. Icto corpore è sanguine repleto. Fiat sanguinis missio primum ex uena basilica dextra deinde ex saluella sinistra, sed superante humore crasso, qui difficile per phlebotomiam educitur, sanguis non est extrahendus.

Quod si cum prædicta ægritudine non fuerit calor, ægro trochisci de capparis dandi sunt. Recipe corticis radicis capparis agni casti, amborum, ana. drach. 10. scolopend. drach. 7. aristol. longo foliorum rutæ, sem. nasturtij, acori, nigellæ, omnium, ana. drach. 3. ammoniaci, drach. 3. ammoniacum in aceto dissoluatur, ex quo cetera conficiantur, & informetur, ex his trochisci ponderantes, drach. 2. ex quibus unus cum syrupo acetoso, de melle, & apozemate, de radicibus in potu sumatur.

Hic curans dolorem à causa materiali frigida dicit. Quod si cum prædicta ægritudine non fuerit calor cuius absentia significat materiæ esse frigidam simul cum absentia febris, & tinctura urinae, dentur trochisci de capparibus. R. corticis radicis capparorum, sem. agni casti, ana. 3. 10. scolopendria 3. 8. aristol. longo foliorum rutæ, sem. nasturtij, acori, nigellæ, ana. 3. 3. ammoniaci. 3. 3. dissoluatur ammoniacum in aceto ex quo cetera puluerizata conficiantur in forma trochiscorum, quorum quilibet ponderet. 3. 2. Et usus eorum est, ut unus quotidie potetur cum oximelle simplici, aut cum composito. Et cum decoctione radicum, sunt enim omnia componentia calida præter acetum, & ex quibus fit medicina subtilitativa, incisiva, absterfiva propria in splene. Quæ tamē administranda sunt post euacuationem.

Si autem splen tensus fuerit, & cum premitur auditur sub eo rugitus, ex prædictis trochiscis cum apozemate de radicibus est dandum. Et uinum uetus tribuendum, & potus aqua minoretur quanto plus possibile fuerit.

Emplastrum ad duritiem & uentositatem quæ est sub splene, faciens. Recipe foliorum rutæ, drach. 1. baurach, mæstria sicce. amborum, ana. drach. 3. ammoniaci, drach. 7. ammoniacum in uino ueteri dissoluatur ex quo cetera conficiantur, & fiat ex eis emplastrum quod loco superponatur.

Hic curat dolorem splenis à uentositate dicens, quod si tensus fuerit, scilicet sine grauitate, & cum premitur auditur rugitus ex motu uentositatis. Ex prædictis trochiscis dandum est, ut supra, & potest uinum uetus, & minoretur potus aquæ. Deinde ponit emplastrum contra duritiem, & uentositatem splenis. R. foliorum rutæ proprie in resolutionem uentositatis, baurach loco cuius accipimus sal nitrum amborum, ana. drach. 3. ammoniaci, drach. 7. ammoniacum in uino ueteri dissoluatur ex quo cetera conficiantur, & fiat emplastrum quod spleni superponatur, resoluit enim uentositatem & huius morem. Et sic est finis.

De anatomia intestinorum. Cap. 101.

Antū est in præcedentibus de ægritudinibus splenis hic agendum est de passionibus intestinorum de quibus ab Auic. agitur in 1. 6. Fen. tertii. Et iuxta consuetudinem est præmittenda anatomia intestinorum. Sicut enim intestina descriptiue membra longa, rotunda, concaua, numero sex, plures habentia reuolutiones, superius cum orificio fundi stomachi, inferius ad anum terminantia, in utero inferiore locata, cum dorso mediante mesenterio ligata, ex duabus tunicis cum uillis longitudinalibus, & transversalibus, uenis, nervis, & arteriis, & pinguedine composita, ad complendum digestionem primam, eiusque superfluitates expellendum finaliter ordinata. Sunt autem intestina adeo longa, ut omnia simul extensa sint communiter nouem cubitorum. Rotunda, quia hæc figura est capacissima, & à nocuementis magis tuta. Concaua, ad continendum chilum, & superfluitates eius. Sunt autem numero sex, plures habentia reuolutiones, nam si fuisset unum intestinum solum, & rectū oportuisset hominem esse in continua comestione, & ferè continua assellatione, quorum primum impediuisset hominem à negociis in uita necessariis, secundum autem fuisset in decorum, & molestum. Propterea Deus sapientissimus prouidens humanæ necessitati, ordinauit, ut essent plurima multitudo habentia reuolutiones, ut quod digestum est in stomacho non cito descenderet, sed per meseraicas uenientes à uena portæ ad intestina paulatim ab hepate fugatur. unde illud quod effugit primam aciem meseraicarum, cum meseraicæ non attrahant nisi illud quod peruenit ad cōtractum superficiem intrinsecæ intestinorum, attrahitur per meseraicas uenientes ad alias reuolutiones intestinorum, quia quod una uice est occultum, fit postea manifestum orificiis uenarum, donec totum conueniens pro nutrimento attrahatur, reliquum tantum superfluum, & foex expellatur, per meseraicas enim uenientes ad stomachum parum quid attrahitur, scilicet illud tantum quod contingunt, & satis remissa, & sunt magis deputatæ ad deferendum sanguinem ad stomachum, ipsum nutriturum quam ad deferendum chilum ad hepar, ut lenit Gal. 4. de utilitate particularum, cui sententiæ conuersus est Auic.

Auic. 1. 6. tertiū. Primum autem intestinū quod uocatur duodenum, eo quod habeat longitudinem 12. digitorum coniunctorum, incipit ab orificio fundi stomachi quod dicitur pylorū, id est, portenarium. est multum subtile habet concauitatem angustam, proportionatam orificio à quo sumpsit initium, & est eius concauitas minor quam sit concauitas meri, cum per illud debeant transire res crassæ nōdum digestæ, & p hoc res in stomacho iam prædigestæ, & eliquatæ. Secundo, quia ad descensum eius quod prædigestum est ad intestina cōcurrunt expulsiua stomachi, & attractiua intestinorum simul attractentium chilum, & fœcem, in qua uoluptuantur sicut uescia in urina, & Kistis in felle. 3. de uirtutibus naturalib. Sed ad attrahendum cibum ad stomachum solum concurrunt attractiua stomachi & meri, & nulla expulsiua nisi quædam expulsiua meri, quæ est partim naturalis, & partim uoluntaria, & ad finem huius terminatur porus felleus deferens choleram ad intestina. Huic continuitati continuum est secundum intestinum jejunum sic dictum, quia semper uacuum, & inanitum reperitur propter tria, primum, quia id quod est conueniens ex chilo ad ipsum perueniens facile ad hepar attrahitur propter multitudinem meseraicarū ad hoc intestinum descendendum magis, quam ad aliquod aliud respectu suæ quantitatē, & post ipsum plures in duodeno reperiuntur.

Secunda causa suæ inanitionis est multitudo cholæræ puræ ad ipsum uenientis, & lauantis. Tertia, quia parū habet obliquitatis in comparatione ad sequentia. Est etiam satis breue non multum longius duodeno, & hoc est illud intestinum, de cuius excoriatione maxime timetur in fluxu dysenterico, & quod maxime extenuatur, & exsiccat in ægreditudinibus acutis. Deinde tertio sequitur ileon intestinum ualde longum plures habens reuolutiones, nunc ad dextram, nunc ad sinistram & posterius, & dicitur ileo, quia locatū est in ileis.

Et ab hoc sumpsit nomen falsio iliaca, siue ileos, aliter dictum miserere, dolor existens intensissimus perducens ad uomitum fecem, & ad mortem in septem diebus. Et ad hoc intestinum plures descendunt meseraicæ quàm ad aliquod aliud cum sit cæteris longius. Et clystera imposita communiter non transeunt hoc intestinum, & hæc tria sunt gracilia, quia subtilia sunt, & satis tenuis substantiæ parum habetia de pinguedine, & mucillaginofitate, in quibus solutio continui à quacunque causa prouenerit est multum timenda. Et in his tribus gracilibus uiget magis uirtus digestiua, quàm in crassiss, non quidem dans formam chilo, sed per confectionem, & complementum digestionis, forma enim datur chilo per uirtutem digestiuam stomachi, in monoculo tamē magis uiget uirtus digestiua quàm in cæteris crassiss. Post ileon sequitur sacculus. Primum ex crassiss, sic dictum, quia est pendens in modum sacculi, aliter dictum monoculus, quia non habet aperturam nisi unum orificium, licet in ueritate sit necessarium habere duos, unum per quod attrahat à superioribus, aliud per quod attractum descendat ad inferiora. Sunt tamen hæc orificia adeo uicina, ut unicum æstimetur. Hoc autem intestinum est satis breue locatum infra renes magis posterius quàm antierius, & magis dextrorsum, quàm sinistrorsum, huius autem fines sunt multi. Primus, ut illud quod descendit in hoc tanquam in sacculo diu retineatur, ut complete digeri possit, quod effugit digestionem stomachi. Et ideo locatur satis iuxta hepar, ut ab eo uirtutem digestiuam acquirat, & hoc se habet in comparatione ad duo intestina sequentia, sicut stomachus ad tria præcedentia, neque hoc factū est principaliter, ut meseraicæ fugant ab eo, cum pauciores meseraicæ ad hoc ueniant, quàm ad quodcūq; aliud. Secundus finis est, ut fœx incipiat in isto acquirere formam fœcis manifestæ, licet in ueritate forma substantialis fœcis inducatur in materia fœcis in stomacho. Nam per uirtutem digestiuam stomachi corrumpitur forma cibi in stomacho, ergo per eandem debet induci in materiam eius alia forma. Et non in totam materiam inducitur forma chili, ergo in partem aliā inducitur alia forma, & non nisi forma fœcis, ergo, &c. aliter sequeretur quod, aut per tempus stabit materia sine forma, aut generabitur aliquod mixtum medium uia transitus inter cibum, & fœcem, primum impossibile, secundum inconueniens, frustra enim est multiplicare huiusmodi entia sine necessitate. Tertius, ut uermes in hoc intestino generentur,

quorum præsentia si pauci sint, & nō magni est inuatiua, cum fugant superflua, & ex his generentur, quorum superfluitatū præsentia cum putrēt posset esse ualde nociua, licet etiam aliquando in aliis generent, & hoc est illud intestinum quod in ruptura frequentius descendit ad bursam testiculorum, quia est pēdens, & minus cæteris dorso alligatum. Post hoc sequitur colon intestinum crassum, sic dictum, quia multos habet colos, & etiam multas habet cellulas in quibus sterora figuram accipiunt, quæ figura rotunda maxime apparet in schibalis cum indurantur, & ideo figura cellularum debet esse rotunda, sicut & schibalæ sunt rotundæ, & in illis cellulis multa phlegmata continentur, quæ aliquando emittuntur apensa ipsis schibalis, & ibi generantur frequenter uermes cucurbitini, sed inter cellulam, & cellulam cum parum de phlegmate contineatur, generatur solummodo panniculus continuans unum uermem cum reliquo in altera cellula generato. hinc est quod aliquando apparent uermes habentes longitudinem sex pedum. Et ab hoc intestino nomen sumpsit colica, existens dolor ualde intensus cū in ipso frequenter propter duritiem fixum generetur, & ad hoc sicut ad superiora multa meseraicæ terminantur ad fugendum si quid boni remansit, hoc autem intestinum incipit in dextra parte & situatur sub media penula hepatis, & contangitur à Kisti fellis, ut præter choleram ad ipsum interius uenientem à superioribus intestinis stimuletur ad expellendum à contactu kystis fellis, & propterea hoc intestinum in illa parte apparet citrinum, croceti, & gustui amarum. Deinde equitat stomachum, ordinauit enim natura cū sit satis ignobile in comparatione ad superiora, ut situctur supra stomachū, quasi stomachum, & alia intestina defendens, & etiam ut sit proximū zirbo per cuius caliditatem, & humiditatem iuuetur in expulsiōe fœcum, ideo zirbus huic intestino est maxime adhaerens, cum tamen cooperiat stomachum, & reliqua intestina. deinde postea hoc intestinum transiens ad sinistram locatur circa renem sinistram. Et ex hoc situ possumus concipere multa utilia, tam ad partem theoricam, quàm ad practicam. Primum quare nocumentum factum in hoc intestino, sicut cum humores descendunt per ipsum, aut clystera ascendant per ipsum ducit ad syncopim, hoc enim est per communatatem oris stomachi, cuius nocumentum facile cordi communicatur. Secundum, quare dolor colicus multum asimiletur dolori renum, cuius causa est, quia hoc intestinum iuxta renes, & proprie sinistram situatur, inter quos dolores docet Auic. distinguere per cibum assumptum, nam si dolor augetur ex sumptione cibi tunc dolor est colicus, stomachus enim cibo plenus comprimit intestinum colon. Si autem sit dolor renalis sedatur propter humiditatem uaporosam cibi doloris sedatiua. Habemus etiam inuamenta in actu practico duo. Primum, quia remedia quæ exterius applicantur magis deberent declinare ad sinistram, quàm ad dextram, cū magis in sinistris, quàm in dextris hoc intestinum locetur. Secundum inuamentum est, quia cum imponimus clystere debemus facere, ut eger iaceat magis in principio super parte dextra, ut liquor possit ascendere, & cum superius ascendit, & eleuatus est aliquid postmodum jaceat super parte sinistra, ut per compressionem liquoris liquor ascendat magis ad superiora, & transeat ad partem dextram, & postea cum uult ipsum emittere reuoluat se super dextram, & postea surgens clystere emittat. Oppositus autem situs debet seruari in operatione medicina, nam cū materiæ descendunt ad intestina reuoluat se super sinistram, & postea super dextram, sic. n. sic facilius superfluitatum exitus. Habemus quinto differentiam, an rugitus, & dolor sensatus ex præsentia humorum sit in stomacho, aut intestino colon. Nam si cito descendit est in colon. Si uero tarde est in stomacho, cum oporteat per omnes intestinorum reuolutiones descendere. Et ex his inferatur quod colica lateris sinistri est facilius curabilis, quàm lateris dextri, cū materia in illa parte cōtenta sit propinquior uis eductionis, faciliusque clystera perueniant ad eā partē. Vltimo est intestinum rectū cæteris crassius, & latius cuius situs est secundū rectum super dorsum, & ascendit usq; prope renes, huius autem inuamentum est ad attrahendum id quod in superioribus intestinis continetur, & ideo latum creatum est, & consequenter ad expellendum per uiam ani, quæ est

Io. Arculani

a cius

eius extremitas, propterea in hoc intestino fuerunt multi uilli longitudinales manifesti qui deferunt attractioni eius ut quod attractum est magna quantitate, postea facilius expellatur. Et in hoc intestino, & maxime uersus extremitatē eius accidit teneismus. Ultimo est sphicteris, siue anus qui est extremitas intestini recti, in cuius circūferētia sunt quinque officia uenarum hæmorrhoidalium, quatuor musculis iuuantibus ad eius dilationem & constrictionem mota, ad retinendum & expellendum superfluitates primæ digestionis sibi exigentiam necessitatis & uoluntatis imperium finaliter ordinata: unus enim musculus est in extremitate ani ex primens quod de fœce aliqui in ano continetur, & est de minima dimissus cū carne sphicteris sicut caput hominis, cuius una pars transit ad radicem uirgæ, altera pars dilatur in circūferentia sphicteris. Deinde est unū par musculorū super hos duos situatū, quorum officium est longaonem, siue sphicteris, siue anum superius trahere, & ex nocumento horum fit ani de scensus qui interdum reduci non potest. Et in summa ex uis cibi & superfluitatum primæ digestionis nulla est quæ habeat motum uoluntarium, nisi principium, s. meri, & finis, id est sphicteris. Sunt autem hæc intestina cum dorso mediante mesenterio, aliter dicta ancharas, ligata, quod quidem mesenterium est membrū dorso continuum ex panniculis ortū habentibus à siphac, ligamentis, multa adipē, & carne glandosa, uenis meseraicis, & arteriis, compositum, & dictū est mesenterium à meseraicis multis in ipso repertis quæ per hanc uiam ad intestina delegantur. Carnes autem glandosæ sunt factæ in ipso ad sustentandum huiusmodi meseraicas, & etiā ad humectandum intestina ut facile fœces possint descendere, & propter hanc causam est etiam in ipso multitudo adipis. Et in hoc mesenterio frequenter colligitur multitudo humoris melancholici faciens melancholiam mirachiam. Fuit autem conueniens ut huiusmodi mesenterium mediaret inter dorsum & intestina, ne molle sicut intestina lædatur à contracti duri. Composita autem fuerunt intestina ex duabus tunicis, ne nocumentum unius partis facile alteri communicetur, & etiam propter diuersitatem uillorum fuerunt in eis hæ duæ tunicæ necessariae, fuerunt enim in eis uilli longitudinales ad attrahendum, transversales ad retinendum, latitudinales ad expellendum, sed latitudinales magis in eis dominantur quā in stomacho cum sint magis ad expellendum ordinati, nisi in intestino recto in quo magis longitudinales dominantur, habet enim attrahere rem crassam difficilis expulsiōis, uenæ autem existentes in ipsis quæ plurimæ sunt, omnes sunt meseraicæ descendentes à uena portæ. Arteriæ autē ueniunt ad ipsa ad dandum uirtutem uitalem ab arteria aorti descendente. Nervi autem sensitiui plurimi ueniunt ad ipsa cum plurimo sensu indiguerint, qui nervi partim à cerebro, partim à nucha ueniunt. Pinguedo autem magis est in superficie extrinseca intestinorum quā intrinseca, licet etiam interius penes Auic. sit pinguedo, pinguedo tamen magis est in crassis quā subtilibus, quia sunt magis frigida & magis crassa, & propter finem, quia oportuit eorum fœces duras à multitudine adipis mollificari, multitudo etiam mucositatis & phlegmatis inuiscati est in superficie intrinseca intestinorum crassorum ne facile lædantur à duritie fœcum, phlegma etiam stagnans, & inuiscatum reperitur in intestinis superioribus gracilibus, sed in minori quantitate. Ultimo in diffinitione subduntur fines duo, quorum unus est cōplementum digestionis primæ. Reliquus est superfluitatum ipsius primæ digestionis expulsio, & ex his manifesta est tota anatomia intestinorum, s. quantitas, figura, numerus, situs, colligantia, & quæ sunt partes componentes, & consequenter ex his manifestum est, quod sint frigida & sic complexio nis, & quod possunt pati omne genus ægritudinis simplicis & compositæ, frequenter autem patiuntur colicā, & fluxum, & uermes. Gratia completioris doctrinæ de anatomia zirbi aliquid dicendum est. Est autem zirbus à Gal. dictus omentum membrum compositum ex duobus panniculis, uenis, & arteriis in modum retis adinuicem contextis adipē seposita uacuitates replente ad uigorandum digestiū stomachi & intestinorum finaliter ordinatus. duo autem pāniculi ex quibus componitur, ortum habent à duabus extremitatibus si-

phac dorso alligatis. Sed uenæ & arteriæ eius ortum habent à uena chilis, & arteria aorti descendētibus. Adeps autem seposita eius ortum habet ab adipē mesenterii, fuit autem ordinatus ad uigorandum digestiū stomachi & intestinorum, tamen reflectendo calorem, quod optime facit mediancibus panniculis densis, ex quibus componitur; qui etiam quia leues sunt, & extensibiles non comprimunt stomachum & intestina, neque propter suam facilem extensionem prohibent intumescētiā stomachi & intestinorum aliquando necessariam. Iuuat etiam ad digestionem calefaciendo mediare adipē seposita, quæ licet ab autoribus graduetur inter mēbra frigida, est tamen potentia calida, quod declaratur ex facili inflammabilitate, nec minus adest ipsa iuuat reflectendo calorem, uenæ quoque & arteriæ in ipso disperse adinuicem digestionem, calefaciendo per sanguinem & spiritum in ipsis contentum. Propterea miles in bello percussus cui abscissus fuit omentum post consolidationem non potuit escam digerere. quinto de ingen. sani. Hic autem zirbus cooperit anterior stomachum & omnia intestina, quod non sic facit in aliis animalibus, quia homo inter cætera animalia est debilior uirtutis digestiue, & etiam ut sit tutela stomachi & intestinorum, quod magis necessarium fuit in homine quā in cæteris animalibus, cum uenter ipsorum non sit ita expositus extrinsecis occurrentibus, & teguntur pelle duriori. Et ex his manifesta est colligantia ipsius. Colligatur enim cum stomacho & intestinis maxime cum colon cui multum annexitur. Et colligatur cum omnibus membris à quibus cōpōnentia ipsum ortum habent, ut dictum est, & manifestum est situs eius, est enim immediate sub siphac contentus. Similiter quantitas & eius complexio. Est enim calida & humidæ complexionis & potest pati omne genus ægritudinis simplicis & compositæ. Sed inter cætera descendens per didymū in bursam testiculorum facit herniam zirbalem. Si autē propter uulnus ventris, aliquando zirbus egreditur, & aliquando tempore moretur disponitur ad putredinem. quapropter oportet ut quicquid egresum est post aliquantum tempus ligetur fortiter, & supra ligaturam incidatur, & cauterizetur, deinde cum filo intromittatur, filo pendente extra uulnus, postea uulnere extrinseco consolidato, uel prope consolidationem filum illud extrahatur.

De punctiōe intestinorum.

Pro notitia huius materiæ sciendum quod reperiuntur istæ passiones, punctio, colica, ileos, quæ licet in aliquibus conueniant in multis tamen differunt. Est enim punctio de qua apud Auicennam. 16. tertii dolor remissus, partium occupans spacium existens in intestinis.

Colica uero distincta contra ileos est dolor intensus in intestinis crasis maxime in colo, cum quo fit difficilis exitus eius, quod inferius per naturam egreditur, s. fœcis, uentositatis humorum, uermium, & huiusmodi, quæ per intestina egredi consueuerunt. Ileos autem descriptiue est dolor intestinalis fortissimus in intestinis gracilibus maxime in ileo cum quo fit difficilis exitus eius quod per anum egreditur. Sed primo sequendo Auic. absoluiamus materiam punctiōis. Punctio quidem non habet species nisi quosdam modos differentes secundum causas, & loca ipsius.

Causæ uero punctiōis quædam sunt primitiue, quædam corporeæ. Primitiue quidem sicut cibi acuti, salsi, acetosi. Item uenena sicut argentum uiuum, sublimatum, calx, arsenicum, & huiusmodi. Corporeæ uero sicut uentositas, quæ aliquando in spatio intestini continentur. Aliquando inter utranque tunicam, & est difficilior. Aliquando cholera pungens & mordicans. Tertio phlegma salsum. Quarto melancholia adusta. Quinto phlegma uiscosum in cuius separatione fit dolor. Sexto excoriatio & ulcus. Septimo apostema. Octauo uermes, crisis quoque est causa eius cum qua humores ad intestina deriuantur, imo ipsa punctio est signum crisis.

Signa. Primo causæ primitiue sunt sibi signa. Et similiter nocumenta ipsas consequentia. Ventositates uero cognoscitur per rugitum, & aliquando punctiōis mutationem. Item per eructationem, aut exitum uentositatis per inferius

interius cum quibus punctio alleviatur. Humor cholericus cognoscitur per caliditatem in loco sensatam, sitim, oris amaritudinem, lingue citrinitatem, & quod cholera aliquando per inferius aut superius expellitur. Et cetera signa generalia sumpta ex complexione, etate, tempore anni, regimine precedente & similibus consignant, si cholera attestetur. Cognoscitur autem phlegma falsum per punctiorem cum gravitate, & si egrediatur inferius apparet album, & cum hoc sentitur in ano mordicatio & tencinus. Et si expellatur per superius percipitur in ore salido, phlegma quoque crassum & viscosum cognoscitur ex gravitate magna, & quia cum educitur apparet in aliqua parte superficiei eius aliquid sanguinis adherens. Melancholia quoque cognoscitur per saporem ponticum, aut acrem & per colorem eius fuscum cum educitur. Et hæc omnia significantur ex signis communibus sumptis ex complexione, etate & similibus. Vermes autem cognoscuntur per signa vermium inferius ponenda. Similiter excoriatio, & ulcus penes signa dicenda in cap. fluxus difterici. Apostema vero cognoscitur per signa communia ex duritie, tensione, gravitate, febre, dolore continuo in una parte & similibus. Crisis autem declaratur per agitudinem precedentem & evacuationem sequentem cum qua prima agritudo terminatur vel minuitur.

Prognostica. Primum, agritudo secundum plurimum curatur si debite tractetur. Secundum, hæc agritudo si augeatur ducit ad colicam, aut ad ileon, est enim via in ipsas & proprie cum est sine fluxu. Tertium, quando pervenit punctio ad alcuzes, vomitum, singultum, destructionem rationis significat mortem.

Cura punctiōis quatuor exigit intentiones. Prima causam remouet, secunda stomachum & intestina confortat ipsorum discrasiam corrigendo, tertia corrigit accidia, quarta ordinat debitum regimen. Si ergo cibi fuerint causa punctiōis illi prohibeantur precipiendo regimen contrarium, ut puta si fuerint acuti, aut falsi dentur frigida, & humidum & insipida, sicut portulacæ, lactucæ, cucurbitæ, cucumeres, & similia. Et si fuerint acetosi dentur dulcia & calida, & quicquid fuerit contentum in stomacho ex his cibis vomitu educatur. Secundo confortetur stomachus & intestina cum propriis moderate stipticis contrariis discrasie a cibis facientibus punctiōem inducunt. Si vero in causa fuerint venena, vomitu quamprimum educantur sicut exhibendo potum copiosum tepidum ex aqua cum oleo sciamino, aut oliuorum subriplo ad aquam, & cum hoc uomitus præcipiatur. Et si punctio ad intestina descendat cum clysteribus ex eisdem rebus factis educantur, & si vomitus, aut solutio ventris cum iam dictis educi non possent dentur aqua decoctionis anethi cum paucis mellis, & salis, hic enim potus tepidus adiuvat vomitum. Et si fuerit in intestinis & proprie superioribus, & non sufficiunt, quæ dicta sunt dentur calsia cum decoctione prunorum, & similia, & pro his recurratur ad sextam quartam, aut ad octauum Alman. Si vero in causa fuerit ventositas considerandum est an multiplicetur merito stomachi, & aliorum membrorum absque humoris presentia. an sit humoris presentia qui quotidie ventosatur, si primum cum hoc sit diminuta caliditate, confortandus & multiplicandus est calor innatus cum his quæ interiorius & exterius applicantur, quæ etiam ventositatem carminant, sicut bonum vinum antiquum non dulce, paucum, multa abstinentia a cibo, fames, & exercitium, & cibaria ad calidum & siccum declinantia non ventosa, & dentur in principio mentha diacyminum, aut diagalanga, & super cibariis suis ponantur aromata proprie facta ex cinamomi, zing. galangæ ana. ʒ. s. piper. ʒ. 2. his etiam quibus placent possent addi cyminum præparatum medicinaliter, aut stomacho ieiuno posset exhiberi trochisci de aromatibus, electarium de baccis lauri, & similia. Auic. tamen dicit quod ex his quæ sunt mirabilis iuuamenti apud experimētores est, ut calcaneus porci aduratur & sumat ipsum in potu habens punctiōem ventosam, ut puta dando de ipso puluerizato. ʒ. 2. cum potu vini potens calidi. Aut dentur de granis lauri siccis folis puluerizatis duo coclearia, est autem coclear. ʒ. s. & fiant exterioribus ventositatem, & inungantur cum oleo de spica, de ruta, laurino, & similibus, aut ponatur emplastrum de baccis

lauri, & similiter fiant clysteria ex carminantibus ventositatem in quibus ponatur oleum rutaceum. Si autem sit humoris presentia ex quo genereur ventositas, ille educatur cum pilulis alephanginis, diapheniconis, electario indo. Et si fuerit melancholia cum diasena. & similiter fiant clysteria eiusdem intentionis, deinde procedatur ad regimen de quo supra. Si autem in causa fuerit cholera attente considerandum est. Dicit enim Auic. quod punctio a quacunque causa curatur cura cholice nisi sit punctio cholericæ. Oportet enim ut in ea caveatur ab errore cadente, & estimatur quod sit cholica, & curatur cura eius, & moritur infirmus. Credo Auicem intellexisse quod cura colice secundum plurimum est cum carminantibus ventositatem calefacientibus & exicantibus, & interdum cum fortibus solutiuis, cum leuia non sufficiant. Si autem punctio cholericæ curetur cum istis non est dubium quod æger posset duci ad perditionem. Secundo quia medici inaduertentes dant solutiua fortia, sicut diapheniconem, electarium indum, sicut aliqua nō consueverunt in cholica & perducunt ægrum ad fluxum vehementem qui non facile sedatur, & interdum ad cholericam passionem, est enim punctio de propriis signis antecedentibus cholericam passionem. Quapropter pro cura huius debemus in principio choleram solvere cum clysteribus frigidis lenientibus, & si non suffecerint dentur calsia, aut manna cum decoctione prunorum, aut tamarindorum, & si cholera fuerit crassa detur aloë lotus. Secundo cholera educata discrasia corrigatur cum frigidis interius & exterius applicatis, ita ut in eis ponatur solatrum, & sandali, & rosæ, sed semper misceatur aliquid absinthii, & similia calidiorum stomachum confortantium, & interius sumat diarrhodon abbatibus, & triasandalos, & aliquando in his casibus datur vinum granatorum, vinum berberis, & similia. Cauendum tamē est a stipticis, imo omnia sint lenientia nisi adsit fluxus ventris. Si vero humor fuerit baurachius, educatur cum clysteribus factis ex decoctione turbit, polypodii, niolarum, fumoterræ, & similia, & euacuetur cum solutiuis sumptis per os quæ sunt, sicut hierapicra, diacitoniten descriptione Mesue, & similia. Si autem fuerit phlegma viscosum, aut melancholia, illa sollicitè educatur cum clysteribus mundificantibus, & abstergentibus & eis quæ sumuntur per os, sicut electarium indum, & diasena, pilule alephanginæ, & similia, & præmittantur digestiua si opus est, facta ex oximelle simplici, composito aut scyllitico, syrupo de epithymo, & similibus cum aqua decoctionis cinnamomi, & anisum. Secundo corrigatur discrasia. Stomachus & intestina confortentur cum propriis, ex quibus maxime laudat Auic. puluerem amomi sumptum per se, sequente potu, ut puta alii cuius vini uinosi pauci & dentur trochisci de aromatibus, & similia calefacientia & confortantia. Si autem in causa fuerit excoriatio, ulcus, aut apostema curentur, ut dicitur inferius in cap. de colica apostemosa & difenteria. Si vero crisis fuerit in causa, sinatur naturam operari si per se fuerit sufficiens: Si vero non, adiuuetur cum frictione ventris, clysteribus & solutiuis leuibus.

Pro cura autem punctiōis pendētis a uermibus, recurre ad capitulum de uermibus infra ponendum. Tertia autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur secundum ipsorum exigentiam, pro quorum cura recurre ad capitula precedentia de vomitu, singultu, alcuzes, & similibus. Quarta autem intentio, scilicet debitum regimen sex rerum non naturalium ordinetur in contrarium discrasie, unde cibi & potus sint facili digestiōis, boni chymi paucarum superfluitatum, & sint ventris lenitui nisi adsit fluxus ventris. Quapropter iura pingua conueniunt, & proprie ius galli decrepiti, & apud Auicennam ericius affatus est proprius conferens in utrisque punctiōibus, scilicet tam calida quam frigida, & intelligitur de ericio porcino & non canino, somnus eorum sit prolixus & proprie nocturnus. Procurent omnes euacuationes a natura institutas, nec ventositatem retineant natura inuitante, sint pauci in cibo & potu, non comedant nisi fame precedente, imo tolerantia famis in ventosa & phlegmatica, & exercitium super fame optime conuenit.

De rugitu & exitu uentositatis inuoluntariæ.

Facit Auicenna capitulum de rugitu & exitu uentositatis inuoluntariæ. Causa immediata rugitus est multitudo uentositatis. Hæc autem multiplicatur aut propter cibos uentosabiles, aut propter malitiam digestionis in membris, scilicet in stomacho, & intestinis. Cuius causa est, aut ipsorum frigiditas, aut paucitas caloris innati, licet forte non sit remissio in gradu, sicut in fine phthisis. Multiplicatur enim uentositas propter diminutionem caloris, siue sit diminutio in quanto, siue in gradu. Hæc autem diminutio aliquando est per essentiam, aliquando per cõmunitatem asplene, aliquando ab hepate, aliquando à mirach & mesenterio, siue per simplicem alterationem, siue in stomacho, & intestinis communicando materiam uentosabilem. Et plurimum est cum lenitate naturæ. Et si est in intestinis subtilibus, tunc sonitus est acutus. Et si in crasis, tunc sonus est grauis propter latitudinem foraminis, & si rugitus est cum gurgulatione, tunc uentositatis est admixta humiditas. Est autem secundum plurimum magis merito malitiæ digestionis membrorum q̃ merito ciborum, & rugitus plerumq̃ est signum crisis antecessoris ipsam. Exitus autem uentositatis inuoluntariæ aliquando fit propter mollificationem intestini recti, & proprie extremitatis eius. Quandoq̃ apud Auicennam propter mollificationem ieiuni, de qua re non parum est admirandum, cum ieiunum non habeat musculos qui sint instrumentum motus uoluntarii neque taliter locatum ut per ipsum uentositates possint ad extra exire. Credo autem textum esse corruptum, & forte loco ieiuni debet esse meri, per cuius mollificationem posset egredi uentositatis inuoluntariæ per superius, sicut per mollificationem aniegitur inuoluntariæ per inferius, aut forte ieiunum habet occultam colligantiam cum intestino recto ita ut propter eius nocumētum mollificetur rectum. Cura rugitus nota est ex his quæ dicta sunt superius in curatione punctiōis à uentositate, quæ curam huic cap. accommoda. Cura autem exitus uentositatis inuoluntariæ perficitur cura paralysis ani, quæ est manifesta ex cura paralysis in generali. Verum remedia localia applicanda sunt regioni alosos & ab alcatim infra. Et si fuerit per nocumētum ieiuni aut meri inungatur quod est super umbilicum cū oleo costino ante & retro.

De colica.

Sequendo ordinem Aui. iam de colica & ileos est nobis agendum. & licet quid nominis & quid rei harum dispositionum sint satis ex dictis manifesta, attamen ut memoriter teneantur, & secundum scilicet species & differentias absoluantur. Permitto quod dolor intestinorum qui est tristis eorum sensatio est duplex, quidam existens in omnibus intestinis, quidam in aliqua eorum parte circūscriptus. Primus autem duplex, quidam n. est cum motu descendens aut ascendens per reuolutiones intestinorum & uocatur tortio. Quidam autem quiescēs, & uocatur nomine generis dolor intestinorum, & ij aliquando sunt remissi aut mediocres de genere naturalitatum insensibiliter ledentes. Si uero dolor intestinorum sit circūscriptus aut est remissus existens de genere neutralitatis, & est punctio, de qua supra, aut est fortis, & dicitur colica si sit in colo & reliquis intestinis crasis cum difficili exitu eius, quod per naturam egreditur aut est in ileo, & intestinis gracilibus, & dicitur ileos, conuocando similiter difficilem exitu eius, quod per inferius egreditur, nomen autem sumpserunt hi duo dolores ab illis duobus intestinis, eo quod in illis frequentius accidunt, in duodeno. n. raro accidit dolor propter ipsius rectitudinem, breuitatem & propinquitatem orificio stomachi, & in ieiuno raro, cum causa doloris factiæ parum in eo morentur propter causas superscriptas. Sed in ileo frequenter propter ipsius longitudinem & plurimam circūuolutionem. Similiter in recto rarissime propter breuitatem, rectitudinem, amplitudinem, & ani propinquitatem. Et similiter in sacculo rarius accidit quam in colon propter breuitatem & amplitudinem. In colo autem frequenter propter longitudinem, tortuositatem, stricturam, & quia fœces duræ, & multa phlegmata in ipsius cellulis continentur, & propter hæc ultimā causam frequentius accidit colica quàm ileos, saltem à causa intrinseca licet à causa extrinseca non frequentius. Et hæc sunt species dolo-

rum sumptæ secundum diuersitatem causarum recipiētium. Sed secundum diuersitatem dolorum in se, & diuersitatem causarum imprimētium sumitur hoc modo. Nam aliquis est pungitiuus, aliquis grauius, aliquis extensiuus, aliquis perforatiuus.

Causa enim interior ipsum dolorem imprimens aut est ea lida acuta & subtilis ipsorum soluens continuitatem, licet sit raro, & tunc facit pungitiuum sicut humor cholericus aut salis sua baurachitate mordens, aut sanguis corruptus, aut uermes suis aculeis pungētes, aut uentositatis in aliquo paruo loco conclusa, aut ulcus paruum. Sed grauius causa est materia frigida, grossa, uiscosa in intestinis aggregata sicut humor phlegmaticus aut sanguis congelatus, aut melancholia quæ de se dolorem talem faciūt satis quietum. Si uero uentofetur dolorem faciunt intestinum extensiuum aut perforatiuum si in aliquo loco concludantur. Si uero moueatur faciunt tortionem. causa autem extensiuæ, tortiuæ & perforatiuæ est uentositatis. Si enim multa sit occupans magnum spatium non mota, sed in illo conclusa facit dolorem extensiuum. Et similiter fit dolor extensiuus à multitudine alicuius materiæ extendentis. Si uero moueatur facit dolorē tortiuum.

Si uero sit in aliquo loco paruo cōclusa, sicut inter duas tunicas intestini dolorem facit perforatiuum differentē à pungitiuo, quia uentositatis & similiter humor faciens pungitiuum est magis subtilis quàm humor aut uentositatis faciens perforatiuum. Differt aut perforatiuus ab actuali, est enim actualis, cum sit panniculi actualis eruptio, & frequenter sequitur perforatiuum. Item quidam dolor est periodicus sequens aggregationem materiæ in determinato tempore sufficientem ad dolorem, quidam non periodicus.

Causæ colicæ quædam sunt corporeæ, quædam primitiue. Corporeæ duplices, per essentiam & per cõmunitatem. Sed absoluamus primo illas, quæ sunt per essentiam in intestinis. Deinde quæ sunt per cõmunitatem. Tercio primitiue.

Causæ autem per essentiam sunt quatuor, scilicet mala complexio non quælibet, sed diuersa, mala cōpositio, solutio continui, apostema. Primo malæ complexionēs immateriales. Caliditas enim per se potest facere dolorem, secundo per accidens resoluendo & exiccando fœces. Item attrahendo humidum ipsius ad hepar, per cuius præsentiam fœces reddebantur molles & fluxibiles fœces autem retenta est causa colicæ. Item frigiditas potest facere dolorem tam per se quàm per accidens debilitando expulsiuam tam musculorum uentris quàm intestinorum aut oppilando poros, & tunc crescit caliditas per antiperistalticam exiccans fœces ut statim dictum est. Item frigiditas impressa in sphincteri sicut accidit sedentibus in terra aut super lapidibus unde confringitur sphincteris & expellitur fœces sursum & retinetur urina, & propter hoc multiplicatur colica in regionibus frigidis, & temporibus frigidis & flantibus uentis frigidis. Tercio complexio mala sicca tam per se, quàm per accidens est in causa, siue sit siccitas positiua, siue sit per consumptionem humidi facientis fœces lubricas, licet una ab altera raro absoluitur. Mala autem complexio humida immaterialis per se non facit dolorem, sed bene per accidens obtinendo calorem innatum cū superfluit, unde debilitata expulsiua & digestiua fiet aggregatio superfluitatum quæ erunt causa colicæ mala autem complexio cum materia cuiuscunq̃ generis potest esse causa colicæ, licet secundum plurimum sit materia frigida, & proprie phlegmatica, hæc enim ad intestina aliquando deriuatur & à capite & à stomacho & ab aliis membris, sed plurimum de ipsa in ipsis cōgeritur propter frigiditatem suæ complexionis & digestiue suæ debilitatem, humores autem alii nō congeruntur in intestinis, licet ad ipsa deriuentur. Et cholica aliquando est paroxysmalis secundum aggregationem materiæ in determinato tempore sufficientis ad cauendum dolorem, siue illa materia congeratur siue aliunde deriuetur, & licet hæc malæ complexionēs possint facere colicam absolute sine oppilatione, secundum plurimum tamen coniungitur oppilatio. Secunda causa principalis colicæ est oppilatio quæ est causa doloris solum per accidens, scilicet mediante complexione mala & solutione continui, quarum utraq̃ est causa doloris per se, quoniam ambæ per se opponunt naturis duabus, scilicet bonæ complexionij & unitati siue continuitati, per

per quas tanquam per instrumentum anima sentit. bona autem compositio non est per se instrumentum animæ ad sentiendum eo quod compositio per se debetur organicis, non autem simplicibus quibus per se debetur sensatio tactus, scilicet nervis, sed complexio per se primo debetur simplicibus, unitas autem utriusque secundum Galenum, & per consequens utraq; est per se instrumentum sensationis tactus cōuenientis, scilicet bona complexio & solutio continui erūt per se causæ tristis sensationis quæ est dolor, mala autem compositio solum per accidens. Etsi insitetur argumento Auer. quia neq; continuitas, neq; contiguitas siue compositio est instrumentum animæ ad bene sentiendum, ergo nec discontinuitas nec mala compositio siue mala contiguitas erit per se causæ tristis sensationis. Dicitur negādo antecedens, quātum ad continuitates, licet quantum ad contiguitatem sit uerum, cum illa non sit natura simplicium sicut est continuitas. Oppilatio fit autem à multis causis. Aliquando ab apostematē intestinorum, quod secundum plurimum est calidum, si fiat per uiam defluxus. Si uero per uiam paulatim facta congestio est frigidum. Aliquando autem fit ab humore & proprie crasso uisoso phlegmatico, & hoc frequēter, à quo eleuatur uentositas fortis penetrās, aut inter tunicas intestinorum, aut conclusa in aliqua concavitate intestinorū quæ impedit exitum egestionis & humorum, sicut etiam impedit deglutionem. Tercio aliquando uentositas oppilat contorquēdo intestinum, sicut ē aliquando contorquetur à percussione, saltu, calu & offensione super uentrem & uiscera, unde ruptis ligamentis intestinum contorquetur. Quarto, oppilatio fit à uermibus conglobatis. Quinto, à fœce sicca adherente & appellatur colica à fœcibus, & hæc quinq; dicuntur oppilationes coartatorie, & fœx etiam potest facere colicam extendendo aut mordicando per aliquam qualitatem in ea existentem, quæ colica à fœce multoties accidit. Fit autem ipsum non motum à loco suo cōprimitur ab aliquo membro uicino tumēte. Secunda quando intestinum propter aperturam aut rupturam didimi caderet in bursam testiculo rum, aut quando in alia parte rumpetur siphach & caderet inter siphach & mirach.

Causæ autem exiccationis fœcis plurimæ sunt. Primo cibi sicci actū sicut legumina sine brodio. Item assata & frixa, similiter cibi sicci potentia in quibus sunt pulueres exiccatiui ut aromata. Secundo quia fœx longam cōtrahit moram in intestinis sicut contingit in occupatis circa res gerendas, qui sui obliuiscuntur. Tercio propter debilitatem musculorum uentris & intestinorum sicut in utentibus multo coitu & infrigidatis & debilibus ex ægreditudinibus. Quarto propter apostemata & mollificationes in musculis uētris. Quinto propter potum narcoticorum uirtutes debilitantium, aut propter alias causas sensum intestinorum obtundentes. Sexto propter paucitatem effusionis cholæræ stimulantis expulsiuam. Istæ tamē præter primam sunt causæ exiccationis fœcum, quia sunt causæ longæ moræ ipsius in intestinis. Septimo propter hepar & meseraicas humiditates ipsius fœcis attrahentes. Octauo propter multum sudorem, humiditates enim trahuntur ad circumferentiam. Nono propter exercitia fortia fœcem exiccantia insensibiliter resoluendo. Decimo propter raritatem corporis à complexione calida. Talis enim calefit ab aere calefaciente, & facile resoluitur & consequenter fœx exiccatur, licet etiam raritas multa sola possit esse causa exiccationis fœcum, quā raritatem Auic. appellat fistulosam, eo quod cum ipsa sint pori lati sicut foramina fistulæ, loquitur enim metaphore. Vndecimo propter longam moram in balneo aqueo aut aereo trahente humiditates ad circumferentiam & simile fit in aere æstiuo calido, etiam non existente corporis raritate. Decimosecundo, ab arte, ut uicariis, fabris, coquis & similibus. Decimotercio, à multitudine cholæræ effusæ ad intestina inueniente fœcem duram & paucam & exiccationi paratam. Hoc autem rarissime, nā cholera stimulo expellit in intestinis contenta. Decimoquarto ab inanitione ut in ieiunantibus & euacuatis & conualescentibus. Decimoquinto, à descensu matricis cum comprimit intestina, aut ab ipsius repletionē, sicut

cum est prægnans & exiccatur diu retinendo fœcem. Circa quod notandum, quod aliquando retinet fœces & urinam cum comprimit intestina inferiora & collum uesicæ, aliquando prohibet retentionem fœcum & urinæ sicut cum comprimit intestina superiora & fundum uesicæ. Decimosexto ab hæmorrhoidibus, ragadiis, ulceribus & apostematibus sphericis, aut colli uesicæ uel matricis, nam per ista quandoque fœx retinetur, & retenta exiccatur. Tercio principaliter solutio continui est causa colicæ, tum quia per se facit dolorem, tum quia natura terretur in emissionē fœcum per loca ulcerata, unde retentæ sunt causa colicæ. Causæ autem solutionis continui est humor acutus uel multus, uentositas, uermes, lapis in intestinis generatus. Item causæ extrinsecæ & reliquæ. Quarto principaliter apost. causant colicam, sunt enim per se causa doloris tam per malam complexionem quæ solutionem continui, causant etiam colicam per accides oppilando, quæ si sint facta per uiam defluxus sunt secundum plurimum calida, si uero per uiam paulatim facta congestio secundum plurimum frigida. Colica autem per communitatem est à multis membris. Primo à stomacho aggregante interdum phlegma aut melancholiam aut alium humorem qui aliquando uentofatur. Interdum aggregante uentositatem ex cibis, ut supra in capitulo de inflatione stomachi, quæ tamen non faceret dolorem in stomacho propter amplitudinem eius. Et quia descendit ad inferiora, & quia stomachus est intra membra calida, nec etiam in gracilibus faciet dolorem, quia sunt calidiora neq; retinetur in eis, non enim habent fœces siccas oppilantes: sed descendens ad intestina crassa intensum faciet dolorem, quia sunt frigidiora remota à membris calidis facile oppilabilia propter presentiam fœcum & multas reuolutiones. Et sunt spissa non rara sicut gracilia à quibus uentositas facile resolui potest. Similiter per communitatem ab hepate generante uentositatem & expellente ad intestina, ut supra in tympanite, iuxta apho. 11. quartæ particulæ. Quibuscumq; torsiones, &c. & similiter hepar expellit humores, quandoq; ad intestina, qui sunt causa colicæ, imo intestina recipiūt superfuitates à toto corpore mediante hepate. Item per communitatem à splene cum melancholia effusa ad intestina uentofatur. Aut etiam uentositas à splene communicatur intestinis, aut splen tume factus coartat intestina. Item per communitatem à spiritalibus ut cum ab ulceribus pectoris & pulmonis sanies mittitur ad intestina per uenam chilis mediante hepate aut cerebro sicut in catarrhis. Item per communitatem à renibus sicut cum apostemantur & coartant intestina & proprie ren sinister qui contangitur à colon. similiter cum patiuntur lapidem communicatur uocementum intestinis, retinetur superfuitates, & fit colica, propterea difficile est distinguere dolorem colicum à renali cum ambo communicet in retentione fœcum. De differentia tamen inter eas statim agetur. Item fit colica per communitatem à matrice & uesica cum apostemantur. Item fit colica per communitatem à toto sicut in febris, quæ contigit Ferrariæ de anno. 1449. fere omne qui infirmabantur incurrēbant cholēcam aut fluxū uentris. Quod non erat nisi, quia humores maligni multi crassi, & secundum plurimum adusti pellebantur de uenis ad intestina. Et sic si grossi erant & uenter multum stipticus faciebant colicam, si uero magis subtiles & multi & uenter natura fluxibilis faciebant fluxum uentris, multoties dysenteriam, sicut mihi eodem anno contigit. Imo dicit Auicenna, quod quandoque accidunt colica & ileos, sed frequentius ileos secundum semitam accidentiæ ægreditudinum pestilentialium & transeunt de regione in regionem, & de homine ad hominem ex quo concluditur has ægreditudines esse quandoque contagiosas & pendere ab influxibus supercoelestibus taliter disponentibus. Et multa extranea Auic. subdit ibi quæ prosequi esset inutile. Et quandoque accidit colica habentibus tetanum, quare deficiunt ab expellendo humores & fœces ab intestinis superioribus, sicut deficiunt à retinendo quod est in inferioribus. Et quandoque deficiunt ab expellendo tam à superioribus quā ab inferioribus. In summa ergo colica cum fiat à tot causis, frequentius tamen contingit à phlegmate, uentositate & duritie fœcum.

Causæ autem primitiue colicæ sunt unum plurimæ commixtionis.

Io. Arculani

2 3 mixtionis

mixtionis & proprie mustum. Item olera & proprie cucurbita. Melones quoque & angurix & fructus omnes recetes habent s humiditatem superfluum uentofabilem, sicut poma una & similia, Item fructus stiptici & pontici, sicut pira, zarrur, citonia, sorba, mespila, castanea. Item legumina & proprie recentia. Item milium & rizum & cetera uentrem strigentia & proprie cum post huiusmodi bibitur aqua. Item coitus & retentio uentositatis uolentis egredi. Item aduentus frigoris stomacho & intestinis sicut si homo præter consuetudinem expositus fuerit uento & aeri frigido aut steterit in aqua frigida, aut sederit super lapide frigido, & apud Auicennam ex eis quæ præparant intestina inferiora ad colicam est comestio ouorum asporum durorum. Item pirorum & citoniorum. Item fauich, milii, & rizi & similia. Item retentio egestionis uolentis egredi. Item aer pestilens & uentus septentrionalis & sumptio ueneni, casus super uentrem percussio contundens aut scindens. Hic notanda sunt aliqua.

Primum quod secundum plurimum ex materia colicæ siue sit humor siue fœx aut alia materia impletur primo monocolum, deinde peruenit ad alia, nec est propter hoc necessarium secundum plurimum prius dolere monocolum quam alia, non enim propter amplitudinem suam quilibet repletio facit dolorem in ipso nisi modum excedat aut sit intentæ malitiæ aut acuitatis. Secundum, quod non accidit sanitas integra nisi complete euacuetur monocolum cum semper suggerat materiam aliis. Tercium, & quandoque materia colica uenit desuper, & quando sit clystere, scilicet carminatiuum aut apponitur aliquid euaporatiuum ampliatur materia & dilatatur, & sic dolor duplicatur, & propterea in his casibus clystera ex oleo & similibus lenientibus sunt conuenientiora neque carminantia conueniunt nisi materia paucificata. Quartum febris est inuatiua in omnibus doloribus colicæ, cuius causa est uentofitas crassa aut phlegma, aut malitia complexionis frigida, & est ex rebus uelociter sanantibus uentofam. Quintum colica multoties permutatur ad paralysem & sanatur per eam, materia enim dilatata petit nucham aut aliquos nervos aliquibus membris particularibus deferuientes, & similiter aliquando permutatur ad iuncturas, quæ permutaciones aliquando accidunt propter medicos inepte operantes, qui ut sedent dolorem faciunt balnea siue semicupia nondum materia minorata, & adhibent alias medicinas colligantes, effert enim minus malum ut stupefacerent. Primum uidi in fratre domini episcopi Veronensis, qui post paralysem uniuersalem mortuus est sequenti die. Secundum in potestate Leniati qui longo tempore arterica laborauit, hæc enim illico secuta sunt post balnei administrationem.

Sextum & multoties permutatur phlegmatica & sanguinea ad dolorem dorsi, quia materiæ subtiliata per caliditatem dolorosam. Et per medicinas iliace quæ communiter subtiliantur facile fluunt ad dorsum cui dolori optime confert phlebotomia, est enim communis euacuatio & eo maxime, quia ibi est uena chilis quæ suggerens materias dorsi inanitur per phlebotomiam. Septimum similiter permutatur ad melancholiam & epilepsiam, quæ sunt ualde mala. Et quandoque ad hydropisum corrumpendo complexionem hepatis. Octauum, quando cholica inuenit dolores articulorum non apparent tribus de causis, quoniam dolor fortior scilicet colicæ impedit debiliorem siue denigrat, & quia materiæ conuertuntur ad latus doloris fortis, scilicet ad intestina, & quoniam dolor, abstinentia & uigilia resoluunt superfluitates.

Nonum, & quando prolongatur retentio fœcis & inflat uenter propter fortem extensionem fœcum retentorum interficet, & quoddam uidi in quibus intestina rumpuntur, & fœx egrediens replet concauitatem uentris & sunt sicut hydro-pici, & foetent odore stercoreum, & quoddam uidi qui post retentionem fœcū, scilicet ad sextū diē postea incurrit fluxum uentris, & cū lieteria moriunt in tribus diebus, quia p fortē extensionem & malam complexionem impressam uirtus digestiua & retentiua intestinorum ablata sunt. Decimum & multoties colica succedit ad fluxum uentris cum quo euacuata sunt materiæ subtiles & remanserunt crasse factiūg colicæ. Undecimum & multoties cura colicæ remouet singul-

tum, quia materia graditur ad intestina.

Iam ponenda sunt signa colicæ. Et primo communia. Si ergo initii colicæ sunt, quia parum de fœce egreditur & mutatur paroxysmus, idest consuetudo egerendi, non enim egerit horis sibi consuetis, minuitur appetitus imo quadoque aufertur propter magnam communitatem stomachi cū intestinis, præcipue abhorret dulcia & unctiosa. Hæc enim sunt similia phlegmati, sed magis appetit falsa, acuta & acetosa, contrariantur enim materiæ phlegmaticæ quæ indiget calefactione, incisione, subtiliatione, stomachus enim præter naturaliter dispositus appetit contraria, sicut naturaliter dispositus appetit similia, secundo technici appetit tamē aquam frigidam, propter sitim magnam ex consumptione humiditatis, roridi in ore stomachi, quæ consumptio fit à uaporibus fœcum retentorum calidis & siccis, & fit sitis propter alias causas statim dicendas. debilitatur digestio propter magnam compassionem stomachi, & propter uapores corruptos petentes stomachum, sentit dolorem in dorso propter uicinitatem, intestina enim alligantur dorso, & dolorem in cruribus propter nocumentum communicatum nervis ad crura descendentibus, & quia propter dolorem reuocatur calor ad uiscera.

Signa autem augmenti colicæ sunt fortificatio doloris & uenter stringitur, ita ut non possit egredi uentofitas, imo interdum non possunt eructare, & aliquando fit fortis punctio & dolor perforatiuus, & actualis, maxime quando uentofitas continetur inter tunicas intestinorum, sed quando materiæ continentur in concauo intestinorum est dolor communiter extensius & grauatiuus, & fit fortis sitis & non fatiatur, licet bibat plurimum, quoniam quod bibitur non penetrat ad hepar propter oppilationes in orificiis meseraicarum, quæ sequuntur uentrem, idest, ad intestina terminantur quæ sunt plena, & sic officia ipsarum oppilantur. Item fit sitis propter dolorem, & uigilias, & propter uapores fœcum calefacientes & exicantes humidum roridum oris stomachi. Item multiplicatur in aliquibus ipsorum tremor ablique causa, scilicet manifesta. Fit enim à uaporibus malignis petentibus cerebrum, & opprimentibus ipsum & nervos, & dolor etiam fortis communitate absoluta communicat omnibus membris. Item si aliquo ingenio aliquid egreditur per anū, illud est schibale, idest, stercorea sicca, rotunda, dura, sicut stercore ouium & caprarum magna & parua, quarum causa in anatomia intestinorum dicta fuit. Aliquando egreditur res natans in aqua propter uentofitatem inclusam subleuantem. Item fit frequens uomitus phlegmaticus, & cholericus, secundum plurimum phlegmaticus, deinde cholericus, deinde uomunt cholera poralem siue prasinam, deinde cholera eruginosam, & tandem melancholiam adustam, adurunt enim humores dolore, uigiliis, fame, medicinarum calidarum exhibitione, & fit uomitus frequens per communitatem stomachi ad intestina, & prohibitionem exitus per partem inferiorem & multitudinem materierum corruptarum, & quadoque uia cholerae ad intestina secundum plurimum costringitur, quare expellitur ad superiora. Item urina est tincta, propter conuersionem maioris partis cholerae ad renes cum non inuenit uiam ad intestina quæ sunt oppilata, & sic oppilata est extremitas poris sellei terminata ad intestina. Secundo tingitur propter dolorem. Tercio, quoniam renes communicant in dolore, & propter istud quandoque retinetur urina comprimitur enim uia transitus urinae. Et quandoque est urina in principio, sicut aqua ciceris, aut aqua casei dicta lactea, propter materias cum urina mixtas, licet sit etiam istud in fine, nisi uia transitus urinae oppilentur, fit enim lactea ex permixtione phlegmatis cum aquositate. Sed in ea quæ est si cut aqua ciceris permiscetur humores diuersi. Item aliqui associatur tremor cordis maximus, ita ut pectus indigeat retentione cum manu propter compassionem cordis in fortissimo dolore & uapores malignos ad ipsum eleuatos, & tandem peruenit ad syncopim, est enim tremor uia in syncopim & peruenit ad sudorem frigidum, & mortem. Sunt enim fœtor & dolor de maxime proferentibus uirtutem.

Signa colicæ salubris. Primum quia egrediuntur aliquando fœx & uentofitas. Secundum, est mutatio doloris de loco ad locum. Tercium, quia aliquando dolor interpolatur aut

saltem

saltem remittitur, & inuenit per clystera & alia remedia quietem, & per exitum uentositatis, & egestionis. Contraria autem significant colicam prauam, & aliquando mortalem. Sicut dolor fortissimus qui non minuitur neque permittitur. Secundo in qua nullo ingenio aliquid egreditur. Tertio, in qua uomitus consequitur uomitum, significat enim fortis oppilatio intestinorum, & materiam regurgitare ad stomachum, & quod peruenit ad uomitum foecum & cadit uirtus cum nihil retineat, quo possit nutrir. Item sudor frigidus & frigus extremitatum propter uehementiam doloris uentris, & declinationem sanguinis, & spiritus ad ipsum. Item quando peruenit ad singulum, quorum unus sequitur alium propter magnum nocumtum communicatum ori stomachi. Item quandoque peruenit ad turbationem rationis, & spasum, significatur enim materiam communicari cerebro & nervis aut saltem est communicatio absoluta propter doloris uehementiam. Et ex signis extraneis est cum apparet in colico uestigium & bochor nigri sicut faba, & ulceratur, & remanet usque ad diem secundum, aut parum plus, quoniam moritur, significatur enim materia melancholica adusta, quia est bochor nigrum & ulceratur, cuius materia natura tentat expulsionem, & non potest expellere nisi modicam rem, quapropter cum maligna sit necessarium est naturam cito succumbere, praeput in colica quae est agritudo acuta, & subdit, quod huic homini aduenit subeth in principio, materia aut saltem multis uaporibus cerebrum opprimetibus, ultimum est quod bonitas anhelitus est bona significatio ad euadendum sicut e contra malitia anhelitus est efficax signum ad moriendum. Differentia inter dolorem colicum & renalem ex lapide. Quia dolor colicus & renalis maxime ex lapide multum simulantur propter propinquitatem colon renibus, & proprie reni sinistro & colligatum eorum adiuuic. Ideo signa distinctiua inter hos dolores sunt ponendo quae penes Auiennam sumuntur ex sex.

Primum est ex parte doloris quatuor modis, scilicet quantitate, loco, tempore & motu. Quantitate, quia renalis paruum occupat spacium, colicus autem magnum. Loco, quia colicus incipit à dextro secundum plurimum, & transit ad finistram super aquitans stomachum. Quandoque etiam incipit à sinistra, & uertitur uersus mirach & pecten, ille enim est locus intestinorum crassorum, & quando magnificatur & extenditur, dilatur dextra & sinistra, & in fumina est declinior ad anteriora quam ad posteriora. Sed renalis incipit à superioribus posterius ubi sunt renes, & descendit paulatim per poros uritides usque ad uescam, & est declinior ad posteriora ubi sunt renes. A tempore uero, quia renalis est fortis, & quando stomachus est uacuuus à cibo, & colicus alieuiatur. Sed e contra renalis alieuiatur cum sumitur cibibus & colicus fortificatur. Huiusmodi autem causa est, quia stomacho uacuo renes dolore inflammati non refrigerantur nec remolluntur, sed sumpto cibo aliquibus partibus uaporosis, aut subtilibus aquosis cito penetrantibus humectantur & remolluntur, & sic dolor sedatur. E contra uero sumpto cibo colon à stomacho pleno & grauate comprimitur, & dolet. Item per descensum cibi augeatur repletio in colon, item colicus fit subito, sicut in eo uelociter fit oppilatio, imo melius sicut facta oppilatione à uentositate retenta fit extensio, & renalis non fit ita subito cum lapis non subito generatur, licet aliquando intendatur subito cum lapis incepit moueri. Quarto principaliter sumitur differentia ex motu doloris, quia colicus mouetur ad plures partes uentris & magnum occupat spacium, sed renalis stat fixus, & si mouetur, mouetur descendendo solum secundum incesum pororum uritidum, & sic sunt quatuor differentiae ex dolore sumptae. Secunda differentia principalis est ex parte uicinantium, quia in lapide dolet dorsum totum, & multiplicatur tremor & impotentia flexionis corporis, & erectionis. Et in colico non. Tertia differentia principalis est ex parte iuuantium & nocentium, quia in colica exitus foecum & uentositatis per clystera, & alia non solum alieuiatur, imo perfecte curant, sed in dolore lapidis, licet alieuiant, tamen parum & saltem non curant nisi exeat lapis, & e contra medicinae frangentes lapidem & prouocantur curant lapidem & non colicam. Quarta differentia principalis sumitur ex eo quod egreditur aut retinetur,

quia in colica cā adest dolor retinentur schibale ster-
cus sicum & steruus uaccinum, & forte adest rugitus ex prae-
sentia uentositatis, & cum huiusmodi educuntur curatur.
Sed cum adest dolor renalis est in uis urinæ praesentia lapi-
dis aut arenularum conglobatarum & per istarum exitu cu-
ratur. Quinta differentia principaliter est ex parte ultimi-
tatis accidit quoniam dolor crurium & dorsi & tremor
in renali est plus, sed casus, appetitus & uomitus freques par-
uitas digestionis, uehementia doloris & perductio ad synco-
pim, & sudor frigidus in renali sunt minus. Sed e contra om-
nia se habent in dolore colico. Sexta differentia principa-
lis sumitur ex parte significationum & causis praecedenti-
um, quoniam frequentia nausearum facietatis & sumptio cibo-
rum malorum qui sunt aquosi, uentositates aut stiptici siue
pontici & uicissitudo punctoris & rugitus & retentio foecis
sunt praecedentes in colica, sed urina arenosa & filosa est
praecedens in renali, & non est in ea urina subtilis nisi dum
esset ultima oppilatio. Item renalem praecedunt grauitas re-
num, & sumptio ciborum uiscolorum quorum chimi sunt ma-
teria lapidis. Differentia autem inter dolorem colicum &
matricalem sumitur ex 5. Primum quia dolor matricis com-
municatur inguinibus, pectini, anchis & coxis & alcatum
& iliis & non ascendit supra ilia neque superequitat stoma-
chum, sed e contra licet colica communicet iliis & pectini,
tamen non communicat inguinibus & coxis, frequenter sto-
machum superequitat.

Secundum quia in dolore matricis licet sit uenter factus
lenis & eductus superfluitates intestinorum, tamen dolor non
sedatur, sed in colica sicca. Tertium, quia in dolore matri-
cis praecessit retentio menstruum & humiditatum consue-
tarum per uuluum euacuari, sed in colica praecessit foecis &
uentositatis retentio. Quartum, quia dolor matricis iuuat-
ur cum educatione humiditatum & uentositatis ex matrice,
colicus cum educatione foecum & superfluitatum intestino-
rum. Quintum, quia aliquando habens dolorem matricis
praefocatur uaporibus ascendentibus ad cor, diaphragma, non
autem sic in colica. Signa distinctiua in species colicae. Coli-
ca phlegmatica signatur per antecessiorem causam gene-
ratiuam phlegmatis ex facietate nausearum, & ex specie-
bus ciborum generantium phlegma. Item per aetatem scilicet
senectutis & pueritiae, & regionem frigidam & humidam.
Et tempus anni scilicet hyemem. Et reliqua, scilicet secundum ar-
tem & similia. Secundum signum est exitus phlegmatis an-
te cholicam & in ipsa colica cum sit clystere. Tertium est
frigidityas intestinorum & grauitas sensata propter frigiditya-
tem & grauitatem phlegmatis. Quartum est uehementia
retentionis, ita ut non egrediatur aliquid de foece aut humo-
re & uentositate, & si quid egreditur illud est res inflata sicut
steruus uaccinum natas, quale egreditur in uentosa propter
phlegma quod uentofatur. Et si comparatur ad uentofam do-
lor est remissior quam dolor uentofus, sed est longioris dura-
tionis cum difficile sit illud phlegma educere propter sui cras-
sitiem & uentositatem, licet non tantam faciat extensionem
sicut uentofitas, & per consequens non ita intensum doloré.
nec decipiat aliquis propter situm inflammationem & ru-
bedinem aquae, & estimet quod agritudo sit calida, haec nan-
que sunt omnibus colicis communia.

Prognosticum. Colica phlegmatica secundum plurimum
curatur. Signa uentofae sunt ista. Primum est antecessio cau-
sarum uentositatis sicut est multitudo potus aquae frigidae.
Item potus uini commixti & olera inflatiua scilicet in qui-
bus est humiditas superflua & fructus humidi inflatiui. Secū-
dum quod cibis non sunt digesti. Tertium rugitus. Quar-
tum retentio foecum in intestinis prohibentium exitum uen-
tositatis. Item extensio & uolutatio uehementis, id est, inque-
tudo propter magnitudinem doloris, quasi intestinum tere-
bello perforetur & quasi in intestino occultetur acus, & haec
accidentia licet aliquando sint in phlegmatica cum retinetur
uentofitas aut generet ipsam sunt tamen fortiora in uentofa.
Et cum hoc in uentofa non est grauedo sensata in phleg-
matica. Item in uentofa quandoque praecedunt rugitus plu-
rimi & uentositates. Et quandoque uenter non rugit, & for-
tasse non rugit nisi cum sit euaporatio & compressio. Et quā-
doque figitur dolor & non permutatur. Et quandoque co-

Io. Arculani a 4 gnoscitur

gnosceitur inflatio cum manu & secundum plurimum iuuatur compressione & euaporatio quadoque iuuat, quandoque nō. Iuuat enim cum est pauca & subtilis ita ut subtiliata possit resolui. Cum autem est multa & crassa, & in aliquo loco conclusa tunc euaporatio nocet. Et similiter cum eius materia est sicca melancholica. Item significat ipsam inflationem foecis uaccinae quae plena uentositate natat super aqua. Et quandoque est cum ea uenter lenis fluens & egrediuntur humores & non iuuatur propter retentionem uentositatis crassae inter tunicas. Et ex signis propriis significantibus ipsam contineri inter duas tunicas intestini est dolor fortis perforatiuus in eodem loco semper permanens. Et illa in qua est permutatio doloris est incolumior. Sed in qua est inflatio sicut in tympanite est mala, significat enim corruptionem digestionis stomachi & hepatis.

Prognosticum. Colica uentosa secundum plurimum curatur & si prolongatur transit in tympanitem. Signa colicae ex foecis sunt antecepsio retentionis foecis ante colicam cum tensione, & grauitate uehementi, & sentitur quasi intestinum rumpatur, & quandoque fit tenebrum propter foecem stimulantem intestinum rectum & grauantem ipsum, & proprie extremitatem eius, & tamen non egreditur aliquid propter foecis crassitatem aut duritiem. Et quandoque egreditur res uiscosa & crassa, scilicet parum phlegmatis aut parum foecis durae phlegmata inuoluta, aut quibusdam mucilaginibus, quarum magna est copia in intestinis crasis. Verum illa quae est ex foecis exiccata a cholera significat tinctura foecis, mordicatio, adustio & inflammatio, siccitas linguae, & multitudo eius, quod egreditur de cholera, & aduentus quietis cum fluxu cholerae, & nocetur a fame & iuuatur a frigidis temperatis. Sed feculentam factam a raritate corporis significat praecipuo paruitatis foecis durae, extenuatio corporis, item uelocitas & facilitas laedendi a calore & frigore extrinseco, ite paucitas pilorum. Sed foeculentam factam a caliditate & siccitate uentris significat intentio inflammationis, & siccitas mirach, & tenebrositas eius & siccitas egestionis cum nigredine. Sed foeculentam factam a resolutione aeris, balneo exercitio, sudore, & reliquis similibus significat praecipuo paruitatis foecis & antecepsio causarum praedictarum. Sed si gna facta ex retentione cholerae, ita ut non transeat ad intestina sunt signa icteritiae supra scriptae in capitulo proprio, & albedo foecis cum difficultate exitus eius, & forte aderit icteritia. Signa uero colicae foeculentae a causis primitiuis, sicut a comestione rerum siccarum, aut exiccantium, aut quia homo propter occupationem tardauerit egestionem, aut quia foex sit exiccata propter ieiunium sunt ipsamet causa primitiua, & consecutio duritiei foecis post ipsas, & idem sit iudicium in omnibus causis primitiuis. Signa autem superfluae caliditatis hepatis propter nimiam attractionem foeces exiccantis, & similiter frigiditatis eius sunt manifesta ex his quae superius dicta sunt in passionibus hepatis.

Prognosticum. Colica ex foecis secundum plurimum curatur. Signa apostemata sunt. Si sanguineus est tumor, durities tensiva, dolor continuus, extensius & grauius, fixus in loco uno cum pulsatione & inflatione, febris acuta, sitis uehementis, rubedo in colore, retentio urinae apostemate comprimente uias urinae, & est signum forte magnitudinis apostematis. Item laedi cum fluxu cum exitu peruenit ad locum apostemosum, & quandoque est iste dolor cum lenitate uentris, & quandoque perducit ad frigus extremitatum cum calore uehementi in uentre, & quandoque rubet locus uentris exterior, & significat magnitudinem apostematis, aut quia forte apostema permutatur exterius. Si uero apostema fuerit cholericum erunt tensio, pulsatio & grauitas minus, & febris & inflammatio & mordicatio uehementius. Signa apostematis phlegmatici, & est parum, sunt. Ut sit dolor continuus in loco uno, & proprie cum descendit aliquid per partem apostematam. Et inuenitur cum manu inflatio cum lenitate. Et habitudo aegri est habitudo mollium phlegmaticorum. Et forte iam praemissum est regimen phlegmatis multiplicarium sicut lactis, piscium, olerum & fructuum frigidorum humidorum & carniuum crassarum. Et est sperma eius frigidum subtile, & est signum conueniens adhuc, & egestio est phlegmatica. A melancholia non prouenit nisi rarissime, & posset fieri permutando ex apostemate

sanguineo & etiam incipiendo, & signa ex praedictis in hoc cap. de apostemate stomachi patere possunt.

Prognosticum. Colica sequens apostema intestinis crasis secundum plurimum curatur. Sed in gracilibus si fuerit notabile, secundum plurimum mortalis. Signa facta ex torsione intestini & ex aperitione didimi & ruptura eius aut siphac sunt. Si est ex torsione uentus eius subito post motum laboriosum aut saltum uehementem, aut casum, aut percussione, aut calcationem, aut lutationem, aut tolerantiam poderis, aut quia praecessit uentositatis uehementis haec omnia contorquent intestinum rumpendo ligamenta. Item secundum plurimum dolor est similis a principio usque in finem non addens neque minuens. Si uero sit ex dilatatione aut ruptura didimi apparet tumor oschei repleti ex intestino quod descendit ad bursum. Si uero siphac in aliqua parte ruptum fuerit apparet ibi tumor ubi ingressum est intestinum, & in omnibus his casibus fit retentio foecum secundum plurimum.

Prognosticum. Colica sequens contorsionem intestini nunquam sanatur nisi Deus uoluerit, & nisi a casu intestinum ad oppositam differentiam reuolutum redeat ad situm naturalem. Colica autem sequens descensum intestini in bursum testiculorum aut in rupturam siphac curatur secundum plurimum. Nam secundum plurimum reduci potest ad intra uentrem & ad situm naturalem, sed non apud inexpertos, & istae sunt species famosae colicae secundum plurimum uenientes. Sed signa reliquarum specierum colicae rarius eueniunt breuiter absoluam. Signa ergo facta a frigiditate intestinorum sunt paruitas sitis, sensibilitas frigoris in intestinis, leuitas doloris sine grauitate, item inflatio egestionis, & quando est sperma cum ea frigidum. Iuuatur a calidis, nocetur a frigidis. Et signa facta ex caliditate sine materia sunt signa contraria. Et signa facta ex siccitate sunt egestio, ualde sicca, corporis exiccatio & cutis, uentris subtilitatio & asperitas, & signa facta ex praesentia cholerae in intestinis sunt regimen praecedens multiplicium cholerae, aetas, tempus, regio & forma, mordicatio uehementis, & inflammatio, item noceri a clysteribus acutis, item noceri ab his quae educunt cholerae, quia in ipsa actuali educatione dolor augetur, licet educit cholerae, postea inuuet, quia causa doloris remouetur nisi cholera fuerit imbibita, & quandoque associatur ei febris, & non est febris intensa neque cum ea magnitudine accidentium quae reperitur in colica apostemosa. Et quandoque associatur dolor in pectine quasi punctura cultelli absque uentositate. Sed signa facta ex melancholia sunt eructatio acris, nigredo egestionis, inflatio uentris cum paruitate doloris & reliqua signa communia attestantia melancholiam. Sed signa debilitatis expulsiuae sunt ut iam antecepsio lenitas uentris & necessitas surgendi frequenter ad assellandum. Sed egerebatur parum pro uice. Item antecepsio causarum debilitantium uirtutem ex calore, frigore, & reliquis, aut praesumptio alicuius rei debilitantis uirtutem uenenosae aut non uenenosae. Et multoties accidit ut uenter sit lenis aut temperatus, & sit quantitas & qualitas egestionis secundum cursum naturalem, & tamen non potest egredi foex, nisi cum clystere aut suppositorio aut alio ingenio. Et istud est quandoque propter fistulam in sphincteri aut ragadias aut haemorrhoidas aut alia similia nocumenta propter quae natura terretur in emittendo foeces. Et quandoque accidit propter obtusionem sensus. Et quandoque propter debilitatem musculorum uentris, discurret ergo medicus, & causam inueniat. Sed signa colicae sequentis debilitatem sensus sunt ut patiens sumat ea quae faciunt foecem mordicantem, & non percipiatur in assellatione, haec autem sunt sicut capere porrum, caseus salitus & cetera acuta. Item quod non sentitur nocumentum suppositoriorum acutorum, & uenter inflatur ex eis quae retinentur & non doleat dolore notabili. Sed signa facta ex uermibus sunt signa uermium, de quibus infra & antecepsio exitus eorum. Signa autem colicae a solutione continui in intestinis sunt exitus sanguinis aut faecis, aut forte praecessit apostema quod ruptum est. Si uero causa eius fuerit lapis in intestinis, erit ibi grauedo, & punctio & quod alias praecedenti tempore genitus sit & eductus. Sed signa colicae per communitatem a stomacho, cerebro, spiritualibus, hepate, splene, renibus uescica, matrice, mirach, & toto, sunt quia praecesserunt nocumenta eorum membrorum

membrorum aut totius, cum quorum augmento augetur colica, diminutione minuitur, & quibus recedentibus colica recedit. Signa colicæ contagiosæ & pestilentialis est ipse trāsitus de homine ad hominem & de regione ad regionem, & quod maxime accidit his qui conuersantur, & hæc frequenter est mortalis, secundum plurimum colica ileos.

Signa autem causarum primitiuarum colicæ est ipsarum causarum præcessio & subleuatio colicæ secundum plurimū his causis præcedentibus. Prognosticum. Hæ species colicæ secundum plurimum curantur præter pestilentiam. Cum uentum est ad uomitum fœcum in quacunque specie mortale secundum plurimum.

Si cum dolore uentris fuerit ipsius constrictione et nausea, sed nec calor, nec febris affuerit, ea egro dāda sunt que uentrem sine uomendi desiderio soluant ut est electariū de gallia. Quod Rec. mastichis, gariophyl. zing. melanopiperis, macropiperis, cinamomi, nucis muscatae, galliæ, omnium ana. drach. 10. scammonæ, drach. 10. postea exprimantur citonia acetosa, & recentia, & succus eorum cum eiusdem quantitatis melle misceantur & coquantur usque ad spissitudinem paulatim. Et conficiatur ex eo medicamen, quod tamen eiusdem quantitatis sit, cuius species sunt. Cuius dosi sit ab aur. 2. usque ad. 2. & 3.

Hic Rasis incipit determinare de passionibus intestinorum, & in primo cap. determinat de doloribus intestinorum, in secundo de fluxibus. Causam autem de uermibus postponit. Sed primum cap. de dolore intestinorum diuiditur in sex partes. In prima determinat dolore intestinorum à phlegmate & cholera, siue sit dolor colicus siue iliacus. In secunda ibi. Quod si cum uentris dolore, determinat de colica uento. In tertia ibi. Si autem cum dolore febris affuerit determinat de colica à causa calida inuenta cum febre. In quarta ibi. Cum autem locus doloris, determinat de colica apostemosa. In quinta ibi. Qui autem cum hoc dolore. ponit regimen præseruatium à colica uento. In sexta ibi. Sed si cui dolor iste, redit ad ponendum curam colicæ à causa calida. Primā diuidi in quatuor. In prima ponit curam doloris intestinorum siue colici siue iliaci cum electario solutiuo, quando est cum uehementi nausea. In secunda ibi. Quod si nausæ uehementia non fuerit, ponit curam huius doloris cum pilulis solutiuo, quando est sine uehementi nausea. In tertia ibi. Si autem passio iliacæ curat hunc dolorem cum suppositoriis. In quarta ibi. Et si non contulerit curat hunc dolorem cum clysteribus. quid dicat in prima parte satis est manifestum.

Curat hunc dolorem existentem cum nausea cum electario de gallia stomachi confortatio ne sequatur uomitus. Est tamen tutius ut præmittantur aliqua clysteria, ut uenter sit obediens, ne medicina solutua efficiatur uomitiua. Recipe ordinetur hoc modo. R. mastichis, gariophylorum, zing. melanopiperis, id est nigri piperis, macropiperis, id est, magni siue longi piperis, cinamomi, nucis muscatae, galliæ, calefangiæ descriptio. Mes. omnium ana. 3. 10. scammonæ. 3. 10. succi citoniorum acetosorum recentium, mellis ana. lib. 1. bulliant primo succus, & mel lento igne paulatim ad succi consumptionem, & in fine pulvis iam dictis secum misceatur. Vult enim Rasis quod mel remanens in fine postquam est cum succo bullitum sit tantæ quantitatis quantæ est pulvis secum miscendus, quod tamen inusitatum. At plus enim in communi usu ponitur pro una lib. mellis tres. 3. pulueris, sed hoc non erit electarium, sed una massa solida, dosi eius est à 3. 2. usque ad. 3. 1. cum dimidia. Et si bene computas dosis non est magna; erunt enim pro uia quaque dosi à 6. usque ad 7. gran. scammonæ, & non est aliud solutiuum. De qua re admirandum est cum intentio sua fuerit principaliter soluere phlegma, quod patet ex pilulis sequentibus in textu Rasis. Credo in textu Rasis esse defectum. Et quod debuerit esse in hoc electario saltem. 28. 3. turbit. Quod patet ex duobus. Primo quia dos. apud consuetudinem. Mes. est parua. Secundo, quia Mes. describens hoc electarium in suo antidotario distinctione tertia in fine. Quando uult soluere cholera: & phlegma permiscet turbit cum scammonæ. Et tu si placet

uide descripti onem eius. Aut oportet dicere, quod intentio Rasis fuerit solum soluere cholera, quod non est bene consonum receptis sequentibus. Ego autem tibi consulo, ut in hac recepta. Mes. sequaris, qui cum uult soluere solum cholera ponit solum scammonæ. Cum uult soluere cholera & phlegma ponit scammonæ & turbit. Si autem solum uult soluere phlegma, ponit turbit, & loco scammonæ tantum cartami excorticati. Et si uult educere solum melancholiam, loco istorum ponit elleborum epithymum & polypodium. Vel si uis potes dicere, quod in isto electario ponit piper nigrum, & piper longum, qui soluunt phlegma liquefaciendo & ipsum dissoluendo & uirtutem stimulo. Nec mireris de hoc, nam ipse Rasis in suo antidotario conficit pilulas ualentes in nausætiua satietate & in colica soluentes, in quibus tamen nihil ponitur solutiuum nisi piper & faccharum. & ita facit Auic. in cap. de colica, & Ral. in suo antidotario ponens hancmet receptam ex succo citoniorum non ponit nisi scammonæ. Hic ut libet. Et si instetur, quod dosis est parua contra consuetudinem Ral. Responde quod in colica solutiuum non debent esse multum fortia, ne forte perueniatur ad uomitum fœcum. Et hæc responsio est conformis intentioni Rasis in diuisionibus in cap. de colica, ubi in colica perueniente à phlegmate crasso dicit quod hora paroxysmi succurratur cum clysteri lenitio solutiuo. Et si sufficit bene est. Et si non cum solutione mediocri. & si sufficit quando est, & si non, cum acuto solutiuo, & detur electarium de dactylis. Et electarium diacitoniten solutiuum. Et certum est quod non loquitur de alio diacitoniten solutiuo, nisi quod hic describitur & in antidotario suo.

Quod, si nausæ uehementia non fuerit, nec ager medicinas uomuerit, pilule iliacæ sunt dande. quæ Rec. colocynthidis sagapeni amborum ana. 3. 10. scammonæ drach. 3. & tertiam. informentur pilula, de quibus unius aur. pondus est dandum; uelociter enim passionem dissolunt ilicam.

Hic Ral. non existente nausæ magna dat pilulas proprias contra passionem iliacam, ut R. colocynthidis calidæ, sicca, educentes phlegma crassum & conferentis colicæ phlegmaticæ & uentose iuuamentum ultimum, & similiter hydropicis, sagapeni calidi & sic. quod bibitum & clysterizatum confert colicæ phlegmaticæ & uentose, ana. 3. 10. scammonæ. 3. 3. & formetur pilula de quibus pondus aur. 1. est dandū, uelociter enim passionem dissolunt iliacam. Ista est medicina fortis, à qua non est incipiendum, imo præmittenda sunt clysteria, & non auderem ex pilulis his dare. 3. 1. & iam uidi cum hoc solutiuo quandam peruenisse ad uomitum fœcum, cui etiam fractum est intestinum & uenter plenus est fœcibus, ac si esset hydropicus & foetens erat & mortuus est tertia die post hoc solutiuum, & in quinta die à principio ægritudinis. Cum tamen etiam patientes iliacam non moriantur de intentione Auic. & ut dicit experientia ante seprimum diem. Ego itaque consulo ut incipias à clysteribus, & si non sufficiat peruenias ad solutiuum leuia, sicut sunt pilula alephagina & similia leuia. Quod etiam consilium habes à Rasi in diuisionibus loco statim allegato.

Si autem passio iliacæ difficilis fuerit, nec medicamina uentris solutiuia eis contulerint, hoc suppone collyrium. Quod recipe salis panis, drach. 10. colocynthidis interioris, scammonæ amborum, ana. drach. 2. et. 5. fiant ex eis collyria longa & supponantur.

Curat hanc passionem cum suppositoriis, & solum in textu ponit pulueres solutiuos. Sed debent sic ordinari. R. panis salis. 3. 10. & est sal quo communiter utimur & ponitur in pane, colocynthidis interiorum, scammonæ ana, amborum. 3. 5. mellis. 3. 5. bulliat mel & addantur pulueres superscripti & fiant suppositoria longa, etiam usque ad longitudinem. 7. digitorum coniunctorum, est enim intestinum rectū, longum satis & latum, ita ut sit capax huiusmodi liciniorum.

Et si contulerint ex enemate leni clysterizetur. Quod Rec. ficus citrinas. 5. furfuris quantum una manu capi potest, maluanis, manip. 1. hæc in panno ligata et sicla solia. 10. in. 2. lib. aquæ coquantur, donec ad unam redeant, deinde

de coletur & ponatur super eam baurach pōdus unius aur. dlei sesamini, unc. 1. & fiat clystere ex eo. Si autem quis fortius & acutius facere uoluerit pondus aur. 1. de collyrio quod prius diximus admisceat. Clystere uehementer solues, quod tunc utendum est cum medicamina non conferunt, nec uenter soluitur, Rec. colocynthidis interioris. 3. 10. centaurea. 3. 5. buchormariem, arthanita, amborum, ana. 3. 2. mentastri, ruta, origani, omnium ana, manip. 1. omnia in tribus lib. aqua donec ad tertias duas redeant, coquantur, et colentur: deinde dissoluantur in ea alchitram, mellis, amborum, ana. 3. 3. castorei, sagapeni, opopanaci, collyrii, quod praximum, omnium ana. 3. 2. misceantur omnia, & dum est tepidum, fiat ex eo enema. Et si schibale non exierint iteretur clystere donec exire uidentur, hoc nanque clystere admistrari debet cum res fortissima est & pessima, et in colica mala, & est illa in qua fit nausea ualde uehemens et inferius nihil egreditur. Huic præterea egritudine quandoque seti da superuenit eruatio & plerumque stercus per os egreditur, quod cum accidit sæpe mortem portendit.

Curat hanc passionem clysteribus lenitiuis. Quæ si non suffecerint docet clysteri admisceri aureum unum pulueris collyrii supra scripti. Et si hæc non cōferunt, docet Rasis imponere clystere ultimum & fortissimum etiā multoties iterandum si schibale & reliqua oppilatiua non exierint. Similia nanq; clysteria fortia zeri conuenit in colica & iliaca mala, in qua timetur ne foeces euomantur. Nam uomitus stercoris sæpe portendit mortem. Buchormariem & arthanita, sunt duæ species mali terræ siue panis porcini, siue cyclaminis, idem enim sunt, alchitram est pix apud alios gummi cedri. Reliqua nota sunt. Sed certe tutius est primo incipere à clysteribus lenitiuis, quæ si non suffecerint procedatur ad clysteria fortia; & his non sufficientibus ad solutiua leuia, & ultimo ad fortia.

Quod si cum dolore uentris non fuerit ipsius structura, sed inflatio & rugitus & tensio in uentre existunt, confectio de baccis lauri danda est, quæ rec. foliorum rutæ siccorum drach. 10. ameos, cimini, nigella, cheisin, origani, carui alexandrini sem. amygdalarum amar. melanopiperis, macropiperis, mentastri, dauci, acori, baccarum, laur. casto. omnium ana. drach. 2. sagapeni, drach. 4. opopanaci, drach. 3. conficiantur cum melle eiusdem ponderis, cuius dosi sit ut auelana una, aut nabatha multis nicibus cum unc. 1. uini calefacti, aut cum apozemate de radicib. Huic confectio in remouenda uentositate, & dissoluenda nihil equiparatur. Hoc præterea suppositorium subiiciatur, quod sit uentositatis dissolutiuum. Rec. cimini, foliorum rutæ uiridis, amborum, ana manip. 1. buchormariem, arthanita, amborum, ana. 3. 3. baurach. 3. 1. conficiantur ex melle & superponantur cum sponsia uel lana, hoc enim dissoluit uentositatem inferius & expellit. Venter quoque asidue ex panno calido, uaporandus est, & æger in tina mittendus. Si autem hæc non suffecerint uentosa cum igne ponenda est, & locus donec ruberè cæperit fricandus. Post hæc inunctio fieri conuenit ex oleo rutaceo, & ex alijs oleis calidis, & ex eis clysterizandus est æger postquam eis admixta fuerint castoreu, euphorbium, amborum ana drach. 5. Hanc uero solitus pati egritudinem, dum sanus est caueat ne uinum aqua mixtū bibat, nec etiam sumat uinum nisi purum, et forte nec aquam multam bibat, & abstineat ab herbis & lacte, et omnibus inflatiuis.

Philonium faciens iliofis cum maximo coartantur dolore & timetur ne syncopis superueniat, uentositatem carminat & somnum prouocat, Rec. piperis, ameos, foliorum rutæ, mentastri, castorei, baccarum, lauri, cimini, omnium, ana, unc. 1. opij, mandragoræ, hyoscyami, se. omnium, ana, unc. 5. conficiantur cum melle eiusdem quantitatis detur ex eo pon-

das aur. unius huic quoque electario additur plerumq; scammonæ, unc. tertia, & fit tunc medicamen uentris solutiuum.

In hac secūda parte principali curat colicam siue iliacam uentosam. Et diuiditur in partes septem. Primo ponitur curam per electarium, quādo non est in uentre constipatio. In secunda ibi. Hoc præterea curat colicam & maxime cum uentris constipatione, cum suppositoio. In tertia ibi. Venter quoq; curat per approximationem panni calidi & balneum. In quarta ibi. Si autem hæc non suffecerint curat cum uentosa. In quinta ibi. Post hæc inunctionem fieri conuenit, curat cum inctione & clysteribus. In sexta ibi. Hanc uero solitus pati docet à quibus est cauendum tempore sanitatis. In septima ibi. Philonium. ponit philonium ultimum in sedando dolores fortissimos. Quæ dicit in prima parte satis nota sunt. Cheisin, id est, semen leuistici, alexandrini seminis, id est, petroselinii, & iubet omnia permisceri cum melle tantæ quantitatis, quantæ sunt, reliqua, quod tamen ut statim dixi non est in communi usu, dosi huius electarii sunt, ut auelana aut nabatha, id est, in iuba siluestris & misceatur cum. 3. 1. uini calefacti potentis, aut detur cum apozemate ex radicibus superius dictis in capite de dolore hepatis. In secunda parte curat colicam cum suppositoio, sed ponit extraneum modum faciendi hoc suppositoio, facit enim primo electarium cum melle ut patet. deinde facit suppositoium de sponsia uel de lana in cōmuni forma, quod postea intingit in electario dicto & supponit. Sed certe præstantius esset facere suppositoium in communi forma, faciendo mel per decoctionem inspissari sicut dictum fuit in alio suppositoio. In tertia parte quæ dicit nota sunt, sed balneum illud siue tina debet esse cum decoctione rerum carminantium uentositatem. In quarta parte quæ dicit sunt manifesta. Ventosa enim habet soluere uentositatem, & debet esse uentosa magna. In quinta parte quæ dicit sunt manifesta. Et nota quod ponit in clysteri castorei, euphorbii, ana. 3. 5. Est forte insolitum, & non auderem facere nisi in forti, & non in puero, neq; in prægnate, prouocat enim abortum mirabiliter. In sexta parte quæ dicit sunt manifesta. In septima parte describit philonium, ualde efficax in sedando dolore uentosi & quæcumq; alium dolorem maxime à frigida causa, sed non debet dari, nisi in casibus extremis, & cum alia non cōtulerint, nec debet multum frequentari, sedat enim dolorem stupefactionis, & subdit quod huic electario additur tertia pars. 3. scammonæ & efficitur solutiuum. Et nota quod est bonum ingonium cum stupefactionis miscere solutiua, simul enim perficitur cura uera & mendosa, stupefactionium potest minus nocere, quando est iunctum solutiuo.

Si autem cum dolore febris affuerit, cassia fist. in succo endiuie bullito & dispumato dissoluta ægro est danda. Et syrrius uiola. in potu est tribuendus. Et nutriendus est ex taphea cum oleo de amygdalis dulcibus condita. Et ex leni clysteri clysterizandus.

In hac tertia parte principali curat colicam pendente à cholera, & docet lenire uentrem cum cassia dissoluta, cum succo endiuie bullito, donec dispumetur. Et clysterizetur cum clysteribus lenientibus frigidis. Et nutrit ægrum ex taphea. Taphea est duplex, una alba quæ fit ex sola aqua & carne. altera uiridis quæ fit ex aqua & carne & coriandro uel ali qua herba uiridi. Et per hæc intelligit cibaria frigida & humida. Omittantur tamen ea, quæ à proprietate faciunt colicam sicut cucurbita & similia.

Cum autem locus doloris in uentre apparuerit crassus, et æger habens apostema in principio phlebotometur. deinde cassia fistula, cum succo herbarum sæpe danda est. Et sit cibus eius, cui hic dolor ex consuetudine accidere solet, taphea mictuosa, cum saccharo, & oleo sesamino. Et abstineat à stipticis, & acetosis, & à cibis crassis, & uentrem stringentibus.

In hac quarta parte principali curat colicā apostemofam, quapropter præcipit phlebotomiam in principio, scilicet ex basilica, & hauriatur quantitas sanguinis notabilis secundum exigentiam repletionis & uirtutis. deinde detur cassia cum succo

fucco herbarum frigidarum, sicut endiuia, lactuca, & similia. Intendit enim curare apostema calidum, nam hoc secū dum plurimum euenit, cetera manifesta sunt.

Qui autem cum hoc dolore uentositatem pati solitus est, cibetur cum calagia & mutagenat conditis cum seminibus. Et abstineat ab oleribus & lacte, & omnibus que inflent. Et bibat uinum forte, & non uiciatum, aut hydromel cum speciebus que pro condimento ponuntur, ut piper quas diceamus. Confectio hydromelis. Recipe mel mundi, lib. 1. aque lib. 6. misceantur & coquantur diu & sumetur bene, donec fiat ad spissitudinem iulep. Cumque hoc factum fuerit in unaquaque libra, ex eo mittantur. 3. 2. puluerizati piperis in panno ligati, donec appropinquet finis decoctionis eius & cum infrigidatur extrahatur pannus & exprimatur, & cum necesse fuerit propinetur.

In hac quinta parte principali, primo docet præseruare à dolore uentoso, licet hoc regimen etiam conferat in cura doloris colici præsentis. In secunda ibi. Confert etiam, describit medicinam conferentem in actuali dolore. Que dicit in prima manifesta sunt. Calagia & mutagenat sunt cibi apud Arabes, qui sunt in carola ex carnis minutim incisum cum aromaticis & seminibus resoluentibus uentositatem. Hydromel, id est, aqua mellis.

Confert etiam cui hæc passio ex uentositate & crassa superfluitate accidere solet oleum de cherua recenti cum apozemate de seminibus sumptum. Apozema de seminibus hoc est, recipe, ameos, cymini, cheism, carui, origani, nigelle, omniū, aut pugillum unum. Istis autem admisceantur, lib. 3. aque & coquantur, donec ad libram unam semis redeant, de hoc itaque apozemate sumantur uncie due, quibus drach. 3. olei de cherua addatur & multis diebus bibantur.

In secunda parte docet dare olei de cherua. 3. 7. cum uncis duabus apozematis, id est, decoctionis de seminibus diebus pluribus stomacho ieiuno. Cherna Arabice est planta, que communiter uocatur pentadactylus, cataputia maior & à quibusdam sponsa solis. apud Dioscoridem uocatur cici nus aut sesamum agrestis, ex hac recenti fit oleum de cherua granis eius expressis.

Sed si cui dolor iste cum calore supervenerit pruna. 20. & ficus citrina. 5. & passularum enucleatarum. 3. 5. sumantur & coquantur & coletur cui oleum amigd. admisceantur, deinde cassia fistula, in eo dissoluta coletur et misceatur. Et ex apozemate quod in capite de rheumatismo diximus in potu tribuatur. Venter uero si multum fuerit siccus prædicto apozemati addantur polypodij & turbiti amborum, ana. 3. 2. & coquantur cum eo, & detur donec uenter solvatur, cum autem solutus fuerit remoueat polypodium & turbiti. Confectio electarij que uentrem soluens destruit uentositatem & grauedinem. Recipe turbiti albi fricati & puluerizati. 3. 20. sacchari. 3. 30. zing. 3. 10. huius pulueris. 3. 3. ad bibendum tribuantur. Pilule de quibus cum quis uentrem soluere uoluerit unam sumere debet, que & appetitum excitant & in statione resoluunt & grauedinem & cibum digerunt. Recipe mastichis, zing. cinnamomi, carioph. nechere misch, melanopiper, macropiperis, scammones, sacch. violacei omnium ana. drach. 1. fiant ex eis pilule ad magnitudinem ciceris & sumatur una, mouebit enim semel aut bis.

In hac sexta parte principali redit ad ponendum curam colicæ à causa calida siue quando cum cholica coniungitur febris. Et primo docet soluere uentrem cum hac medicina. Recipe prunorum, ros. ficum citrinorum quinque, passularum enucleatarum. 3. 5. incidantur incidenda, & coquantur in duabus libris aque ad consumptionem duarum partium & cum. 3. 5. huius decoct. trahatur cassia floris. 3. 1. cui tori addatur, olei amig. dulcium recentium. 3. 1. & calida exhibetur sto-

macho ieiunio, hæc enim leniendo fœces exiccatas educit & non inflamat, & est medicina secuta. Item docet exhibere decoctionem, quam superius posuit in cap. de catarrho. Et est prima decoctio ibi posita uentris lenitiua, & si uenter fuerit nimis stipticus docet admisceri illi decoctioni turbiti polipodij ana. 3. 2. que debent bullire cum ceteris positus in decoctione ista ita ut uentrem sufficienter soluat. Sed cui uenter solutus fuerit administretur sola decoctio prima. Ista enim sufficit ad tenendum uentrem lenem, tandem & a sis ponit duas receptas conuenientes in colica. Prima est satis manifesta, ualens in colica phlegmatica, & sumatur cum custodia. Turbiti enim est solutiuum phlegmatis satis forte, & si sit confortati cum zing. sicut hic soluit phlegma crassum. Si uero non, soluit phlegma aquosum. Secundo describit receptam pilu. ualentium in causa mixta, quas magnis laudibus extollit, & possunt sumi per horam ante cibum.

Melius tamē est propter scammonem ut seruetur aliqua custodia, & que dicit patent. Necheremisch dicitur esse rosa asinina, & dicitur quod est species endiuia alibi pœonia.

Pro cura colicæ sunt præmittendi quidam canones generales & sunt. 1. 3. Primus quod regimen colicæ nō tardetur, est enim secundum plurimum ægritudo acuta & inter cetera repletio minoretur, ita ut cibis exhibeatur rarius & in minori quantitate, multumque tempore sauitatis, & cum hoc non sit crassius, uiscosus aut uetiosus sed lenitiuus. Item si nauisauerint uomitus adiuuetur. Et proprie si fuerit stomachus plenus cibo, & cum eo etiam humores in stomacho existentes educantur, hic nanque minuit materiam colicæ. Secundus canon, nullo pacto festinet medicus dare in principio solutiuum forte desuper, sed primo incipiat cū sülusteribus leniētibus, & deinde aliquantulum acutis si opus est, quibus non sufficientibus det solutiuum, sicut ius galli antiqui simplex aut compositum si non fuerit febris. Si uero fuerit febris, aquam hordei medicinale debite calidā Et Rasis in textu facit aliquas decoctiones lenientes ex prunis, ficibus, passulis & similibus cum quibus potes mannam aut cassiam permiscere. Quandoque scybalæ & humores crassi descendunt per inferius, & dolor instans coegerit dare solutiuum, electarium per superius tunc detur, sed leue & in pauca quantitate & boni odoris, sicut pilulas alephanginas, & sunt proprie mihi expertæ, aut hiera simplex aut diaphœnicô, aut diacitoniten descriptione Mesue. Et quanto medicina est minoris quantitatatis & melioris odoris & saporis, tanto est melius. Melius enim à stomacho retinetur, detur tamē quantitas tanta quæ uerissimiliter sufficiat operari. Est tamen melius dare illa quorum uirtus parum transeat ultra stomachum, & intestina, ne materia à corpore præcipitetur ad intestina, propterea omittantur medicina exoluentes quantum est possibile. Et similiter omittantur medicina leues electiue si clysteria sufficient educere scybalas, & alia que oppilant, nisi materia fuerit in stomacho, & in intestinis superioribus quæ non possunt uomitu educi hoc autem comprehenditur per grauitatem & dolorem supra umbilicum sensatum, & tunc ista medicina solutiua lenit sumpta per os, aut euacuabit materiam totaliter ad extra, aut attrahet ipsam ad aliquod intestinum inferius, quæ deinde per clystere poterit educi. Similiter oportet dare solutiuum per os quando colica sequitur excoriationem siue fluxum dysentericum est enim materia communiter contenta, supra locum excoriationis, ad quam clysteria non attingunt. Tertius canon, quod aliquando opus est dare medicinas exoluentes & satis fortes, & trahentes à longinquis in tribus casibus. Primus, quando materia antecedens transiens in causam coniunctam colicæ continetur in locis distantibus sicut in uenis, & hoc frequenter contingit, quando febres permittantur ad colicam, sicut fuit de anno. 1449. Ferrariæ, tunc in hoc casu competit diaphœnicô, pilulæ aggregatiuæ, & similia. Secundus casus, quando humores essent crassi in intestinis inuicati, quos neque clysteribus neque solutiuis lenibus possumus eradicare. Tertius, quando esset fortis oppilatio, quam neque clysteria, neque leuia solutiua possunt auferre, & in his duobus casibus ultimis authores concesserunt pilulas de sagapeno, & Rasis in litera pilulas iliacas, tibi tamen iureiurando affirmo, quod ad soluendum fortem oppilationem uidi magis conferre

conferre oleum commune bene conditionatum calefactum exhibitum in quantitate sex aut octo unciarum. Et est medicina satis secunda cum sit cibis & medicina, & perficit operationem communiter in duodecim horis, sed post ipsum nihil detur nisi cum iam ex stomacho descenderit, scilicet per quinque horas post ne euomatur. Et procuret quantum est possibile a'pergendo faciem aqua frigida ne euomatur. Et post ipsum immediate dando pomum aut pirum, aut aliquod talegratum infirmo ut abominatio sedetur. Quartus cano quod nullo pacto ponatur agaricus in medicinis colicæ, qui agaricus adhæret intestinis. Et facit etiam alias medicinas retineri & profundari in intestinis, & cum hoc trahit à lōginquis. Quintus canon quod secundum plurimum debemus esse cōtenti clysteribus & suppositoriis, quia clysteria educunt humores etiam crassos existentes in intestinis, & cū nō trahunt ex lōginquis alias materias ad intestina. Et tertio nō faciūt agitationem in humoribus & casum in febres sicut medicinæ & quarto si non soluant neq; educunt materiam oppilantem non est dubium quod faciant peruenire ad uomitū focum & debilitēt uirtutem sicut medicinæ. Et quinto secundum necessitatem possunt reiterari absq; paruo nocumento nō sicut medicinæ, non enim etiam si essent acuta taliter adstantur sicut medicinæ in stomacho. præterea medicinæ in stomacho quādoq; trahunt humores malos ad intestina excoctantes ipsa, quare aggregatur colica & excoctatio simul, & hoc est ex nocumentis mortalibus. Sextus canon, quando clysteria sunt aliquoties iterata & non soluant, abstinendū est ab ipsis & p'prie ad acutis donec materia sit digesta quæ iterum digeritur tum à calore naturali, tum auxilio medicinarum digerentiū secundum humoris exigentiam, imo proprius usus clysterio rum acutorum est post maturationem, timetur enim ex ipsis cordi & hepati, & faciunt accidere foda cum non soluat p'p agitationem. Et quia qñq; suat ex rebus mittentibus uapores acutos ad caput. Ideo oportet quandoq; ut adiuuentur desuper sicut etiam euacuatio desuper iuuatur cum suppositoriis & clysteribus, hæc nota sunt scienti medicinarū acuturū malitiam. Et nota quod quanto maior est febris clysteria debent esse magis lenientia & minus acuta, cum tamē apud Aui. oporteat aliquādo in clysteribus esse. 2. 3. & mediā salis.

Septimus canon. Non fiant clysteria cum aliquid crudum in stomacho continetur quod maxime de cibo intelligitur. Octauus canon. Oportet ut fiat interpolatio in clysteribus, nec ex omni causa fiat clystere, contra ignorantes qui singula hora & pro singulo dolore faciunt clystere, huius autem ratio est, quia clysteria agitant non educendo, & sunt causa febrium aut aliorum nocumentorum, secundum debilitant stomachum & hepar, posset aliquando sequi fluxus immoderatus sicut aliquando mihi contigit.

Nonus canon. Oportet ut custodiatur caput ut non recipiat uapores materiarum retētarum nec medicinarum quas sæpe administrare oportet, sicut sunt clystera, somētationes balnea siue semicupia, hi enim aliquando grauant caput. Et aliquando sequitur alienatio & uigiliarum instantia, huic autem subueniatur stringendo ægrum circa medium cum fomentatur aut ponitur in semicupio. Et similiter ponendo aliquem pannum inter caput & locum somētatum, ut uapores non possint ad caput peruenire. Et tertio epithimando frontem & tempora cum rebus frigidis caput confortantibus, sicut aqua ros. aut oleum ros. cum quarta parte aceti, & similiter cum succis infrigidantibus. Decimus canon. custodiatur pars hepatis ab emplastris, fomentationibus, sacculis, & huiusmodi calidis, quæ uentri propter dolorem applicantur, ne supercalefiat, imo si uidebitur infrigidetur cum sibi proprio sicut cum cerato sandalino, & huiusmodi. Et similiter custodiatur regio cordis cum succis frigidis, camphora, & huiusmodi. Et si potest poni aliquid distinguens inter uentrem & huiusmodi membra fiat nemedicina unius membri alteri communicetur. Undecimus toleretur sitis quantum est possibile in colica, facit enim ad resolutionem humorum uentositatis. Quod si à potu abstinere non possit sedetur cum aliquo iulep, ut puta uiolaceo aut cum decoctione prunorum tamarindorum & similibus cum saccharo dulcorata, & similibus. est enim in istis lubricatio, & quia dulcia sunt & corpori amica cito penetrant, & bibatur parum pro ui-

ce, sic enim cum paucio potu melius satisfit siti nec sequitur uomitus, aut teneantur aliqua in ore sitim sedantia. Duodecimus, quando in colica est uomitus frequens & tamen oppilatio est in intestinis, oportet, ut fiat retentio uomitus etiam cum stipticis exterius applicitis, deinde soluat ueter. Ego tamen in his casibus constringo uomitum, aspergendo faciem cum aqua frigida & aliis ingeniis, & omitto quantum possum medicinas stipticas exterius applicitas ne augeant oppilationem intestinorum. Decimustertius, & si in cura regulari doloris intestinorum sit incipiendum à remotione causæ, attamen coactè aliquando est incipiendum à sedatione doloris, in fortissimo dolore non dante inducias tamen rarissime cōtingit ut cogamur incipere cum stupefactiuis. Quod si ne cessitas cogat aliquando adhuc melius est ut solutiu cum narcoticis misceatur, ut simul utraque cura perficiatur sicut miscere unam drachmam aloes, aut pilularum alephanginarum cum duobus granis opii, & uno grano croci, aut. 5. 3. diaphœniconis cum. s. 3. philonii.

Cura colicæ phlegmaticæ.

Is canonibus præmissis iam accedamus ad curam colicæ particulariter secundum eius speciem. Incipiendum curare phlegmaticam. Cura cuius exigit octo intentiones. Prima est uentris lenitio & intestinorum deoppilatio. Secunda, est humoris peccantis minoratio. Tertio, digestio. Quarta, eradicatio. Quinta, doloris sedatio. Sexta, stomachi intestinorum & membrorum mittentium si qua sunt in causa confortatio. Septima, accidentium correctio. Octaua, debitum regimen sex rerum non naturalium. Prima intentio compleretur cum clysteribus lenitiuis, & abstergentibus factis ex uncis decem, brodii carniū pinguium, uncias quinque, olei communis, uel sesam. & uncias duas sacchari rubei, uel ratundem mellis uiolacei & 3. 2. salis. Quod si clysteria retinentur secundum quod frequenter accidit ponantur cū brodio carniū supra scripto quatuor, aut sex uncias mellis crudi aut un' cyathus urinae. uel. 2. olei cōis lib. 1. mellis. 5. 6. misce, & calidū imponatur. Fiat etiā decoctio ex fursurib. scœnugræci, seminis anethi, mal. seminis maluui sci, blitis. ana. Manipulum unum, quæ bulliant in aqua libras quinque usque ad sufficiens decoctionem ex qua decoctione accipiat lib. 1. olei communis, uel sesamini, uel anethini. 5. 5. mellis. 3. 3. & debite calidum supponatur, quod si clysteria retinere non possent omitterentur acuta stimulantia sicut mel, sal, & urina, & similia. Et pro secreto habe quod butyrum impositum in his clysteribus est optimum faciens ad lenitionem, & doloris sedationem. Secunda intentio est materiarum minoratio. Verum ubi non esset fortis oppilatio possent istæ duæ intentiones simul compleri, sicut supra scriptis clysteribus addendo cassiam, hieram simplicem, hieram compositam, hieralogodion, diaphœnicon, electarium indurum, hieram hermetis, & similia. de his ergo unum uel plura addantur secundum quod est tuo proposito conueniens. Et possent fieri decoctiones educentes phlegma, ut. 2. poly-podii. 3. 1. carthami. 3. 2. centaureæ minoris. 3. 2. colocynthidis. 3. 1. scœnugræci. 3. 1. ficuum siccarum numero octo, bulliant in tribus libris aquæ ad consumptionem medietatis & coletur, cuius decoct. 5. 8. misceatur cum 5. 4. olei sesamini aut communis, & 3. 1. butyri, & addatur salis aut sal gemme. 3. 2. uel imponatur sine sale si uis quod diutius retineatur. Clystere autem ultimum & efficacissimum est, quod est descriptum à Rasi in textu & a me expositum, & si uis temperare medicinarum calidarum acuitatem his adde in decoctione maluas, sebesten, matres uiolarum, & similia. Collyria quoque in textu descripta sunt adhuc multum efficacia potes etiam si placet facere collyria minus acuta si. 3. 2. mellis, addatur salis gemme. 3. 2. stercoreis muris. 3. 1. Et in summa multa talia sicut scammonæa, colocynthidis, elleborus, tur-bich, & similia, possunt cum melle incorporari & fieri collyria secundum exigentiam. Aui. facit speciale cap. de clysteribus educentibus phlegma & humores uiscosos. Similiter potest fieri minoratio cum solutiuis sumptis per os, sed consulo ut incipias à lenioribus sicut à pilulis alephanginis quarum exhibeatur. 3. 1. aut. 3. 1. semis pro uice, quarum forte tardabitur solutio per. 2. 4. horas, Et similiter aloë solū succocitrinū sumptum in eadem dosi est efficax, & non fallit simul.

simul educens phlegma & colicam. Item pilule stomachicæ. Sed magis confido in alephanginis & aloe, & fortiora his sunt hiera composita diaphœnicon, electariū de algalim descriptum in textu, electariū indu, pilulæ autem fortes sunt sicut foetida. Item pilulæ iliacæ postre à Rasi in textu & sunt fortissimæ. Tertia uero intentio est digestio perficienda in materia phlegmatica cum oximelle simplici, oximelle composito, oximelle scyllitico si fuerit multum uiscosa, & cum melle ros. syrupus de absinthio, & de calamen. si fuerit minus uiscosa, aquæ autem sunt sicut absinthii, foeni. apii, & ali quando bulimus cinnamomi, anisoforum, ana. 3. 2. in duabus libris aquæ ad consumptionē tertiæ partis, & ualet in phlegmatica & uentosa. Digerimus quoque cum electariis sicut diacymino, diacinnamomo, diambra, diacalamentho, theria ca, metridato, & aliis confectionibus magnis. ius autem galii decrepiti simplex aut compositum factum secundum artem Mes. est simul digestiuium & euacuatium. Quarta intentio est eradicatio complenda uicibus secundum exigentiam multitudinis, ita ut euacuatio sit pro unaquaque uice parua sed reiterata. Et complentia hanc intentionem sunt iam dicta in secunda intentione, est tamen semper tutius ut cum leuibis procedas dummodo educant satis sufficienter. Inter cætera præstantissimum solutiuum est terebinthina, confert enim omnibus membris neuosis sicut in doloribus arteticis, doloribus stomachi, matricis, intestinorū à causa phlegmatica, uide Auic. secundo cas. cap. proprio. Verum, quia debilitat stomachum attendatur eius cōfortationi cum caparibus, mentha, & similibus. Modus aut exhibendi ipsam est, quod inchoetur à parua quantitate, sicut ab. 3. s. & aliqui inuoluunt ipsam in saccharo trito & deglutunt, aliqui uero abluunt os suum cum aqua aut uino. deinde habent ipsam tantum in uino uel aqua & sorbent ipsam gutture aperto. Aliqui inuoluunt ipsam in hostia uel scaleta infusa in uino uel aqua. deinde sequenti die dentur. 6. 3. & tertia die. 3. 1. & ultra procedat secundum oportunitatem quæ sequitur ex ea. Hæc etiam intentio compleitur cum clysteribus, de quibus supra. Quinta intentio, est mitigatio doloris quam ab ipso initio complere oportet si necessitas instat. Sed Auic. dat cas. quod ualde errat qui à principio approximat narcotica materia existente frigida, quia non abscondunt causam doloris, imo augent & confirmant quia si humor est crassus fit crassior. secundo si complexio est frigida fit frigidior, si uentositas est spissa fit spissior & augeat oppilatio, & tandem redit dolor fortior quam prius. Quapropter oportet ut narcotica postponantur quantum est possibile, & tenetur doloris sedatio aliis modis, & proprie cum his quæ causam abscondunt. Modi autem præter stupescientia sunt quatuor. Primus cum clysteribus educentibus humores & carminantibus uentositatem quæ ab illis humoribus eleuatur, quæ debent secundum exigentiam doloris reiterari, quorum multa posita sunt superius in intentione prima & secunda, & multa ponentur inferius in colica uentosa. Sed sint anodina, lenitiua, humoris eductiua, & uentositatis carminatiua, intestinumque confortatiua, ut Recip. olei anethini. 3. 8. uini al. potentis. 3. 4. sacch. rub. 3. 2. misc. & calidum imponatur & diu retineatur. Vel istud. Recip. mal. bifidalux, brancæ urfinæ, mercurialis, ana. M. 1. caricarum pinguium num. 10. sem. foen. sem. lini, sem. anethini, ana. 3. 1. furfur, pugillum. 1. bul. in quinque lib. aquæ ad consumpt. medietatis & coletur de qua decoct. accipiat lib. 1. mellis, olei sesami. ana. 3. 1. s. salis gemmæ. 3. 1. florum calsæ. 3. 1. s. benedictæ, hieræ picræ, ana. 3. 6. misc. Et ius galli decrepiti clysterizatum simplex aut compositum est proprium. Secundus cum his quæ exterius applicantur quæ sint poros dilatantia, humorem inarturantia, uentositatem carminantia, ex quibus sunt fomenta, sacculi, uentosa, emplastra, unctiones, & cauedum est ne sint nimis calida ne amplius humorem in uentositatem conuertant, quam fit illud quod de uentositate & materia resoluunt, imo fit quantitas caliditatis quæ faciat in uentositate resolutionem fortem, & in materia subtiliationē & murationem non resolutionem fortem, id est, in uentositatis conuersionē, est enim quandoque necessarium propter dolorem commotum ex euaporatione, aut dimittere euaporationē, aut multiplicare & iterare ipsam, ut resoluat quod cōmouit de uen-

tositate. Ex fomentis autē est decoctio facta ex floribus chamæmillæ, meliloti, anethi, fiseleos, ruta, & similibus, facta in aqua, aut uino, aut utrisque, & applicita cum spongia aut filtro, aut impleatur uesica ex hac decoctione, & uentri applicetur resoluendo ipsam super loco dolente, aut impleatur uesica oleo calido communi aut aliis oleis propriis & applicetur. Item sunt sacculi ex floribus chamæmillæ, melil. anethi, furfuribus atamifatis, ita ut nihil remanserit farinæ, milio, panicio, sale, & similibus. Item sacculus ex cinere debite calido, & sint omnes molles non duri. Et possunt bullire una ebullitione in aqua uel uino decoctionis rerum similibus & calidi applicari, & parietaria cū oleo anethino in patella calefacta & semicocta loco dolenti applicita est efficax in sedando dolorem. Item, uentosa magnæ, lati orificii, quæ multum ignitæ ponantur super loco dolente. Item sunt emplastra & unctiones inferius ponendæ in colica uentosa. Et applicatio fili crudi, dum à mulieribus decoquitur cum cinere notabiliter calidum solēnter iuuat. Tertius modus est, cum his quæ sumuntur. Inter cætera comestio aliorum in colica frigida. Et apud consuetos comeduntur cruda, & apud inconsuetos comeduntur cocta, & post ipsa bibatur uinum potens non dulce neque acre, sed medii saporis, & dormiat aut exercitetur, aut utrunque faciat. Et reiteretur comestio secundum necessitatem, nec allium facit sitim sicut cepæ. Item decoctio cymini & absinthii, an. sumpta quantitate trium aut. 4. 3. Item castoreum sumptum usque ad mediam. 3. mirabiliter confert. Similiter radix lilij in aqua decoctionis præsui. Item zing. & aristolochiæ rot. an. 3. s. sumpta cum uino potenti cum quo bullierint. Item, lumbrici exsiccati sumpti cum uino usque ad drach. s. Item, stercus lupi ex ossibus quod sit album & proprie collectum super spinis, & aromatizatum cum sale & pipere usque ad drach. s. Item dicitur quod suspensio in pelle leopardi uel cerui, uel in lana arietis, qui fugit ab eo, scilicet lupo aut in argento à proprietate confert, ut testatur Gale. 4. de simplici medicina, cui Auic. consentit in capitulo de colica. Et intestinum lupi exiccatum & bibitum est adhuc præstantius, imo delatio eius in forma cinguli ualet. Item, scorpiones assati in colica uera, & in lapide renum sunt ultimi, sed in lapide renum de per te in colica de per accidens, credo prouocando urinam. Et ex laudatis in uehementia colicæ est cornu ceruinum adustum in potu sumptum usque ad drach. x. cum uino, sedat enim dolorem statim. Quartus modus est cum balneis & embrocis, balnea autem sunt mineralia siue aquæ thermarum, aut in qua decoquantur res carminantes uentositatem & remollientes dolorem, quia sedantes de his quæ dicta sunt superius in fomentis. Et sint magis aut minus calidæ secundum exigentiam materiæ colicæ, temporis anni & complexionis ipsius patientis, & accidentia quæ secum complicantur, multum enim iuuant tum sedando dolorem sua humiditate, anodinatum maturando, materiam resoluendo & uentositatem carminando, tum mollificando musculum ani & faciendo uentrem obedientem. Sed in horum administratione sunt cas. obseruandi. Primus, quod aqua non attingat nisi usque ad umbilicum, & sit moderate calida quæ delectet & possit tolerari, & propterea melius instrumentum ad hoc est semicupulum. Et si non sit paratum, habeatur brenta altitudinis unius pedis in qua sedeat æger pedibus existentibus extra. Secundus, quod non diu moretur & proprie debilis, est enim conuenientior iteratio quam longa mora in eo & sint prope eum res boni odoris, quibus delectetur sicut fructus odoriferi, uinum, uel uipa cum gariophyllis, uino, optimo aceto, & aqua ros. & apud necessitatem aliquid uini exhibeatur, aut aqua carnis si timeretur casus in syncopi. Si tamen infirmus ualde debilis sit non fiat balneum. Tertius, quod non administraretur materia existente multa nisi iam minorata sit, timetur enim de paralyfi & de raptu materiarum ad aliqua membra nobilia. Quapropter existente aliquo apostemate iam inchoato aut de proximo inchoando non fiat balneum istud, & proprie secundum membrum illud de cuius apostemate timetur. Quapropter non conuenit in colica apostemosa nisi forte in declinatione, & similis huic est embroca super uentre patientis iacentis supini, & semper cum surgit à balneo uel remouetur embroca exiccet &

Io. Arculani

b

ungatur,

ungatur, & in lecto ponatur & dormiat, fortasse enim illico dormiet, & subueniatur sibi eius, & cuiusque alteri accidenti ipsum molestanti ne a somno impediatur. Cum autem dolor non possit his quatuor modis sedari, & esset fortis virtutem dissoluens, tunc ad narcotica, id est, stupefactiua venientem est, & ex propriis est illud philonium, quod est a Rasi in litera descriptum. Et Auic. facit cap. de narcoticis quæ sunt in hac dispositione propria, & ordinat quædam sumeda per os in modum electarii. Sed præstans ualde est philonium ro manum descriptum a Mesue & hoc a Rasi descriptum. Sed in forma pilularum potest exhiberi istud ab Auic. descriptum. *R. croci, styracis liquida, zingib. piperis longi, seminis hyoscyami albi, an. 3. i. opii, castorei, ana. 3. i. quartam, formetur pilula parua, & sit dosis earum a 3. s. usq; 3. i. Item possunt fieri clysteria ex iam dictis lenientibus quibus ponatur castorei, 3. s. & opii grana quinq; & sedat dolorem, & quandoque fit tenta siue suppositorium ex petia lanæ aut cotto, & intingitur in olei de feminibus, aut in olei anethini. 3. i. opii, scrupulum unum, castorei. 3. s. optime adinuicem dissolutis, & sit ligatum cum filo cottis, ita ut ligamentum pendeat extra, ut possit extrahi ad libitum, & possit ad libitum ex eodẽ medicamine infundi etiam absq; quod extrahatur. Et nota quod ubi timeretur cõuersio materiei ad aliud membrum sicut ad neruos, est minus malum sedare dolorem cum narcoticis quàm facere balneum. Item nota quod aliquando huiusmodi narcotica miscentur cum solutiuis, sicut præcipit Rasis miscere scammoneam cum philonio quod ordinat in textu. Ego autem utor his pilulis. *R. aloes succocitrini, uel pilularum alephanginarum, sed melius est qd sint ex aloë nō loto. 3. i. uel. 3. 4. opii, croci, an. gran. 1. uel. 2. uel pro croco pone castoreum, fiant pilule septem uel nouem & exhibean tur stomacho ieiuno, dolorem. n. post horam sedat, & postea tandem soluunt & faciunt operationem incolumẽ. Et si uel les quod uelocius soluerent adde duo aut tria grana, scammonæ, & cum his non modicum honorem sum aliquando consecutus. Sexta autem intentio, scilicet stomachi & intesti norum confortatio aliquando necessaria est, quia huiusmodi membra sunt lassata ex dolore & causis eius. Vnde multiplicabunt iterum phlegma & uentositatem. ergo confortandi sunt confectionibus, sicut aromatico ros. diadraganto, diaga langa, speciebus ducis bono uino & aliis huiusmodi. Et similiter eorum mala complexio est corrigenda cum contrariis. Si autem aliqua membra sunt communicantia sicut hepar, splen, & cetera corrigantur secundum quod dictum est, & dicetur in cap. propriis. Septima autem intentio. scilicet correctio accidentium perficiatur secundum ipsorum exigentiam. Instantia uigiliarum remouetur per remotionem doloris, cui aliquando oportet subuenire cum narcoticis simul tollentibus dolorem & somnum inducentibus. Vomitus oportet subuenire abstergendo faciem cum aqua frig. & reliquis remediis in præcedentibus cap. dictis. Syncope cum exhibitione uini & aquæ carnis, & similibus. Reliquorum accidentium cura suis cap. perquiratur. Ultima autem intentio. regimen uitæ perficitur faciendo aerem declinare ad calid. & sic. naturaliter aut artificialiter. Et sit notabiliter indutus secundum exigentiam temporum, præcipue teneat stomachum & uentrem debite calidum, diætã suã tam in quantitate continua, quàm discretã sit tenuis. Et cibi sui non sint sicci, crassi aut uiscoli, neq; uentosabiles & sint uentrem lubricantes. Et panis suus sit bene coctus, salitus & fermentatus, qui cõdiri potest cum aliquibus granis anisi, cymini, foeniculi, licet hoc sit magis conueniens in fine quàm in principio. Vinum sit odoriferum, purum, antiquum, aromaticum, sed in pauca quantitate, & aliquando conuenit parum maluatice ad subtiliandum humorem, confortandum uirtutem, uigorandum digestionem. Fercula autem sua sint brodialia pingui, uidentur assata & frixa, sit brodium caponum & gallinarum pinguium. Sed proprium est ius galli antiqui uia cibi & medicinæ, & quæto pinguius tanto melius. Item, brodium caulium & cicerum. Itẽ, brodium factum ex decoctione caulium, ceparum, porrorum, allii, cum oleo uel carne pingui castrati est mirabile. Item, brodium blitis coctum cum carnibus laudabilibus pinguibus. Sed apud debilitatem uirtutis dantur contusi pulli, oua sorbilia, brodium carniū laudabilium cũ uiello oui conuaf-**

fatum. Carnes uero sint perdicum, phasianorum & francolinorum, auium paruarum, pipionum iuuenum, uideatur crassa carnes, & sint elixæ non assatæ nec frixæ, uideatur potum aquæ frigida, & uini multum aquati. Aqua sua sit aqua saccharata, aut aqua decoctionis pauci mellis, ita ut aqua sit duodecupla ad mel, & optime bulliat & despumetur. Est. n. aliquando aqua necessaria cum adest febris & ius blitis & spinachiarum tunc esset conueniens. Pro salata utatur capparibus & asparagis. Aromata autem sua sint proprie ex cinnamomi partibus duabus zingib. piper. galangæ, ana pars una, croci quarta unius partis. Sonnus super repletionem malus, in uacuitate bonus, licet secundum plurimum oporteat ipsos dormire quando possunt. Similiter in retentione fecis malus. Deambulet stomacho ieiuno, post cibum quiescat, & in præseruatione exercitium est oportunum, euitet retentionem fecis & stiptica. Et retinere uentositatem exire uolentem, desperatio, tristitia & huiusmodi accidentia corruptentia digestionem disconueniunt, ita tamen conuenit nisi modum excedat.

Cura colicæ melancholicæ.

Sed in colica melancholica procedatur cũ eisdem intentionibus. Sed etiam euacuantia & digerentia debent esse melancholicæ propria. Et carminantia uentositatē debent esse fortiora, quia illa uentositas est crassior & deterior, horum autem copia habita est in ægreditinibus splenis. Decoctio tamen epithymi Mes. est propria. Item pilula indr. de lapide lazuli, & electarium dialenæ, & in melancholia adusta electariū hamech. Et pro clysterib. in decoctione ponat epithymū stœcas & sal indum. Et in suppositoriis lapis lazuli cõtritus & lapis armenus & sal indum. Et apud Auic. euaporetur uenter cũ eis quæ sunt grana lauri, armeli, id est, ruta agrestis, origanū, chamæmila in aceto decocta ad maiorem incisionem & penetrationem. Et regimẽ declinet magis ad humidum. Et in brodiis suis decoquatur borago & buglossa. Et fructus conuenientes sunt passulæ. Et salata eorum sint cappares, & proprie si splen sit in causa.

Cura colicæ cholericæ.

Et in colica cholerica seruentur eadem intentiones. Sed totum regimen tam medicinale quàm sex rerum non naturalium declinet ad frigidum & humidum. Vnde clysteria fiant ex decoctione blitis, matrum uiolarum & maluarum, sebesten cum oleo uiol. & pauco salis. Et si retinerentur addantur. 3. 3. mellis uiolacei, & similiter fieri possunt ex aqua hordei cum oleo uiolaceo & sale. Et possit addi calsia in clysteribus, & electarium de succo ros. Solutiua autem per os sumenda sunt penes Rasi, florum calsiq; 3. i. o. quæ trahatur cum succo endiuie bullito donec clarescat. Sed melius est ut trahatur calsia cum decoctione prunorum tamarindorum & uiolarum, & similiter possent exhiberi. 3. 3. mannæ distemperatæ cum eisdem. Si autẽ colica fuerit crassior & minus calida, possunt dari calsia distemperata cũ decoctione prunorum & passularum & ficuum & in hac possent concedi aloes loti. 3. i. sed ubi causa antecedens esset distas, possent dari pilula aureæ, electarium de succo ros. & similia. Digestiua uero sint syrupus uiolaceus cum aqua hordei medicinali, aut cum decoctione prunorum & tamarindorum, & si cholera sit crassior misceatur cum syrupo uiolaceo syrupo acetoso simplici. Et pro ferculis conceditur decoctio blitis endiuie, lactuca, & similia in iure carniū laudabilium, bibat aquam saccharatã aut hordei, & si expediens sit, uinum sit pauciferum, & Rasis nutrit cum taphea cũ oleo de amygdalis dulcibus condita. Et si fuerit expediens stupefactiuum iubet Auic. permisceri stercus adip. i. lupi cum stupefacientibus. Et cauendum est a castoreo & euphorbio & similibus, sed pro correctione opii ponatur crocus, & requies descriptio Nicolai, si misceatur cum pauco stercoris adip, esset ad intentionem Auic.

Cura colicæ uentolæ.

Eius cura exigit intentiones supra scriptas, scilicet, lenitionem & deopilationem intestinorum, ut uentositas possit exire aut extrahi modis infra dicendis. Secundo, minoratōe materiæ ex qua generatur & fouet uentositas. Tercio digestionē. Quarto, eradicationē, paulatim tamq̃ & in

& in pluribus uicibus & omnes hæ intentiones cum medicinis dictis superius complentur. Verum Auic. multa describit clysteria, suppositoria, & medicinas solutiuas, mirabiles & extraneæ compositionis, quas si placet uide. Quinta autem intentio est doloris sedatio multis modis complenda maxime per carminationem uentositatis siue ipsius educationem quouis ingenio, quæ modis septem educi potest. Primus, est per uentris lenitionem & intestinorum deopilationem iam dictam in intentione prima. Secundus, est apertio porroscatum uentris complenda, ut supra dictum est cum fomētis, facculis, emplastris, unctionibus, fricationibus, & similibus. Tertius, est eius attractio cum uentosis magnis latorū orificiorum. Quartus, cum attractione eius ad inferiora & educatione per anum cum clysteribus & suppositoriis, in quibus ponuntur carminantia & attrahentia uentositatem ad inferiora, ex quibus sunt ruta, cymini, fœnelis, amomum, ammi, baccæ, lauri, aristolochia, bdellium, sagapenum, castoreum, sal, & similia, ex quibus possunt fieri decoctiones pro clysteribus secundum exigentiam, & ex compositis componendis in clysteri est electarium de baccis lauri cui non est compar. Quintus, cum educatione eius per superiora & inferiora, & per porroscates uentris simul cum decoctionibus ad hoc propriis, sicut diacyminum, diazingiber, diagalanga, diacynamomum, diacalamen, theriaca uetus, mithridatum, diambra, diatriopipereon, electariū de baccis lauri in textu descriptū, item decoctio de seminibus similiter in textu descripta, cuius. 3. dantur cum olei de alcherua. 3. 3. Et tu iuxta Auic. consideranda modum illum artificialem dandi in potu oleum de alcherua, de qua re facit speciale cap. Item decoctiones in uino bono seminum carminantium, sicut cymini, ameos, amomum, fœnelos, dauci, anisi, fœneli, petroselini, carui, nigellæ, iuniperi, baccarum lauri, urticæ, carthami, rutæ, calamen, pulegii, chamedryos, chamæpityos siccorum, & aromatum sicut zingib. gariophylorum cinamomi, piperis, galangæ, & similia & ex fortibus est aristolochia & castoreum per omnem modum adhibita, & ad hanc intentionem sunt unctioes ex oleis in quibus illa bullierint & facculi & emplastra stomacho & uentri applicita ex similibus composita, in quibus uult Auic. & alii autores ut ponatur solutiuas, f. colocynthis, turbit, & similia. Ex quibus est unguentum arthanitz descriptione Mes. q. super uentrem positum soluit solutione catartici, & super stomacho prouocat uomitum. Et nota quod inunctio umbilici & partium inferiorum cum butyri recentis. 3. 1. & colocynthidis. 3. 2. & eius suppositio soluit uentrem & curat colicam. Et ex emplastris uentositatem carminantibus est emplastrum de baccis lauri descriptione Mes. Sextus modus est, ut stringat rotus uenter, & stomachus cū fasciâ, deinde patiens proiciat se super aliquo cussino de corio pendentibus capite & pedibus ut per compressionē expellatur uentositatis, expelletur enim per superius aut inferius, uel uenter appodiet alicui rei super quam se fortiter cōprimat. Septimus modus, ut toleret famem duobus aut tribus diebus, aut quantum potest exercitetur. Faciunt enim hæc duo ad resolutionem uentositatis & humorum. & dormiat cum uentre deorsum, facit enim amplius ad uigorationem caloris innati. Præterea, quia clysteribus in his dispositionibus, maxime opus est, & uentositate resistente difficile est clysteria imponere: facit Auic. speciale cap. de clysteribus. Modi autem siue figuræ clysteriorum præter illum Auic. quæ non intelligo sunt tres. Primus est communis cum manica de corio & cannula pyramidalis in extremitate anum ingrediente plura habente foramina. Secundus modus est cum canna longa perforata ex pluribus frustis composita, quorū unum ingreditur, alterum stricte ut nihil possit refudare, & in parte inferiore huius cannx recte infixa est una canna longa una spania diametraliter fixa secundum latum cannx longe prædictæ. Et in hac canna taliter infixa est cannula pyramidalis anum ingrediens infixa in extremitate eius cadens diametraliter super illam extremitatem secundum latum ipsius. in summitate autem primæ cannx longe est scutella in qua imponitur liquor anum ingressurus qui uocatur enema. Et instrumentum quo iniicitur uocatur clystere. Liquor autem ingredienti primo descendit postea ascendit. Canna autem prima longa ex frustis composita debet esse parū longior quàm

fit unus cubitus. Et cum hoc instrumento homo potest sibi imponere clystere. Tertius, modus est, ut habeantur duo ligna sicut duo incisoria parua optime rotunda, & coriū de pelle heedi inuoluatur stricte circa ista duo incisoria secundum ipsorum circumferentiam, stricte ipsum figendo cum clauis paruis, ut liquor cum erit impositus non possit exire. Vel fiant duo canales in medio duarum circumferentiarum horū incisoriorum, in quibus cannalibus pellis iam dicta ligetur cum filo forti cerato stricte, sed melius est ut utrunque fiat, scilicet quod figatur cum clauis, & quod ligetur. Et in centro unius istorum incisoriorum fit foramen in quo ponatur cannula pyramidalis anum ingressura, & per hoc foramen liquor imponatur, deinde ponatur cannula iam dicta bene stricte in foramine illo ut nihil possit refudare, super quā cannulam in ano fixam patiens sedeat comprimendo illa incisoria aduicem. Nam per hunc modum ne detur penetratio corporum necesse est liquorem in intestina ascendere. Sit autem prædicta canna anum ingrediens perforata in extremitate sua anum ingrediente, & habeat duo alia foramina lateralia, unum prope corium in latere uno aliud parū altius in latere opposito. Et sit lōgitudō sua communis quinque digitorum coniunctorum, licet in puero minor. Sed in casibus aliquibus oportet quod sit ad lōgitudinem unius spā sæ uel. 10. digitorum coniunctorum ut puta in colica, ileos & ubi oportet liquorem ascendere ad intestina gracilia. Similiter cum oportet iniicere aliquem liquorem in matricem, sicut pro secundina extrahenda, aut pro matrice mundificanda aut pro curandis ulceribus eius, & cum istis duabus ultimis formis clysteriorum potest patiens seipsum clysterizare, quæ res est frequenter oportuna in his qui uerecundantur, præcipue in mulieribus. Situs autem clysterizandi uariatur secundum locum læsum. Si enim uelimus dorso prodesset, steter homo resupinus. Si intestinis, steter cum facie deorsum & magis ascendit homine stāte cum facie deorsum quàm secundum situm alium, & præcipue si posteriora sint tempore impositionis & post impositionem magis eleuata quàm anteriora, & si dextro uolumus magis prodesset super dextro uoluitur, & ita de sinistro. Et si uolumus enema multum ascendere ad superiora sicut in colica, ileos & cum ulceris sunt in intestinis gracilibus eleuentur posteriora & conuassentur. Cauendum tamen ne liquor stomachum ingre diatur ne forte sequatur uomitus ipsius, & stercoreum, præcipue in his qui cum ascendit parum ad superiora syncopizāt. Et patiente existente debili imponatur clystere ipso iacente super lateribus uel supino nec post impositionem conuassetur. Quantitas autem liquoris in adultis est ab. 1. lib. cum dimidia ad lib. 2. In infantibus sufficit. lib. s. Hæc tamen uarianda sunt secundum magnitudinem intestinorum & secundum diuersitatem loci quem uolumus attingere, quanto enim locus attingendus est magis supra, quantitas debet esse maior, quanto inferior sufficit minor quantitas. Vnde si uolumus mundificare aut consolidare ulcus intestini recti sufficit. lib. s. aut parum plus. Modus autem imponendi cū primo clysteri est ut stringatur manica cum manu prope liquorem, ne aer mediet inter manum & liquorem, deinde imposita cannula in ano & ægro aut alio firmiter eam tenente impellatur enema siue liquor successiue donec ingrediat quantum sufficit. Sit autem impulsio illa cum maiori conatu quando uolumus liquorem magis ascendere: Quanto autem minus, impellatur cum minori conatu. Et tempore impositionis non tussiat, neque sternutet, neque uomat, neque se exprimat, sed anhelitum dilatet. Et immediate post impositionem stappa prius circinvoluta cannulæ impellatur prope anum & bene adhæreat, deinde æger crura & coxas extendat. Et postea reuoluat secundum exigentiam utilitatis quam quæris, & similiter magis aut minus eleuetur. Retineatur autem in colica non superflue imo post decimum horæ, cum primum stimulat & pungit, eiiciatur, sed in fluxibus multo tempore retineatur. In reliquis autem casibus longiori aut breviori tempore secundū quod uis uirtutem eius ad loca magis aut minus distantia attingere, & secundum alias circumstantias quas sapiens metiatur. Quod si debito tempore non retineretur aliud minus acutum aut minoris quantitatatis replicetur. Si uero nimis retineatur

Io. Arculani b 2 tineretur

tineretur sicut in colica accidit in qua interdum retinentur. 7. clysteria, tunc suppositorium stimulant imponatur. Et si istud non sufficit iniiciatur cum clysteri liquor in quo sit magna quantitas mellis etiam usque ad lib. i. Et infallanter educet secum reliqua clysteria & cetera quae facile possunt educi. Et nota quod fiunt clysteria non solum ad iniiciendum si quorem, sed ad attrahendum uentositatem in intestinis contentam sicut in colica uentosa. Modus autem est ut habeatur follis parvus cuius cannula sit longa. 10. digitis coniunctis uel etiam amplius. Et fit de ligno, ferro & argento, & cum latera follis sunt clausa imponatur. Deinde aliquo uel agro ipso firme tenente cannulam latera follis dilatetur, & ne detur uacuū egredietur uentofitas. Sunt & alii modi huic proportionales, aliqui etiam pro expellenda uentofitate tenent in ano cannulam argenteam uel ligneam utrinque perforatam, ut libere uentofitas egredietur. Sed fit illa cannula secundum partem ingredientem intestinum in multis locis perforata ne omnia foramina simul obturentur. Secundo sedatur dolor cum stupefaciētibz, quorum copiam superius descripsi. Sed communiter in hoc casu utor philonio romano uel philonio à Rasi in textu descripto. Sexta autem intentio. scilicet membrorum confortatio est complenda, ut prius dixi in colica phlegmatica. Similiter septima intentio. scilicet accidētium correctio perficiatur ut prius. Octaua autem intentio. scilicet regimen uitae declinet ad calidum & siccum. & caueatur aer frigidus & uentofus, & humidus, & pannis bene operatus sit praecipue secundum uentrem & stomachum & anum, sit parcus in cibo & potu, & sint calidi & sic non uiscosi, non uentofabiles, facili digestiois, uentrem non cōstringentes, dormiat multum maxime in nocte. Exercitetur multum stomacho ie iuno, sit sollicitus in expellendo superfluitates inferius, nullo pacto retineat uentositatem, nec superius nec inferius, sit sperans & gaudens, & aliquando leuiter irascatur. Sed tristitia, timor, & accidentia corrumpentia digestionem fugienda sunt. Omitto reliqua particularia, nota enim satis sunt ex superscriptis. quod uinū suum debet esse potēs, antiquum, medii saporis in pauca quantitate bibitum, & quod panis sit bene fermentatus & salutus in quo semina carminantia uentositatem aliquando ponantur. haec nota sunt ex superscriptis.

Cura colicæ ex foecibus.

Eius cura exigit tres intentiones praeter tres communes in quacunque specie colicæ necessarias. Prima est foecis mollificatio & superficiei intrinsecæ intestinorum applanatio, ut facile lubricet. Secunda ipsius educatio. Tertia causæ siccitatis, foecis remotio, & hæc intentio simul concernit regimen curatiuum & praeseruatium. Prima intentio completur primo cum clysteribus ex lib. s. olei cōmunis cui possunt addi. 3. 3. butyri recentis. Item cum clysteribus ex oleo sesamino nec nō cum brodiis pinguibz carniū, sicut pullorum, agnorum castratorum, & similibz, & proprie caput & intestinorum eorum addendo æquale quantitatem alicuius ex oleis superscriptis, & potest addi butyrū, & quando nihil aliud esset paratum solum oleum sufficit, & possunt fieri decoctiones ex maluis, matribz uiolarum, sem. lini, se. aut radice maluauisci, ficibus, & similibz & frigidioribus possumus uti existente febre, & cum signis caliditatis & calidioribus in dispositione cōtraria. Item compleri potest hæc prima intentio cum sumendis per os ex quibus sunt iura pingua carniū laudabilia, gallinarum, caponum, agnorum castratorum, & ius galli antiqui est proprium, non solum leniens, sed sua nitrositate abstergens, uittelli quoque ouorum sorbilibz, passulæ nigre sine nucleis, sicut albæ tā siccæ quā recentis, pulpa prunorū optime maturorum, penidia sacch. iulep uiol. brodium cicero rub. integrorum, brodium caulium collectorum ante ortum solis leuissime lotorum, & fractorum in frustra ualde parua & leuiter coctorum. Item brodium blitis, attritis spinachiarum, maluarum, mercurialis, maluauisci, & similitū, & in summa omne brodium habens uirtutem nitrosam, uel baurachiam, uel absteruiuā, uel saluam stimulatuiam uirtutis, uel in qua sint partes uentuosæ & pingues. & si uolumus maiorem mollificationē faciemus bullire herbas superscriptas in aqua uel brodio carniū. deinde addamus oleum commune in magna quantitate uel butyrum recēs, & similia, & brodium decoctionis acruminum,

sicut ceparum & similibz ualeat ad lubricandum, & quandoque in brodiis laudabiliū ponatur sacch. uel penidia. Et quando cetera non sufficiant ad leniendum oleum commune bene cōditionatum, aut sesaminum, aut amigdalorum dulcium recentium sumptum in quantitate. 6. aut. 8. 3. non fallit. Et si timeretur læsio stomachi & nimia lenitas, huic misceantur. 3. 3. olei amygdalarum amararum, aut facta uētris lenitione confortetur & corrigatur stomachus cum stipticis confortantibus interius & exterius applicitis. Sed existente febre detur aqua hordei excorticati facta secundum artem mixta cum iulep uiolaceo uel saccharo rubeo. Vel detur syrupus acetosus simplex per duas horas post ipsam aquā. Cassia quoque & māna sumptæ in potu cum aqua hord. aut brodio carniū aut decoctione prunorum faciunt ad uentris lubricitatem, & similiter etiam in clysteribus ponantur. Emplastra quoque, tomenta, unctiones, & semicupia facta ex huiusmodi lenientibus ad hoc conferunt, & cum hoc sedant dolorē.

Secunda uero intentio, scilicet educatio foecis mollificat eadem die complenda, aut sequenti die perficiatur, si alicui istorum clysteriorum mollificantium, de quibus supra, addatur mellis ab. 3. 3. usque ad 3. 6. aut secum miscendo multum salis, aut. 6. 3. urinae, mel tamen est mihi magis dilectum, aut replicetur sæpe aliquod suppositorium ex superscriptis. Quæ si non sufficiant detur cassia, aut hierapicra per os & pilulæ alephanginae, & aloë non fallunt præcedere mollificationē, & fortiora sunt diaphenicon, diacitoniten solutium, & similia. Tertia autem intentio, scilicet remotio causarum, siccitas foecum perficitur secundum ipsarum exigentiam. Si ergo adsint causæ primitiue sicut cibaria sicca, pauca comestio, balneum, exercitium nimium, nimis coitus, &c. huiusmodi similia remoueat, & inducatur regimen cōtrarium. Item, alteretur caliditas hepatis si sit in causis, & deoppiletur kystis, quæ qualiter debeant perfici dictum est superius in passionibus hepatis & icteritia. Et si causa est debilitas expulsiuæ intestinorum & obtusus sensus eorum succurratur cum theriaca, mithridato, diacori, diaphrisarcoricon, diamusco. Item, stimuletur expulsua cum suppositoriis & clysteribus acutis, & si causa est multitudo cholerae educatur & remouentur causæ ipsam multiplicantes, ut superius in icteritia. Et si causa esset raritas corporis & sudor nimis ungatur cū oleo ros. rudi, aut cum oleo de myrto, & similibz, praestantius tamen est ut causæ sudorum auferantur. Et si causa est urinae prouocatio cohibeatur per frig. stiptica, sed tutius est causas eius auferre. Et si causa exiccationis foecis & longæ retentionis eius sit per communiatem à membris nocumta illorum membrorum corrigantur secundum quod dictum est in capitulis præcedentibus & dicetur in sequentibus. Reliquæ autem intentiones, scilicet doloris sedatio, accidētium correctio, & regimen sex rerum non naturalium possunt partem ex superscriptis.

De colica apostemosa.

Eius cura est ut in primis lenias uētre. Et educaas materias communes si fue int retentæ cum clysteribus in apostemate cal. quod est secundum plurimum frigidis & humidis, sicut est aqua decoctionis hordei, sebesten uiolarum, & oleo uiol. aut cum lacte & oleo uiol. & pauco saccharo. Et addatur cassia si fuerit opus magis lenire. Et si fuerit opus magis infrigidare, ponatur in clysteribus aqua solatri aut mucilago psylli. Deinde quā citius fieri potest fiat phlebotomia basilicæ. Et hauriantur. 6. aut. 8. 3. sanguinis, aut plures secundum repletionem & uirtutem. Et si apostema fuerit uehementis magnitudinis communicans uis urinae, & retinens ipsam fiat phlebotomia saphenæ eiusdem lateris post phlebotomiam basilicæ, & hauriatur notabilis quantitas sanguinis. Et attendatur etiam lenitati uentris cum sumptis per os, quæ cū hoc etiam sicut aqua hord. cum mucilagine psylli, & similibz, præter cucurbitam. Inest enim ei mala proprietates in passionibus intestinorum. Et ex propriis est aqua siue succus duorum granatorum. 5. 3. Item aqua endiuia, & aqua solatri, cum quibus si opus est lenire uentrem misceantur. 3. 6. aut. 3. 1. florum calsiæ, aut. 3. 2. mannae, & hoc tempore super loco apostemato ponantur reperculsiua frigida non stiptica multum sicut oleum uiol. mixtum cum oleo ros. Deinde in augmento misceantur cū sum

sumptis interius & clysterizatis resolutiua & mollicia cum repercussione, sicut aqua decoct. horde. sebesten & pafularum, & his possunt addi in decoctione folia althææ, & hac decoctio potest bibi & clysterizari, & si clysterizetur, huic potest addi oleum sesaminum & amygdalinum. Et circa statum fiat decoctio ex floribus chamæmillæ, se. maluanifci, se. lini, & similibus, qui clysterizetur addeado oleum sesaminum aut amygdalinum, aut parum uini cocti. Et si opus fuerit abstergere, ponatur. 3. i. sacch. rub. Et si tendat ad maturationem, addantur adipēs, & si post maturationem rumpatur regatur cura ulceris intestinorum, de qua infra, & similes intentiones habeantur in sumptis interius & applicitis exterius. Sicut interius est aqua decoctionis sebesten, hordei, pafularum, sicum, & se. maluanifci, & potest cum sacch. dulcorari. Et exterius sicut oleum ros. chamomellinum, sesaminum quibus potest addi pinguedo gallinæ, anatis, & similia. Itē possunt addi mucilagines maluanifci, se. nigr. se. lini, & ad confortandum miscetur secum oleum masticinum, & ad hanc intentionem possunt fieri emplastra & fomenta. Si uero apostema fuerit frigidum leniatur uenter primo. Deinde phlebotometur ex basilica. Et obseruentur eadem intentiones quæ posita sunt in calido, sed declinent ad calidum. Unde ea quæ competunt in augmento calidi possunt competere in principio frigidi, & quæ competunt in statu calidi, possunt competere in augmento frigidi. Sed in statu, & declinatione addantur magis calida sicut oleum de spica, oleum laurinum, adeps anseris, & similia.

Cura colicæ ex torsione & ex descensu intestini in butfam testiculorum aut in aliquam rupturam mirach.

Si fuerit ex torsione situctur æger supinus in loco temperato, prius eductis fecibus quæ sunt infra intestinum tortum cum clysteribus iuxta doctrinam datam in præcedentibus cap. Et manibus inuinctis in oleo de spica, de enula uel castoreo, si fuerit facta torsio ex uentositate, fricetur uenter primo leuiter descendendo & ascendendo, nunc ad latera trahendo & semper ascendendo cum frictione, & descendendo, & ad latera trahendo perueniatur ad locū ubi sentitur intestinum tortum, & hoc fiat pluries. Et si cum leui frictione non obedit neque redit ad situm naturalem, frictio fiat fortior etiam iterata. Et si non redit ad situm naturalem experiantur alii situs super latera similiter fricando. Et aliquando iaceat cum uentre deorsum. Item ipse sedens aut iacens se conuasset, aliquando se inordinato motu proiciat, aut aliquando per pedes eleuetur. Fortasse autem quod arte fieri nequit à calu redibit ad situm naturalem. Si autem à calu, percussione, saltu, & similibus causis primitiuis facta fuerit torsio, fiat hæc autem frictio sed leuior ne locus apostometur, & sint manus iunctæ cum oleo niol. aut simili frigido aut temperato. Et nullo pacto dentur in his casibus solutiua superius nisi prius intestinum fuerit reductum, & diætā ualde tenuis. Cumque intestinum est reductum procuretur exitus fecum iuxta superiorum doctrinam. Deinde uenter stringatur cum fascia strictura decenti ut non amplius difloccetur, & stringantur crura fortiter super genu & similiter adiutoria super cubitum, ne intestinum contortum apostometur. Et diætā sit tenuis lubrica. Et si fuerit ex descensu intestini in oscheum aut in aliquam fracturam sphac, prius feces quæ sunt infra intestinum illud diflocatum educantur & imponantur clysteria molliciantia quæ ascendant usque ad intestinum diflocatum & non sint acuta ut possint retineri. Et exterius applicetur molliciantia quæ etiam uentositatē carminant, ægro iacente supino & aliquantulum magis eleuato cum parte ad quam facta est diflocatio. Et si opus est ponatur in balneo molliciantē liquore, ascendente ad locū ubi retentum est intestinum diflocatum. Aut loco illi applicetur philtrea infusa in huiusmodi molliciantibus. Postea comprimatur intestinum cum sinuitate uersus aperturam. Et inter cetera obseruetur hoc ingenium, ut intestinum prope aperturam digitis stringatur ut sublietetur, & paulatim stringendo impellatur modicum, post modicum de intestino aut de fecce in eo contenta, donec paulatim quasi inungendo ad superiora totum interius impellatur. Nec faciendum est sicut faciunt quidam in experti qui totum fortiter comprimendo

una uice uolūt impellere. Et cum reductum est procuretur exitus fecum omni ingenio. Sed ante reductionem non dentur solutiua. Et diætā sit ualde tenuis & lenitiua. Et reducto intestino consolidetur ruptura cum ligatura braccali & reliquis necessariis interius & exterius applicitis.

Cura reliquarum specierum colicæ.

Si fuerit ex lapide in intestinis hu. lubricis, abstergentibus, quibus aliqua lapidem frangentia sunt admiscenda, curandus est. Quæ si lapis fuerit in superioribus intestinis per os exhibeantur. Si uero in inferioribus per clysteria. Si uero fuerit ex uermibus cum interficientibus & ipsos educantibus curetur iuxta doctrinam in proprio cap. ponendam. Si uero ex sang. in intestinis congelato fuerit educatur. Si fuerit in intestinis inferioribus cū aque decoct. hordei & fursuris & similia abstergentium molliciantium, cuius lib. 1. sit admixtum oximel simplex uel scilliticum. 3. 3. Si uero fuerit in superioribus detur aqua hoi. d. calida cum oximelle simplici uel scillitico & istis adhibitis tā superius quā inferius potest admisceri aliquid coaguli, sumptis per os usque ad 5. gra. sed clysterizatis usque ad 3. s. Si uero dolor in testinorum fuerit à solutione continui & fuerit ex causa exteriori, ut puta ex uulnere eius cura alibi perquiratur, & proprie ab Auic. quarti. Si uero fuerit ab humore acuto pingente & corrodeute siue sit colica, siue phleg. salsum, aut à cibo acuto, & est fm plurimū de genere pnnctionis, eius cura est habita superius cap. de punctione. Et si excoriatio & ulcens iam factū sit in intestinis cura perquirenda est interius in cap. de diffenteria. Est & superius posita cura colicæ quæ huic de seruit quantum est expediens. Si dolor intestini fuerit per coitatem ab aliis membris, puta à cerebro, neruis, pectore, hepate, splene, instrumentis urinæ, mirach & lacertis nētris, & similibus, aut per communiatem à toto, dux habeantur intentiones generales, una ad membrum mittens, altera ad membrum recipiēs, à quarū prima licet regulariter incipien dū frequenter tñ coacta à secūda incipimus. Si uero dolor fuerit à cā extrinseca, ut puta à potu aquæ frigida & balneo, in ipsa, uero septentrionali, sessione sup lapide, ab aere pestilenti, à ueneno sumpto, à cibis stipticis & poncticis, aut à proprietate facientibus hanc passionem dux sunt intentiones. Una est causam primitiuam remouere, eam omnino à corpore abiciendo uel quantum est possibile & inducere regimē contrarium. Secunda est dispositionem impressam corrigere. Quæ intentiones qualiter debeant compleri ex supralcritis patere potest.

De ileos.

Cap. 102.

Quid nominis & quid rei ileos quæ apud antiquos dicta est, Domine miserere mei propter mortem crudelem & obscenam post tantos cruciatus & hominum stercoreum, superius posita sunt. Quæ licet cum colica conueniat in quibusdam generalibus, scilicet causis accidentibus & cura, sunt tamen quandoque particularia quibus abinuicem differunt, scilicet causæ, dolor, exentia, iuuamentum remediorum, & ultimitas accidentium. Primo in causis, quidem differunt. Nam iliaca plus accidit à causis primitiuis & extrinsecis, & mala complexionē singulari & frigida, sicut in potu aquæ frigida in tempore non congruo, & hoc quia gracilia sunt stomacho propinqua magis. Item, frequentius accidit ab aere pestilenti propter propinquitatem ad cor. Et similiter à uenenis propter propinquitatem ad stomachum & ad cor. Et propter has causas magis permuat de regione ad regionem, & de corpore ad corpus in modū pestilentis morbi. Item frequentius accidit ab apost. propter uiciniam ad hepar, & maiorem multitudinem mesentericarum uenientium ad gracilia. Item frequentius accidit propter uehementiam uirtutis retentiæ, cum gracilia sint magis ordinata in retentione quā crassa, & econtra crassa magis ad expulsiōem, sunt enim gracilia strictiora. Sed econtra colica frequentius fit à causa corporea, scilicet uentositate, phleg. stercore sicco, uermibus & similibus, cum sint frigidiora & ad horum expulsiōem ordinata. Et si accidat in eis frequenter propter defectum expulsiuæ. Secundo. In dolore quidē primo quantum ad speciem. Accidit enim in gracilibus frequenter dolor pungitiuus & tortiuus. Pun-

Io. Arculani b 3 giciuus

gitius quidem propter choleram immediate ad ipsa ueniētem. Sed tortius propter ipforum longitudinem & plurimam reuolutionem, licet in quocunque intestino, quæcumque species doloris possit accidere. Secundo, quantum ad intentionem, est enim dolor in gracilibus intensior quàm in crassissimis, quia sunt magis nervosa & acutioris sensus. Tertio, in loco doloris. Nam dolor iliaceus est supra umbilicum, & hypochondriis magis, sed colicus est infra umbilicum.

Quarto, in permutatione, facilius enim ileos permutatur quam colica propter maiorem colligantiam & uiciniam intestinorum gracilium cum membris ad quæ permutari cōsuevit, de qua permutatione superius dictum est. Sed econtra in colica dolor est magis extensius, grauatiuus, & perfortius, & si aliquando est pungitius est propter uermes. Item, dolor colicus licet sit remissior, est tamen magis perdurans propter longam materiæ retentionem ex ipso spissitudine & carnositate. Et dolor magis est infra umbilicum circa pectinem. Et minus nocuum communicat superioribus nobilibus quam iliaca. Et minus permutatur, licet sit maioris permutationis ad iliacam quam econtra, cum enim colon aut sacculus oppilatur, materia regurgitat ad superiora in quibus propter ipforum stricturam facile retinetur & causat iliacam. Sed cum oppilatur superiora in iliaca materia ad stomachum regurgitat. Et si descendit ad crassa cum sit subtilis, & intestina illa sint larga non retinetur, sed descendit secundum plurimum & egreditur. Tertio, principaliter differunt in exeuntibus. Nam in ileos per anum fere nihil egreditur, & non nisi cum maxima difficultate, sed per uomitum plur. & facilius. Et illud est phlegmaticum, quandoque cholericum, quandoque uiride, prasinum uel eruginosum, quandoque nigrum melanch. Item plurimum uentosum cum eructatione, & tandem quandoque foetidum stercorosum cum uermibus mixtum. Et est secundum plur. mortale. Irē, in iliaca urina est magis tincta propter colorem auctiorem magis inflammantem. Item, propter retentionem cholerae quæ per canalem ad finem duodeni terminatum, ad gracilia transmitti consuevit, quare rediens ad uias urinae tingit ipsam. Sudor quandoque in iliaca magis contingit propter doloris uehementiam in spiritualibus angustiam imprimētē, & est frigidior, calore amplius ad locum doloris attracto, & uirtute magis dissoluta. Sed in colica cum clysteri aut collyrio facilius egreditur phlegma mucilaginosum & stercus scybalosum phlegmate inuolutum. Item, uentositas crassa sonans, & uermes. Et non fit nisi per compactionem gracilium, & stomachi ad gracilia. Item, urina in colica rubet propter dolorem inflammantem, & etiam propter compactionem renum in dolore, quare urinam retinent diu & tingitur, non autem propter cholerae regurgitationem. Quarto principaliter in remediorum iuuamento est differentia, quia iliaci iuuantur maxime per superius exhibita. Sicut colici econtra iuuantur per clysteria & suppositoria. Quinto est differentia in accidentium ultimata cōsecutione. Nam casus uirtutis, alienatio, spasmus, aluizes, instācia uigiliarum, tremor cordis, syncopis, frigiditas extremorum, singultus, & huiusmodi accidentia terroris, & tandem mors sunt in iliaca magis & in colica minus propter causas supra scriptas. Et apparet in iliaca inflatio oculi magis quam in colica, id est, inflatio monoculi. Et in summa iliaca est difficilior quam colica ex causa proportionali uel consimili. Et factam ex ueneno si significat antecessio ueneni, & alia accidentia ueneni, scilicet debilitas corporis, tremor cordis, quæ aliquando dolorem iliacum antecedunt. Et factum ex apostemate significat durities foecis, & uelocitas in egestione, id est, in uomitu foecis & febris. Cum aliis enim non erit febris nec casus uirtutis uehementis nisi forte fuerit ad ueneno. Et ex supra scriptis in hoc capitulo de colica iam manifesta sunt quid nominis & quid rei ileos causæ & signa.

Sed prognostica sunt ista. Primum, cum plus occidit ileos occidit in septimo, quod est uerum secundum plurimum, quandoque enim uidi etiam occidisse in quinto. Secundum. Cum accidunt accidentia horrenda supra scripta pauca est spes salutis, licet aliquos uiderim peruenisse ad uomitum stercorum accidentibus fortibus & euasisse. Tertium est aphor. sextæ partic. Cum ex distillatione accidit ileos moritur, cuius est

in septimo, nisi accidat febris & curat cum ea sudor plurimus. Et quamuis dicat Auic. Galenum causam huius aphorismi ignorauisse, credo causam esse, quia distillatio ex humiditate superflua accidit, propter quam superfluitates consuevit cum urina euacuari, sunt retentæ. Et regurgitantes ad intestina faciunt ileos. Febris autem superueniens est causa ut materia subiliata cum sudore educatur, per cuius presentiam causabatur distillatio & ileos. Quartum ileos, phlegmatica & uentosa iuuantur febre. Quintum, bonitas urine in ileo non facit fiduciam sanitatis, quid ergo iudicandum est de urina mala? Sextum, deterior ileos est in quo egreditur stercus uomitu. Deinde illa in qua egreditur sudor foetidus, scilicet habens odorem stercoris. Tertio, in quo est anhelitus habens odorem stercoris. Quarto, in quo est eructatio habens odorem stercoris. Quinto, leuissima omnium est in qua inferior uentositatis est foetida. Cura ileos proxima est curæ colicæ. Verum differt à cura colicæ in tribus. Prima differentia est, quia cura eius maiorem exigit festinationem quam cura colicæ, quanto est morbus acutior tanto minores dat inducias. Secunda differentia est, quia bibita sunt cum hac magis iuuatiua quam supposita, cuius oppositum est in colica. Causa autem differentia est, quia clysteria & lychnia non ascendunt nisi difficulter ad intestina gracilia. Attamen bibita & supposita sunt in eius cura necessaria, & quamuis Auic. dicat quod non refert à quo incipiatur an à bibitis an à suppositis, dummodo alterum subsequatur. Ego tamen existimo melius esse incipere à clysteribus ut intestina crassa mundificentur ab his quæ in eis continentur, ut uia exitus superfluitatum quæ dolore faciunt intestinis gracilibus sit expedita, & facile possint descendere, & eo magis, quia oppilatio inferiorum & præcipue sacculi frequenter est causa retentionis superfluitatum in superioribus. Et consequenter doloris eorum quamuis inferioribus, & proprie in sacculo non sit dolor propter suam amplitudinem. Et clystere primum debet esse lenitium secundum, acutum ut eradicet materias ab inferioribus, & trahantur à superioribus. Et clysteria ista debent esse magnæ quantitatatis, & postea quam citius fieri potest, subsequatur aliquod lenitium de super. Et Auic. dicit, quod sorbitio aquæ calidæ sedat dolorem. Ego tamen credo tutius esse ut exhibeatur oleum commune bene conditionatum. 6. aut. 8. 3. debite calefactum, & elaboretur cum ingenio ut retineatur. Aut si abhorreatur, detur lib. 1. brodii caponis uel gallinæ multum pinguis, sed melius galli decrepiti. Aut detur alia medicina lenitiua ex casia, manna, & similibus dictis in colica. Et apud necessitatem misceantur cum diaphænicone, diacitonitene, electario indo, & similibus. Aut ipsa sola electaria exhibeantur cum lenitiuis sicut brodio galli decrepiti, aut aliquo modo secundum exigentiam, ita ut fiat deoppilatio & retenta educantur. Tertia differentia est, quia in iliaca magis est necessaria phlebotomia quam in colica, ita ut non solum in apostemosa sit necessaria, sed etiam frequenter in aliis speciebus. Nam propter fortem dolorem & multitudinem uenarum meseraicarum uenientium ad gracilia sunt magis apta apostemari gracilia quam intestina crassa. Item, quia facta oppilatione in gracilibus magis per corpus sparguntur humores consuevit euacuare quam propter oppilationem in crassis quæ sparsi phlebotomia sunt euacuandi. Obseruatis ergo his tribus differentiis, procedatur ad curam iliace secundum unamquamque causam secundum quod dictum fuit in colica. Item, ut intentiones illæ & remedia ibidem dicta secundum unamquamque causam colicæ ad hunc locum afferantur, curando iliacam à simili causa pendente sicut dictum est in colica. Nam à quacunque causa potest pendere colica ab eadem uel simili potest pendere iliaca, & econtra. Et obseruetur quarta differentia, quia diēta debet esse magis tenuis in iliaca quam in colica, quanto iliaca est acutior colica.

De fluxu uentris.

Cum cibis in stomacho morē solito non moratur, imo citius egreditur, non mutatus nisi parum; & fuerit quod hoc mordicatio, & dolor in uentre, & sitis, cum quo etiam plerumque adest uentris fluxus, in quo ante cōtionem

Stionem inuenitur aliquid purulentum; detur t̄ agro rob de succo uuae acerbae, aut de succo ribes, aut de succo granatorum, cum spodij, & ros.amborum ana. drach. 2. trochisci quoque de spodio constricti in idem tribuantur. nutriantur uero ex adesta citrina, & pullis cum aceto coctis, & assatis, & cū succo uuae acerbae positus in potu uero sumat sumach cum aqua ros. & deinde nutriatur ex cibo, cui admiscetur sumach, qui uocatur sumachia. totumque eius regimen ad hoc perducatur, ut in frigidare possit, & constringere.

Hoc capitulum diuiditur in quinque partes. In prima agit de lienteria. In secunda de fluxu chilo. In tertia, de diarrhoea. In quarta, de dysenteria. In quinta, de tenesmo. In secunda ibi. Si uero cibus non egreditur. tertia ibi. Si autem quod egreditur citrinum fuerit. quarta ibi. Quod si ex fluxu ueris euenit excoriatio. quinta ibi. Trochisci ad tenesmonem. Primam partem diuidit in quatuor. In prima ponit generalia signa lienteriae. In secunda agit de lienteria pendente à cholera & excoriatione siue ulcere stomachi. In tertia agit de lienteria pendente à phleg. existente in stom. In quarta parte agit de lienteria pendente à mala complexionem stomachi frig. & hum. sine materia. Secunda pars incipit ibi parum distanter à principio. Et fuerit cum hoc mordicatio. tertia ibi. Quod si non fuerit cum eo mordicatio. quarta ibi. Si autem cum hoc quod diximus nihil egreditur. In prima parte ponit duo signa generalia lienteriae. Primum, quod cibus in stomacho non moratur quantum consuevit. Secundum quod egreditur, scilicet per anum extra corpus non digestus nisi parum. Est enim lienteria fluxus cibi indigesti. Quod potest esse tribus modis, aut quia cibus nullo modo est digestus, quia egreditur in ea qualitate & quantitate in qua sumptus est, aut quia est diminute digestus secundum quodlibet eius, aut tertio, quia aliqua pars eius difficilius digestio non est digesta reliquo ipsius existente digesto. Item secunda parte, primo ponit signa lienteriae à cholera & ulcere pendentes, quae sunt mordicatio, & dolor in uentre, id est, in stomacho, & sitis cum quo plerumque est fluxus uentris, in quo etiam ante comestionem inuenitur aliquid purulentum, id est, saniosum. Deinde dat remedia infra scripta. Primum est rob de succo uuae acerbae, aut rob de succo ribes, aut de succo granatorum quae omnia sunt frigida, sic. & stipica, & permiscenda sunt cum spodij, ros. ana. 3. r. & posunt dari haec tria rob simul mixta, & singulum de per se. Secundum est trochisci de spo. quorum descriptio ponetur in hoc cap. & sunt praestantes in hac re. Tertium est quod nutriatur ex adesta citrina, id est, ex cibo facto ex lentibus cum pauco sapharani, sed prima aqua decocto. letum semper debet abici. Item, ex pullis cum aceto coctis, haec est gelatina. Item, ex pullis assatis positus in succo uuae acerbae. id est, agrestis, & in potu sumat aquam ros. infusionis sumach. Item, comedat sumachiam, id est, cibarium factum ex granis sumach frig. siccis, & stip. optime ualentibus in hoc proposito & myrtea & limonea sunt praestantis iuuamenti. Nota tamen quod existente ulcere in stomacho caueas ab acerbis & acerosi notabiliter, ne sequatur mordicatio intolerabilis. Et in casu ulceris ultimum remedium est succus plantaginis cubolo ar. aut trochisci de spodio dissoluti in succo dicto.

SCHOLIA

Cum quo plerumque adest uentris fluxus non in qualibet lienteria coniungitur plurimus uentris fluxus. Sed satis est id cibi, quod sumitur, parum in uentriculo morari, & quodammodo mutatum egredi. Detur agro rob de succo uuae acerbae quoniam lienteria breui resoluat uirtutes, easque debilitat; iccirco nos docet Rasis agrotanti ea exhibere, quae facultatem habent stipicam.

Quod si non fuerit cum eo in uentre mordicatio, neque quod egreditur pus habet admixtum, sed est uiscosum, & adest inflationis paucitas, & ructus acidus, & pauca sitis; agro t̄ sicla, & sinapis, & pisces saliti tribuantur. deinde t̄ cogatur ea uomere, sumendo sale, & mel. & anethum coctum. quae si non succederint; medicamen, quod expellit phlegma, tribuatur: quod t̄ recipit aloes, drachmam unam, colo-

cyntibidis interioris drachmas quatuor, salis indi drachmas quatuor, turbit drach. 1. ex his fiant pilulae, & sufficiunt ad dosim. 1. uomitu praeterea saepe utatur. et cibaria, quibus utitur in alimuri, per se intingantur. & come dat fulcita, quae sale condiuntur, & acrimoniam habent, quae appetitum prouocare consueuerunt.

In hac secunda parte primae partis agit de lienteria à phlegmate dicens, quod si non fuerit mordicatio in stomacho, nec illud quod egreditur per anum pus habet admixtum, licet sit uiscosum, sicut est de natura phlegmatis, & paucitas inflationis & pauca sitis, eructuatio acida, quae omnia attestantur frigiditati, detur primo agro hoc uomituum. Recipe anethi manipulum unum uel duos bulliant in unam libram aquae ad consumptionem medietatis & coletur, cum qua decoctione colata. 5. uel. 6. unciae administrentur, mellis. 5. 2. salis. 3. 2. & totum tepidum sumatur postquam aeger prius comederit siclam, id est, blitem, sinapim, id est, mostardam & pisces salitos, quae omnia sunt incidentia phlegma, abstergentia & subtiliantia, deinde tentet uomitum, digitum aut penam in gutture imponendo, ut phlegma simul cum eo quod sumptum est educatur. Secundum remedium hoc non sufficiente est ut detur una ex pilulis infra scriptis. R. aloes solutiu phlegmatis & cholerae. 3. 1. colocynt. interioris solutiu phlegmatis chol. & aquositas. 3. 4. sal. indi solutiu phlegm. & melanch. 3. 4. turbit solutiu phlegmatis. 3. 1. fiant pilulae crassae. Tertium remedium quod utatur saepe uomitu, hoc enim promptius est ad mundificandum stomachum quam solutio. Quartum, quod cibaria sua quibus utitur intingantur in alimuri, id est, in balsamento facto ex pisciculis salitis & aromatibus, parso, id est, dissoluto, & comedat fulcita quae sale condiuntur, & quae habent acrimoniam, id est, acuitatem per aromata quae fulcita consueuerunt prouocare appetitum, & haec fulcita sunt mortatellae, & similia.

SCHOLIA

Aegro sicla, & sinapis, & pisces saliti tribuantur nam haec incident, subtiliant, & parant pituitam. Deinde cogatur ea uomere sumendo sal, mel, & anethum coctum. i. post horam uomere nitatur. sal, & anethum cum aliis medicamentis mixtum uim possident per os educendi humores pituitosos. mel praeterea abstergit. Quod recipit aloes purgant haec pilulae pituitosos humores, & crassos; sed noxi, & uehementer soluunt.

Si t̄ autem cum hoc, quod diximus, nihil egreditur super fluum, neque quod expellitur, aliquid purulentum, uel phlegmaticum habet admixtum; agro unum forte purum tribuendum est. & diabolianum dandum, quod recipit olibani. 3. 1. 0. piperis, ameos, sic. cheisim, anisi, nigellae omnium ana drach. 2. balaustie drach. 1. 0. mellis desummati quantum sufficit ad conficiendum. detur ex hoc in potu; quia stomachum calefacit, & uehementer desiccatur. apozema quoque, quod in cap. colicae passionis nominauimus, detur. & assuescat in potu sumere unum purum.

In hac quarta parte & ultima huius primae partis principalis curat lienteriam à mala complexionem frigida & humida sine materia, & quae dicit nota sunt. Nam ea quae ipse concedit sunt calida, sicca, constringentia & stomachum corroborantia. Et omnia nota sunt, cheisim, id est, leuisticum.

SCHOLION

Si autem cum hoc & c. huiusmodi signa declarant uirtutem digestiuam, & retentiuam debilem factam, cuius curationem adhibet.

Sed uero cibus non egreditur, sed res subtilis, alba, & aquosa, cum qua sunt ea quae t̄ hepatis significant debilitatem; agro tribuatur id, quod fit de scoria, et diabolianum, & electarium diacalamentum, & trochisci calefacientes hepar, quos nominauimus, & electarium diacalamentum, quod recipit foliorum rutae, calamenthi sic. ameos, carui, cheisim, zingiberis, cinnamomi, macro piperis, omnium partes aequales. conficiantur cum melle cocto. & dentur alia Io. Arculani b 4 medicamina

medicamina, quæ nominauimus in cap. hepatis ex his, quæ ipsum calefaciunt, & confortant.

Hæc est secunda pars principalis huius cap. in qua agit de fluxu chyloso & habet duas partes. In prima agit de fluxu chyloso propter nocuentum hepatis & maxime debilitatem attractiuæ eius. In secunda uero agit de fluxu chyloso sequente nocuentum stomachi & intestinorum, & maxime debilitatem retentiuæ eorum. In secund. Si autem cum prædicta egritudine. In prima parte ponit primo signa fluxus chyloso dicens, quod si cibus nō egreditur imo egreditur res subtilis aquosa & alba quæ est chylus, est enim chylus substantia alba, subtilis aquosa ex meliori parte cibi per primam digestionem genita, ad sunt etiam ea quæ significant hepatis debilitatem, scilicet mala complexio frigida, aut apostema, aut oppilatio ex quibus debilitetur hepar, & maxime secundum attractiuam dentur remedia infra scripta. Primum id quod fit ex scoria ferri superius in capitulo de debilitate stomachi descriptum. Secundum est diabolbanum in parte præcedenti descriptum. Tertium, trochisci calefacientes hepar, scilicet trochisci de rhabarbaro, trochisci de lacca, de quibus superius in capitulo de dolore hepatis. Quartum est diacalamentum quod hic describit. Et nota sunt omnia ex sape dictis, & ualent hæc medicamina ad calefaciendum hepar, excitando, confortando, & faciunt chylum penetrare per ipsum, & remouent eius oppilationes.

SCHOLION

Quæ hepatis significant debilitatem talis fluxus ab hepatis obstructione profectus non curabitur (id quod multi morborum cause imperiti faciunt) cum medicamine stiptico; obstrui et enim magis meatus egritudinem; maligniorem produceret.

Si autem cum prædicta egritudine non fuerit significatio debilitatis hepatis, imo quod egreditur, subtile est, & album, fuerit in stomacho grauitas; puluis de malis granatis ad transglutendum dandus est, cuius confectio. Recipe of sium granatorum acetosorum, & tritorum, ut alcohol, drach. 10. carui, seminis coriandri, amborum aceto acerrimo infusorum, & postea assatorum ana drachmas uiginti, xilocarar, sumach, balaustie omnium ana drachmas decem. puluerizentur optime, & dentur ad transglutendum. electarium quoque, quod dicitur chanzi, detur, quod recipit arillorum passorum tritorum, ut alcohol, libram unā, myrtillorum siccorum puluerizatorum, ut alcohol, libram seminis, xilocarar, nabati, balaustie, seminis tamarisci, ameos omnium ana drachmas decem. conficiantur cum melle de canna, aut cum melle apum optime dissumato, & electarium sumatur.

In hac parte secunda huius secundæ partis principalis curat fluxum chylosum ex debilitate contentiuæ stomachi, & intestinorum prouenientem quæ sequitur secundum plurimum malam complexionem humidam, non enim tanto tempore retinet chylum quod possit per hepar attrahi medianibus meseraicis. Et ponens signa dicit, quod non sunt signa debilitatis hepatis, sed ad sunt signa debilitatis stomachi, quæ grauitas. Tunc detur patienti puluis de granatis, cuius descriptionem ponit. Et sunt nota omnia ex supra scriptis. Xilocarar, id est, cornua ligni, & sunt carubæ. Hic autem puluis potest cum aliquo liquore permisceri, ut miua & uino citoniorum. Secundum est electarium quod dicitur chanzi, forte nomine inuentoris, & descriptio manifesta est, hæc enim sunt notabiliter sicca, parum secundum qualitates primas à temperamento recedentia, & confortantia retentiuam stomachi & intestinorum per siccitatem, stipticitatem & proprietatem.

SCHOLION.

Puluis de malis granatis ad transglutendum dandus est plurimum ualeat, sed magis in uicibus uentriculi corrigendis, maximeque uirtute retentiuæ debili: adhæret enim atque complectitur eius partes facilius ita, ut alia medicamenta possit habere.

Si autem quod egreditur, citrinum fuerit, & anum mordicat, egerq; sitim patitur, & febrem; trochisci constrin-

ctiui de spodio, et aqua sauch, hordei detur. et trochisci constricui de spodio. Rec. rosarū rubeorum, spodij ana drach. 10. seminis acetosi, sumach, balaustie, gummi arabici omnium ana drach. quinque. informantur trochisci pondere drach. 2. quorum unus cum. 3. de rob citoniorum simplici sumatur. aqua uero sauch hordei ita fit. Hordeum factum in aqua ipsum cooperiente bulliat donec aqua inspissetur. deinde coletur & bibantur ex eo uncias quatuor cum drachmis tribus spodij & gummi arabici eadem quantitate.

In hac tertia parte principali curat diarrhæam græce, quæ latine significat fluxum. Et dicitur à διαρρῆα uerbo græco, idem quod fluo significante, nomen enim generis sibi uendicauit cum frequentius ceteris fluxibus accidat. Est autem descriptiue fluxus unius, plurium, aut omnium humorum præterquā sanguinis, qui si fluere diceretur fluxus sanguineus, maxime tamen hic curat fluxum cholericum dicens. Quod si illud quod egreditur fuerit citrinum, & anum mordicat, egerq; sitim patitur & febrem, quæ omnia cholere attestantur, trochisci de spodio constricui statim dentur, quorum descriptio satis nota est. Et sunt præstantes, in frigidantes, confortantes, & fluxum stringentes, & maxime debent dari cū succo citoniorum. Similiter debet dari aqua sauch, hordei, q; fit ex hordeo torrefacto super quo ponatur tāta aqua, quod notabiliter cooperiat ipsum, potest. n. esse aqua nigecupla aut etiam minoris quantitatis ad ipsum & bulliat usq; ad aliqualem inspissationem aque. deinde coletur, & cum quatuor uncias eiusdem miscantur spodij, gummi arabici ana drach. 3. & in potu pluribus uicibus sumatur. Hæc enim optime confert in frigidando, constringendo, & dolorem seu punctionem sedando.

Quod si ex fluxu uentris euenerit excoriatio; puluis de bolo ad transglutendum detur. qui recipit psilly drach. 20. seminis plantaginis 3. 10. gummi arabici, boli armeni amborum ana. 3. 3. psillium affertur, & gummi, & bolus puluerizentur, & commisceantur, & sumatur in potu ex eo in mane drachmas tres cum rob, de citonijs, & circa noctem tantundem. cibus uero eius sit pulmentum factum cum granis granatorum & passis cum aqua & aceto. & cibus factus cum succo uinæ acerbæ, & sumachia, & castæ, cui ad miscetur succus sumach, & his similia cibaria. trochisci de balaustijs, qui cum nimie conferant diarrhææ, dandi sunt; cum fluxus fuerit superfluous, sine habeat sanguinem admixtum, siue non. Recipe gallarum, siliquarum nabati, seminis tamarisci, olibani, balaustie, omnium partes æquales, opij, gummi arabici amborum ana partem semis. informantur trochisci pondere drach. 2. ex quibus unus cum uino sumatur. si neque calor affuerit, neq; febris. sed si febris affuerit; cum rob de citonijs acetosis sumatur: qui tunc dandi sunt, cum fluxus uentris superfluous fuerit.

In hac quarta parte principali Ras. curat disenteriam dictam à διας, quod est male, & στερρ quod est intestinum. Isidorus sexto ethimologiarum, & est descriptiue fluxus uentris cum excoriatione, aut ulcere intestini. Pro cuius cura primo dat puluerem de bolo, cuius est hæc descriptio. Rec. psylli frigidi & humidi in secundo, sed per assationem minuit eius humiditas drach. 20. sem. plantaginis frigidi & sicc drach. 10. gummi arabici frigidi & sicc, uiscosi, boli armeni frigidi & sicc, stiptici, uiscosi proprie in consolidando ulcera intestinorum ana drach. 3. psillium affertur, & gummi, & bolus armenus puluerizati commisceantur, de quo puluere sumatur drach. 3. in mane & per duas horas ante coenam cum rob de citonijs. Cibus sit pulmentum, id est, ius cibale in quo sint grana granatorum & passæ, & aliquid aceti sed modicum timetur enim excoriatio ex aceto, item cibus factus cū agresta, & sumachia, id est, cibus factus cū granis sumach, & his similia, sicut limonea & myrthea. Dat tertio trochiseos de balaustijs opiatos, quorū descriptio nota est, & iubet dari drach. 2. pro uice cum uino non existente febre, & cum rob de citonijs si adsit febris. Hi tamen non debent dari nisi cum superfluous

perflus fluxus, & cætera non contulerint, una tamen drachma ab initio experienda est. si liqua nabati, idest carubia regionis illius.

SCHOLION

Psillum afficitur, & gum. psillum afficitur, ut corrigatur facultas illa ulcerandi, & dissoluendi. gum. quoque, ut, cum liniat, stiptica reddatur.

Trochisci ad tenesmon, qui tunc dandi sunt, cum calor absentia fuerit, & uentositas erit nociua, et sonitus. Recipe ꝑ seminis hyoscyami albi, seminis anethi, seminis feniculi omnium ana drach. 5. ameos drach. 2. & semis, opij drach. 3. seminis apij drach. 10. fiant trochisci, de quibus pondus unius aurei in potu sumatur. confectio electuarii de styrace, quæ antiquo fluxui uentris confert, ac tenesmon, cum neque febris, neque calor affuerit, sed aderit uentositas nociua, danda erit. Recipe ꝑ castorei, opij, assari, styraçis liquide, myrrhæ seminis hyoscyami nigri, thuris omnium partes æquales, melis quantum sufficit ad specierum confectioem, cuius dosis sit drach. 2. uel tres. si autem, postquam tenesmon decem transierit dies, non uisa fuerint medicamina cõferre, & æger super pectinem sentit dolorem, redeundum est ad clystere. Quod recipit panici excorticati, rizi excorticati, lentium excorticatarum, rosarum siccarum, balaustræ, cupularum, glandium omnium ana manipulum unum. omnia in tres libras aquæ coquantur, donec ad unam & semis redeant. deinde colentur, deinde sumantur cerise, cineris papyri ambræ ana drach. 1. boli armeni drachmam semis, uitelli oui unius assati duri, olei ros. unciam semis, ex his omnibus in prædicto apozemate fricando dissolutis clysterizetur æger semel, aut bis.

In hac quinta parte & ultima huius capituli ponit curam tenesmonis, tenesmonis autem siue melius siue quod, græce idem significat quod gemitus latine dictum à τενεω uerbo græco, idem quod gemo significantem, est descriptiue expressio intestini recti cum gemitu & conamine ad egerendum facta ab expulsiua stimulata à causa præternaturam existente in ipso, aut in extremitate eius quæ est anus. Hæc pars diuiditur in quatuor partes. In prima parte curat tenesmonem pauci temporis. In secunda tenesmonem longi temporis. In tertia ponit duo antidota optime ualentia in constrictione fluxus uentris. In quarta parte ponit remedium ultimum in tenesmonem. Secunda pars incipit ibi. Quod si tenesmon fuerit longi temporis. Tertia pars ibi. Epithyma de quo. Quarta pars ibi. Quod si æger. Primam partem possem diuidere in tres secundum quod tria affert remedia pro curando tenesmonem, partes patebunt discurrendo per textum. Primum remedium est trochisci cum adsunt signa frigiditatis, & est uentositas nociua ab humore frigido eleuata, quæ cum sonitu emittitur, horum descriptio est ista. Recipe seminis hyoscyami albi, frigidi in principio quarti gradus stupefactiui, seminis anethi calidi in secundo resolutiui uentositatis, seminis feniculi similiter calidi, omnium ana drach. 5. ameos calidi in secundo uentositatis resolutiui drachmas duas semis, opij drachmas tres, seminis apij calidi. aperitiui uentositatis resolutiui drach. 10. fiant trochisci, de quibus detur pondus aurei unius, sed medietas aurei in primis tentanda, nam in uino auro ingrediuntur plura quam sex gran. opij. Secundum remedium est electuarii de styrace conferens antiquo fluxui uentris & tenesmonem cum adsunt signa frigiditatis & uentositatis. Recipe castorei calidi in principio quarti, opij correcti, assari, idest, baccaræ calidæ & siccæ, styraçis liquide, mirrhæ calidorum & siccorum, seminis hyoscyami nigri, frigidioris quam albi & deterius, quo raro utendum est, est enim frigidum in fine tertii gradus, album uero in principio tertii thuris omnium partes æquales mellis quod sufficit ad specierum confectioem. Et debet esse quadruplū ad species, dosis eius est à drachmis duabus ad tres, sed sufficiat medietas. Tertio, ponit clystere constrictionem conueniens in tenesmonem postquam transierint dies uiginti dolore existente in intestinis crasis. Recipe panici excorticati frigidi & sicci, rizi excorticati calidi

& sicci, lentium excorticatarum, rosarum siccarum rub. balaustræ, cupularum glandium omnium frigidarum & siccarum ana manipulum unum, bulliant in tres libras aquæ donec redeant ad unam & semis. sed iudicio meo opus esset maiore quantitate aquæ pro sufficienti decoctione de qua accipitur libram unam & semis, deinde misceatur secum cerussæ frigida & sicca, cineris papyri babilonici calidi & sicci, stiptici ana drachmam unam. Est autem papyrus babilonicus iuncus syluestris super quo antiqui scribebāt, hoc utimur ad obturandum uegetes ne nimium exeat, boli armeni drachmam semis, uitelli duri unius oui, olei rosacei, uncia semis, ex his omnibus ad inuicem commixtis fiat clystere, est enim cõstrictum sua stipticitate & uiscositate.

SCHOLIA.

Recipe castorei ꝑ hæc, & superior confectio ut stupefaciant, ita dolorem minuant, sed malle hæc composita sex menses post esse propinata, ut uis frigida frangeretur. quod rec. panice ꝑ fortasse noceret, si uentos dissolvere uelimus, sed proficeret ori uenarum apertarum, musculis relaxatis, & fluxui ex humore falso genito.

Quod si tenesmon fuerit longi temporis, in quo non egreditur sanguis, sed rasura alba, & mucilagini similis, medicamen putredinis, quod in capitulo putridarum gingiuarum nominauimus, dandum est, ex quo in apozemate eorum, quæ nominauimus frictio, & dissolutio clystere semel, aut bis fiat. & si ex uentris fluxu in uentre uehemens mordicatio secuta fuerit, clystere fiat ex oleo rosato tepido. si autem nullo modo mordicat, clystere ex illo medicamine addatur multoties donec sanetur.

In hac secunda parte huius quintæ partis principalis curat tenesmon longi temporis quando iam factum est ulcus putridum in intestino recto. unde illud quod emittitur est album simile mucilagini saniose. curat autem ponendo in clysteri superscriptæ descriptionis medicamen superius positum in capitulo de cura gingiuarum sanguinolentarum, quod est notabiliter corrosiuum propter arsinicum, calcem, & reliqua acuta quæ ingrediuntur eius compositionem, de hoc tamen non est in clysteri nisi parua quantitas imponenda, scilicet drachmam semis, & si non senserit ardorem ponatur secunda uice unciam unam, & si procedatur augendo quantitatem donec senserit notabilem ardorem, ponitur enim ad causticandum carnem putridam impediendam ulceris consolidationem. Propterea subiungitur quod si ardor superuenierit, clysterizetur cum oleo rosaceo tepido ad ardoris sedationem. Illud tamen non fiat immediate, ne operatio medicinæ impediatur.

Epithyma quo uenter, cum fluxus uehemens est, & uirtus debilitata, leniendus est. Recipe galliæ, acatiæ, cyperi, mirrhæ, galliarum, cupressi, thuris, omnium partes æquales. ex omnibus bis uino ueteri, aut succo citoniorum conspersis liniatur uenter. huic quoque quandoque additur panis bis coctus de syria. si autem cum hac ægritudine fuerit calor, epithyma fieri conuenit ex duobus sandalis et ros. & bolo armeno, & faufel, & galliæ, & pane bis cocto cum succo macianorum, aut citoniorum, aut myrtino.

In hac tertia parte huius quintæ partis principalis describit duo antidota, primum in causa frigida, secundum in causa calida, optime ualentia ad fluxum constringendum, & descriptiones notæ sunt. Acacia est gummi cuiusdam arboris, quæ non est apud nos, sed pro ea accipimus succum prunellorum immaturorum. Faufel, idest, auellana inda frigida & sicca, quam non habemus.

SCHOLION.

Epithyma siue emplastrum uentri applicandum non est humoribus multis existentibus, sed ualde profunde cum fluxus superfluit.

Quod si æger uehementer patiatur tenesmonem, & sepe uadat ad sellam, & nihil tamen egreditur, collyrium istud subijciatur: est enim mirabile ad sedandum tenesmonem, quod recipit thuris, licij, croci, gummi arabici ana. 3. 1. opij. 3. 2. informentur collyria, & supponantur.

In

In hac parte ultima ponit remedium ultimum in tenefmo ipsius sedatium stupefaciendo, ex hoc enim medicamine debent fieri collyria, id est, suppos. subtilia longa ad quantitatem digiti parui, & debeat optime ligari ut possint extrahi ad libitum. melior autem modus est, ut massa ex his medicinis cum albumine oui confecta optime permisceatur. cum lino, scilicet accipiendo tantum de lino & massa illa quantum sufficit pro uno lichenio, & bene aduicem misceantur, & exiccari permittantur & supponantur apud magnam necessitatem, ita ut totum collyrium anum ingrediat, & cum dolor incoeperit sedari, & somnus induci ilico extrahatur, est enim dubium si remaneret ne agrum interimeret. Recurre tamen pro administrandis opiatibus ad ea quæ dixi in tractatu de fluxibus. Rasis enim hic procedit ordine retrorgrado in cura tenefmi, nam incipit ab opiatibus, cum tamen debeant postponi. Item pro cura tenefmi debemus primo facere clystere mundificatium, deinde constrictium, tandem his non sufficientibus administrantur opiata incipiendo iuxta canonem Auicennæ ab his quæ exterius applicantur. Quibus non sufficientibus ueniendum est ad suppositoria, dimittendo tamen ea paucio tempore. Tertio ad clystera suppositoriis non sufficientibus. Quarto ad exhibitionem per os eorum quæ opiata sunt. Non tamen hæc administranda sunt nisi uirtute existente forti, nec quotidie sed per interualla.

SCHOLION

¹ Quod &c. Iplura ex his simplicibus medicamentis fiant collyria ad nucleei pini magnitudinem.

TRACTATUS PRIMVS

de fluxu uentris in generali duo continens capitula.

De quidditate speciebus, causis, signis, & prognosticis fluxus in generali. Cap. 1.

Fluxus uentris est motus ad expellendum rem materiale a corpore per uiam intestinorum & ani factus a uirtute, aut aliqua causarum præternaturalium. In hac diffinitione ly motus cadit loco generis. Et tangitur per ipsum causa formalis fluxus. Per ly ad expellendum tangitur finis, est enim cuiuscunque fluxus finis materia a corpore expulso. Per ly rem materiale manifestatur materia siue obiectum a corpore expellendum scilicet ad differentiam uaporis uentositatis, & spiritus, quæ non dicuntur res materiales apud medicos. Per ly a corpore per uiam intestinorum, & ani, ponitur causa materialis, in qua reliquæ particulæ diffinitionis manifestant causam efficientem, sit enim aut a uirtute expulsiua, aut ab aliqua causarum præternaturalium, sicut a compressione facta super uentrem, aut a grauitate materiz uirtute iam defecta, sicut accidit in timentibus, & in propinquis morti in quibus casibus, aliquando nullo modo uirtus expulsiua concurret, sed est defectus contentiue, quæ tamen non est per se, & adequata causa fluxus, cum nullum priuatium sit per se causa positiui, sed per se concurret grauietas materiz, & alia huiusmodi, defectus autem contentiue per accidens.

Species & differentiz fluxus sumi possunt secundum unamquamque causam in diffinitione positam ut a causa formali, quia motus ille est siuauis uirtuti & repletioni proportionatus, aut insuauis, illis non proportionatus. Similiter a causa finali, quia aut expelluntur nocentia, & dicitur laudabilis, aut inuuantia & dicitur illaudabilis. Similiter a causa materiali obiectiua, quæ fluxus expellitur sumuntur hæc differentiz. Quod enim expellitur aut est quid extrinsecum incorporum sicut cibi, potus, & medicinz, & sub lubricitate, & lentoria continetur. Aut est quid intrinsecum corporeum. Et hoc est duplex, aut est immediate ex cibo genitum secundum plurimum eius. Et hoc est duplex, scilicet chylus, & dicitur fluxus chylosus, aut est fœx, siue stercus, & dicitur fœculentus, seu multi stercoris, aut non est immediate ex cibo genitum. Et est duplex, scilicet continens & contentum. Continens sicut membrum, pars membri, frustum eius, aut pellicula &c. Contentum uero quod fluxus expellitur. Aut est ex naturalibus humoribus, puta sanguine, phlegmate, cholera,

& melancholia, & ab humore proprio generaliter nuncupatur, quia sanguineus, phlegmaticus, cholericus, & melancholicus, & specialiter a specie uniuscuiusque, sicut phlegmaticus saluus, cholericus uitellinus, & sic de singulis. aut est ex non naturalibus sicut fluxus a prædictis humoribus corruptis perductus, quia fœtidus, prasinus, eruginosus, saniosus, uirulentus, lotius, sicut lotura carnis, aquosus, fœculentus, niger, sicut sang. aut uini fœx, fellus niger, & niger melancholicus, & per aduersionem phlegmatis genitus, & fluxus diuersorum colorum, & quod est simile carni hepatis. Et hi secundum plurimum sunt species hepatici. Et quandoque est ex uermibus quotidie aut frequenter expulsi, sicut in infantibus qui lacte nutriuntur, & quandoque est ex lapidibus, quæ tamen nunquam uidi, cum tamen semel uiderim apothema ex lapidibus duris, & satis crassis in inguine, & lapides è pulmone excreatos. Differentiz autem fluxus sumptæ a causa materiali, in qua sunt huiusmodi. Aut enim fluxus est a toto. Aut a membris particularibus. Si a toto sic est quintuplex, scilicet diarrhæa, fluxus sanguineus, fluxus diuersorum colorum, fluxus liquefactius, & cholericus passio. Si autem sit a parte, aut est a cerebro, & dicitur cerebialis, aut a stomacho & dicitur lientericus siue stomaticus, aut ab intestinis in quibus materia paulatim congregata est. Et est quadruplex, scilicet lubricitas intestinorum, diarrhœa, fluxus sanguineus, & dysenteria. Et hæc dysenteria est triplex, aut ab intestinis superioribus gracilibus, scilicet duodeno & icterico, aut a mediis, scilicet ileon & sacculo aut a duobus inferioribus, scilicet colon & recto, nonnunquam ab extremitate intestini recti, & dicitur tenesmus. Dysenteria tamen secundum plurimum est a materia ab aliis membris ad intestina defluxa. Fluxus uero ab hepate & kilti fellis & mesentericis dicitur hepaticus. Materia etiam non fluente ab his dicitur hepaticus, quando scilicet esset propter ipsorum nocumētū, sicut est fluxus chylosus. Fluxus autem a splene dicitur spleneticus secundum plurimum existens melancholicus siue materia ab ipso splene defluat, siue non, modo sit factus impotens scilicet ad debite trahendum melancholiam aut propter oppilationem, aut debilitatem attractionis. Ex quo inferitur non esse inconueniens eundem fluxum simul hepaticum & spleneticum nuncupari posse ob rationes diuersas. Descriptiue enim hepaticus est qui fit uitio hepatis, sicut spleneticus qui fit uitio splenis, nunc autem cōtingit utriusque uitio eundem fluxum fieri. Sed a causa efficiente sumuntur differentiz fluxus, quia aut fit a uirtute ex se principaliter operante, quia primo digerit secundum diuidit, tertio nociuū expellit, & dicitur fluxus criticus. Aut fit a uirtute stimulata non ordinate hos actus perficiente, & dicitur symptomatikus, siue ruinosus, in quo nociuū & iuuatium simul expellit. Symptoma enim græce est periculum, & ruina latine, inter quos interest multum. Nam in primo sicut debet esse ordine naturali, expulsiua prius incipit quam retentia cedat, & paulatim sicut expulsiua expellit, ita retentia cedit. Econtra in symptomatiko prius cedit retentia quam expulsiua expellat, & aliquando hæc duæ uirtutes quæ sibi debent esse naturaliter subordinate inter se aduersantur, cum aliquando conante expulsiua expellere conetur retentia retinere, quæ contrarietas non est in fluxu critico. Fluxus autem ab oppilatione contingens qui oppilariuus nuncupatur secundum plurimum est symptomatikus. Fluxus autem facti ab aliis causis præter naturam efficientibus non concurrente uirtute sunt ex toto genere illaudabiles, & si fiant a causis efficientibus, non naturalibus, sicut a cibis & medicinis, aere & similibus, quandoque sunt laudabiles quandoque illaudabiles, sed cum tot sint differentiz, scilicet fluxus sumptæ ab his causis in diffinitione positis hic. In primis prosequar differentias fluxus quæ sumuntur a causa materiali in qua. Deinde illas quæ sumuntur a causa materiali obiectiua. Tertio quæ sumuntur a causa efficiente. Quarto quæ sumuntur a causa formali. Quinto prosequar differentias fluxus sumptas a causa finali &c.

Sed præter causas fluxus generales a quibus sumuntur species, & differentiz fluxus sunt aliz cause minus generales. scilicet fortitudo membri, uel membrorum mitetium, debilitas intestinorum recipientium, latitudo uiarum, præsentia materiz aptæ ad fluxum sua multitudine modo substantiæ medicæ

cri & sua qualitate uirtutem stimulante. Sicut e contra causa diminutionis aut priuationis fluxus sunt, debilitas membrorum mittentium, fortitudo recipientium, strictura mense-
raicarum, & aliorum ductuum, materia inobediens, quia pauca aut nimis crassa, ut uiscosa aut subtilis imbibita, carēs acuitate & mordicatione.

Causæ autem magis particulares secundum plurimū con-
currentes sunt debilitas attractiua, debilitas retentiua, debi-
litas & corruptio digestiua, debilitas expulsiua, & quando-
que ipsius acuitas & fortitudo. hæ autem sequuntur malitiā
complexionis sine materia, & cum materia cuiuscunque ge-
neris, licet sit rarius sicca in causa, uerum attractiua amplius
debilitatur frigido, & retentiua humi. & digestiua debilita-
tur frigido, licet à caliditate superflua corrumpatur. Expul-
siua uero debilitatur sicco, & à suo contrario fortificatur, li-
cet omnis immoderata discretio deiciat actum cuiuscunque
uirtutis, secundo technī. Debilitantur quoque propter mal-
lam compositionem & proprie oppilationem, aut ægritudi-
nem in superficie, similiter propter solutam cōtinuitatem,
& apostemata. Causæ autem corporæ magis remotæ
sunt quæcunque possunt huiusmodi ægritudines simplices aut
compositas cauare.

Causæ autem primitiue sunt res non naturales inconueni-
enter applicitæ, sicut aer propter malam dispositionē eius
manifestam uel occultam, & corruptionem suæ substantiæ.
Et similiter cibi & potus mali chymi multarum superfluita-
tum, malæ proprietatis malæ præparati, & inconuenienter
sumpti, & sic de ceteris rebus non naturalibus, & sibi annexis.
Et quandoque res extraneæ sunt in causa, sicut morsus serpē-
tis, casus, percussiones, & similia &c. Signa fluxus genera-
lia demonstratiua & rememoratua fati manifesta sunt, sed
prognostica futuri fluxus sunt huiusmodi.

Primum, signa arguentia caco-chymam, & materiæ multē
tudinē, & proprie cum non est sanguinea. Secundum plu-
rimus euentus fluxum tempore illo quod contingit, scilicet
ex aeris dispositione manifesta uel occulta, aut ex ciborum
malitiā. Tertium, retentio aliarum euacuationum consueta-
rum, scilicet uomitus, sudoris, fluxus sanguinis narium, hæ-
morrhoidalis aut menstrualis, uriniæ & ceterorum. Quartum
rugitus & dolor circa uentrem, & proprie descendens. Quin-
tum, maior tinctura & humoresitas egestionum consueta.
Sextum, tumor siue augmentum magis consueto circa hypo-
chondria. Septimum, quando uina post egestionem per-
seuerat subtilis & alba, tunc expectatur fluxus uentris qui
forte erit cum rasura intestinorum, & proprie cum non
sentitur euentus nocuenti in altero membro, neque alia
manifesta euacuatio. Particularia uero signa dicuntur in
particularibus cap.

Prognostica. Omnis fluxus perducens ad casum pulsus,
aut manifestam eius debilitatem, sicut est uermicularis aut
formicans, aut ad frigiditatem extremorum perseuerantem
mortalis, & moritur æger post pulsus destructionem cum fri-
gidity extremorum. Secundum, omnis fluxus sequens ali-
quam ægritudinem cum quo illa ægritudo non minuitur cū
mala ægri tolerantia, mortalis, significat enim humorum plu-
rimum corruptionem. Tertium, in hydropisi fluxus omnis
secundum plurimum malus, sanguinolēus, pessimus & mortal-
is. Quartum, post fluxum fortem singultus superueniens,
mortale secundum plurimum. Quintum, si retentio superflui
tatum molesta, & eius expulsio non alleuiat, & fluxus diu du-
rauerit, mortale. Sextum, fluxus prolixus in senibus mortal-
is. Septimum, fluxus uentris cum nausea, & uomitu ualde
malus. Octauum, si in fluxibus apparent pustulæ, & su-
bito desitecent, malum, earum uero egressio & multipli-
catio bona.

Nonum, in uentris fluxibus mutationes egestionum iuuat,
si non ad malum se transmutauerint, unde si fluxus fuerit ni-
ger ex adultione, postea fiat uiridis, deinde citrina fit in me-
lius in transmutatio. Decimum, fluxus sequens apostemata
intrinsicæ secundum plurimum mortalis. Undecimum, alche-
ta, id est, trauis accidit diaria plurima, propter humiditatem
dominantem super membra ipsorum neruosa, id est, super sto-
machos eorum communitate suorum cerebriorum. Duodeci-
mum, secundum plurimum ille qui est lenis aut duræ naturæ.

in puericia, est apud senectutem contrariio modo se habens.
Decimum tertium, omnis fluxus uentris accidens post ægri-
tudinē uehementem est significatio mortis, quia significat
corruptionem subitam, & proprie in senibus. Decimū quar-
tum, cum cibatur habens uentrem liquidum, & non additur
uirtus eius, tunc nō curens eum. Decimum quintum, qui ege-
rit species diuersas cum multa corruptione non est constri-
gendus nisi uirtus cadat, perducit enim ad ægritudines diffi-
ciles & fraudulentas si constringatur. Decimum sextum si ali-
cui fluxus uentris constringatur, & non fortificatur signifi-
cat quod corpus non recipit cibum. Decimum septimum, si
quis plus affellat in die quā in nocte, & quandoque sum-
pserit cibum tunc causa eius est debilitas stomachi, si autem
plus in nocte quā in die causa est debilitas hepatis.

Decimum octauum, multoties succedit fluxui propterea
quod expellitur subtile, & remanet crassum colica uehementis.
Decimum nonum, est Aui. cum retentio conturbat, & solu-
tio facit acquirere tranquillitatem, mortale sē plurimum.
Quod dictum intelligitur de retēione rationabiliter facta,
& de solutione faciente tranquillitatem respectu nocumen-
ti secuti ex retentione, nō autem respectu dispositionis prin-
cipalis, sicut accidit in phthisicis aut alio modo consumptis,
& ualde debilibus, quorum uirtutes naturales propriis gra-
uantur humoribus, est enim mortale, cum sit necessariū aut
solutionem, scilicet more, aut retineri, quorum utrumque du-
cit ad mortem, & ex hac glossa apparet solutio omnium in-
stantiarum quæ contra hunc textum. A. fieri consueuerunt.

De regimine uniuersali præseruatio & cu-
ratiuo. Cap. 2

Regimen fluxus est duplex, præseruatiuum & curati-
uum. De præseruatio sit prius sermo, quod tribus
completur intentionibus. Prima, euacuat humores
superfluos. Secunda, discretiam membrorum alterat, quæ
sunt causa fluxus ipsa confortando, oppilationes & cetera
ipsorum nocumenta remouendo. Tertia ordinat debitum re-
gimen sex rerum non naturalium. Pro prima intentione, si
humor superfluus fuerit sanguineus aut alii humores mixti
cum sanguine, dominante sanguine ipsis equatis ad bonum
intellectum, scilicet secundum debita proportionem geome-
tricam fiat phlebotomia, aut aliis modis sanguis minuatur,
deinde alii humores secundum opportunitatem euacuentur.
si uero alii humores sanguini dominarentur prius educātur,
postea sanguinis minutio fiat, & si soli sine sanguine pecca-
uerint soli educantur, & similiter si solus sanguis peccet si-
ne aliis, quod rarissime accidit in fluxibus solus euacnetur.
Phlebotomia uero fiat à uenis euacuantibus à membris in
quibus materiæ peccantes continentur, ut si in matrice fue-
rit retentio menstruum aut fluxus hæmorrhoidarum in cā
phlebotometur saphenæ, & si in causa fuerit hepar phlebo-
tometur basilica dextra, & si splen basilica sinistra, & si totū
uena communis, & si caput cephalica aut fiant uēsculationes
aut sanguisugæ apponantur secundum horum membrorum
exigentiam & sanguinis quantitas educatur secundum exi-
gentiam repletionis, & tolerantiam uirtutis. Similiter alii
humores euacuentur cum propriis respicientibus humores
peccantes & membra in quibus peccant: quæ medicinæ sint
benedictæ non exoluentes, neque membra debilitantes sicut
aloes lotus, agaricus, & proprie præparatus, rhabarbarum,
mirabo, sena, epithymum, calsia, manna, & similia. Cau-
endum est à scammonia colocynthide, turbithe, elleboro, cucu-
mere asinino, euphorbio, & similibus corpus inflammanti-
bus & membra debilitantibus. Et ex compositis sunt pilulæ
alephang, de hiera simplici, communes, de rhab. stomacicæ
& similes. Item, diacatholicon electop. diaprunis compo-
situm non solutiuum, & similia. Cauendum est etiam ab ag-
gregatiuis aureis & similibus. Item ab electario de succo
rosarum diaphoenicone, electario indo, diaprunis solutiuis
& similibus. Nisi forte ex his exoluentibus aliquid modi-
cum cum medicinis benedictis supra scriptis misceretur in
corpore forti, cuius uenter non esset obediens, & hæ inten-
tiones maxime in corpore repleto sint integratæ ex minora-
tione digestiui & eradicatio etiam iteratis secundum op-
portunitatem &c. Secunda intentio, scilicet discretiæ
membrorum alteratio perficitur cum cōtrariis membra ipsa
pro

proprietate & moderata stipticitate confortantibus. Maxime autem confortandus est stomachus & hepar cum sint potissima causa generationis humorum. Quapropter eligatur propria frigida, sicut aqua endi. & syrui. eius. aqua cuscute, ci choreæ, & similia &c. Et calida propria sunt sicut aqua absynthii, eupatorii, & syrui ex ipsis. Iræ diarrhodon abbatis triasandali, aromaticum ro. & similia. Et ex propriis confortantibus stomachum & hepar sunt pelliculæ intrinsecæ stomachorum gallinarum lotæ cum uino & exiccatae. Hepar adip. id est lupi caro limaciarum. Item, hepar gallinarum anserum, & anatum, passulæ, siltica, & auellana torrefacta. Et si fuerint oppilationes, syr. ace. compositus, de eupatorio & similes. Et si splen fuerit in causa propria sunt tamariscus, scolopendria, cortices, radicum capparorum, sem. agni casti, sem. portu. acetum, & similia. Cauendum tamen est à superfluo usu aceti & proprie acuti, tam in cibis quam in medicinis &c. Tertia autem intentio, scilicet debitum regimen sex rerum non naturalium est ut aer sit temperatus, aut aliquoties contrarius differat membrorum corrigendæ. Cauendum autem est à uentis & aere lacuali aut excedente secundum aliquam qualitatem, aut aliter infecto & putrefacto. Sit parcus in cibo & potu, & fiant naturæ digestionem, & uini suum sit pauciter, aut mediocri uino sitatis moderata stipticitate participans, & lymphetur secundum exigentiam temporum, complexionum, & consuetudinum, cum aqua bene conditionata, & similiter cetera cibaria sint etiam boni chymi, facili digestionis, paucarum superfluitatum bene preparata non ualde fluentia neque nimis pissa. Cauendum est à diuersitate ciborum in mensa una, surgat etiam à mensa cum reliquiis famis, neque comedat nisi fame præcedente. Somnus eius sit mediocri, & sit maxime nocturnus, in meridie tam dormire potest per horam à medio Madii usque ad medium Augusti. Procuret omnes euacuationes à natura institutas, & etiam diu consuatas, & si non fuerint naturales. Coitus superfluus uitetur. Et non coeat nisi à natura fuerit multum stimulatus. Vitentur motus superflui intensus & extensus. Exercitium tamen moderatum stomacho ieiuno conuenit. Sit sperans gaudens, & omnes animi delectationes querat. Sollicitas & tristes animi fugiat cogitationes, iram, tristitiam, & omnia accidentia animi ualde excessiua &c. Nunc sequitur de cura ipsius fluxus in generali: cuius principium anteponebatur, nunc autem etiam ponetur.

Cura fluxus in generali septem completur intentionibus. Prima, causam remouet, aut saltem minuit, siue sit corporea, siue incorporea. Secunda, membrum mittens regit si aliquid est in causa superflua ab eo euacuando, differatiam eius corrigendo & ipsam confortando. Tertia intestina confortat & mundat à superfluitatibus in ipsis existensibus & dolorem ex cursu humorum præcedentium lenit. Quarta, humorem ad intestina fluentem uel fluxum diuertit. Quinta, humorem incrassat uias & ductus constringit, & intestina confortat ne recipiant etiam sensum obtundens apud necessitatem. Sexta, accidentia corrigit. Septima, ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium & annexorum secundum exigentiam intentionum.

Prima intentio, si causa remotio aut minoratio completur hoc modo. Nam si sit causa primitiua, scilicet cibi & potus hoc facientes, aut constitutio australis aut borealis, & aer male dispositus secundum qualitates manifestas aut occultas: aut modum substantiæ sicut fuit anno. 1450. Ferrariæ in quo fuit multitudine fluxuum quæ uerisimiliter pedit ab aeris dispositione. Effectus namque uniuersales resolui debet in causas uniuersales. Hæc ergo & similia remoueantur & inducatur regimen contrarium. Similiter & potus fluxum facientes aut augentes uitandi sunt, & his contrariis est utendum. Similiter aer uetustus uitandus est & eius excessus secundum qualitates manifestas est contemperandus. Et si corruptus sit cum igne & odoriferis corrigendus est. Idem est iudicium si accidentia animi fuerint in causa. De fluxu tamen à rebus non naturalibus & extraneis existente est speciale cap. inferius. Quod si in causa est medicina solutua frangatur eius audacia, & cito à corpore educatur cum aqua calida sumpta in potu etiam usque ad .3. i. 2. sex tamen .3. communiter sufficiunt, aut cum aqua hord. sola, aut mixta cum zuccharo rubeo quæ

lauando & abstergendo eam educit, aut cum comprimentibus, & proprie cum succo cydo. aut cydoniis ipsis & similibus comprimentibus, & proprie præcedentibus huiusmodi lauantibus, & abstergentibus, de quibus statim dictum est. Et clysteria lauatiua & abstergiua optime conferunt. Si uero causa fuerit corporea sicut multitudo aut malitia humoris, & fluxus fuerit qualis & quantus oportet, & in summa uirtuti & repletioni proportionatus, iuxta sententiam Hip. dimittatur. Est enim natura tunc sufficiens in suis superfluis expurgandis, huius autem signum est potissimum quia confert & bene fertur. Si uero fuerit superfluis uirtuti aut repletioni improporionatus cohibendus est iuxta ordinem sequentiū intentionum. Si autem fluxus fuerit diminutus in comparatione ad multitudinem materiæ aut eius malitiam secundum quod accidit in fluxibus communiter occurrentibus præcipue his temporibus in quibus est tanta multitudo fluxuum quorum materia multa & maligna existens paulatim & in longo tempore à naturaeducta quodque nocens mēbris principalibus in quatuor diebus interficit, & quandoque intestina excoriat, & tandem profundius soluit continuum ita ut interficiat aut ulcera magna derelinquat. In his enim casibus considerandum est qualis sit materia. Si enim fuerit sanguis aut mixta cum sanguine & proprie corpore existente carnosio & ceteris omnibus, aut pluribus consentientibus phlebotomia, phlebotomenter, aut de uena communis repletio sit in toto aut de basilica dextra si hepar fuerit in causa, aut sinistra, si fuerit splen in causa aut ex saphenis si retentio menstruum aut hæmorrhoidarum fuerit in causa, & hauriatur quantitas sanguinis secundum exigentiam circumstantiarum. Sunt tamen huiusmodi materiæ & proprie facientes dysenteriam communiter multum distantes à natura sanguinis sicut cholera præsina & alii humores in melancholia potest aduersionem uersu, unde secundum plurimum non competit phlebotomia. Si autem non fuerit mixta cum sanguine, et natura tentaret eius euacuationem per aliam regionem sicut per uomitum, sudorem, & urinam, & cetera adiuuaret, sic enim materia per illas regiones paucificata fluxus ueteris minorabitur. Si autem nullum horum adsit secundum quod est in diarrhoeis & dysenteris communiter occurrentibus. Est iuxta primam intentionem materia per eandem regionem minoranda, & proprie cum fuerit multa aut maligna ratione quantitatis occultæ aut manifestæ, & hoc quæui citius fieri potest. Solutium autem debet esse in principio hoc modo conditionatum.

Primo, sit frigidum potentia si humores sunt calidi secundum quod est ut plurimum & proprie in dysenteris. Secundo stomachi confortatiuum & etiam intestinorum. Tercio, humoris fluentis eductiuum. Quarto, non multum stipticum ut in principio. Si humores sint frigidi, non tamen multum declinent ad calidum. Si ergo humor fluens fuerit cholericus secundum quod est frequenter & proprie qui facit dysenteriam. Ix. tamarindorum. 3. 2. uel ab. 3. 2. uel ad. 3. dissoluantur cum. 3. 3. aquæ lactis & addatur. 3. 1. uel quantum sufficit iulepro. aut syr. de ribes aut de acetosi. citri. aut de acrella. Et si deficeret aqua lactis sumatur aqua platagi. uel endi. uel portu. uel florum nenupharis. Et si humor fluens fuerit melancholicus in. 4. 3. aquæ casei ponatur in infusione. 3. 1. s. senæ crasso modo puluerizate, aut. 3. 3. epithymi. Et bulliat epithymum una ebulli. sed sena longiori tempore, & colata ab epithymo aut à sena misceatur cum. 3. 2. myrobo. indorum, & dulcoretur cum. 3. 1. syr. uiol. aut de floribus nenupharis si melancholia fuerit adusta. Si uero non adusta cum. 3. 1. syrui po de epithymo & calida exhibeatur. Cauendum tamen si stomachus sit abhorrens ne medicina sit nimis quantitas ne cogatur ad uomitum, & in eo casu minuatur aqua casei aut alter liquor, dummodo possit potari & remaneat eiusdem potentia, & si deficeret ferum caprinum, sumatur aqua boraginis uel buglossæ, si melancholia fuerit non adusta. Si uero fuerit adusta sumatur aqua uiol. & florum nenupharis, multoties tamen propter uomitus timorem cogimur dare in forma pilularum, & in hoc casu in materia melancholica accipiantur. 3. s. senæ, & 3. s. mirobo. indorum cum duobus gra. zing. & in cholericis à. 3. 1. rhubar. usque ad. 2. & conficiantur pilulæ cum aqua plantag. aut sero caprino aut aliqua ex aquis suprapositis

tis. Si autem humor fuerit phlegmaticus tuncumat. 3. s. uel quantum suffi. pilulæ alephanginarum aut tantundem pilu. stomatarum deserip. Me. quæ incipit. Pilulæ stomatice stomachum & digestionem confortant, & si mallet medicinam liquidam. 3. 3. carthami crasso modo contusi cum. 3. 5. galange infundantur in. 3. 2. mellis ro. per sex horas, postea coentur & ipsi melli ro. sic colato & expresso addantur. 3. 2. mirab. Kebulorum subtiliter puluerizatorum, & cum suffic. quantitate aquæ abinthii fumatur in potu, & si phlegma sit falsum distemperentur cum aqua casei, & loco carthami posunt accipi. 3. 2. polyodii & infundi sicut dictum est de carthamo. Si autem humores fluentes fuerint mixti sicut phlegma & cholera fm qd est frequenter exhibeatur rhabarb. a. 3. 1. ad. 2. cum suf. quanti. aquæ casei aut aquæ endi. & uno cleario uini, & dulcoretur cum iulep. 1. of. aut similibus tuo proposito deferuentibus. Et si cum his mixtis fuerit humor melancholicus bulliat in aqua casei aliquid senæ aut epithymi aut mirab. indorum & cum ea ab eisdem colata distemperetur reubarbarum aut ex reubarbaro conficiantur pilu. sicut dictum fuit superius addendo aliquid senæ epithymi aut mirab. indorum. Myrabolani enim in omnibus feruunt castibus. Citrini ad choleram euacuandum, Kebuli ad phlegma. Indi ad melancholiam, & possunt exhiberi in infusione ubi parua sit intentio ad contrahendum, ubi autem maior non dentur in substantia torrefacti, sed ubi adhuc maior exhibeatur torrefacti, sicut cum fluxus multum præcessit, idem iudico de reubarbaro & ceteris medicinis, parum enim cōstrindendum est in prin. in medio mediocriter, in fine maxime. Moderni tamen quidam in omni fluxu & in omni tempore indifferenter utuntur rhabarbaro torrefacto. Est etiam uariandum in solutiuis secundum diuersitatem excoiationis uel alterius nocimenti ex parte loci: nam si excoiatio sit in superioribus, ieiunio & duodeno magis cum timore soluendum est, & cum his quæ stomachum & intestina confortant, licet in hoc casu multum properandum sit cum ægritudo nō det inducias quantas dat cum excoiatio sit in aliis intestinis. Si uero in mediis, in ileo, & sacculo iudicium est mediū. Si in infimis, scilicet colo & recto, audacius est soluendum. Est etiam fm hanc uarietatem diuersificanda medicinarum cuiuscūq; generis approximatio, quia si excoiatio sit in duobus superioribus, medicinæ dentur per os, quia iuxta Ga. clysteria non transcendunt ieiunum, imo in dysenteris neq; ad ileon perueniunt, quia clysteria parum retinentur, & est cōtinua uoluntas ad expellendum etiam cum imponuntur. Si uero in duobus inferioribus maxime conferunt clysteria, parum uero medicinæ bibita, in duobus mediis iudiciū est medium, utraq; enim mediocriter conferunt. Secunda intentio, regimen membri mittentis expedienda quā ciliū fieri potest. Tria exigunt regimina. Primum, est materiam si qua sit in ipso euacuare. Secundum dyscrasiam eius corrigere. Tercium, ipsum confortare ut fiat minera laudabilis humoris. Euacuatio autem per phlebotomiam qualiter debeat fieri dictum est in prima intentione, euacuationes etiam reliquæ ibidem dictæ quantum possibile est respiciant mēbrū mittens. Dyscrasia etiam membri mittentis contrariis corrigatur interius & exterius applicitis quæ moderata stipicitate participant, & singularem habeant ad ipsum proprietatem ut uirtutes ipsius confortentur. Tertia intentio scilicet intestinum mundificatio, confortatio, & doloris sedatio, quæ die immediate sequente exequenda, aut q̄ citius fieri possit completa prima intentione perficitur. Si excoiatio, aut dolor aut aliud nocumentum sit in intestinis superioribus & ab humore calido cum aqua hord. calida in potu sumpta. Cuius quantitas sit circa. 3. 5. & si uolueris magis confortare mif. 3. 3. aquæ hordei cum. 3. 2. iulep. ro. uel cum. 3. 5. s. zuchari ros. & si humor fuerit frigidus mifceatur tantundem aquæ hord. aut aquæ zucharatæ cum. 3. 2. mellis ros. & calida stomacho ieiuno fumatur in potu, & ad hanc intentionem est aqua lactis sumpta in potu proprie cū humores fuerint aduisti aut baurachii. Si uero nocumentum fuerit magis in intestinis inferioribus fiat hoc clystere commune in causa calida 3. 3. aquæ hord. factæ secundum artem. 3. 1. 6. uel. 1. 7. olei ros. 3. 3. utelli oui nune. 1. adipis renum capræ uel hircinæ. unc. 3. fiat clystere, & stomacho ieiuno tepidum imponatur. De-

bēt enim clysteria in hoc casu esse minus actū calida quā in aliis casibus, aliter non possunt retineri. In causa uero frigida loco aquæ hord. ponatur aqua mellis, aut suprascriptis addatur mel. ros. unc. 2. & oleum camomellinum est in hoc casu conueniens. Clystere quoq; ex aqua decoct. fursuris, aut ex brodio renū capræ uel castrati aut ex amobus simul mixtis cum reliquis in altero clysteri positis est in hoc præstans. Et si materia esset nimis calida naturaliter aut per adustionem, sicut est cholera zinaria aut præsina aut melacholia genita per adustionem cholere, suc. portul. aut cucurbitæ aut mucilago psillii suprascripto clysteri facto ex aqua, scilicet hordei &c. addatur in quantitate. unc. 2. aut quantum indebitur. Si uero nocumentum sit in intestinis mediis, tunc & potata & clysterizata conueniunt diuersificanda fm materie diuersitatem. Quarta uero intentio, materie diuersio immedie post tres primos dies expedienda uel immediate post tres primas intentiones expedienda, aut etiam simul cum ipsis si fieri potest perficitur cum phlebotomiis dictis in prima intentione si fuerint in casu expedientes. Item, uomitu si ad ipsum natura inclinetur ponendo digitum aut pennam oleo intinctam in ore. Vomitiua tamen fortia quæ possent nocere in fluxu uitanda sunt. Lenia autem sicut aqua hord. tepida & similia concedi possunt. Similiter prouocari potest urina cum lacte se. communium in causa calida aut decoct. radicū alparagi & similibus in causa frigida, & citonia sunt ad hoc singularia, prouocant enim urinam & confortant & stringunt fluxum, prouocatio etiam sudoris cuncta in hoc diuersiones excedit penes Hip. inquit enim q̄ uomitus sedat fluxum & fluxus uomitus, & uomitus uomitus, & fluxus fluxum, sed sudor utrunque. Prouocatur autem sudor & simul sit diuersio ad extrema lauando brachia cum aqua calida fricatio & attrahendo ab humeris uersus manus. Itē. receptio sumi ab aqua calida eleuati ad faciē pectus & residuū corporis est ad hoc cōueniens. Itē, positio ægri in balneo uel in stupha in quo fudet. Et somnus adiuuat ad sudorem & anhelitus re tentio ligationes quoque uentofationes & uerberationes partium superiorum fluxuum materiam diuertit, sed lotio, fricatio, & ligatio crurum suspecta est ne materia mora inferius amplius fluat ad intestina, ad quæ fluere incepit, & in casibus omnibus omnis euacuatio naturalis, siue præternaturalis diu consueta prouocetur, unde prouocentur menstrua & sanguis hæmorrhoidalis, & fluxus sanguinis narium diu consuetus, & si qua ulcera antiqua cōsolidata fuerint rescindantur, idem sit iudicium in cæteris.

Quinta intentio, humorum incrassatio, uiarum & ductuū restrictio perficitur cum interius sumptis, exterius applicitis suppositis & suffumigatis, quæ intentio est aliquando citius, aliquando tardius fm materie multitudinem & uirtutis tolerantiam exequanda. Rob. cōueniens in causa calida sunt rob. de ribes, de acresta, de cornibus, de berbere, de sumach, & est etiam proprium, prohibet enim ne uiscera materia ad ipsa fluēt suscipiant rob de moris immaturis, de cydo. de piris, de acetositate citri. & cum hoc est proprium in confortatione cordis rob de fructibus. M. rob. myrtinum. Et ex eisdem possunt fieri syrupi de rob sunt præstantiores, quia zuchari & mel uentrem liniunt, his ergo uel aliquo istorum ntere, exhibendo ab unc. s. usque ad. 1. uel plus uel minus secundum ægri appetitum quæ uidentur magis tuo proposito deferuire. Rob. de granatis licet apud M. conferat est mihi suspectum cum Auicē. in curatione generali febrium ponat succum granatorum inter ventrem lenientia, & similiter in multis aliis capitulis, credo tamen quod magis soluat cōprimendo & esset conueniens ubi soluendum esset opus stringere. Syrupus de papauere optime confert cum opus est aliquo qualiter propter dolorem stupefacere & in somnum inducere, sed in causa frigida accipiantur aliqua ex his rob. minus frigidis, sicut rob de myrto, de cydoniis, & similia, & mifceantur siue in ipsis fundantur aliqua aromata calida, sicut mastiche, lignum aloes, thus, gallia muscata, macis, gariofli, nuces cupressi, & similia, hi autem rob. & syrupi sumi possunt sine alterius rei mixtione, sed communiter sumuntur cum aqua ferrata aut aqua acet. aut plantaginis, aut portulacæ, aut nenufaris, aut aqua ferrata decoctionis sumach, aut in qua infusum fuerit, aut coctum thus, mastix, gariofli, Io. Arculani c & similia

& similia, in causa frigida, similiter aqua decoctionis forbarum, mespilorum, cydoniorum, se. platanis, se. acetosæ, prunellorum siluestrum, cornium, tragacanthi, gummi arab. & proprie cum sunt torrefacta, & succi multorum ex prædictis sunt convenientes, & per ipsorum inspissationem possunt fieri rob, & permiscendo zucharam aut mel cum aquis, aut succis ipsorum possunt fieri syru. & de substantiis ipsorum possunt fieri electaria, sicut est electarium de forbis, de cydoniis & diacitoniten quod est in communi usu, & his possunt addi alia contingentia secundum quod duo proposito esset cōueniēs. Cydonia quoque & pira condita, & mespila, & forba & hmoi ad hoc conferunt. Sed in causa frigida, succus & aqua mentha, & foliorum cupressi sunt præstantes, & quedam alia quæ trituratione indigent conuenientia in fluxu calido, sicut spodium, rosa, semen portulacæ, semen acetosæ, gummi ar. tragacanthum, gallæ, barba hircina, coriandrum infusum in aceto, sumach amylum, balaustie, cortices granatorum, berberis, myrtus, camphora, anthera, sang. drag. ramich. acacia, hypocisthis, lapis emathitis, bolus ar. terra sig. coralli, Karabæ, margaritæ, cornu cerui, papauer album & ni. hypocyamus, & opium quæ stupefaciendo & compingendo retinent, & hæc si uolentur sunt magis retinentia, nisi papauer hyocyamus, & opium, & similia stupefactiua quæ propter uisionem uirtutem stupefactiua amittunt. Sed in causa frigida calida stipica aut uiscosa, sicut thus, mastix, gallia, gariofil. xyloaloes, anisum, cuminum, nasturtium et ammi torrefacta. Item coagulum hœdi uel leporis, & caseus antiquus prius bullitus in aqua ut sal remoueat, deinde exsiccat & tritatus est apud Aui. præstantior quam coagulum &c. Quedam tamen ex his magis ad unam intentionem deferuntur quam ad alteram. Coriandro utimur quando uolumus materias incrassare & compingere, sed luto sigil. & sanguine draconis quando excoarationem esse credimus, spodio quando dolores pungitios sedare intendimus, acacia, sanguine dra. Karabæ, quando oportet sedare fluxum sanguinis, & succo barba hircinæ quædo uenter & ductus laxe residant materiam ad intestina, adipibus utimur in puncturis mordicationibus & excoarationibus intestinum, mucilage psilii in expellendo residuum materiæ rebus narcoticis utimur quando queritur stupefactio & somnus, materierum incrassatio, sed in fine rei tantum quando alia non contulerint in desperatione & causis magis & timorosis, non tamen hæc danda sunt nisi ad huc stante fortitudine uirtutis. Bdellio utimur in prohibendo fluxum sanguinis hemorrhoidalis, bolo ar. utimur, & succo plantag. in consolidando ulcera stomachi & intestinum & sunt proprie cum signis caliditatis, & cum signis frigiditatis his addatur thus mastix, & similia, quibus uti potes in clysteribus, & per os secundum necessitatis exigentiam. Ex compositis est electarium de fructibus descriptione Mes. & electarium de forbis eiusdem. Item, duo electaria Nicolai constructiua, sed in causa frigida electarium de myrto Nicolai, & trisera minor arte xenonis Mes. & micheleta Nicolai ualde efficax & ulcima, & multa electaria de cydoniis apud Mes. & uariæ descriptiones miuæ cydoniorum eiusdem, quarum aliquæ ualent in causa calida, aliquæ in frigida. Electarium Mes. in causa calida, & granatorum myrti subtilissimi puluerizatorum. 3. 1. 2. rosarum, spodii, sumach sandali al. rubei & citrini, balaustiarum, gummi ara. ana. 3. 1. s. granorum granatorum acetosorum. 3. 7. coriandri infusi in aceto & affati. 3. 4. se. acetosæ, se. plantag. se. rosarum. ana. 3. 1. fiat omnium cōtritio bona, & fricentur cum succo acrostæ, & exicentur, uel cum succo myrti aceto, deinde inuoluantur cum miuâ facta ex succo cydoniorum & aceto, & sit dosis eius. 3. 3. cum succo cydoniorum acetosorum, sed in causa frigida, & signa aloes, spica, gallia, mus. cyperi. calami aromatici. ana. 3. 2. cimini, carmeni infusi in aceto die ac nocte, & torrefacti, se. porri torrefacti. ana. 3. 1. s. emblicorum infusorum in aceto, & torrefactorum. 3. 2. s. granorum nasturtii torrefactorum. 2. 6. granorum passularum. 3. 5. granorum myrti tritorum subtilissimi. 3. 16. balaustiarum, conularum adustarum, thuris, fructus tamarisci. ana. 3. 2. s. ameos. 3. 3. terre omnia sicut alcohol, & infundantur in uino odorifero, deinde fricentur & fundantur iterum in aqua antiqua granorum myrti. exicentur & iterum terantur & inuoluantur in miuâ, dosis eius est. 3. 3.

cum syrupo cydoniorum aut myrtinorum. Ex trochiscis sunt trochisci de spodio cum semine acetosæ, trochisci de Karabæ, & de terra sigil. opiat & non opiat, confectio trochiscorum descriptione Mes. & spodii. 3. 7. rosarum se. earum, acacia, balaustia, sang. drag. ana. 3. 1. s. barba hircinæ, carnis sumach se. planta. se. portula. affati. ana. 3. 1. & sexta, gummi affati. 3. 1. fiant trochisci. 3. s. da cum aqua sauih, id est, facta ex hordeo torrefacto. Trochisci descriptione M. quando fluxus est chronicus, & ualet in causa frigida & mixta. & balaustiarum, corticum glandium infusorum in aceto & torrefactorum capitum granatorum, fructus tamarisci, macis, xyloaloes, galliæ aromaticæ mastiches, spica. ana. 3. 1. se. acetosæ, gummi boli ar. granorum passularum torrefactorum. ana. 3. 1. s. granorum coriandri infusorum in aceto & affatorum. 3. 2. fac trochiscos. 3. 1. cum uino pontico, & sit dosis trochiscus unus, puta. 3. 1. cum syrupo cydoniorum, uel aliquo rob stiprico. Et trochisci Ras. de spodio. 9. Alman. & trochisci Mes. de spodio cum semine acetosæ sunt proprii in fluxu cholericum cum febre acuta dati cum aqua sauih, aut aliquo succo frigido, & succo cydoniorum, forbarum, & similibus. Et cum fuerit dysenteria, detur iste puluis Ras. mane & sero & c. & psilii. 3. 20. scilicet herbæ non seminis, se. plantag. 3. 10. gummi ara. boli ar. ana. 3. 3. psillum affetur, & gummi & bolus puluerizetur & detur. 3. 3. mane & sero, & cum succo cydoniorum & si hæc non sufficiant dentur opiat, sicut trochisci de balaustis Ras. & trochisci constructiui Nicolai. Exterius applicita sunt unctiones, pulueres, emplastra, cerata, encatasmata, siue fempicupia. Vnctiones sunt. & olei cydoniorum unc. 1. se. ros. 3. 2. mastiche, galliæ mus. ana. 3. 1. aceti modicum, ceræ quantum suff. & fiat unctio, & si opus est amplius ipsam fortificare addatur. 3. 1. uel quantum uis unius ex trochiscis. Item, dicit Mes. quod in fluxu proneniente à catarrho si ungatur uenter ex oleo ros. calido quantum pati possit & desuper spargatur puluis ex mastiche, ros. & gallia inuenitur mirabile, mihi tamen uidetur præstantius, semen ros. quam rosæ, & hæc unctiones fiant toti uentri stomacho ieiuno. Vnguentum conueniens. & rosarum, se. earum, pulpe sumach, sandali albi & rub. spodii, sanguinis drach. Karabæ, balaustia, galliarum, acacia, hypocisthis, galliæ, musca, corticum mandragoræ corticum granatorum. ana. 3. 3. camphoræ. 3. 1. & tertium unius, tere & fac puluerem & accipe succi extremitatum uitis. unc. 1. succi acrost. 3. 1. succi extremitatum myrtis aceti. ana. 3. 1. infunde in eis die ac nocte sauih hord. 3. 3. gummi. 3. 5. granorum myrti tritorum, sicut alcohol. 3. 3. & misce cum eis miuæ acetosæ. unc. 3. decoque igne leui donec habeat spissitudinem uiscosam, deinde aggrega si mulcum speciebus in mortario & contunde donec permisceantur, & line ex eo super petia, & suffumigetur cum xyloaloes, & applicetur toti uentri, & conuenit in causa ualde calida. Facilius tamen possit fieri emplastrum non minus efficax præcedenti. & cydonium unum aut plura, & incisum in frusta, & mundatum à mediulo interiori coque in aceto, deinde contunde & secum misce puluerem ex uno trochiscorum superius descriptorum addendo parum mastiches, & galliæ mus. & si uis suffumiga cum xyloaloes, & uentri applica. Et ad hanc intentionem est emplastrum diaphoenicò descriptione Mes. secunda, nam prima magis confert in causa frigida. Et in causa frigida possunt fieri unctiones cum oleo de mastiche & spicha addendo mastichen, gariofil. galliam muscatam, & similia. Item potest fieri emplastrum decoquendo cydonium in uino nigro & secum permiscendo panem affatum in succo miuæ infusum, deinde permiscendo pulueres calidos suprascriptos. Et potest fieri ceratum. & laudani, picis, rasina. ana. 5. s. mastiches. 5. 1. gariofil. galliæ mus. nucum cupressi, xyloaloes, thuris. ana. 3. 1. olei mastichini. q. s. ceræ & aceti modicum. Ex quibus etiam debeant fieri pulueres super raspergendo unctionibus, satis est ex dictis manifestum. Clysteria autem constringentia fiant ex decoctione alicuius aut plurium rerum suprascriptarum, sicut sunt myrtus, rosa, corpula glandium, milium, siue panicum & hordeum torrefactum, gallæ, & similia, de qua decoctione accipiat lib. 1. olei ros. 5. 3. utelli oui in aceto affati num. 1. 1. adipis rænum, capræ. 3. 1. uel. s. succi plantaginis uel portul. 5. 3. sang. dra. boli ar. & alicuius ex trochiscis suprascriptis, sicut de Karabæ

rabe, de terra sigil. maxime ubi sanguis fuerit ana. 3. i. & mifce, & materia existente frigida ponantur nuces cuprefsi & rizum in decoctione, & unc. 3. vini nigri ftiptici fati uinofi, & oleum camamil. & puluis thuris, malthiches, & litii. Et apud magnam neceffitatem ponantur trochifci opiat, ita tamen ut à parua quantitate opiatorum incipias, & augeas fecundum neceffitatem. Est enim canon in adminiftratione opiatorum, fi fufficiat applicatio eorum exterius non fupponantur. Et fi non fufficiat applicatio eorum ad extra, fiat lychinium quod ad libitum poffit remoueri. Et fi ad huc hoc non fufficiat clyfterizentur, quod fi adhuc non fufficiant, fupmanur in potu. Secundus canon eft, ut fit ufus eorum ftomacho ieiuino. Tertius canon eft, quod inchoetur à parua quantitate, ita ut opium non tranfcendat gra. 2. Quartus cano eft, quod interpolatis diebus eis utendum eft. Quintus pofponendus eft ufus eorum quantum eft poffibile, & non nifi alia remedia non fufficerent. Sextus quod uirtus adhuc fit conftans potens tolerare, unde iuxta hos canones poffumus ponere apud magnum dolorem & inquietudinem & fluxum uehementem parum ex trochifcis opiat inunctionibus uel emplaftris, & fi illud non fufficit fupponantur lychinium defcriptione Alman. R. thuris, litii, croci, gummi ara. 3. i. opii. 3. 3. formentur collyria diuerfarum quantitatum, fed communiter fint ualde parua & aliquid longa & subtilia, & bene ligata ut poffint extrahi, unde cum filis lini optime permifceantur ad minima, quæ fila pofttea definant in chordam uel ex eis fiat chorda quæ pendeat extra anum cum lychiniū eft impofitum & prima uix non retineatur ultra horam fufe fomnum induxerit, fufe non, deinde fi bene ferat æger poterit longiori tempore retineri. His autem aliquando utimur cum non poffunt clyfteria retineri, lychinio enim prius impofito per aliquod tempus ftupet locus, & pofttea clyfter impofitum facilius retinetur. Sunt quidam dicentes hæ lychinia effe nimis opiat: propterea opium diminuunt. Ego uero credo hæc effe conuenientia, nam quando non cito inducitur ftupor per opium non poffunt retineri. Stimulant enim uirtutem expulfiuam, ita ut æger cogatur expellere, eft autem in potestate tua poftquam actiua funt extrahere quando uis. Si autem his non fufficientibus opus fit clyfteribus opiat, fuprafcriptis clyfteribus poteft addi. 3. i. trochifcorum de Karabe opiatorum, aut tantundem philonii perfici, & fic de aliis opiat. Si uero his non fufficientibus opus fit dari in potu opiat incipiendum eft à 2. 3. aut. 3. s. philonii perfici, aut à 3. s. trochifcorum de karabe, & gradatim do fis augeatur apud neceffitatem. Defcriptio philonii perfici eft apud Mef. in fine cap. de fputo fanguinis, & eft hæc. Confectio philonii perfici uehementis uirtutis ad emanationes fanguinis undecunque, & fcreatum eius cum tufsi & fupfluitatem menftruorum dolorofam & hæmorrhoidarum & egeftionem fanguineam & ad mulieres prægnantes quibus abruptuntur menftra, conferuat enim foetus in matricibus earum. R. fe. papaueris albi, hyofcyami, ana. 3. 20. terræ sigillæ, opii. ana. 3. i. 6. fedene, id eft, lapidis emathitis, croci, ana. 3. 5. caftorei, piretri euphorbii, fpicæ, margaritarum nõ perforatarum, karabæ, zedoariæ, doronigi, ramich, galliæ muf. ana. 3. i. camphoræ, 3. i. tertiam confice cum melle rofæo quantum fuffi. & dofis eius eft à 3. s. ufque ad. i. cum fucco arnogloffe, aut aqua ro. & modico uini puri, existente tamen excoctatione in ftomacho, aut in inteftinis, aut materia existente ualde calida remoueatir piretrum & euphorbium ab hoc philonio. Et breuiter diuerfificanda funt clyfteria, lychinia, unctiones, emplaftra, unguenta, & omnia genera medicaminum fecundum materię diuerfitatem & complexionum temporum anni, & fimilium. Suffumigia fiant in caufa calida ex decoctione rofarum, myrtillorum, foliorum mefpillorum, forbarum, pirorum, cydoniorum, balaufiarum, & huiufmodi in aqua calibata: & quidam utuntur melica folum in aqua decocta, & poffet in decoctione addi parum uini ftiptici, fed fuffumigia ficca fiant ex thure, tragacantho Karabe, fpodio, & huiufmodi, pofitis fuper prunis quæ fint frigida & ftiptica & uifcofa, & boni odoris. Sed in caufa frigida & thure, & pice, & laudano, nucibus cuprefsi, ftyrace ficca, & fimilibus, aut calida ftiptica, in uino decoquantur fimulaueris fuffumigium humidum, quæ in ipfo furgente ad fel

lam fupponantur, felfio etiam in decoctionibus ftipticis calidis actu frigidis, aut calidis in potentia fecundum exigentiam confert, & liquor perueniat ufque ad umbilicum, & instrumenta apta funt femicupia & huiufmodi. Pannus quoque lini aut lanæ bene infufus in uino aut aqua decoctionis rerum ftipticarum, & expreffus ano applicitus & compreffus fuper ipfum iuuat ad retentionem. Et balneatio totius perfonæ in balneis ftipticis non laudatur, imo uituperatur apud Mef. & cæteros, prohibet enim sudorem & pellit materiam de circumferentiis ad centrum. Similiter nec lotio crurum nec brachiorum confert cum huiufmodi ftipticis ob eandem caufam, imo potius lotionem huiufmodi quæ dilatat & trahunt materias ad circumferentiam ad extrema &c. Sexta intentio, fcilicet accidentium correctio fecundum ipforū exigentiam perficitur, dolor fedetur ponendo in clyfteribus pinguedinem recentem castrati aut capræ & oleum rofæcū. Et fi dolor fuerit pungitius ponatur fpodium, & lac clyfterizatum eft adhuc conueniens, & exterius applicetur ziribus castrati, aut agni calefactus in fartagine cum oleo rofæco, & apud magnam neceffitatem fedeat in femicupio in quo fit aqua debite calida decoctionis aliquorum ftipticorum calidorum aut frigidorum fecundum caufę exigentiam, in quod tamen non diu moretur, eft enim melior reiteratio quàm longatio in eo ftatio, & in excoctatione fuperciali à materia acuta ceruffa lota clyfterizata cum oleo ro. conuenit, & fi fuerit dolor in fuperioribus inteftinis bibat aquam hordei, fyrupū de papauere & fimilia, fed apud maximam neceffitatem ubi cunque fit dolor dentur fuperciacia exterius applicata, fupposita, clyfterizata, aut bibita fecundum quod tuo propofito conuenit. Gerardus Veronenfis dicit fe expertum fuiffe, fi dolor fit in fuperioribus inteftinis aquam rofæcam decoctionis feminum papaueris, & florum tafsi barbafsi in potu exhibitam, & fit tepida uel calida. Secundum accidens eft caufas uirtutis cui fubueniendum eft dando uirellum oui & parum uini dulcis odoriferi lymphati fecundum exigentiam cum aqua calibata aut permixti cum aqua diffillationis aut expreffionis, aut decoctionis carniū aut aqua ipfa primo exhibeatur, pofttea parū uini. Sed attende quod aqua diffillationis, aut expreffionis, aut decoctionis carniū debet effe alterata cū cōstringentibus calidis, aut frigidis fm exigentiā, unde in caufa calida lauet primo caro & proprie diffillando cum aqua rofæca & acetofæ, & ponantur fecum ad bulliendum frufta forbarum aut cytoniorum, & femina plantaginis & femina acetofæ recentia, & fimilia. Et in caufa frigida uirtus macis, gariof. xyloaloes & fimilia, lauetur primo carnes cum uino odorifero ftiptico, fimiliter aqua decoctionis fiat decoquendo pullam in aqua calibata ufque ad carnis confumptionem, & fecum bulliant aliqua ex fuprafcriptis calida aut frigida fecundum exigentiam, fed fuccus fufe aqua expreffionis carniū fiat primo carnes coctas exprimendo, deinde fecum permifcendo aliquod ftipticum calidum & frigidum fecundum exigentiam, & quia uirtus debilis non poffet multum dirigere cibentur frequenter, fed parum pro uice. Vigiliis autem fubueniatur ungendo frontem cum diapopuleo cui apud neceffitatem addat parum opii, fyrupus de papauere eft conueniens, quia fomnum inducit & fedat fluxum m, fed apud magnam neceffitatem fupponatur pro paruo tempore lychinium opiatum, aut parum philonii perfici, & apud ultimam neceffitatem detur per os aliquid opiat ftiptici, cui ad mixta funt calida aut magis aut minus fecundum quod tuo pofito pertinet, fed cum cautela aut timore. Cætera autem accidentia ficut tenefmus & dyfenteria & fimilia curentur fecundum quod in fuis dicitur capitulis. Septima intentio perficitur ponendo ægrum in aere non uentofo boni odoris temperato in actiuus. Sed in caufa frigida declinet aliquantulum ad calidum, & minus malum eft ut declinet magis ad calidū q̄ oportet quā ad frigidum quā oportet, & melius eft ut declinet ad ficcum quā ad hum. nec in camera fua alpergatur acetur nec huiufmodi quæ uigilias excitant dormiat quantum poteft & quando poteft. Communiter enim in his propter frequentem afcellationem & multas alias caufas fomnus impeditur procuret omnes alias euacuationes, tã naturales quā pternaturales tibi cōfuetas, præter eā quæ eft fm uentrē, quiefcat quantum poteft. uerum fricationes partium

Io. Arculani

c

2

fuperiorum

superiorum aliquando conueniunt. Accidentia animi excessiua communiter uitanda sunt. Gaudium tamen & uerecundia moderata conuenit, hic enim mouent materias à centro ad circumferentiam, & e contra, timor, desperatio, tristitia, multum nocent, & ira agitat humores qui commoti amplius fluunt. Sit parcus in cibo & potu in primis duobus aut tribus diebus, & in reliquo tempore etiam non superflue comedat, & iuxta posse prius notabiliter comedat antequam bibat, & cibaria sua & proprie cum opus est stringere sint aliquantulum spissa non fluentia, & in principio mensæ comedat aliquid contrahens, sicut pirum cydonium, aut diacitoniten, diaforbon, & similia, in causa calida, & in frigida aromatizetur cum mace, cinamomo, galaga, cymino præparato & similia, & panis eius sit ex farina frumenti, uel hordei quibus etiam parum farinæ milii aut panici posset addi cum opus est contrahere, & tunc neque sit salutus nec multum fermentatus, & non primi diei, & non transcendens quartum diem, de quo tamen parum edat. Et uinum suum in causa calida sit pauciflorum stipticum & debite lymphatum cum aqua calibata, & aliquando sint in ea cocta sumach, aut frustra sorbarum, aut cydoniorum, aut parum tragacanthi & similia, sedat constante uirtute in causa calida præstantior est aqua quam uinum. Sed in causa frigida sit uinum stipticum mediocriter uinosum lymphatum cum aqua calibata, in qua etiam aliquando infundatur parum massiches, & carnes communiter sint ex pullis & auibus syluestribus bene conditionatis, & turtures laudantur. Ex quadrupedibus hedi, cuniculi, & similes faciles digestionis, paucarum superfluitatum, & extremitates & omnes partes uiscosæ cõferunt ad retentionem. Et ex ferculis panicum, rizum, far, lentes, abiecta prima aqua, alagang & proprie condita cum casio antiquo prius in aqua bullito & exiccato postea trituro. Oua etiam conueniunt & proprie apud debilitatem uirtutis, sed sint media inter fluentia & dura, & apud modernos communiter cum testis suis coquantur in aceto. Et ferculum ex acresta cum ouo conuenit, sed confusum pulli & proprie prius affati alteratum acresta, succo citri, arantii & similibus in causa calida, & cum calidis in causa frigida, sicut mace, gariofil. est apud debilitatem uirtutis conuenientissimum. Pisces conuenientes sunt parui, petrosi, lutii, temali, & strilii, aurata, fardella, passeris, & similes boni Kimi & faciles digestionis, & sint communiter affati in uero, aut super craticula, & condiantur cum acresta sapore de myrto & similibus in causa calida, sed in frigida aromatizentur cum mace, galanga, gariophil. cinamomo, & similibus. Ex fructibus conueniunt pira, cydonia, mespila, sorba, in causa calida & proprie in principio mensæ, sed in causa frigida, auellana, & filica torrefacta &c. Et hæc de fluxu in generali dicta, sufficiant &c.

TRACTATUS SECVNDVS
de speciebus fluxus sumptis à causa materiali subiectiua
continens duas partes distributas
in decem cap.

Prima pars est de speciebus fluxus sumptis à toto
quinque continens capitula.

De diarrhoea. Cap. I.



Diarrhoea apud grecos idem significans quod fluxus apud latinos, deriuatum à *διαρραιο* idem significante q̃ fluosus. Nomen generis sibi uendicans eo quod frequentius cæteris fluxibus accidat. Est descriptiue fluxus à toto unius plurium aut omnium humorum præterquam sanguinis absque excoriatione intestinorum. Quapropter eius species distingui possunt secundum species humorum. Ut dicatur quædam cholericæ, quædam phleg. quædam melancholicæ, quædam mixtæ. Cuius causa est multitudo aut malitia humorum. Sed causa remotior est indebitum regimen in cibo & potu quo huiusmodi humores multiplicantur, qui cum non sint apti in substantiam nutriti conuerteri, nec aliter sensibilibiter, aut insensibiliter expellantur, natura tandem moneat ad

iporum expulsionem per uiam hepatis & meseraicarum ad intestina, & tandem ad extra per uiam intestinorum & aniquæ est uia facilior & naturæ magis conueniens &c. Et quædoque sunt in causa febres malignæ præcedentes chronice aut acute hos humores corruptètes & dimissio euacuacionis consuetæ naturalis aut artificialis, & dimissio etiã exercitii consueti. Et in summa reliquum malum regimen sex rerum non naturalium & annexorum, est enim mala aeris dispositio manifesta uel occulta frequenter huius fluxus causa hos humores corruptendo, aut uirtutes debilitando. Et quandoq; est causa fluxus, prohibitio transitus nutrimenti ad membra pp oppilationem, concurrente etiam debilitate attractiue membrorum, aliquando fit hic fluxus à medicina solutiua suo acumine aut multitudine, aut quia aliquid eius est in intestinis aut meseraicis affixum continue nouam ad intestina attrahens materiam &c. Signa prognostica huius fluxus futuri. Et prognostica dispositionum inde sequentiū satis sunt ex generalibus manifesta. Similiter signa demonstratiua & rememoratiua ex supralcriptis facite patet. Signa autem particularia cuiuscunq; humoris fluentis sumuntur ex colore modo substantiæ & ex nocuentis quæ imprimunt in membra per quæ transeunt. Et sunt reliqua signa coadiuantia sumpta ex complexione, ætate, regimine præcedente, ætate, tempore anni, & huiusmodi. Cholericus quidem citrinus est aut uiridis, & aliquando cum citrinitate tendit in rubedinem, & aliquando in nigredinem, & cholera uitellina similis tur uittellis ouorum, & est crassa & citrina minus crassa, sed multa citrinitatis, & cholera minoris fame tendit in fuscum, & est multum crassa. Prasina similis succo prasii siue succo porri. Et zinaria coloris uiridis æris, & est multum crassa, & hæc cholera faciunt punctiorem & ardorem, & facile excoriant partes per quas transeunt. Et complexio cholericæ ætas iuuentutis, ætas, ars calida, regimen præcedens, multiplicat cholera, & reliqua huiusmodi adiuuant ad significandum. Sed phlegma est coloris albi. Et sunt species cognoscuntur ex colore, modo substantiæ, & ex nocuentis quæ imprimunt mēbris, siue sit phlegma salsum, siue acetosum, & sic de singulis speciebus phlegmatis. Et acetosum cum hoc cognoscitur ex odore. Obseruanda sunt etiã reliqua cõsignificanti sumpta ex complexione, tempore, anni, ætate, regimine præcedente, & huiusmodi. Sed melancholia cognoscitur ex nigredine uel fuscitudine & acredine à qua fugiunt muscæ. Ex odore acris etiam cognoscitur, & est genita per aduersionem melancholiæ naturalis, sicut genita per aduersionem cholerae re dolet amarum, & est ualde mala cito duens ad excoriationem intestinorum. Naturalis autem habet odorem ponticum, nec multum imprimit in intestina. Et quæ genita est per aduersionem communiter habet odorem grauē & nigredinem lucentem. Quæ uero per congelationem est odore priuata, & habet nigredinem remissam non lucidam, imo pallidam. Attende etiam reliqua cõsignificanti sumpta ex complexione & aliis huiusmodi de quibus supra. Signa autem causarum tam antecedentium quam primitiuarum satis nota sunt sed pro signis oppilationis cum est in causa fluxus recurre ad capitulum de fluxu oppilatiuo de quo infra & inter cætera fluxus ab oppilatione membrorum quæ sunt ultra hepar est periodicus, debilitatem autem attractiue membrorum significat corporis debilitas & extenuatio.

Prognostica. Primum, cholera fluens per intestina cõter excoriat ante decimum quintum, phlegma ante trigessimum, & melancholia ante quadragesimum, uerum cum hi humores sint multum adulti frequenter excoriant in prima die uel secunda, & phlegma aliquando excoriat propter difficultatem ab intestinis separationem.

Secundum prognosticum est aphorismus quartæ particulæ. Quibuscunq; in ægritudinibus acutis, aut multi temporis, aut abortibus, aut aliter extenuatis, id est, multum consumptis & debilitatis fel nigrum sursum, id est, per uomitum, aut deorsum, id est, per secessum exierit sequenti die, id est, per paruum tempus post morietur, pro reliquis prognosticis recurre ad generale capitulum &c.

Cura diarrhoeæ easdem septem exigit intentiones quæ superius posite fuerunt in cap. generali, ad quod recurre, & eas huic cap. accomoda fm exigentiam, & metire medicinas

cinas illas intentiones complentes secundum exigentiam uirtutis, repletionis, temporis anni, & reliquorum quae omnia apud prudentem medicum sunt consideranda.

De fluxu sanguinis provenientis a toto. Cap. 2.

Fluxus sanguinis a toto quantum ad quid nominis & quid rei satis est manifestus. Species proprie non habet sed solum quosdam modos secundum magis & minus differentes. Est enim quique multus, quandoque paucus, quique novus, aliquando antiquus, quique continuus, nonnunquam interpolatus, quandoque criticus, aliquando symptomaticus. Eius causa est repletio uenarum totius ex comestione multarum carniarum & potu uini nigri crassi, quae repletio non est diminuta per exercitium, neque solitas euacuationes naturales, sicut per fluxum sanctorum menses aut hemorrhoidalem, neque per euacuationes artificiales sicut per phlebotomiam & similes. Et forte fuit in causa membri mutilatio, unde superfluit sanguis qui debuit esse nutrimentum eius, quapropter natura stimulata misit hunc sanguinem ex uenis paruis ad magnas & ex magnis ad uenam chyli, & tandem per ramos uenarum chyli disseminatos per hepatis gibbum mittit ad ramos uenarum portae sibi obuiantes disseminatos per concauum hepatis, & tandem per meseraicas ortum habentes ad uenam portae transmittit ad intestina, & hic fluxus accidit in aegritudinibus acutis sanguineis, sicut in synocha & similibus & plerumque est ipsarum crasis, & aliquando hic sanguis per uenas emulgentes mittitur ad renes, & uenis ipsorum dilatatis, aut forte solutis per poros uritides mittitur ad uescicam, & fit mitis sanguinis, & aliquando recipit ad stomachum, & in uomitum. 2. lib. aliquando est sanitas, penes Aui. 13. tertii cap. proprio, & quandoque per poros cutis sub forma sudoris emittitur. Tertio de hysto. animalium, licet hoc rarissimum sit, & quandoque causa huius fluxus est oppilatio membrorum quae sunt ultra hepar, & aliquando debilitas attractiua ipsorum. Signa eius sunt regimen praecedens multiplicatiuum sanguinis, & repletio totius etiam ad uasa uenarum sunt tumentes & facies rubicunda. Item, carentia euacuationum naturalium aut artificialium consuetarum, aut membri mutilatio signa huius cum provenit ab oppilatione ponentur in fluxu hepatico, & oppilatio, & inter caetera fluxus est periodicus. Debilitatem autem attractiua membrorum declarat corporis debilitas & extenuatio. Signa autem distinguunt hunc fluxum a fluxu sanguineo ab hepate stomacho & intestinis sunt causae praedictae absque noementis particularibus horum membrorum &c. Prognosticum. secundum plurimum curatur hic fluxus si debite tractetur, si uero indebite perducit ad casum uirtutis, & quando diu continuatur ad hydropem &c.

Cura. Si fuerit criticus dimittat quousque natura toleret, & similiter si fuerit symptomaticus quem natura regulet & bene ferat. Si uero superfluit aut alio modo fuerit naturae improporcionatus, aut quia intestina excoriet, aut sit cum aliis accidentibus molestis. Constringat primo remouendo regimen praecedens sanguinis multiplicatiuum & praecipiendo regimen contrarium scilicet dietam extenuatiua, & cum hoc stiptica aut costringentia. Secundo minuendo sanguinem & diuertendo, quod fiat aut prouocando euacuationes consuetas si fuerit in causa earum retentio scilicet fluxum sanctorum hemorrhoidalem & menstruale. quod si non possint prouocari fiat phlebotomia his proportionata scilicet uenae cephalicae aut saphenarum, & si nulla talis retentio sit in causa phlebotometur basilica communis, si causa fluxus fuerit admixtio cholerae cum sanguine ipsam fluere facietis, & sanguis ab ea mundificetur cum decoctione prunorum, tamarind. myroba. citrinorum: cum qua colatura dissemperetur rhabar. 3. i. uel quantum suff. & haec etiam educit materias communes & sanguinem si forte in intestinis coagulatus fuerit. quod si causa fluxus sanguinis esset aquositas sanguini permixta educatur cum decoctione myrobolanorum kebulorum, cui parum succi ireos, ut puta. 3. s. uel. 1. 3. aut plus possit addi uel potest exhiberi decoc. myrobolanorum kebulorum cum paucis turbitis non confortati cum zingib. Et tertio his non sufficientibus dentur retinentia sanguinem, stiptica, conglutinatiua, & ex propriis est succus plantaginis, uel consolidae, uel caudae equinae. 3. i. uel 3. 2.

cui. 3. i. lapidis emathitis, aut dentur species luti & proprie armeni aut sigillati, & trochisci de karabe, & de terra sigill. sine opio & cum opio apud magnam necessitatem sunt praestantes, & philonium persicum, & ungatur hepar, & similiter dorsum ex directo uenae chyli cum cerato sandalino cui bolus armenus, aut sang. dra. aut lapis emathitis, aut aliquis ex trochiscis superscriptis sit admixtus aut epithimetur cum succo plantaginis, & aliquo ex pulueribus superscriptis, & in causa frigida superscriptis stipticis addatur thus, mastiche & similia, & in utrisque addatur aliquid aceti ad penetrandum & constringendum. Et quarto ordinetur regimen stipticum non multiplicatiuum sanguinis, & bibat aquam ferratam sine uino nisi timeatur casus uirtutis, & tunc detur uinum nigrum stipticum cum eadem aqua lymphatum, & si in causa esset aquositas sanguini permixta detur trisera ferruginata ex arte Fenonis, confortetur cum lapide emathitis, aut cum aliquo ex trochiscis superscriptis, & ordinetur regimen stipticum non declinans ad frigidum. quod si nocumentum aliquod esset in intestinis, ut quia sanguis esset in eis coagulatus cum clysteri mundificante educatur, & si excoriatio sit in eis facta curetur medicinis dysenteriae inferius ponendis. Cura autem fluxus sanguinei a toto ex oppilatione procedens ponetur infra in fluxu hepatico, & in fluxu oppilatio. Sed cura fluxus sanguinei ex debilitate attractiua membro rum perficitur cum frictione corporis, & exhibitione uini subtilis & rerum facile penetrantium & similiarum.

De fluxu diuersorum colorum. Cap. 3.

Fluxus diuersorum colorum qui etiam est a toto, quantum ad quid nominis, & quid rei satis manifestus est. Apparet enim in egestionibus colores diuersi ualde, si cut albus, niger, subniger, citrinus obscurus, citrinus clarus, similiter uiridis diuersorum modorum rubeus obscurus, rubeus clarus morellus, & in summa fere non est imaginabilis color qui non appareat. Imo interdum in una accellatione multiplices colores apparebunt. Eius causae & signa sunt regimen praecedens diuersum & dyscrasia corporis diuersa, ita ut sit necessarium diuersos effectus provenire &c. Prognosticum secundum plurimum curatur si debite tractetur. Cura. Si fluxus fuerit uirtuti & repletioni proportionatus, finatur regimini naturae, & solum aequetur regimen & dyscrasia corporis diuersa. Si uero nimis superfluit constringatur ut non ita repente fluat. Subita enim & multa euacuatio a natura non toleratur. Modi constringendi sunt manifesti ex his quae superius in cura generali fluxus dicta sunt. Si uero fuerit tardus & diminutus natura adiuuetur prius mundificando corpus cum his quae diuersos humores euacuant, non exsoluentibus, sed stipticis, sed derelinquntibus in intestinis & uis ductum uestigium constrictionis, quorum copia suprahabitat est in cura generali. Et si fuerit multa plethoria cum uirtutis constantia, & in habitudine carnosa fiat phlebotomia ex saphenis, si retentio fluxus menstrualis aut hemorrhoidalis fuerit in causa. Si autem nihil tale fuerit phlebotometur basilica uel communis. Secundo aequetur regimen & corporis complexio, ita ut ad proportionalitatem quadam naturae conformem ducatur omnium membrorum complexio, quae ergo superflue lapsa sunt corrigantur cum interius & exterius applicitis, & tam cibalibus quam medicinalibus & omnium membrorum & proprie nutrimentorum uirtutes confortentur cum propriis stipticitate moderata participantibus & euacuationes consuetae procurentur tam naturales quam praeternaturales diu consuetae. Et in summa hic obseruetur documentum Aui. 14. tertii. tract. 4. c. 1. quod quandoque est in expulsionibus diuersorum colorum lenitas scilicet quando expellitur quantum & quale, & qualiter oportet. Et errant qui tenent hos colores diuersi in omni dispositione, scilicet ante completam mundificationem. Et uehementior error eius est qui tenet eos cum oppilatiuis, constipatiuis, qui retinendi sunt mundificando dyscrasiam corporis diuersam alterando & membra confortando.

De fluxu liquefactiuo. Cap. 4.

Fluxus liquefactiuus qui etiam est a toto quantum ad quid nominis & quid rei est satis manifestus. Est enim fluxus per quem humiditates membrorum substantia-

les educuntur. Species siue modi eius diuersificantur secundum eius quod egreditur diuersitatem, & consequenter secundum diuersitatem membrorum à quibus fit liquefactio & dissolutio. Quandoque enim fluentia sunt alba uiscosa, non tñ unctiosa, & oleagina, & proueniunt ex dissolutione membrorum radicalium, & sunt sicut uirus subtile album, & si est ex liquefactione musculorum & carnis ruberæ sunt sicut uirus rubrum. Quandoque uero sunt unctiosa & oleagina, & proueniunt ex dissolutione adipis & pinguedinis, & si pinguedo dissoluta fuerit recēs exuntia sunt alba, & si antiqua sunt citrina, & si ex dissolutione adipis renum sunt magis cōglobata &c. Causa huius fluxus sunt omnia corpus præter modum calefacientia, & exiccantia, siue sint intrinseca, siue corporea sicut febres fortes & diu durantes, tam heticæ quā humores, & causæ magis remotæ sunt ulcera & apostemata membrorum nobilium & corporum parua resistentia, quia sunt mollia, aut ex ætate sicut pueri, aut ex complexione & habitudine sicut illi q. habet lacertos molles & humidos &c.

Signa sunt ipsæ causæ præcedentes & concomitantes, corpus liquefacientes, necnon effectus inde sequentes sicut exuntia de quibus sermo præcessit, necnon corporis consumptio & arefactio, & etiam ipsa urina quæ apparet unctiosa & oleagina in superficie, imo aliquando notabilis pars eius, sicut oleum & pinguedo liquefacta alba, uel citrina secundum dissolutionem adipis recentis uel antiqui, & hoc quando fit dissolutio multi adipis & pinguedinis. & si apparet conglobata separata & supernatans magis est ex dissolutione adipis renum iuxta aphorismum, quibus uero pinguis hypostasis & conglobata nefreticum significat, si uero urina fuerit alba similis lacti uel spermari non unctiosa magis ex liquefactione radicalium peruenit &c.

Prognosticum. Fluxus liquefactius ex dissolutione adipis uel pinguedinis curabilis est, & proprie cum non est ex dissolutione pinguedinis antiquæ, non tamen apud negligētes parum exercitatos, & proprie curabilis est si causa eius posset remoueri. Vbi enim pendeat ab apostemate fixo in membro nobili intrinseco, aut ab ulcere pulmonis & simili etiam incipiens esset incurabilis, si uero proueniat ex dissolutione membrorum radicalium si notabilis est, est incurabilis. Huius fluxus cura duplicem exigit intentionem. Prima est remotio causæ immediatæ liquefactionis scilicet caliditatis & sicce, liquefacientis. Secunda est eius quod deperditum est restauratio. Prima intentio compleitur cum remotioe causarum caliditatem illam & siccitatem conseruantium, siue sint febres putridæ, siue ulcera aut apostemata, quæ qualiter debeant curari ex suis capitulis perquiratur, quod si remoueri non possint non est ingenium nisi in prolongatione uitæ, quæ tamen magis potest dici mors quā uita. Intendendum est ergo siue huiusmodi causæ fouentes caliditatem remoueri possint, siue non ad ipsius caliditatis & sicce alterationem cum frigidis & hu. stipticis & uiscosis, quæ tamen non sint multum frigida, ne calorem naturalem extinguant qui debilis est, neque multum stiptica, ne transitum nutrimenti prohibeant ad membra, ex complementibus autem hanc intentionem quædam sunt medicinæ, quædam cibi medicinales. Medicinæ autē quædā exterius applicantur sicut fronti, tēporibus, & cerebro anteriori, quædā cordi, quædā hepatis, quædā dorso, spinali, medullæ, & renibus, & quædā partibus extremis, & oēs hæc sint frigida & hu. magis aut minus sibi corporis dyscrasiam & fortitudinem caliditatis innatæ potentis scilicet tolerare & moderata stipticitate participant maxime quæ applicantur principalibus magis ad confortandū quā ad contrahendum, & communiter nisi calor innatus sit ualde debilis actū frigide applicetur, aut saltem nō calidæ, & balnea ex lacte aut ex his qui in hēctica fieri cōsueuerūt sunt in hac præstantia. Medicinæ autē suprascriptæ ex cap. hēctice colligantur, similiter medicinæ quæ interius sumuntur sint frigida & hu. maiori tamen stipticitate, & uiscositate participant ut melius prohibeant liquefactionē. Et quæ clysterizantur sint similiter conditionatæ sed magis stipticæ. Cibi aut sint frigidi & hu. aliquantulum stiptici paucorum superfluitatum præbentes nutrimentum bonum, uiscosum, & solidum ne facile liquefiat, & cum hoc sint faciles digestionis, sicut est uinum nigrum stipticum cum aqua calibata, aut infusio-

nibus tragacanthi, debite lymphatum, & ex carnibus pulli cuiuscunque generis phasiani, perdices, coturnices, franquilini, & similes, cōditi cum acresta aut uino cydoniorum, aut in gelatina, aut cum sumach myrto & similibus. Et oua forbi lia cocta in aceto & aqua ros. Et genera lactis in quibus sit extinctum ferrum & proprie mulieris, deinde asine, deinde capræ, deinde ouium, deinde uaccinum, & caseus recens, & pisces bene conditionati, & ex granis far, hordeum, spelta, amylium, & similia, sed melius est Kist eorū. Et ex herbis, cucurbita, portulaca, lactuca, sed acetosa est propria, & cibaria sua quandoque immiscetur cum puluere gummi, tragacanthi, coriandri quod est proprium: inspissat enim humiditates & uiscosas facit & membris adhaerentes, & propterea minus liquefactibiles, & adhuc Karabe confert & folia ulnæ, & est res albi coloris collecta super arboribus sunt in hoc propria & hæc sua stipticitate tēperata paulatim fluxū stringunt nō repente, & sibi hanc intentionem facile fieri possent composita, sicut marzapanis & electaria restauratiua & sibi similia. Secunda autem intentio scilicet humidi restauratio perficitur cum similibus cibis quorum præcessit rememoratio & uirtute existente debili pluries in die sunt cibandi.

De cholerica passione.

Cap. 5.

Cholerica passio, est descriptus motus uehemens materierum ex indigestione corruptarum ad expellendum à corpore cum labore & acuitate uirtutis expulsiue tanta ut propter multitudinem & acuitatem materię fiat uomitus & secessus simul &c. Complementum huius cap. quo ad species, causas, signa, prognostica. Et curam quere supra in tractatu de passionibus stomachi.

Secunda pars est de speciebus fluxus sumptis à membris particularibus continens capitula sex.

De fluxu cerebri.

Cap. 6.

Fluxus cerebri est qui fit propter catarrhum à cerebro ad stomachum, & tandem ad intestina descendentem multoties corruptentem cibum & facientem ipsū fluere, & descendentem simul cum eo propter suam lubricitatem & expulsiōem factam ab intestinis.

Causæ huius fluxus sunt omnia quæ catarrhum multiplicat, siue corporea sint, siue incorporea, & maxime sibi plurimum mala complexio frigida cerebri & humida, & aliquando calida & hu. quæ ratione caliditatis attrahit & ratione humidi resolutionem impedit, unde neque fit nutrimenti debita conuersio, nec superfluitatū propriarum, aut, cōiū resolutione, aut per proprias regiones euacuatio, quapropter descendentes per colatorium, aut alias uias occultas ad stomachū deriuantur, & sunt sibi plurimum phlegmaticę. Item, uapores qui à membris inferioribus & maxime à stomacho ad cerebri eleuati à frigiditate sua & humiditate condensati sunt frequenter in causa, multiplicantur autem & ad cerebri eleuantur propter debilitatem suarum digestionum, & quia non possunt per alias regiones sensibiles aut insensibiles expelli & frequenter pororum oppilationes &c. Species non habet nisi quosdam modos secundum magis & minus differentes, ut quia aliquis est nouus, aliquis antiquus & similes, &c.

Causæ autem primitiue sunt aer frigid. & humid. & nentofus, auster enim caput implet, boreas exprimit, & statio sub radiis solis, aut lunæ capite repleto. Item cibi difficili digestionis, uapores, & potus nimius, & præcipue uini uinoli, & somnus multus, & proprie meridianus, & immediate post crapulam aut ebrietatem. Item, retentio euacuationum consuetarum, & quies multa, & exercitium forte inconsumetum, capite etiam repleto & coitus multus debilitans cerebrum & membra naturalia. Item, accidentia animæ, sicut tristitia, nimium studium, cogitationes profundæ, & similia &c. Signa fluxus cerebri sunt primo signa corruptionis complexionis cerebri scilicet frigiditatis & hu. secundum plurimum, sed caliditatis & hum. rarius, & ad sunt signa catarrhi, quia sentitur in gutture titillatio quædam, & descensus eius per mery, quem, quandoque sentiens deglutit.

deglutit, & cum peruenit ad stomachum sentitur frequenter grauedo, & aliquando nausea, & quandoque dolor, & apparet in egestionibus cibis indigestus cum mucus phlegmaticis, & habet periodos secundum aggregationem materiae catarrhalis magis in somno, & post expegefactionem descendit, & quandoque descendit in somno, ita ut sentiat patiens deglutire. Et differt à lubricitate stomachi, quia illa non habet periodos, sed quacunq; hora cibus assumitur descendit, & sem plurimum est sine mucus phlegmaticis, & e contra uero fluxus cerebri est cum exitu humorum catarrhaliū abluque cibo, & aliquando absque alia siccum admixtione, nec adsunt in lubricitate signa corruptionis complexionis cerebri nec signa catarrhi quae apparent in gutture & mery & in stomacho postquam descendit, de quibus dictum est.

Prognosticum. Huius fluxus cura facile perficitur si catarrhus potest prohiberi, quapropter in senibus est huiusmodi cura difficillima &c. Cura huius fluxus septem exigit intentiones, scilicet euacuationem, diuersionem, cerebri rectificationem, sitionem stomachi, & intestinorum mundificationem, & ipsorum confortationem, & debitum regimen sex rerum non naturalium secundum exigentiam intentionum. Prima intentio in catarrho frigido aut mixto completur cū pilulis de hiera simplici, aut de hiera composita, aut cum agarico uel cum huiusmodi. Recipe pilularum de hiera simplici. 3. i. agarici preparati, myrabolanorum. Kibulorum ana. 3. s. cum aqua menthae, aut maioranae, aut cum uino fermentur pilulae. 1. 5. de quibus sumantur. 5. aut. 7. secundum exigentiam mane, aut completa digestionem cibi praecedentis, & apud maiorem necessitatem pilulis de hiera simplici, potest addi aliquid cochiarum, & in calido euacuetur cum pilulis assaiaret, quibus apud necessitatem posset addi aliquid modicum aurearum. Sed cauendum est cum adsit fluxus ne fortia soluentia nimium soluant & stomachum debilitent & intestina, propterea bonum est cum medicinis soluentibus superprescriptis aliquid myrabolanorum misceri. Digestina autē si eis opus sit sunt in materia frigida. mel. ros. syrupus de stoea dos, & his posset admisceri aliquid thuris ad confortandum, & in crassandum, & in calido iulep rosaceum de myrto, & syrupus de papauere, & debent hi sumi cum aqua leuiter calibea, sed in causa frigida in ea insulum aliquid thuris, maceis, nucis muscatae, & similia. Diuertatur iuxta secundam intentionem materia catarrhalis fluens uel fluxura, & similiter uapores caput petentes omni genere diuersionum communium, & cum aliquibus propriis, maxime caput purgii & defecatoriis, & tandem cauteriis commissurae coronali applicitis. masticatoria uero & gargarismata sunt mihi suspecta ne amplius materiam ad stomachum praecipitent & diuersificentur caput purgia secundum materiae diuersitatem & sensus acuitatem & similiter uescicatoria & cauteria. Confortetur autem cerebrum iuxta tertiam intentionem cū exterius applicitis, sicut sacculo maxime applicito super commissura coronali facto ex sale iustilato, sandarace, radice nenusa, exiccata. ana. 3. 2. spicae, myrrhae, ana. 3. 1. & hic sacculus aliquantulum calefactus super latere cal. asperso uino, & pauco aceti bis in die applicetur, & sumpta interius sint diamusculus & diambra in causa frigida, & zucarum rosaceū in causa calida myrobalani quoque chebuli conditi optime valent in confortatione stomachi & capitis, & cum hoc comprimendo euacuat, & trisera ferruginea est propria ex arte Phoenonis, sed in confortatione stomachi superflue remolliti, & aromaticum rosaceum est proprium in utriusque confortatione, & in causa mixta aut frigida. Sistatur autem catarrhus frigidus iuxta quartam intentionem multis modis, sed maxime tenendo in ore thus aut spicam, & thus deglutit post coenam optime confert, sed in calido teneatur in ore semen papaueris al. diacodion, terra sig. lutum armenum, aut aliquid ex eis deglutatur, & quandoque oportet uti narcoticis, sed postponatur quantum est possibile. Suffumigia etiam facta cum thure, sandaraca, costis, landano, xyloaloe singulariter aut coniunctim, & proprie si cum resina & pice incorporentur optime valent ad sistendum catarrhum, & ad cerebri confortationem. Mundificetur autem stomachus iuxta quintam intentionem cum uomitu, & proprie si nauseauerit. Et stomachus & intestina mundificentur cum clysteribus aut solutiuis leui-

bus sicut pilulis de hiera simplici cum pauco myrabolanorum. Deinde confortetur iuxta sextam intentionem cum stipticis & aromaticis, & prohibentibus effusionem materiae ad ipsa. Et ex propriis est thus, spica, capilli ueneris, mastiche, maceis, & similia. Et si qua sit discrasia impressa in stomacho & in testinis frigida cum calidis amoueat, sicut sunt cortex citri, zingiberis, ameos, cortex thuris, & sicut aromaticum rotheriaca, mitridatum usque ad aquam uitis, & similiter cum exterius applicitis. Calida autem remoueat cum frigidis confortatibus, sicut diarrhodon abbat, zucarum ros. & si militer leuiter ad frigidum declinantia applicetur exterius. Aer iuxta septimam intentionem declinet ad siccum & ad temperamentum in actiuis, aut leuiter ad calidum. Caueat à uetis & à statione sub radiis solis aut lunae, teneat caput pannis mediocriter coopertum inspecta eius discrasia, sed residuum corporis magis calidum. Vitet uinum quantum est possibile. Sed bibat aqua mellitam uel zucarata, aut uinum rubrum optime lymphatum & proprie aqua aliquantulum calibea. Et sint cibi eius facili digestibiles non uaporosi ad siccum declinantes, non comedat brodia in coenis. Post cibum sumat aliquid cydonii, aut piri cocti aut conditi, aut coriandros semi confectos, aut saltem praeparatos. Non dormiat in die iuxta posse, & taret somnum post coenam quae sit leuis, dormiat capite eleuato ad alterum laterum declinantem, ita ut humiditates sint pronae fluere per nares. Procuret uomitum si nauseauerit immediate post somnum. Et ceteras procuret euacuationes per conuenientes regiones. Exercitetur stomacho ieiuno, sed exercitium sit magis longum quam forte aut intensum. Et frictiones aliquando suppleant uicem exercitii. Sit speras & gaudens, uitet tristitiam & longum studium, & nimiam sollicitudinem.

De lienteria siue fluxu stomachico. Cap. 6.

Lienteria lubricitas stomachi, lenitas eius, fluxus stomachicus sunt termini synonymi, & dicitur lienteria à λένειν quod est lenire & ἔνταρον intestinum, id est, lenitas intestinorum. Propterea diffinierunt quod est lenitas stomachi & intestinorum, est enim tunc eorum superficies lenis non aspera, sicut debet esse in dispositione naturali. Est autem descriptiue asperitas inaequalis superficiei secundum corpus durum, quae naturaliter debet esse in superficie intrinseca stomachi propter retentionem, cū enim stomachus primae digestionis organum sit principaliter ordinatum ad digerendum cibum & potum sibi ab ore per mery delatum quae digerere non potest nisi ipsum debito tempore retineat, cū actiones naturales non fiant nisi in tempore, fuit à natura sapienter ordinatum ut tunica ipsius stomachi cum uillis suis corrugareretur, & super cibo contraheretur clauso portuario ut fieret immediata adhesio cibi ad stomachum & e contra, & nullum caderet uacuum inter ipsos, sic enim duae sequenter utilitates. una est retentio cibi debito tempore quae maxime perficitur per superficiem intrinsecam asperam ex tunicarum corrugatione prouenientem. altera est cibi bona digestio, & in chylum transmutatio quae perficitur per bonam stomachi cibo digerendo adhesionem. Si ergo stomachus debens esse naturaliter asper fiat lenis laxaretur immediate retentiu, & consequenter digestiu, & aegrotabit aegritudine quae dicitur secundum essentiam suam lenitas opposita asperitati quae sub creatura continetur. Et sem accidens immedia tum dicitur lubricitas, & sem mediatum dicitur lienteria quae descriptiue est fluxus indigesti. Primo enim lenitur superficies stomachi interior, deinde ex ea deficit retentiu & lubricat chylus, ex quo consequenter deficit digestiu, ultimo cibus indigestus emittitur &c.

Hic fluxus species non habet nisi quasdam improprias differencias secundum magis & minus, aut secundum diuersitatem suarum causarum. Est enim quaedam lienteria in qua emittitur cibus & potus omnino indigestus, & in ea quantitate in qua est assumptus. Est etiam alia species leuior in qua cibus totus emittitur, sed non omnino indigestus sicut assumptus est. Est etiam tertia species leuissima in qua non totus, sed aliqua parte eius bene in chylum conuersa, aliqua uero refugiente digestionem emittitur indigestus. Similiter possunt assignari species secundum diuersitatem suarum causarum.

Io. Arculani c 4 ut

ut quod aliqua pendet à causa primitiua, sicut à cibo aut medicina, & aliqua à causa corporea, sicut ex nocumento stomachi & membrorum sibi communicantium.

Propterea causas huius fluxus absoluiamus incipiendo à primitiuis ex quibus est medicina solutiua, cuius aliquid est in stomacho aut intestinis, prius autem in orificiis mesenteriarum derelictum materiam à membris circumstantibus attrahens ad stomachum & intestina, quibus uirtus grauata simul cum illis cibum expellit. Et aliquando cum periodicis materia in determinato tempore aggregata sufficiente stimulare expulsiuam, aut debilitare contentiuam. Quandoque à cibo, aut propter sui quantitatem, aut qualitatem, aut malum ordinem, aut quia non sumitur in tempore conuenienti, aut quia non debite præparatur, aut quia non fit debita ciborum mixtio adinuicem, aut quia non seruatur debitus ordo sumpto cibo. Cibus enim quantitatis multæ grauando retentiua est causa fluxus, & si corrumpitur propter diminutâ decoctionem corrumpitur ad acetosum. Cibus autem paruæ quantitatis interdum est causa fluxus cum propter magnam proportionem uirtutis digerentis corrumpitur ad fumosum, & stimulo expulsiua est causa fluxus. Secundus cibus malæ qualitatis, ut puta grauis & crasse substantiæ, sicut fabæ, caro buffali, & similia debilitando contentiuam est causa fluxus etiam ante eius digestionem, & salsedo cibi acuitas & acetositas irritat ad expulsiuam ante digestionem, sicut allia, piper, acetum & ualde salsa, & uetustas sicut in fungis malis, & uelox cibi corruptio sicut lac. Et cibus multæ aquositatis, sicut cerasa, pepones, uua, & similia, & fluxibilia ualde, sicut brodia & unctiuosa faciunt ad lubricitatem, & cibi, quorum multum parum nutrit, sicut olera, conturbant enim stomachum, cum parum cedat in nutrimentum, plurimum in superfluitatem. Item, cibus qui non est conueniens homini cum sua proprietate contraria toti speciei, sicut foenum, carnes crudæ, & cibi animalium, non hominum, aut qui est contrarius uni homini, ita quod non alteri cum sua proprietate materiam insequente, sicut cancri qui solebantur amicum meum soluere, & in eo fluxum prouocare toties quoties caneros comederet. Tercio ratione mali ordinis fit fluxus cum præmittitur cibus lubricus facilis digestionis, & postponitur stipticus: aut quando postponitur cibus facilis digestionis, & corrumpitur, est causa fluxus corrumpendo quod est sub se, & irritat naturam ad expellendum. Quarto quando sumitur in tempore non conuenienti, sicut cum sumitur cibus præcedenti nondum digesto: aut cum tardatur cibus post famem replentem stomachum malis humoribus, fit ut corrumpatur, & tanquam superfluum expellatur. Quinto non debita præparatio, sicut quando non bene coquitur aut minus excoquitur, aut frigidus non comeditur, & similia. Sexto mala ciborum mixtio, sicut quando ex incisuiis, abstergentibus, salis, unctiuosis fit mixtio &c. Septimo indebitum regimen post cibum est causa fluxus, sicut potus multæ aquæ post coenam est causa, cur cibus lubricet. Quanquam aliqui ex tali potu credant se bene digerere sed falluntur, quia non digerunt, sed sic videtur eis, quia cibus descendit indigestus et citius quam solebat. Similiter qui se exercent inordinare post cibum, aut coeunt, aut incurrunt timorem, iram, & huiusmodi accidentia extrema. Aer quoque humidus superflue adiuuat ad fluxum, & etiam qualitercunque multum discrasatus, est enim causa debilitatis uirtutis contentiuæ, aut corruptionis humorum qui corrupti sunt causa fluxus. Ex parte uero stomachi est mala complexio frigida & humida, maxime debilitando contentiuam ratione humiditatis, & ratione frigiditatis digestiuam: licet enim frigiditas utranque debilitet multum, humiditas multo magis lædit contentiuam quam digestiuam, quamquam caliditas & siccitas cum excedunt sint causa fluxus debilitando contentiuam & digestiuam, sicut in propinquis morti. Omnis enim moderata discrasia deicit actum propriæ uirtutis secundo technî. Secunda causa sunt humiditates phlegmaticæ stomacho adherentes, siue in eo congestæ, siue aliunde defluxæ quæ non sinit cibum fieri in stomacho, vel tanto tempore remanere ut digeratur, & potest esse quod eorum præsentia stomachus non fit læsus, sicut neque dicimus hominē lesū in uirtute retentiua manuum habentē manus oleo inunctas, quamuis non bene retineat, secundū plurimum, tamen si pro-

longaretur in stomacho lædunt retentiua & digestiuam. Similiter præsentia humoris cholericæ aut phlegmaticæ falsi pungentis & stimulantis expulsiuam non sinit cibum fieri. Ventositas etiam non sinens stomachum adherere cibo est causa ut corrumpatur & expellatur. Tertia causa, sunt ulcera pustulæ aut apostema stomachi tantum dolorem inferentia ut non toleret cibi contactum, quapropter irritatur expulsiua ad expellendum. Item, dolores stomachi à quacunque causa contigerint. Quarta causa, posset esse apostema & ulcera membrorum sibi vicinantium, scilicet diaphragmatis, hepatis, intestinorum gracilium, & colon, qui superequitat stomachum, & similiter ipsorum dolores. Est tamen aduertendum, lienteriam, quamuis sit principaliter passio stomachi cui principaliter debetur cibi digestio, esse etiam passionem intestinorum & propriæ superiorum, quorum actio est in cibo prædigesto in stomacho ad complectendam eius digestionem, licet uirtus retentiua non insit eis per uirtutem in eis repertam, sed solum per ipsorum circinuationem, ut uoluit Gal.

Signa lienteriae sunt ipsa lienteria, scilicet exitus cibi & potus indigesti. Differt tamen lienteria stomachi à lienteria intestinorum. Nam in intestinali egreditur cibus notabiliter digestus, cum ipsius digestio principaliter in stomacho perficiatur. Sed in stomachali siue stomachica secundum plurimum notabiliter indigestus, & adsunt nocumenta intestinorum cum sanitate stomachi, vel e conuerso, & distinguitur per locum doloris, & cuiuscunque alterius nocumenti sensati, an sit in regione stomachi, vel intestinorum. Item, ex aggritudinibus quæ præcesserunt an fuerint in stomacho, sicut nausea, subuersio, vomitus, & similes, an fuerint in intestinis, sicut colica, dysenteria, & similes, quæ magis in intestinis appropriatur, & vomitus sanies, & sanguinis cum dolore circa stomachum sensato, siue præsens, siue antecedens significat lienteriam esse stomachicam cum sanies, & sanguis intestinorum male posset enomi nisi magna esset opilatio in intestinis sicut in ileo. uerū sanies & sanguis stomachi facile potest per secessum expelli, & differt à fluxu cerebri, quia lienteria ordinem non habet neque periodum, sed quacunque hora cibus assumitur, & propriè difficilis digestionis egreditur. Cerebralis autem ordinem habet & periodos, ut supra.

Signa causarum si fuerint primitiua sicut medicina, cibus potus, & aer, & alia quæ superueniunt sumpto cibo, scilicet exercitium & similia sunt præcessio ipsarum causarum. Et quæ docung; talis causa præcessit, ut quia talis sumptus est cibus, aut aliqua ex causis iam dictis semper sequitur talis effectus, scilicet lienteria & nulla tali causa præcedente non sequitur lienteria. Et si est causa medicina solutiua interdum sentitur dolor & punctio, & sapor eius est ex eis quæ hoc facere consueuerunt, sicut est agaricum aut colocynthis consumitur in substantia nisi sit infusa, sicut oxymelle &c. Signa malæ complexionis frigida & hum. stomachi sine materia sunt albedo faciei, & lingua paucitas sitis, & tarda digestio, frequens corruptio cibi ad acetosum cum oxyremia, multitudo sputi, & non est grauitas stomachi neque nausea. Sed si sit cum præsentia materiæ phlegmaticæ, adsunt signa suprascripta, & cum hoc grauitas & frequenter stomacho ieiuno adest nausea, subuersio, vomitus phlegmatis, quod etiam frequenter secessum educitur, & si in causa est ventositas sentitur motus ventositatis per superius aut per inferius & rugitus & dolor, nunc in una parte, nunc in altera. Et si in causa sit mala complexio calida & humores calidi adsunt signa contraria supra scripta, & eorum sapor in eructatione sentitur & frequenter vomitu aut secessu emittuntur, & cum hoc sunt signa generalia ex complexione, habitudine, ætate, tempore, regimine præcedente & similibus, quæ malæ complexionis calidæ aut frigida attestantur. & phlegma falsum cognoscitur ex sapore si uomitur, & ex substantia sua subtili & acuitate & mordicatione tenelmo si per secessum emittitur. Et signa ulcerum sunt vomitus saniei & eructatio redolens saniem, & secessus saniei multum commixta fecibus propter longum cum chylo & fecibus incesum. Et si ulcera sunt in intestinis raro uel nunquam sanies euomitur, neque eructatio est redolens odorem eius, sed solum per secessum emittitur, & sumpta per os si acuta sint ardore inferunt quando ulcera sunt in stomacho, sed in intestinis minime. Et apostemata cognoscuntur ex eorum more,

more, duritie, grauitate, dolore continuo, febre continua. & bothor cognoscuntur ex punctione, & mordicatione, & frequenter apparent in ore propter continuationem pelliculæ oris cum pellicula stomachi, & facile possunt in causis communicare. Et si apostemata sint in intestinis adest colica & lenteria ex debilitate retentiæ, distinguitur à lenteria ex debilitate digestiæ, quia in prima cum cibus assumptus est statim emittitur, & proprie cum homo sedet vel incedit, sed paulatim existente fere semper aliquo conatu ad retinendum, & proprie cum expulsua non est valde fortis, & apparet in cibo aliqua digestio secundum moram eius in stomacho, sed in secunda ex debilitate digestiæ cibus notabili tempore retinetur, postea tandem indigestus per superius aut inferius emittitur. Et frequenter apparent signa corruptæ digestionis.

Prognostica. Primum est aphorismus quintæ particulæ, scilicet in diuturnis lenteris q̄ oxyremia superueniens prius non existens bonum. & est sensus q̄ oxyremia, id est eructatio redolens acetum vel acretam superueniens prius nō existens bonum est per viam signi, significat enim cibum immutari cum prius non immutaretur, & sic bonū est & præcipue si redoleat odorem aceti cum magis actionem caliditatis significet. Si autem oxyremia præcessisset lenteriam, aut simul cum ea inchoasset, siue diu durasset, siue non, non est bonū signum, significat enim phlegmatis acetosi, aut melancholicæ acris præsentia in stomacho aut magnani distemperantiā stomachi ad frigidum, quorum nullum est bonum. Dicunt etiam quidam esse bonum per viam causæ quia res acetosæ phlegmata incidunt, sed in hoc casu arbitror hoc paruum iumentum. Secundum prognosticum, lenteria succedens fluxibus antiquis, & ad chronicas ægitudines mortalis. Tertium, lenteria sequens malam complexionem frigi, & hum. est summe difficilis cum antiquatur tandem & ducit ad hydropem, tum hepar refrigerando, tum male chylum præparando. Quartum prognosticum, lenteria sequens medicinas exoluentes, aliquando ducit ad dysenteriam & mala vlcera intestinorum. Quintum, vomitus in lenteria est malus. Significat enim debilitatem toti stomacho communem aut multitudinem materiæ in toto stomacho incitantem ad vomitum, & ad secesum, & similiter significat omnes alias causas toti stomacho communes. Sextum, quando apparet in lubricitate intestinorum super costis aliquid simile ciceri, & prouocatur urina, & multiplicatur, morit æger in hora illa.

Cura lenteris si fuerit à medicina solutiua exigat quinque intentiones, prima, frangit audaciam medicinx & eam à corpore educit, secunda, humores diuertit, tertia confortat stomachum & intestina ne recipiant, nec non cor & mēbra nobilia, & cum hoc ductus & vias constringit, incrassat materiam, & tandem compingit, quarta accidentia corrigit, quinta, ordinat debitum regimen. Prima completur exhibendo aquam hordei, aut aquam calibeatam in potu in notabili quantitate etiam pluribus vicibus, & si apparent signa frigiditatis detur aqua passularum zucchari rub. uel mellis. Mucilago quoq; se. psilii, vel se. cydoniorum, & exhibitio olei omphacini uel sisamini, & similia optime valet, tum ad deponendum medicinam, tum ad frangendum eius acuitatem, & maxime si sit uenenosā, & debent dari in notabili quantitate & multoties, & possunt mucilagines cū aqua hor. permisceri, & similiter butyrum cum aqua ca. permixtum est in hac re præstantis iuuamenti, & ex similibus rebus fiant clysteria secundum necessitatem. Communiter tamen sufficiat aqua hord. uel aqua communis calida siue potata siue clysterizata, sed in clysteribus aliquid unctuosum, sicut oleum uel butyrū & similiter aliquid absterfium, sicut zuc. rub. permiscatur, & si per duas horas; post huiusmodi lauatiua dentur aliqua compressina, sicut succus cydoniorum, vinum granatorum, sorbium, & similia, & decoctio myrobolanorum optime confert ad deponendum medicinam. Secunda intentio completur cum diuersionibus, & proprie si medicina fluxum humorum excitauerit, ex quibus sunt ligaturæ supra cubitos multoties reiterandæ, nec non uentosæ spatulis applicitæ. Item frictiones, & lotiones brachiorum, sed uentosa magna stomacho applicita cibum in stomacho retinet. Tertia intentio completur cum interius & exterius applicitis, sicut

cum vnguentis emplastris ceratis epithematibus stomacho, & intestinis applicitis, nec non syrupis, electariis, & cæteris de quibus sermo præcessit in cura fluxus in vniuersali. Confortetur etiam cor cum exterius applicitis, & omnes hæc medicinx cōstrictiæ interius sumptæ, sunt etiam pro parte cordis constrictiæ & confortatiæ, sicut rob de acetositate citri de ribes & similes, & hepar confortetur cum stipticis claudentibus vias & ductus eius, per quos materia ad stomachū & intestina defertur. Recipiunt enim stomachus & intestina superfluitates, terè à toto corpore mediantē hepate, & tūdem apud magnam necessitatem compingendum & stupefaciendum est iuxta doctrinam superscriptorum.

Corrigantur accidentia iuxta quartam intentionem, & si militer debitum regimen ordinetur iuxta quintum sicut dictum est in cap. generali curationis fluxus. Similiter si lenteria fuerit ex cibus aut à quacunque alia causa primitiua illa remoueatur, & inducatur regimen contrarium.

Cura lenteris à phlegmate existente in stomacho exigat sex intentiones curatiuas. Prima digerit incidendo & abstergendo phlegma existens in stomacho cum oxymelle simplicis, oxymelle cōposito & squillitico apud maiorem necessitatem & melle ros. cum his mixto ad aliqualem confortationem, & aquæ sint sicut aqua menthæ, absinthii, aqua decoct. cinnamomi & similes. Sed esto memor paucam aquam cum syr. permiscere, ut puta tantundem aquæ ut melius adherendo abstergat. Secunda intentio est euacuatio cum pillulis alephanginis de hiera simplici stomachicis & non excedendū est in solutiuis fortibus quæ multum trahant à longinquis, ne stomachum debilitent & amplius de materia trahatur ad stomachum nisi illa materia à membris distantibus mitteretur, & tūc in eo casu possemus uti electario electop. si mitteretur à membris nutritiuis, & pillulis cochiis si à capite mitteretur, sint tamen in parua quantitate & cum quibusdam stipticis permixta stomachum confortantibus. Vomitus quoq; & proprie si ad ipsum æger inclinetur est præstans in melancholia, & proprie præcedentibus incisuiis & subtrahitiuis & abstergentibus, sicut sunt almuri & res salæ, & synapis, & cæpe decoctæ aut raphanum, & his succedant inuiscantia, sicut alagana in eadem mensa, & multum potet de vino satis potenti, & per horam post elaboret in vomendo iteratis vicibus imponendo digitum in ore, aut pennam oleo intinctam donec multum de phlegmate euomat. Tertia autem intentio est diuisio quæ perficitur secundum materiarum fluentiū exigentiam ad stomachum & membrorum a quibus fluunt, & hæc perficiatur ut sæpe dictum est. Quarta autem intentio scilicet confortatio & proprie retentiæ eius completur cum unguentis, emplastris, ceratis, sacculis, fomentis factis ex rebus calidis & stipticis odoriferis per uirtutem tertiam stomachum confortantibus, sicut est mastix, thus, gallia musc. absinthium, gariofli, spica, mentha, calamus aromaticus, iandani ex quibus possunt fieri composita permiscendo cum oleo de mastice, de spica, & similibus, & succo menthæ, vino odorifero, & paucis aceti, cera, pice, resina secundum exigentiam vnguenti aut cerati. Interius autē sumpta sint sicut thus mastix, diabolbanum, miua aromatica, syr. de mentha, diacoronitem cum mastice. Sed nota q̄ inter herbas mentha est præstantissima in stomachi confortatione & maxime hortulana boni odoris, & castoreum plus confortat ipsum ceteris carnibus, mastix plus ceteris gummis, galanga plus ceteris aromatibus, enula magis omnibus rad. cappares cōditi plus omnibus floribus, & cydonia plus omnibus fructibus. Quinta intentio est cura accidentium, pro quibus etiam recurre ad ea quæ dicta sunt. Sexta intentio ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium. Aer ergo declinet ad calidū & sic naturaliter, aut artificialiter, & cibi sui sint calidi, & sic incidentes abstergentes non stiptici saltem in principio sicut ex salatis cappares cum aceto conditi & paucis mellis. Et cape debite decoctum, & similia, cum aceto & melle, & paucis aromatibus condita aut cum zuc. rub. raphanū & porrum concedi possunt in pauca quantitate. Ex ferculis, brodium, cicerum cum mentha in eo minutim incisa. Item, radices petrosellini debite coctæ & præparatæ. Item, brodium caulium, & carnes ex ambus boni kimi & facili digestionis & ex saporibus synapismum, & piperata, & vinum antiquū

arom.

aromaticum uinolum aut mediocris potentia. In fine autem multa materia phlegmatica educta magis stipticis utendum est. Si fuerit mala complexio frigida & hu. sine materia unica intentione opus est, scilicet calefactione & exiccatione cum his quæ habent stomachum confortare sua stipticitate temperata aromaticitate & proprietate. Si uero uentositas fuerit in causa. Primo materia à qua eleuatur euacuetur iuxta modum præcedentis doctrinæ. Secundo uentositas carminetur cum his quæ etiam stomachum confortant, sicut est zingib. & ex maxime propriis est galanga, & diagalanga. Itē, castoreum, & diaciminum, & bacce lauri, & electarium de bacce lauri. Et si in causa fuerint humores calidi uomitu aut secessu educantur per eam, regionem quam magis natura taret. Et diuertatur iuxta modum generalem superius dictum, postea mala complexio eius alteretur cum frigidis & stipticis interius & exterius applicitis stomachum confortantibus, quorum copiam superius habuisti, & similiter seruetur regimen in cibo & potu. Si uero lienteria pendeat ab ulceribus, cura ex proprio cap. requiratur. Ex maxime autem conferentibus est succus plantagi. cum bolo ar. & maxime si adsunt signa caliditatis, his tamen postea addi thus, aut mastiche, existentibus signis frigiditatis.

Cura uero apostematum stomachi ex propriis capitulis requiratur. Et ex propriis potest patere causa fluxus chylosi accidentis merito nocumentorum stomachi & intestinorum. Cause enim intensæ de quibus supra quæ faciunt lienteriam remisse possunt facere chylosum, quare cura erit proportionalis supra scriptis. Cura uero lienteria ex debilitate contentiæ magis indiget siccis stipticis quam quæ ex debilitate digestiue, sed in caliditate satis parificatur. Vinum enim potens antiquum stipticum magis subuenit debilitati contentiæ ex causa frig. & hum. Vinum autem potens minus siccum & minoris stipticitatis magis subuenit digestiue ex simili causa. Et diabolianum est summe laudatum in defectu utriusque à causa frigida & hu. cuius est descript. y. olibani. 3. 4. pi peris, ameos spicis, keisim, id est leuistici, anisi, nigellæ. ana. 3. 2. balauftiarum drach. 4. mellis dispumati. q. s. misce. dentur de eo stomacho ieiuno drac. 3. pro uice, & taret prandium per duas horas. Cura fluxus stomachi sanguinei completur cum his quæ dicuntur in cura fluxus intestinalis, sanguinei ad quod cap. recurre.

De fluxu intestinali. Cap. 3.

Fluxus intestinalis est quadruplex, scilicet diarrhoeicus, lientericus, sanguineus, & dysentericus. De diarrhoea & lienteria satis actum est. fluxus sanguineus ab intestinis, de quo est hic sermo est fluxus sanguinis ab eisdem in notabili quantitate. Species non habet nisi forte quoddam modos secundum magis & minus differentes.

Cause sunt solutio unius aut plurium uenarum in intestinis, aut apertio orificiorum ipsarum, aut propter multitudinem extendentem, aut acuitatem corrodentem, & quandoque excoriatio aut ulcus intestinum paulatim se dilatans, profundans per eorum substantiam.

Signa distinctiua inter hunc fluxum sanguineum intestinale & fluxum sang. à toto, & fluxum sang. hepaticum, sunt manifesta ex dictis superius in fluxu sanguineo à toto. Et ex dicendis in fluxu hepatico satis in principio cap. ibi enim ponuntur sex signa distinctiua inter hepaticum & intestinale.

Prognostica. Hic fluxus sequens dilatationem orificiorum uenarum intestinum facile curatur, sequens autem fracturam absque corrosione & ulceratione difficulter, sed sequens ulcera & corrosiones difficillime, præcipue si fuerit in intestinis gracilibus. Dysenteria uero est fluxus uentris cum excoriatione aut ulcere intestinum à duobus quod difficultate significat & ερεσν intestinum quasi difficultas intestini. Isido. 6. Et y. Est autem excoriatio intestinum dolor abrasionis, siue abrasio dolorosa in superficie eorum intrinseca. Vlcus autem est solutio continuitatis eorum cum sanie. Et hæc ulcera & excoriationes frequenter fiunt in intestinis, in stomacho rarissime.

Species dysenteria sumuntur aut ab intestinis ipsis. Est enim quædam facta in duobus superioribus, scilicet duodeno & ic

iuo, quædam in duobus mediis, scilicet ileo & sacculo. Quædam in duobus inferioribus, scilicet colo & recto, & quandoque fit in extremitate intestini recti, & si est cum punctione grauiamine & conamine ad egerendum dicitur tenesmus, de quo posterius agetur. Quandoque species dysenteria sumuntur à solutione continui, & sunt tres.

Prima in qua educitur sanguis, pinguedo, siue potius uiscositas quædam, & est phlegma stagnans intestina. Secunda est in qua cortex intestinum educitur, & dicitur alcurat uel alcurati. Tertia in qua frustum seu pars intestini educitur. Et quælibet istarum, aut est recens sine sanie, aut antiqua cum sanie. Et quanto est maior & profundior, tanto plus de sanie educitur. Et hæc ulcera intestinum quandoque sunt munda à quibus sanies laudabilis emanat, quandoque sunt immunda, & corrosiua à quibus cum sanie, & propter ulteriore corrosione etiam sanguis emanat, & quæ sunt putrida à quibus uirus foetens emittitur. Et quædam propter antiquitatem tandem conuertuntur ad fistulas, & quædam adeo profundantur ut perferent intestina, & coe in uentre colliguntur, quod est deterius quod si simul uenter & intestina perforantur.

Cause autem sunt primitiua sicut medicina, uenosa solutua, aut non solutua, nec non cibi acuti. Corporeæ autem sicut humores, sed frequentius cholera cuiuscunque generis. Ex quibus ualde mala est prasinia, pefsimas, zinaria, & deinde frequentius post cholera est in causa phlegma salum aut uiscosum sua tenacitate cum separatur soluens continui, sed hoc magis in intestino recto. Tercio loco est melancholia adulta cuiuscunque generis, & sanguis acutus & hi humores excoriantes quandoque sunt paulatim in intestinis congesti, sed secundum plurimum sunt aliunde deriuati. Et cholera transiens per intestina penes Auic. secundum plurimum excoriatur infra 5. dies, humor uero phlegmaticus in uno mense. Melancholicus in 40. diebus, licet frequenter in prima aut secunda die quilibet istorum excoriet. Sanies quoque catarrhi & quicunque alter humor acutus ad intestina deriuatus est in causa. Et quandoque causa excoriationis est toxica, & proprie in extremitate intestini recti, & causat tenesmus. Alii quando causa ulceris est apostema quod in intestinis rumpitur.

Signa. Prognostica dysenteria & fluxus sanguinis ex uentre sunt cum præcesserit hyems sicca septentrionalis & succedit uer pluuiosum & æstas pluuiosa. Similiter quando hyems est austrina & uer boreale pauca pluuia, succedunt enim fluxus propter multiplicationem catarrhorum. Et multiplicatur fluxus in regionibus meridionalibus cum exsiccationibus austrinis multitudine pluuia.

Signum demonstratiuum commune omnibus dysenteria est, quia sanguis pinguedo, siue phlegma stagnans sanies, cortex, aut frustum intestini educitur, aut solum, aut cum fecibus ex aliis humoribus permixta, & est cum punctione & dolore notabili in intestinis, & per hoc sanies & sanguis ab intestinis distinguitur à sanie & san. proveniente à membris superioribus, cum ille sit sine notabili dolore intestinum. Et in intestinali sanies & sanguis ueniunt paulatim, & secundum continuationem & permixti cum fecibus nisi uena soluat aut orificium eius aperiatur, aut apostema in intestinis subito rumpatur. In hepatico autem & communiter in aliis fluxibus ueniunt in quantitate notabili & interpolate & non permixti, immo primo foetor emittitur & succedit sanguis aut sanies, & sunt nocumenta manifesta in hepate & in aliis membris quæ præcesserunt. Et in intestinis non est nocumentum manifestum. Et cum exit sanguis ex excoriatione intestinum paulatim incipit & agendo procedit nisi soluat pena, & est cum febre continua. Cum uero uenis ex hepate & membris superioribus communiter uenire incipit in magna quantitate cum interpolatōnibus, ut dictum est, & communiter omnis paroxysmus est deterius & manifestior præcedente, nisi cum uentum est ad declinationem.

Signa causarum primitiuarum sunt ipsæmet cause primitiue, scilicet melancholia aut cibi mali qui præcesserunt. Humores cognoscuntur per colores suos. Phlegma enim colorem habet album & est eius euentus cum rugitu à uentositate, sed materia falsa baurachia distinguitur à crassa uiscosa sua uiscositate separante pelliculas, quia phlegma salum est subtile.

subtile: hoc uero crassum cōglobatum, & hoc crassum habet albae siue pelliculas sibi adherētes, salsum uero nō, & cū hoc crasso sentitur grauitas & dolor manifestus aliquo tēpore qui non permittitur. Cholera autem cognoscitur per colorem suū citrinum, aut rubrum, aut uiridem attestantem colori prasi siue succi eius aut colori succi fol. porri si fuerit prasiina aut colorem uiridem magis clarum attestantem erugini æris si fuerit zinaria, & est sequorū accidentium, & aliquādo cum syncope. Sed melancholia habet colorem magnum & magis lucidum, quæ genita est per aduersionem, & magis nigrā quā quæ est genita per congelationem. Sed melancholia naturalis habet colorem fuscum, & habet odorem ponticum & acré, & genita per aduersionem melancholia naturalis habet odorem acetosum cum ponticitate, & genita per aduersionem cholerae habet odorem acetosum cū amaritudine, & genita per aduersionem phlegmatis habet colorem mixtum cum albo & nigro, & per aduersionem sanguinis permixtum ex rubeo & nigro, & dolorem habet dulcem tendentem in acetosum, & genita per aduersionem cholerae & melancholice sunt cum accidentibus suis. Et hæc duæ species ebullunt super terram, sed magis genita est melancholia, & fugiunt ab eis mufcæ. Apoptemata eorum cognoscuntur per tumorem, duritiē, grauitatem, dolorem continuum in ipsis intestinis & similia, & cum rumpuntur sanies subito profuit in magna quantitate, nec absoluitur æger à feb. cōtinua. Et cum est excoarctatio ex duritie fœcis cognoscitur cum aliquid sui egreditur cū absentia aliorum signorum, & sedatur dolor cum lenitate uentris. Et multoties egreditur succus fœcis ex force iam dura, & exilimatur quod sit fluxus uentris, & constringitur, & in hoc est mors & perditio ægri. Et distinguitur ab alijs fluxibus per colorem, & ex longa fœcis retentione, & ex uentris tumore cum duritie. Et cognoscitur esse in duobus superioribus, quia dolor est supra umbilicum & multus fortis, & stomachus multum læditur, unde fit frequens uomitus, nausea, & subuersio, & singultus, & hepar compatitur maxime si sit in ieiuno. Et egestio nō egreditur post dolorem inchoatum cum oporteat eum transire per plures intestinorum reuolutiones antequam egrediatur, & est cum notabili quantitate sanguinis. Et pelliculæ inde egredientes sunt minores & tenuiores. Et habent sanguis, sanies, & pelliculæ maiorem cū fœcibus permixtionem. Et quod egreditur si saniosum est, est magis fœcidum & chylosum habet admixtum. Et frequenter assimilatur aquæ carnis. Et cum est in duobus inferioribus omnia sunt his contraria, & dolor est infra umbilicum. Et multoties sanguis & sanies egreditur ante fœces, & proprie cum est in recto & in extremitate eius. Et cū est in duobus medijs omnia medio modo se habent, & dolor est circa umbilicum. Species dysenteriae secundum maiorem & minorem profunditatem cognoscuntur per exuentia. Nam in prima specie egreditur sanguis & mucositas. In secunda specie pelliculæ. In tertia cortices intestinorum crassiores. Et hæc maxime descēdunt & manifestantur in clysteri lauatiuo. Sed ulcera per saniem cognoscuntur, & cum sanies est laudabilis, tunc ulcera sunt munda, cum uero mali coloris fœtens, tunc ulcera sunt putrida, & cum saniei sanguis associatur cum dolore tunc sunt corrosua, & cum ulcera sunt multæ saniei & sine dolore, tunc sunt fordida, & distinguuntur à putridis, quia putrida sunt cum dolore & fœtore. Et si est ulcus canerosum uirus suum declinat ad nigredinem, & præcessit fluxus melancholicus. Et si est cancer sunt signa eius præter signa apostematis. Et si ulcus fistulatur est sine dolore & egreditur uirulentia subtilis, cuius exitus interpollatur.

Prognostica. Primum, ulcera & excoriaciones quæ sunt in intestinis gracilibus, sunt multum suspecta ad mortem. Et proprie ea quæ sunt in ieiuno intestino propter multitudinem uenarum eius crassitatem earum & subtilitatem corporis sui, & cursum cholerae puræ ex felle ad ipsum, & propter propinquitatem eius in membro regali, idest hepate, est enim ceteris intestinis sibi propinquius, & quia medicina non permanet super eo, immo quamprimum propter cholerae mordicationem lubricat ex eo. Quæ uero sunt in intestinis crassius secundum plurimum salua sunt. Secundum prognosticum. Fluxus à cholera prasiina malus, et eruginosa. Sed qui ex humoribus minus malignis secundum plurimum salubris. Quæ

uero ex melancholia adusta quæ sparsa super terram ebullit & habet odorem acetosum mortalis secundum plurimum, esto quod uirtus sit potens, & proprie cum est incipiens iuxta aphorismorum. 24. quartæ particulæ. Dysenteria si ex felle nigro inchoauerit mortale. Significat enim cancerum ulceratum aut ulcus canerosum. Et sequitur. Quibuscumque in ægritudinibus acutis, aut multi temporis aut aliter extenuatis fel nigrum sursum aut deorsum exierit, sequenti die morietur, idest parum post, hæc omnia intelligantur secundum plurimum esse uera, quia si mutantur in bonum & naturales superfluitates admixtas habuerint est bonum, ut uult Gal. Si uero melancholia non fuerit ualde maligna, potest esse crisis, aut terminus alicuius ægritudinis, duæ enim sunt species melancholice per aduersionem genitæ ualde malignæ, scilicet quæ sit per aduersionem cholerae, & est subtilis redolens amaritudinem. Altera per aduersionem melancholice, & est crassior & redolet acetositatem siue acridinē, & ab utraque fugiunt mufcæ. Et utraque sparsa supra terram ebullit, sed magis ea quæ redolet acetosum. Tertium prognosticum. Quando perforantur intestina, & proprie gracilia est mortale omnino. Si uero crassa perforentur nō omnino mortales, immo quidam uiuunt in quibus post perforationem intestini apostemat uenter, & rumpitur, & fœces, & uermes, per foramina egrediuntur. Et secundum plurimum egreditur ex intestino aliquid saltem aliqua notabilis quantitas moritur æger, etiam si sit de crasis, quāto magis ex subtilibus & proprie ex ieiuno, nam statim communicat stomachus & hepar, nihil in stomacho retinetur & cadit uirtus, & non absoluitur à dolore continuo usque ad mortem. Quartum prognosticum. Fluxus sanguinis puri in quantitate post dysenteriam ualde malus, significat enim profunditatem excoriationis, ita ut uenæ scindantur. Quintum. Cum sit egestio similis aquæ postea similis unguento malum. Sextum. Post hydropsim egestio sanguinolenta mortale proprio perseuerans, non enim educitur materia hydropisis sed quæ uirtutem debilitat. Septimum prognosticum. Spasmus, uomitus, & singultus, cōturbatio rationis post dysenteriam, imò post omnem fluxum, mortem significat. Octauum, est inuentum in libro secretorum Hip. si habenti dysenteriam appareat post aurem sinistram res nigra similis orobo, & cum hoc accidit sitis uehemens, moritur æger in secundo die. Nonum. Quandoque congelatur aliquid sanguinis effusi in uentre rupto intestinis significatur per frigus extremitatum subito inflatione uentris, casum pulvis & syncope. Si autem hic sanguis congeletur in intestinis accidunt hæc accidentia, sed remissa. Decimum. Ulcera & intestinorum excoriatio quandoque ducunt ad hydropsim. Undecimum. Quando post alchurat, idest frusta subtilia intestinorum egreditur sanguis plurimus, significat quod ulcus profundatur, & ægritudo fit fortis, & finitur id quod est in superficie intestinorum, & peruenit ad profunditatem substantiæ eorum, quod si ante alchurit & excoriationem fluxus sanguinis præcedat, difficile est cognoscere an sit ex intestinis, an ex membris frigidioribus, cum quandoque ex intestinis egreditur sine punctione à dolore notabili, & etiam cum periodicis. Sed tamen discernitur quia intestinalis est, aut permixtus cum fœcibus, aut præcedit eas, scilicet quando est ab intestino recto & sphaeteri. Hepaticus autem & qui est ab alijs membris supra intestina communiter subsequitur, & hic est minus timendus, quā quando præcedit alchurat uel excoriatio. Duodecimum. Si causa dysenteriae simul expellitur cum alchurit, tunc excoriatio est in uia additionis propter inseparabilitatem causæ. Quod si abscindatur causa & solum alchurat expellitur, res tutior est, & melius de salute sperandum est, & soli excoriationi intendendum est, cum in primo casu simul excoriationi & causæ sit intendendum.

Cura fluxus intestinalis quæ dicitur diarrhæa. Aliorum humorum præterquam sanguinis sufficenter supra posita est. Et similiter fluxus cibalis quæ dicitur lienteria. Superest enim ut curemus fluxum sanguinis ab intestinis sine excoriatione qui prouenit à dilatatione orificii alicuius uenæ, uel plurius, aut ex ruptura earum. Et secundo curemus fluxum sanguinis ab excoriatione prouenientem. Et tertio dysenteriam & ulcera intestinorum.

Cura

Cura primum exigit quinque intentiones. Primo sanguinem diuerit. Secunda, causam fluxus remouet. Tertia ipsum sanguinem constringit. Quarta, corrigit accidentia. Quinta, ordinat debitum regimen sex rerum non naturalium.

Prima intentio perficitur cum phlebotomia basilica si hepar fuerit in causa. Si autem in causa fuerit retentio mēstruorum, aut hēmorrhoidarum phlebotometur saphenæ, & si in causa sit repletio in toto phlebotometur uena communis. Secunda intentio, si causa fuerit cholerica permixta cum sanguine est ipsius euacuatio fienda cum his quæ sanguinem cōstringunt, sicut. 3. 2. rhabbarbari aliquantulum correfacti cū aqua plantaginis, aut aqua calibeata sumptæ, & mirabolani citrini sunt ad hanc intentionem, & si in causa fuerit aquositas sanguini permixta sumuntur mirabolani Kēbuli cum uirtute turbith. Tertia intentio constringens sanguinem finentem perficitur cum bolo armeno, lapide emathitis, Karabe, acatias, sang. drach. Trochisci de charabe, de terra sigillata exhibitis cum succo plantaginis, aut syrupo de myrto si fuerit in intestinis superioribus, aut cum eisdem clysterizatis si fluxerit ab intestinis inferioribus aut cum utrisque si fluxerit ex mediis. Quarta intentio requiratur superius in cap. generali. Et similiter quinta quæ est debitum regimen. Si autem fluxus sanguineus fuerit ab excoriatione curetur ut supra dictum est, & cum hoc attendatur excoriationi & ulceri cum his quæ statim dicuntur. Non enim bonum est in singulis capitulis eadem replicare. Cura dysentericæ quæ secundum plurimum pendet ex materia ab aliis membris ad intestina deriuata nouem exigit intentiones. Prima, causam remouet. Secunda, intestina ab humoribus in ipsis dolorem generantibus mundificat. Tertia, diuerit. Quarta, regit membrum mittens. Quinta, constringit & cum hoc intestina excoriata consolidat. Sexta, si fuerint ulcera ipsa mundificat. Septima, ipsa consolidat. Octaua, corrigit accidentia. Nona, ordinat debitum regimen, pro quibus duabus ultimis recurratur ad capitulum generale.

Prima intentio perficitur corrigendo aerem, prohibendo cibos, potus, & medicinas ipsius factiuas, & fortuias, & corrigendo quasque causas primitiuas siue corporeas huius fluxus dysenterici. Sed quia multitudo aut malicia humorum secundum plurimum est in causa inchoandum est ab eorum euacuatione. Si ergo fuerit sanguis in causa, aut alii humores cum sanguine peccauerint incipiendum est à phlebotomia saphenarum si in causa fuerit retentio sang. hēmorrhoidalis aut menstrualis. Et si in causa fuerit hepar ipsum multiplicans, aut sua caliditate ipsum adurens & inflammans phlebotometur basilica aut saluatella dextra, & si in causa fuerit splen basilica aut saluatella sinistra, & si fuerit repletio in toto nō facta propter aliquod mēbrū de supradictis phlebotometur uena communis, & hauriatur quantitas sanguinis secundum quod exigit repletio uirtus & cetera, à quibus queritur licentia in phlebotomia. Si uero alii humores sanguine educto super fuerint, aut forte ipsi absque peccato sanguinis fuerint in causa, educantur etiam iteratis uicibus cū his quæ non sunt exoluentia, immo aliquod uestigium stipticitatis derelinquant, de quibus in cap. generali curationis fluxus dictum est. & si pro his euacuationibus complendis opus esset digestionem, digerantur humores secundum plurimum cum his quæ incrassant & inuisant & stipticant calidis aut frig. secundum complexionem & humorum exigentiam confortantibus membra nobilia & proprie nutritiua per uirutem tertiam de quibus supra in cap. generali dictum est. Secunda intentio, scilicet mundificatio intestinorum & doloris sedatio completur cum his quæ dicta sunt supra in secunda intentione regiminis fluxus uniuersalis. Et similiter completur tertia, quarta, & quinta, sicut supra dictum est in eodem cap. generali.

Sexta intentio, scilicet excoriationis & ulceris mundificatio perficitur cum infra scriptis medicinis. Si quidem excoriatio fuerit superficialis & cum signis caliditatis sufficit clystere ex aqua hordei. 3. 1. olei ro. 3. 3. adipis renū capræ. 3. 2. & repidum sicut lac nouiter emulum imponatur, sed maior existente caliditate his addantur. 3. 2. succi plantagi. aut succi portula. Si uero fuerint in intestinis superioribus bibantur aquæ hord. medicinalis. 3. 6. aut circa debite calidæ stomacho

ieiunio, & huic pro stomachi cōfortatione possit addi iulep ros. pro tertia aut quarta parte. Si uero excoriatio profundior & cum pauciori caliditate cum apparentia alicuius saniei aut phlegmatum uiscosorum supra scriptorum, possunt addi. 2. 3. mellis ros. & si ulcus esset profundius cum eductione phlegmatis uiscosi acuti aut saniei crassioris fiat clystere ex aqua mellis 3. 1. 5. melle ros. 3. 3. & dimittantur oleum & adeps. Si uero esset ulcus putridum cum sanie fetente clysterizetur cum 3. 1. 2. aquæ salitæ, aut aquæ piscium salitorum, aut aquæ oliuarum conditarum, & addi possunt. 3. 3. mellis ros. sed melius est oximel simplex, melius tamen est ut prius temperetur clystere ex tribus partibus aquæ hordei & una parte aquæ salitæ & gradatim procedatur in acuitate, & clystere ex urina factum est ad hanc intentionem efficacius. Trochiscis autem de arsinico non auderem uti nisi in modicissima quantitate & in forti & carnosio, & in intestinis crassis inferioribus, & in eo qui non est ualde acuti sensus, neque febriens faciendo clystere paruum, ut. 3. 8. trochiscorum de arsinico. 3. 1. misce. Descriptio trochiscorum de arsinico, & est uatici. 3. arsinici. sandaracæ. ana. 3. s. calcis uiuæ. 3. 3. chartæ bombacinæ combustæ, acatias, ana. 3. 1. fac puluerem, & cum succo arnoglossæ fac trochis. 3. 1. Trochisci Auiæ. 3. sumach, capitum granatorum, & succo eorum balaustiarum, idest florum granatorum agrestium, licet moderni balaustias pro cadico granatorum accipiunt, & sunt capita granatorum interiorum, acreste, chalcacchi, colcotar. ana. 3. 1. & sunt duæ species uitrioli, aris uiti, antimoni, flor. aris. ana. 3. 5. sunt trochisci cum succo plantaginis, & sunt ualde fortes, & experiatur primo cum. 3. 1. in aqua hordei, uel lacte, quidam tamen his trochiscis addunt opium ut dolor confurgens ex tro. mitigetur, sed non ponatur ultra duo grana aut tria pro quolibet clysteri. Et quidam ante impositionem clysteris supra scripti stupefaciunt cum lychinio aut clysteri opiato, ut deinde clystere corrosiuum sequens primo educto possit facilius tolerari sine dolore, & est melius. Sed obserua in impositione huius clysteris conditiones supra scriptas. Si uero sit ulcus corrosiuum quod distinguitur à putrido, quia procedit corrodendo substantiam ipsorum intestinorum, ita ut post saniem, aut simul cum sanie sanguis egredietur, non autem procedit putrefaciendo, & non est cum eo fetor sicut in putrido. Curetur tamen frigidis stipticis sicut cum succo plātæ, cerussa, tuscia, & similibus cum clysteri iniectionis. Et si non sufficiat clysterizetur cum aqua aut succo planta. 1. lib. in qua etiam bullierit aluminis de rocha. 3. s. usque ad consumptionem quartæ partis, & tepidum imponatur. Et si dolorem fecerit sedetur cum clysteri ex lacte & oleo ro. cui apud necessitatem addatur trochiscorum de Karabe opiatorum. 3. 1. Septima autem intentio, scilicet ulceris consolidatio perficitur si ulcera fuerint cum caliditate cum thutia, cerussa, lythargirio, spodio, bolo ar. sang. drac. tragacantho, gūmi arabico, succo plantaginis, & similibus. Cuius pulueris accipiantur. 3. 3. & dissoluantur cum succo planta. aut aqua calibeata quæ sit lib. 1. aut plus, aut accipiat aliquam decoctionem constrictiua ex supradictis in cap. generali, sicut quæ fit ex ros. myrto floribus tasi barbasi, copul. glandium, milio aut hordeo torrefactis & similibus. Neque in istis ponatur adeps aut oleum nisi quantum esset necessarium pro mitigatione doloris. Et si esset ulcus cū signis frigiditatis, pulueres possint in clysteri sint thus, sed melior est cortex thuris, myrrha, sandaraca, litium. Et decoctio fit facta ex cyperis, nucibus cupressi, myrto, & similibus, in aqua ferrata. Si autem ulcus sit in intestinis superioribus, facta mundificatione, non quidem cum corrodentibus, sed cum aqua hordei, aut aqua mellis, de quibus supra consolidetur. In causa calida cum succo planta. 3. 1. boli ar. 3. 1. quæ medicina bis in die exhibeatur stomacho ieiunio, & non falsi. Si uero fuerit cum signis frigiditatis accipiatur succi plantaginis 3. 1. boli armenii, thuris, mastiches, ana. scrupulum unum, aut huiusmodi pulueres sumantur cum aqua calibeata aut uino ferrato, aut exhibeatur uinum, & aqua calibeata infusionis, thuris, mastiches, tragachanti, macis, gariophi. & similia. Pro reliquis duabus intentionibus recurratur ad capitulum generale fluxus ut dictum est supra. Et hæc de cura dysentericæ sufficiant.

De

De tenesmo, & est fluxus ab intestino recto. Cap. 4.

Tenesmus; immo potius *τεναςμός* græce, idem sonans quod gemitus latine. Dicitur à *τενάξω* uerbo græco idem quod gemo significante. Est descriptiue ex pressio intestini recti cum gemitu & conamine ad egerendum facta ab expulsiva stimula à causa præternaturali lædente ipsum aut extremitatem eius.

Prima distinctio, tenesmus est duplex, uerum & non uerum. Verum est à causa corporea affixa substantiæ intestini recti aut extremitatis eius. Non uerum autem est quod fit à causa incorporea, aut incorporea non fixa in substantia intestini recti, aut extremitatis eius, sicut à selsione super lapide duro, aut frigiditate extrinseca, aut à fœce dura, aut à materia fluente per intestina & anum, quæ non figitur neque inuisatur in intestino recto aut extremitate eius.

Secunda distinctio, quoddam est purum, & est absque materia quæ sit causa eius, quoddam impurum, & est cum materia quæ existit causa eius & manifestum est quod huiusmodi distinctiones non coincidunt.

Causa est duplex, corporea, & incorporea. Corporea est duplex. Aut propria in eo existens. Aut superioribus effusa. Propria est materia cholericæ in eo imbibita pungens & stimulan, aut phlegmatica adhaerens & inuisata, quæ per purgationem aut paucæ cholericæ admixtionem, & acquisiuit acuitatem salsedinem & baurachitatem, sicut est phlegma putridum aut salsum quæ materia grauat aut pungit, aut melancholia adusta, aut sanguis acutus, uel est apostema calidum aut durum grauas quod putredinem acquisiuit, aut sua uirulentia resudante molestans, aut ulcera corrosiua, fistulæ, hæmorrhoidis occultæ & ragadiæ. Sed à superioribus effusa est duplex. Aut materia acuta sicut humores, sanies, & similia fluente per intestinum rectum sicut accidit in fluxibus. Aut est fœx sicca dura exasperans, quæ in incessu suo pungendo & grauando stimulat intestinum ad expulsionem. Nonnunquam uentositatis est causa tenesmi pungendo & stimulo extrematatem recti. Incorporea autem est res extrinseca in frigidans intestinum rectum, sicut aer frigidus obuians ano discooperto, aut aqua frigida cum homo stat in ea, aut selsio super lapide duro frigido lædente contunden-do & in frigidando. Est autem confusio species solutionis continuitatis. Similiter mala complexio calida siue materia multum excedens. Et quæcunque causa impressa sit potest esse in causa, licet de raro sit. Reliquæ quoque medicinx remanentes circa sifterim stimulo est causa tenesmonis. Similiter clystere acutum aut suppositorium, & introitus cimicis in anum, & uermes ad ipsum provenientes. Cibi quoque acuti & salsi maxime uiscosi possunt esse in causa aut immediate si secundum aliquam eorum particulam in ano recti sint aut mediate fœce ex ipsis genita. Tenesmus autem frequentius euenit à frigiditate siue materia quam à calore quia intestinum rectum facilius alteratur à causis in frigidantibus communiter occurrentibus quam à causis calefacientibus, quia in habentibus symbolum facilius est transitus. Est autem complexio intestini naturaliter frigida, tum quia frigiditas est magis sibi disconueniens, sicut & cæteris membris frigidis, iuxta 18. aphorismum. 5. particulæ. Frigidum inimicum neruis &c. Mouetur autem natura ad huiusmodi frigiditatis & reliquorum nocentium expulsionem contrahendo musculos uentris comprimendo intestinum rectum, & ipsum extendendo, & anum dilatando, & huiusmodi nocitiua per anum educantur, quamuis non sit possibilis ipsius frigiditatis educio cum sit res immaterialis. In hoc enim natura decipitur credens id nocitum esse rem materialem educibilem cum non sit, sicut etiam decipitur in tussi & nausea, & sternutatione à causa immateriali pendentibus.

Signa communia cuiusque tenesmi sunt subitum desiderium & conatus ad egerendum cum expressione recti intestini, & extensione, & anaperitione, & si quid egreditur in principio est modicum pingue & uiscosum. Deinde apparet puncta sanguinis parua. Deinde plus de san. non ualde permixto cum reliquo quod egreditur. Est enim communiter illud quod est in immateriali egreditur multoties quadam,

& phlegma stagnans intestinum rectum uiolenter propter multum conatum expressum. Apparet autem puncta sanguinis parua propter separationem phlegmatis stagnantis à fœce intestini recti. Deinde apparet plus de sanguine illo phlegmate profundius euulso cum aliquali excoriatione, hæc autem quæ dicta sunt de eo quod egeritur sunt propria signa tenesmi ueri. In non uero enim pendente à causa primitiua quoadque nihil egreditur, & in pendente à materia desuper effusa secundum plurimum multum egreditur, sicut accidit in fluxibus. Distinguitur etiam uerum à non uero ex punctatione pruritu pondere fere continuo in uero. In non uero autem cum maiori interpolatione distinguitur purum siue immateriale ab impuro siue materiali quia in puro præter materiam, de qua supra fere communem omni tenesmo nihil egreditur, sed in materiali præter superscripta secundum plurimum egreditur aliquid de materia quæ est in causa. Cognoscitur autem materiam esse à superioribus influxā, quia primo præcessit fluxus illius materiæ, postea secutum est tenesmus. Et crescit tenesmus cum materia illa per intestina descendit, quæ euacuata cessat aut minuitur tenesmus, & nunquam redit aut crescit nisi noua materia descendente. Sed ubi materia non sit in fluxu, immo sit solum affixa aut inuisata in intestino recto ad sunt signa contraria & accidentaria tenesmi sunt magis uniformiter continua. Sed materia cholericæ cognoscitur ex regimine præcedente multiplicante cholera, & ex signis domini cholericæ in corpore ægri. Item ex punctatione percepta in recto & ano, & ex euita sunt citrina uel citrinitati admixta. Et quia à mundificandis cholera & alterantibus iuuatur, & multum calidis manifeste læditur. Et si phlegma salsum fuerit in causa cognoscitur ex præcedente regimine multiplicante phlegma & cholera subdominantur cum circumstantibus similibus. Secundo ex signis domini phlegmatis falsi. Tercio ex pruritu percepto in loco & exeuntibus phlegmaticis. Quarto iuuatur calidis anodinis & humidis abstergentibus, de quibus infra, & à contrariis læditur manifeste. Et si melancholia sit in causa aut sanguis acutus ad sunt signa sibi propria nonalia quæ ex dictis facile comprehendere possunt. Et si apostemata sit in causa, sentitur grauedo & dolor continuus & magis apud emissionem stercoris, & non euacuatur à febre, & exeuntia difficile emittuntur, & quandoque egreditur uirulentia etiam ab aliis exeuntibus distincta & impermixta. Iuuatur mollificantibus & anodinis, & à contrariis læditur. Quod si pendeat ab ulcere, corrosione, aut ragadiis præcesserunt causæ ulcerantes & corrodescentes scilicet humores acuti, uel forte apostema antea fuit ruptum, uel præcessit dysenteria, aut fluxus eruginosus prasinus niger felleus uel phlegmatis falsi, aut medicina ulceratiua exhibitæ fuit, sicut euphorbium, colocynthis, & similes. Vel forte sumpsit aliquando rem duram acutam indigestibilem, ut uitrum & similia. Vel præcessit immisio clysteris, cuius cannula fuit acuta uel immisio collyrii acuti aut nimis crassi, & sentitur ardor in loco continuus, maxime in egestionibus, & sanies, & putredo forte egrediuntur iuuatur lauandis, & acutis mordentibus. Quod si pendeat ex hæmorrhoidibus occultis & intrinsecis sanguis niger apparebit à cæteris exeuntibus distinctus, & reliqua signa hæmorrhoidarum, de quibus infra. Quod si pendeat à fœce dura præcesserunt causæ uentrem constipantes, & paucitas egestionis, exasperatio circa anum percepta ab humidis & lubricis iuuatur, læditur à contrariis. Quod si fuerit ex frigiditate præcesserunt causæ in frigidantes, sicut statio in aquis & discoopertio ani aeri & uento frigido, & selsio super re frigida sicut marmor, & proprie mensibus eratis, siue tempore frigido, sensus obtusus, & frigus in loco perceptum, & à calidis iuuatur, nocetur à frigidis, & signa sunt contraria si accidat à caliditate immateriali. Quod si pendeat, à uentositate adest præsentia uentositatis in intestinis, maxime in recto, quæ perueniente ad extremitatem recti fit tenesmus, & exeunte remouetur. Causæ uero primitiue reliquæ sicut medicinx reliquæ aut cibi acuti declarantur ex ipsarum præcessione & tenesmonis subsequencia. Introitus autem cimicis in anum aut uermes in ipso existentes declarantur ex titillatione, & commotione in ano sensata.

Prognosticum. Primum tenesmus secundum plurimum Io. Arculani d. cura.

curatur. Secundum tenefmus aliquando prouocat abortum.

Cura tenefmi materialis absque apostemate quinque exigit intentiones. Prima, prohibet causam antecedentem si qua sit ne transeat in coniunctam. Secunda, materiam coniunctam resoluit & abstergit. Tertia, malam complexionem in intestino derelictam alterat ipsum confortando. Quarta, corrigit accidentia. Quinta ordinat debitum regimen. Prima intentio completur euacuando, diuertendo, sistendo, materiam antecedentem cum his quæ dicta sunt in cura fluxus in generali. Secunda uero scilicet resolutio & mundificatio causæ coniunctæ imbibitur aut inuiscatur in recto completur cum clysteribus, collyriis, emplastris, unctionibus, facculis, fomentis, felsenibus diuersificandis secundum exigentiam materię. Materia ergo existente cholericæ fiat clystere ex aqua hor. 3. 10. olei uio. 3. 3. uirellis ouorum duobus zuc. ru. 3. 1. postea his addes. 3. 3. mellis uio. aut. 3. 1. s. floris cassiæ, & si fuerit magna caliditas, pone olea in frigidantia sicut nenupharis, mandragoræ, aut papaueris, aut aquam, aut suc. nenupharis, semperuiuæ. Sed in phlegmatica clysterizabis cum aqua mellis, & oleo sisamini, aut decoc. furfuris & hordei, cui addes oleum sisaminum, & mel ros. & si propter maiorem inuiscationem, opus fuerit magis abstergentibus clysterizabis cum aqua mellis, & aqua parum salita. ana. 3. 4. aut loco aquæ salitæ ponatur aqua oliuarum parum salitarum, aut succus blitis, & cum similibus curari potest sanguinea & melancholica, hoc præmissis quod si isti humores sint adusti aut acuti ualde cum mitioribus procedatur. Et nota quod clysteria communiter debent esse pauca quantitatis, ita ut sufficiant. 10. aut. 12. 3. non enim opus est ut transeant ultra intestinum, rectum, & cum hoc melius retinentur, & melancholia adusta clysterizari potest cum aqua decoc. hor. & mellis. an. 3. 6. post sunt addi olei uiol. aut sisamini diu ducti in mortario plûbeo. 3. 4. & nota quod sisaminum & oleum eius cataplasmatum & clysterizatum est in his dispositionibus proprium. Collyria autem fiant in cholericæ ex litui, croci ana. 3. 1. s. cerussæ. 3. 3. quæ pulverizata misc. cum. 2. 3. adipis renum capræ dissolutæ & in melancholica addatur plumbum uisum & adeps cancrorum, al. capræ, & sint collyria longa usque ad 7. digitos, uel supra & intincta in oleo uio. tepido cum supponuntur. Sed in phlegmatica fiant collyria ex bdellio, croco, ana. 3. 2. laudano. 3. s. adipe gallinæ & cera. ana. q. s. hæc enim dolore leniunt & dissolunt, & sunt experta. Fomenta uero fiant in cholericæ ex decoct. uiol. ros. myrti fenug. se. li. mal. melilot. rad. altheæ, sisami chamomillæ, & similia molliciantium & resoluentium & partim in frigidantia. Sed in phlegmatica his addatur fumus terræ, lapacium parietaria, absinthium, & similia, & minuuntur fri. Hæc autem fomentationes fiant cum spogia, filtro, lana, uel cotto quæ in his decoctionibus infusa & expressa debite calida sæpe applicentur ano & partibus circumstantibus, & in melancholica addatur epithimum. Sessio quoque in huiusmodi decoctionibus mirabiliter confert ad sedandum tenefmum. Et ex his possunt fieri facculi qui in aqua ca. infusi & expressi sæpe applicentur ano & partibus adiacentibus, etiam facculus & fursure debite calefactus est proprius phlegmatica. Et possent fieri unguenta in calida cum oleo ros. loto, cum aqua nenupharis & adipe gallinæ siue renum capræ lota cum aqua frigid. pluries, sed in frigida cum oleo sisam. & adipibus prædictis, & si fuerit superficialis excoctio his adde cerussam lotam, & ungatur anus interius quantum est possibile. Quod si tenefmus ualde fuerit molestus aliquando supponatur collyria siue lychinia descriptio ne Alman. Recipe thuris, litui, croci, gummi arabici. ana. 3. 1. opii. 3. 2. formentur lychinia aliquantulum longa subtilia incorporando pulueres prædictos cum albumine oui, & suspendantur bene ut possint ad libitum extrahi, non enim dimittendi sunt nisi per horam. Et replicentur secundum opportunitatem. Et si intentio esset consolidare, somnum prouocare, fluxum stringere potest uti lychinio ochel. Recipe sanguis draconis, boli arme. cerussæ abluta cum aqua ro. ana. 3. 2. masti. 3. 5. opii, hyoscyami, croci, ana. scrupulum unum, croci gra. 3. 1. & cum uino stiptico fiant lychinia, aut cum albumine oui, & nalet in causa calida, sed in frigida castorei, thus, crocus, & litium cum opio misceantur secundum exigentiam. Et si uis lychinia nõ opiat. Reci. masti. myrrhæ, sandaracæ, thuris,

ana. 3. 1. litui, laudani, ana. 3. s. cerussæ, sanguis draconis, ana. 3. 1. pulverizentur, & cum uino fiant lychinia. Et hæc eadem sine opio sufficient ad complendam tertiam intentionem si sibi addantur aliqua stiptica calida aut frig. secundum exigentiam dyscrasie corrigendæ.

Pro complenda autem quarta intentione maxime corrigendæ sunt uigilia, ardor, dolor, & punctio, quæ omnia optime sedantur cum lychiniis supra descriptis & cæteris de quibus supra, pro his etiam accidentibus corrigendis recurratur ad capitulum generale curæ fluxus.

Regimen uero sex rerum iuxta quintam intentionem declinet in tenefmone cholericæ ad frigidum, & sit temperate stipticum stomachi & membrorum naturalium confortatiuum si per compulsionem aliquod eorum debilitatum fuerit. In tenefino autem phlegmatico declinet parum per ad calidum, aut sit temperatum in actiuis similiter moderate stipticum & membrorum naturalium confortatiuum. Sed in melancholico ad frigidum & humidum. In sanguineo ad frigidum & siccum. Si uero tenefmus pendeat ab apostemate factio per uiam defluxus exigit triplex regimen. Primum respicit causam antecedentem complendam euacuatione, diuersione, & fluxus materię prohibitione. Si ergo materia peccet cum sang. fiat phlebotomia basilicæ, imo fere nunquam a flebotomia est exculatio, & si repletio sit communis in toto flebotometur communis, & si retentio hæmorrhoidarum aut menstuarum sit causa phlebotomentur saphenæ, & uomitus est magis conueniens quæ uentris solutio. Quod si solutio fuerit necessaria fiat cum lenientibus sicut magna, cassia, sed distemperetur cum decoctione myrabolanorum, bdellii, & similia prohibentium fluxum humorum ad locum apostematum, & decoctio myrabolanorum citri. in cholericæ, kebulorum in phlegmaticæ, indorum in melancholica & rhabarbari in mixta ex cholera & phlegmate est conueniens. Ventose quoque appositæ super hepate splene & spatulis conferunt diuertendo, & similiter urinae & sudoris prouocatio, prohibetur autem fluxus materię ad locum apostematum exhibendo incrassantia & frigida, maxime si fuerit calida subtilis sicut suc. granatorum cyd. & similia. Item, lac & syr. de papa. & oxyzacharum syr. ros. uio. iuiuinum, aquam lactucæ, cucurbitæ, citruli, hordei, & similia. Sed in crassantia & uentrem lenientia sicut syr. iuiuinus uio. sunt præstantiora quàm uentrem stringentia. sed in causa frigida eligantur temperate ad calidum declinantia aut parum frigida, sicut syr. myrtinus, miua cydo. cum uino, & aromatis & similia. Secundum est regimen particulare complendum in principio cum repercussiuis dolorem sedantibus sicut est oleum ros. & myrtinum clysterizatum & lychinium ex cortio molli in eis intinctum & tepidum suppositum si possit retineri absque dolore, & materia existente multum calida, hæc olea possent lauare aut cum eis misceri succi infrigidantes sicut lactucæ foliati semperuiuæ, plantaginis, & similia. Sed in causa frigida his addatur oleum chamæmelinum & sisaminum, similiter exterius ungatur & epithimetur fieri peritoneum, renes, pectus, inguinæ, cum filtro in his oleis in fulo, & partibus prædictis applicito, & similiter intus in aqua decoct. ro. myrti & similia quibus in causa frigida possent addi purum schinanthi, & florum chamomillæ, & in his quæ applicantur exterius possent admisceri parum aceti ad reperiendum. In augmento uero supra scriptis oleis frigidis cum clysteri imponendis addenda sunt calida resolutoria & molliciantia, sicut oleum anethinum, liliorum alb. de spica, butyrum, adeps renum, capræ olei sisaminum, amig. dul. & similia, & bdellium est proprium. Et possunt fieri decoct. & emplastra ex ros. myrto, rad. malua uisc. floribus chamæmillæ, anetho, sem. lini, fenug. & si maturetur fiat clystere ex decoct. malua uisc. fenugraci, seminis lini, in qua bdellium sit dissolutum, & butyrum, & adeps renum capræ, & si humor sit multum frigidus addatur hyssopus humida, cum his decoctionibus potest epithimari clysterizari & ipsis potest sedere, & cum foce earum potest emplastrum. Et in causa frigida cape album assacum cum butyro & hyssopo humida exterius applicitum est optimum maturatiuum. in apostemate autem duro molliciantia uincant resolutoria, & medullæ, & adipis, oleum sisaminum, amig. mucilagines.

mucilagines, maluaufci, fentigr. se. lini sunt proprie, & similiter butyrum. Et si fuerit frigiditas notabilis hyssopus hum. Et si apostema esset cancriforme omne regimen declinet ad frigidum & hum. & clysterizetur cum oleo uiol. aut ros. 3. 6. aut 7. quibus possunt addi butyri recentis. 3. & omnia diu ducta sint in mortario plumbeo, & pro huius cura quæ debet esse blanditiua, cum cura uera non sit possibilis recurratur ad cap. de cancro, & in summa in his apostematibus procedatur secundum suorum temporum & materię exigentiam. Vltimum autem regimen comprehendens correctionem accidentiũ & regimen sex rerum non naturalium qualiter debeat compleri patere potest ex suprascriptis. Dieta enim debet esse ualde tenuis & uentris lenitiua non contipatiua declinans ad calidum aut frigi. hu. aut sic, secundum materię exigentiã & reliquorum, à quibus sumitur indicatio, & quanto ægritudo est acutior, diæta debet esse magis tenuis, quod si apostema rumpatur curetur cura ulcerum, ut statim dicitur. Si uero apostema genitum sit per uiam paulatim factæ confectionis, duo ultima regimina sunt necessaria, sed primũ omitatur, quia respicit causam antecedentem transeuntem in cõiunctam. Si uero tenesmus sit ab ulceribus & corrosione in intestino recto & extremitate eius. Primo mundificetur cum aqua aut uino decoct. mel. aut mel. ro. Et si adsit putredo in loco quoddam cognoscitur ex egressione uirus fetentis mali coloris suprascriptis addatur oxymel simplex, ita ut quarta pars, aut addatur aqua salita, aut oliuarum salutarum pro tertia aut quarta parte, & hæc clysteria sint pauca quantitate cũ sint acuta scilicet. 4. aut 6. 3. iam intestinis à fecibus mundificatis, & ubi esset maior putredo cum aqua mellis misceatur aqua decoctionis aluminis, & quando hæc non sufficerent cum 3. 6. aquæ hord. misce à duabus drachmis usque ad 3. s. unguenti ægyptiaci. Rasis tamen. 9. Alman. cap. de fluxu uentris quando tenesmus fuerit longi temporis in quo non egeratur sanguis, sed rasura alba mucilaginis similis docet administrari medicamen quod in cura gingiuarum putrida posuit quod est medicamen acutum ualde factum, s. ex arsenico citri. & rub. & calce & c. Sed consulo ut cum leuioribus procedas, & si lequeretur mordicatio clysterizetur immediate cum oleo tepido, postea consolidetur cum unguento de cerussa cum aqua calibeata aut succo plantaginis clysterizato, aut iniiciantur pulueres consolidatiui, sicut cerussa, lithargyrium, plumbum uisum & lutum, thucia præparata, cadmia, an thimonium & similia, quibus potest addi aloes lotum, & sarcocolla nutrita, & in summa curetur cura ulcerum intestinorum de qua supra. Et apud Franciscum de pedemontium, oleum uetus clysterizatum cum creta est proprium & pulueres suprascripti possunt cum cannula in ano imposita insufflari. Sed semper ante immisionem harum medicinarum mundificantium aut consolidantium educantur feces cum clysteri ex aqua mellis aut hordei. Possunt etiam fieri lychinia longa ex melle aut adipe renum capræ & secum miseri huiusmodi mundificantia aut consolidantia, & sint longa ut attingant ad locum ulceratum. Et uideantur cibi acuti falsi, amarissimi, acetosi ualde qui possunt facere feces acutas. Et sint potius lenientes quàm contipantes. Si uero sit excoriatio lenis sufficiat iniectione cerussæ aut unguenti de cerussæ, aut aliquid ex pluribus suprascriptis cum aqua hordei, aut succo plantaginis, & similibus, aut ex similibus fiant lychinia longa. Si uero pendeat à ragadiis hamorrhoidibus & fistulis eius cura inferius propriis cap. perquiretur. Si uero pendeat à fecibus siccis eius cura perquiratur in cap. de cura colicæ à febribus siccis, & in summa fœces cum clysteribus & sumptis superius mollificentur, deinde cum clysteribus suprascriptis quibus acuta addantur, & proprie mel in magna quantitate educatur. Verum clysteria & sumpta per os declinent ad calidum aut frigidum secundum fœcum maiorem acuitatē aut minorem, & cæteris circumstantiis à quibus queritur indicatio. Si uero pendeat à frigiditate ano impressa omne regimen declinet ad calidum tam sex rerum non naturalium quàm medicinale & proprie teneat anum uentrem & partes circumstantes ani calidas, & feces educantur cum oleo anethino fœcamino aut communi, quibus educatione addatur aliquid acutum si opus est sicut mel aut urina, postea clysterizetur cum oleo anethino, rutaceo, & similibus, quibus uinum potens

dulce admisceatur aut clysterizentur decoctiones rerum calidarum mollificantium aut lenientium, aut secum talia misceantur, sicut olea & adipēs, aut fiant fomenta & fessiones in huiusmodi, aut sacculi ex rebus calefacientibus ano applicentur, aut sedeatur super affere cal. aut uenter catuli ano applicetur, aut filum bulitum in aqua ano applicetur aut uesica plena oleis aut decoctionibus calidis ano applicetur. Si uero pendeat à caliditate omne regimen declinet ad frigidum, & in hoc casu oleum ros. uiol. succi frigiditantes inuncti cataplasmati clysterizati sunt conuenientes, clysterizata tamen debent esse actu tepida. Si uero tenesmus pendeat à uentositate, fiant clysteria carminantia uentositatem ex decoctione seminum anethi, anisi, karui, dauci, rutæ, ameos & similia, cuius 3. 8. addantur olei anethini, olei rutacei, ana. 3. 2. Et cum similibus decoctionibus potest locus fomentari, & in ipsis potest sedere. Rasis tamen. 9. Alman. præcipit duo opiata, scilicet trochiscos & confectionem de styrace, quorum descriptionem in textu exposui, simul enim stupefaciunt & uentositatem resoluunt. Reliquum regimen perquiratur ex cap. de colica uentosa.

Solutiua tamen minus hic conueniunt quàm ibi. Si uero tenesmus fuerit ex reliquiis medicinarum abstergatur & lauetur cum clysteri ex aqua hordei, oleo uiolaceo, zuchcharo & similibus, & si timueris excoriationem laua adipem renũ capræ cum aqua frigida, & suprascriptis adde, & si inceperit excoriatio adde cerussam lotam cũ succo plantaginis & oleũ ros. Et similiter si fuerit ab acuitate clysteris laua & infrigida, & locum conforta ne apostemetur cum suprascriptis, & si fuerit à cimice & uermibus interficiatur & educantur cũ his quæ ducuntur in cap. proprio. Et si fuerit à cibis acutis & falsis clysterizentur cum aqua hordei & oleo uiolaceo, & si quid fuerit niscosum cum magis abstergentibus sicut cum aqua mellis, & si fuerit ex fessione super re dura administrentur mollificantia & prohibentia apostema, sicut decoctio rosarum chamæmeli, & anethi debite calida approximata cum filtro, & unctio ex oleo rosaceo, chamæmeli, & adipe gallinæ & si timeretur apostema approximetur oleum ros. solum.

De fluxu hepatico.

Luxus hepaticus qui descriptiue est fluxus factus uitio hepatis apud Auic. habet nouem species penes materiam distinctas. Prima est chylosa. Secunda phlegmatica, quam Auic. sub aquosa comprehendit. Tertia cholemica. Quarta melancholica quam Auic. in nigram subtilē felleam, in nigram fœcalem & nigram melancholicam subdividit. Quinta sanguinea pura. Sexta lotiua. Septima fetida. Octaua uirulenta. Nona est res crassa nigra quæ est substantia stomachi aut hepatis. Fluxus autem diuersorum colorum licet possit contingere uitio hepatis, & sic dici hepaticus, qui magis in hepate contingit ex diuersitate partium chyli, & consequenter ex diuersitate cibi & potus quàm propter diuersam & difformem dispositionem partium hepatis, congruentius inter quinque fluxus à toto superius connumeratus est, cum frequentius contingat membrorum totius corporis diuersam & difformem esse dispositionem quàm folius hepatis, sed de hoc ibi dictum est quantum est opportunum. Sed nunc sigillatim species nouem suprascriptas absoluamus. Posita tamen prius differentia inter solutionem hepaticam & intestinalem. Secundo inter hepaticam & stomaticam. Tercio inter hepaticam & meseraicalem, cum hæc omnes cũ hepatica in aliquibus conueniant præcipue in exeuntibus.

Differt hepatica ab intestinali, & proprie quæ est cum rasura aut ulcere intestinorum. Primo quia hepatica est sine dolore intestinorum, imo etiam frequenter sine dolore hepatis. Sed intestinalis iam dicta est cum dolore notabili intestinorum. Secundo quia hepatica est multa & cum interpolatione notabili secundum plurimum. Sed intestinalis est paulatim facta & fere continua. Tertia differentia sumitur à permixtione fœcum cum solutione antepositione aut postpositione. Intestinalis enim sanguis aut sanies est semper fere permixta cum fœcibus, & magis ea quæ à superioribus uenit intestinalis quàm quæ ab inferioribus. Sed hepatica aut descendit sola si non inueniat fœcem in intestinalis aptam descendere aut descendit post egestionem sibi contiguam, facit enim egestionem descendere cum appli-

Io. Arculani d 2 catur

catur ad eam. Et hoc maxime uerum est si egestio sit prope animum. Si enim egestio siue foex esset distans posset secum permisceri in longo transitu. Nunquam tamen solutio hepatica praecedit foecem, ita ut foex immediate subsequatur, & in hoc differt a sanguine hæmorrhoidali, ille enim frequenter immediate praecedit foecem, & certissimum signum sanguis hæmorrhoidalis est si appareat egredi saltando sicut ex phlebotomia. Quarta differentia est quia hepaticum praecesserunt hepatis nocumenta & concomitantur absque nocumentis intestinorum; sed cum intestinali adsunt & praecesserunt nocumenta intestinorum absque nocumentis hepatis. Quinta differentia, quia hepatica est secundum plurimum chronica, intestinalis autem acuta. Sexta quia hepatica cum retinetur cum oppilantibus & constringentibus, sequitur nocumentum secundum plurimum, raro enim absoluitur ab oppilatione, & etiam si non esset oppilatio, frequenter sequeretur nocumentum, ut patet discurrendo per causas eius, sed intestinalis frequenter sine nocumento retinetur. Hepatica autem & stomatica licet conueniant in exitu chyli. Differunt tamen. Primo quia in hepatica chylus est æqualis perfecte digestus. Sed in stomatica imperfecte. Item, in stomatica secundum plurimum descendit cibum cum chilo & adest lienteria, sed in hepatica minime. Tercio in stomatica adsunt nocumenta stomachi & non hepatis, saltem manifesta, sed in hepatica adsunt nocumenta hepatis manifesta. Sed differentia inter solutionem hepaticam & meseraicalem, licet conueniant in egressione chyli, est. Primo, quia chylus in hepatica est tendens in sanguineum, cum iam hepar impletur aliquid digestionis. Sed in meseraicali minime aut leuissime. Secundo, quia in hepatica adsunt manifesta nocumenta hepatis quæ ex urina & foce ex grauitate & dolore & similibus circa regionem hepatis comprehenduntur, sed in meseraicali non adsunt hæc nocumenta, imo adsunt nocumenta mesenterii ex dolore & grauitate circa dorsum perceptis.

De fluxu hepatico chyloso.

Luxus hepaticus chylosus est descriptiue fluxus chyli qui est substantia subtilis alba in stomacho per primam digestionem ex parte meliori cibi genita, deinde in intestinis perfecta. Hæc species non habet nisi modos quosdam secundum magis & minus differentes. Quandoque enim totus chylus egreditur, quandoque pars eius. Hi autem fluxus licet possint contingere uitio stomachi solum, tamen de eo hic agemus qui prouenit uitio hepatis, nam de stomacho superius dictum est quantum est opportunum.

Hic autem quinque ex causis contingere potest. Prima causa quia chylus est pluris quantitatis quam sit expediens pro corpore nutriendo. unde quod superfluum est ab hepate renuitur, & tanquam superfluum ab intestinis expellitur. Generatur autem plus de eo quam sit expediens propter superfluum appetitum stomachi cum bona eius digestionem, & qui cibum assumptus est multus & multi nutrimenti & paucorum superfluitatum facile in chilum conuertibilis. Idem etiam fluxus posset contingere si chylus genitus esset nimium crassus aut uiscosus. Aut aliter male conditionatus, ob defectum stomachi, aut cibi. Secunda causa, quia hepar fuit creatum paruum, unde non potuisset multum chylum continere. Tertia est apostema concaui hepatis aut meseraicarum quod licet possit pendere a quacunque materia, est tamen secundum plurimum sanguineum & frequenter permutando efficitur durum. Quarta causa est oppilatio concaui hepatis aut meseraicarum attenuatoria aut coarctatoria aut carnosæ. Si enim essent in gibbo fieret fluxus humoralis, cum humores in concauo generentur, licet in gibbo perficiantur. Quinta est debilitas attractiue hepatis uel meseraicarum, licet maxime hepatis approprietur, non est enim attractiua meseraicarum de qua sit curandum, sit enim attractio in uirtute hepatis. Hæc autem debilitas licet possit a quacunque specie male complexionis cum superfluit contingere, semper plurimum tamen pendet a superflua frigidityte, & quandoque a multitudine euacuationis tam per uomitum quam per alias regiones.

Signa fluxus chylosi absolute manifesta sunt cognoscendi chylum qui est albus subtilis sicut præsana hordeacea, siue solus expellatur, siue cum aliis excrementis permixtus. Sed

quod proueniat ex chylo ampliori cognoscitur, quia patiens non macrescit & comedit amplius consuetum, & forte cibos pluris nutrimenti & in summa est cum bona habitudine & constantia uirtutum naturalium. Quod uero chylus sit crassus aut uiscosus aut aliter male conditionatus cognoscitur per uisum, & quia utitur regimine malo, aut forte adest mala stomachi dispositio cum carètia aliarum causarum. Quod autem sit hic fluxus a paruitate hepatis cognoscitur, quia est a generatione contractus, & quod cum comedit parum prouice & frequentius melius se habet. Quod autem sit ab apostemate hepatis aut meseraicarum & a qua specie apostematis cognoscitur per signa superius dicta in passionibus hepatis, ad quas recurrendum. Et similiter est illic recurrendum per cognoscendis oppilationibus hepatis & meseraicarum. Inter quas & apostema est distinguendum, & maxime per febrem quæ necessario sequitur quodcumque apostema hepatis & meseraicarum, licet in apostemate meseraicarum sit ualde remissa, cum oppilatione aut secundum plurimum non est febris. Item quia ad apostemata uehementiora sequuntur nocumenta, & in breuiori tempore quam ad oppilationes, sicut decoctio appetitus, singultus, arefactio hydrops & similia. In cæteris enim signis communibus multum simulantur. Et hic nota quod fluxus esse periodicum est signum fere commune omnibus fluxibus oppilatiuis semper aggregatione materię in determinato tempore, minus tamen fluxibus chylosis conuenit, licet sint cum oppilatione. De fluxu autem oppilatiui in ferius faciam speciale cap. ad quod recurre. Quod autem sit a debilitate attractiue cognoscitur per carèntiam aliarum causarum, & per præsentiam malæ complexionis in hepate uerisimiliter ipsius factiue quæ semper plurimum est frigida. Pro cognitione autem specierum malæ complexionis hepatis in causa recuratur ad superius dicta in passionibus hepatis.

Prognostica. Primum hic fluxus secundum plurimum curatur nisi pendeat ex apostemate, exigit tamē medicum expertum & diligentem. Secundum, hic fluxus est ex eis qui cum dimittuntur ar faciunt & debilitant uirtutem, & quando retinentur & proprie cum oppilatiuis constringentibus inflantur in superioribus, & constringitur anhelitus.

Cura hepatici chylosi. Si pendeat a nimia quantitate chyli, minoretur cibum. Quod si propter famem non posset abstineretur cibaria quorum multa quantitas parum nutrit, sint tamen boni nutrimenti sicut olera laudabilia panis cum & similia. Curetur cura appetitus canini. Licet forte melius sit huic fluxui sinere. Si uero chylus esset nimium crassus aut uiscosus, dentur cibi præbentes nutrimentum subtile sicut uinum album, carnes auium laudabiles, uitelli oioris, & si cum hoc fiat appetitui erit proficuum sicut brodium ciccerum abiecta prima decoctione. Item decoctiones radicis foeniculi, peroselinii, apii & similibus, & aromentizentur cum cinnamomo. & panis suus sit communi fermentator. Etsi chylus fuerit aliter male conditionatus incidatur in contrarium regiminis præcedentis, & stomachus si fuerit in causa corrigatur.

Quod si pendeat a paruitate hepatis comedat frequenter & parum pro uice & cibaria boni nutrimenti subtilis & multum & paucorum superfluitatum non uentre lubricantia. Quod si pendeat ab hepate concaui hepatis aut meseraicarum phlebotometur aut aliter euacuetur & diuertatur, & quantum ad localia administrantur secundum exigentiam suorum temporum & materię. Et dicta sit tenuis contraria discrasie apostematis, ita ut in apostemate saltem calido prohibeantur panis carnes & uinum præbeat tamen nutrimentum subtile facile penetrans, & pro cura huius recuratur ad cap. de apostemate hepatis. Et cauendum est ab administratione fortiter constringentium & oppilantium tam interius quam exterius. Habeant tamen spicicacitatem paucam cum singulari proprietate quibus sint hepatis & membrorum naturalium confortantia, nec sint uentrem lubricantia. Si uero pendeat ab oppilatione, curetur cura fluxus oppilatiui de quo infra in cap. proprio. Et si sit repletio sanguinea phlebotomia barisilica aut saluatella dextra semper exigentiam repletionis & uirtutis. Si uero materia oppilans sit phlegmatica crassa aut uiscosa secundum quod est ut plurimum digeratur cum oxymelle simplici & aqua abstinui. Deinde euacuetur cum pilulis de rhabarbaro

rhabarbaro aut alephanginis cum tertia parte agarici præparati, & pilulæ de raue Mefue sunt fortiores. Tercio digeratur cum oxymelle composito aut scillitico aut syrupo de eupatorio & aquis ablinthii apii aut eupatorii. Quarto euacuetur cum eisdem aucta dosi, & proprie cum pilulis de raue de eupatorio aut de alKe Kengi Mefue. & Aui. dicit clystertia fortis aperitionis & attractionis, & similiter uomituum esse ex rebus magis iuuatiuis, si tamen appareat dominium caliditatis dentur digerentia & euacuatia temperata aut ad frigidum declinantia sicut aqua cicoreæ aqua cuscute capillorum ueneris, syrups bifantinus & acetosus simplex & compositus. Quinto aperiantur oppilationes cum theriaca diacalamentho diacynamomo quæ cum uino subtili aut aquis aperientibus exhibeantur, uinum tamen est melius ut sit anti quum, & sit. 2. ael. 3. 5. Item passulæ cum phisticis, seminibus communibus frigidis, anis, semicofectis & cinamomo sunt præstites & passulæ solæ optime conferunt aut cum diarrhodon admixte. Et si appareat dominium caliditatis detur diarrhodon & semina communia frigida. Digna autem declinet ad calidum frigidum aut secundum exigentiam dyscrasie & aliarum circumstantiarum. Et sint cibi & potus aperitiui non oppilantes. Et uinum sit album subtile non dulce bene clarum magis aut minus uinosum secundum quod oportet. nam plurimus potus uini falsi recetis facit cadere in solutionem hepaticam propter suam crassitatem & dulcedinem. Et cum apparent signa caliditatis pusula hordeacea confert. & dimittatur panis uinum & carnes, constante uirtute, & cibus est partiendus ut parum pro uice comedat, sed frequenter. Dormiat sufficienter ut fiat bona digestio, fiant fricationes toti corpori celebrata prima & secunda digestione, ut nutrimentum ad membra trahatur, & summopere uitanda sunt oppilata & constringentia interius aut exterius applicata & ualde dulcia. Et hæc cura est communis cuicunque fluxui oppilatio chyloso aut humoralis, siue oppilatio sit in gibbo aut contra uentrem hepatis, siue inter hepar & intestina siue in membris quæ sunt ultra hepar. Si uero fluxus chylosus pendeat ex debilitate attractiue sequentem malam complexionem frigidam cum materia sicut accidit secundum plurimum procedatur eodem modo qui dictus est in cura fluxus oppilatiui à materia frigida. Verum communiter non indiget ita fortibus incisiuis & subtiliatiuis pro digestione, sed bene fortibus aperitiuis, & etiam communiter sufficiunt leuiores solutiua cum quibusdam stipticis confortata, sicut pilulæ de rhabar. additis mirabolanis Kebulis pro quarta parte. Si uero sit mala complexio frig. sine materia non indiget euacuatione, sed calescat hepar cum oleo de spica, quod esset præstantius si bullierit cum pauco uino subtili aromatico usque ad uini consumptionem & ungatur notabiliter fricatio ipso oleo prius calefacto, & panis sit communi fermentatio coditus cum aniso & similibus & uinum sit antiquum subtile &c. ut superius conditionatum, sed si in hoc casu attinetur alicui dulcedini forte esse præstantius. Non sic in oppilatione, & phisticis & passulæ pingues auellane depilate cum cinna. essent præstantes, & in reliquis fiat ut dictum est in fluxu chyloso ab oppilatione. Et si appareat dominium caliditatis detur aperitiua frigida, hepatica tamen confortatiua sicut diarrhodon aut trianlandali cum passulis, & seminibus communibus frigidis, & ungatur cum oleo ro. & myrtino, & reliquum regimen declinet ad frigidum, & sit hepatis & membrorum naturalium confortatiuum tam stipticitate temperata quam singulari proprietate, & si fuerit debilitata propter lapsum ad humidum, totum regimen declinet ad siccum. Et econtra si fuerit debilitata propter lapsum ad siccum declinet ad humidum, & si fuerit debilitata propter nimias euacuationes si stantur euacuationes illæ & totum regimen medicinale, & in cibo & potu sit stipticum cum temperamento actiuarum & cum hoc sit aperitiuum facile penetrans ad membra, & sit multum resumptiuum ita ut parum ipsius multum nutriat, & in hoc casu maxime cibus est partiendus.

De fluxu hepatico phlegmatico sub quo aquosus continetur.

Quid nominis & quid rei huius fluxus satis manifesta sunt. Est autem hic fluxus duplex, quidam aquosus, quidam à phlegmate crassiori.

Causa aquosi est corruptio digestiue hepatis, quam coadiuuat multus potus aquæ & usus rerum aquosarum. Et potentia uirtutis expellentis per meseraicas ad intestina, quæ si deficeret esset causa ascitis. Corruptur autem digestiua huiusmodi producens aquositatem secundum plurimum à frigido, licet etiam caliditas hepatis superfluens in gradu dimi nuta tamen in quanto possit per corruptam digestionem aquositatem multiplicare, sicut accedit in habentibus hepar superflue calidum & febrientibus qui efficiuntur hydropici, potentia enim rei insequitur multitudinem formæ. Item corruptur ab humido. A siccio autem corrupta non producit aquositatem aut rarissime. Apotematata quoque hepatis & oppilationis corrumpunt hepatis digestiuam. Corruptur etiam per communitatem & à toto & à pluribus membris. De his tñ quantum est expediens dictum fuit superius in hydropice. Conuersio quoque aquæ hydropicorum per meseraicas ad intestina est causa huiusmodi fluxus, & per ipsum soluitur ascites sicut dicit Hip. 6. aphorismorum aphorismo. 14. Ab hydropice habito fm uenas in uentrem aqua fluente solutio fit. Causa aut fluxus à phlegmate crassiori est mala complexio frigida hepatis destruens digestiuam cum regimine proportionali generationi huius phlegmatis & fortitudo expulsiua.

Signa sunt illud quod egreditur, scilicet phlegma & aquositas & regimine præcedens, scilicet comestio fructuum aquosorum, & potus aquæ superflui & proprie tempore non congruo. Item paucitas urinae & sudoris uel ascites præcedens cum confortatione uirtutis, & aqua tunc est citrina. sed ex præcedenti causa est alba, & proprie si fuerit in causa mala complexio frigida hepatis. Si autem mala complexio nis hepatis apotematatis oppilationis & nocumeni ipsius hepatis per communitatem ab aliis membris, sunt ex dictis superius manifesta.

Prognostica. Primum, hic fluxus curatur secundum plurimum, nisi pendeat ab hepate. Secundum, cum retinetur hic fluxus aquosus errante digestiua, impletur hepar aquositate, & rumpens in uentrem facit hydropem aquosam secundum plurimum mortalem, iuxta aphorismum. 56. septime particulae. Si hepar impletum aqua in omentum eruperit, idest in zirbum, his uenter aqua impletur & moriuntur.

Cura. Si causa fluxus aquosi fuerit conuersio aquæ ascitici ad intestina, sinatur natura operari, & medicus ad nihil aliud intendat, nisi ad confortationem digestiue & expulsiue hepatis cum propriis per uirtutem tertiam & contrariis hepatis dyscrasie & cæteris nocuentis eius, & cum hoc moderata stipticitate participantibus. Si tamen nimis superflueret, cohibeatur cum magis stipticis, propriis tamen in confortatione hepatis & contrariis ipsius dyscrasie, ut supra. Si uero in causa fuerit regimen præcedens malum, ordinetur regimen contrarium tam regimini præcedenti quæ dyscrasie inducitur in hepate per regimen illud, & digna sit tenuis, boni chymi, & paucarum superfluitatum. Si uero in causa fuerit aliquid hepatis nocumentum per essentiam uel per communitatem ex superscriptis, quatuor debentur intentiones. prima est remotio causæ siue nocuenti illius, secunda uirtutum hepatis confortatio, tertia correctio accidentium, quarta regimen uitæ.

Pro prima intentione, primo mundificetur hepar ab aquositate, nunc per eandem regionem, scilicet per intestina si natura per se non fuerit sufficiens cum decoctione hieros & mirabol. Cebulorum. ana. 3. 2. quæ decoctio fiat in aqua mel. 3. 6. ad consumptionem medietatis, & coletur, & sufficienter exprimatur, uel cum aqua mellis, decoct. mirabol. kebulorū. 3. 1. misceatur. 3. s. succi ireos, aut quantum uidetur sufficere, uel si fluxus fuerit phlegmaticus, minoretur cum his quæ dicta sunt in cura generali fluxus. Aliquando uero mundificetur, & diuertatur aquositas illa per urinam cum diacurcuma, aut dialacca exhibita cum uino albo, aut cum decoctione radicū & seminum prouocantium, cum qua etiam trochisci de lacca possunt exhiberi. Si tamen esset cum signis caliditatis aut febre, dentur diuretica frigida, sicut decoctio seminum communium frigidorum & radicū asparagi permixta cum trianlandalis aut diarrhodon abbatis, sudor etiam si oportuerit prouocetur ponendo ipsum in stupha aut in furno à quo panis sit extractus & teneat caput extra, aut ponendo ipsum in thermis quæ non sint atramentales aut aluminosæ, aut

Io. Arculani d 3 alio

alio modo stipticæ, & si esset debilis non potens huiusmodi tolerare, dormiat, & in somno bene panis operiatur, aut anhelitum contineat, aut hora somni exhibeatur portio sudoris prouocatiua sicut theriaca aut mitridatum cum uino subtili potenti. Deinde pro complenda hac intentione alteretur hepatis discrasia & corrigantur cætera nocumeta eius siue sint per essentiam, siue per communitatem cum his quæ dicta sunt in passionibus hepatis. Et cum eisdem compleatur intentio secunda quæ est digestiua hepatis confortatio. Et ex propriis sunt passulæ, siltica, auellana, cinnamomū, hepar adip. & caro limaciarum cum proprietate, crocus, uinum mediocris uinostatis odoriferū medium inter dulce & acre. Et ex frigidis sunt species endiuæ & multa alia simplicia & composita de quibus supra in debilitate hepatis. Tercio corrigatur accidentia sicut dictum fuit in cura generali fluxus. Et regimen declinet ad calidum aut frigidum secundum exigentiam discrasie, sed secundum plurimum ad siccum, & sit participas stipticitate temperata cum singulari proprietate in confortatione hepatis.

De fluxu hepatico cholerico.

Fluxus hepaticus cholericus quantum ad quid nominis & quid rei satis ex dictis manifestus.

Species habet diuersas sumptas secundum diuersas species cholerae. Expellitur enim quandoque cholera naturalis, quandoque non naturalis sicut citrina, uirellina, cholera minoris famæ, præsina eruginosa.

Causa eius est multitudo cholerae aut acuitas propter discrasiam hepatis calidam cum regimine calido proportionali generationi eius sicut est frequens usus ciborum acutorum amarorum salforum ualde dulcium & unguosorum, & motus fortes sub æstu solis & in diebus canicularibus, ira & reliqua quæ corpus inflammant. Et similiter causæ præternaturales sicut febres adurentes, apostemata calida, & oppilationes. & proprie oppilatio in poris kyllis cum fortitudine expulsiua. huiusmodi enim causæ inflammantes cum excedunt adurunt sanguinem & humores, & per aduersionem inspissando sunt causæ cholerae zinariæ, imò aduersionis substantiæ hepatis.

Signa. Hic fluxus cholericus secundum species suas cognoscitur per colorem & substantiam eius quod expellitur. Sed de signis fluxus cholerici sufficienter actum est in cap. de diarrhoea. Sed eruginosus raro conueniens est sicut erugo æris cum multa corporis & hepatis inflammatione quæ si perferret aduritur substantia hepatis. Signa autem discrasie hepatis apostematū oppilationum eius & kyllis fellis sunt ex præcedentibus manifesta.

Prognostica. Primum, hic fluxus perducit ad excoriationem & ulcera intestinorum, & tanto citius quanto cholera est acutior & maioris aduersionis. Secundum. Hic fluxus secundum plurimum curatur nisi pædeat ab apostemate aut sit cum aduersione substantiæ hepatis, quæ aduersione cognoscitur ex hypostasi orobina rubea tendente in nigredinem, cuius orobus est fragibilis ad differentiam orobinae citrinæ, non facile fragibilis, quæ est ex rene, & ille orobus de quo supra non est nisi de substantia hepatis aduersione si tenacitatem aliquam habuerit ad differentiam sanguinis adusti.

Cura huius fluxus cholerici hepatici quatuor exigit intentiones. prima, remouet causam fluxus, secunda, hepar confortat, tertia, corrigit accidentia, quarta ordinat debitum regimen. Si ergo causa fluxus fuerit regimen præcedens, remoueat & inducatur regimen contrarium infrigidans & humectans. Si uero in causa fuerit hepatis superflua caliditas, alteretur cum infrigidantibus magis aut minus intensis secundum discrasiam exigentiam quæ applicentur intus, & extra. Sed tamen extra non applicentur nisi prius facta sufficienti cholerae euacuatione, quæ educatur nisi natura per se ad hoc sufficiat cum decoct. prunorum tama. mirrobo. citri. in qua infusa sint. 3. rhabarb. infrigidantia autem interius sumpta sunt sicut syrupus de granatis cum aqua endiuæ, plantaginis aut solatri aut semperuivæ, aut portulacæ, & similia magis aut minus frigidorum secundum exigentiam in quibus possunt infundi sandali aut species triafandalorum cum camphora apud maiorem inflammationem. Vinum quoque granatorum de berberis siue crispinum cum aquis superscriptis ad hoc con-

ueniunt. Externus autem fiant epithemata cum aqua endiuæ, plantaginis cum spodio speciebus triafandalorum & similia, quibus addatur parum aceti. & si uirtus esset debilis parū uini aromatici aut spicæ. Apostemata uero & oppilationes siue hepatis siue kyllis manifesta sunt ex dictis in oppilationibus hepatis & icteritia. Sint tamen de oppilatiis frig. aut temperata si cum frigidis non possent fieri aperta sicut est aqua hordei sem. communium frigidorum cuscute capil. uen. & similia. Confortatur autem hepar cum eisdem de quibus statim dictum est. Pro tertia intentione. s. correctio accidentium frequententur clysteria mundificatiua prohibentia excoriationem in quibus ponatur aqua hord. adeps renum capræ, albumen cum uitello oui. oleum uiola. & similia. Reliqua accidentia sicut instantiæ uigiliarum & similia curentur, ut dictum est supra in cap. generali. Regimen autem sex rerum non naturalium iuxta quartam intentionem declinet ad frig. & hum. cum temperata stipticitate & singulari proprietate hepatis confortatiua.

De fluxu hepatico nigro, melancholico.

Quid nominis & quid rei huius fluxus hepatici nigri melancholici satis sunt ex dictis manifesta. Est enim hic fluxus descriptiue fluxus humoris siue puris melancholici uitio hepatis ex quo patet quomodo differat a fluxu nigro qui est substantia hepatis aut stomachi, & etiam a diarrhoea melancholica. Illa enim non est uitio proprio hepatis sed totius. Species ipsius famosæ sunt tres, scilicet. Fluxus niger sicut sanguis niger aut uini nigri foex. Fluxus niger fellis. Et niger melancholicus. Primus autem triplex penes Auic. est enim quidam existens sicut sanguis subtilis niger non conglobatus. alter uero frequentius ueniens qualis sanguis niger conglobatus. Similiter fluxus niger fellis est duplex, quidam est fluxus melancholice genitæ per aduersionem cholerae rubæ naturalis, alter per aduersionem cholerae non naturalis. Sed tertius fluxus, scilicet niger melancholicus est iterum duplex, scilicet melancholice naturalis cum lu perfluit, & melancholice præternaturam genitæ per aduersionem melancholice naturalis, alter per aduersionem subtilioris partis eius. Species autem fluxus melancholici non famosæ sunt quæ sunt per congelationem melancholice, aut per aduersionem phlegmatis aquosi aut crassioris, aut ipsius congelationem, quæ ideo sunt non famosæ, quia raro euenientes. Ex melancholia enim genitæ per congelationem melancholice non fit fluxus nisi raro propter sui crassitatem & paucam stimulationem, sed fit zephiro purum. Melancholia autem genitæ ex phlegmate pauce attinet nigredini.

Causæ primi fluxus, scilicet melancholici foecalis sunt sex. Prima est mala complexio hepatis calida adurens aut frigida congelans, materia autem est massa sanguinea in hac melancholiam foecalem per aduersionem aut congelationem uersa ad quod iuuat mixtio multi humoris melancholici in massa sanguinea. Secunda causa est ulcus putridum in substantia hepatis emittens pus nigrum. Tertia causa est dubiæ quod rumpitur in substantia hepatis subito emittens magnam quantitatem puris nigri quod per meseraicas ad intestina defertur. Si enim solum resudaret & non rumperetur manifeste fieret fluxus uirulētus subtilis de quo infra. Quarta causa est oppilatio hepatis quæ aperitur, unde materię diu per oppilationē retentæ & denigratæ educuntur, licet quandoque per apertionem huiusmodi oppilationis fiat fluxus diuersorum colorum. aperitur autem oppilatio aut a uirtute forti sola aut cum auxilio medicinarum. Quinta causa est fortitudo uirtutis aut sola aut auxilio medicinali adiuta digerens & separans nocitium a iuuatiuo, & tandem nocitium nigrum foecalem de quo supra expellens. Sexta causa est debilitas uirtutis, scilicet retentiæ aut digestiue hepatis, & hunc fluxum foecalem antecedit fluxus lotiuus secundum plurimum de quo infra. Retentia autem & digestiua licet possint debilitari ab omni genere ægritudinis, quantum tamen pertinet huic proposito debilitantur a mala complexionē calida aut frigida. Calida autem magis laedit retentiuam. Frigida uero magis digestiuam quæ malæ complexionē auget aut diu imprimentes perducunt, tandem aut fluxum foeculentum adurendo aut congelando. Propterea dicit Aui. quod hæc mutatio ex lotiuo ad foeculentum non fit subito, i. in modico tempore.

tempore, sed paulatim. Citius tamen ad hunc perducit caliditas adurendo quam frigiditas congelando, cum ipsa sit magis actiua. Fluxus autem sanguinis denigrari propter longam moram non reducitur ad hunc foecalem, sed ad fluxum sanguineum de quo infra, quia forte licet sit denigratus, adhuc tamen retinet foramen sanguinis aut saltem magis sanguini assimilatur quam huic melancholice foeculente. Eius autem mora denigrans ipsum secundum plurimum est in intestinis. Ab his tamen sex causis supralcriptis, licet uterque fluxus foecalis pendere possit, scilicet subtilis & crassus. Subtilis tamen penes A. frequentius fit a debilitate uirtutis digestiue, & consequenter a mala complexionione frigida. Et ideo fluxus lotius frequenter antecedit ipsum, & fit in principio sui est parua, & appetitus cibi plurimus: quâvis in fine rei perducatur propter sui putredinem ad febres & deiciat uirtutem & perducatur ad hydropisim, & ad ultimum est longitudo cum extensione dispositionis. Causæ uero secundi fluxus melancholice nigri fellei est caliditas hepatis adurens, conuertens choleram rubeam naturalem aut non naturalem in melancholiam adustam. Causæ tertii fluxus melancholici qui dicitur niger melancholicus est debilitas attractiue splenis aut eius oppilatio siue sit in porro attrahente siue in porro expellente melancholiam ad os stomachi, quare melancholia ab hepate non mundificata tãquam superflua expellitur ab ipso per melericas ad intestina ad quod concurrit multitudo generationis eius, aut propter cibos proportionales aut propter hepatis discrasiam superflue calidam adurentem, & sic conuertentem melancholiam naturalem uel subtilem partem eius in melancholiam adustam, non autem conuertentem massam sanguineam, quia esset fluxus foecalis pertinet ad primam speciem de qua supra, neque etiam choleram quia pertinet ad secundum modum de quo supra. Species autem non famose de quibus supra fiunt aut ex frigiditate congelante melancholiam aut phlegma aut ipsum adurentem. Signa. Fluxus foecalis niger est coloris nigri tendentis in rubeum. Et si est crassus est sicut foex uini aut sanguis niger congelatus. Si uero subtilis est sicut sanguis niger subtilis non congelatus.

Differt autem qui fit a mala complexionione adurentem aut congelante ab his qui pendunt ab aliis causis, quia adfunt signa malæ complexionionis non autem apostematibus, neque ulceris aut oppilationis, nec reliquarum causarum de quibus supra. Et qui est a caliditate est magis niger. Et habet nigredinem magis lucentem. Et est magis foetens. Et antecedit eum liquefactio humorum & membrorum, & fluxus uetris uirtutis, sitis, paucitas appetitus, uehementia rubedinis aquæ. Et plurimum sunt cum eo febres & egestio præcedens eum est sicut egestio febris pestilentie in uehementia febris crassitudine & tinctura coloris, & tandem in fine egreditur sanguis niger. Sed quando fit a frigiditate adfunt signa contraria. Et quando siccitas est coniuncta caliditati aut frigiditati est maior sitis & fluxus magis conglobatus, quando autem humiditas est ipsis coniuncta adfunt effectus contrarii. Si uero pendat ab ulcere aut corrosione est cum dolore in partibus hepatis & cum paucitate eius quod egreditur & remanet, scilicet in hepate & antecessione causarum facientium necessario ulcera & corrosiones, paulatim enim pus educitur, sicut paulatim in ulcere aggregatur. Et non profuit magna quantitas subito sicut in ruptura dubelati. Si uero pendat a ruptura apostematibus adfunt primo signa apostematibus, forte nodum colligendis sumpta ex grauedine crassitie dolore & febre continuis. Deinde signa dubelati siue collectionis & maturationis eius sumpta ex augmento febris doloris & cremore reliquorum accidentium. Et febres illæ sunt non seruantes ordinem. Et multoties incipiunt cum uirgibus. Et durities pulsus est testimonium magnum dubelati in uisceribus. Et aliquando paulatim resudat uirus. Et læduntur a resupinatione nedum a statione super latus. Et cum perfecta est maturatio quiescit febris, dolor & reliqua accidentia, & crescit grauitas. Et quando redeunt dolores et punctiones, & grauitas fit maior, appropinquat eruptio. Cui ergo accidit rigor subito & sedatur grauitas & dolor in loco apostemato, tunc iam eruptio facta est, & proprie quando descendit magna quantitas puris mordicans illud quod pertransit, & fortasse accidunt pulsus cordis, syncopis, & mors

propter uirtutis resolutionem. Et quandoque non solū egreditur pus immo notabilis quantitas sanguinis, aliqua uena soluta. Et quando rumpitur, ad intestina egreditur cum egestione. Sed quando ad renes egreditur cum urina. Sed quando ad uentrem, per nullam regionem egreditur sed deumescit hepar & apparet tumor circa inguina. Si uero pendat ab oppilatione aperta, præcesserunt signa oppilationis hepatis quæ multum apostemati simulantur. Absentia tamen febris facit secundum plurimum eas ab apostematibus differre. licet in eis sit maior grauitas quam in apostematibus, secunda primi. Secundo hic fluxus accedit subito, & est secundum plurimum salubris. Si uero pendat a fortitudine uirtutis apparent signa digestionis cum uirtutis constantia, & fit fluxus citro cum omnibus aut pluribus conditionibus laudabilis crisis qui ad salutem satis cito terminatur. Si uero pendat a debilitate uirtutis digestiue aut retentiuæ præcesserunt causæ debilitatis, & præcedit secundum plurimum fluxus lotius qui tandem ad foeculentum perducitur.

Signa uero fluxus fellei sumuntur ex colore eius quod egreditur nigro tendente in citrinum & odore amaro & subtilitate substantiæ, & si est per aduersionem cholere naturalis est subtilior & acuitate & mordicatione eius. Et quia in paruo tempore ducit ad dysenteriam, & præcesserunt causæ adurentes, & cum reliquis accidentibus proportionalibus & est cum foetore notabili. Signa uero fluxus melancholici subtilis adusti sunt quia habet odorem acrem, sicut acetum a quo fugiunt mulsæ, & sparsa super terram ebullit, & est acuta & uelocis impressio, & est nigra relucens non tendens in citrinum, neque in rubeum, neque in album. Si uero sit fluxus melancholice crasse genitæ per aduersionem, habens odorem acrem tendentem in ponticum nigrum, ut supra cum reluctantiæ, sed est tardioris impressio, & cum hoc tardioris euacuationis, & utraque est cum foetore notabili. Melancholia autem naturalis fluens est cum paruo foetore, pauca impressio, nigra non multum, neque relucens, neque præcesserunt causæ aduersionis, & habet odorem ponticum. Quod autem in causa sint cibi melancholici, significat ipsorum usus. Debilitas autem attractiue splenis, aut oppilationes ipsius cognoscuntur per signa propria superius posita in passionibus eius, ad quas recurre, & inferius ponenda in fluxu oppilatio. Quæ uero est per congelationem melancholice est multum crassa, pauca impressio, pauci foetoris, difficilis curæ, habens nigredinem non relucentem & odorem ponticum tendentem in acrem.

Quæ uero est per aduersionem phlegmatis aquosi habet odorem salum subtilis existens substantiæ, coloris parum nigri tendentis in album satis fortis impressio, satis faciliter curabilis satis foetens. Quæ uero est per aduersionem phlegmatis crassioris est crassa habens odorem parum acrem aut ponticum pauca impressio, difficulter curabilis parum nigra tendens in album satis foetens. Si uero sit per congelationem phlegmatis habet colorem parum nigrum cum albedine siue reluctantiæ saporis pontici cum acredine parum foetens, pauca impressio, difficulter curabilis, & signa sitigiditatis præcesserunt.

Prognostica. Primum Hip. 4. aphorismum aphorismo 21. egestiones nigre qualis sanguis sponte uenientes, id est non apparetibus signis digestionis & sine auxilio speciali & per seuerantes siue sequantur caliditatem adurentem aut frigiditatem congelantem aut indebitam mundificationem melancholice propter defectum splenis sunt pessimæ & mortales secundum plurimum. Sed cum pharmaco, aut apparentibus signis digestionis minus malum. Secundum, huiusmodi egestiones sequentes ulcus aut rupturam dubelati in hepate sunt plurimum sunt mortales. Tertium, sequens apertionem oppilationis hepatis, aut crism secundum plurimum salubres sunt. Quartum, sequentes debilitatem uirtutis quas antecedit fluxus lotius secundum plurimum mortales. Quintum, Hip. 4. aphorismorum aphorismo 22. ægritudinibus quibuscunque incipientibus, si sel nigrum sursum aut deorsum exierit mortale, ampliando aphorismum ad quancunque speciem melancholice genitæ per aduersionem, maxime per aduersionem cholere aut melancholice, & supposito quod fluxus talis melancholice sit per seuerans. Sextum, Hip. 4. aphorismorum aphorismo 23.

Io. Arculani d 4 Quibus

Quibusque ex ægritudinibus acutis aut multi temporis aut abortibus aut aliter extenuatis fel nigrum aut quasi sanguis niger exierit sequenti die moritur, id est per parum tempus post, intelligendo semper quod corpora ista sint debilitata notabiliter quod dedit intelligi per extenuationem & quod egestiones istæ sint perseverantes & sponte uenientes non præparantibus signis digestionis. Septimum. 4. aphorismorum aphorismo. 24. dysenteria si à felle nigro inchoauerit mortale ampliando, ut supra aphorismum ad quancunque speciem melancholiæ per aduersionem genitæ maxime p aduersionem cholæræ & melancholiæ naturalis. & intelligitur quod huiusmodi melancholia affixa sit & diuturnauerit in intestinis, nam excoriatio siue ulcus huiusmodi quod datur intelligi per dysenteriam est cancer ulceratus siue ulcus cæcum, quod est ex toto genere mortale & ex hoc tollitur contradictio aphorismi. 48. 6. particulæ spleneticis dysenteria si perueniens soluit ægritudinem. Illa enim melancholia à splene ad intestina deriuata facit dysenteriam transeundo & non figitur in intestinis.

Cura fluxus hepatici fœculenti nigri exigit quatuor intentiones. prima causam remouet. secunda hepar confortat. tertia corrigit accidentia. quarta ordinat debitum regimen. Si ergo iuxta primam intentionem causa huius fluxus fuerit regimen præcedens malum multiplicatum melancholiæ aut cholæræ adultæ & sanguinis aduersionem illud remouetur & inducatur regimen contrarium. Et si in causa fuerint febres adurentes sanguinem, scilicet caupon tertiana continua, synocha pestilentialis attendatur euacuationi cum phlebotomiis, & solutiuis quæ sint tamen plurimæ infrigidationis & humectationis, & secundo attendatur extinctioni caumatis febrilis sex modis. Primus cum infrigidatione aeris, & eius humectatione, qui tamen stante fluxu non debet adeo infrigidari ne materia pellatur à circumferentia ad centrum. Aer tamen inspiratus debet esse notabiliter frigidus cui semper sint admixti uapores rerum frigidarum redolentium, quibus eger delectetur. Secundus cum his quæ in ore retinètur infrigidantibus & humectantibus guttur & linguam. Tercius est alteratio per clysteria, sed stante fluxu sint mundificatiua. Quapropter aquæ hordei adduntur succi infrigidantes, sicut portulacæ plantaginis solatri semperuiuæ, & similia, oleum uiol. nenufa. & adeps renum capræ ad prohibendum excoriationem. Quartus est per cibos & potus, quapropter in cibis suis ponatur uinum granatorum, de berberis, aut acresta. Et in brodiis ex quibus debent fieri fercula bulliat lactuca, endiua, plátago, portulaca, cucurbita, & similia aut aliquod istorum. Quintus per epithimata applicanda cordi, hepatis, renibus, dorso, capiti. Sed hic duo obserua. Primum, ut hæc non applicentur nisi præcedente sufficienti euacuatione. Secundum, ut stante fluxu totum corpus aut maior pars cum his frigidis non epithimetur ne materia amplius pellatur à circumferentiis ad centrum, sic enim fluxus nimis augeatur. Sextus, per ea quæ sumuntur quæ sint infrigidantia & humectantia hepar & membra nobilia confortantia cum singulari proprietate cum stipticitate temperata, & cum hoc sint propria humori peccanti, scilicet cholæræ aut melancholiæ cum sanguine mixtæ, quæ per sui caliditatem aut putrefactionem sunt causa aduersionis sanguinis. Potus tamen aquæ frigida qui conceditur in febribus urentibus, stante fluxu non est concedendus, facile enim perduceret ad lyenteriam, aut ad fluxum chylosum. Et si causa fluxus fuerit defectus splenis in mundificando hepar, regatur secundum quod dicitur in fluxu spleneticum. Et si in causa fuerit caliditas adurentis hepatis, aut membrorum quæ sunt ultra hepar, alteretur cum infrigidantibus fortibus, quæ tamen non extinguant calorem innatum interius sumptis & exterius applicatis hepatis & cordi & dorso secundum situm uenæ chylis. Et sint confortantia, ut supra, stipticitate temperata & singulari proprietate, sed non approximentur exterius nisi prius de bita mundificatione præcedente. Si ergo adfit multitudo sanguinis, præponatur phlebotomia ex basilica aut ex communi, aut ex saphenis si in causa fuerit retentio menstruorum aut hæmorrhoidarum, postea humor dominans in sanguine mundificetur, cholera quidem cum decoctione fructuum, scilicet prunorum, tamarindorum, & mirabol. citrin. in a-

qua endiua, in cuius. 3. 3. debite colatis & expressis infundantur rhabarbari. 3. 2. per. 1. 2. horas cum ebullitione parua & debita expressione & colatione. Et si in causa fuerit humor melancholicus educatur, ut. 3. 1. epithymi mirabol. indorum. ana. 3. 2. seneg. 3. 1. bulliant in. 6. 3. aquæ lactis ad consumptionem medietatis, & coletur exprimendo, sed epithimum ponatur ad bulliendum in fine. Et si uenter non esset facile obediens, cum hac decoctione distemperetur. 3. 1. aut quantum uidetur electarii amech. Quod si non fuerit opus phlebotomia, à mundificatione iam dicta inchoandum est. Deinde alteretur hepatis & cordis dyscrasia cum frigidis sæpe dictis, & similiter dorsum siue regio uenæ chylis cum infrigidante Gal. aut similibus sicut oleo ros. cum quarta parte acetii. Similiter sumat frigida de quibus superius in fluxu cholærico. Quod si nimia frigiditas hepatis aut membrorum quæ sunt ultra hepar fuerit in causa, educatur prius melancholia cum decoctione statim posita. Sed loco electarii hamech ponatur diasene, aut exhibeantur pillule ad hanc intentionem. In quibus tamen ponatur mirabol. nigri derelinquētes aliquod uestigium constrictionis. Et regatur splen si deficeret ab attrahendo melancholiam, aut propter debilitatem aut oppilationem, ut infra in fluxu spleneticum. Postea calefiat hepar cum interius sumptis, sicut syrupo de absinthio, de eupatorio, cum syrupo de epithymo, cum aquis absinthii, buglossæ, & similibus. Et ex confectionibus conueniunt diaga longa, diatriopipericon, diachalametum, diamuscum. Item theriaca & mitridathum. Et si opus esset calefacere & humectare conueniunt zucharam buglossatum, zucharam boraginatum cum passulis auellanis parum torrefactis & silticis. Et exterius applicentur oleum de spica de absinthio cum tantundem uini potentis & pauco acetii & aromatizentur cum garioflis & spica, & similia modo tuo elige. Et hæc eadem quæ dicta sunt, optime ualent ad complendum secundam intentionem quæ est hepatis confortatio, modo habeant stipticitatem moderatam, & singularem proprietatem ad hepar. Si uero fluxus fœculentus pendeat ab ulcere remanente post rupturam apostematis aut pēdente ab aliis. primo remouetur causa fluxus mundificando & consolidando partem ulceratam. Secundo hepar confortetur. Tercio accidentia corrigantur. Quarto ordinetur regimen. Primo mundificetur hepar cum aqua hordei, aut zuchari, aut mellis permixtis cum melle ros. oxymelle simplici aut syrupo acetoso simplici secundum exigentiam dyscrasiæ & putredinis ulceris. qui bus utēdum est aliquibus diebus donec pus minoretur, post ea consolidetur cum succi plantaginis. 3. 2. succi end. 3. 5. boli. ar. 3. 1. Et si opus erit minori infrigidatione his addatur aliquid thuris aut masticis, item diarrhodon abbatis, & triasandali permixti cum his aut similibus confortant & consolidant. Et si opus esset calefacere eligatur syrups de absinthio, diarrhodon de succis herbarum. Item trochisci diarrhodon de rhabarbaro, & cum his compleatur prima & secunda intentio. Si uero fluxus fœculentus pendeat ab apertione oppilationis aut à uirtute ceticante, sinatur natura operari & adiuetur si defecerit. Vbi uero fluxus nimium excederet quem uirtus non bene ferret sedetur secundum opportunitatem. Si uero fluxus fœculentus pendeat à debilitate uirtutis quem frequenter antecedit lotius, remouetur causa eius, quæ secundum plurimum est mala complexio aut calida debilitans contentiua, aut frigida debilitans digestiuam cum his quæ sæpe supra dicta sunt. Et cum eisdem hepar confortetur ut supra. Et corrigantur accidentia secundum exigentiam ipsorum, & ordinetur regimen secundum causæ exigentiam.

Cura uero nigri fellei, & nigri melancholici exigit intentiones quatuor suprascriptas. Sed properandum est maxime in cura nigri fellei & melancholici subtilis propter fortitudinem suæ impressionis. Ergo quam primum potes euacua huiusmodi humores. 3. 3. decoctionis prunorum tamarindorum, mirabo. indorum, epithymi & seneg. in qua post debitam colationem & expressionē infunde rhabarbar. 3. 1. per. 1. 2. horas, deinde coletur exprimatur & secum misceatur. 3. 1. electarii hamech uel quantum uidetur. Et eadem medicina conuenit in melancholia facta per aduersionem phlegmatis. Sed in melancholia naturali aut genita p cogelatione datur

detur diaphanē ab .s.s. usque ad .s.i. cum aqua abinthij, infusio nis epichymi & mirabolanorum indorum. Post euacuati- nem alteretur hepatis dyscrasia cal. aut frig. secundum exi- gentiam. medicina aut alteratiue tam interius sumenda quam exterius applicanda patere possunt ex supradictis quæ cum hoc quod alterent sint etiam hepatis confortatiue iux- ta secundam intentionem. Sed pro tertia intentione prohi- benda est excoriatio intestinorum, dolor est sedandus cum clysteribus & reliquis proprijs ad hoc, quæ requirantur in cura dysenteriae & in cura generali fluxus. Tu tamen debes uti clysteribus magis aut minus infrigidantibus, & magis & minus abstergentibus & aliquando stupefactiuis secun- dum humoris diuersitatem & necessitatis exigentiam, quo- rum copiam in cura dysenteriae & cura generali fluxus ha- buisti. Et reliqua accidentia corrigantur secundum quod ibi dictum est &c. Sed pro quarta intentione regimen sex rerū declinet ad frigidum aut ad cali. secundum exigentiam dyscra- siae. Licet secundum plurimum debeat declinare ad frigidū, immo aliquando debet esse notabiliter frigidum. Similiter quandoque debet declinare ad humid. quandoque ad sic. Et aliquando cum temperamento actiuarum aut passiuarum aut utrarumque.

Similiter diæta debet esse aliquando tenuis, aliquando crassa secundum longitudinem aut breuitatem morbi & uir- tutis tolerantiam. Quæ autem sit huiusmodi, requiratur in cura generali fluxus.

De fluxu hepatico sanguineo.

Hic fluxus quantum ad quid nominis & quid rei est fa- tis ex dictis manifestus. Est autem hic sanguis quan- doque rubescens, quandoque niger, & niger est foetens, aut non foetens. Et quicunque istorum quandoque est multus, quandoque paucus, quandoque nouus quando- que antiquus, quandoque continuus quandoque interpollatus siue periodicus, quandoque criticus quandoque symptomaticus.

Causa rubei prima est scissura uenæ portæ aut meseraicæ absque scissura carnis aut panniculi tegētis ipsas facta à cau- sa primitiua aut à multitudine extendente aut ab acuitate corrodeute. Si enim simul cum ipsis scinderetur caro & pan- niculus tegens ipsas, sanguis exiens reperet ad concauū uen- tris, sicut scissura uenæ chylis aut emulgentis absque scissura rei regentis ipsas est causa mictus sanguinei. Secunda cau- sa est multitudo eius supra illum qui necessarius est pro cor- pore nutriendo aut acuitas eius stimulanis expulsiua. Terti- a causa est oppilatio ramorum uenæ chylis aut portæ, qua- re sanguis in hepate generatus ad membra nutrienda transi- re non ualet sed tanquam superfluum ab eo ad intestina expel- litur. Quarta causa tenens se ex parte corporis est repletio eius, apostema, oppilatio, debilitas attractiua ipsius, quarum causas require in cap. de fluxu sanguinis à toto.

Causa autem nigri non foetentis est longa mora eius in intestinis aut multa admixtio humoris melancholici, aut fri- gidity congelans. Sed causa nigri foetentis est mora adeo longa ut foeteat. Item caliditas putrefaciens.

Signa. Differt hepaticus sanguineus à fluxu intestinali san- guineo per signa sex superius posita in princ. huius cap. Sed differt à sanguineo proueniente à toto, quia cum hoc adsunt nocumenta hepatis, cum illo non. sed adsunt signa nocumen- ti membrorum ultra hepar, scilicet oppilationis, apostema- ti, repletionis, debilitatis attractiue & similibus. Pro qui- bus recurre ad cap. de fluxu sanguineo à toto. Signa scissuræ uenæ portæ sunt ipsa causa primitiua, scilicet calus, offensio aut percussio super hepar si præcesserint. Et dolor quidā sen- satus circa concauum hepatis, & quod sanguis egreditur in ma- gna quantitate & subito, & non facile sistitur neque cito. Sed quod superfluit supra illum qui est necessarius pro corpore nutriendo cognoscitur quia sumit cibum maioris quantita- tis aut magis nutritiuum quam cōsueuerit. Sed quod sit acutus cognoscitur ex præcedenti acuitate cibi & quia mordicat lo- ca per quæ fluit, & forte tendit in citrinum. Sed quod sit oppila- tio in uenis hepatis cognoscitur per signa superius posita ex grauedine, tumore, & similibus, quæ melius in gibbo quā in concauo percipiuntur. & quando sanguis uenit à gibbo est magis spiritus, & depuratus, & oppilatio gibbi magis cōmu- nicat spiritualibus, sicut oppilatio concaui magis communi-

cat stomacho, & qui est ex oppilatione cito absconditur & est periodicus. Et differt à lotiuo, quia hic est purus ille si- cut lotura carnis.

Prognostica. Primum, hic fluxus secundum plurimum cu- ratur, sed non apud negligentes & inexpertos. Secundum, fluxus sanguinis nigri foetētis deterior est quā fluxus nig- ri non foetentis. Tercium fluxus sanguinis rubei deterior est quā sit fluxus nigri non foetentis cui concordat aphor. 25. quartæ particulæ. Sanguis quidem sursum qualiscunq; fuerit per os malum, deorsum uero bonum si niger fuerit.

Cura huius fluxus sanguinei hepatici rubei quārum ad om- nes causas eius præterquam ab oppilatione patere potest ex cura fluxus sanguinei à toto de quo superius factum est speciale cap. Sed pro cura huius hepatici sanguinei penden- tis ab oppilatione recurratur ad cap. de fluxu chyloso de quo supra, & ad cap. de fluxu oppilatiuo, de quo infra. Sed cura sanguinei nigri foetentis aut non foetentis est, ut primo pro- curetur ipsiuseductio cum clysteribus mundificantibus aut solutiuis quæ uentrem lauant aut soluunt comprimendo, aut mixtis ex his, & est præstantius. deinde remoueat causa ni- gredinis sanguinis & putoris eius. Si enim causa sit admix- tio humoris melancholici educatur cum his quæ dicta sunt in fluxu melancholico. Si uero in causa sit caliditas putredi- nalis aut frigiditas congelans alteretur cum his etiam quæ ibidem dicta sunt.

De fluxu hepatico lotiuo.

Fluxus hepaticus lotiuus est descriptiue fluxus rei quæ est sicut lotura carnis recentis, est. n. aquositas tendens in rubedinem sanguineam.

Causa eius immediata est duplex, scilicet defectus dige- stiue siue ex se principaliter deficiat siue ex defectu conten- tiuæ quæ non tanto tempore retineat chylum in hepate do- nec digestiua complete ipsum digerat. Hic autem defectus digestiue est duplex, aut quia diminute ipsum digerat immu- tando ipsum debilitate uersus naturam sanguinis, aut quia cor- rupte ipsum digerat corrumendo ipsum in aquositate si- cut in fluxu aquoso dictum est. Sed in hoc lotiuo nō est tan- ta corruptio quin appareat alicuius sanguinis uestigiū. Se- cunda causa est debilitas sequestrationis aquositaris à sangui- ne propter debilitatem hepatis & renum.

Causa autem harum debilitatum hepatis, licet possit esse omne genus malæ complexionis cum est immoderata. 2. tech- ni. secundum plurimum tamen digestiua hepatis debilita- tur à frigido, & retentiua à calido & hum. cum superfluit. Apostemata quoque & oppilationes sunt causa harum debi- litatum. Et debilitatur etiam per communitatem aut à toto aut à membris particularibus sicut superius in fluxu aquoso & hydropo dictum fuit.

Causa autem defectus attractiue renum secundum pluri- mum est ipsorum frigiditas aut oppilatio aut apostema.

Causæ autem primitiue sunt nimis potus aquæ & prop- rie hora incongrua, & similiter usus fructuum aquosorum & omnis superfluius potus & comestio.

Signa. Differentia inter diminutionem digestiue & debi- litate retentiue hepatis haberi non possunt per egestionem lotiuam, utriusq; enim est chylus diminute digestus qui cum sua albedine tendit in rubedinem. Sed differentia inter de- fectus ipsarum habetur per causas. Si. n. adsit mala comple- xio frigida uerisimiliter iudicandum est esse debilitatam di- gestiua. Si uero adsit mala complexio calida aut hum. iu- dicandum est esse debilitatem contentiuam. Sed cōtra à ca- liditate superflua potest digestiua hepatis diminui. Ergo si- gnum erit dubium. Si. n. sit diminuta digestiua, aut laesa reten- tiua. Ad hoc dicit quod digestiua à caliditate superflua cor- rumpitur & non diminuitur nisi forte rarissime. Quapro- pter si erit corrupta digestiua exiens erit aquositas tendens in rubedinem sanguineam. Si autem laesa retentiua erit chy- lus tendens in rubedinem sanguineam: facile autem discer- nitur inter chylum, & aquositatem. Forte alia essent in itan- tia, sed nolo ut tantum labores. nam quæcunq; ipsarum laesa sit eadem est cura. & remotio causæ lædētis. Si uero causa hu- ius fluxus sit defectus sequestrationis aquositaris à sanguine propter defectum renum, gestio lotiua secundum plurimum erit aquositas multa cum paucio sanguine permixta qui san- guis

quis forte residebit aquositate, non autem erit aquositas cum sua albedine tendens in rubedinem sanguineam, inter quas duas est differentia, quia in prima sanguis residet, in secunda non, & erit paucitas urinae non solum cum fluxu adest, quia est commune omnibus fluxibus iuxta aphor. ultimum quartae particulae, urina multa noctu facta modicum secessum significat, & econverso, sed etiam ante fluxum. Signa autem aegritudinum hepatis superius habuisti. Sed signa aegritudinum renum inferius ponentur si Deus uoluerit.

Prognostica. Primum. Hic fluxus secundum plurimum curatur nisi pendeat ab apostemate. Secundum si non debite curatur ducit ad ascitem, aut ad fluxum foeculentum de quo supra.

Cura huius fluxus est proportionalis curae fluxus aquosi de quo supra. Et exigit quatuor intentiones. Prima causam remouet. Secunda uirtutem hepatis, scilicet digestiuam & retentiuam confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat regimen. Pro executione primae intentionis. Si fue rit multiplicata aquositas, educatur uel per secessum, uel per urinam, uel per sudorem. nunc per unam, nunc per alteram. Non autem per omnes simul, sicut dictum est in cura fluxus aquosi. Deinde nocumenta hepatis corrigantur ut ibi. Si autem in causa fuerit solum diminutio digestiuae, & non corruptio ita ut solum sit chylus diminute digestus, alteretur hepatis discrasia quae est in cap. & similiter cetera eius nocumenta corrigantur sicut dictum fuit in passionibus hepatis. Tercio confortentur uirtutes hepatis cum his quae simul hepar confortent & corrigant nocumenta ipsius: & propria in confortatione digestiuae dicta sunt in fluxu aquoso. s. passulae, fistica, auellanae, crocus, cinnamomum, hepar adip & caro limaciarum. Et in causa calida endiuiia, & composita sunt sicut electarium de passulis uerificatum per Auicennam in capitulo debilitatis hepatis in causa frigida, sed in causa calida diarrhoea & triasandali. Applicata etiam exterius ad hoc conferunt calida aut frigida secundum exigentiam sed in confortatione retentiuae sunt magis siccifica, quae habeant etiam singularem proprietatem ad hepar, & laudanum cum uino & potus succi & seminis linguae arietis habent singularem proprietatem. Et corrigantur accidentia sicut dictum fuit in cura generali fluxus. Et regimen ordinetur in contrarium discrasiae, & sit dicta tenuis aut crassa secundum longitudinem aut breuitatem aegritudinis. Sit tamen ex his quae praebent nutrimentum bonum paucarum superfluitatum & facile digerantur, & est praestantius ut cibus partiatur, sic enim chylus inde genitus melius retinebitur & digeretur.

De fluxu hepatico foetido.

Hic fluxus descriptiue est fluxus rei foetidis, siue sit humor aut sanies, aut substantia hepatis corrupta.

Species non habet nisi quosdam modos differentes secundum diuersitatem eius quod egreditur paucitatem aut multitudinem eius, continuationem aut interpolationem.

Causae humoris foetentis sunt aliquando longa mora humoris, & proprie cum retinetur in loco non naturali sicut in intestinis. Licet tamen in hoc & in quocunque alio foetente sit necessarium concurrere calorem extraneum putredinalem. Similiter quandoque humor putrescit in ipso hepate & tanquam superfluum expellitur. Tercio in causa est aliquando ulcus aut apostema hepatis a quibus sanies foetens fluit. Quarto in causa est ipsa hepatis putrefactio per quam aliquid de substantia hepatis corrupta fluit per meseraicas ad intestina.

Signa sunt ipse foetor rei quae egreditur, sed humor foetens & sanies & substantia hepatis corrupta distinguuntur per calorem & substantiam, & quia sanies descendit in aqua, humor secundum plurimum supernat. Substantia autem hepatis est spissior, neque facile diuisibilis.

Prognostica. Hic fluxus si pendeat ab humore secundum plurimum curatur, si ab ulcere aut apostemate hepatis difficillime & raro, si a substantia hepatis putrida nunquam curatur nisi sit res modicissima.

Cura. Hic fluxus exigit quatuor intentiones saepe dictas. s. remotionem causae perficiendum. Primo cum mundificatione harum rerum foetentium quae nullo modo debent costringi, si tamen fluxus sit excedens quem uirtus nequeat tolerare aliquantulum cohibeatur, sed non restringatur nisi perfecta

mundificatione, quae mundificatio fiat cum clysteribus mundificantibus & cum solutiuis secundum exigentiam humoris si humor corruptus sit educibilis cum solutiuis propriis sicut cholera phlegma aut melancholia, quorum solutiuium copiam superius habuisti in cura generali fluxus. Si uero sit sanguis educatur cum lenitiuis abstergentibus, & secundo alteretur calor putredinalis cum frigidis interius & exterius applicitis. Si uero in causa sit ulcus mundificetur, & similiter mundificetur substantia hepatis corrupta prohibendo ulteriorem putredinem. Ad quod ualet aqua decoctionis hordei aut mellis cum oxymelle aut syr. acetolo simplici, & reliquis quae dicta sunt superius in cura fluxus foeculentis, ad quam recurre. Secundo confortetur hepar cum propriis contrariis tamen ipsius discrasiae. Tercio corrigantur accidentia secundum quod oportet. Quarto ordinetur debitum regimen in contrarium discrasiae, sicut dictum fuit supra in fluxu foeculento. Et hic fluxus foetidus potest esse a toto, cuius causa, signa prognostica, cura, sunt proportionales his quae dicta sunt in hoc fluxu hepatico foetenti.

De fluxu hepatico uirulento.

Hic fluxus descriptiue est fluxus rei subtilis tendentis in citrinitatem aut rubedinem ad modum uirulentiae.

Species non habet, nisi modos diferentes secundum colores. Cum aliquando & proprie qui uenit a mesenterica siue a mesenterio magis tendat in citrinum. Qui uero ab hepate magis in rubrum. Distinguitur etiam secundum quantitatem maiorem aut minorem & secundum continuationem aut interpolationem.

Causae sunt tres. Prima liquefactio sanguinis & humorum a caliditate forti & tandem ipsius substantiae hepatis. Secunda est refusio apostematis calidi nondum manifeste rupti in hepate aut in meseraicis. Tertia causa est uirtus expellens huiusmodi humoris critice aut symptomaticae.

Signa sunt inflammatio hepatis non aduicta, sed liquefacta. Item signa apostematis calidi sub cute subtili celati non profundi, quia non refudaret, inter quae duo distinguitur, quia frequenter est huiusmodi caliditas sine febre, sed apostema nunquam absoluitur a febre. Item cum apostemate ad sunt signa apostematis de quibus supra. Differt autem uirtus proueniens ab apostemate meseraica siue mesenterica a proueniente ab apostemate hepatis. Primo per signa propria distinguuntur inter utrumque apostema, de quibus supra in passionibus hepatis, inter quae est febris quae fortis est in apostemate calido hepatis, sed in apostemate meseraica leuis. Secundo, quia uirtus hepaticum magis declinat ad rubedinem, sed uirtus meseraica cum albedine declinat ad citrinitatem. Cognoscitur autem hunc fluxum esse criticum, quia est cum omnibus aut pluribus conditionibus laudabilis crisis, & cum ipso sequitur festina salus aegritudinis praecedentis. Symptomaticus autem est cum nullis aut paucioribus conditionibus laudabilis crisis.

Prognostica. Primum. Hic fluxus si pendeat a caliditate liquefaciente sanguinem & humores curatur secundum plurimum, si uero liquefiat substantia hepatis aut pendeat ab apostemate difficillime curatur. Secundum. Hic fluxus facile transit in foeculentum cum per intensionem aut ex dispositione passio caliditas calefactiua efficitur aduictiua. Tercium. Ex hoc liquefactiua quandoque peruenit ad educationem substantiae hepatis, & est morale, ut infra. Quartum. Factus a uirtute critice aut symptomaticae expellente secundum plurimum est salubris.

Cura. Hic fluxus si pendeat a caliditate liquefaciente exigit quatuor intentiones supra scriptas. Prima remouet causam mundificando uirulentiam cum decoctione prunorum tamarindorum, mirobolanorum citrinorum, cum qua distemperetur drachma una mannae aut drachmae sex calsia: aut in qua infusa sint drachmae duae rhabbarbari & expressae. Deinde in frigidetur caliditas hepatis liquefaciens cum exterius & interius applicitis, quorum copiam superius habuisti in fluxu foeculento.

Cura tamen liquefactionis substantiae hepatis pro magna parte pendet ex cura fluxus liquefactiui, de quo superius est factum speciale capitulum. Si uero pendeat ex refusioe apostematis hepatis mundificetur cum aqua hordei sumpta cum

eum triafandalis, prius tamen præmissa phlebotomia, & præmissio reliquo regimine dicto in cura apostematum hepatis, calidorum. Deinde si apostema manifeste rumpatur attendatur mundificationi & prohibitioni putrefactionis substantiæ hepatis, & tandem ilcus consolidetur cum his quæ dicta sunt in fluxu feculento, ad quod recurre. Si uero hic fluxus pendeat à uirtute, symptomatice aut critice humores uirulentos expellente, sinatur si per se sufficiens fuerit. Si uero deficiat adiuuatur. Si uero fluxus superfluit aliquantulum compescendus est, non tamen ex toto retinendus nisi facta sufficiat mundificatione. Et secundo in hoc fluxu quantum ad omnes eius species attendatur in toto curæ processu cōfortationi uirtutum hepatis cum his quæ sunt contraria ipsius discrasie, & confortent ipsum stipticitate moderata & singulari proprietate, de quibus supra. Tertio corrigantur accidentia secundum opportunitatem. Et quarto ordinetur regimen in contrarium discrasie hepatis.

De fluxu hepatico qui est substantia hepatis aut sibi similitur.

NE contingat error est sciendum quod aliquando in fluxu egreditur res nigra non facile diuisibilis quæ est substantia hepatis ab hepate separata per putrefactionem aut aduersionem substantiæ ipsius, & cum huiusmodi hepatis substantia descendat per mēseraicas ad intestina opus est ut sit non magnæ quantitatis, sicut aliquando descendit cum urina. Et est sicut orobus differens ab orobo à renibus deciso per colorem tendendum in rubeum. Orobus autem renalis tendit in citrinum ut superius dictum fuit. Item per modum substantiæ, non enim est orobus renalis facile fragibilis sicut hepaticus. Aliquando uero egreditur in fluxu non proprie substantia hepatis, sed quoddam similitur substantiæ hepatis in sua naturali dispositione existens in colore rubeo in modo substantiæ eius, est tamen mollius, imo quod plus est cum diuiditur in partes apparent sicut uenulæ duriore reliqua substantia, sicut apparent in uero hepate cum in frustra fecatur. Et per sepe uidi egredi huiusmodi substantiam in pluribus frustis diuisum usque ad quantitatem quinque librarum, inter quæ reperiebatur frustum. s. lib. om. hinc hepatis simile.

Causæ primi sunt putredines & aduersiones substantiæ hepatis, necnon ulcera putrida & corrosiua, siue genita sint ab apostematibus ruptis, siue à causis aliis.

Causæ autem secundi, scilicet rei assimilatiæ substantiæ hepatis est fluxus sanguinis ab hepate ad intestina gracilia, qui sanguis est pronus ad coagulationem ratione suæ complexionis, & modi substantiæ. Quapropter à uirtute naturali intestinorum directæ à uirtute digestiua hepatis coagulatur in rem similem substantiæ hepatis cum pronitate sua ad hanc conuersionem. nam unumquodque agens intendit pasci assimilationem.

Signa distinctiua inter substantiam hepatis corruptam nigram foetentem, & id quod assimilatur substantiæ hepatis fani quod in rei ueritate non est nisi sanguis coagulatus sunt satis nota. Sed distinctiua inter substantiam hepatis corruptam & sanguinem feculentum corruptum sunt, quia feculentus corruptus est in magna quantitate, & habet frusta magna, & parum dura & facile diuisibilia. Sed e contra se habet hepatis substantia corrupta. Similiter sunt signa distinctiua inter frustum hepatis ueri & sanguinem coagulatum sibi assimilatum, quia uerum hepar est durum non facile diuisibile, neque liquefit in aqua calida sicut sanguis coagulatus. Signa autem causarum manifesta sunt ex superscriptis in fluxu feculento.

Prognostica. Primum. Fluxus substantiæ hepatis corrupte est mortalis secundum plurimum nisi quod egreditur fuerit modicissimum. Sicut e contra fluxus sanguinis coagulati similis hepatis fano est sem plurimum salubris, significat enim fortitudinem hepatis & satis bonam sanguinis dispositionem cum constantia uirtutum intestinorum gracilium.

Huius cura, cum est substantia hepatis corrupta exigit quatuor intentiones superscriptas. Prima causam remouet. Secunda hepar confortat. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat regimen. Quæ omnes intentiones sunt complere

da sicut superius dictum fuit in fluxu feculento à putredine & corrosione siue ulceribus putridis & corrosiuis. Si uero sit fluxus sanguinis coagulati, primo sanguis ille educatur cum clysteribus mundificantibus & potionibus sicut est aqua hordei, cum oxymelle simplici, & apud maiorem necessitatem addantur. 4. grana coaguli leporis uel hedi. Aut exhibeatur cal. 5. 1. cum aqua decoct. mellis. Postea intendatur ad curam fluxus sang. ab hepate ad intestina cum his quæ superius dicta sunt in cura fluxus hepatici sanguinei ad quam recurre, non enim est bonum toties idem replicare. nam sic uolumen nimis excreceret. Et sic Deo dante sit factus finis huic fluxui hepatico super cæteras materias difficillimo tam ad cognoscendum quam ad operandum pro quo ipsi gratias ago infinitas.

De fluxu splenetico.

Cap. 6.

Ic descriptiue est fluxus factus uitio splenis, & est secundum plurimum melancholicus. qui est hic aliquando multus aliquando paucus, quandoque criticus, quandoque symptomaticus, quandoque periodicus, quandoque sine periodicis.

Causa in genere est triplex. Prima est defectus mundificationis melancholiæ ab hepate, quare superfluens expellitur per mēseraicas ad intestina. Hic autem defectus mundificationis est aut propter oppil. in poro siue uena ortum habente à uena portæ & terminata ad splenem ad hoc principaliter ordinata ut deferat melancholiam superfluentem ab hepate ad splenem, hæc autem oppilatio est sem plurimum, coarctatoria & melancholia crassa meatum implente. Et aliquando hic defectus est propter debilitatem attractiua splenis aut à mala complexionem quæ sem plurimum est frigida aut propter apostema & duritiem eius aut solutam continuitatem. Secunda causa principalis est defectus expulsiōis melancholiæ ad os stomachi quæ naturaliter debet ad ipsum fluere ad famem excitandam, hic autem defectus est aut propter oppilationem in uena per quam deferitur melancholia ad os stomachi, quæ etiam sem plurimum est coarctatoria ab humore melancholico, aut accidit propter debilitatē expulsiua splenis quæ frequenter est à siccitate superflua, licet possit ab omni genere egritudinis contingere. Tertia causa principaliter fluxus est multitudo melancholiæ in splene cum apostemate aut sine, ad cuius expulsiōem natura irritata tandem mouetur aut sola aut medicinali auxilio adiuta, & sic expellitur ad hepar, & postea per mēseraicas ad intestina. Si uero expelletur per uenam terminatam ad os stomachi faciet uomitum melancholicum, & forte faciet fluxum melancholiæ expulsiua à stomacho ad intestina, & ideo cum expellitur aliquando per utranque uiam accidit simul uomitus & secessus melancholicus. Licet etiam uterq; possit contingere ab hepate simul expellente per mēseraicas terminatas ad stomachum & intestina. Reliquæ autem causæ, scilicet defectus hepatis in expellendo melancholiam ad splenem aut superflua generatio melancholiæ supra illam quæ est pro splene necessaria prouenit ex defectu hepatis aut ex regimine non conuenienti, & non appropriantur spleni.

Signa, fluxus spleneticus cognoscitur, quia quod egreditur sem plurimum est melancholicum. Et cognoscitur defectus mundificationis melancholiæ ab hepate, quia sem plurimum splen est extenuatus. Iste defectus si proueniat ex debilitate attractiua splenis propter aliquam suam egritudinem cognoscitur per signa egritudinum eius de quibus supra. Si uero ab oppilatione uenæ deferentis melancholiam ab hepate ad splenem, sentitur grauitas inter hepar & splenem cum cauteria egritudinum splenis. Si uero proueniat ex defectu expulsiōis melancholiæ ad os stomachi, non accidit fames debitis horis, sicut consueuerat & splen est plenus & tumens secundum plurimum. Cuius defectus si causa fuerit debilitas expulsiua, aderunt egritudines splenis, de quibus supra in propriis cap. Quæ si non fuerit erit ex oppilatione poro, siue uenæ deferentis melancholiam ad os stomachi. Si uero in causa fuerit multitudo materiæ melancholiæ in splene, ex tumore, grauitate, & tensione comprehenditur. Differt autem apostema splenis à duritie non apostemosa per febrem & dolorem, & cætera signa de quibus supra in propriis cap.

Prognostica.

Prognostica. Hic fluxus à uirtute factus cū omnibus aut pluribus conditionibus laudabilis crisis soluit ægritudines melancholicas. f. duritiem splenis, apostema eius, quartanam, melancholiam myrachiam, splenicam & cerebralem. Si uero sit sine his, secundum plurimum mortalis. Reliqua prognostica querantur in cap. generali fluxus, & in fluxu hepatico & melancholico.

Cura huius fluxus exigit quatuor intentiones. Prima remouet causam. Secunda confortat splenem. Tertia corrigit accidentia. Quarta ordinat regimen. Si ergo in causa fuerit oppilatio, curetur perficiendo has intentiones, sicut infra dicetur in fluxu oppilatio. Si uero in causa fuerit debilitas attractiua splenis propter malam complexionem frigidam, Primo mundificetur melancholia cū decoct. epithymi apud Mes. cuius potest exhiberi circa. 3. 1. & diafene est proprium, aut exhibeatur istud. R. senæ, mirobo. indorum, ana. 3. s. epithymi. 3. 2. zingib. 3. s. aquæ lactis caprini. 3. 2. aut exhibeantur pilulæ istæ. R. mirobo. indorum senæ, pilularum alephanginarum ana. 3. 1. zingib. gra. 1. fiant pilulæ. 7. cum aqua sco lopendriæ, & fortiores istis essent pilulæ indæ & de lapide lazuli. Sed in fluxibus communiter leuia sufficiunt. Et ab ipsis est inchoandum, imo in multis si daretur medietas dosis istorum solutiuum sufficeret, & si materia esset plurima melius esset abstinere. Deinde datur aperitiua sicut hoc. R. sco lopen. tamarisci, an. 3. 2. corticium radicis capparorum. 3. s. sem. agni casti. 3. 2. contundantur crasso modo & bulliant in lib. 2. aquæ ad consumptionem medietatis & coletur cū expressione cuius exhibeantur. 3. 3. cum. 3. 1. s. syr. aceto. compositi, & super splene ponantur uentose absq; scarificatione, & emplastra attrahentia, & si fluxus superfluerit restringatur & ex propriis simplicibus est xyloaloes, & aqua myrti, aut syr. eius & ex compositis micheleta. Si uero in causa fuerit superflua quantitas melancholiæ mundificetur cum his quæ dicta sunt. Et si splen fuerit oppilatus aut apostematus cæteris communicantibus fiat phlebotomia basilicæ, aut saluætellæ sinistræ. Quod si causa fuerit debilitas expulsiuæ splenis ad os stomachi facta mundificatione, ut prius, datur aperientia de quibus supra. Tercio corrigatur mala complexio splenis quæ secundum plurimum est sicca, & quæcunque alia ægritudo fuerit in causa. Quarto super ore stomachi ponantur attractiua sicut uentose & emplastra attrahentia. Si uero fluxus melancholiæ ad os stomachi superflueret mundificetur, ut prius, cum his quæ nullo modo sint nomitiua. Sed in casu immediate præcedenti euacuatiua melancholiæ debent esse pro parte nomitiua. Secundo confortetur stomachus ne recipiat cum syr. de mentha, de myrto, miua cydoniorum & similibus, & etiam cum ceratis, unguentis, emplastris, & epithimatis stomacho applicitis. Tercio ponantur uentose sine scarificatione, primo super splene, deinde immediate super hepate. Et in omnibus his casibus, peracta prima intentione expediatur secunda. f. splenis confortatio exhibendo cappare & diamuscum dulce, aut zuch. boraginatam aut buglossatum cum aqua end. & tamarisci, & in summa ea quæ confortant sine propria per uirtutem terriam moderata stipticitate participantia & contraria discrasie splenis. Pro tertia intentione. f. correctione accidentiū prohibeatur excoariatio intestinorum cū clysteribus mundificantibus in quibus ponatur adeps renum capræ & subueniatur in dolore ipsorum & in reliquis accidentibus sicut dictum fuit in generali cura fluxus. Pro quarta intentione, sit regimen declinans ad calidum, aut ad frigidum secundum exigentiam discrasie, sed secundum plurimum ad hum. Et sit dicta tenuis aut crassa secundum tolerantiam uirtutis, & longitudinem aut breuitatem ægritudinis, & sit generatiua boni sanguinis nō melancholici, & sit constrictiua, aut aperitiua secundum exigentiam intentionum, quas intendis perficere. Et sic cum auxilio Dei, cui gratias ago immortales, sunt expeditæ undecim species fluxus, penes causam materiale, in qua, quarum primæ quinque se tenent ex parte totius. Reliquæ sex ex parte membrorum particularium. Sequitur iam ut absoluamus species fluxus se tenentes ex parte causæ materialis obiecti quæ fluxu expellitur, licet multæ ex his iam absolutæ sint, imo maior pars in fluxibus in præcedentibus. Relinquuntur enim solum tres species penes hanc causam, quas si Deus uo-

luerit expediemus, scilicet fluxus stercorosus, fluxus uermium & fluxus lapidum.

TRACTATUS TERTIVS DE speciebus fluxus sumptis à causa materiali obiectiua continens tria capitula.

De fluxu stercoroso.

Cap. 1.

Fluxus stercorosus descriptiue est fluxus stercorum in quantitate exuberante supra id quod est conueniens. Est autem stercus superfluitas primæ digestionis recipiens formam substantialem in stomacho, licet in intestinis accidentaliter perficiatur. Modos habet differentes secundum magis & minus. Sunt enim stercora aliquando magis dura & compacta, aliquando magis liquida & fluentia, item aliquando cum multa mixtione humorum. f. phlegmatis & utriusque cholerae, aliquando sine: item recipiunt differentias penes multitudinem eius, quod egeritur tam secundum quantitatem continuam quam discretam.

Causæ eius sunt multa quantitas cibi, item qualitas eius, quia, scilicet parum eius transmutatur in chylum, plurimum in superfluitates, sicut sunt fructus, olera, & similia, quorum multum parum nutrit. Item paucitas eius quod ad hepar & mēbra attrahitur, siue proueniat ex defectu stomachi, & intestinorum non debite immutantur aut non debito tempore retinentur, donec hepar & meseraicæ sugat, quod eis pertinet, aut ex defectu hepatis, & meseraicarum propter debilitatem attractiua aut oppilationem, & causas superius dictas in fluxu chyloso, aut propter defectum membrorum quæ sunt ultra hepar, quia repleta nimis aut debilitate attrahentia aut oppilata, sicut superius dictum fuit in fluxu sanguineo. Item tertio multitudo eius quod ex phlegmate aquositate, & utraque cholera redit ad intestina, & totū cum stercore permixtum, stercore dominante nomine stercoris appellatur. propterea dicimus aliquod stercus esse magis cholicum, aliquod phlegmaticum, aliquod melancholicum, & forte humilimodi humores ad intestina delati uirtute intestinorum stercorizantur.

Signa patent ex his quæ dicta sunt in fluxu sanguineo, & chyloso, ad quorum capitula recurre.

Prognostica. Primū, hic fluxus secundum plurimum curatur si debite tractetur. Secundum, difficile est, & non bene tutum medicinaliter permutare naturas, & hominum consuetudines. Sunt enim quidam naturaliter egerentes semel in die, quidam bis, quidam ter quater aut pluries. Quendam de Cauaiono Veronensi uidi ascillantem tantum semel omnibus. 22. diebus & sic se habuerat per totum decursum uitæ suæ. Tercium, homines multum permutantur ex decursu ætatis, iuxta aphor. 22. secundæ particule. Quibuscunque iuuenibus existentibus uentres humectantur his senescentibus exiccantur & e contra. Quia aphorismus est ex contragentibus æqualiter.

Huius cura exigit tres intentiones. Prima ut causæ corporeæ si quæ sint remoueantur scilicet oppilationes malæ complexionis stomachi, intestinorum, hepatis, & membrorum quæ sunt ultra hepar, & sic de singulis ægritudinibus, quæ possent esse causa huius fluxus, quæ qualiter remouende sint ex supradictis patere potest. Et si corpus superflue plenum fuerit euacuetur secundum repletionis exigentiam. Secunda intentio ut fiant frictiones toti corpori & balneationes non quidem stipticæ, sed dilatantes poros, & attrahentes nutrimentum ad membra quæ fiant completa prima & secunda digestionem. Tertia intentio ut dentur cibi multi nutrimenti, & paucorum superfluitatum non lenientes, imo potius appetientes & prouocantes, & sint moderatæ quantitatibus sufficientis tamen pro corpore nutriendo, sicut uinum subtile odoriferum, carnes laudabiles, uitelli ouorum sorbiles debite cocti, testiculi gallorum fistica, auellanae parum torrefactæ, & similia quæ præter suprascriptas condiciones stomachum, & hepar confortent.

De fluxu uermium.

Cap. 2.

Hic fluxus descriptiue est fluxus ipsorum uermium uiuentium aut mortuorum.

Species

Species huius fluxus sumi possunt secundum differentes florum species quæ sunt tres scilicet cucurbitini in modum feminis cucurbitæ: qui tamen aliquando adinuicem connexi mediante humiditate phlegmatica non animata ipsos continuante inueniuntur longi sicut hominis staturam, sicut per se uidi, ascarides subtiles parui, aliquando rotundi & oblongi, sicut aristeæ & lumbrici rubei tendentes in albedinem longi secundum palmi longitudinem: imo aliquando cubiti. Distinguntur etiam species fluxus secundum quod huiusmodi uermes expelluntur uiuentes aut mortui.

Causa materialis uermium est phlegma: locus sunt intestina, & aliquando stomachus: causa efficiens disponens est calor putredinalis: principalis operans est calor naturalis, saltem sibi, siue sint duo numero distincti siue tantum unus, perficiens autem est coelestis influentia, quæ est causa prima aut principalis concurrentis.

Signa uermium referuntur ad capitulum proprium. Sed signa fluxus ipsorum, ipsorumque distinctio secundum species suas sensui manifesta sunt.

Prognostica. Primum. Fluxus uermium mortuorum in egritudinibus acutis est ualde deterius quam fluxus uiuentium, significatur enim malicia egritudinis ipsos interimens, sed si uiui descendunt significatur aut expulsiue potentia aut non tanta egritudinis malicia. Secundum. Si soli impermixti se cibis egerantur malum, permixti uero bonum. Tertium. Si permixti sanguini egerantur malum. Quartum. Vomitu expulsi malum. Sed in hac materia leuiter pertransito. Inferius enim in capitulo proprio Deo daute dicitur quantum erit opportunum.

Cura. Si natura per se non fuerit sufficiens adiuuatur cum educentibus uermes, & mundificantibus materiam eorum. Et ex propriis est clystere factum ex 1. 5. 3. lactis aut quantum uideatur opportunum insperata ætare cum 1. aut 2. 3. zuch. rub. aut 3. 2. mellis ros. Et si fluxus aliarum materiarum præter uermes esset nimis exuberans sic lac calibeatur, aut clysterizetur cum aqua mellis facta secundum artem, aut cum aqua hord. cum melle ros. Et si fuerit aut timeatur excoarctatio addatur adeps renum capræ, & si uermibus aut materia eorum existentibus in stomacho, aut in intestinis superioribus fuerit opus mundificare per ea quæ sumuntur, detur mel ros. infusionis semenzinæ, aut in quo sit admixta 3. s. auc. 3. 1. semenzinæ cum pauco aquæ hordei aut mellis, & ita detur duabus aut tribus uicibus, quoniam educet uermes, & eorum materiam. Et si opus fuerit constringere fluxum & uermes educere detur micheleta cum pauco semenzinæ dissemperata cum uino cydoniorum, & similibus. Et in summa intendatur contra uermes & fluxum. Et pro ampliori noticia si est expeditis recurratur superius ad capitulum generalis curæ fluxus, & interius ad capitulum de uermibus, & curentur accidentia secundum quod dictum fuit in cura generali fluxus, & dicitur in cura uermium, & similiter ordinetur regimen sex rerum secundum exigentiam fluxus & uermium, & diarræia, & reliquorum à quibus sumenda est indicatio.

De fluxu lapidum.

Cap. 3.

Vid rei huius fluxus satis est manifestum. Hunc fluxum nunquam uidi. Sed recitat Franciscus de pede montium quod quidam clericus neapolitanus cui nomen erat Medicus, per mensum emisit lapides per uirgam & anum; & qui per uirgam emittebantur erant ad quantitatem nucellæ. Qui uero per anum ad quantitatem oui, qui finaliter fuit liberatus cum comestione melonum. Hi lapides saltem crassi uerisimiliter generantur in sacculo, aut colo scilicet in cellulis ipsius in quibus scyphale figuratur. In eis enim multum de phlegmate uisoso continetur, quod est materia ipsorum. Agens autem est calor intestinorum aditus à calore membrorum circumstantium. Neque est credendum quod materiæ tantorum lapidum fuerint una nice congregare quæ in huiusmodi lapides condensentur, sed potius paulatim crescunt per paulatim factam materiæ additionem, sicut etiam lapis crescit in uesica.

Prognosticum. uerisimile est hunc fluxum secundum plurimum esse salubrem.

Cura est educio lapidum, & phlegmatis uisosi quod est materia eorum cum bibitis, sicut aqua mellis cum oxymelle

scillitico quibus posset addi ad magis lubricandum oleum commune uel amygdalarum dulcium, nisi stomachus abominaretur, uel cum aqua mellis distemperentur drachmæ decæ flor. calsiæ, aut quantum uideatur sufficere, aut cum clysterizatis à quibus est inchoandum, sicut ex oleo communi, aut si sumino cum oxymelle scillitico, aut cum tertia parte uringæ, & similibus: prius tamen oleum solum cum butyro ad mollicandum clysterizetur.

Regimen autem non naturalium sit cum eis quæ uentrem lubricent, & non sint generatiua huiusmodi phlegmatis uisosi, imo ipsius generationem prohibeant. Et sic cum Dei gratia sunt absolutæ omnes species fluxus penes causam materialem subiectiuam & obiectiuam. Superest iam ut absoluantur species fluxus penes causam efficientem.

TRACTATUS QUARTVS

de speciebus fluxus penes causam efficientem, tria continens capitula.

De fluxu critico, & symptomatico. Cap. 1.

Luxus criticus est qui est terminus alicuius egritudinis materialis existens cum omnibus aut pluribus conditionibus laudabilis crisis. quæ sunt ut materia sit præ digesta, sit indicatiua, sit in die critica cum enauratione qualis, & quanti oportet cum bona ægri tolerantia, & conferentia, & in hoc fluxu primo sit digestio, deinde nocitui à iuuatio separatio tandem nocitui expulsiuo retento, iuuatio, & expulsiua prius incipit expellere & retentiua cedit, sicut expulsiua expellit, neque sibi aduersatur cum utraque suum finem consequatur, expulsiua nocituum expellente, & retentiua iuuatum retinente. Sed in fluxu symptomatico, oppositæ sunt conditiones qui propterea symptomaticus, id est, ruinosus appellatus est. In hoc enim sit iuuatiui & nocitui expulsiuo, propterea retentiua & expulsiua sibi in suis operationibus aduersantur, & aliquando prius retentiua cedit quam expulsiua expellat, immo quandoque sit fluxus ex solo defectu contentiue expulsiua nullo modo concurrens, sicut accidit in propinquis morti, in timentibus, & in fine phthisis, quo modo frequenter accidit oregon, & lachrymæ inuoluntariæ, & sudor diaphoreticus. Est itaque hic symptomaticus duplex. unus factus à uirtute expulsiua stimulata, alter ex defectu contentiue, nullo modo concurrens expulsiua, & proportionatur illis motibus, de quibus dicit Auer. 3. col. quod non habet principium, neque causam, neque finem, sed solum defectum, eius enim causa per se non est aliqua uirtus, sed sola grauitas. Et ex his patet quid nominis, & quid rei, species, causæ, & signa.

Prognostica. Sed prognostica sunt hæc. Primum omnis crisis in omni egritudine materiali, etiam pestilentiali existens cum omnibus conditionibus superscriptis est euidentis signum salutis. Si uero deficient aliquæ ex principalibus conditionibus superscriptis, non est efficax signum salutis, & proprie in pestilentialibus. Secundum. Fluxus symptomaticus accidens in principiis egritudinum, licet conferat euacuando nocituum, est secundum plurimum malus, significans multitudinem materiæ aut malitiam. Tertium. Fluxus uentris symptomaticus accidens post egritudines uehementes, aut post egritudines chronicas est secundum plurimum mortalis significans uehementem corruptionem aut defectum uirtutis. Quartum. Fluxus symptomaticus proueniens ex solo defectu contentiue est universaliter mortalis.

Cura fluxus critici & symptomatici. Si fluxus criticus fuerit cum omnibus, aut pluribus conditionibus laudabilis crisis sinatur naturam operari, iuxta aphorismum. 20. primæ part. Prohibeanturque omnia quæ crism possent impedire, solum medicus intendat regimini sex rerum non naturalium secundum exigentiam egritudinis, & accidentium. Quapropter in egritudine acuta abstineat à uino, & carnibus, & si crisi diu durante opus fuerit aliquo cibo, accipiat ptisanam, & similia, sed in egritudine chronica maxime crisi diu durante potest uti uino, & carnibus moderate, siue aqua carnis & similibus quæ tamen non crism impediunt. Si uero

Io. Arculani

e

fluxus

fluxus fuerit diminutus adiuvetur eū clysteribus calidis aut frig. secundum exigentiam incipiendo à leuibus, & gradatim procedendo ad acutiora, quæ si non sufficiant aliquod leue solutiuum exhiberi potest, sicut infusio prunorum, tamarindorum, manna, calsia, rhabarbarum, polypodium, carthamum, & similia, quorum tamen uirtus solutiuua fit aliquo stiptico repressa aut per torrefactionem. Si uero superfluat cohibendum est cum his, quæ dicta sunt in cap. generali fluxus, & in capitulis præcedentibus. Ad quod ualeat ptisana hordea ex hordeo torrefacto, & similes cibi stiptici & incrassantes calidi, aut frig. secundum quod oportet conditi cum uino cydo, & similibus. Item sumachia, mirthea, & similes, & obseruet reliquum regimen suprascriptum. Si uero fluxus fuerit symptomaticus factus à uirtute expulsiua irritata in principio ægritudinis, & fuerit ex genere humoris qui facit ægritudinem dimittendus est, nisi modum excedat, in fine uero ægritudinis moderandus. nam tunc secundum plurimum timetur de casu uirtutis. Si uero fluxus proveniat ex solo casu uirtutis, non concurrente expulsiua, cohibendus est, & uirtuti cadenti subueniendum, ita ut dentur ea quæ sunt boni chymi, facili digestioni, paucarum superfluitatum, quorum parum multum nutrit, cito in sanguinem, & spiritus conuertenda, & cum hoc constringentia à sua proprietate. Et reliquum regimen constrictiuum obseruetur. & boni odores conferunt ad uirtutis subleuationem. Sed forte potius si ius diuinum, & naturale permitteret, ab horū cura fugiendum esset. Non enim hic aliud intendere possumus nisi cuiusdam miserabilis uitæ aliquantulum productionem.

De fluxu oppilatiuo. Cap. 2.

Fluxus oppilatiuus est qui provenit ab oppilatione uel ex apertione oppilationis, quamuis huiusmodi causæ sint efficientes mediatae. Immediata enim causa est uirtus expulsiua stimulata à præsentia materiæ, aut defectus contentiæ cum grauitate materiæ.

Species. Hic autem fluxus est quintuplex secundum quinque species siue modos oppilationum distinctos secundum membra quæ possunt esse causa fluxus. Prima est oppilatio melaica. Secunda hepatis, & pororum eius. Tertia splenis & pororum eius. Quarta uenarū quæ sunt ultra hepar ortum habentium à chyli ascendente aut descendente. Quinta oppilatio pororum cutis, & apertio omnium istarum potest esse causa fluxus præterquam oppilationis pororum cutis, hæc enim potest esse causa sudoris cum prius retentus esset. Est autem oppilatio horum membrorum morbus in uia prohibens transitum humiditatis bonæ aut superflue, quæ naturaliter transire debet, & est triplex, una à quibusdam appellata coarctatoria, & est illa cuius causa est in uia, & non in instrumento, cuius causa secundum plurimum est humor multus crassus uiscosus aut congelatus. Huius autem causæ primitiue sunt cibi & potus præbentes nutrimentum multum crassum aut uiscosum. Secunda uero dicitur attenuatoria, & est illa cuius causa est in instrumento, & non in uia, sicut apostema membri uicini coarctans, aut uentositas, aut alicuius membri dislocatio comprimentis meatum, aut ligatura, aut mala complexio frigida, & sicca uiam constringens, aut calida & sicca exiccando contrahens. Tertia autem est dicta carnosa cuius nocumentum est commune uitæ, & instrumento, & eius causa est caro, uerruca, pustula uel cicatrix, & omnes istæ causæ sunt pericientes. Causa autem disponens est strictura meatuum in creatione sua. Causa oppilationis melaicarum disponens est strictura ipsarum in creatione sua & periciens secundum plurimum est chylus, & humor crassus & uiscosus. sed causæ primitiue sunt potus aque frigide aque luteæ aluminosæ & atramentales, item caleus antiquus, & carnes antiquæ bonum, bufalorum, & similia, & hæc secundum plurimum sunt causæ cæterarum oppilationum. Oppilatio autem hepatis est duplex, quædam in uenis, quædam in poris eius, & utraq; est duplex. Quæ enim est in uenis, aut est in paruis aut in magnis, sed quæ in magnis aut accidit in porta & ramis eius crassis & est raro, aut in chyli & ramis eius crassis & est rarius, sed in ramis paruis utriusque frequenter accidit, & proprie in capitibus ipsorum sibi inui-

cem occurrentibus propter ipsorum uehemetem stricturam, & hanc oppilationem frequenter sequitur fluxus uentris. Quæ autem in poris est duplex aut enim est in poris purgationis superfluitatum, & est frequenter causa. primo icteritia citrina si sit in poro felleo qui sub media penula hepatis collocatur transiens usque ad gibbum eius, & aliquando licet raro sequitur tandem fluxus cholericus cholera regurgitante per melaicas ad intestina. Si autem sit in aliis ramis Kistis accidit icteritia, & fœces dealbantur, & rarissime contingit fluxus cholericus. licet dealbatio fœcum & tinctura urinae sit ferè commune signum cuiuscunque pori fellei oppilati, præterquam transeuntis ad fundum stomachi. Et si sit in poro purgationis superfluitatis melancholicæ à splene sequitur icteritia nigra, & tandem, licet raro, fluxus melancholicus. Et si fuerit oppilatio in utriusque poris accidit icteritia uiridis siue mixta utraq; cholera parsa per cutis superficiem, ex colore enim citrino, & nig. cum permiscetur resulat color uiridis, de his tamen in icteritia dictum est quantum est opportunum, & ad hos oppilatiuos si sequeretur fluxus quod rarissimum est esset mixtus ex cholera, & melancholia. Si autem oppilatio sit in poris transitus nutrimenti de parte in partem per substantiam hepatis quæ est raro non sequitur fluxus neque icteritia, sed crassities hepatis cum duritie, & corporis extenuatio, quod est commune signum omnium oppilationum hepatis, licet per se habiendo corpus præternaturaliter tumeat, & possunt eam multæ aliæ ægritudines concomitari cum oppilatio hepatis sit fere mater omnium ægritudinum. Et unaquæque istarum oppilationum, aut est noua, aut antiqua, simplex, aut composita, & unaquæque istarum potest esse coarctatoria attenuatoria & carnosa, quarum causæ sunt illæ, de quibus supra. Sed frequenter oppilationes hepatis sunt coarctatoriæ ab humore multo crasso & uiscoso. Raro attenuatoriæ ab apostemate coarctante. Quarum causæ primitiue sunt illæ, de quibus supra. Rarissime carnosa. Oppilatio autem splenis est morbus in uis & ductibus per quos habet trahere fœcem sanguinis, s. melancholiam superfluum ab hepate, ut sanguis depuretur, & sit cōueniens membrorum alimentum, & ipsam ad hos stomachi pro fame excitanda delegare, quæ est triplex. Aut enim est in poro qui est inter ipsum, & hepar per quem trahit fœcem sanguinis ab ipso & hic est unus ex octo ramis uenæ portæ egredientibus hepar ualde manifestus: aut est in uia, quæ est inter ipsum, & stomachum per quem delegatur melancholia ad os stomachi, & est ramus uenæ suprascriptæ: aut est in ipsa splenis substantia, & posset esse in aliquibus aut omnibus his simul. Et oppilatio eius est secundum plurimum coarctatoria pendens ab humore melancholico foculento, qui propter multitudinem & crassitiam non potens transire per ductus, & poros remanet in eis obstrictus: & quandoque est attenuatoria ex siccitate, & ponticitate cholere nig. uel uentositate uicinarum, aut apostemate comprimente, licet in aliquo uiderim ipsam sequi compressionem costarum super splene, cuius causa erat gibbositas, & incurrerat icteritiam nigram sibi coeternam. Rarissime est carnosa. Ad has autem oppilationes præcipue ad eam quæ est in uia per quam melancholia mittitur ab hepate ad splenem, sequitur icteritia nigra, & quandoque fluxus melancholicus melancholia regurgitante ad portam, deinde per melaicas ad intestina. Similiter ex deoppilatione istarum splenis ante repleto sequitur fluxus melancholicus. Sed si deoppilata uia inter ipsum, & stomachum sequitur uomitus melancholicus & melancholia ualde superfluere fit uomitus & fluxus si mul, sicut uidi in Dño Laurètio Donato Potestate Veronæ qui uomitu & secessu expulit. 15. lib. melancholice in duobus diebus, & quauis deuenit ad frigiditatem extremam & pulsum uermicularum cum frequentia syncopis, tñ superuixit contra intentionem aphor. 23. quartæ particulæ, quibuscumque in ægritudinibus acutis &c. erat. n. summæ extenuatus cum laborasset dolore stomachi tribus annis continuis. Oppilatio autem uenarū, quæ sunt ultra hepar quantum ad quid nominis, & quid rei ex dictis est manifesta. Modi autem eius sunt duo, quoadque. n. oppilantur uenæ ortū habentes à chyli ascendente, quoadque ortum habentes à chyli descendente, & prime sunt à gibbo hepatis supra, & secundæ à gibbo hepatis infra. Earum autem oppilatio fm plurimum est coarctatoria. Raro attenuatoria.

tenuatoria. Rarissime carnosae. & causae ipsarum sunt quae superius dictae sunt. Oppilatio pororum cutis quandoque est coarctatoria à superfuitate multa aut crassa & viscosa, quae refecatur in quarta digestionem propter multiplicationem ciborum crassorum viscosorum, & omissionem frictionis & balnei, quandoque est attenuatoria propter frigiditatem aeris, aut aquae, in qua balneatur, condensantem: quandoque à caliditate solis aut ignis arefaciendo constringente, & quandoque in causa: quandoque est carnosae ex cicatrice orta in corporis superficie, per hanc enim pororum oppilationem prohibetur euacuatio insensibilis & etiam sensibilis sub forma sudoris. unde materiae per hanc regionem solite euacuari retinentur, & retentae alias insciant, & tandem cum plurimae aggregatae sunt pelluntur de uenis paruis ad magnas, & de magnis ad uenam chylis, & tandem ad uenam portae, & postea per meseraicas ad intestina, & fluxu uentris expelluntur. Et istae oppilationes aliquando sunt cum febre, aliquando sine, secundum quam diuersitatem oportet curam variari exhibendo minus calida quando sunt febribus coniunctae.

Signa communia cuicunque oppilationi sunt. Primo grauitas & extensio in parte oppilata, quae tamen non ab omnibus aegris discernitur. Secundo color à naturali notabiliter permutatus, scilicet pallidus uel citrinus in toto corpore, quia sanguis laudabilis, & copiosus non uenit ad cutis superficiem sed subtile eius solū aquositate uel cholera mixtum attrahitur membris inanitis, & hoc maxime uerificatur in oppilationibus hepatis, & uenarum: nam si sit in meatibus kistis aut splenis color sit ictericus citrinus niger aut uiridis, sed in oppilationibus pororum cutis non est necessarium colorem ita permutari, & urina in oppilationibus hepatis, & uenarum est subtilis. Sed in oppilationibus pororum purgationis superfuitatum est crassa icteritia, & in oppilationibus cutis crassa non icteritia. Et tertio est homo in suis operationibus impeditus, & ea membra in quibus est oppilatio, & sibi communicantibus. Et est signum efficax cum non uisa fuerit alia aegritudo quae possit uerisimiliter illas operationes impedire, & cum non adsint signa repletionis in toto corpore.

Signum commune ferè cuicunque fluxui oppilatio est esse periodicum, sunt enim periodice secundum aggregationem materiae in determinato tempore, & ipsius expulsiōnem, & carentiam fluxus quouique noua materia ad fluxum sufficiens sit aggregata.

Sed signū propriū fluxus oppilatiui meseraicalis est fluxus kyli perfecte digesti, id est sine notabili admixtione lienteriae, non tendens aequaliter in colorem rub. festinus, post complementū digestionis primae exiit cū grauitate hypochondrii dextri declinante uersus dorsum, & per has circūstātiās differt hic fluxus à fluxu chyloso sequente nocumentum stomachi, & intestinorum, & proprie retentiū eorū. Est. n. chylus non perfecte digestus, immo admixtus lienteriae. Differt secundo à fluxu sequente oppilationē portae, & ramorum eius non egredientium hepar. Ille enim licet sit chylosus, tendit tamen in colorem sanguinis aequaliter, cum uirtus aequalis sanguificatiua sit in meseraicis, à uirtute tamen hepatis. Item est festinus post complementum primae digestionis, & in eo quod chylosus differt à fluxu sequente oppilationem chylis, cum ille sit humoralis chylo iam in sanguineum, & in reliquos humores uersus in uena portae. Et per hoc etiam differt reliquis fluxibus oppilationis uenarum quae sunt ultra hepar sed per hoc quod est cū grauitate hypochondrii dextri tendente uersus dorsum differt à fluxu sequente debilitatem attractiue hepatis, qui licet sit chylosus, est tamē sine grauitate. Differt etiam à fluxu sequente oppilationem partium hepatis, quia est cū grauitate hypochondrii dextri, quae tamen non tendit uersus dorsum. Differentia autem inter apostema hepatis, & meseraicarum, & oppilationem eorū est, quia febris cōcomitur apostema & non oppilationem, licet aliquando grauitatur maior in oppilationem hepatis quā in apostema eius, iuxta Aui. 2. primi. de signis oppilationū. Item apostemata hepatis maiora causant nocumenta in breui tempore quā ipsius oppilationis, sicut est defectio appetitus, singultus, arefactio hydrops, & similia. Et ex his manifesta sunt signa fluxus oppilatiui, siue oppilatio sit in meseraicis, siue in uena portae, siue in uena chylis. Signa praeterea distinctiua inter partes hepatis oppilatas etiam distinguunt inter fluxus inde procedentes, nam oppilatio gibbi manifestior est sensui, sentitur enim per tactum durities & crassities, & laedit magis partes spirituales, sed oppilatio concaui magis laedit stomachum & non est ad tactum manifesta. Sed signa oppilationis pororum Kystis fellis sunt dealbatio foecum, urina citrina crassa, icteritia citrina, & tandem, licet raro fluxus cholericus cholera rheumatizante per meseraicas ad intestina, sed ad apertionem oppilationis horum pororum, sequitur aliquando fluxus cholericus, aliquando uomitus, si aperiatur oppilatio pori fellis tendentis ad fundum stomachi. Quae autem sunt signa distinctiua inter oppilationes diuersarum pororum Kystis sufficienter dictum fuit in icteritia. Signa autem oppilationis pororum transitus nutrimenti ex dictis in hoc capitulo manifesta sunt, non enim sequitur fluxus uentris neque icteritia, sed crassities hepatis cum duritie, & corporis extenuatio, quod est commune signum omnium oppilationum hepatis. Signa uero oppilationis splenis ex dictis superius sunt manifesta. Siquidem fuerit in poro per quem splen attrahit melancholiam ab hepate sequitur fluxus melancholicus, & splen est extenuatus. Si uero fuerit in poro per quem melancholia delegatur ad os stomachi splen incrassatur, & cadit appetitus, ad cuius apertionem sequitur uomitus melancholicus, & interdum melancholia exuberante uomitus & fluxus simul. Si uero sit in ipsa substantia splenis, adest crassities splenis absque fluxu aut uomitu, nisi modum excederet quae crassities si solueretur posset esse causa uomitus aut secessus melancholici. De his tamen superius sufficienter dictum est. Signa uero oppilationis uenarum, quae sunt ultra hepar sunt signa oppilationis generalia suprascripta, & cum hoc non sunt signa specialia alicuius ex quatuor oppilationibus suprascriptis. Item fluxus inde sequens est humoralis cū periodis. Signa uero oppilationis pororum cutis sunt causae ipsius, de quibus supra, & cum hoc prohibitio ludoris conuicti, & non sunt signa alterius oppilationis, & fluxus est humoralis periodicus.

Signa uero causarum sunt huiusmodi. Si quidem oppilatio sit coarctatoria ab humorū multitudine adsint signa plethorae praedictis generalibus signis oppilationis addita. Si uero sit coarctatoria ab humorū crassitie & viscositate adsint signa cacochymiae, itē regimē praecedēs cū malitia digestionis, quae si multiplicet uentositatē apparebit durities & crassities augeri & minui in breui tpe. Si uero non, permanebit semper aequalis durities uel crassities. Si uero causa fuerit attenuatoria perficiens erunt signa apostematis hepatis uel praesumptio alicuius ex praenarratis aggregantibus & constringentibus eas. Si uero fuerit compressio costarum aut ligatura & similia extrinseca, omnia sunt sensui manifesta. Si uero fuerit carnosae, puta pustula aut bothor apparebunt signa apostematis, & pustularū. Si uero carnis additio ut uerruca, oppilatio erit partialis in aliqua uia uel poro propter quod oppilatio non erit magna, & per consequens signa oppilationis debilia, & cū hoc cura parum proderit. Si uero causa fuerit disponēs, puta strictura uiarum in creatione sua, signum erit diuturnitas passionis, quia à principio generationis contracta cum fortitudine retentiue & debilitate expulsiue.

Signa uero fluxus sequentis deoppilationem sunt ipsa oppilatio praecedens, de qua supra. Deinde fluxus humoralis sequens, Et tertia cura omnium accidentium sequentium oppilationem illam.

Prognostica. Primum fluxus sequens oppilationem coarctatorem antiquatā difficulter curatur. Noua uero, facile curatur si debite tractetur. Secundum. Fluxus sequens oppilationem attenuatorem per apostema coarctans, aut dislocationē membri uicini comprimentis, raro, & difficulter curatur. Sequens uero malam cōplexionem sine materia, aut uentositatem uias attenuantem, facile curatur. Tertium. Fluxus sequens oppilationem carnosam non recipit curam. Quartū fluxus sequens constrictionem meatuum à generatione contractus est coeternus patienti. Quintū. Fluxus sequens apertionem oppilationis est secundum plurimum salubris. Et tertius minus accidentium sequentium oppilationem.

Io. Arculani c 2 Cura

Cura fluxus oppilatiui in generali.

CVra generalis fluxus sequentis oppilationem exigit quinque intentiones. Prima apertio oppilationis fieri potest. Secunda mundificatio humorum qui propter oppilationem sunt retenti. Tertia confortatio membrorum tam mittentium quam suscipientium. Quarta correctio accidentium. Quinta debitum regimen sex rerum non naturalium. Sed in oppilationibus meseraicarum uenę portę ratorum, uenę chylis, & uenarum quę sunt ultra hepar apertis oppilationibus, & facta mundificatione superfluum, quę per oppilationem erant retenta, dentur ea quę faciunt chylum penetrare ad hepar, & humores ad membra confortando ipsorum attractiuum cum frictione & reliquis ingeniis. Quę intentio in reliquis oppilationibus dictis nō est necessaria, sicut in oppilationibus kistis splenis & pororum cutis, quia in istis non prohibetur transitus nutrimenti ad membra. Si uero fluxus sequatur apertionem oppilationis exiguntur ceterę intentiones præter primam. Et ex his interturipti ea constringentia nō conuenire in cura fluxus oppilatiui nisi aperta oppilationem fluxus modū excederet, & hoc est quod dicit Auic. 16. tertii tract. 2. cap. 1. & istud quod cadit in hoc cap. de errore est, ut dentur illi qui habet fluxum hepaticum oppilatiuum medicinę constringentię addētes in oppilationem confortantes eam ut constringant naturā: & perducit istud ad errorem maximum & multoties quidem linet insipiens cum insipientibus sanguinem, & extinguentibus hepar per hoc quod sunt frigida, & in hoc est mors, & successio putrefactionis, imo oportet cum sciueris quod causa in ipso est oppilatio in hepate, & meseraica ut intendas cum apertione oppilationis, & iam laudatę fuerunt passulę pingues in hoc capitulo, ita ut quidam exilimauerint quod ipse sanant fluxum difficilem. Et nos quidem experti sumus, & fuit res non longinqua ab eo quod dixerunt & sicut est de hepatico ita in ceteris fluxibus oppilatiuis sentiendum est nisi secundum modum quem dixi. De fluxu tamen hepatico chyloso propter oppilationem dixi quantum est opportunum. Quod si oppilatio fuerit coarctatoria in meseraicis, hepate, uel poris kyllis, & uenis quę sunt ultra hepar pēdens ā multitudinem humorum secundum plurimum cōuenit phlebotomia, & si repleto fuerit uniuersalis in toto, fiat primo ex communis, deinde ex basilica dextra. Si uero repletio non excederet modum sufficit phlebotomia basilicę aut saluarellę dextrę. Si tamen in causa esset retentio hamorrhoidarum aut menstuarum permittatur phlebotomia saphenę, deinde phlebotometur basilica dextra. Et si infusę in oleo amigdalino sunt fortes in prouocando menstrua. Quod si reliquę conditiones ā quibus queritur licentia in phlebotomando non consentirent, uentrosentur nares, aut sanguisugę applicentur. Si uero in causa fuerit humor crassus aut uiscosus, primo digeratur. deinde euacuetur, postea dentur aperitiua secundum exigentiam. Digerentia enim in principio non debent esse multum aperientia aut prouocantia, sed abstergentia & incidencia, sicut syr. aceto. aut oxymel simplex, postea dentur magis aperientia & prouocantia, sicut syr. aceto. compositus, oxymel compositus, oxymel squilliticum, & possunt hi syrapi permisceri cum aquis magis aut minus aperientibus calidis aut frigidis secundum exigentiam. Hic autem ponant quędā simplicia & composita, quibus secundum exigentiam utendum est. Frigida sunt sicut endiuia & cicorea, & aquę ipsarum. Aqua plātaginis ex foliis, & radicibus suis. Semina communia frigida quibus utendum est in oppilationem cum caliditate. Calidę uero sunt, foeniculus, petroselinum, apium, aslarum, cassia lignea, rubea tinctorum, filica scilla, spica, gentiana, aqua cicero, rhabarbarum, absinthium, eupatorium, zimę, schinanthi, amigdalę amara, chamępityos: & proprie quādo oppilatio esset in uis strictis, unum subtile est proprium confortans & aperiens, & causa frigida possunt cum eo distemperari aliqua ex electariis infrascriptis. Aequalitati propinqua sunt, lupuli, cuscute, lacca, capilli, uel. sparagi, acetum scilliticum, sed cuscute est proprium in apertione meatuum kyllis. Ex compositis autem sunt quę dicta sunt superius. Item syrupus acetosus ex melle uel zucarho factus cum rubea, syr. acetosus diarrhodon, syrupus aceto. de luccis herbarum, syrupus de calamentho, de eupatorio. Item diacala-

mentum, diacurcuma, dialacca, theriaca, & similia, quorum plurima sunt descriptio Mes. sunt etiam trochisci ad hoc proprii, sicut de rhabarbaro, de absinthio, de eupatorio, de aniso, de lacca, & similes. Frigida autem pauca apertionis sunt, diarrhodon, & triafandali. Tu uero utere calidis ubi sunt signa frigiditatis, & contra frigidis aut æqualibus secundum exigentiam. Sed nota quod in causa calida si aperientia frigida non sufficiunt est utendum temperatis aut calidis, aut calida cum frigidis sunt permiscenda, & maius erit iuuamentum apertionis quā nocuum inflammationis, quod facile tollitur per apertionem. Euacuatio autē post digestionem fiat cum propriis, sicut aloes lotus, rhabarbari, agaricus preparatus, eupatorium, & similia. Ex compositis sunt hierapicra, pilulę de eupatorio maiores & minores, pilulę de rhabarbaro, pilulę alephanginę, pilulę alkekengi, pilulę de raued, & similia. Sed propter fluxum sunt in parua dosi. Et quandoque necessarium est, ut dicit Aui. in apertiendo oppilationes solutiuum fortiter attrahens materias crassas facientes oppilationem, & clysteria fortis attractionis & apertionis, sed hæc fortia stante fluxu quantum est possibile omittantur, & uomitus est ex rebus magis iuuatiuis ad istud, & proprie cum oppilatio est in porta aut in uenis quę stomacho communicant. Sed nota quod si oppilatio est in cōcauo hepatis, poris eius, & meseraicis, aperientia debent esse minus fortia, sed debent esse abstergentia, & uētris solutiuā. Si autem sit in gibbo, & in uenis quę sunt ultra hepar debet esse aperientia fortiora & urinam prouocantia. Si uero oppilatio sit attenuatoria propter apostema partis uicinę, curet cura apostematis, de quo supra. Si uero proueniat ā uentositate coarctante, prius educto humore ā quo uēstrositas eleuatur, carminetur uēstrositas cum sumptis interius, sicut est diacalamenthum, diatrionpipereon, diaciminum, confectio de seminibus. proprie. Diacurcuma quoque ad hoc confert, & si uiderentur nimis calida cum diarrhodon abbat, triafandali, & similibus temperentur aut sumantur cum aqua endiuie. Exterius quoque ungatur cum oleo de spica aut approximetur sacculus ex milio, & sale torrefactis, aut fomētur particula cum filtro aut spongia infusa in aliqua ex decoctionibus carminantibus. Si uero oppilatio pēdeat ā causa extrinseca, remoueat, & mala complexio inducā cū contrariis alteretur calidis aut frig. secundum exigentiam, sed secundum plurimum sint humida, & sint aperitiua ad dilatandum meatus, & quando opus esset frigidis, sint remissa frigida, sicut aqua hęcis caprini cum decoctione ablynt. aut eupat. Item aqua cicero, & decoct. radicum cōmunium cum florib. borag. & buglossi, lupulorum, cuscute, & passularum, & si opus esset infrigidare fiat decoct. cum seminibus communibus frigidis, sem. endiuie, lupuli, cuscute, passulus, & similib. Si uero oppilatio fuerit carnosa ex pustulis in uis, cura ē resolutio si fieri potest, aut sanatio & eruptio. Inquit enim Hippo. Quib. in urinali uia pustulę nascuntur, sanie facta, & erupta solutio, similiter & in proposito. Cum quibus autem hæc fiant in cura apostematum hepatis dictum fuit superius. Secunda intentio, scilicet mundificatio humorum qui propter oppilationem sunt retenti ab ipsa natura pellente complentur, quod si deficeret, aut propter debilitatem aut materię inobediētiā adiuuetur cum aperientibus, abstergentibus, & incidentibus secundum exigentiam. Tertia aut intentio, scilicet confortatio membrorum tam mittentium quā suscipientium completur cum aperientibus iam dictis confortantibus stipticitate temperata, & proprietate. Eligantur ergo ex supra scriptis quę uideantur magis conuenire, sicut endiuia, cuscute, passulę, hepar adip preparatum. Auellane torrefactę, filica, & similia, imo quia fluxus est, licet pēdeat ab oppilationem utendum est semper stipticis moderate etiā cum uoluumus aperire, & per tertiā uirtutem membra læsa confortantibus. Quarta aut intentio, scilicet accidentium correctio completur sem ipso exigentiam, pro qua recurre ad curam generalē fluxus. Et si fluxus nimis superflueret aperta oppilationem conueniunt stiptica cōstringentia, quorū copiam habes in cura generali fluxus, & in præcedentibus capitulis & si febris esset cōiuncta fluxui, totum regimen magis ad frigidum declinet. Quinta intentio, scilicet debitum regimen sex rerum completur secundum exigentiam causę oppilationis, & exigentiam intentionum. Aer autem secundum

secundum plurimum sit temperatus in actiuis, declinet ad sic-
cum fomus sit satis prolixus. Procurent euacuationes à natu-
ra institutas. Quiescat animo & corpore. Cibi sui & potus
cum opus est aperire oppilationem sint aperiui abstergentes
& incidentes sicut exigentiam, & in summa sint secundum
exigentiam illarum intentionum, quas complere intendimus.
Sit dicta satis tenuis, inspecta tamen uirtute ne cadat, & re-
ctius est apud Aui. ut comedat cibum suum in pluribus uici-
bus, & partiatur ipsum, & consequi faciat cibum suum quod
adiuuat ad penetrandum cum uelocitate, & aperiat oppila-
tionem, sicut exempli gratia. uinum subtile. Et detur ei dia-
calamentum aur. i. ante cibum per mediam horam cum pau-
co aceti uini subtilis potentis non dulcis, & cum digeritur ei
bus detur de eo. 3. s. cum uino supra scripto, quando cibum de-
bet penetrare ad hep. Et theriaca sumpta mane cum uino
debito calido iuuat uehementer, & balneatio completa fecu-
da digestionem iuuat. similiter frictio ante cibum completa se-
cunda digestionem est conueniens, & propria, maxime quan-
do membra sunt debilia in attrahendo, & fiat fortis frictio
cum panno aspero incipiendo à dorso, & uentre, & tenden-
do ad extrema. Et non absoluitur æger à frictione, nam cum
fricaueris cum & aperueris oppilationes & solueris humo-
res oppilantes penetrabit cibum ad corpus eius, & non acci-
det diarrhoea post illud, & confortabitur corpus. quod si aper-
ta oppilationem fluxus superfluit utendū est stipticis cōfor-
tantibus. Et nota q. aqua calibata fere confert in omni flu-
xu, & in omni tempore, cum hoc enim q. confortando cōstrin-
git, non tamen addit in oppilationem. Si uero fluxus sequere-
tur apertione oppilationis exiguntur intentiones supra scrip-
ptæ præter primam, quæ complenda sunt sicut dictum fuit.

Cura fluxus splenetici oppilatiui exigit quinque intē-
tiones supra scriptas, & fere cum eisdem complendis de quibus
dictum est in fluxu hepatico oppilatiuo. Fortiora tamē cate-
ris paribus exiguntur aperiui in fluxu splenetico non pro-
pter densitatem suæ subtilitatis cum sit rarior hepate, sed pro-
pter humoris melancholici crassitatem. Ergo iuxta doctrinā
primam, si fuerit peccatum in sanguine phlebotometur basi-
lica, aut saluarella sinistra, & prouocetur sanguis hamorrhoi-
dalis aut menstrualis si eorum retentio fuerit in causa. Et for-
te in his casibus melius est incipere à phlebotomia saphenæ
sinistræ, deinde phlebotomare basilicā aut saluallā sinistra.
Deinde digeratur humor oppilans, & per oppilationem re-
tentus cum oxymelle simplici composito & scillitico, & syr-
de epithymo cum aquis scolopendriæ, tamarisci, & similibus.
Sed ex propriis est huiusmodi. 3. corticum radicum cappa-
ris. 3. s. scolopendriæ, tamarisci, se. agni casti, se. endiuia, sem.
portulacæ. ana. 3. 2. aquæ lib. 2. mellis aceti. ana. 3. 3. bulliant
simul ad consumptionem medietatis, & coletur & clarifice-
tur, & facta digestionem dentur. 3. 3. epithymi. & 3. s. zing. cū
3. 2. decoctionis supra scriptæ, aut cum tantumdem feri capri-
ni. Item decoctio epithymi descriptione Mesue est ad hæc
propria. Item dialene est conueniens. uel accipiat huius-
modi si euacuando intendis derelinquere uestigium constri-
ctionis. R. seneg. mirabolanorum indorū. ana. 3. s. epithymi.
3. 2. zing. gran. 5. feri capri. 3. 2. misce. & si mallet pilulas ex-
hibeantur huiusmodi. R. mirabolanorum indorum, seneg. pi-
lularum aefanginarum ana. 3. 1. zing. gra. 1. fiant pilulæ. 7.
cum aqua scolopendriæ, & exhibeantur, aut exhibeatur quā-
tum de eis uideatur sufficere, in fluxu enim solutiua debent
esse leuia. Si tamen esset cum febre aut cum signis calidita-
tis dentur frigida aut remissa calida, sicut trochisci de agno-
casto descriptione Ras. 9. Alman. in cap. de dolore splenis.
R. se. agni casti, se. tamarisci. ana. 3. 4. se. endiuia, sem. portu-
lacæ ana. 3. 2. fiant trochisci, de quibus quotidie detur unus
cum syr. acetoso, & sint trochisci. 3. 2. aut circa. & in his casibus
utendum est aquis frigidis, sicut endiuia, cuscutha, tama-
risci, medianæ, fraxini, aut salicis, & solutiua etiam cum fri-
gidis temperentur. Si uero oppilatio esset attenuatoria pro-
pter apostema curetur cura eius, de qua supra. Si uero esset
attenuatoria propter uentositatem dentur trochisci de cap-
paribus cum apozimate de radicibus. Et hoc emplastrū con-
fert contra duritiem & uentositatem quæ est sub splenē. R.
foliorum rutæ. 3. 10. baurach, mentastri sicci. ana. 3. 3. ammo-
niaci. 3. 7. ammoniacum in uino ueteri dissoluatur cum quo

cætera conficiantur, & fiat emplastrum. Quod si durities cū
oppilationem fuerit in substantia splenis, primo mollificetur
cum mucilagine malua uisci, pinguedine anatis, medulla ui-
tuli, & oleo de capparibus, postea resoluatur ad quod opti-
me ualet emplastrum de fermento descriptione Mesue, &
quæcunque alia causa oppilationis remoueat secundū q.
oportet, sicut dictum fuit in oppilationem hepatis. Et nota q.
si exhibeatur. 3. 1. ammoniaci cum. 3. 1. syrapi acetosi, & 3. 3.
decoctionis radicum capparibus, soluit oppilationem, & mun-
dificat splenem. Ceteræ autem intentiones compleantur. s.
mundificatio, splenis confortatio, & accidentium correctio
secundum q. oportet. Si tñ aperta oppilationem fluxus super-
flueret cōstringatur cum interius & exterius applicitis, quo-
rum copiam superius habuisti in cura generali fluxus, & ex
propriis confortantibus splenem, & stringentibus fluxum,
sunt, ut exhibeatur in potu sumach, se. portulacæ ana. 3. 2. cū
aceto aut syr. aceto. & semen cuscuthæ, folia salicis, & semen
acetosæ sunt ad hoc propria. Sed in causa frigida exhibean-
tur cum oxymelle simplici. Pro regimine autem cibi, exhibe-
antur cibi leues & pingues ex iuribus præparatis cū sub-
tiliantibus & temperate calefacientibus. Et capparibus cum
aceto sunt proprii, & aqua extinctionis calibis, & uinū sub-
tile. Declinet autem magis aut minus ad calidum secundum
exigentiam causæ, accidentium, temporis anni, & huiusmo-
di. Quod si fluxus sequatur oppilationem pororum cutis, &
fuerit coarctatoria euacuetur humor qui est sub forma cau-
sæ antecedentis phlebotomia & pharmacia secundum ipsius
exigentiam, postea intēdatur ad euacuationem humorum qui
stāt sub forma causæ cōiūctæ in poris cutis cū balneis aereis
aut aqueis sudare facientibus, in quibus sint cocta aperiuiua,
sicut anethū, flores, chamæmeli, & similia, & fricetur cutis
cum pannis asperis donec rubeant. Postea ingrediatur bal-
neum aqueum aut aereum, & apud maiorem necessitatē fri-
centur cum melle, in quo mixta sit farina orobi, radi. lilij, &
aristol. ro. & si fortis fuerit oppilatio ponatur parum salis ni-
tri, deinde ingrediatur balneum, & lauetur & abstergetur.

Frequentatio enim balnei aerei aut aquei poros cutis aperit
& sudorem prouocat. Sumpta etiam sicut est uinum subtile,
aut theriaca cum uino subtili prouocando sudorem aperit po-
ros, & remouet oppilationem, à quacunque causa proueniat
nisi fuerit carnosa, cuius cura non est possiblis. Postea perfi-
ciantur reliquæ intentiones, sicut humorum mundificatio p-
secesum aut urinam. Et quinto membra cōfortentur, & cor-
rigantur accidentia secundum q. oportet, quæ qualiter de-
beant compleri ex dictis potest esse manifestum, & cauendū
est à uiscosis, & stipticis tam cibalibus quàm medicinalibus,
nisi aperta oppilationem fluxus superflueret. Præcipue in his
casibus exterius applicita non sint stiptica. Et sic cum Dei
gratia finitum est capitulum de fluxu oppilatiuo.

De fluxu à rebus non naturalibus, & extraneis sicut mor-
sus uenenosorum & uenenorum sumptio. Cap. 3.

He fluxus quantum ad quid nominis, & quid rei est
manifestus. Species non habet nisi quosdam modos
secundum causas eius differentes. Aer enim potest
esse causa eius, aut propter eius superfluum lapsum
secundū qualitates manifestas, aut propter qualitatem mali-
gnā sibi impressam à formis celestibus, aut quia putridus.
Venti quoque plerunq. sunt causa fluxus, aut corpora replen-
do & humores liquefaciendo, sicut uenti australes & subsola-
nus, aut exprimendo humores à circumferentia ad centrum
sicut boreales, imo cum accidit tanta copia fluxuum qui sunt
communes uni patriæ, aut regioni, sicut fuit Ferrariæ anno.
1450. existimandum, hos etiam pedere ab aliqua causa uni-
uersali, siue sit aer, siue fruges illius regionis taliter corru-
ptæ, aut formæ celestes, quæ tñ imprimunt in corpora nostra
mediante aere, aut mediantibus cibis & potibus per ipsas
corruptis quibus uescuntur. Effectus namque uniuersales in
causas uniuersales resolui debent. Regimen quoque malum
in cibo, & potu est frequenter causa fluxus, quod esse potest
multipliciter, aut propter quantitatem auctam, & est fre-
quenter, & sit secundum plurimum corruptio ad acetosum,
aut quantitatem diminutam, & est raro, & sit sicut plurimum
corruptio ad fumosum, & utraque disponit ad putredinem

Io. Arculani c 3 chyli,

chylis, & chymi inde generandi, aut propter qualitates primas inter quas maxime facit caliditas & humiditas, caliditas quidem pungendo, & excoriando, humiditas autem leniendo & lubricando, aut propter qualitates secundas, sicut subtilitas substantiæ, fluxibilitas, lenitas, absterfio, incisio, & similes, aut propter proprietatem occultam facientem hoc à tota specie, sicut medicinæ solutiua, aut propter proprietatem individuale insequentem materiam, sicut canceri soluunt quosdam, aut propter malitiam ordinis, sicut cū liquida præmittuntur stipticis compressiuis aut ponitur indigestum super indigestum, aut propter malitiam artificii, quæ potest esse multipliciter, aut propter ea quæ comestioni superueniunt, sicut coitus, motus fortes, accidentia animi & similia. Accidentia quoque animi sicut timor sunt causa fluxus trahendo materias à circumferentia ad centrum, ad quem fluxum sicut dictum fuit non semper concurrunt expulsiua, sed aliquando sola grauitas materiæ cum debilitate contentiuæ. Morsus quoque animalium uenenosorum est aliquando causa fluxus aut corrumpendo humores aut debilitando contentiuam. Similiter casus & percussio soluendo continuum, & frequenter sequitur fluxus sanguinis.

Signa sunt causæ suæ.

Prognostica. Hic fluxus sibi plurimum curatur, nisi sequatur corruptionem aeris & pestilentiam. Aliquando enim imo frequenter interficit à quarta usque ad septimam. Si uero sequatur morsum uenenosorum cura est difficilis, aut impossibilis sibi malitiam, & intensiorem uenenositatis impressam.

Cura posita est superius in cap. 2. ubi ponitur cura generalis cuiuscunque fluxus, & est sermo de ea in principio capituli. Verum si sit fluxus pestilentialis non est restringendus nisi timeatur casus uirtutis, & intendatur confortationi cordis, & membrorum nobilium, & prohibeatur putredo quantum est possibile, & pro completa notitia huius recurre ad cap. de febre pestilentiali, & inter cetera cogatur ad cibum & ad potum qui partiendus est propter uirtutis debilitatem. Si uero fluxus pèdeat à morsu animalis uenofici fricetur locus morsus ut sanguis exeat, aut uentosa cum scarificatione superponantur, & emplastretrur cum attrahentibus, & propriis contra genus animalis quod momordit, & inter cetera applicatio animalium nouiter interfectorum & apertorum cum calore actuali confert trahendo ad se uenenum, imo etiā ipsa uiua sicut gallinæ cum ano applicite conferunt, & locus superior defendatur cum aceto & forti stricture per magnā partem eius, & membra principalia confortentur cum interioribus & exterius applicitis, & proprie cum theriaca, & bezoartica propria contra illa uenena exhibeantur, nec in his casibus competunt solutiua saltem fortia neque phlebotomia, & proprie in principio ne uenenum trahatur a loco morsu ad membra nobilia. Si uero sumperint uenenum aut medicinā uenenosam procuretur ipsius uomitus exquisitus, & si quid superest cum lenientibus educatur sicut cum multo oleo calido assumpto, & casia & clysteribus. Tertio membra principalia confortentur & dentur bezoartica contra ista uenena, & in hoc casu secundum plurimum non competit phlebotomia. Si uero fluxus sequatur casum, & percussione, phlebotometur, sanguis fluens constringatur, & uena soluta consolidetur, & si quid sanguinis coagulatum fuerit educatur sibi quod est expediens. Et sic auxilio dei absoluta sunt species fluxus penes causam efficientem, & finitus tractatus quartus.

TRACTATUS QUINTVS

de speciebus fluxus à causa formali capitulum unum
contingens de fluxu suauis & insuauis.

Fluxus suauis est qui uirtuti & repletioni est proportionatus. E contra insuauis qui est alteri harum improporionatus. Si enim sit nimis uelox est uirtuti improporionatus. Si uero nimis tardus est improporionatus cacoehymia.

Causæ suauis sunt dominium uirtutis supra materiam & ipsius digestio cum conuenienti uiarum latitudine, & contrariæ causæ sunt insuauis.

Signa fluxus suauis sunt bona conferentia & tolerantia, & signa digestionis materiæ, & de hoc genere est fluxus criti-

ticus. Item fluxus per quem natura aliquando expellit superflua nulla præcedente ægritudine.

Signa fluxus insuauis sunt his contraria, & de hoc genere est fluxus symptomaticus, & cholericus passio. Item fluxus omnes cum quibus tarde superflua educuntur.

Prognostica. Fluxus suauis aut est terminus ægritudinis, aut ab ægritudine præseruat. Insuauis autem est malus.

Aliquando nimia uelocitate, aut tarditate ducens ad interitum. Cura. Si uero fuerit suauis finatur natura operari, sicut in fluxu critico dictum fuit superius, nec in hoc aliquid est ordinandum nisi regimen sex rerum secundum quod est expediens.

Si uero fuerit insuauis nimia uelocitate quam natura non toleret retardetur ingeniiis opportunis, de quibus sufficienter dictum fuit in cap. generali curationis fluxus, & etiā in particularibus, hic enim necessario ad aliquem ex fluxibus particularibus, de quibus supra reducit. Si uero nimis tardus, uelocitetur, sicut in fluxu critico diminuto, & tardante superius dictum fuit. Et sic finitus est hoc capitulum, & cum eo tractatus quintus.

TRACTATUS SEXTVS

de speciebus fluxus à causa finali, capitulum
unum continens de fluxu laudabili &
illaudabili.

Fluxus laudabilis est per quem expelluntur nocitiua illauidabilis uero per quem inuatiua, ex quibus inferitur quod aliquis fluxus potest esse laudabilis, qui tamen non est suauis, sicut fluxus per quem expelluntur nocitiua nimis uelociter, qualem motum uirtus non bene tolerat, quemadmodum etiam in aliis euacuationibus est manifestum, sicut in empyemate, & hydropisi cum aperiuntur, unde 6. aphor. aphorismo. 27. Quicunque empyeci aut hydropici uruntur aut inciduntur his fluente sanie, aut aqua multa repente omnino pereunt. In talibus enim melius est infra subsistere quam exquisitè subito euacuare.

Causæ laudabilis sunt dominium uirtutis supra materiam, digerentis, separantis nocitium à iuuatiua, & expellentis nocitium retento iuuatiua, & debita proportio uirtutis reuentiuæ ad expulsiuam, & e contra.

Signa huius sunt signa digestionis materiæ, & bona conferentia, & tolerantia nisi nimis uelociter superflua educant.

Causæ autem & signa illauidabilis sunt his contraria. Prognostica. Fluxus laudabilis secundum plurimum est salubris, & est terminus alicuius ægritudinis, aut ab aliqua ægritudine præseruat. E contra uero illauidabilis frequenter perniciosus.

Cura laudabilis est ut finatur natura operari, si tamē effect nimis uelox aut tardus adiunetur auxiliis opportunis. Sed cura illauidabilis perficienda est sibi quod dictum fuit in capitulo generali, & in capitulis particularibus præcedentibus, ad aliquem enim fluxum particulariū superscriptorum reducendus est. Et sic cum Dei auxilio, cui gratias semper ago immortalis, finitus est tractatus iste difficilis de fluxu uetris, cuius æternæ maiestati supplico ut me cunctasque actiones, & gressus meos dirigat in sui cōtemplatione, & uia salutis æternæ. Amē.

De anatomia renum.

Via hic agitur de passionibus renum & uesicæ, est eorum anatomia præmittenda. Renes descriptiue sunt membra instrumentalia parua, figuræ oblongæ, ad rotunditatem tendentis, numero duo iuxta spōdiles alchatham ex utroque latere locata, ex parte gibbosa & cōcaua integrata, ex panniculo, carne crassa & solida, uena & arteria composita, ad mundificationem aquositate superflua à sanguine finaliter ordinata. Sunt quidē instrumentalia cū sint composita & in operatione necessariā ad esse indiuidui ordinata, parua in cōparatione fere ad omnia membra intrinseca. Sunt creati figuræ oblongæ, quia sic duo foramina superius, aut inferius melius sunt distincta. Tendunt ad rotunditatem, quia hæc figura magis est capax, aut à nocuentis magis tuta. Fuerunt autem duo cum tamen cuiuslibet aliarum superfluitatum, scilicet cholerae, & melancholice receptaculum sit tantum unum, quia hæc aquositas est multo maioris quantitatis quam aliqua illarum superfluitatum. Et secundo ne læso uno huius aquositatis mundificatio impediatur. Tertio, quia si fuisset tamen unus oportuisset ipsum esse magnum, qui

qui non potuisset debite locari nisi fuisset facta eminētia in alcham, quod fuisset satis turpe & indecorum. Sunt autem locati iuxta spondyles alcham, unus in dextro latere alter in sinistro, sed qui in dextro latere est magis eleuatus, tum quia calidior, tum quia hepar minus descendit quam splen, & tertio ut cedat monoculo qui infra renem dextrum est locatus. Habent autem partem gibbosam & concauam, secundum quam adheret dorso, cum hac enim forma melius aquositas attrahitur, & per poros ad uescicā expellitur, & sanguis nutritur renes melius digeritur, & ipsi melius dorso alligantur. Panniculus autem inuoluens & suspendens unumquemque eorum per quem datur ipsi sensus cōponitur ex nervo oriente à media spondylium alcham, & ex ligamēto ortum habente ab ipsis spondylibus. Caro autem fuit solida ne facile excoriētur ab urina acuta, & ab humoribus acutis qui ei permiscerentur aliquando, sed fuit crassa, ut in eis uirtus attractiua esset fortior, cuius fortitudo insequitur multitudinem caliditatis & spirituum. Venæ autem uenientes ad renes dicuntur emulgentes, quæ oriuntur à uena chyli descendente cum est ex directo renum. Orificia autem istarum uenarum non sunt ex directo, sed unum est altius & superius. scilicet quod est initium uenæ emulgentis uenientis ad renem dextrum. Cuius causa est quia ren dexter est magis in alto situatus quam sinister, & quælibet istarum emulgentium uenit ad renem concauitatem, & in ea dilatur & rarefit, & ipsa sic rarefacta est colatorium, per quod colatur aquositas à sanguine, nam renes per uenas emulgentes attrahunt aquositate simul cum pauco sanguinis ipsos nutrituro, sed in renibus per colatorium colatur aquositas & descendit ad orificium inferius ad quod terminatur porus uritis deferens illam aquositate ad uescicam. Sanguis autem, qui crassior, non potens transire remanet, qui renes nutrit. Quapropter aquositas optime colata ad uescicam deferitur, quæ deinde mingitur. Similiter ad utrumque renem ab arteria aorti descendente, uenit ramus arteriæ deferens spiritum uitalem. Nervi autem ipsi adueniunt à nucha spondylium alcham, ex quibus ut dictum est simul cum ligamentis ab eisdem spondylibus ortu habentibus texuntur panniculi ipsos renes inuoluentes & suspendentes. Sunt autem ordinati ad mundificandam aquositate, quia aquositas multa quæ erat necessaria, ut simul cum ea sanguis penetraret per ramos subtilissimos uenæ portæ, aut uenæ chyli sibi obuiantes, cum sanguis transiit ad chylum est superflua, propterea per uenas emulgentes expellitur ad renes, ut deinde tanquam superflua expellatur. Non enim de ea remanet cum sanguine nisi quantum sufficit ad faciendum sanguinem penetrare per uenas ad corpus nutriendum. Ex quibus manifestum est ipsos renes colligari cum cerebro mediantibus nervis à nucha orientibus, & cum corde mediantibus arteriis orientibus ab arteria aorti, & cum hepate per uenas emulgentes, & cum uescica per poros uiritides, & quod sunt cōplexionis calidæ & humidæ, & possunt pati omne genus ægritudinis, scilicet malam complexionem quæ est secundum plurimum calida, malam compositionem, scilicet oppilationem, & morbum in numero sicut lapidem, arenulas, & pilos, qui secundum plurimum ex eadem materia generantur. scilicet crassa, phlegmatica, uiscosa caliditate ipsorum, & quandoque pili generantur ad longitudinem palmi cum materia illa transiens per aliquem porum strictum colatorii paulatim in pilum condensatur, & quandoque patiuntur solutionem continui secundum aliquam uenam colatorii, unde fit miētus sanguinis, licet etiam possit esse miētus sanguinis propter colatorii dilatationem, sed hic paruus est, imo quod mingitur est sicut lotura carnis, licet etiam ruptura emulgentis superius possit esse causa miētus sanguinis, debilitando colatorium, sed hoc rarius. Item possunt pati apostematata, post cuius rupturam sequitur ulcus licet ulcus in eis ex pluribus aliis causis contingere possit. Item causa ipsorum fit diabetes, quando tota aquositas uel plusquam debeat trahitur ad renes, & attracta fere subito expellitur, & simulatur lienteria, cum nullam digestionem in renibus recipiat, sicut nec cibus in stomacho.

De anatomia uescicæ.

Vescica est membrum instrumentale, magnam habens concauitatem infra renes, dorso alligatum, superius cum renibus mediantibus poris uiritidibus, anterius

cum uirga mediante collo eius colligatum, ex duabus tunicis quantum ad fundum ex carne & musculis quantum ad collum, & nervis, uenis, & arteriis compositum ad attrahendum aquositate, ipsam quoque debitum tempore retinendum, & tandem expellendum finaliter ordinatum. Quod sit instrumentale patet ex sepe dictis. Concauitatem autem habuit magnam propter multitudinem superfluitatis aquosæ, quam habuit continere. Est autem dorso alligata infra renes, quia renes alligantur spondylibus alcham. Ipsa uero spondylibus alapis secundum eius concauum. Est autem superius continuata cum renibus mediantibus poris uiritidibus, quorum dexter oritur à foramine inferiori renis dextri. Sinister à foramine inferiori renis sinistri, qui poris uiritides sunt cannales stricti, rotundi, longi, per quorum foramina defertur aquositas urinalis à renibus ad uescicam. Hi autem perueniunt ad uescicam circa medium eius, dexter ad dextrum, sinister ad sinistrum eius. Et non perforant uescicam directo uno foramine magno, imo foraminibus paruis & obliquis procedentibus inter tunicam, & tunicam per aliquantum spatium, postea penetrantia secundam tunicam. Quod factum fuit ne cum uescica impleatur urina, possit urina regredi, imo quanto magis est plena, tanto tunicam interior magis comprimit exteriorem non sinens urinam regredi. Et sunt nervosi ex duabus tunicis compositi, sicut & fundus uescicæ, continuatur autem collum uescicæ, cum uirga in uiris, in quo collo simul & uirga est foramen per quod mingitur, sed in mulieribus extremitas colli uescicæ terminatur ad uuluum, distanter ab orificio eius per duos digitos, aut circa, & collum uescicæ in uiris est longius quam in mulieribus, & habet tres anfractus, in quibus aliquid urinae cum egreditur retinetur, quia anfractus inuacat ad retentionem urinae, ne facile inuoluntarie egrediatur, sed collum uescicæ in mulieribus non habet nisi unum anfractum, & est magis latum quam in uiris. Est autem fundus uescicæ compositus ex duabus tunicis, quarum intrinseca est dupla secundum crassitiem ad extrinsecam cum obuiet aquositati urinae acuta, sed collum est carneum, siue carnosum, & crassum, propterea facile consolidabile cum soluitur, fundus uero non. Ad uescicæ autem tam partem dextram quam sinistram uenit nervi, uenæ, & arteriæ à nucha, uena chyli, & arteria aorti descendentes cum sunt ex directo spondylium, alapis, & alosos. In collo autem eius est tantum unus musculus qui ipsum circumdat. Cuius inuacemum est urinam usque ad horam uoluntatis retinendi, & cum uoluntas fuerit expellendi eius laxabitur constrictio, & uentris musculi uescicam urgebunt, & urinam expulsua adiuuante expellent. Finis autem inferitur in fine. Nam iuxta Auic. 19. tertii, cap. primo. Quemadmodum Deus excelsus creauit, fecit uasa comprehendentia totum usquequo aggregatur. deinde expellitur totum simul per quod fit excusatio ab affellatione fere continua. Similiter præparauit superfluitati aquosæ dignæ expelli capacitatem & sacculum comprehendentem totalitatem, aut plurimum eius, donec surgat ad expellendum simul, & non sit necessarium expellere ipsam continue, sicut accidit patientibus distillationem urinae, & capacitas illa est uescica. Ex his manifesta est anatomia uescicæ, & complexio eius quæ est frigida & sicca. Vesica autem potest pati omne genus ægritudinis, scilicet malam complexionem cuiuscunque generis, malam compositionem, sicut oppilationem, siue sit in meatu per quem urina attrahitur ad uescicam, siue in meatu per quem expellitur. Item morbum in numero. scilicet lapidem, qui aliquando crescit ad quantitatem oui. Item ægritudinem in quantitate aucta, aut diminuta. Item ægritudinem in situ propter distocationem. Item solutionem & apostema, & quandoque ipsi communicant membra regalia & nobilia, sicut cerebrum. Nam fit dolorosum cum ea, & aduenit ei uertigo, & quandoque prouenit ad fisen causa communitalis ægritudinum calidarum uescicæ. Item hepar, quare aliquando accidit hydropifis propter frigus uescicæ. Et communicat ei cor per arteriam. Et ægritudines uescicæ multiplicantur in hyeme, & curantur sicut ægritudines renum, sed cum medicinis fortioribus & magis remanentibus, & sunt potiones, iniectiones, unctiones, & emplastra, quibus emplastrantur duo emunctorii, id est, pori uiritides, & sub umbilico, scilicet usque ad pecten, & in duabus commissuris singularibus. scilicet pori uiritides ad uescicam

Io. Arculani

c 4

ficam

sicam terminantur, & etiam in peritoneon. s. inter anum & testiculos, & curantur cum selsionibus in tinis.

De difficultate urinæ.

Pro noticia terminorum est sciendum, quod actio urinandi dupliciter impeditur, aut in emissione, aut in retentione. In emissione quidem diminute, ablate, aut corrupte. Diminute quidem quando homo tenuiter mingit, unde magnum tempus occupat in mingendo, aut quia urina existente in uesica non potest incipere mingere cum uult, aut forte postquam incoepit non potest continuare, sed per notabile tempus intercipitur, & hæc dicitur actio emitendi urinam diminuta, & à quibusdam uocatur dysuria. Ablate autem læditur, quando homo nullo pacto potest mingere, & hæc ab eis uocatur ischuria. Corrupte uero quando guttatim emittitur, aut cum conamine, hæc. n. actio corrupta dicitur, quia non cōuenit alicui indiuiduo de specie humana naturaliter disposito, & dicitur stranguria. Et has dispositiones hoc uersu pertrinxerunt. Strangur. guttatim. Schur. nil. dysurq; per horas. uerum his terminis antiqui & moderni abutuntur, sed secundum Simonem apud grecos stranguria quæ potius dicitur, & scribitur stranguria exponitur constrictio urinæ, & est cum guttatim mingitur, & est species dysuriæ, sed hanc cōtentionem de his nominibus omittamus. Actio etiam retinendi urinam tripliciter impeditur. Diminute quando non potest eam debito tempore cōtinere, sicut accidit in uoluntarie mingentibus dum uigilant, & etiam mingentibus in somno. Ablate quando nullo modo potest cōtinere, & dicitur distillatio. Corrupte uero quando cum dolore retinetur. Verum autem istæ duæ actiones. s. emissio & retentio urinæ possint diminute lædi per intensiorem est ex dictis manifestum. Est enim tenenda pars affirmatiua. Rasis autem in præfenti cap. per difficultatem urinæ intellexit emissionem urinæ tripliciter impeditam. s. diminute, ablate, & corrupte. De impedimento autem triplici retentionis urinæ loquitur in quodam cap. sequente intitulo de fluxu urinæ. Et ex his manifesta est quidditas difficultatis urinæ, de qua intulatur præfens capitulum. Est enim læsio emissionis urinæ, diminute, ablate, aut corrupte. Sicut e contra fluxus urinæ, de quo intulatur quoddam capitulum sequens, est læsio retentionis urinæ, diminute, ablate, aut corrupte, sunt etiam utriusque species manifestæ ex dictis.

Causæ difficultatis, siue impedimenti emissionis urinæ sunt septem. Prima, est nocumentum uesicæ. Secunda, est læsio in meatu urinæ, qui est collum uesicæ, uel uirga. Tertia, est nocumentum in uirtute. Quarta, est nocumentum lacerti, collis, uesicæ. Quinta, est dispositio urinæ. Sexta, est dispositio renum & pororū uiridum. Septima, est dispositio membrorum principalium, & sibi deseruiuentium.

Prima causa, scilicet nocumentum uesicæ est. Aut propter malam complexionem sine materia, quæ secundū plurimum est frigida aut cū materia cuiuscunque generis. Secundo propter apostema ipsius calidum, aut frigidum frequenter durū. Tercio ex retentione urinæ longo tempore. Nam uesica extenditur, & meatus urinæ oppilatur, & etiam propter extensionem uilli latitudinales facti debiles non possunt se contrahere & constringere uesicam, ita ut urina expellatur. Secunda causa, scilicet læsio in meatu colli uesicæ, aut uirgæ, est aliquando ulcus ualens, aut scabies in meatu urinæ existens, ex quibus natura sentiens mordicationem terretur ab expulsionem urinæ per meatum illum. Nam quoties uult mingere dolet, ideo non exprimit uictor uesicam fugiens à dolore, imo cōstringit meatum urinæ, & fit oppilatio attenuatoria. Fit etiam eiusdem oppilatio attenuatoria propter compressionem ab aliquo membro, sicut anus, intestinum rectum, collum matricis, cum huiusmodi membra apostemantur, aut ex aliqua causa tument & comprimunt collum uesicæ, aut sicut apostema factum in partibus inferioribus dorsi, aut toris, & sicut si accidat testiculo eleuari ad mirach, quare comprimat meatum, & quandoque exicatio humiditatis fluentis à carne glandosa, quæ est apud collum uesicæ est causa constrictionis meatus. Aliquando uero meatus iste oppilatur coarctatorie propter lapidem, sanguinem coagulatum, sanie, humorem crassum, & uiscosum uel propter uentositatem crassam. Veruca autem, & caro orta in meatu facit oppilationem carno-

sam, & oppilatio sequens apostema eiusdem meatus reducitur ad oppilationem carnosam. Tertia causa, est nocumentum in uirtute, quæ est triplex, scilicet sensitiua, motiua uoluntarie, & motiua naturalis. In sensitiua quidem est nocumentum cum uirtus sensibilis non percipit mordicationem, aut grauitatem urinæ propter stuporem eius, sed in motiua uoluntaria est nocumentum cum in his lacertis latitudinalibus uentris est paralytis, unde non possunt se contrahere pro urina expellenda. Si autem in lacerto colli uesicæ esset paralytis, potius fieret distillatio urinæ quàm difficultas, & e contra si spasmus esset in eo, in motiua autem naturali est nocumentum, quando uilli latitudinales fundi uesicæ nō possunt se contrahere pro expulsionem urinæ.

Causæ autem nocimenti harum uirtutum sunt, aut mala complexio, aut defectus spirituum, aut nocumentum in principis. Quinta causa est dispositio urinæ, aut ex parte quantitatis, ut cū est pauca, à cuius expressione deficit uirtus non stimulat, uel est nimia supra quam uirtus non habet proportionem, aut ex parte qualitatatis ut cum in ea fuerit calor faciens mordicationem per poros uirides collum uesicæ, & uirgam, & maxime si loca ista fuerint ulcerata, aut scabiosa. Sexta causa, est dispositio renum cum fuerint debiles, nō potentes attrahere aquositate propter malitiam complexionis, & proprie frigidas, aut non potentes eam expellere, aut fuerint oppilati, aut apostemati. Et similiter cum pori uirides fuerint oppilati, aut forte rupti, ex qua ruptura aqua in greditur concavum uentris inferioris. Septima causa est ex parte membrorum principalium, sicut hepatis, cum deficit à sequestratione aquæ & eius expulsionem ad uenam cōcauam, sicut in ascite, de quo defectu sermo præterit in hydropo. Similiter cum cerebrum retrahit spiritum animale tempore somni, aut uerecundiam, aut aliquas occupationes circa peragenda ab instrumentis urinæ, quare remanent uilli latitudinales debiles, & alia instrumenta debilia pro cōtractione necessaria ad expulsionem, uel forte propter aliquas egrotudines cerebri, sicut lithargiam & similes, de quibus sermo præcessit. Et aliquando leduntur nucha & nerui, unde si fiat paralytis frequenter urina emittitur inuoluntarie. Si uero spasmus frequenter sequitur difficultas.

Causæ autem primitiue, quædam sunt extraneæ, sicut casus, percussio, offensio instrumentorum urinæ, unde subito aliqui sunt impotentes ad emittendum urinam, quia forte dirumpitur uesica, aut porus uirides, aut ren, unde urina ingreditur concavitatem uentris, aut forte uilli latitudinales debilitantur. Aliqui uero inuoluntarie urinam emittunt læso lacerto colli uesicæ. Quædam uero causæ primitiue sunt non extraneæ sumptæ ex rebus non naturalibus & hæc sunt plurimum non causant difficultatem urinæ immediate.

Signa. Difficultas urinæ & retentio eius est manifesta. Notitia uero causarum est occulta, sed in primis bonum est quod cognoscas, an difficultas urinæ sit propter nocumenta uesicæ & sibi uicinorum, an propter nocumenta renū & pororum uiridum, aut membrorum quæ sunt supra renes. Cognoscitur autem quod difficultas sit propter uesicam, quando uesica est plena urina, quod cognoscitur per tumorem in femore perceptum. Si uero uesica sit uacua ab urina notabilis quantitatis non est tumor in femore, quare difficultas urinæ est propter membra quæ sunt supra uesicam. Et si in causa sint renes, aut pori uirides declaratur per nocumenta eorum. Si uero in causa sint membra supra renes, scilicet hepar, aut cerebrum, aut nucha, & nerui declaratur per nocumenta sua. Cum ergo per tumorem in uesica certificatus es impedimentum urinandi esse propter uesicam, tunc per signa distingue causas ipsi uesicæ pertinentes. Quod enim sit propter frigiditatem eius cognoscitur per albedinem urinæ cum crassitudine, aut tenuitate, & multitudine necessitatis surgendi ad mingendum ante istud, & sensibilitatem frigoris, & iuari à calidis & priuationem signorum reliquarum causarum. Signum uero caliditatis est acuitas urinæ & inflammatio sensu percepta. Et si causa est constructio à frigore significatur per iuuamentum proveniens ex mollificatione. Et si est à febribus adurentibus & siccitate significatur, quia iuuatur ab humectantibus & frigidis. Et iterum de signis eius est quod parum non egreditur, & multum est

est facilius exitus propterea quod humectat madefaciendo meatum & dilatando ipsum. Signa autem eius quæ est causa apostematis in uesica, aut membris ipsi uicinis, aut exturæ, scies ex cap. sequenti intitulo de apostemate, quod fit in renibus & uesica. Et differentia inter difficultatem factam ex apostemate, & factam ab aliis causis est, quod apostema non accedit subito, sed paulatim nisi fit res magna ualde, & cum ea adest febris. Sed difficultas ab aliis causis sicut ab oppilatione non apostemosa frequenter fit subito, & cum illa raro est febris. Et cognoscitur difficultas sequens oppilationem per causam in uesica ipsa, aut propter coarctationem à membro uicino ex inflammatione & tensione eius propter multitudinem urinae extendentis. Illa enim quæ est causa membri mittentis non est cum coarctatione à membro uicino, neque cum tumore & tensione, cum urina non descendat ad eam & omnes species oppilationis quæ accidunt in uesica propter causam in ipsa, aut causa membri uicini coarctantis sunt cum dolore. Et quod fit à reticulo eleuato comprimente meatum ipsa eleuatio est signum. Et quod fit ab exiccatione carnis glandosæ, præcelsio causarum exiccantium est signum. Item quia urina multa melius mingitur quam pauca. Et cognoscitur apostema oppilans per signa propria, de quibus infra. Et etiam per signa dicta. Cognoscitur autem res oppilans abique apostemate per syringam, & per illud quod ipsa expellit de sanguine, aut alio humore, aut per id quod stat in facie eius ex uerruca, aut lapide, aut incarnatione & non dimittit ipsam penetrare. Et lapis cognoscitur per signa eius, & propterea quod syringa tangit duram ualde. Et sanguis quidem & humor cognoscuntur iterum per urinam, nam secundum plurimum aliquid egreditur cum urina. Et sanguis etiam cognoscitur per signa congelationis sanguinis in uesica ex citrinitate coloris, aut paruitate pulsus & anhelitus, & frequentia amborum, & sudore frigido, & rigore, & nausea, & est malus à quo parum fit euasio. Et humor quidem crassus cognoscitur ex grauitate sensata, si sit notabilis quantitas, & iterum si egreditur in urina. Et illius quidem quæ est à frigore constringente, aut calore solidum faciente causæ propinquæ & antecedentes sunt signa. Et illius quæ est à uenositate signum est tensio sine grauitate, & quandoque est cū permutatione, quandoque sine. Et signum eius quæ est ex debilitate sensus, est ut non sentiat mordicationem urinæ. Et signum eius quæ est à debilitate expulsiuæ, est ut compressio facilius educat eam. Et signum mollificationis lacerti uentris est, quia non potest uentrem contrahere pro compressione faciendâ, & compressio facile eam educit. Signum autem mollificationis lacerti colli est, quia urina egreditur inuoluntarie & ecotra est de spasmu utriusque, quia per spasmum lacertorum latitudinalium uentris urina exprimitur, sed per spasmum lacerti uesicæ urina retinetur, nec potest educi nisi cum compressione. Et difficultas facta causa renû, & pororum uridum, siue sequatur debilitatem attractiua, uel propter aliquam speciem malæ complexionis, siue oppilationem, siue apostema, aut solutionem continui cognoscitur per signa inferius ponenda, & ut dictum est urina non cōtinetur in uesica, & si sit magna grauitas circa renes ibidem urina retinetur, non potens ad uesicam penetrare. Et si grauitas sit mediocris, tunc illic est materia cum apostemate, aut sine. Si autem non sit grauitas, sed dolor extensius tunc est uentrositas in renibus. Et quando non est nocumentum in uesica nec adsunt signa oppilationis renum, & uenter est lenis, tunc causa difficultatis urinæ est debilitas attractionis renum. Et signum factæ causæ doloris accidentia ex ulcere, aut ex acuitate urinæ est quod tolerantia dolorum educit eam. Item adsunt signa ulceris sumpta à sanie. Et signa facta ab exiccatione humorositatis in membris glandosis, sunt antecessio causarum exiccantium, & quod humectatio facit fluere urinam. Et signa difficultatis urinæ causa hepatis, cerebri, nuchæ, & neruorum sunt ægri tudines suæ, de quibus sermo præcessit, & proprie cum non apparent nocumenta in instrumentis urinæ.

Prognostica. Primum. Hæc passio difficulter sanatur in senibus, & proprie in decrepitis, & adhuc ampliatur aphorismus sextus, sextæ particulæ, nephretici & circa uesicam dolores laboriose sanantur in senibus. Secundum Aui. expertum

quidem est in pluribus horis, & dictum est qui habet difficultatem urinæ, & aduenit ei postea tenesmus, moritur in septimo nisi accidat febris & prouocationem plurimam faciat. Verificatur autem quia aliquando accidit difficultas urinæ propter spasmum lacerti, colli, uesicæ, & postea aduenit tenesmus propter fortem conatum ad mingendum, unde fit magna compressio ani. febris autem superueniens resoluendo humiditatem spasmaticam curat difficultatem ex qua mortuus fuisset in septimo, licet aliquando moriuntur, soluto autem spasmu fit plurima urinæ prouocatio. Tertium. Quibus minus denegatus fuerit, si mingunt in septimo uel ante sufficere secundum plurimum saluantur. Si uero post septimum secundum plurimum moriuntur, iam læsis notabiliter membris nobilibus ex urine retentione.

Cum urina minuitur, aut ex toto retinetur nec tumor apparet in femore, nec grauitas, nec dolor in renibus sentitur; succurrendum est ex medicaminibus urinæ prouocatiuis, quæ nominabimus. quorum unius confessio. Recipe seminis apij, nitri, rubæ tinctorum, seminis olusatris, asari, seminis iuniperi, ameos, seminis fœniculi, spicæ, amygdalarum amararum ana. 3. uiginti, seminis melonis. 3. 10. cantharidarum quarum capita, & alæ abscissa fuerint. 3. 1. ammoniaci 3. 3. ammoniacum in uino dissoluatur, & alie species ex eo conspergantur, ex quibus fiant formæ auellanis similes: ex quibus sumatur ab. 1. 3. usque ad. 3. hoc enim medicamen ualde confert corpori, cum dissolutionem, & laxationem patitur, & hypofarcæ ad expellenda omnia accidentia, causa quorum corpus desiccari oportet.

Hoc cap. diuiditur in quatuor partes. In prima curat difficultatem urinæ ex debilitate attractiua renum. In secunda parte curat difficultatem sequentem apostema propter causam & percussione. In tertia parte curat difficultatē sequentem oppilationem coarctatoriam à trumbis sanguinis, aut fauiosis, aut ab humore crasso, & uiscoso. In quarta parte curat difficultatem propter lapidem in uesica, Secunda ibi. Quod si contingat. Tertia ibi. Si autem mingendi. Quarta ibi. Si autem mingendi difficultas. In prima parte dicit. Cū urina minuitur, nec in femore apparet tumor, nec grauitas, quod signat in uesica non esse oppilationem, nec dolor in renibus sentitur, quod significat ibi non esse apostema, aut lapidem, neque urinam ibi congregatam, unde est sola impotentia atrahendi aquositatem sequens malam complexionem secundum plurimum frigidam. Succurrendum est cum urinæ prouocatiuis quæ nominauimus, quorum unum est hoc. Recipe seminis apij, nitri, rubæ tinctorum, olusatris. 1. seminis macedonici, alias seminis alexandrini, seminis iuniperi, seminis asari, ameos, sem. fœniculi, spicæ, amygdalarum amararum ana. 3. 20. seminis melonis. 3. 10. cantharidarum quarum capita & alæ abscissa fuerint, sunt enim nimis excoctiua. 3. 1. ammoniaci. 3. 3. ammoniacum in uino dissoluatur, & alia secum misceantur ex quibus fiant formæ similes auellanis, de quibus sumatur à. 3. 1. usque ad. 3. 3. hoc enim medicamen ualde confert corpori cum dissolutionem, idest mollificationem patitur ab humiditate superflua, & laxitatem, idest, molitiem hypofarcæ propter phlegma & aquositatem superflua. Et in summa ubi opus est corpus exicare, sunt enim hæc omnia fortiter prouocantia, notabiliter calida & sicca, præter semina melonum quæ sunt frigida & humida. Et potest hoc medicamen exhiberi cum iure cicero, aut alio prouocante sicut aqua raphani.

S C H O L I A

Cum urina minuitur & iuerisimile quidem est morbum maxime duci ab impotenti uesicæ uirtute naturali, hoc est, comprimendo, & expellendo. Recipe sem. apij calefacit hoc compositum, exiccat, & urinam prouocat: tamen in corpore humoribus noxiis repleto id non porrigendum censetur: dissoluit enim humores, & ad urinæ meatum eos conducit, unde est quod, nisi obstructio esset, à maxima corripantur uasa urinaria.

Quod, si contingat mingendi difficultas ex casu, uel percussione in femore, uel in ano, uel in eorum circuitu; ager ex basilica minuat. deinde aqua calida sepe superfundatur, & usque ad spatium medii diei oleis fricetur. agro quoque præcipiatur, ut urinam expellere nitatur.

Hic

Hic curat difficultatem urinæ à casu, aut percussione, qui bus accidit apostema in meatu colli, uesicæ, aut uirgæ, aut in membro uicino, præcipiens egrum ex basilica minui ad prohibendum augmentum apostematis, postea aqua calida superfundatur ad sedandum dolorem & meatum dilatandum. Et ex oleis fricetur ita ut uirtus olei penetret in profundum, & sit oleum doloris sedatiuum, sicut oleum uiolaceum sesaminum, & præcipiatur ut eger conetur expellere urinam, imo aliqua compressione adiutur eius expulsio. Sed ut credo melius esset in principio epithemare locum cum oleo rosato rudi, ad prohibendum apostema, deinde uenire ad mollescentiam iam dicta, præmissa semper phlebotomia copiosa, & etiam iterata, si fuerit expediens, & uentre cum clysteribus linito. Signa autem distinctiua inter apostema meatus uesicæ, & membri uicini sunt, quia in apostemate membri uicini urina exprimitur sine dolore magno, sed in apostemate proprio meatu cum dolore magno. Item ad sunt signa propria cuicunque membro apostemato.

SCHOLIA

In femore, uel in ano hæc sunt causa per se, quod urine stillicidium fiat. Ex basilica minuiatur] quæ tunc omnium medicamentorum erit præstantissima: habet enim horum membrorum contusorum rationem. Deinde aqua calida] fomenta, balnea, & emplastra talia sanguinem à percussione coagulum dissolunt, & mollescent.

Si autem mingendi difficultas contingit uesica existente plena, & extensa, & sit hoc post sanguinis, uel puris mixtum; medicamina, quæ trumbos sanguinis, uel puris, quod in uesica generatur, soluere consueuerunt, & liquare, danda sunt. confectio medicaminis sang. uel puris trumbos, quod in uesica sit dissoluentis. Recipe cordumeni, myrrhæ rubæ, de qua tingitur, seminis iuniperi, ammoniaci, assæ fetide omnium ana partes æquales ammoniacum dissoluatur, & reformentur pilulæ ex eis, uel his speciebus cum eo conspersis. de quibus quater in die sumatur cum apozemate de seminibus, quod nominauimus. Syrupus & etiam acetosus ex forti aceto factus multoties detur. per syringam præterea immittatur aqua in uesicam, in qua dissolutus fuerit sal, aut aqua cineris. & ista est confectio aque, quæ sit de cinere. Recipe cinerem de ilice, cinerem de uitis calis, calcem, his omnibus admisceatur tantum aque, ut ex ea cooperiri possint, & dimittantur sic per tres dies: deinde colentur, & per syringam iniiciatur. herba quoque croci hortulani, & sulla cocta supponantur. tinam præterea ingrediatur in aqua, in qua cocta sit chamomila stæcas arab. sampfuchus, simbrum, uel in qua extremitas caulium, & sulla, & simus columbinus cocta fuerint. & sedeat in ea, quandiu poterit. ex herbis istis sic coctis fiet emplastrum, siue epithyma super femur, & partes ei circumadiacentes. & dum in tina moratur; sumat ea in potu, quæ urinam prouocant. & si hæc omnia non profuerint; ad instrumentum, quo uirina prouocatur, redeundum est.

Hic curat difficultatem prouenientem ex oppilatione coarctatoria meatus. Et ponens signa dicit quod si uesica est plena & tensa, quod comprehenditur ex tumore in femore, & quia præcessit mixtus sanguinis aut saniei. Et tu supple aut phlegmatis crassi. Primum remedium, tunc dentur illa quæ dissoluant huiusmodi trumbos sicut istud. Recipe cordumeni, id est, carui agrestis, rubæ, myrrhæ, seminis iuniperi, ammoniaci, assæ, omnium partes æquales, ammoniacum dissoluatur, exempli gratia cum oxymelle simpliciter, uel composito scillitico, & cum eo misceantur reliqua, & reformentur pilulæ, de quibus detur quater in die cum apozemate de seminibus superius descripto. Dosis autem istarum pilularum est 2.3. Secundum remedium est, ut syrupus acetosus ex forti aceto factus multoties cum syringa immittatur in uesicam cui sit admixtum aliquid salis ad dissoluendum trumbos illos. Tertium ut aqua cineris etiam immittatur per syringam cuius est hæc descriptio. Recipe cineris de ilice, cineris de ui-

tibus calis, id est, cineris qui sit de quadam herba falsa quod uiruntur tinctorum, calcis, ana partes æquales, cum his misceatur tantum aquæ, ut ex ea cooperiri possint. Et dimittantur sic per tres dies, deinde colentur, & per syringam in uesicam iniiciatur aliquid eius, & est fortis & non ponenda ubi timor sit de excoriatione aut ulcere. Quartum est herba croci hortulani, id est, carthami, & sulla, id est, herba arctica, quæ regioni uesicæ superponatur postquam est cocta, prouocat enim. Quintum est, ut ingrediatur tinam aquæ, in qua cocta sunt chamomilla, stæcas arab. sampfuchus, id est, maioranas, simbrum, aut in qua cocta sint extremitates caulium, aut simus columbinus, & similia prouocant, & eger in decoctione earum sedeat, & ex herbis istis sic coctis & debite calidis emplastrum super femur apponatur, & partes uicinas. Sextum dum in tina moratur sumat in potu medicinas prouocantes, & ultimo his non sufficientibus ad curam, ad instrumentum cum quo urina prouocatur est recurrendum, & est syringa, quæ debet poni per foramen uirgæ, usque ad concauum uesicæ, ut id quod est in meatu propellatur. Et si aliquid sit in meatu syringe, postquam est immissa extrahatur. Et sequetur urina ne detur uacuum, uel catheter ponatur cum extremitate sua in meatum syringæ & extrahatur, & sequetur urina ne detur uacuum. Sed de his infra.

SCHOLIA

Syrupus acetosus detur] nam dissoluit, tenuat, & incidit. Per syringam immittatur aqua in uesicam] nisi sit apostema in causa difficultatis urinæ. R. cinerem de ilice] in debili corpore hoc medicamine uti non auderem facultates enim uesicæ principes læderet. quapropter eius loco mitterem uel oleum ex lilio, uel ex scorpiionibus, uel aliis similibus compositum.

Si autem mingendi difficultas post lapidis signa affuerit; eger & supinus iaceat, & pedes eius diu diuersis modis, & fortiter quatituri sunt. & si urina non egressa fuerit; oportebit, ut cum instrumento curetur: per quod membro immisum sit impulsio. cauendum tamen est, ne uirgæ immittatur, cum est ibi apostema. ad difficultatem uerò urinæ ualde confert sæpe ingredi tinam: & ungere locum ex oleo: et medicamina urinam prouocantia in potu sumere: & abstinere à nutrientibus acetosis, & ponticis, & crassis.

Hic curat difficultatem propter lapidem oppilantem meatum uesicæ. Si ergo signa lapidis affuerint, quæ sciuntur ex cap. sequenti, eger supinus iacens per pedes captus eleuetur & fortiter concutatur, ut lapis fortiter ab orificio remoueat, & si hoc non sufficit, oportet ut instrumentum aliquod si cut syringa per uirgam immittatur, per cuius immisionem lapis à meatu propellatur. Cauendum tamē est ne uirgæ immittatur, cum est ibi apostema, esset enim causa augmenti apostematis dolorem intensum inferendo.

Postea epilogan, dicit quod ad difficultatem urinæ confert sæpe ingredi tinam, & inungere loca ex oleis. Et tertio medicamina urinam prouocantia sumere, & quarto abstinere à nutrientibus acetosis & ponticis & crassis imo potius uti absteruis incidentibus & prouocantibus.

SCHOLION

Ager supinus iaceat, &c.] hæc sunt faciendæ; cum calculus sit paruus; quoniam magnam maiora desiderat.

De cura difficultatis urinæ.

Vra difficultatis urinæ exigit quatuor intentiones, prima remouet causam, secunda educit urinam, tertia corrigit accidentia, quarta ordinat debitum regimen sexerum. Si ergo in causa fuerit caliditas frigis, aut alia discrasia, remoueat cum contrariis applicitis & assumptis quæ tamen sint propria in prouocando urinam de quibus dicitur. Si uero fuerit propter apostema, curetur cura apostematis de quo infra in cap. proprio. Et administrantur illa, quæ cum hoc quod sunt propria in curatione apostematis etiam prouocent urinam. De quibus est phlebotomia basilicæ in primis, deinde phlebotomia saphenæ, quandoque enim prouocatur cum ea urina, & applicatur femori parietaria, caules, semina lini, althææ, mortificata in sartagine cum oleo chamæmil.

chamæmilanethino, & samino & similibus. Item fiant clysteria ex decoct. istorum & similibus cum oleis dictis, nam cum est leuitas apostematis descendit urina cum expressione & compressione, & minoretur potus aquæ & prohibeatur cibis duobus diebus aut ualde minoretur. Et si in causa fuerit retentio urinae longo tempore, curetur sedendo in decoctione mollificante & fomentando femur cum ea, facta scilicet ex se. lini & similibus. Deinde utere ruta & multum pronocantibus: & oleum balsami, & quæ sunt ei comparia sunt multi iuuamenti: & iuuatur etiam cum compressione. Et si in causa fuerit humor aut sanies oppilans meaturum, existimo tutius esse non exhibere diuretica, & maxime uesica existente plena, ne fiat maior oppilatio, & maior ipsius uesicæ extensio, sed bonum femori applicare dissoluentia trumbos sanguinis, & saniei & humoris crassi, & ex eisdem clysterizare, & ponere ægrum in tina siue in semicupio. Quibus non sufficientibus trumbos à meatu cum syringa pellere, & inicere in uesicam ea quæ illos dissoluant. Et urinam expellere cum syringa sicut dicitur. Tandem his non sufficientibus exhibere diuretica & trumbos dissoluentia. Ultimo his non conterentibus cum res iam posita est in desperatione incidere in collo uesicæ, secundum modum qui seruatur in incidendo collum uesicæ pro extractione lapidis, sed pro expellenda urina multo minus sufficit foramen. Medicinæ ergo femori superponendæ, clysterizandæ & in semicupio ponendæ sunt istæ, parietaria, cretæanus marinus, herba croci hortulani, extremitates canlium, chamæmilla, stœcas, samplucus, folia & radices apii. Sed fortia sunt cordumeni, rubea, mirrha, semen iuni peri, saluia, asarum, amomum, folia raphani & semen, pulegium, daucus, sinapis, simus columbinus, his ergo aut aliquibus earum pro libito utaris. Medicinæ uero fortes sumendæ sunt, diacurcuma, dialacca & similes, quæ sumi possunt cum aqua raphani, aut aqua ciceris nigri. Fortissima uero sunt prima descripta à Rasi in hoc cap. Et apud Aui. confectio diaretica fortis circa principium cap. de quibus ingrediuntur cantharides, quæ sunt ultimæ in prouocando, interius sumptæ & exterius applicatæ, & ad dissoluendum trumbos saniei & sanguinis optimum est medicamentum possum à Rasi, cuius litera. Medicamentum quod trumbos sanguinis aut saniei. Et similiter iniiciendum per syringam est aqua cineris quam describit. Cum uero, utere magis aut minus fortibus secundum quod uidebitur tibi expediens. Caue tamen ne in puero ualde fortibus utaris, imo leuia ex his danda sunt cum lacte materno, aut his nutritur utatur, remanebit enim uirtus in lacte prouocatiua. Similiter uitanda sunt ubi adit aut timeatur excoarctatio aut ulcus. Sed cura illius quæ est causa lapidis in renibus, est ut primo leniatur uenter. Et fiat renum mundificatio cum 123. florum cassiæ dissolutæ cum aqua scolopendriæ, & fiant clysteria lenitiua & prouocantia ex decoct. parietariæ oleo anethino, lilio rum alborum cum benedicta simplici & similibus. Exterius apponatur parietaria mortificata cum oleo scorpionum, & sedat in tinis prouocantibus & lenientibus. Et si mar iustini aut lithonchrypton cum aqua raphani & similibus. Si uero in causa fuerit lapis uesicæ eger eleuatus per pedes concutiatur, aut cum syringa immissa in uesica lapis à meatu uesicæ amoueatur, aut cum digitis in anum positis similiter amoueatur donec urinet, postea attendatur ueræ cutæ ipsius lapidis. Si uero lapis fuerit in meatu uirgæ retentus ponatur uirga in aqua calida. Et cum oleis lenientibus & dilatantibus ungatur & uersus extrema lapis exprimatur. Et impellendo urinam uiolenter tentet ipsius expulsionem. His autem non sufficientibus cum stilo habente extremitatem aliquam extrahatur, quod est simile instrumentum cum quo mundificantur aures, & his non sufficientibus incidatur meatus uirgæ, in quo continetur & extrahatur. Modus autem incidendi collum uesicæ pro extrahendo lapidem est satis notus. Si autem difficultatis causa fuerit uerruca aut caro, cum mollificantibus procedatur, & modus Aui. fortasse proderit, fortasse non. facta autem causa uentositatis curetur cura uentositatis, de qua in tympanite. Facta uero propter dolorem ex lésione in meatu curatur cum adiministratione stupefacientium & iniectione

ne, deinde præcipiatur ut se exprimat, & etiam comprimendo femur adiuetur, & post illud administretur cura ulceris, aut cura æquationis urinae acutæ cum cibis & potibus infrigidantibus, & quandoque iniiciantur facientia conglutinationem, separantia inter acuitatem urinae & nocumētū eius in meatu sensibili, sicut aqua albuminis oui, difficultas autem sequens apostema membri vicini curatur cum phlebotomia & reliqua cura apostematum, & maxime cum mollificantibus & compressione uesicæ. Testiculus autem eleuatus ad mirach trahitur deorsum cum mollificantibus quæ applicantur, & in quibus sedetur. Exiccatio uero carnis glandosæ similiter curatur cum humectantibus. Si uero in cā fuerit defectus uirtutis sensitiuæ aut motiua, & sequatur nocumentum principiorum, curetur cura paralysos, spasmus, aut stuporis. Si uero nocumentum fuerit in uesica & lacerto exhibeatur theriaca & nichridatum, & ungatur cum oleo sambacino, & oleo de lilio, & de narcisso, aut de croco, aut de balsamo. Et administretur emplastrum de foliis arborum & oleorum dilectorum spiritibus animalibus sicut folia malorum, menta, ruta. Et misceantur cum eis medicinæ expergeficientes sicut semen armel, & semen ruta montanæ, & emplastrum cum eis pecten. & si sequitur debilitatem expulsiuæ remoue discrasiam eius, quæ est causa eius, & est secundum plurimum frigida & curatur cum calidis moderate stipticis. Si uero difficultas urinae sequatur nocumenta renum intendatur cura discrasie apostematis & oppilationis renum, & cum hoc est necessarium administralare mollificantia exterius & reliquis applicitis necessaria est administralatio prouocantium urinam, nisi timeatur quod faciant descendere materiam plurimam. Si uero difficultas sequatur nocumenta membrorum nobilium, sicut hepatis & cerebri, intendatur cura suarum dispositionum secundum quod dictum fuit in suis capitulis. Et cum hoc tentetur urinae prouocatio omnibus ingeniis. Cura uera difficultatis sequentis percussione aut calum patuit in expositione textus. Et ex his patet prima intentio habenda in cura difficultatis urinae quæ est remotio causæ. Secunda uero scilicet educio urine perficitur modis infra scriptis.

Primus, comprimendo uesicam, & hoc maxime ualet ubi est debilitas uirtutis sensitiuæ, motiua, aut naturalis, & non est fortis oppilatio, sed fiat æqualiter aut cum gradatione incipiendo ex leui & procedendo ad fortem compressionem. Secundus modus, est cum immersione pediculi aut cymicis in foramine uirgæ. Et hoc maxime ualet ubi est supita uirtus sensitiua. Tertius modus, imponendo in ano aliquod suppositorium, sicut apud Aui. suppositorium de sale taberzet, & ut credo est saccharum candi, prouocabit enim urinam, & soluet uentrem, hoc enim stimulo excitat uirtutem expulsiuam, sed non uideo cur etiam ex melle supposito aut aliquo proportionali non debeat sequi idem effectus. Colligantiam namque habent magnam nerui, ueniente ad constitutionem musculi colli uesicæ, quare excitatio unius est causa excitationis alterius. Quartus autem modus, est cum syringis, quarum quidam sunt ad iniiciendum aliquid in uesicam, quidam ad extrahendum qui in uesica, continentur, quidam ad utrumque simul deserviunt. Syringa autem debet esse ad longitudinem palmi subtilis concava in eius extremitate rotunda. In qua extremitate sit foramen omnino absque asperitate, & similiter in lateribus sint plura foramina ut si unum oppiletur alterum suppleat ad iniiciendum & attrahendum secundum necessitatem. Extremitas autem remanens exterius debet esse latior & amplior cum rotunditate, ut per illam facile possint iniici quæ iniicienda sunt. Cum ergo uolumus mittere aliquid extremitati exteriori, appendimus aliquid sicut uesicam aut uaginam quam implemus liquore ipsam comprimendo, sicut cum comprimitur clystere iniicitur contentum in illo ad concavum uesicæ. Et hoc est ad iniiciendum, licet per foramen eius possit egredi urina in uesica contenta. Quædam uero est ad extrahendum, & est ut in concavitate eius sit aliquis globus rotundus ex sponsia, filtro, uel aliquo his proportionali perfecte obturans meatum in ea parte in qua continetur, & sit suspensus cum filo ferreo uel æneo, ut ad libitum possit per foramen intus pelli & extrahi. hoc ergo

go si trahitur uersus partem exteriorem, ne detur uacuum, educit quæ in uesica continentur, licet ea quæ in uesica continentur, possint fugendo extrahi. Aliqua uero simul est ad iniiciendum & ad impellendum. Et est ut habeatur cathariz cuius extremitas acuta & concava adæquatur extremitati syringæ remanenti extra, & prius impleatur cathariz liquore iniiciendo in uesica. Et extremitate sua acuta ponatur in concavum syringæ, iam existentis in uesica & impellatur liquor ad uesicam ne detur penetratio corporum & e contra cum eodem potest extrahi, quod in uesica continetur ne detur uacuum, syringæ autem possunt ex multis fieri, scilicet ex ære, argento, stanno, ligno, corio debite preparato sicut charta, super qua scribitur. Et quanto ex materia magis leui aut flexibili cum debita firmitudine, sunt præstantiores. Est ergo bonum ut diuersæ sint apud te quibus possis uti secundum exigentiam, & similiter diuersæ cathariz. Modus autem imponendi syringam sine dolore aut cum minori dolore quantum est possibile est ut æger se deat super extremitate caudæ suæ retro sustentatus, & eleuet gēua aliquantulum super in gēua, quæ gēua sint satis distantia inter se, deinde operator, uel æger ipse imponat syringam prius mollificata uirga, & uesica in tina uel cum fomentis, unctionibus aut emplastris. Et imponat extremitatem syringæ iam iniunctam cum oleo aut unguento leni quod fortasse est melius paulatim quo usque peruenierit ad obstaculum, & tunc eleuet aut deprimat syringam, donec pertrahat illud cum omni facilitate ne excoriet quousque perueniat ad concavum, & tunc potest aliquem liquorem iniicere in uesicam aut extrahere contenta in ea secundum exigentiam modis iam dictis aut utrunque facere. His autem non sufficientibus ad prouocandum urinationem, opus est deuenire ad sectionem in collo uesicæ, sicut fit in extractione lapidis, sed foramen sufficit paruum pro extrahenda urina. Tertia autem intentio, scilicet correctio accidentium perficitur in ipsum exigentiam.

Quarto uero scilicet regimen sex rerum perficitur secundum exigentiam causæ difficultatis urinae, & accidentium, sit tamen digita tenuis ita ut abstineat quantum est possibile a cibo & potu, & maxime a potu, & omnino caueat a stipitibus & uiscosis, sed potius cibi sui sint subtiliantes, & incidentes, abstergentes. Et caueat a potu aquæ, imo sufficiat ipsi collutio oris cum ea.

De lapide. Cap. 104.

Cum æger uirgam sepe fricat. Quamuis lapis in multis partibus corporis humani possit generari, scilicet in intestinis crasis, infra contentis, maxime in collo, ut uidi Ferrariz anno 1457. & erant quantitates auellane magnæ & multum duri, emissæ per anum a quadam muliere in multis uicibus numero circa 50. cuius rei testis est excellens medicus Bartholomeus Falconerus, & in pulmone ut dicit Galenus, & ut uidi Veronæ: & sua lingua ut habeo a Zoar: & in poro fellis a Gentili: & in paucis isturis & stomacho ut dicit Gilbertus: & in inguinibus ut uidi Veronæ, una cum eximio medico magistro Benedicto de Leonibus. Vt plurimum tamen generantur in renibus & uesica. Et nominatur hæc passio ab Hip. lithiasis. 4. Aphorif. ab Haliabbate, calculus: a quibusdam petra: ab Auic. & Rasi lapis. Qui lapis in renibus uel uesica, de quo est hic sermo est ægritudo in numero, si in quantum quid addit ultra partes membri, in quo continetur, immediate & sensibilibiter lædat operationes eius, & est multoties causa oppilationis quæ est morbus in uia impediendo transitum urinae & aliorum quæ per meatus urinales transire consueperunt.

Species lapidis sumuntur hoc modo. Quidam enim sunt renales. Quidam uesicales. Et distinguuntur inter se magnitudine, duritie, asperitate, colore. Nam geniti in uesica sunt maiores, duriores, asperiores, tendentes in colorem album, uel fuscum. Sed renales tendunt in colorem rubeum. Horum autem diuersitates sumuntur ex materia agente, & loco, & tempore, sicut dicitur quamuis in uesica reperiatur aliquando lapis facile comminibilis.

Causæ de consideratione medicorum sunt duplices, materialis, & efficiens. Formalem & finalem physicis relinquo, quæ tamen sunt satis notæ. Formalis enim est forma lapidis.

Finalis uero ut habeant esse, licet in quantum morbus finis sit nocere operationibus. Materia uero lapidis quæ est eius causa cōiuncta, est humiditas crassa & uiscosa de genere phlegmatis, sanguinis, aut saniei, in hoc differens a materia arenularum quæ licet sit crassa, non tamen est uiscosa, ideo facile comminuitur. Materia autem remotior est cibi & potus huius materie generationi proportionales, sicut lac, caseus & proprie humidus. Item carnes crassæ, sicut auium palustrium & magni corporis. Et caro camelina, hircina, & caro uaccina, & quæ de siluestribus incrassant, & pisces crassi, & cibi frixi, panis uiscosus, crudus & azimus, similiter uinum crassum, & quæ crassæ, & quæcunque merito sui, aut malitia artificio, aut ordinis, aut multitudinis, & similia sunt apta generationi chymorum crassorum & uiscosorum. Causa autem retentionis huiusmodi materie lapidis in renibus uel uesica, est debilitas expulsiue ipsorum, sequens malam complexionem: aut apostema, aut ulcus, aut oppilatio prohibens exitum materie ab huiusmodi membris, & retinentur superfluitates crassæ residentes ex omni aquositate perueniente ad hæc membra. Et hæc causæ retentionis materie tenent se ex parte causæ materialis. Et fortasse fortitudo attractionis renū, sequens caliditatem superfluum facit ut cum aquositate alia attrahatur materie crassæ, quæ postea non expulsiue densantur in lapidem, antequam expellatur, & hæc caliditas respectu lapidis simul se tenet ex parte agentis & materie. Oppilatio autem de qua supra, aliquando est coarctatoria superfluitate crassa retenta, aliquando attenuatoria a superflua frigidityte aut a compressione membri uicini sicut intestini, aut carnosæ ab apostemate. Caliditas autem actiue concurrrens ad generationem lapidis, quandoque est inseparabilis, quia forte naturalis. Aliquando separabilis, quia forte accidit propter dolorem, aut propter acceptationem rei calefacientis. Sed quomodo docunque sit, uidetur Auic. quod caliditas factiua lapidis sit egressa ab æqualitate per intensionem. Quod apud Serap. non est uerum universaliter. Imo quandoque est caliditas illa temperata, aliquando remissior temperata ut manifestat generatio lapidis in phlegmaticis, melancholicis & seniores. Quapropter in generatione lapidis plus operatur crassities & uiscositas materie caliditatis intensio. Et hoc affirmat Rasi in continenti dicens, quod ille in quo generatur lapis non potest esse frigidior renum nisi raro, præterea lapis uesicæ in qua est pauca caliditas est crassior, & durior quam lapis renum, quamuis materia sit similis. Ex quibus inferitur quod caliditas ualde superflua est causa, cur aliquando lapis sit minor & facilius comminibilis superflue exiccando humidum continuatum partium, & forte causa magnitudinis lapidis in uesica est loci amplitudo. Et e contra angustia loci est causa paruitatis eius in renibus. Et similiter causa duritiei in uesica potest esse longa mora cum calore moderato, sicut e contra paucitas moræ lapidis in renibus cum calore superfluo, potest esse causa cur lapis renum sit mollior, & facilius comminibilis. Et omnes istæ causæ lapidis reperiuntur in uesica, licet tamen ut dictum est sint ualde differentes in magnitudine, duritie, asperitate, propter causas dictas. Causa autem cur lapis renum sit rubeus est rubedo renum, & forte decoctio uiolenta & festina, & ille cui plurimum accidit lapis renum est pinguis, & ille cui plurimum accidit lapis uesicæ est extenuatus. Primi forte causa est oppilatio attenuatoria sequens pinguedinem. Secundi uero causa est debilitas expulsiue in extenuato sequens paucitatem caloris innati, & senibus frequentius accidit lapis renum quam uesicæ, sed in infantibus aut sibi proximis est e contra. Et plurimum huiusmodi est inter infantia & pubertatis initium, & illud ideo quoniam uirtus expulsiua in infantibus & adolescentibus est fortis, quare expellit a superioribus membris ad inferiora. In senibus uero uirtutes renum ipsorum sunt debiles. Et iterum quoniam infantum & adolescentum humores sunt subtiliores, propterea penetrant in renibus ipsorum. Et senum humores sunt crassiores, quare non penetrant in renibus ipsorum. Et quod plurimum generatur lapis in infantibus est propter appetitum eorum & motum ipsorum super repletionem, & quia potant lac, & propter contractionem meatus uesicæ ipsorum. Et in senibus propter debilitatem digestionis eorum. Et propter hoc uideatur

horarum spacio : deinde extracti pulverizentur , & reponantur.

In parte præfenti curat lapidem. Et primo qui est in uestica, secundo qui est in renibus, tertio qui est in uirga. secunda ibi. Cum autem in renibus lapis fuerit, tertia ibi. Si autem la ips ceciderit. In prima parte dicit, quod lapidi existenti in uestica, curatio ista utilis & optima existit, frangit enim lapidem in spatio minori. 40. dierum. Cuius confectio est ista. 8. carpobalsami, id est, fructus balsami, seminis raphani, dauci, olusatris, id est, seminis macedonici, corticum radicum, opopanacis, corticum radicum capparis, amygdalarum amaram, dannocochiaz, id est, saxifragiaz, schinanthi, ciperi, spicæ indæ, calsiæ lignæ, saccolocondrion, id est, scolopendriæ, gétianæ, aristolochiæ rot. affari, cordumeni, id est, charui agrestis, ammoniaci, sagapeni, bdellii, piperis, acori, omnium partes æquales. Gumma, in sufficienti balsamo, id est, oleo balsami dissolutæ malaxentur, & ex eis alix species conficiantur, ex quibus informetur pilulæ, & sumatur ex eis in die. 3. 2. cum apozemate de seminibus, de quo supra. Et quandoq; sex ta pars. 3. 1. de cinere scorpionum cum his addatur. Cinis uero de scorpionibus fit hoc modo, scorpiones mittantur in ollam nouam quæ bene oppilata ponatur in furno super latere, in quo non sit uehemens calor per spacium sex horarum, deinde extracti pulverizentur & reponantur, scilicet in uase uitreo, in quo bene referuntur, hæ enim medicinz omnes sunt calidæ & siccæ præter scorpiones qui sunt frigidi secundum plurimum, & habent omnes singularem proprietatem in comminuendo lapidem.

SCHOLION.

Ego quoque iam fregi] ex his facile comprehenditur sepe, ac diu medicamenta esse applicanda : tempus quidem 40. dierum notat. Cinis uero de scorpionibus] est præstantissimum remedium, atq; singulare, & efficax.

Ager uero nutriatur ex aqua ciceris, & calagiæ, & mutagenat : & abstineat a lacte, & caseo, & ab alijs nutritiuis crasis : & ingrediatur tinam, ubi sit aqua, in qua cocta sint folia caulium, & sula, & berengessiph, & menthastrum, & finus columbinus, & medulla croci hortulani.

Hic ponit dietam conuenientem cōtra lapidem, est enim subtiliatiua & absterfua, & incisua, & prouocatiua sicut aqua decoct. ciceris, calagiæ, & mutagenat de quibus supra, abstineat a lacte & caseo, & ab alijs cibis crasis. Ingrediat tinam. Hic ponit tertium remedium dicens, quod ager ingrediatur tinam, id est, semicupium, ip qua sit aqua decoct. foliorum caulium, sula, id est, iux sue artetice. Berengessiph, id est, abrotani, sed pro eo potest accipi serapium, menthastrum, & finus colubinus, medulla sem. croci hortulani, id est, carthami, hoc semicupium est ad comminuendum lapidem.

SCHOLIA

Ager uero nutriatur ex aqua ciceris] huius uisus ratio mollificat, & aperit. Et abstineat a lacte, & caseo, & alijs nutritiuis crasis] quoniam calidiorum materia ducitur ab humoribus crasis, & uiscosis. Et ingrediatur tinam] quæ ob simplicia medicamenta admodum prodest, ac propter inunctiones facias.

Femur etiam sepe inungatur ex oleo scorpionis, & immittatur uirga. quod Rec. aristolochiæ rotundæ, gentianæ, ciperi, cortic. radic. capparis ana. unc. 1. hæc omnia in lib. 1. olei de amygdalis amaris posita ad solem per hebdomadā unam dimittantur, & colentur. & pro unaquaque lib. de eo adiungantur ei scorpiones. 10. & totum in uas, cuius os oppilatum fuerit, missum ad solem per duas septimanas moretur. deinde colatum reponatur ; est enim optimum, & mirabile. de quo guttatim quotidie in uirga mittendum est ; postquam ager egreditur de tina. quod, si lapis magnus fuerit, non inuenitur aliud remedium, nisi ut cum incisione extrahatur. de hoc tamen loqui huius nostri libri modū excedit.

Hoc est quartum remedium, & est quod post exitum a balneo unguatur femur cū oleo de scorpionibus, & ex eo etiā in uirga distillet. Cuius olei est hæc descriptio. 8. aristol. rotarū, gentianæ, ciperi, corticū radicū capparis, ana. 3. 1. hæc omnia in lib. 1. olei de amygd. amar. posita ad solē per hebdoma-

dam unam dimittantur & colentur & exprimantur. Et pro unaquaque lib. ex eo adiungantur scorpiones. 10. & totum in uas cuius os sit oppilatum, missum ad solem per duas hebdomadas moretur, deinde coletur & reponatur. Est enim optimum & mirabile, de quo quotidie per uirgam guttatim fundendum est, postquam ager de tina egreditur, sic enim præcedente mollificatione per balneum melius comminuetur. Vltimum remedium si lapis fuerit ingens his remediis non sufficientibus fiat sectio in collo uesticæ secundum quod dicitur & extrahatur, loqui tamen de modo sectionis metas huius libri transcendit.

Cum autem in renibus fuerit lapis ; ager frequenter ingrediat balneum : & renes, & ilia ex oleis inungantur. & ea, quæ calefaciunt locum desuper, cum panno ponantur ; ut t sunt ea, quæ nominauimus. in potu quoque sumantur ea, quæ lapidem frangunt.

Hic curat lapidem renum tribus auxiliis. Primum quod frequenter tinam ingrediat, de qua supra, & si cum ea ponentur aliqua mollificantiæ esset præstantior. Secundū quod renes & ilia ex oleis ungantur & desuper ponantur ea quæ locum calefaciunt, ut sunt ea quæ dicta sunt in lapide uesticæ. Tertiū fumar ea quæ lapidem frangunt de quibus supra.

SCHOLIA.

Vt sunt ea, quæ nominauimus] falluntur quidem ij, qui sacculos milio, & sale refertos applicant : siquidem calculi duriores reddunt. In potu quoque sumantur ea, quæ lapidem frangunt] si dolor sedatus fuerit ab emplastris, balneis, & unctiōibus ; educuntur enim facilius calculi mollificati per meatus apertos.

Si autem lapis ceciderit, & in uirga obstaculum fecerit : aqua calida ab alto distillando ei superfundatur, donec ru bere uideatur. deinde oleum tepidum guttatim superinfundatur & fricetur. et si necesse fuerit sugatur. & ex hoc mone uebitur lapis & exibat. sed si magnus & angulosus fuerit ; necesse est, ut uirga inferius incidatur, & extrahatur.

SCHOLIA

Aqua calida ab alto distillando ei superfundatur] ut pori dilatentur, aperianturque. Deinde oleum tepidum] quod fortasse minuet calculum, atque educetur.

Hic curat lapidē in uirga retentum duobus auxiliis. Primum est casus aquæ calidæ ex alto, & postea inunctio cū oleo tepido exprimendo lapidē uersus extra. Secundū auxilium est, quod his non sufficientibus uirga inferius scindatur & extrahatur lapis. Cura lapidis renum & uesticæ habet duplex regimen. Primum est præseruatiuum, reliquum curatiuum. Regimen præseruatiuum duas habet intentiones. Prima est prohibitio generationis materiæ lapidis maxime complenda regi mine sex rerū non naturalium. Secunda est ipsius materiæ iam genitæ euacuatio. Regimen autem sex rerum non naturalium prohibens generationē materiæ lapidis est, ut panis sit ex optima farina frumenti non oīno a fursure depurata, conueniēter salitus & coctus. Et uinum sit albū aut mediū coloris, clarum, subtilis substantiæ, pauciferū aut mediocrius uinositatis, limphandum em exigentiam cōplexionis tēporis & consuetudinis, & aqua sit subtilis, lenis, clara habens. 18. conditiones laudabiles, de quibus secunda primi, & carnes sint generatiuæ sanguinis subtilis, sicut aues bene conditionatæ, hæ di, uituli lactentis, castrati annualis, agni crassi, uidentur pisces, nisi quidam sicut temali, lutii parui. Item pisces parui, petrosi, & similes ex maritimis auratæ rubi & similes. Videntur lac & caseus & lacticia omnia, ius cicerum conuenit & ius caulium & rapæ debite coctæ. Et ex herbis bauricæ recentes, apium, fœniculum, petroselinum, endiuia, cichorea, asparagi, ex leguminibus chist hordei, & ius cicerū. Ex fructibus ficus humidæ, & siccæ, amygdalæ, uua alba : oua conueniunt modo sint mollia non per decoctionem indurata : & utatur ferculis & brodiis, & omnibus iis quæ uentrem leniunt, propterea magis conueniunt elixa quā assa aut fricta. Vitetur tñ in regimine præseruatiuo nimius usus diureticorum, præcipitant enim materias ad instrumenta urinæ. Vitentur fercula ex pasta & sal immundū, & in summa sit intentio ad generandum sanguinem subtilē nō autē humores crassos aut uiscosos, & ad leniendum uentrē, & non multum ad prouocandum, & procuretur ut fiant bonæ digestionēs, & ne superflua

superflua per regiones proprias euacuentur. Propterea sit aliquantulum parcus in cibo & potu, & surgat à mensa cum reliquis famis, & non multiplicet cibaria in mēsa una, & non comedat nisi digestionē celebrata, & potus sit cibo proportionatus, nec gerat uestimenta stricta circa dorsum. Et exercetur animo & corpore tempore debito, & non coeat nisi natura exigente. Sub secunda intentione quæ est materiæ iam genitæ euacuatio, comprehenditur prohibitio generationis lapidis. Et prohibitio augmenti ipsius iam geniti. Nec non ipsius iam genitieductio antequam magnificetur. Et ad complendum omnia hæc sunt duæ medicinæ laudatæ ab autoribus & mihi expertæ. Prima est, Recipe. florū cassiæ, 3. i. o. cum aqua scolopendriæ scilicet distillatæ, aut decoctæ, trahatur cassia, & fiat potio quam accipiat semel in mense, aut etiam pluries si expedit. Secunda medicina est aqua mellis secundum descriptionem Mesue, de qua debite calida accipiat quatuor diebus continuis. 4. 3. pro uice in aurora iam præcedentis coenæ digestionē celebrata. Aeger potest unam istarum medicinarum accipere in principio mensis, reliquam in medio mensis, & si ante potū aquæ mellis acciperet decem amygdalas amaras singula die, quas bene masticet, & post eas immediate biberet aquam iam dictam res esset efficacior. Et si patiens esset renum calidorum, sumat cassiam prædictam cum decoctione feminum communium frigidorum, liquiritiæ & granorum alchechengi, & proprie tempore calido. Item cum aqua mellis, quando decoquitur bulliant grana alchechengi. Et postea cum ipsa colata trahatur lac. 3. s. feminum communium frigidorum, & hæc sufficiant pro complenda hac intentione. Si tamen patiens esset siccitatis uentris potest superscriptæ cassiæ addi, drach. i. benedictæ simplicis aut tantundem electarii indi.

Regimen uero curatiuum, tres habet intentiones. Prima, lapidem comminuit & ipsum educit comminutum aut non comminutum. Secunda, corrigit accidentia. Tertia, ordinat debitum regimen sex rerum. Medicinarum autem perficiendum primam intentionem, quædam sunt simplices, quædam compositæ. Et simplices, sunt triplices quædam comminutæ à complexione, quædam à proprietate, quædam utroque modo. Comminuentium autem à complexione quædam sunt debiles, tantum in lapidem renum imprimentes, quales sunt medicinæ amaræ absterfusiæ aut fortis incisionis sicut oxymel, aut acetum, betonica, penthaphylon, capil. ueneris, grana solis, faxifragia, folia fraxini, radix scolopendriæ quarum impressio non est nisi in lapide renum: pertranseuntia autem usque ad lapidem uesicæ, sunt cicor nigrum, aqua eius radix costi, bdellium, radix sicæ, allia, tribuli, apium montanum, calamentum, pulegium, cucumer asininum, radix balsami & partes eius, semen raphani, & aqua radicū eius, scordeon, præputia, uitis alba, ruta agrestis, baurach, piper puluerizatum, ex quo factus est trochiscus, daucus cum aqua fistici facit descendere lapidem, uirtum adultum, & sang. hirci secundum artem collectus & referuatus in trochiscis, de quibus in hora doloris detur unus cum uini aceto, aut aqua apii montani. A proprietate autem comminuentia sunt puluis scorpionis & oleum eius & solatrum hortulanum, & lapis spongix, & iudaicus, & cinis leporis decollati, lumbrici terrestres exsiccati, cinis hepatis asini in lapide renum & gramen. Quidam comminutū utroque modo sicut uirtum album & clarum puluerizatum, cinis corticum ouorum scarabei, & semen genestæ quod frangit & educit & prohibet generari, & auis parua uocata cauda tremula & græce troglodytes in cuius alis sunt pennæ aureæ, & super cauda sunt puncta alba, & Francigenæ uocant safunegi, hæc adulta & cinis eius cum aqua mellis extrahit lapidem. Item simus columbinus. Modus autem componendi has medicinas est ut fiat una medicina composita habens condiciones opportunas in hac intentione & ut misceantur adinuicem medicinæ habentes uirtutem comminuentem ex dictis. Et quædam iuuantes ad penetrandum quæ etiam comminuant, sicut piper, cinnamomum, calamentum. Et quædam prouocantes extrahentes superfluitates crassas, sicut radix rubæ, foenugræcum, daucus, fus, meui, assarum, ameos, cheifim, fefilis, semen agni casti, sehinnanchum, & cordumeni, & cantharides in hoc sunt potissimæ imprimentes etiam in lapidem, sed administrantur cum

cautela, ut non ulcerent uirgam, unde in una portione non sit ad plus, nisi una, cuius caput & alæ sint abscessæ. Quædam sunt alteratiuæ & frangentes caliditatem aliarum sicut solatrum.

Aliæ sunt retardantes & detinentes medicinas in loco donec compleant suas operationes, & hoc faciunt cum uiscositate quadam, sicut species gummi. Aliæ sunt confortantes sua aromaticitate, sicut spica, cassia lignea. Alia confortent simplicitate moderata, ut radix rubi, uirga pastoris. Aliæ sunt sedantes dolorem cum proprietate, sicut nuces auellanae quæ etiam retardant medicinas in loco, & quadam anodinitate, sicut habentes caliditatem primi gradus, & proprie cum humilitate, & quædam stupefaciendo. Et ex his ita artificialiter mixtis fiet una medicina composita habens uirtutes opportunas in hac intentione, & natura sagax discernet inter eas, & eas ad diuersas operationes prout expedit ordinabit. Sed oportet ut hæc medicina composita non sit fermentata. Et si uolueris uerificare receptas inuenies iustinum, lithontrypton, & reliqua ab autoribus composita habere plures ex his uirtutibus hic numeratis. Nullum enim simplex debet poni in aliqua medicina composita, quod non habeat aliquam specialem utilitatem contra dispositionem, contra quam ordinata est composita. Et ista medicinæ quandoque sumuntur, quandoque applicantur in unctionibus, emplastris, fomentis, semicupis, quandoque in uesicam iniiciuntur, & ualet hic modus in utroque lapide. Secundus modus, est cum incisione, & extractione lapidis si primus non suffecerit, qui in lapide renum est inconueniens & mortalis, sed in lapide uesicæ possibilibus, licet timorofus propter membri nobilitatem ex cuius sectione sequitur aliquando dolor fortis, spasmus, syncopis, apostema, & aliquando mors. Et quandoque uulnus illud uertitur in fistulam, ex quo urina continue fluit. Caueant ergo ut non nisi magna necessitate cogente fecent. Sicut quando adesset dolor fortis, aut retentio urinae, aut similia accidentia suspicionem mortis facientia: & non fecent nisi in forti & constante, & præuacuato, & cum cautela ab errore, & si tales non sint dimittant sectionem, & properent, ad tollendum accidentia, tunc præstantia meliori modo possibili, transponant ergo lapidem, & similiter sanguinem ex punctura lapidis defluxum ad orificium colli uesicæ, ut urina libere effundatur, sit autem hæc transpositio tripliciter, sicut dictum fuit in cap. præcedenti.

Transponitur autem lapis renum, primo mouendo ipsum inferius motu forti saltando de gradu in gradum per aliquam scalam. Item anhelitus retentione ac compressione & frictione renum & aliorum trahendo inferius. Item cum uentosa paulatim mutata à renibus ad inferiora, & ex illis sunt clamores & clysteria calefacientia & humectantia, & inferiorum calefactio cum fomentis, & emplastris, hæc n. trahunt lapidem renū usque ad uesicā paulatim, & quæ extra de uesica per uirgam expellitur, aut per uulua mulieris. Quod si forte non posset trahi inferius & retentus urinam impediret, aut aliter multum noceret, trahatur superius, aut uomitu uiolento, aut cum uentosa supra renes posita. Incisionis autem modus cum deliberata fuerit sit obseruatis can. infra scriptis.

Primus quod incidendus sit puer constantis uirtutis, bonæ complexionis & habitudinis, & sit præuacuatus, & interstina lenita, cui ordinetur diæta tenuis sine uino, carnibus, & ouis cō pauco potu quæ sic obseruetur usque ad quartum diem, & eligatur tempus temperatum, dies clara & locus conueniens. Secundus quod instrumenta sint parata, scilicet pilum, instrumenta curua ad extrahendum lapidem post sectionem fasciæ, medicinæ appropriatæ in constrictione sanguinis.

Tertius canon, quod æger iaceat supinus cruribus retractis & dilatatis, & detentus sit à circumstantibus firmiter, & chirurgus imponat indicem in anum pueri uel puellæ uirginis, uel in uuluum deuirginatæ donec peruenerit ad lapidem. Et cum peruenerit ipsum ad collum uesicæ trahat, & teneat firmiter impellendo semper uersus collum, & tunc signet atramento ubi incisionem facturus est. Fiatque in collo uesicæ inter anum & bursam testiculorum, & non in fundo uesicæ, & fiat sectio super lapide, ita ut acuties pili ueniat ad lapidem, & sit tanta ut lapis possit extrahi, nā quanto minor est sectio, modo lapis possit extrahi tanto est melior, deinde extrahat illum cum instrumento curuo cum quæta facilitate & uelocitate.

Io. Arculani

f z tate

tate potest. Deinde ponat stupa, uel cotum infusum in albū oui cum utello mixtis cum puluere constringente sang. & non moueat ipsum usque in tertium diem, nisi aliquando accidens cogat ad mutationem, & tandem cura propria vulnerati consolidetur, & succurratur accideribus superuenientibus. scilicet dolori, apostemati, sang. congelationi & reliquis fecundum quod oportet. Si autem lapis peruenerit ad cannale uirgæ succurratur, secundum quod dictum fuit in expositione textus. Et quotidie antequam mutetur, mingat ut urina egrediatur per foramen naturale, & non per sectionem. Secunda autem intentio, scilicet correctio accidentium perficiatur secundum ipsorum exigentiam, dolor ergo si fortis est, oportet sedare ante sectionem, cum epithematibus, emplastris, vntionibus, & semicupijs, & cum clysteribus ex anodinis, & si expediat cum stupefacientibus bibitis, sicut philonio, theriaca noua, quæ cum hoc quod stupefaciunt, etiā uenositatem resoluunt, quæ aliquando est causa doloris & prouocant urinam, & sunt quæ ante incisionem stupefaciunt locum cum opiatibus sumptis cum uino. Et quandoque cum vntionibus applicitis parti incidendæ & circumstantibus. Sedatio namque doloris à futuro apostemate liberat, & forte à morte, & ad prohibendum apostema bonū est ut partes circumstantes liniantur cum aliquo percussiuo, & phlebotomia & diæta tenuis ad hoc præseruant. Si uero ex lapide retineatur urina propter oppilationem in renibus, poris uiridibus, aut collo uescicæ, aut meatu uirgæ tentetur eius eductio, aut transpositio quæ citius est possibile, quæ res qualiter debeat perfici patet ex suprascriptis. Si uero sequatur exco-riatio aut ulcus in instrumentis urinæ succurratur secundum quod docetur in sequentibus cap. Regimen autem sex rerum iuxta tertiam intentionem ordinetur, sicut dictum fuit in regimine præseruatiuo, sed in hoc regimine curatiuo opus est cibis magis abstergentibus, incidentibus, & subtiliantibus, & prouocantibus. Et tempore operationum fortium, sicut est sectio, diæta debet esse tenuis sine uino, sine carnibus, & ouis usque ad quartum diem, uel quousque sumus securi ab apostemate, & aliis seuis accideribus. Sequuntur medicinæ compositæ. Medicamen sublimè & expertū ad lapidem renum, secundum Serapionem. Recipe feminis bacearum excorticatis, milli solis, uetri adulti, dauci, ana terantur & cribellentur, & dentur de eo drach. 3. cum aqua decoct. ciceris nigri. Aliud secundum eum ad lapidem uescicæ. Recipe condili drach. 1. fimi columbini. 3. 1. s. terantur & dentur omni mane cum aqua raphani. Aliud Constantini. Rec. feminis bacearum, ci-trulli, cucumeris excorticatorum ana. 3. 5. feminis raphani, & apii & rapæ syluestris, & dauci, & petroselinæ ana drac. 2. feminis foeniculi drach. 3. granorum nere, idest, ceraforum syluestrium drach. 4. stercoreis uaccæ pascentis inuoluti cum oleo sambacino. 3. 5. terantur & cribellentur & detur de eo pondus. 3. 3. cum aqua apii & raphani. Ad lapidem uero porum sufficit balneum ex rebus molliciantibus & frangentibus lapidem cum sumptione rerum frangentium lapidem magis facilius. Rufus inquit, plurima balneatio in thermis sulphureis frangit lapidem, similiter si infundatur in eis pan-nus & calidus applicetur loco lapidis operatur ad exitum eius. Galenus autem testificatur quod pulvis leporis cōbusti exhibitus aliquot diebus quantitate duorum drach. cum aqua calida frangit lapidem renum & uescicæ. & sang. hircinus præparatus secundum artem exhibitus quantitate duorum aureorum est fortis in hoc casu. Et modus præparationis est ut eligatur hircus quatuor annorum, aut circa rubeus, & nutriatur per mensem herbis, & granis propriis in hoc cap. & iuguletur de mense Augusti, & extrahatur sanguis cuius primus abiciatur, & postremus, medius reseruetur, & excicetur ad solem diuisis in frusta, quantitate duorum aureorum, & exhibeantur cum uino potenti aliquantiter acetoso, aut cum aqua ciceris, aut raphani duo aur. pro uice aliquibus diebus uocatur enim manus Dei ob excellentem eius uirtutem. & apud Auicennam nigella aliquod diebus administrata cum aqua mellis frangit utrumque. Sed Gerardus, Rec. cretæ marinæ, milli solis ana drach. unam semis, sang. hircini præparati secundum artem drachmas duas, lapidis spongiæ, lapidis iudaici ana. 3. s. feminis melonis. 3. 1. aquæ laxi agiæ. unc. s. panis sacch. lib. 1. fiat electarium. Aliud eiusdem.

Recipe corrigiolæ. 3. s. cicerum rub. quart. semis, seminis melonis, unciam semis, bulliant in tribus libris aquæ ad consumptionem tertiæ partis, coletur & cum modico saccharo administratur. mirabiliter ualet & expellit arenulas. Item ualet succus limonum, & quasdam alias medicinas describit. quas lege ab eo, & dicit quod pro frangendo lapide bonum est præmittere molliciantia, sicut semicupia & emplastra molliciantia, mixta tamen cum aliquibus fortibus in hoc capitulo, deinde exhibere fortia ex iam dictis. Et ex fortibus est iustum lithon thrypton, electarium ducis & similia, & frangunt utrumque lapidem, difficilius enim est frangere lapidem uescicæ quam renum, quod n. frangit lapidem uescicæ, frangit lapidem renum, sed non econtra.

De apostemate quod fit in renibus uel uescicæ. Cap. 105.

Quid sit apostema renum & uescicæ, ex sepe dictis potest esse manifestum. Apostemata renum & uescicæ diuersificantur. Aut ex parte materiæ apostematis, & secundum hoc quædam sunt ex materia calida essentialiter sanguinea, uel cholericæ, magis tamen sunt ex sang. grosso, uel subtili cholericæ, quàm ex cholera: quædam ex materia frigida phlegmatica, uel melancholica, secundum plurimū tamen ex materia mixta. Et quæ sunt melancholica quandoque sunt talia incipiendo, quandoque permutatio siue sint melancholica adusta, siue non adusta. Secundo diuersificantur ex parte locorum in quibus sit apostema. Nam aliquando fit in utroque renum. Quandoque in uno eorum dextro uel sinistro. Et quandoque sunt magna occupantia totum corpus renis. Quandoque parua, & tunc uel sunt in latere concauitatis, in qua colatur urina, uel in latere gibbositatis apud panniculum, uel in pâniculo, uel ante eos, uel sunt in parte terminata ad dorsum, uel sunt in parte terminata ad emunctorium. i. porum uiritidē, uel in parte meatus superioris uersus uenas emulgentes. Similiter apostemata uescicæ diuersificantur ex parte materiæ, aut ex parte locorum. Sed ex parte materiæ contrarietas inter Auic. & Rasm in lib. diuisionum. Vult. n. Auic. raro fieri apostema calidū in uescicæ, quoniam apostema calidum est morbus dissimilis complexionis uescicæ quæ est frigida, unde si fiat in ea apostema calidum non erit nisi à forti causa. Rasis uero in libro diuisionum in hoc cap. dicit, quod plurimum apostematis quod accidit in uescicæ est apostema calidum. Et eius ratio est quia uescicæ est membrum densum, in cuius substantiam difficulter penetrat humor frigidus. Dicendum ut tollatur contrarietas quod apostema in uescicæ quandoque generatur per uiam paulatim factæ congestionis, quandoque per uiam defluxus. Si primo modo tunc apostema uescicæ semper est frigidum, quia nutrimentum eius & etiā superfluitas nutrimenti, ex quibus apostema paulatim congeritur sunt frigida. Si uero apostema fiat per uiam defluxus, aut causa defluxus est intrinseca corporea, & tunc apostema est plurimum est frigidum, licet aliquando sit calidum quia in eâ est dominium humorū calidorum, aut forte lapis nocet uescicæ. Si uero causa defluxus fuerit primitiua, sicut percussio, calus, aut offensio uescicæ, tunc apostema est plurimum est calidum, cum causa attractionis materiæ ad uescicam sit dolor sequens causam primitiuam, qui secundum plurimum est causa attractionis humorum calid. & proprie sang. Et hoc est quod uoluit dicere Auicenna, cum dixit in uescicæ non fieri apostema calidum ut plurimum, non enim fit nisi à forti causa. Rasis uero uoluit apostema ex causis fortibus iam dictis esse secundum plurimum calidum. Quapropter sunt concordēs. Aliquando apostema diuersificatur secundum locū. Nam quandoque apostema est in parte uescicæ terminata ad collum, uel in collo ipso: quandoque est in parte uescicæ terminata ad poros uiritides: quandoque est in parte superiori uersus uentrem: quandoque est in parte inferiori uersus dorsum: quandoque in tota uescicæ uel plurimo eius.

Causæ apostematum renū & uescicæ sunt humores, de quibus supra, actū ingressi horum membrorum substantiam. Licet non sit longinquum à uero quod aqua, aut uentositas, aut alius humor existens in cōcauitate renis, aut uescicæ extendens latera faciet apostema absque quod ingrediatur mēbri substantiam, ut bene sensuit Auicenna. tertia quarti cap. de apostematibus uentosis. Et humiditates secundæ & superflua resecata in tertia

tertia aut quarta digestione sunt aliquando causa coniuncta apostematis paulatim congeſti. Causæ antecedentes sunt humores superflui in quanto aut in quali existentes in uenis. Item mala complexio totius aut partis his membris communis. tertio debilitas renum & uesicæ, & eorum dolor, causa & oppilatio. quarto, latitudo uiarum per quas defluit materia ad hæc membra apostemanda. Item retentio uring extendens renes aut uesicam. Causæ primitiue sunt indebitum regimen sex rerum. Item causæ extraneæ, sicut casus, percussio offensus, balneum, stricture lumbaris & similia. Apostemata renum & uesicæ terminantur tribus modis. Quandoque enim resoluntur & est optima terminatio, quandoque indurantur resolutis partibus subtilibus, quandoque suppurantur, & post suppurationem rumpuntur & sanies expellitur per uesicam & uirgam, quandoque expellitur ad per uias occultas, aut per uenas emulgentes ad chylum, & ex chyli ad hepar, & tandem ad intestina per uenas meseraicas. Et hæc est decerior terminatio quam per uias uring. Tertio aliquando fit ruptio ad uentrem. Et materia colligitur in concauitate uentris inferioris, & indiget perforatione. Et hæc est pessima omnium nisi forte illa cum qua fieret horum membrorum putrefactio. Aliquando non erumpuntur imo remanent in eis, & hæc etiam curantur cum apertione.

Signa. Primo, ponitur signa apostematis renum. Secundo, uesicæ. Signa apostematis renum sunt dolor, & grauitas in alchatis, & maxime cum iacet æger cum uentre deorsum & fit frequens mictus propter debilitatem renis & stimulationem à materia apostemante sed hoc accidens magis est in apostemate uesicæ nisi propter apostema urina retineatur. Et si est in rene dextro maxime sentitur dolor & grauitas, qñ iacet super latere sinistro. Et contra si est in sinistro quando iacet super latere dextro. Et si est in utroque secundum utrumque situm magnificatur dolor & grauitas renis oppositi. Item si apostema est in rene dextro, dolor ascendit maxime quando est in parte superiori usque ad hepar. Et si in sinistro dolor descendit usque ad uesicam & uirgam, imo etiam in utroque quando est in parte inferiori renis. Et cum dolor est apud panniculum & suspensorium magnificatur dolor & fit fortis, & prohibet erectionem, tussim, & sternutationem, & difficile est sibi inuenire situm in quo quiescat nisi forte quando apostema esset confirmatum priuans membrum sensu. Et quando resupinatur dolor est leuior quam in alio situ. Quando aut apostema est in carnositate dolor est leuius ut uix sentiat & secundum omnem situm. Cognoscitur aut quod sit calidum ex febre continua quæ habet remissiones & excreſcētias inordinatas, quasi sint principia quartanæ, id est, sicut accidit febribus commixtis inordinate uagantibus quæ in quartanam perficiuntur, & hoc est propter diuersas materias & difformes aduſiones quæ sunt in materia apostemate renes. Et apparet in principis suarum exacerbationum coarctatio pulsus, sicut in reliquis febribus & incipiunt cum frigore extrimitatum, & fit horripilatio commiscens inflammationem id est, postquam incipit horripilatio sequitur inflammatio, & iterum post inflammationem sequitur horripilatio. alia litera habet propter materiarum diuersitatem. Et hæc uerificatur siue febris sit inseparabilis siue non, non enim est impossibile quod in continua sint huiusmodi horripilationes & typi, febris autem sequens apostema frigidum est remissior, & forte in continua, sed etiam febris sequens apostema calidum non fit multum intensa propter distantiam à corde. Et aliquando istæ febres sunt putridæ, aliquando ephimeræ. Item nocetur ab omni diuretico, acuto, salſo & ualde acetoso, sed magis & minus secundum diuersitatem materiæ. Nam in apostemate cal. magis læditur quā in frigido & appie ab acuto & salſo. Et qñ apostema est calidum & magnum perducit ad coarctationem sensus pp communiatem diaphragmatis cū renibus & cū cerebro. Et ad uomitum cholera propter communiatem stomachi ad hepar & hepatis ad renem. Et quandoq; communicatur dolor faciei & oculorū. Et retinetur ueter, quia apā coarctat intestina, urina uero est alba in principio materia ad renem permutata, deinde fit citrina, ignea, non permixta qñ apostema calidum est in statu & cholera quæ conuenit deriuari ad renem, iam expellitur cum urina. Deinde fit rubra circa declinationem, quando aliquid de mate-

ria apostemate expellitur cū urina. Et qñ urina perseverat alba indicat duritiem futuram aut conuersionem ad dubelati. i. maturationem, nihil enim de materia cum urina expellitur. Et ad ultimū urina perseverat uiscosa & alba est significatio mala, & aliqui rubet aqua & perseverat in ea sedimen laudabile tunc obedit apā digestionis absq; conuersionem ad duritiem aut ad suppurationem. Et qñ in primis diebus remanet urina clara & tenuis tunc apā est in uia maturationis aut indurationis, & qñ apostema maturatur magnificatur grauitas ualde, & sentitur grauitas quasi sphaera grauatiua in uentre, & accidit inflatio in locis uacuis, quia partes circumstantes tumescunt extractione materiæ ad illas & accidentia sunt fortia, & sentitur punctura uehemens in uirga. Et quando apostema est maturum alleuiatur febris, & augmentatur horripilatio uaporibus acutis comunicatis membris sensibilibus & incrassatur urina materia cū ipsa expulsa, & multiplicatur in ea sedimen bonum, & qñ ruptum est apostema remouetur febris & rigor, & si sanies alba, lenis, non foetida egreditur cum urina tunc adeo est bonum ut nihil melius, & similiter si est sanguis & pus album, & qñ est diuersum ab hoc est deterius secundū q magis elogatur à conditionibus bonæ saniei. Signa autem distinguunt inter species apostematum penes materiam maxime sumuntur à febribus & reliquis accidentibus homogeneis materiæ apostemanti, & item à conueniente ætate, tempore anni, regimine præcedente & similibus. Signa quod apostema maturetur posita sunt superius. Sed signa eruptionis est egressio saniei cum urina aut cum egestionem. Si autem rumpitur ad concauitatem uentris inferioris sequitur subita alleuiatio doloris & grauitatis, post præcessionem signorum maturationis non apparet exitus saniei per aliquam regionem. Signa resolutionis sunt quod omnia accidentia remittuntur cum bona conualeſcentia. Signa duritiæ, sunt quod omnia accidentia remittuntur præter grauitatem.

Signa putrefactionis renis sunt continuatio saniorum accidentiam usque ad mortem, & quod aliquando egreditur, sanies mala foetentissima cum urina aut faecibus. Signa apostematis uesicæ sunt dolor continuus in femore, & illis cum duritie & tensione febris continua. Item retentio urina, difficultas aut distillatio, & frequenter non possunt mingere nisi stantes, nam si apostema est in parte uersus uentrem facile subiacet tactui. Si uero in parte uersus dorsum, non occurrit tactui nisi cū forti cōpressionem. Si uero sit in parte terminata ad poros uritides fit retentio urina, & cū hoc uesica sentitur uacua ab urina. Si uero sit in parte terminata ad collū, & collo ipso adest similiter retentio aut magna difficultas, & cum hoc uesica est plena urina quod ex magno tumore in femore comprehenditur. Si uero sit in aliis partibus est frequens mictus & distillatio, & quandoque retentio stercoris ppter cōpressionem intestini recti à uesica apostemata. Quod autem apostema sit calidum, cognoscitur ex febre forti & caliditate in loco sensata. Itē ex dolore pūgitio si sit cholerici, aut extēſiuo, grauatiuo & pulsatiuo si sit sanguineū, & quandoq; apparet rubedo exterius. Itē cognoscitur ex siti uehementi, uomitu cholera puræ, & asmate, frigore extremitatum quæ fortasse non caleſcūt. Item, ex alienatione, nigredine lingue. & quia non nocetur ab omni acuto & diuretico, & significat ipsum complexio, ætas, causæ præcedentes. Et signa maturationis sunt horripilationes diuersæ, & febres permixtæ, sicut dictum est in dubelati renum. & significat maturitatem eius mollities sensata, & urina cum sedimine laudabili significat digestionem, eruptionem autem significat urina habens pus admixtum. Si autem signa maturitatis non apparuerint non rumpitur usque ad hebdomadam, & plurimæ uesicæ fiunt uersus collum eius, & quandoque in partibus aliis & quandoq; aperiantur ad anteriorem partem uesicæ, & tunc sanies mingitur & quandoque aperiantur ad partem posteriorem & sanies quæ egreditur colligitur in uentre. Signa apostematis frigidi in renibus sunt signa communia apostematum ex duritie, tumore, & grauitate, retentione urina, difficultate & distillatione, sed est pauca febris, paruus dolor, & grauatiuus absque siti, & aliis quæ attestantur apostemati calido. Et si est apostema durum sentitur durities cum grauitate notabili, & fortasse præcessit apostema calidum.

Io. Arculani f 3 lidum

lidum & proprie sanguineum quod terminatum est ad duritiem. Sic enim fit apostema durum in renibus & uesica secundum plurimum permutando ex aposte. sang. quandoque acciatur stupor in cruribus & dispositio ad hydropisum, sed apostema phleg. in his omnibus assimilatur apostemati duro præterquam in duritie sang. cum mollitie, & secundum plur. fit incipiendo, nec fit tanta ad hydropem dispositio, neque tanta sentitur grauitas.

Prognostica. Primum, apostema renum secundum plur. salubre, & apostema uesicæ secundum pluri. mortale. Secundum. Vtrunq; prolóngatur & induratur ac disponit ad hydropem. Tertiū, Apostema uesicæ cæteris paribus citius interficit quā apostema renum. Quartū. Anic. omnia renū apostemata uelocia sunt adhuc ut in lapidem idest duritiem conuertantur, & quomodo nō, cum ipsa sint causa lapidis? Quintum. Cum apostema calidum est in rene cum febre notabili, deinde accedit commixtio rationis, tunc illud est causa communis uelaminum idest panniculorum cerebri magnitudine apostematis, & est mortale, & proprie quando est significatio mala, nam illud propter communitatem malā. Quod si accadat comunicatio malā, tunc expectatur ruptura ad salutē, & fortasse egreditur sicut pilus rubeus in longitudine unius palmi & plus. Sextū. Deterius apostema uesicæ est illud cum quo cōtinuat caliditas febris acutæ, & uehementis fit retentio urinæ & stercoris, & fortis dolor, & in urina nō est digest. est .n. mortale, & plus mortale cū maturatur. Cum aut apparet in urina hypost. & fex subfidens lenis tunc est maioris spei.

Apostema, quod fit in renibus, & uesica, comitatur febris permixta, quæ non est uehementis caloris, cum qua est horripilatio, & rigor, & frequens mictus, & dolores in inferioribus dorsi, & grauitas: & cum impellitur uidetur ægro, quod aliquid ibi sit suspensum.

Hoc capitulum habet tres partes principales. In prima ponit signa & curam apostematis renum. In secunda signa & curam apostematis uesicæ. In tertia parte ponit signa & curam apostematis renum cum induratur, secunda ibi. Apostema uero quod fit in uesica, tertia ibi. Est autem quando apostema renum. Prima in duas. In prima parte ponit signa apostematis renum quæ etiam pro parte sunt communia apostemati uesicæ. In secunda curam. Secunda ibi. Cum his itaque. In prima parte dicit, quod signa apostematis quod fit in renibus & uesica sunt ista. Primum febris permixta propter diuersitatem materierum & diuersitas adustionis in eis. Quæ tamen febris non est uehementis caloris, quia materia putrens notabiliter distat à corde, cum qua febre est horripilatio & rigor frequens siue sit interpolata siue contentiua propter diuersas excrecentias, & diuersos paroxysmos, imo inordinatos sequentes diuersitates materierum ex duobus superscriptis. Est autem horripilatio prima. 4. cap. proprio dispositione in qua inuenit corpus diuersitatem in frigore & putrefactionem in cute & in lacertis. Rigor autem est ut non possit continere membra sua ex commotione à tremore eueniente in eis & motibus inuoluntariis. Secundum signum est frequens mictus, sequens debilitatem renum & uesicæ necnon ad stimulationem præsentia materię apostematis. Tertium est dolor in inferioribus dorsi, scilicet ab alchaim usque ad caudam, ibi enim est situs renum & uesicæ. Quartum signum cum impellitur, idest, cum homo se commoueat aut cōquassando se aut reuoluendo de latere ad latus, aut uoluendo se cum facie deorsum, uidetur sibi quod aliquid sit suspensum, sentit enim pondus & dolorem membri apostemati ponderantis, minus enim molestus situs eius est cum iacet supinus.

SCHOLIA

Comitatur febris, inquit. Auer. quarto colligit, non fit ab apostemate membrorum principalibus, nisi illud fuerit sanie aptum. quod & euenit duris apostematibus, non durum enim, ut plerumque in renibus accidere solet, cōcomitatur feb. nam horum materia ut plurimum est calida, cum frigida difficile penetrat. Et frequens mictus propterea quod urina inflammatur, mordicat, inde expellitur.

Cum itaque hæc signa uisa fuerint, æger ex basilica minuatur eius partis, in qua grauedinem & dolorem sentit.

In hac parte curat apostema renum, & primo per euacua-

tionē quæ maxime respicit causam antecedentē. Secūdo per auxilia applicata, quæ maxime respiciūt causam coniunctam secūda ibi. Loco quoque; emplastra. In prima parte cum dicit, cum hæc signa uisa fuerint quæ signant apostema renū, æger phlebotometur ex basilica eius partis in qua sentit dolorem & grauedinem ad minorandum materiam & diuertendum.

SCHOLION

Æger ex basilica minuatur, nisi magna sit corporis repletio, uel hæmorrhoidarum, uel mensium suppressio, uel ulcerum glutinatio, uel alia similis causa: nam sanguis esset mittendus aut ex basilica, aut saphena opposita.

Loco quoque emplastra infrigidantia superponantur: & si ægritudo sic dissoluta fuerit, bonum erit.

Hic curat per auxilia applicata super loco quæ maxime respiciunt causam coniunctam, & habet tres partes. In prima parte curat apostema terminandum per respirationem, aut etiam per resolutionem. In secunda curat ipsum quando terminatur per suppurationem. In tertia parte curat ipsum postquam suppuratum est, & eruptum, idest postquam factū est ulcus. secunda ibi. Si autem febris, tertia ibi. Si autem æger minxerit pus. In prima parte dicit quod super regione renum, scilicet super alchaim ponentur emplastra infrigidantia. Et si cum his ægritudo dissoluta fuerit bonum erit, dissoluitur autem apostema cum his quæ pars materię retro cedit & uenas reingreditur, pars autem aliqua ex calore naturali confortato per applicata resoluitur, quæ autem sint huiusmodi frigida dicetur inferius.

Si autem febris & dolor & grauitas perseverauerint, & urina minutim, & frequenter egrediatur, significatur ibi pus colligi. emplastrum igitur est tunc super dorsum ponendum ex chamæmilla, se. lini, oleo sesamino, surfure conspersis & agro præcipiendum, ut in tina sedeat.

In parte præsentī curat apostema cum suppuratione dicens. Si autē febris, & dolor & grauitas præseuerauerint quorum perseverantia & augmentum significat suppurationem iuxta aphorismum. Circa generationem saniei fiunt dolores & febres. & tunc crescit grauitas, quia materia in uno loco colligitur. Et urina minutim & frequenter egreditur sicut in stranguria uirtute debilitata & stimulat significat pus colligi, est igitur tunc super dorsum ponendū emplastrum. Ix. chamæmilla se. lini, surfuris ana m. i. contundatur contundēda mediocriter & cū oleo sesamino, quantum sufficit, fiat emplastrum, hoc enim partim resoluit, partem maturat & dolore mitigat. Est enim se. lini calidum & humidum, reliqua calida & sicca in primo gradu, secundo sedeant in tina eiudem intentionis.

SCHOLION

Urina minutim egreditur propter extensionem, & augmentum apostematis, quod meatus claudit.

Si autem æger minxerit pus; semina, quæ nominauimus in cap. de ardore urinæ, sunt danda, donec pus minuatur: deinde trochisci dentur, quos in cap. de mictu sanguinis, & puris nominabimus.

In parte præsentī curat ulcus remanens post apostematis rupturam dicens, quod si æger minxerit pus, semina quæ nominabimus in capitulo de ardore urinæ danda sunt ad mundificationem & doloris mitigationem, deinde dentur trochisci qui dicuntur in cap. de mictu sanguinis & saniei ad mundificationem & consolidandū, necnon ad dolorē mitigandū, uide horū descriptionem in duobus cap. sequentibus. Et hi trochisci sunt ultimi qui ponuntur in cap. de mictu saniei & sanguinis.

Apostema uero, quod fit in uesica, debet comitari feb. cōclusa, & difficultas mingendi, & dysuria, & femoris, & uirgæ dolor, & tunc æger ex basilica minuendus est: & fiat huius ægritudinis curas, quemadmodum præ diximus.

In hac parte primo ponit signa apostematis uesicæ. Secundo curam, secundo ibi. Est tunc æger de basilica phlebotomandus. In prima parte ponit tria signa. Primum est febris conclusio, quod nerum est si apostema fuerit sanguineum. Si uero cholericum febris est acuta continua habens proportionē ad tertium diem manifestā uel occultā. Si uero apostema fuerit

fuerit frigidum, febris non est fortis, nisi forte fieret suppuration. Secundum signum est difficultas mingendi quæ est uel retentio urinae uel maxima difficultas emittendi aliquid eius quod maxime uerificatur si apostema fuerit in parte terminata ad collum uel ad poros uirides. Et dysuria, id est emissio urinae guttatim uel per interualla cum apostema est in aliis partibus uesicæ. Tertium est dolor femoris & uirgæ, nam si apostema est in parte terminata ad collum dolor notabilis est in femore, quia ibi est collum uesicæ, cui uirga continuatur, & si est in aliis partibus distantibus à collo uesicæ forte aliquis dolor licet leuis potest femori, & uirgæ communicari.

Tunc ager. Hic pro cura phlebotomatur ex basilica, & dicitur reliquam curam esse obseruandam statim positum in cura apostematis renum, quod si aliqua sit differentia dicitur cum ordinabo curam.

Est autem, qui t renum apostema non peruenit ad sanie, imo transit in duritiem: cuius grauitas in renibus sine febre perseverat: est ergo clysterizandus ex mucilagine fœnu greci, & sem. lini, & apozemate chamemille, & caulium, & meliloti, & maluaufci, & fursuris, & uomat frequenter, renibus quoque superponatur emplastrum ex his, quæ nominauimus: & si urina minui uidetur; urinam prouocantia dentur.

Hic curat apostema renū quando induratur, dicens quod huiusmodi signum est grauitas notabilis absque febre, resolutis enim humoribus calidioribus & subtilioribus facienti bus apostema cessat febris. Et pro cura, primo præcipit egrū esse clysterizandum hoc clysteri. R. chamemillæ, meliloti, caulium, fursuris, ana. M. i. radicem maluaufci contusarum aut incisarum. ʒ. 2. bulliant in 5. lib. aquæ uel pluribus ad sufficientem coctionem, de qua decoctione accipiat lib. i. mucilaginis fœni, & sem. lini, ana. ʒ. i. fiat clyster, quod debite calidum imponatur. hic possit addi olei sesamini, medullæ uituli, pinguedinis gallinæ, an. ʒ. i. Secundo uomatur frequenter, ad diuertendum: est enim melior euacuatio quam per resolutionem, quia solutua præcipit materiam ad locum apostematatum nisi sint leuia. Tertio regioni renum, scilicet alchati superponatur emplastrū ex his quæ nominauimus, quæ scilicet ponuntur in clysteri statim descripto. Quarto, si urina minuitur dentur cum illo clysteri & emplastro prouocantia urinam, id est, sem. cum misceatur aliqua cum illa quæ prouocet, sicut parietaria, crura marina, & similia, uel aliter dentur cum illo, id est, dum sunt remedia superprescripta, sumat etiam ea quæ prouocant urinam, non tamen fortia sed leuia, de quibus supra in proprio capitulo.

SCHOLION.

Qui renum apostema &c. Iam, cum materia a frigefacta resolutione partis calidioris, & inflammatio decreuit, & uapores, tunc sunt calculi.

Hoc quoque pro paruo non est habendū, quia ex eo peruenitur ad hydropisim.

Vltimo, hic admonet medicum, ut sit diligens in cura huius apostematis duri, quoniam perducit ad hydropisim, debilitatur enim uirtus attractiua renum. quapropter aquositate remanente in apostemate & mēbris supra renes sit transitus in hydropem. Et cum hæc sit oppilatio prohibēs descensum urinae ad uesicam, hic etiam canon obseruandus est in apostemate uesicæ cum induretur, & remedia eadem uel similia applicentur, clysteria tamen in apostemate uesicæ sint minoris quantitatis ut melius retineantur, & cum hoc pauca quantitas sufficit propter propinquitatem, non sic in apostemate renum, & calsia posita in his clysteribus est præstans.

Cura apostematatum renum & uesicæ exigit triplex regimen. Primum, debetur causæ antecedenti complendum euacuatione & diuersione. Secundum, causa coniuncta diuersum de complendum secundum varios modos terminationis eius. Tertium, est commune utriq; curans accidentia, & ordinans debitum regimen sex rerum.

Pro euacuatione secundum plurimum necessaria est phlebotomia in apostematibus renum, aut uesicæ quæ repletione existente multa, & sanguine dominatē debet esse copiosa, & similiter ipso cum aliis humoribus æquato; si uero alii

dominentur, phlebotomia sit minus copiosa, & fiat ex basilica eiusdem lateris, & postea apud Auic. phlebotometur uenæ curuaturæ poplitæ, & hoc maxime conuenit si retentio menstruum, aut sanguinis hæmorrhoidalis fuerit in causa, & si non apparet phlebotometur saphena eiusdem lateris.

Prima enim est ad euacuandum & diuertendum. Secūda uero sit ad eradicandum causam coniunctam, aut proximā coniunctā, & existimo secundam esse tardandam usque ad diem tertiam. Ante tamen has si expedierit præmittatur uentris lenitio cum clysteri factō ex aqua decoctionis hordei, maluarum, & similibus lenientium magis aut minus frigidorum secundum exigentiam materiæ. Sed secunda die facta prima phlebotomia soluat uenter, aut cum clysteri leniente in quo sint mucilagines sem. maluarum, maluaufci, sem. lini, fœnugræci & similibus, & ex oleis ponatur uiolaceum, amygdalinum, sesaminum, & ex medullis, medulla uituli, cerui, & similes, & ex pinguedinibus, pinguedo gallinæ, anatis, anseris, butyrum, & similia, & eligantur magis calida, aut minus secundum diuersitatem materiæ. Et si opus fuerit medicina solutua sit lenitua, non attrahēs à longinquis, sicut calsia, aut manna, sed præstantior est calsia quæ misceatur cum sero caprino, sunt enim ambo præstantia in his casibus, & aqua hordei in calido, & aqua mellis in frigido, & aqua sacchari in mixto sunt præstantes, cum quibus etiam potest calsia distemperari, & omnino caueantur solutua fortia, & si præmittatur digestio solutioni est præstantius, & omnino caueatur diuretica ante maturationem, sed post maturationem conueniunt, & quamuis aqua iuuat in eo quod infrigidat & humectat in apostemate calido, tamen nocet in eo quod facit urinare. Caueatur itaq; multitudo eius, & proprie cum impediri ea est urina, & sic aqua dulcis clara fugendo sumpta non multum frigida ne inruerit humores, neque notabiliter calida, imo caueatur omne multum calidum in actu & potentia in apostemate calido renum; aut uesicæ, & similiter caueatur omne ualde frigidum actu & potentia in quocunq; apostemate renum & uesicæ, sed maxime in frigido. Digestiua autem sicut syrupus uiol. in calido sumptus cum tantundem aquæ hordei, sed in phlegmatico mel ros. cum tantundem aquæ mellis, in melancholico uero syrupus de pomis dulcibus cum aqua passularum. Solutiuum autem sit calsia à 3. 8. usque ad 10. sumpta cum aquis dictis, aut cum aqua casei in adulto & falso. Et si clysteria sufficiunt forte melius est omittere quod cūque solutiuum bibitum ne præcipitet materias ad locum apostematatum. In processu uero cum materia amplius non est in fluxu, siue terminetur per maturationem, siue per resolutionem possumus uti diureticis, sicut est lac, sem. communium frigidorum in calido & frigido, decoctione radicū & seminum prouocantium, & aqua ciceris nigri. Et in mixto mixta ex his quæ prouocantia etiam possunt exterius applicari. Secunda intentio, scilicet diuersio completur cum clysteribus iam dictis, in quibus ponantur calsia. Et si opus est fortioribus in materia frigida addatur benedicta. Item appositione uentrosarum in spatulis cum scarificatione, & sine in apostemate renum, & cum appositione earum in natibus in apostemate uesicæ. Item cum prouocantibus sudorē. Secundum regimen respiciens causam coniunctam si terminetur per uiam resolutionis exigit in principio repercussina. Vnde in apostemate calido. R. olei ros. aut aquæ ros. succi foliorum salicis, ana. partem. i. aceti partem mediam misce, & cum eis regio membri apostemati epichimetur, & si caliditas fuerit uehemens his adde succum plantaginis, sem. peruiæ, solatri, & similia, & hoc tempore administra clysteria ex aqua hordei, oleo uiolato, & similibus, aut ex lacte. Et post administra emplastra ex farina hordei, fabarum cum oleo ros. & pauco aceti. Postea in statu minora frigida, & adde fœnugræcum, chamemillam, anethum, sem. lini, & oleum sesaminum, & similia. Et clysteria etiam sint eiusdem intentionis facta ex decoctione hordei, & maluarū, & sint in eis mucilago maluaufci, fœnugræci, se. lini, oleum sesaminum, & similia. Si uero apostema sit frigidum, phlegmaticū in principio, incipe cum oleo rosaceo, de spica, & aceto, postea adde folia lauri, grana eius, & oleum ipsius, in lauro enim est plurimum fiducia, & similiter in ruta. Si uero apostemata ista maturentur quod raro contingit de phlegmatico, & melan-

Io. Arculani

f 4

cholico,

cholico, & cholerico, sed frequenter de sanguineo post principium in quo procedendum est ut dictum fuit in resolutione procedatur cum minus calidis & magis humidis habentibus viscositatem. Est enim secundo canon medicamen resolutionum de cuius proprietate est ut fortitudine suae caliditatis conuertendo humorem in vaporem finiant ipsum. Medicamen uero maturatiuum est, cuius proprietates est ut acquirat humori digestionem, quoniam calefacit cum aequalitate & Mollificatiuum uero est, quod sua caliditate & humiditate poros membri dilatat & praeparat humorem ad facilem expulsionem. Vnde resolutionum habet caliditatem cum siccitate notabili absque viscositate, sed maturatiuum habet caliditatem moderatam cum humiditate & viscositate, mollificatiuum uero moderatam cum multa humiditate. Maturatiua uero in calido sunt malua, malua uiscus, foenugraec. sem. lini, oleum sesaminum, & similia quibus utere secundum exigentiam, & in ualde calido potes his addere mucilaginem psyllii. Sed apostemate maturato erumpendum est cum motibus, sicut sternutando, & uelociter se mutando de latere ad latus, & similibus. Et secundo cum applicitis & etiam sedendo in tinis, siue semicupis, in quibus sit simus columbinus, & coepe narcisci, & tertio cum sumptis in quibus sit fermentum, & similia. & quarto si appareat tumor in alchatis, aut in regione colli uesicae inter bursam testiculorum, & anum cum incisione. Quod si apostema fuerit durum post uniuersalia ex phlebotomia & uentris lenitione duae sunt intentiones, una est mollificatio a qua inchoandum est, altera resolutio & materiaeeductio. Pro mollificatione utere mucilagibus dictis. Item oleo sesamino, oleo amygdul. Item medullis & pinguedinibus & similibus, ex quibus fiat unctiones, emplastra, epithemata, item clysteria & sumat etiam ea quae sunt ad hanc intentionem. Postea utatur magis resolutiuis, & etiam prouocatiuis in quibus non sit superfluitas, ut resolutis paribus subtilibus remaneat crassum & conuertatur in lapidem, imo considera urinam, & quoties incrassatur prouoca cum aequalitate, & quoties stat absque incrassatione mollifica, & de signis maturitatis & obedientiae materiae est multiplicatio urinae, & ad resoluendum conferunt unctiones, & uapores cum oleo chamemelino, nardino, sambacino, coltino, laurino, & conferunt emplastra ex meliloto, chamemil la semine lini. Et quandoque sunt necessaria ea quae sunt, sicut bdellium, ammoniacum, sagapenum, adeps uris, medulla uaccina, & ceruina, & quandoque est necessarium ut bdellium, ammoniacum. Et similiter chamemilla, tribuli, & melilotum dissoluantur in decoctione diureticorum, & dentur ex eis in potu. Quandoque uero in apostematibus duris duas intentiones simul persequimur, miscendo mollificantia cum resolutiuis in applicitis sumptis & clysterizatis. Item in tinis, siue semicupis quibus multoties oportet uti praecedentibus unctionibus, tum ad sedandum dolorem, tum ad prouocandum urinam, & maxime in apostemate duro & phlegmatico, & etiam in apostemate calido cum est facta maturatio ad erumpendum ipsum. Et nota quod cura apostematum renum, & uesicae cum pedent a materia eadem uel simili, est eadem exigens easdem, uel similes intentiones, & cum eisdem perficiendas, & non est differentia nisi in quatuor. Primum quia minori in tempore debemus continuare frigida, repercussiuua in apostemate uesicae quam renum. Et secundo debemus esse magis in eo solliciti de sedatione doloris, etiam cum stupefacientibus sumptis, iniectionibus, & applicitis, quia est membrum magis neruosum. Et tertio magis solliciti, ut urina educatur cum in apostemate uesicae frequentius retineatur. Et quarto, quod aliquando utimur syringis & cathatris, tum ad incidendas medicinas, tum ad extrahendum urinam, & quae in uesica continentur. Quibus non possumus uti in apostematibus renum, quapropter mihi placuit horum curationes in eodem capitulo concludere. Sed pro tertio regimine. Primo curentur accidentia secundum quod oportet, dolor quidem cum anodinis applicitis, sicut fomentando cum spongibus & filtro infusis in decoctionibus se. lini, anheti, foenugraeci, parietariae, florum chamemillae, meliloti, & similibus. Item cum uescis plenis his decoctionibus & oleis ad hanc intentionem, item cum semicupis eiusdem intentionis. Et his non sufficientibus, stupefaciendum est dando requiem in

causa calida, & frigida philonium. Item applicandum hyoscyamum, opium, & huiusmodi cum anodinis. Si uero urina retineatur recurre ad capitulum praecedens de difficultate urinae, & reliquis succurratur secundum eorum exigentiam. Secunda uero intentio huius regiminis, si regiminis sex rerum, est ut diata in apostematibus calidis sit tenuis frigida, unde utatur ptisana hordeacea, pane loto, spinachiis, blite, & similibus, omittendo uinum, carnes, & oua usque ad statum inclusue, & bibat aquam hordei, aut sacchari non multum frigidam, neque calidam paulatim sugendo eam, sed postea crasfetur diata, paulatim utendo carnibus, uino & ouis. Sed in apostematibus frigidis utatur in principio in potu aqua mel lis, iure caulium, & etiam ferculis superscriptis, sed possunt esse fercula sua cocta in iure laudabilium carnium, & cum saccharo condita, postea diata magis incrassetur utendo uino, carnibus, & ouis. Crassior enim conuenit diata in frigidis quam in calidis, & in principis non utatur cibis, aut potibus diureticis, sed in processu sic, & proprie cum uentum est ad statum, & adhuc magis in declinatione, sicut ferculis, in quibus sunt sem. communia frigida in apostematibus calidis, sed in frigidis iure cicerum, & decoctionibus radicum prouocantium, & in quocunque tempore uitetur potus superfluous, imo sit parcus, & proprie cum retinetur urina. Dormiat multum, procurentur euacuationes solitae, siue naturales, siue non naturales. Quiescat animo & corpore, nisi cum intaret tempus eruptionis apostematis, nam motus inuaret ad erumpendum, ut dictum fuit.

De ardore urinae. Cap. 106.

Rdor urinae est dolor mordacitius in meatu colli uesicae, aut uirga causa urinae. Qui aliquando est intensus, aliquando remissus, aliquando nouus, aliquando antiquus, quandoque frequens, aliquando rarus. Causae eius sunt acuitas urinae propter permixtionem alieuius acutius cum ea, sicut est cholera, phlegma salum, aut alius humor notabiliter acutus, item sicut sanies, arenula, frustula lapidis, & similia cum urina mixta. Secunda causa est excoriationis superficialis, aut ulcus in uesica, aut in meatu colli eius, aut uirga, item scabies aduersionem faciens. Causa uero excoriationis & ulceris est, aliquando lapis, aliquando humor cholericus, aut baurachius & similes humiditates acutae, tertio aliquando in causa est apostema, aut pustula quae rumpitur, quarto aliquando causa est percussio, aut casus, causa uero scabiei secundum plurimum sunt humores adusti. Tertia causa est defectus humiditatis in carnibus glandosis quae sunt in collo uesicae. Cuius finis est duplex. Vnus est temperare acuitatem urinae cui permiscetur, secunda ut ipsa sparsa super meatum urinae faciat ipsum glutinosum. Quapropter ipsa deficiente, urina fit acutior magis imprimens. Et secundo tollitur resistentia uesicae, & meatus urinae imprimenti hic aut defectus humiditatis est aliquando propter frequentem coitum. Nam illae humiditates egrediuntur cum spermate propter uiciniam ipsarum ad ipsum cum exitu plurimi spermatis. Item deficiunt propter aegritudines & causas extrinsecas eliquantes corpus. Causae autem primitivae sunt res acutae sumptae, sicut cantharides, cibi, & medicinae acutae.

Signa ardoris urinae sunt punctio, aut mordicatio sensata in capite uirga, aut in peritoneo quando mingitur, & etiam post mictum, sed quod sit ab acuitate urinae, cognoscitur ex defectu aliarum causarum, quarum signa ponuntur, & si urina sit citrina indicatur quod ei sit admixta cholera. Si uero alba, quod ei sit admixtio phlegmatis baurachii, & quodcunque ei admixtum potens facere ipsam acutam facile cognoscitur post eius residuum, siue sit sanies, siue lapis, & quodcunque huiusmodi. Sed quod sit ab excoriatione, uel ulcere in locis iam dictis, cognoscitur per exitum sanguinis, aut saniei, aut utriusque cum punctione & mordicatione in locis dictis, hoc addito quod in membro superiori non praecesserit soluta continuitas, a quo talis sanguis, aut sanies possit emanare, nec etiam sanies illa descendat a concantitate uenarum absque ulcere sicut plerumque accidit sanis non exercitatis, secunda primi cap. de signis substantiae urinae, hoc autem certificatur, quia si ardor praecessit exitum sanguinis, aut saniei significatur solutionem continui esse in locis iam dictis. Si uero exitus sanguinis aut saniei praecedat ardorem, uerisimiliter

uerisimiliter à membris superioribus contingit. Et discerni tur an membra superiora sint ulcerata, uel nō ulcerata ex bona ualitudine, aut aduersa, necnon ex signis ulcerum cuiuscūque membri aut priuatione ipsorum. Quod uero sit à scabie cognoscitur ex uestione urinae, foetore eius, & dolore uehementi cum pruritu & sedimine fureo. & cum diuturnatur quandoque exit humiditas, & quandoque aliquid sanguinis, sicut accidit in scabie membrorum extrinsecorum. Signa uero causarum ulceris & scabiei sunt nota ex capitulis praecedentibus, & ex dictis in hoc cap. Quod uero ardor urinae sit ex defectu humiditatis in carnibus glandosis cognoscitur ex ex careria aliarum causarum. Itē ex causis defectus huius humiditatis, quarum sermo praecessit. Signa autem causarum primitiuarum sunt ipsarum praecelsio cū subsecutione ardoris.

Prognostica. Primum est Hip. 6. Aphor. nephretici & circa uesica dolores laboriose sanantur in senibus. Secundū. Rasis, & Aui. ardor urinae cū perseuerat, perducit ad ulcera in instrumentis urinae. Tertiū, ardor urinae in nō senibus, aut non habetibus soluta cōtinuitate in instrumentis urinae facile curatur, nisi sequatur extrema cōsumptionem humiditatis carnis glandosae. Quid autem futurum sit in ardore sequente ulcera instrumentorum urinae, uidebitur in sequenti capitulo.

Cum uerger, dum mingit, sentit ardorem, et punctionem in uirga; à falsis, & acetosis, & acutis abstinentur est. & nutriendus est ex tapheis lenibus, & zibrebegi, & eorum similibus. haec quoque medicina danda est ei. rec. sem. melonis excorticati. 3. 3. citrulli, cucurbitae, portulacae, papaueris al. seminum ana. 3. 3. sem. hyoscyami. al. 3. 2. sacchari al. 3. 3. ad pondus omnium. pulueris horum quotidie drach. 3. in mane, & alie. 3. circa noctē cum uncia una syrpi uiolati, aut uilep sumantur.

Hoc capitulum diuiditur in tres parts. In prima notificat ardorem urinae absolute. In secunda ponit eius curationem secundum unam causam tantum. In tertia admonet medicū ut sit diligens in curando ardorem urinae, secunda ibi. A falsis & acetosis, tertia ibi. Haec quoque aggritudo. Quae dicit in prima parte nota sunt. In secunda dicit quod abstinere debet à falsis & acetosis, & acutis, quia augent mordicationem, & nutriendus est tapheis lenibus, id est, quae habent lenire humectando. Est autem taphea duplex. Quaedam alba & fit ex carne & iure. Quaedam uiridis, & fit ex supra scriptis cum aliqua herba dante colorem uiridem, & zebengi, uel zibrebegi & est taphea mixta cum ouis & similibus, scilicet humectantibus. Hoc quoque medicamentum dandum est. R. se. melonis excorticati. 3. 3. se. citrulli, se. cucu. se. portulacae. papaueris albi omnium ana. 3. 3. se. hyoscyami albi. 3. 2. sacchari al. 3. 3. ad pondus omnium. De puluere eorum quotidie in potu. 3. 3. in mane danda sunt, & totidem circa noctem, id est, per duas horas, aut tres ante coenam cum. 3. 1. syr. uiol. & aliqua aqua conueniente, sicut decoctio hordei, liquiritiae, & sebestae, aut cum. 3. 1. iulep, id est, aquae sacchari.

SCHOLIA

A falsis, & acetosis, & acutis est abstinentus qui humores procreant acutos: siquē, ut urina mordicat. Haec quoque medicina danda est quae dolorem sedat, minuit acuitatem materiae, & conuertit ad uias urinarias.

Haec ergo aggritudo non est paruipendenda, quia cū sit manifesta, & perseuerans, proueniunt ex ea in uesica, & instrumentis urinalibus ulcera.

Hic admonet medicum ut sit diligens in cura huius aggritudinis, ut patet. Cura. Hic tantummodo ordinabo curam ardoris ab acuitate urinae. Et propter defectum humiditatis glutinosae. Et tertio pendentes à causis primitiuis. Reliquarum causarum cura pertinet ad sequens capitulum.

Circa ergo ardoris ab acuitate urinae exigit duplicem intentionem. Prima euacuat humorem acuentem urinam, & ipsum diuertit ad regionem aliam. Secunda alterat discretiōem calidam & siccam membrorum humidorum, & aquositate. Prima autem intentio completur exhibendo. 3. 1. florum castae, aut. 3. 1. & s. mannae cum sero caprino, aut aqua decoctionis sebesten, & prunorum. Et potest cum his misceri syr. aut iulep uiol. Et apud me nihil ponatur quod sit diureticum, ne

humores deriuentur ad uias urinae. Et potio hic potest aliquā replicari. Diuertunt etiam & euacuantur humores cum uomitu secundum ipsorum exigentiam, & est praestans medicina maxime aegro nauisanti, & proprie cum est facilis ad uomitum, sicut tamen uomitua non acuta, sicut oximel cum aqua hordei. Item conferunt clysteria alterantia & diuertentia facta, scilicet ex lacte cum oleo uiol. & casia, & similibus eiusdem intentionis. Et sanguine dominante, aut etiam subdominante si alii humores sint ipsi admixti apti cum ipso euacuari, fiat phlebotomia communiter ex basilica, aut ex saphenis materia existente plurima, & maxime cum mouetur ad superiora, aut si in causa fuerit retentio sanguinis menstrualis, aut haemorrhoidalis. Prouocatio etiam sudoris optime confert euacuando & diuertendo. Dubitatur utrum diuretica siue euacuantia per urinam conueniant. Et uidetur quod sic ex Rasi & ceteris qui administrant semina cōmunia, & alia diuretica ut dicit Aui. in cap. de ardore urinae. Et si non fuerint ulcera nec sanies, tunc melior cura eius erit exuberatio urinae consequenter extrahendo superfluitates cum solutione subtili. id est, postquam extraxeris superfluitates cū solutione &c. Tertio aliquando opotet educere superfluitates quae sunt in membris urinalibus quae melius educuntur cum diureticis. Quarto quanto urina est maioris quantitatis minorem facit ardorem ut docet experientia quare multiplicanda est. Et confirmatur quia quanto magis multiplicatur est minoris acuitatis ut declarat sensus & ratio.

In oppositum quia diuretica ducunt humores ad instrumenta urinae & cogunt frequenter mingere, hoc tamen est uehementer nociuum. Amplius Auic. in cap. de cura ulcerum in renibus & uesica dicit, & minoratio potus aquae, ut minores necessitas mingendi, & minoretur motus renum ab eo quod peruenit ad eos, & eorum ratio per istud, canon enim curationis ulcerum est quies. Credo in hoc dubio ista esse tenenda. Tenendum primo tam in ardore urinae quam in ulceribus membrorum urinalium aliquando competere diuretica, tū ad ducendum uirtutes medicinarum ad loca illa, tum ad euacuandum superflua contenta in meatibus ipsorum quae aptissime per eandem regionem euacuantur. Tenendum secundo de intentione Auicennae, quod leuiora debent administrari in ulcere uesicae quam ardore eius sequente acuitatem urinae, nam diuretica inquietant membra ulcerata, & canon curationis ulcerum est quies. Tertio tenendum, quod in ardore urinae sequente paucitatem humiditatis glutinosae non cōpetunt diuretica. Quarto tenendum quod exuberatio urinae in ardore eius est melior cura eius, non quidem facta per diuretica, sed potius per cibos & potus multiplicantes aquositate urinali, sicut cucurbitae, & similia, & consequenter potum aquae frigidae in eo conuenire nisi aliquid crassum cū urina mixtum impediatur, non sic in ulceribus membrorum urinalium, cum omnis potus superfluum uini & reliquorum in ulceribus horum membrorum uitandus est. Contraria autem huius determinationis facile soluuntur. Secunda autem intentio, scilicet alteratio discretiōis perficitur regimine medicinali & sex rerum, & ex medicinis perficientibus hac intentionem est puluis Rasis, sed praeter hunc quaedam alia subiunguntur, scilicet trochisci, syrapi, & aquae. descriptio trochisci ad antiquos ardores urinae cum patientes coguntur frequenter mingere cum multo dolore. R. medullae, sem. citrulli & cucurbitae ana. 3. 4. se. lactucae, & portulacae ana. 3. 2. succi liquiritiae, glandium ana. 3. 1. ros. 3. s. uiolarum sentium excorticatarum ana. 3. 1. terantur & cum succo portulacae, & mucilagine psyllii fiant trochisci quorum quilibet ponderet. 3. 1. & s. exhibeatur cum lacte, aut decoc. hordei, sebesten, & similium, & si uis magis constringere compone cum succo hypocisthidos. Syrupus. R. succi endiuiae, lactucae, caudae equinae, ana. partem. 1. bulliant continue despumando, quibus despumatis adde succi cucumeris, & lactis, sem. communium frigidorum, & aquae uiolatae ana. partem. s. bulliant lento igne, & cum saccharo albo fiat syrupus longus, de quo dentur mane & uespere. 3. 4. pro uice. Sed nota quod ex praestantibus syrapi, est syrupus de papauere cuius. 3. 2. sumantur cum aqua decoctionis hordei mundi, sebesten, & liquiritiae in mane, & medietas in uespere, aut sumantur cum succo cucurbitae bullito ad consumptionem tertiam

tertiæ partis. Et aqua facta ex decoctione sebestæ & quatuor feminum communium frigidorum, papauere albo, & liquiritia est præstas, & si ardor esset ex humore crasso urinæ permixto, tunc ualde conuenit aqua sublimationis acori, & florum maluæ bibita omni die, cuius dosi sit. ʒ. 3. quæ exhibeantur bis in die in ieiuno. Et si ardor esset uehemens, esset necessarium administrare aliquid de stupefaciētibz fortibus, sicut de trochiscis alchechengi, prius tamen tentatis leuioribus, scilicet papauere, exhibendo omnia permixta cum aqua, aut syrupo eius, hæc etiam intentio perficitur cum iniectione & applicitis. Simplicia sunt semina quatuor, albumen oui, siue aqua eius post fortem eius conuassationem, lac mulieris, asinæ, aut capræ, mucilago psylli & sem. citon. oleum nenupharinum. Sed compositum auxilium optimum sic fit. ʒ. sem. psylli, & cito. integrorum ana partes æquales, & pone ea in succo cucurbitæ calido, & stent in infusione quousque possint extrahi mucilagines quæ extractæ bulliāt cum oleo uiol. mandragorato, papauerino, nenuph. deinde ponantur in eis lac mulieris, lactatis puellam quam peperit, & albumen oui recentis, & fiat horum agitatio & conuassatio. Et ultimo addatur camphoræ parum, & fiat horum simplicium, siue compositorum frequens iniectione in uirgam & uescicam, caue tamen ne iniciantur cum dolore, nam forte sequeretur maius nocuumtum quam utilitas. Quapropter syringa sic subtilis & aptissima quam reget sibi imponat, aut imponatur ab artifice bene experto, & operante cum leuitate.

Sed ab extra epithimentur, aut ungantur renes, femur, & peritoneon. ʒ. oleorum uiolarum, nenupharini, lotorum cū succis endiuia, plantaginis, & semperuiuæ ana. ʒ. i. lactis mulieris. ʒ. s. mucilag. psylli. ʒ. i. s. camphoræ. ʒ. i. ceræ albæ quantum sufficit fiat unctio quæ est conferens ualde quando ardor est cum difficultate mingendi. Item cum impediretur urina emplastretr femur, aut peritoneon cum umbilico ueneris decocto. Item ualeat fomentatio cum sapa in qua decocta sint urtica, parietaria, & malua, & in uehementia ardoris iniciantur in uirgam narcotica, si aliquid de semine hyoscyami albi, aut opii, & pone in capite uirgæ de aqua rosata, in qua dissolutum sit opium, cuius aliquid per foramen ingrediat. Agentia autem à proprietate sunt uescicæ tauri, & uescicæ capræ puluerizata, & puluis misceatur cum his quæ iniciuntur in uescicam.

Cura uero ardoris sequentis defectum humiditatis glutinosæ perficitur prohibendo coitum, & remouendo omnes causas corpus exiccantes, & administrando omnia humectantia qualitatiue & substantiifice interius & exterius. Sed cura ardoris urinæ sequentis lapidem, aut arenulas manifesta est ex cura lapidis de qua sermo præcessit. Cura autem ardoris urinæ sequentis solutionem continui ponetur in cap. sequenti. Regimen autem sex rerum complens hanc intentionem secundam est infra scriptum. Aer declinet ad frigidum & humidum, nec sit multum opertus pannis secundum renes, aut regionem uescicæ, non tamen multum frigeat secundum uescicam. Cibi eius declinent ad frigidum & humidum & sint inspidi, aut pauca dulcedinis, & uidentur acuta, amara, salia, acetosa, & multum dulcia. Item multum stiptica, aut uiscosa proprie quando urinæ esset admixtum aliquid crassum de genere humoris lapidis & similia. Et uidentur multum aperientia & prouocantia. Panis eius sit ex optima farina frumenti parum fermentatus non salitus. Vinum eius sit pauciferum mediocris substantiæ bene clarum unius anni tantum, & limphetur cum aqua bene conditionata, aut aqua decoctionis hordei, & sebesten, & similia, aut bibat aquam solā simplicem, aut decoctionis rerum dictarum. Et potus lactis esset præstans nisi adesset febris putrida. Fercula ex ouis & lacte conueniunt, aut ex pane loto, & ouis secundum communem usum. Ex granis conuenit hordeum, præsana hordeacea, robia, aut horum chist. Ex herbis conuenit lactuca, spinachia, blitis, endiuia, malua, borago. Item conuenit cucurbita, pepo, melon, indus, cucumer, citrullus. Ex fructibus conueniunt pruna, persica poma, pineg, preparate, uidentur ficus sicca & humida. Item uux recentes, sed sicca conueniunt. Oua conueniunt, lac, butyrum recens, capita lactis, caseus recens, non salitus nouiter factus, & conuenientes sunt pulli, & ceteræ aues bene conditionatæ. Ex quadrupedibus uutili

lactentes, agni, hoedi, & similes, & communiter comedatur elix. Oleum amygdalinum est ceteris oleis melius. Notabiliter dormiat, procuret euacuationes naturales. Fugiat coitum. Sit quietus animo & corpore.

De mictu sanguinis & saniei. Cap. 107.

Rimo agetur de mictu sanguinis. Postea de mictu saniei. Pro noticia primi est sciendum quod sanguis uel simile sanguini quod mingitur est quadruplex. Aliquando mingitur sanguis uerus & complete solus, sicut in ruptura aut apertione uenæ emulgentis, aut uenæ in uescica propter percussionem, equitatione fortem aut alias causas corporeas, aut primitiuas. Et hic aliquando licet raro procedit ex membris quæ sunt supra renes & uescicam, sicut est hepatis: aliquando ex corpore toto propter repletionem multæ sanguineæ, quare separatur continuas uenarum, aut aperturuntur. & aliquando sequitur corrosione, uentositatem, tetanum, aut spasmodum fortem, & causas primitiuas, sicut & ille qui mingitur a membris urinalibus: & fit mictus sanguinis, aliquando propter subtilitatem eius unde currit, quia su perfluus, & quia non est ei essentia. Secundo mingitur sanguis permixtus aquositate urinali propter debilitatem uirtutis hepatis, uel renum non separantis uerum & completum sanguinem ab aquositate, unde taliter mixtus descendit ad uescicam & mingitur. Mictus autem sanguinis permixti humoribus crasis plurimum fit propter debilitatem renum. Tercio mingitur aliquid simile sanguini, scilicet quando caro hepatis, aut renum liquefit quæ rediens in liquorem simile sanguini mingitur. Quarto est mictus rei deficientis à complemento sanguinis, est enim chylus diminute sanguificatus, aut sanguis diminute digestus, & hoc accidit ex debilitate uirtutis digestiue hepatis, & talis in colore & substantia assimilatur loturæ carnis recentis. Secundo sciendum, quod aliquando est mictus sanguinis secundum uiam mundificationis superfluitatum etiam in corpore sano, qui est quandoque habes periodos, & circuitus in quibus redit & aliquando non redit: & aliquando fit mictus sanguinis, uidelicet symptomatice, & aliquando est criticus existens terminus alicuius ægritudinis. Mictus autem rei similis capillis plurimum fit causa debilitatis digestionis uenarum, & quandoque est ualde longa quasi duobus palmis, & quandoque est decliuus ad albedinem, quandoque ad rubedinem, & non prolongatur nisi causa suæ generationis in inuolutionibus uenarum renum aut aliorum, & ex cibis crasis, & generibus lactis, & granis, sicut fabis, & similibus, & non est in mictu eius de timore secundum quod terretur cor ex aspectu. Urinæ autem crassæ minguntur, aut causa modificationis & crisis quam sequitur aluentatio, & quandoque sunt propter multitudinem humorum crassorum propter debilitatem digestionis. Urinæ uero pinguis facilis exitus significat liquefactionem adipis. Mictus uero puris aut sanguinis permixti puri, quandoque fit propter ruptionem aducleret in membris superioribus pulmonis & pectoris, & hepatis, aut propter apostema ruptum in membris urinæ, aut propter ulcera in eis, & quandoque fit in sanis non exercitatis absque ulcere, sicut dictum fuit superius. Et ex his iam manifestæ sunt species & causæ mictus sanguinis & saniei. quid nominis autem & quid rei satis nota sunt. Signa mictus sanguinis puri ueri cognoscitur ex colore & modo substantiæ, & quia non est ei permixtio aquositate, aut aliorum humorum. Quod uero fit ex uescica, cognoscitur per nocumenta uescicæ ex dolore, & similibus, & quia sanguis ueniens ex uescica est paucus, habet enim uescica uenas paruas, in quibus paucus sanguis continetur solum sufficiens ad nutrimentum eius. Mictus uero sanguinis ex renibus, cognoscitur quia est multus maxime quando uenarum pituitur. Sunt enim uenæ ueniens ad renes magnæ, multæ sanguinem deferentes non solum sufficientem pro nutrimento ipsorum, sed aliorum membrorum, & sunt magis paratæ eruptioni, quia non sunt boni situs æqualis, imo eleuatæ supra partes in quibus continentur. Sed uenæ uescicæ sunt conseruatæ, aliās contentæ non expolitæ scissioni & eruptioni cū situ suo. Quod uero mictus sanguinis ueniat ex hepate & membris aliis supra renes & uescicam, cognoscitur ex carentia nocumentorum renum & uescicæ, ex præsentia causarum potentium

potentiam facere in eis rupturam, aut apertionem uenæ ex qua sequatur mictus sanguinis, sicut est repletio & similes ista tunc dicta, & ille qui est propter apertionem uenarum fit sine dolore, & est paucus in principio licet forte postea augeat & est mundus & syncerus. Sanguis uero eruptionis & scissionis est multum in principio & postea aliquando minoratur, & aliquando non est mictus, aut syncerus, cum sequatur ulcera, aut corrosionem, imo si est corrosio est paulatim ad nigredinem decliuus, & quadoque est cum eo foetor, & sequitur alias aggritudines, & multoties sunt cum eo cortices, & sanies & pus, quod si est cum ulcere absque corrosione saltē est cum eo sanies aut pus. Mictus autem sanguinis permixti aquositate cognoscitur, quia apparet aquositas ipsi permixta, & aliquando sanguis residet in fundo urinalis, aut saltem si coletur per petiam descendit aquositas & remanet sanguis, & per hoc distinguitur a mictu sanguinis diminute decocti, qui neque residet, neque colari potest ab aquositate, licet ambo conueniant in hoc quod sunt, sicut lotura carnis. Distinguitur autem an ueniat ex hepate uel renibus, quia ueniens ex renibus magis tendit in albedinem & est magis crassa. Veniens autem ex hepate magis trahit ad rubedinem, & est subtilior & similior sanguini. Mictus autem rei similis sanguini quæ est ex substantia hepatis, aut renis liquefacta cognoscitur ex causis præcedentibus, scilicet febribus collquantibus: itē ex causis primitiuis multum calefacientibus: item quod mingitur est tenue sicut adustum, & quod est ex liquefactione hepatis magis tendit in rubedinem, & e contra, quod est ex liquefactione renum magis in albedinem cum minori rubedine. Mictus autem sanguinis propter tenuitatem eius significatur quia sanguis qui egreditur mingendo, & per phlebotomiam est ualde tenuis, & non sunt signa aliarum causarum. Locus autem saniei & ulceris cognoscitur per dolorē si fuerit membrum dolorosum, & cognoscitur per signa aggritudinum in quibuscunque membris existat, sicut per signa aggritudinis, aut dubelati, aut ulceris, aut repletionis, & cognoscitur ex uia commixtionis, nam quanto locus ulceratus magis est alteratus, est sanies, aut sanguis inde egrediens maioris commixtionis, & quanto inferior minoris & maioris separationis ab aliis quæ secum aliquando miscentur, sicut est urina. & si ambo egrediantur ex eodem ulcere in loco inferiori magis sunt adinuicem separata, si uero ex loco alto magis sunt adinuicem permixta. Ille autem qui est propter causas uicinas uirgæ, aut in uirga antecedit urinam, & elogatus a uirga postponitur ab urina, aut permiscetur ei uehementer. Apodemata autem & ulcera cuiuscunque membri cognoscuntur per signa & accidentia propria, sed distinguitur an sanies quæ mingitur sit ex ulcere aut apodemate, nam quæ est ex apodemate mingitur subito in magna quantitate, quæ uero ex ulcere paulatim, & multoties ex longo processu perducit ad excoriationem & ardorem partes per quas transit. Expulsio autē critica cognoscitur, quia est subita, & cum alleuiatione & fortitudine, symptomata uero sine his. Signa uero mictus rei similis capillis, & pinguedinis, & rerū crassarū sunt ipsæ res quæ minguntur.

Prognostica. Primum Aui. auctoritate Hippo. Cum mingitur sanguis sine dolore aut est paucus in horis quibusdam non est malum. Cum autem perseverat fortasse accidet febris & mictus puris. Secundum, mictus puris ex ulcere hepatis, aut fundi uesicæ secundum plurimum mortalis. Ex ulcere uero renis, aut colli uesicæ frequenter salubris. Tertiū, cuius ren porus uritis, aut uesica dirumpitur moritur. Quartum, mictus rei similis capillis, pinguedinis, aut rerū crassarū, secundum plurimum sanatur.

Cum aliquis propter casum, uel percussione sanguinem minxerit, ex basilica minuatur. & trochisci qui dicuntur trochisci de charabe tribuantur. qui Recipiunt charabe, gummi, tremulæ arboris ana, 3. 5. balauftiarum, hypocistidos ana. 3. 2. & 5. olibani. 3. 2. sem. apij, opij ana. 3. 1. formentur trochisci pondere aur. 1. ex quibus unus in die cum apozemate sumach tribuatur. ad comedendum uero tribuantur carnes coctæ cum sumach, & carnes coctæ cum succo uinæ acerbæ. abstineat a nutrientibus acutis, &

salis. loco uero percussione superponatur emplastrum ex bolo armeno, & acatia, & aloë, & litio, confectis cum acetato, & aqua.

Hic Rasis primo agit de mictu sanguinis. Secundo, de mictu saniei, secunda ibi. Pus uero si minxerit. Prima in duas. In prima curat mictum sanguinis sequentem casum, aut percussione. In secunda curat mictum sanguinis sequentem cibos & potus acutos, secunda ibi. Si autem sanguinis mictus euenerit. In prima parte dicit, cum aliquis propter casum, aut percussione minxerit sanguinem phlebotometur ex basilica, ætate scilicet & reliquis consentientibus, de hac tamen uberior dicitur cum ordinabo curam. deinde datur trochisci de charabe ad constringendum, præcedente tamen aliqua modificatione, si fuerit expediens de qua dicitur. Re. charabæ, gummi, tremulæ arboris, idest, granati syluestris ana. 3. 1. balauftiarum, hypocistidos ana. 3. 2. s. olibani. 3. 2. sem. apij opij, ana. 3. 1. Ex istis puluerizatis formant trochisci cum succo ozimi, quorum quilibet sit aur. 1. ex quibus omni die unus exhibeat dissolutus cum decoctione sumach in ieiuno, hæc. n. sunt constringentia, partim stipticitate, partim uiscositate, opium autem compingendo: sed semen apij ponitur ut ducat uirtutes medicinarum ad locum. sed ad comedendum tribuatur caro cocta cum sumach, & caro cocta cum succo uinæ acerbæ, hæc. n. constringunt frigiditate, siccitate, stipticitate. Abstineat a cibis acutis, & salis, super loco uero percussione ponatur emplastrum ex bolo armeno, & acatia pro qua sumitur succus prunellorum, aloë, & litium quod est succus arboris quæ habet folia similia buxo. Et fructus eius est similis pipere, hæc aut sumpta in æquali dosi, & mixta cum aqua, & aceto, & supposita loco percusso optime sanguinem constringunt. Et si uis magis in frigidare, auge frigidam, scilicet bolum & acatiā.

Si uero sanguinis mictus euenerit post comestionem ciborum acutorum, aut potum uini acuti; phlebotometur æger, & trochiscos de charabe in potu sumat: & eodem, quo diximus gubernetur regimine.

Hic curat mictum sang. ex sumptione rerum acutarum, sicut alliorū, sinapis, & uini potētis &c. dicit ægrum esse phlebotomandū, & ipsi esse tribuendum de trochiscis de charabe prædictis, & reliquo regimine supra scripto esse regendum.

Pus uero si minxerit, ægro trochisci isti dandi sunt. Recipe melonis, citrulli, cucurbitæ absque corticibus, omnium. 3. uiginti, boli armeni, gummi arabici, thuris, sang. drac. omnium ana. 3. 1. opij. 3. 3. seminis apij. 3. 2. informetur trochisci pondere. 3. 2. ex quibus omni die unus cum syrupo depapauere tribuatur uncia. 1. in potu. uirgæ, quoque ex isto collyrio immitatur. collyrium de cerussa. Recipe cerussæ sarcocolla, olibani, gummi arabici, opij, sanguinis draconis, omnium partes æquales. fiant ex eis collyria, & per syringam prius fiat iniectio ex hydromelle. & mingat æger, & post eius egressionem fiat iterum iniectio istius collyrii dissoluti in lacte asinæ.

S C H O L I O N

Duplex curatio requiritur: altera, quæ abstergat humores peccantes: altera, quæ siccet, atque ulcus glutinet.

Hic curat mictum puris ex ulceribus maxime renum & uesicæ, dicens esse ægro tribuendum de his trochiscis. Re. sem. melonis, citrulli, cucurbitæ absque corticibus ana. 3. 2. boli armeni, gummi arabici, thuris, sang. drac. ana. 3. 1. opij. 3. 3. sem. apij. 3. 2. formentur trochisci. 2. 3. ex quibus omni die unus cum syrupo de papauere. 3. 1. in potu tribuant. Virgæ quoque ex isto collyrio immitatur. Re. cerussæ, sarcocollæ, olibani, gummi arabici, opij, sang. drac. ana. partes æquales fiant ex eis collyria, idest, hies, quibus hoc modo utendum est. Primo enim fit iniectio ex hydromelle ad mundificandum, & mingat æger, & post eius egressionem fiat iniectio istius collyrii dissoluti cum lacte asinæ ad consolidandum & dolorem mitigandum. Hoc diuinum opus imperfectum nobis reliquit clarissimus, Physicus Ioan. Arcu. qui dum in florentissimo Ferrariensi gymnasio publice medicinā legeret, ac idies hoc ipsum opus fluderet

studeret absoluere, dira atque acerba morte interceptus est, cum tamen iam pridem de mola matricis ac hernia, de quibus durarum doloribus materiam plene absoluisset. Cuius quidem admirandi uiri sepulchro huiusmodi inscriptum est epigramma.

Quæ iustæ uitæ meritis, & philosophiæ

Summa arte ac studio gloria summa fuit.

Ipsam qui uere medicinam nouit, & agris

Si qua fuit, solus spesq; salusq; fuit.

Reges & populos deslenda morte Ioannes,

Orbatos linquens conditur hoc tumulo.

De mola.

Cap. 108.

MOLA dicta à molin per se idem significante q; partu ritio carnis. Latine est prægnatio mendosa, in qua non foetus sed frustum carnis, uentositas, aut aquositas, aut humores diuersi in matrice continentur. Ex quibus inferitur quod mola est quadruplex, scilicet carnosæ, uentosæ, aquosæ, & humoralis. Est autem carnosæ morbus in numero. Reliqua autem reducuntur ad morbum in complexione & compositione.

Causæ carnosæ quæ proprie est mola, est duplex, materialis & efficiens, omitto finalem & formalem, quarum confideratio ad philosophum pertinet. Causa materialis carnosæ est sanguis menstruus in concauo matricis contentus. Causa efficiens est uirtus augmentatiua concurrere caliditate & siccitate matricis conuertens hunc sanguinem in carnem quæ caro nullius animalis formam, aut similitudinem gerit, & habet solum animam uegetatiuam. Secunda causa est sperma muliebri quod aliquando in somnis iniicitur in concau matricis, aut aliis modis mulieribus notis, quod permiscetur cum sanguine menstruato ipsum extendens & in carnem conuertens. Sed propter defectum uirtutis informatiue non acquirit formam hominis, nec alterius animalis & sic remanet informis nullam gerens similitudinem alicuius animalis. Tertia causa est aliquando sperma uirile non habens sufficientem uirtutem informatiua, quod permixtum cum sanguine menstruato licet dilatat & extēdat, non tamen linea ipsum & figurat secundum humanæ animæ exigentiam. Causæ uero molæ uentosæ materialis est phlegma, aut alius humor uentosabilis existens in matrice. Causa uero efficiens est caliditas matricis ipsum potens uentosare, non autem uentositatem inde genitam resolueret. Secundo posset hæc uentositas genita ex errore digestiue hepatis, sicut in tympanite deferri ad concauum matricis, sicut in tympanite deferretur, aliquando in uentrem cōrentium membrorum naturalium. Tertia causa potest esse uentus ueniens de foris ingrediens matricem per uias manifestas uel occultas. Causæ uero molæ aquosæ, sunt aliquando aquositas genita ex errore digestiue hepatis quæ cum sanguine transmittitur ad matricem. Sed sanguis cedit in nutrimentum eius. Aquositas uero effusa ad concauum eius & ibidem retēta propter clausonem colli matricis, sicut fit in prægnatione uera est causa molæ aquosæ quæ in dies ex eadem causa augendo procedit. Secundo multiplicatur aquositas in matrice per uiam paulatim facta congestiōis ex superfluitate nutrimenti eius non expulsa. Causa uero humoralis est multitudo humorum secundum plurimum permixtorum cum sanguine qui ad matricem delati effunduntur ad concauum eius per orificia uenarū menstrualium & ibidem retenti & in dies aucti faciunt molam. Vidi tamen semel molam ab humore phlegmatico, crasso ad similitudinem pultis factæ per superfluum milii decoctionem in aqua, quæ tantum excreuit, ut post mortem patientis facta anatomia esset maioris quantitatis & poderis quam residuum corporis ipsius.

Sed præter hæc superflua aliquando in matrice contenta quæ sunt causa molæ ut supra reperiuntur uermes in matrice in notabili quantitate geniti ex phlegmate putrido, qui tamen non debent dici mola cum ex ipsis non sit aptus tantus tumor provenire ut assimiletur prægnationi. Si tamen ad aliquam speciem molæ essent deducendi ad speciem molæ carnes reducerentur. Reperiuntur quoque quandoque in matrice simul cum foetu animalia diuersarum specierum, sicut bufones, & similia, & proprie in regionibus Australibus & Occi-

dentalibus, quæ sunt genita ex concursu spermatis uiri post ueram prægnationem permixti cum sanguine menstruato concurrente in fluxu supercoelesti ad horum animalium generationem quæ cum sint uenenosa, si mordeant foetum, sicut aliquando accidit in partu moritur foetus. Nunc superest ut ponantur signa. Sed primo ponantur signa distinguenda inter prægnationem ueram & speciem molæ. Secundo signa distinguenda unam speciem ab altera. Tertio, signa distinguenda inter speciem molæ, & speciem hydropisis, ex quibus apparebit differentia inter ueram prægnationem & speciem hydropisis, hæc enim magna inuestigatione digna sunt cum per unum ex eorum ignorantia accidant errores male corrigibiles & uituperia non pauca medicis, & non mirum. Nam multum assimulantur uere prægnantes molaticis in reteriorne menstruorum, alteratione coloris, nocuentis stomachi conclusionem oris matricis, inflammatione mammillarum, tumore uentris, qui augetur quotidie ad tempus naturalis partus, sed in partu error detegitur cum molaticæ non foetus, sed frustum carnis aquositate, uentositatem, aut humores diuersos emittant. Signa ergo distinctiua inter ueram prægnationem & molam carneam sunt quinque. Primum, quia foetus post tertium mensem usque ad tempus partus mouetur ex se & ad diuersas imo ad oppositas differentias, mola uero carnea minime, imo non mouetur nisi post compressionem fortem. Secundum, quia maior durities est in mola carnea, quam in prægnatione uera cum frustum carnis sit aliquando ita durum ut uix scindi possit. Tertium, quia extremitates, scilicet manus & pedes patientis molam carneam sunt molles, sicut undimiatu propter errorem digestiue quæ magis accidit in extremis quam in aliis partibus, & non est ita in prægnante, cum uirtus digestiua sit fortior. Quartum, in mola carnea totum corpus extenuatur ex debilitate digestiue, non sic in prægnatione uera. Quintum, patiens molam est secundum plurimum debilior in omnibus operationibus quam uere prægnans. Distinguitur autem inter molam carneam, & foetum mortuum, quia in reuolutione de latere ad latus, foetus mortuus cadit ad latus ad quod uenter inclinatur, sed mola carnea non mouetur à suo loco. Sunt & alia signa foetus mortui, sicut frigiditas luminis, & reliqua uidentur cap. proprio. Signa uero distinctiua inter ueram prægnationem, & molam uentosam sunt quinque. Primum, quia in prægnante tumor & durities sunt magis in una parte determinata, & si duo foetus in duobus lateribus matricis contineantur apparet in illis durities & tumor. In medio uero apparet mollities per quam distinguitur inter duos foetus, sed in mola uentosa, fere equali apparet tumor & uniformis in omnibus partibus eius. Secundum, quia in mola uentosa est leuitas cum dolore extēsiuo, & interdum perforatio quæ non sunt in uere prægnante. Tertium, mola uentosa cum tumore notabili accidit in paruo tempore non sic in prægnante. Quartum, tumor ille aliquando notabiliter crescit aliquando decrescit in paruo tempore non sic in prægnante.

Quintum, cum percussit uenter sonat ut tympanum in mola uentosa, non sic in prægnante. Signa distinctiua inter ueram prægnationem & molam aquosam sunt quinque. Primum, quia in uera prægnatione sunt tumor & durities in una parte determinata, scilicet ubi est foetus, & si sunt duo foetus apparent in uentre duo tumores, & duæ durities distinctæ secundum locum. Sed in mola aquosa est mollities, & tumor uniformis per totum. Secundum, quia uere prægnans non est multum discolorata, sed habens molam aquosam est ualde pallida cum mollitie quadam. Tertium, quia in mola aquosa in motu & corporis reuolutione audit sonitus aque motæ, non autem sic in prægnante. Quartum, quia in habente molam aquosam est sūmen & pecten, undimiatum cum magna mollitie quod non est in uere prægnante. Quintum, quia in habente molam aquosam, aliquando egreditur humida aquosa per uuluum, non sic in prægnante. Signa uero distinctiua inter ueram prægnationem, & molam humoralem sunt duo. Primum, quia in uera prægnatione sunt tumor & durities in una parte determinata ubi est foetus, aut in pluribus si plures sint foetus. Sed in habente molam humoralem est tumor cum mollitie uniformis per totam regionem matricis. Secundum, quia in mola humoralis egreditur per uuluum

uuluum humores diuersi quandoque mixti cum sanguine, non sic in prægnante, nisi cum uellet abortire. Signa uero distinctiua inter species molæ sunt infra scripta. Distinguitur ergo mola carnea uentosa per signa quinque. Primum, quia in mola carnea est durities fortis & tumor in una parte determinata, ubi est frustum carnis, sed in mola uentosa est tumor & tensio uniformis per totam regionem matricis absque duritie in aliqua parte determinata. Secundum, quia tumor in mola carnea uniformiter augendo procedit, sed in mola uentosa nunc tumor subito decreuit, nunc augetur notabiliter. Tertium, quia in uentosa sonat uenter sicut tympanum cum percutitur, non sic in carnea. Quartum, quia accidit frequenter dolor extensiuus & aliquando perforatiuus in uentosa, non sic in carnea. Quintum, quia adest leuitas in uentosa, grauitas notabilis in carnea. Sed distinguitur carnea ab aquosa per quinque superius posita per quæ distinguitur uera prægnatio à mola aquosa. Similiter distinguitur mola carnea ab humoralis per duo signa supra scripta, per quæ distinguitur uera prægnatio à mola humoralis. Signa uero distinctiua inter molam aquosam, & uentosam sunt quinque. Primum, quia in mola uentosa est tumor notabilis, & tensio quæ facile non cedit comprimenti, non sic in aquosa. Secundum, quia utraque iacente supina in uentosa est uniformis tensio per totum, sed in aquosa deprimitur partes funinis, sed inflantur ilia & latera. Tertium quia uentosa aliquando notabiliter crescit subito, aquosa uero procedit augendo uniformiter. Quartum, quia in uentosa cum percutitur uenter auditur sonus sicut tympani. Sed in aquosa auditur sonitus aquæ in motu & reuolutione de latere ad latus. Quintum, quia in aquosa apparet sumen & pecten undimiatum cum mollitie: item humiditates aquosæ egrediuntur per uuluum, non sic in uentosa. Signa uero distinctiua inter molam aquosam, & humoralem, sunt difficiilia cum multum assimilentur, hoc tamen interest. Primum, quia in aquosa apparet undimia cum mollitie circa sumen & pecten, non sic in humoralis. Secundum, quia in aquosa interdum egreditur aquositas per uuluum, in humoralis uero humores frequenter sanguini permixti. Tertium maior est palloredo in aquosa quam in humoralis, & pedes, & crura magis undimiata. Signa uero distinctiua inter species molæ, & species hydropisis sunt difficiilia, cum mola aquosa multum assimiletur asciti, & mola uentosa tympaniti. Signa tamen distinctiua sunt tria. Primum, quia in speciebus hydropisis præcesserunt nocumenta hepatis, de quibus actum est superius, sed in mola præcesserunt nocumenta matricis. Secundum, quia tam in mola aquosa quam uentosa, & etiam in humoralis non est tumor, nisi in lumine vel ab umbilico infra scilicet ubi continetur regio matricis, sed in duabus speciebus hydropisis iam dictis, scilicet ascite, & tympanite apparet tumor per totum ventrem à pectine usque ad diaphragma. Tertium signum, quia in mola aquosa egreditur frequenter aquositas per uuluum, non sic in ascite, & ex his possunt sumi distinctiua inter ueram prægnationem & species hydropisis.

Prognostica. Primum, licet molæ secundum plurimum emittantur ante nonum mensem, aliquando tamen prolongantur usque ad tres, vel quatuor annos, aliquando usque ad extremum uitæ quod maxime verificatur de carnea & uentosa. Secundum, sem plurimum cum species molæ prolóngantur ultra nonum mensem sunt insanabiles & frequenter interimunt.

Mulieribus plerumque accidit passio, ex qua prægnantium dispositionis similitudinem incurrunt: uenter namque crescit, & discoloratur sunt, & retinentur menstrua, motus tamen, qui est in hac agriitudine, non est, ut motus infantis: immo quandoque de suo mouetur loco, cum durius tangitur. ad ultimum uero cum angustia & dolore, frustum carnis informe, ac si pareret, emittit, plurimum uero solummodo uentosas, & humorum multitudine emittuntur: & deinde minuitur uenter, & remouentur accidentia: postquam uero tempus præterierit, in quo scitur puerum debere moueri, si adest: trochisci de mirra dadi sunt, & apozema de seminibus, & oleum de resina ad bibendum: & pessarium ex ruta, & mentastro, & alia pessaria prædicta in

capitulo de alleviatione partus sunt immittenda, doses quod de pilulis fiet. frequenter tribuenda sunt, cum hoc e nim cito euadent.

Hoc cap. diuidit in tres partes. In prima ponit signa molæ. In secunda modum terminationis. In tertia, temporis inchoandi curam, & auxilia opportuna, secunda ibi. Ad ultimum uero, tertia ibi. Postquam uero tempus præterierit. In prima ponit quatuor signa dicens, quod mulieribus aliquando accidit passio dicta mola in qua patientes assimulantur prægnantibus. Primo crescit uenter sicut in prægnantibus cum res in utero contenta paulatim augendo procedat. Secundo sunt discolorata nocumento communicato stomacho, & hepatis maxime propter retentionem mestrurorum. Tertio retinentur menstrua propter clausuram oris matricis, sicut in prægnatione quæ clausa sit a uirtute, & est oppilatio attenuatoria. Quarto, quia contentum in matrice mouetur, sed non ex se imo per compressionem, & in hoc differt a uera prægnatione, in qua foetus ex se mouetur, etiam ad oppositas differentias. In secunda parte ponit modum terminationis, dicit quod ad ultimum. i. transactis quibusdam mensibus, cum dolore & angustia, ac si pareret emittit frustum carnis, pluries tamen emittit solâ uentositatē, aut humorum multitudinem, post quorum emissionem uenter minuit & sedantur accidentia. Sed in tertia parte ostendit tempus inchoandi curam, & ponit remedia opportuna. Tempus autem inchoandi curam est a quarto vel quinto mense supra scilicet in eo tempore in quo foetus deberet se mouere & non adest motus eius. Remedia autem sunt quinque. Primum, trochisci de mirra sunt dandi, sicut dictum fuit in cap. de prouocatione mestrurorum ad mouendum sang. ad orificia uenarum menstrualium, & ad stimulandum expulsiuam matricis, ut aperiatur collum eius. Secundum est apozema, i. decoctio de seminibus de quo supra cap. de colica & est ad eandem intentionem, & ad dissolendas uentositates existentes in matrice. Tertium est oleum de cheisim, id est de pentadactylo qui aliter dicitur cherua, cataputia maior, sollequia, hoc enim in potu sumptum a tribus. 3. usque ad 4. ualde potens est ad extenuandum phlegma, & ad carminandum uentositatem. Quartum est pessarium ex ruta & mentastro potens ad carminandum uentositatem, & alia pessaria aquæ sunt immittenda, quæ pessaria perquire quarto huius capitulo de faciando partum. Quintum & ultimum auxilium sunt pilulæ foetide frequenter exhibenda, cum hoc enim quod prouocant educunt causam antecedentem.

Cura molæ exigit sex intentiones. Prima euacuat causam materialem eius. Secunda præparat ad ipsius mole educationem. Tertia ipsam educit. Quarta alterat discrasiam matricis, quæ est causa generationis eius. Quinta corrigit accidentia. Sexta ordinat regimen sex rerum. Prima intentio perficitur digerendo & euacuando. Digestiui autem sit in mola carnea, & uentosa, & humoralis pendente ab humoribus crassis incisuium, absterfuium, subtiliatuium, & per uirtutem tertiam petens matricem, sicut oxymel simplex, compositum, & scillicum cum aqua artemisæ, & similibus, & ex propriis est huiusmodi. Recipe betonice, matricarie, artemisæ, chamedryos, chamæpitios, calamenthi, mentastri, pulegii, organi ana. M. i. sauinæ, plu, id est, ualerianæ, meu, leuistici, cyperi, calami, arom. ana drach. 1. bulliant in lib. 5. aquæ ad consumptionem medietatis & coletur, quæ colatura syrupizetur cum mellis lib. 2. aceti lib. s. & fiat syrupus longus pro duabus porcionibus reliquum abbreuietur, quod deinde sumatur cum aqua artemisæ, aut matricarie, euacuatuium uero sit electarium indum, benedicta simplex, theodoricon, hieralogodion, pilulæ foetide, & similia. Si uero materia fuerit aquosa, educatur cum succo ireos, & his quæ conueniunt in ascite, de qua supra. Digestiua etiam sunt illa quæ superius posita sunt in ascite, phlebotomia conuenit si in causa fuerit sanguis, & fiat ex basilica aut ex saphenis, si in causa fuerit retentio mestrurorum. Præparetur autem & molæ educio iuxta secundam intentionem cum his quæ mollescant, & collum matricis dilatent, ex quibus sunt fomenta, unctiões, semicupia, pessaria, suffumigia, & ea quæ sumuntur, mollescantia in quibus est sedendum, & cum quibus est fomentandum, sunt decoctio ex alchæa,

Io. Arculani

g foent-

foenugræco, semine lini, anetho, fefamo, malua, branca urfina, & similibus, & cum eisdem est suffumigandum. his posunt addi in decoctione aliqua prouocantia, sicut fauina, semen iuniperi, & similia, & pessarium fiat ex cotto quod infundatur in unctione facta ex pinguedine gallinæ, oleo liliorum alborum, fefamino, cui parum musci addi potest. Et hæc maxime in carnea sunt necessaria. Sed in uetosa cum suprascriptis ponantur ad bulliendum aliqua carminantia uentositatem, sicut arist. rotun. & similia, & in aquosa aliqua eductantia aquositate, sicut iris. & sumat decoctionem lenientem & lubricantem factam ex capillis ueneris, passulis, sebesten, dactylis, ficibus, semine althææ, & artemisæ. Eductio autem molæ iuxta tertiam intentionem fiat cum his quæ stimulant expulsiuam, & faciunt collum matricis aperiri sicut trochisci de mirra exhibiti: cum aqua decoctionis iuniperi. item suffumigium infrascriptum à Ras. 4. Alm. Recipe mirrhæ, idest, galbani, gēsu, idest, oppoponacis, sulphuris ana drach. i. puluerizentur, & misce cum felle uaccino, & fiant pilule quarum una post aliam super prunis mittatur, & recipiatur fumus ad matricem cum emboto, & suffumigatio cum elleboro, & colocynthis est præstans, & quæcunq; facilitant partum & educunt foetum, & secundinam, sunt ad hanc intentionem. Et ex præstantibus quæ non fallunt est confectio huiusmodi. Recipe mirrhæ, castorei, styracis ana drach. i. cinnam. fauinæ ana. 3. s. conficiantur cum melle, cuius dosis sint auræ duo cum uino, quod si mola fuerit aquosa euacuetur cum diureticis, sicut diacurcuma, dialacca. Et dentur medicinæ soluentes aquositate, & in summa regatur regimine ascitis, de qua supra. Si tamen potest educi aquositas per collum matricis illud est præstantius, propterea illa uia tentanda est. & efficax ad illud est pessarium factum ex farina gith, & ex mercuriali contrita. Si uero fuerit uetosa regatur cum carminantibus uentositatem ex propriis, matrici, sicut arist. rotun. potata & pessariata. Et sicut pessariū Ras. 5. in litera & oleum de cherua, de quo supra, potatum est efficax, & in summa regatur cura tympanitis. Si uero sit humoralis præmissis uniuersalibus euacuationibus, de quibus supra, tētetur eductio eius per collum matricis cum his quæ dicta sunt & phlebotomia saphenarum. Quarta intentio aliterat diffractam matricis, quæ secundum plurimum est calida & sicca cum contrariis bibitis epithemizatis, & pessariatis, & ex propriis frigidis est oleum de alchechengi. Quinta intentio corrigit accidentia secundum ipsorum exigentiam. Sexta intentio ordinat regimen sex rerum in contrarium diffractæ, & etiam secundum exigentiam intentionum quas intendimus perficere.

De anatomia siphac & mirach. Cap. 109.

Quia hic agitur de ægritudinibus mirach eius anatomia est præmittenda. Cum tres sint uentres in humano corpore. Superior contentius membrorum animalium & est caput. Medius contentius membrorum spiritualium & est pectus. Inferius contentius membrorum naturalium, de cuius anatomia agendum est. Qui descriptiue est uas superius, ad diaphragma, inferius, ad pectus terminatum, posterius habens dorsum, anterior mirach ad continendum membra naturalia finaliter ordinatum. Superius. n. terminatur ad diaphragma quod diuidit naturalia à spiritualibus. Inferius terminatur ad pectus quod continet membra generationis, quæ tamen inter membra naturalia computantur, habet posterius dorsum, scilicet à 19. spondilium eius infra: anterior autem est mirach. Membra autem naturalia quæ continentur in hoc uase sunt decem, scilicet zirbus, stomachus, intestina, mesenterium, hepar, splen, renes, matrix, uesica, testiculi, cum uasis spermaticis in mulieribus, quia in uiris procedunt extra. Hic autem uenter habet partes anteriores & laterales & posteriores. Anteriores sunt quinque. Prima, est pars quæ cooperit malum granatum & os stomachi. Est autem malum granatum os charitilaginosum figuram habens scutalem continuatum inferiori ex ossibus thoracis quæ sunt septem, ordinatum ad tutandum os stomachi, & ut sit medium inter thoracem & membra leuia, & dicitur epiglottis apud Auic. eo quod epiglottis assimiletur. Secunda pars cooperit fundum stomachi duras prope umbilicum per duos aut tres

digitos. Tertia est, umbilicus cum quo foetus alligatur matrici in primo est una uena, quæ transit per gibbum hepatis ad uenam chylum, & continuatur cum orificio vnius ex uenis matricis mediante secundina, & per hanc foetus nutritur ex sanguine attracto à matrice ad gibbum hepatis eius. Non enim in eo ex chylo generatur sanguis neque celebratur in eo prima digestio quæ fit in stomacho, propterea non sunt in eo fœces quæ sunt superfluitates primæ digestionis. Sed fit in gibbo hepatis eius secunda digestio, non quidem dans formam sanguini, sed solum perficiens & separans quædam superflua. Est etiam in umbilico arteria una quæ ascendit ab arteria aorti cum est in principio spondilium alanis quæ continuatur cum orificio unius arteriæ terminatæ ad concauum matricis. Per quam deferitur aer à concauo matricis ad cor foetus ad ipsius euentationem. Non enim foetus euentatur in utero per aerem inspiratum ad pulmonem, propterea pulmo foetus est rubeus, sed albificatur cum exiit ab utero per respirationem. Quarta, est pars quæ uocatur sume infra umbilicum per quatuor digitos, & est pars in qua uenæ quatuor terminantur ad cutim, per quas foetus existens in matrice emittunt aquositate. Ideo apud Auicem. hæ uenæ notiores sunt in non natis quam in perfectis in quibus frustrantur à tali operatione. Quinta, est pars quæ uocatur pecten in qua sunt membra genitalia, partes uero laterales funt hypochondria & ilia, in hypochondrio dextro continetur hepar, in sinistro uero splen, & sub eis sunt ilium dextrum & sinistrum, & quibus reliqua membra naturalia continentur, partes uero componentes mirach sunt quinque, scilicet cutis pinguedo, panniculus carnosus, octo lacerti uentris cum choris eorum, & panniculus neruosus dictus siphac, & ab Ani. uocatur beiteron. Auic. tamen per mirach aliquando intelligit aggregatum ex omnibus his quinque particulis. Cutis facta est ad continendum & sentiendum quæcunq; occurrentia. Postea sequitur pinguedo, maior tamē in porco quam in homine, ordinata ad reflectendum calorem ut uigoretur digestio, & ad remolliendum fœces ut facilius expellantur. Postea est panniculus carnosus qui non est neruosus ut alii, neque carnosus ut musculi. Musculi autem sunt octo. Primo sunt duo longitudinales procedentes à clypeo oris stomachi usque ad ossa pectinis secundum longum uentris, ideo appellati sunt logitudinales, & iuuuant ad attrahendum cum nullis se elongando, & postea se contrahendo. Deinde sunt duo transversales superiores, unus à dextris, alter à sinistris, & ambo oriuntur à superioribus iuxta costas mēdosas, & desinunt in chordas iuxta ossa pectinis sic quod dextri corda tēdit ad sinistrum inferius, & sinistri ad dextrum, & per oppositum sunt duo inferiores procedentes ad superiora, quorum ortus est ab ossibus pectinis & anchæ, & desinentia in chordas est ad locum ubi finiunt costas, ita ut se crucient secundum angulos obliquos ad modum istius figuræ, & sunt ordinati ad retinendum. Ultimo sunt latitudinales quorum fila procedunt per latum, unus dexter, alter sinister, & ortus & aperientia eorum est magis iuxta dorsum uersus superius, & isti cum longitudinalibus se interfecāt ad angulos rectos, & sunt ordinati ad expellendum, quapropter eius situs est magis superius quam inferius cum magis ordinentur ad expulsionem per inferiora, quam per superiora, & propter eandem causam transversales superiores sunt fortiores & crassiores, cum magis sunt ordinati ad retinendum ne quid egrediatur per inferius. Ultimo sequitur siphac panniculus, durissimus & subtilissimus, hic factus fuit ut prohiberet ne musculi comprimerent membra intrinseca, & ut ea contineret. Propter quod tactus fuit neruosus & non ossesus, ut posset contrahi & dilatari secundum exigentiam, & fuit subtilis ne aggrauaret, & durus ne facilius rumpiretur. Nam ex eius fractura accidit passio, quæ dicitur crepatura siue hernia, de qua Ras. in cap. Intumescit enim mirach cum rumpitur hoc siphac. Sunt etiam eius alia dua iuamenta apud Auic. in capitulo de anatomia stomachi. Vnum ut per curationem eius cum adiutorio diaphragmatis cum quo alligatur expellatur quod in stomacho, intestinis & in matrice continetur. Aliud iuamentum est ut alliget intestina dorso mediatis panniculis mesenterii ab ipso ortum habentibus, & ut ab ipso oriuntur omnes panniculi membrorum in ipso contento, & quinta utilitas apud Galenum quinto de iuamentis membrorum

membrorum est, quod prohibet intestina à ruptura quando instantur. Potest autem venter pati omne genus ægritudinis. Sed nihil habet proprium quod ex anatomia depèdeat, nisi solutionem continui & tumorem præter naturam. Cum enim soluitur venter solutione penetrante utrunq; aliquando egreditur zirbus, & opus est ut quicquid ab acre alteratum est ligetur prope uulnus ligatura forti, & supra ligaturam scindatur & abiiciatur & retromittatur, & fila ligaturæ exterius dimittantur, ut facta consolidatione post nouè dies uel decem, possit filum extrahi. Si autem egreditur intestinum retromittatur quàm citius fieri potest. Quod si tumor ingressum impediret fomentetur aqua decoctionis rerù carminantium uentositatem donec detumescat & retromittatur. Et si medicinx non sufficiunt ad detumefaciendum ipsum, paulatim stringatur iuxta foramen ut aliquid unctuositatis ingrediatur per partem, cum non possit totum simul ingredi. His autem non sufficiens uulnus dilatetur cum instrumento aliquoties curuo ex una tantum parte incidente & intromittatur. Quod si intestinum esset incisum & sit de crasis, suatur futura pellipariorum. Si uero de subtilibus suatur similiter, sed postea inuoluatur cum intestino alicuius animalis circum confuto, ut fucione intestini debite conseruet, cuius quantitas sit adæquata quantitati primi intestini, postea intromittatur dimissis extra florum capitibus, cum quibus fucio facta est, ut post consolidationem possint extrahi, & uulnus extrinsecum suatur modo Auic. Primo apprehendendum cum acu totum mirach ex una parte, ex altera parte totum mirach præter siphac, & in secundo puncto econuerso apprehendatur totum mirach, ex altero latere. primo totum mirach præter siphac, & sicut puncta stricta distantia per medium digitum, postea cum puncta sunt facta omnia stringantur, sic enim coniungitur siphac neruofum cum mirach carnosum & fiet consolidatio. in tumore autem ascitico dictum fuit superius qualiter debeat fieri sectio in capite de hydropisi sed in tumore apostemofa caueatur ne apostema rumpatur interius. quapropter apostemate exeunte pro funde scindatur ante maturacionem. Didimi autem sunt panniculi neruosi orientes ex siphac iuxta utrunq; inguen stricti superius, sed inferius dilatantur circundantes testiculos, & per utrumque didimum ingrediuntur uasa spermatica, de quibus supra, deferentia spiritum animale, uitalem, & naturalem, & sanguinem conuertendum in sperma, finis itaque didimorum est suspendere testiculos, testiculos continere atque custodire simul cum uasis spermaticis, & possunt pati omne genus ægritudinis: & præcipue patiuntur dilacionem aut rupturam ægritudinem sibi propriam, per quam ea quæ in uentre continentur descendunt in oscheum, quæ passio dicitur hernia, de qua Rasis facit hoc capitulum, licet in hoc etiam agat de eminentia siue augmento mirach quod ab Auic. appellatur augmentum umbilici.

De eminentia & ruptura. Cap. 110.

Pro notitia huius dispositionis est sciendum, quod augmentum umbilici apud Auic. est tumor siue eminentia accidens umbilico aut partibus adiacentibus, scilicet sumini, pectini, illis aut hypochondriis propter aliquid præternaturaliter contentum inter partes mirach. Dicitur autè augmentum umbilici eo quod frequentius accidat umbilico propter foramen naturalem ibidem existens, de quo supra in anatomia. Augmentum autem inguinis est tumor similiter accidens inguini, si non communicatus fuerit burse testicularum. Si uero coicatus fuerit dicitur ramex siue hernia. Sed Rasis has dispositiones sub eminentia & ruptura comprehendit. Sic enim intitulauit hoc capitulum. Sed agamus primo de augmento umbilici & inguinis. Deinde de ramice siue hernia. Est ergo eminentia umbilici & similiter inguinis septiplex scilicet apostemofa, carnosaf, uentofa, aquofa, sanguinea, zirbalis & intestinalis. Apostemofa est propter apostema calidum uel frigidum, durum aut molle. Carnosa pendet à carne nata inter partes mirach, sicut aliquando ex ulceribus ibidem factis in quibus excreuit caro. Ventosa pendet à uentositate cõtenta inter partes mirach, siue sit ibidem genita, siue illud deriuata ab hepate uel à concauitate uentris sicut aliquando accidit in tympanite, aut propter rupturam

siphac aut sine ruptura. Aquofa uero pendet ab aqua ad partes mirach sibi plurimum deriuata. Sanguinea uero pendet ab emborismate inter partes mirach facta propter rupturam uenæ aut arteriæ, & sanguis egrediens ibidem retentus facit illas partes intumere. Zirbalis fit à zirbo ibi cõtento. Sicut intestinalis ab intestino ibidè inter partes mirach contento, quæ duæ eminentiæ si fiant ex directo umbilici aut suminis, aut in inguine possunt fieri per rupturam siphac, & per dilacionem eius absq; ruptura, cum in his tribus locis sint meatus naturales ut paruit ex anatomia. In reliquis autem partibus non credo has duas posse fieri absq; ruptura. Reliquas autem quinque species credo in quibuscunq; partibus posse fieri absq; ruptura siphac. Harum autem eminentiarum, quædam sunt nouæ, quædam antiquæ: quædam magnæ, quædam paruæ: quædam in puericia, quædam in aliis ætatibus: quædam in habente complexionem bonam cum bonitate humorum, quædam econtrario. Species autem herniarum, quæ aliter dicuntur ramices sunt octo, scilicet uentofa, aquofa, saniosa, carnosaf, uaricofa, zirbalis, & intestinalis, & apostemofa. Ventofa, aquofa, & saniosa, sunt ex uento phlegmate, aqua, aut sanie per didimum ad testiculos delata, cum rupturâ, aut sine ruptura. Sed carnosaf ex carne aut adipe intra didimum genita, siue sit adhærens & inuiscata cum testiculo, siue cum didimo, aut cum utroq; Varicofa autem fit ex dilacione uenarum & increffatione quæ descendunt ad testiculos, aliquando ex increffatione uenarum ipsius oschei. Zirbalis uero fit ex descensu zirbi per didimum. Sicut intestinalis fit ex descensu intestinorum, quod secundum plurimum est monoculus, quoniam est minus cæteris mesenterio alligatus. Et hæc est quandoque cum ruptura didimi, quædoque ex sola apertione absq; ruptura, & frequentius accidit in uiris q; in mulieribus, maxime ex hac causa, quia mulieres non habent didimos ordinatos ad continendū & suspendendū testiculos, cum testiculi sui non procedant extra sicut in uiris. Et ex his infertur quod hernia accidit mulieribus zirbalis aut intestinalis, est semper ex ruptura siphac cum non sit ibi meatus naturalis per cuius apertionem possint descendere. Species herniarū similiter distingui possunt penes quantitatem, tempus, ætatem & complexionem, sicut statim dictum fuit de eminentiis mirach & inguinis.

Causæ coniunctæ eminentiarum & herniarum ex iam dictis sunt manifestæ. Causæ autem primitiuæ sunt casus, percussio, offensio, saltus, cantus, risus, tussis, sternutatio, & omnis fortis motus, conatus, & expressio & multoties sequuntur prægnationem, molam, & hydropisim propter fortem extensionem mirach, & aliquando accidit his qui sunt tormentantur, aut super quorum uentrem cadit equus aut alia res grauis. Causæ uero antecedentes corporeæ ex sæpe dictis possunt esse manifestæ.

Signa apostemofa cognoscuntur per signa communia apostematum, scilicet tumorem, duritiem, grauitatem, dolorem, & quia paulatim augendo procedit, sed à quo humore pendeat cognoscitur ex colore, specie doloris, uelocitate aut tarditate augmenti, & cæteris quæ consignant, scilicet complexionem, habitudine, ætate, tempore anni, regimine præcedente & similibus, quæ sæpe dicta sunt, carnosaf uero cognoscitur ex tumore cum duritie sine dolore qui tumor non augetur neque minuitur. Sed uentofa cognoscitur ex leuitate cum tensione æquali, & quia subito facta est, & sonat cum percutitur, & est cum claritate quadam, & aliquando cum dolore, sed aquofa cognoscitur ex mollitie cum grauitate & fit paulatim. Sanguinea uero siue emborisma cognoscitur, quia subito uel in paruo tempore facta est, & est mollities cum caliditate quadam, & aliquando propter multitudinem sanguinis extendentis apparet durities potius sequens tensionem quàm naturam humoris. Et quandoque sentitur pulsatio sicut arteriæ & color tendit in fuscum, & premendo retrocedit aliquando & non premendo reuertitur sicut ruptura. Sed zirbalis & intestinalis cognoscuntur, quia homine iacente supino per compressionem recedunt zirbo & intestino interius redeunte. Sed cum homo erigitur iterum redeunt. Differt tamè zirbalis ab intestinali, quia zirbalis est mollior & sine rugitu intromittitur, & est secundum plurimum minor. Intestinalis autem in his tribus habet

Io. Arculani g a bec

bet e contra. Hernie uero distinguuntur ab eminentiis inguinis, quia sunt cum tumore oschei, eminentiæ uero non. Sed signa aquosa & uentosa sunt similia his quæ in eminentia aquosa & uentosa dicta sunt. Saniosa uero licet sit similis aquosa differt tamen ab ea per opacitatem quandam quæ nõ est in aquosa, & quia saniosa præcesserunt ulcera aut rupturæ apostematis. Carnosa cognoscitur per tactum carnis duræ adhærentis testiculo, aut bursæ, aut utriusque licet aliquando sit mollior sicut adiposa, & non potest introritti sicut zirbus aut intestinum de quibus statim. Varicosa uero cognoscitur, quia sentiuntur uenæ crassæ tortuosæ ab inguine usque ad testiculum, licet aliquando sentiatur in oscheo, & in his duabus testiculus eiusdem partis magis pendet quæ testiculus partis oppositæ. Zirbalis autem & intestinalis cognoscuntur, quia delitescunt per compressionem zirbo & intestino in uentrem redeunte. Sed zirbus facilius & sine rugitu introrittitur, intestinalis difficilior & cum rugitu, imo aliquando non potest introritti cum est intestinum plenum stercoreibus duris. Et aliquando difficilior introrittitur quam intestinum uacuum à stercoreibus, & tunc sequitur colica & uomitus stercoreum & mors. Item zirbalis est minor & mollior & cum nullo aut paruo dolore. Quod autem proveniat à scissura siphac, cognoscitur quia subito accidunt & sunt cum dolore, & præcesserunt causæ primitivæ aut corporeæ uiolenter exprimentes quæ in uentre continentur, & regimen præcedens, & tempus anni fuit exiccituum. Sed e contra omnino non sunt signa dilatationis absque scissura.

Prognostica. Primum. Eminentia & hernia uentosa, aquosa, & saniosa, facile curantur, licet post curationem quandoque redeant. Secundum. Eminentia & hernia zirbales & intestinales, quando sunt ex dilatatione absque ruptura, ual de facilius curantur quam quando sunt cum fractura, ita quod aliquando magis & in ætate adulta & antiqua curantur. Sed quæ sunt cum scissura minime, imo non curantur cum medicinis nisi parua non antiquata & in ætate pueritiæ. Reliquæ uero pro curatione exigunt operationem manualet. Tertium. Eminentia quæ est emborisma difficillime sanatur, & exigit medicum expertum. Quartum. Cura herniæ carnosæ & uariolæ difficillima est aut impossibilis. Quintum. Hernia cum prolongantur nocent testiculis interdum ipsos corripentes.

Cum aliquis in mirach uentris habuerit eminentiam quæ, cum supinus iacuerit, & cum leuiter digitis locis compressus fuerit, remouetur: & cum sederit redibit; passio adeft, quæ ruptura dicitur.

Diuiditur hoc cap. in partes duas. In prima agit de eminentia mirach & inguinis zirbali & intestinali, quia solum de his duabus determinat. In secunda agit de hernia quam appellat rupturam. Secunda ibi. Ruptura autem. Prima in duas. In prima ponit signa. In secunda curam. Secunda ibi. Qui hoc itaque patitur. In prima dicit, quando aliquis in mirach uentris eminentiam habuerit, quæ cum supinus iacuerit, & locus eminens digito compressus fuerit remouetur, & cum sedet redibit, passio adeft quæ ruptura dicitur, eminentiam enim huiusmodi rupturam appellat eo quod frequenter sequitur rupturam siue scissuram siphac.

SCHOLIION

Conspicuius in scroto, aut inguine tumor est ramex, siue hernia: ille, qui in exercitiis itinere, spiritus retentione, alisque occasionibus maior, quam prius euadit. compressus tardè quidem recurrit: celeriter autem rursum deuoluitur.

Qui hoc itaque patitur, sibi cauere debet, ne post comestionem moueatur, neque comedat fabas: & hoc præcipue neque phaseolos, neque lentes, neque olera, neque aliquem cibum inflatum. Studere etiam debet, ut eius uenter semper sit mollis: hoc nanque regimine possibile est ipsum euadere dolorem. loco præterea aliquod superponendum est ob sciculum, & stringendum, & proprie cum se mouere uoluerit. crassus quoque si fuerit, & uentrem habuerit grauem, non debet uti motu, nisi uenter prius sub umbilicum amplacingatur fasciæ. emplastrum ad rupturam. Rec. gallarum

cupressi, partes duas, mirrhæ, ciperi, sampsiuci, gallarum, acatiæ, olibani, gummi arabici omnium ana partem unam gumma prius in uino soluantur, & aggregentur cum eis reliqua, & super rupturam ægro supino iacente ponatur, & stringatur locus, & non soluiatur usque ad tres uel septem dies. postea ægro supino iacente soluiatur, & illo eiefto de eodem emplastro superponatur; ex hoc enim probibetur ampliari.

Hic curat hanc eminentiam quinque aliis. Primum est regimen sex rerum quo cauetur ne post cibum moueatur, motus enim simul cum cibo comprimentes facit intestina & zirbum egredi. uicit etiam uentosa sicut proprie sunt fabæ. icæ reliqua difficilis digestio, & habentia humidum uentofabile sicut reliqua legumina, herbæ, & similia. Secundum est, quod teneat uentrem lenem, ne uentositates & sterora reuoluerit rupturam augeant, hoc uanque regimine possibile est euadere dolorem, qui sequitur rupturam & extensionem ab intestinis ex zirbo egredientibus. Tertium, rupturæ superponatur aliquod obstaculum sicut plumaceolus qui cum ligatura debite stringatur, & maxime hoc necessarium cum se mouere uoluerit. Quartum, si crassus fuerit secundum compositionem, & uentrem habuerit grauem propter intestina crassa & plena stercoreibus nullo pacto moueatur, nisi uenter sub umbilico usque ad pectinem ampla stringatur fasciæ ad sustentandum uentrem, ne rupturam faciat aut augeat. Quintum, emplastrum hoc superponatur eminentiæ, zirbo & intestinis intus repositis. Nucum cupressi partes. 2. quæ sunt calidæ & sic. & stipt. mirrhæ, ciperi, samp. calidorum & siccorum, gallarum acatiæ, quæ sunt frigida, & sic. stiptica, olibani, gummi arab. ana partem. 1. gumma, scilicet mirrhæ, thus, gummi ara. prius in uino, scilicet stiptico dissoluantur. & cum eis reliqua misceantur, & fiat unguentum tenax, & super loco ponatur ægro iacente supino, & remutetur de tertio in tertium, sic ut unguentum bene adhæreat. Si æger bene se habuerit expectet usque ad septem, omnis enim motus est aptus nocere, & quando remouetur fiat cum omni modestia ne partes semiincarnatæ discontinuantur & aliud superponatur de eodem augmento, & sic omnis mutatio fiat cum omni modestia possibili. Ruptura autem. In parte præfenti agit de hernia. Et primo enumerat species herniæ, de quibus acturus est. Secundo de ipsis prosequitur. Secunda ibi. Si uero propter intestina descensum. In prima parte dicit, quæ pellis testiculorum augmentatur rupturæ, id est propter rupturam factam per uentositatem, aut propter aquam quæ in oscheo siue pelle testiculorum congregatur, aut quia intestina descendunt ad bursam testiculorum, & sic tantummodo agit de tribus speciebus herniæ.

SCHOLIA.

Qui hoc ita patitur independentem prohibet morbum. Rec. gallarum cupressi præsentemque sanat.

Ruptura autem testiculorum pelliculæ oschei augmentatur. quod fit, aut propter uentositatem, aut propter aquam quæ ibi congregatur, aut quia intestina descendunt ad locum illum. Si uero propter intestinorum descensum contingat, erit grauis & dolorosus, & sentit dolorem cum tangitur. Taliter itaque patiens sicut prædiximus regendus est. Et emplastrum prædictum superponendum est. Et locus ligatura assidue stringendus est. Ruptura enim cum stringitur dilatur & augmentatur semper.

Prosequitur de tribus speciebus herniæ, & primo de ea quæ est propter descensum intestini. In secunda de ea quæ est propter aquositatē. In tertia de ea quæ est propter uentositatem. Secunda ibi. Si autem causa aquæ. tertia ibi. Cum autem hæc ægritudo. In prima parte curans herniam ex descensu in testini, dicit primo quod æger sentiet grauitatem notabilem & dolorem in oscheo & in inguine, & maxime cum tangitur. secundo dicit, quod intestinum siue zirbus qui descendit est reducendus ad locum suum, & emplastrum supra scriptum est superponendum, & locus cum ligatura debite stringendus, ut iterum nõ descendat. Ligatura. n. inter oia maxime. phibet descensum intestini & foraminis dilatationē, & si omittat ligatura et debita compressio cum plumaceolo foramen semper augeatur. Si

Si autem causa aqua fiat, locus apparet lucidus & tensus. huic itaque confert epithemari epithemate quod in cap. de hydropisi nominauimus. aqua uero in hac egritudine plurimum petit inferiora & fluit inde, unde ager per aliquod tempus sanus efficitur, sed postea redit egritudo. Postquam ergo aqua fluxerit, curatus est ager ex cauterio & medicamentis acuto. Ex hoc. n. prorsus curabitur nec redibit egritudo, de hoc tamen loqui plus est quam hic noster exigit liber.

In parte ista curans herniam aquosam. Dicit primo quod si aqua descendit locus apparet turbidus, id est, non ita clarus sicut quando uentrositas ibi continetur. Et est locus ille, scilicet bursa testiculorum tensa, id est, tumida, est tamen tumor ille cum mollitie, sed in uentosa cum duritie propter tensionem. Secundo dicit, quod huic confert epithema superius positum pro cura hydropisis ascitis. Tercio dicit, quod aqua huiusmodi descendens ad bursum testiculorum, aliquando egreditur, scilicet resudando, aut quia forte auxiliis opportunis resoluitur, aut aliter educitur, sed postea redit noua aqua in partibus superioribus congregata, & ad bursum testiculorum iterum deriuata, & hoc fiet multoties, nisi subueniatur cum cauterio, scilicet actuali, aut medicamine acuto, id est, cauterio potenciali apponendo in inguine super loco tractus aquosus ad bursum testiculorum, & etiam subueniendum reliquis auxiliis prohibentibus praedictae aquae congregationem de quibus in cura agetur. De hac tamen operatione manuali loqui, non pertinet ad hunc librum, sed magis pertinet ad septimum huius ubi agitur de chirurgia.

SCHOLION

Aquosi ramis praeter notas dictas tumor est dolore uacans firmus: ac fabilis in scroto quacunque tandem occasione non euascentis: sed in iis qui continent modicum, cedens humore in illis, qui copiosum habent, non ite.

Cum autem hac egritudo uentositatis causa contingat locus fricandus est, & ex oleo sambacino in quo castoreum & euphorbium dissoluta fuerint inungendus, & ex eodem intus in uirgam guttatim distillantur est.

In hac parte ultima curans herniam uentosam dicit primo quod locus fricandus est cum oleo sambacino, id est, scilicet, samacino, exempli gratia 5. i. in quo castorei & euphor. ana. 3. i. dissoluta fuerit, & ex hoc medicamine aliquid in uirga guttatim est instillantur hoc enim medicamen taliter ungendo locum tumorem applicatum, & in foramine uirgae instillatum plurimum iuuat in resolutione uentositatis.

Cura eminentiae apostemose perficitur sicut cura reliquorum apostematum. Nihil enim habet proprium nisi quia oportet apostema cum est profundum ante perfectam maturationem scindere, ne forte rumpatur intus. Similiter hernia apostemosa quae est apost. bursa testiculorum eodem modo curatur sicut reliqua apostema. Verum cauendum est, ne huiusmodi membra putrefiant, sunt enim ad putredinem paratissima, & suppositoria conferunt trahendo materiam ad anum, & repercutiendi appropriatur chimolea cum aceto, & in resoluendo appropriatur farina fabarum & aqua caulium, & in sedando dolorem folia hyoscyami summe ualent in causa cal. & in causa frigida ponatur farina fabarum cum foenug. & cymini. Et si maturentur fiat sectio longe ab ano, & a commissura & ligatura fiat cum brachiali tenente bursum cum testiculis suspensam, & eger supinus iaceat culo eleuato. Carnosa uero siue sit in inguine, siue in mirachuratione non indiget nisi laedat quod raro est, quod si laedat auferenda est caro addita sectione aut cauterio actuali uel potenciali, & auferatur ita profunde, aut cum administrabitur cicatrizationum sit adhuc diminuta ab eo quod est secundum naturam, nam cicatrizationum addit in carnem. Cura herniae carnae ponetur infra. Cura autem aquosae & uentosae, siue fuerit eminentia, siue hernia exigit duplex regimen. Primum debetur causae antecedenti. Secundum uero causae coniunctae. Primum exigit tres intentiones. Prima est euacuatio materiae ex qua generatur uentrositas, scilicet phlegmatis aut melanc. item euacuatio aquositas. Secunda est confortatio hepatis, stomachi, & membrorum naturalium per quorum defectum haec superflua multiplicantur cum quibus autem hac intentio compleatur, po-

test esse manifestum ex cap. de hydropi. Tertia autem intentio est regimen sex rerum, de quo Ras. agit in textu. Sit enim prohibitum generationis aquositas & uentositatis, sed de hoc dictum est opportune in capitulo de hydropisi. Secundum uero regimen quod debetur causae coniunctae duas intentiones habet. Prima est educio aquositas & uentositatis in loco contentae, & secunda est prohibitione in eodem loco eadem materia congregetur. Prima intentio iuxta posse compleatur cum resolutione ex propriis mirabilibus ad resolutionem cuiuscunque materiae existentis in bursa testiculorum ac in ipsis testiculis siue apostemantis, siue non est farina fabarum, aut fabae ipsae contractae & mundatae a corticibus exterioribus, deinde coctae in aqua, & postea pistatae in mortario addendo olui rosacei, acetii, ana. quantum sufficit & tandem super loco cum decenti ligatura applicite, ita ut bursa & testiculi non stent suspensi nec pendentes, sed subleuati. Et his non sufficientibus potes addere pro resolutione uentositatis, puluerem cymini preparati & baccarum lauri, aut parum emplastri de baccis lauri praecipue quando non est mala complexio calida. Sed in hernia aquosa potest superscriptis addi parum emplastri superius positi in cura hydropisis ascitis, sed fortiora sunt uirum & piper. In uentosa uero optime conueniunt oleum de spica, oleum de costis, oleum rutaceum, cyminum, baccae lauri, & calamentum. Aliquando uero pro extractione aqua opus est aperire bursum, illud apud Albucasis non conceditur in uentosa. Quod si aqua fuerit in bursa, & non in chisti contenta aperiat cum sagittella in parte inferiori distanter a commissura & extrahatur, & locus consolidetur & medicamen contritiuum super inguine ponatur cum plumaceolo stringendo ne iteretur, & si iterum redeat iteratio sic fiat. Quando autem aqua fuerit conclusa in folliculo ducatur per didimum supra os peccinis, & a parte uentris minister digito fortiter comprimatur, ut non egrediatur uentrem, & similiter operator stringat a parte burse, ut non descendat in bursum, & cum phlebotomo penetret usque ad aquam, & ipsam extrahat ex foramine cum tenta aliquantulum dilatato post accipiat parum arsenici sublimati, ut puta sicut medium granum frumenti, kystim cauterizet, deindeeducta escara consolidetur. Secunda autem intentio, scilicet prohibitio aggregationis aquae perficatur extrahendo aquam, sicut nuper dictum est, hoc enim regimine aqua extrahitur & prohibetur alterius aggregationis. Alii tamen cauterio actuali aut potenciali penetrant, usque ad didimum & ipsum cauterizant. Credo tamen istas operationes esse secundum plurimum pluris nocumendi quam iuuamenti, quia aut totus didimus cauterizatur aut non, si non, aqua iterum descendit per partem non cauterizantam. Si uero totus cauterizatur, necesse est testiculum corrumperetur & extrahi. Quapropter credo eligibilis esse, ut his operationibus omittis quae non sunt absque periculo, si aqua descendit, extrahatur modis superscriptis cum medicinis resoluentibus aut cum perforatione, quae aqua iterum descendente iteretur, sic enim ager dies suos salubriter finiet, & eodem modo procedatur in saniosa. Hernia sanguinea siue emborisma si sequatur fracturam arteriae quae sit notabilis difficulter recipiet curam. Primo ergo tenetur curatio cum appositione unguenti stiptici & debita compressionis cum plumaceolo sicut fit in ruptura, nec mutetur nisi de quinto in quintum aut etiam tardius. Quod si hoc non suffecerit arteria in duabus partibus discooperiatur & ligetur, & in medio ubi est ruptura scindatur & extrema notabiliter cauterizentur & conferuetur escara quartum est possibile, tandem remota escara quantum natura expellit consolidetur. Cura herniae carnosae difficillima est. Si tamen cum instantia fueris requisitus, praemissis uniuersalibus scilicet phlebotomia, uentris solutione secundum exigentiam, & ordinata dieta conueniente, quae tempore operationum manualium de quibus infra, sit tenuis decliuis ad frigidum, primo experire in carnosa dura medicinis mollificantibus, postea resoluentibus secundum ordinem institutum in cura apostematum duorum sed in intentione resolutionis semper medicinae resoluentes sint admixtae farinae fabarum aut earum substantiae, & aceto ad penetrationem, resolutionem & mollificationem, haec enim medicinae nunc mollificantes, nunc resoluentes in

Io. Arculani g 3 longitudine

longitudine dierum carnē extenuant, sit tamen longior usus extenuantium quam mollificantium, imo post initium curæ, in quo licet uti mollificantibus sit fere continuus usus extenuantium & soluentium. Si uero caro sit mollis adiposa solum cum reloluentibus & fortiter exsiccantibus procedendum est, sed in uaricosa frequenti phlebotomia basilicæ eiusdem lateris utendum est, & procuretur fluxus sanguinis hæmorrhoidalis præcipue, si fuerit consuetus, sed medicinæ locales sint stipticæ, in quibus sit acetum & applicetur cū bona strictione, & bursæ & testiculorum subleuatione, his enim modis frequenter curatur sine operatione manuali. Sed operatio manualis, primo prognosticato periculo & rei difficultate secundum Albucasi hoc modo perficienda est, postq̃ fueris multis precibus infestatus. Scinde oscheum sufficienter in ea parte ubi est caro uel uarix, & impositis stuellis cum albugine oui ad sanguinis restrictionem & uulneris dilatationem, nil aliud prima die opereris, sed secunda die tenta separa carnem a testiculo & à partibus quibus alligata est, nõ lædendo testiculum & ea incide. Si uero non sit possibile & testiculus totus forte sit corruptus aut zephiratus uel canceratus liga superius didimum, uel sue, postea canteriza & totum extrahe postea uulnus sue, hæc tamē operatio ex sequentibus fiat manifestior. Si uero fuerit uarix liga eam in parte superiori & inferiori utrobique secando uenam proprie ligaturas & inter medium extrahe, deinde uulnus sue.

Cura eminentiæ & herniæ zirkalis & intestinalis sit dupliciter, uno modo cum medicinis, alio modo cum operatione manuali. Curatio cum medicinis aut saltem præseruatio habet quatuor intentiones. Prima euacuat. Secunda zirkbum & intestina in uentrem reducit. Tertia stringit & cōsolidat. Quarta ordinat regimen sex rerum. Prima euacuat plegmata & aquositate, fœces, & quæcunq; possent rupturam facere aut fouere cum medicinis solutius, non tamen præter modum exoluentibus, in quibus ponatur aliquod derelinquens uestigium constrictionis, sicut mirabolani citrini, chebuli indi, hæc solutiuæ ex sæpe dictis possunt esse manifesta.

Secunda intentio perficitur, quando difficilis est intromissio, quia forte intestina quæ descenderunt sunt plena fecibus duris. Primo clysterizando ægrum cum lenientibus & mollificantibus & fomentando particulam cum eisdem & ex eisdem faciendo balneum in quo iaceat, deinde ægro iacete supino alius tamen cum parte posteriori quam cum anteriori & cruribus contractis, sed dilatatis, stringendo intestinum prope foramen à quo egressum & paulatim, sicut stringitur implendo ad intra uentrem per partem post partem, donec totum ingrediatur, maximus enim error est, uelle totum simul implere. Et post intromissionem procuretur tertia intentio. Primo fomentando locum cum aqua, uino, & aceto decoctionis gallarum, nucum cupressi & aluminis. Deinde apponatur emplastrum in loco in quo apparebat eminentia extensum super corio in modum scuti, quod cum brachiali aut proportionali ipsi debite stringatur, & mutetur de nouem diebus in nouem dies, & cum mutatur eger stet supinus & amoueatur cum omni modestia, ne partes continuæ diffundantur & teneantur digiti desuper, donec brachiale ligetur. Instrumenta autem cum quibus fit huiusmodi constructio triplicia sunt. Quædam enim sūt ex petia, aut sustagno in cōmuni forma. Sed hæc non sunt conuenientia, quia si stricta illaqueentur dolorem inferunt abradendo carnem. Si uero parum stringantur intestinum egreditur. Nisi forte æger uellet per longum tempus quiescere in lecto & stare supinus, in hoc casu esset satis commoda, & si excoriarent aliquā partem ponatur ibi unguentum de cerussa bene coctum. Sed ubi non posset aut uellet quiescere stringat locus cum brachiali de ferro aut de ligno suffulto sustagno aut simili. Hæc enim cōuenientiora sunt, & magis æqualiter comprimentia. Nec relaxant sicut ea quæ sunt de sustagno aut tela, & commodè feruntur equitando & incidendo. Et hæc maxime cōuenientia sunt ubi intendamus solum præseruare, & nõ perfecte curare, est enim difficile in homine qui frequenter mouetur locum consolidari, licet aliquando uiderim quotidie exercitatum cum his perfecte curari. Sed ad perfectā curationem secundum plurimum opus est facere quinquaginta diebus, deinde aliis quinquaginta diebus postquā surrexit ferre bra-

chale. Quolibet autem mane administretur sibi potio consolidatiua cum uino crasso stiptico. Descriptio emplastri. Recip. picis naualis. 5. 5. colophonæ. 3. 3. lithargirii, ammoniaci, opopanaci, galbani, bdellii, mastichis, terebenthinæ, ana. 5. 1. boli armeni, sanguinis draco, gypsi, thuris, sarcocollæ, aloes succotrinii, mumie, aristol. centaureæ utriusq; consolididæ, sumach, berberis, nucis cupressi, gallarum, psidia uermium terrestrium, ana. 3. 2. sanguinis humani. 3. 1. glutinis piscium, uisci quercini, ana. 3. 1. s. pellis arietinæ cocta cum aqua pluuiæ & aceto usque ad dissolutionem, lib. 5. dissoluatur gummi cum aceto. Conficiantur omnia cum glutinibus liquefactis & fiat emplastrum. Emplastrum quoq; Rasis in litera descriptum est conueniens & breuis compositionis. Potio ruptorum sit ex trium consolidarum, sigilli sanctæ Mariæ, utriusq; laccæ, utriusque plantaginis, ualerianæ, pimpinellæ, ana. 3. 1. nucis cupressi, nucis muscæ, cinnamomi, rhabbari alsi, fructus tamarisci, seminis nasturtii, cymini præparati, coriandri ana drac. 1. sanguinis draco. mastichis, mumie, terræ sigillatæ, boli armeni, piscis, sarcocollæ, tragacanthi ana drach. 1. fiat pulvis quo utatur fumendo de mane. 3. 1. cum. 3. 1. s. uini nigri stiptici. Alter modus curandi rupturas apud Guidonem est quod supposito bono regimine de quo infra, ægro ut dictum est iacente per. 30. dies & reductis intestinis accipiat quolibet mane, & sero. 3. 1. limaturæ calybis cum uino decoctionis hepaticæ terrefris & super loco cum rupturæ per. 15. dies de tertio in tertium remutando, ponat emplastrum factum de adamante crasso modo puluerizato, & cum apostolicon malaxando incorporato, & post alios. 25. dies continuet emplastrum dictum superius, & ligetur cum brachiali dicto, & iussus Dei erit curatus. Fundamentum illius curæ & rota spes est, quia in primis. 5. diebus adamas attrahit ad locum rupturæ limaturæ quæ facit ad consolidationem, & in aliis. 15. diebus emplastrum complet consolidationem. Quapropter reperietur super loco nodoso carnositas, quæ est signum perfectæ curationis. Quarta intentio, scilicet regimen sex rerum declinet ad caliditatem & siccitatem temperatam, cum quadam subtiliatione & carminatione uentositatis & proprie consolidandi & aggregandi dilatata & disuncta. Et cauendum est ab omnibus uentosis & superflue humectantibus. Venter tamen teneatur magis lenis quam stipticus. Vbi tamen præter modum uenter stringeretur, posset uti in principio mense ouis forbilibus cum saccharo, passulis sine nucleis & similibus uentrem lenientibus. Et apud maiorem necessitatem in æstate diaprunis, Nicolai compositio cum rhabbaro. Et in hyeme alephanginis, pillulis de rhabbaro & similibus. Aut fiant clysteria secundum exigentiam. Operatio aut manualis in ruptura didimi perficitur duobus modis. Primus cum incisione cum rasorio, & est quod situato patiente supino super tabula, & bene ligato, & reductis intestinis in uentrem, signetur locus cum enclaustro, ubi debet fieri sectio ad quem locū testiculus reducatur, postea fiat sectio super testiculo & testiculus cum didimo extrahatur excarnando & separando didimum. Postea suatur & ligetur didimus firmiter, ita alte sicut est possibile, prius capiendi & stringendo ipsum didimum inter forpices, propterea bonum est, ut antequam capiatur cum forpicebus trahatur notabiliter inferius, deinde fecetur supra forpices. ita tamen ut didimo remaneat supra forpices quantitas medii digiti parui. Deinde fortiter cauterizetur pars remanens supra forpices, & intromittatur, sed capita fili eum quo facta est sutio dimittantur extra, & cum albugine oui in primis, & postea cum curatione aliorum uulnerum curetur, & teneantur semper loca pila stupea cum ligatura debite compressa, ut tussis aut alio motu non fiat futura disruptio. Secundus modus est cum cauterio actuali, & ponitur ab albucafi, Auicennæ, & cæteris, & fit quod resupinato patiente modo dicto, & intromisso intestino & ducto testiculo ad os pectinis, signetur locus secundum quantitatem testiculi cū emplastro, & reducto testiculo per medium signi transuersaliter cauterizetur cum cauterio recuruo rotas, quousque ad os pectinis perueniatur. Postea cum albugine oui & cura reliquorum uulnorum curetur, extrahendo tamen didimum cum testiculo. Si uero uoluntas esset dimittere testiculū, quia forte ruptura non esset ualde magna, facta

facto signo cum emplastro super loco scindendo remanente testiculo in oscheo, & non deducto superius ad locum signatum perforetur usque ad os cum instrumento recuruo, ita ut pars didimi secundum medium eius scindatur utrinque; & non totus didimus, & in hoc casu instrumentum sit paruum. Sunt aliqui qui cum cauterio potenciali hanc eandem faciunt operationem, quæ est longa, laboriosa, eam uide à Guidone & reliquis. Sunt & multi alii modi quos prætermitto, tum quia difficiles, longi & laboriosi, tum quia aliqui eorum sunt fallaces. Prima tamen est cæteris securior. Quia si eminentia esset in mirach uentris, ruptura siphac, signetur locus eminens agro iacente supino secundum longum, uentris intestinum introducatur, deinde scindatur mirach secundum longum, usque ad siphac exclusiue, deinde siphac ex utraque parte excorietur separando ipsum à reliquis partibus, postea cum forcipe capiat utraque pars siphac postea suatur & liget infra forcipem, & supra forcipem incidatur & cauterizetur. Et capta filorum, cum quibus lutum est siphac extra uulnus dimittantur, postea uulnus mirach consolidetur cura reliquorum uulnerum. Simili modo procedendum est in cura rupturæ inguinis mulierum, quæ non habent didimum. Nisi quod sectio in inguine, non debet fieri secundum longum, sed secundum transversum aliquantulum, secundum incessum inguinis. Accidentia uero quæ sequuntur operationes superscriptas sunt tria. Primum, quia aliquando sequitur dolor intensus cui subueniendum est cum rebus anodinis super loco appositis. Item cum semicupis anodinis, quod si spasmus sequetur sicut aliquando uidetur, administretur cura spasmum non proportionati ad materiam, & balnea ex oleo toti corpori applicita sunt præstantia. Secundum accidens est fluxus sanguinis, cui subueniatur cum constringentibus in communi forma, & his non sufficientibus cauterizetur uena à qua sanguis profuit profunde. Tertium est tumor bursæ testiculorum interdum apostemofus, cui subueniatur cura apostematum, & si faniaretur secetur inferius, similiter si fanies cōtineretur in oscheo fiat sectio parua in parte inferiori.

De dolore iuncturarum. Cap. III.

Dolor iuncturarum est earum tristis sensatio rei subito secundum plurimum materialiter imprimens. Gutta autem est dolor iuncturarum à causa corporea, quapropter sub dolore iuncturarum gutta continetur, tanquam inferius sub suo superiori. Est autem iunctura ossium membrorum adinuicem coniunctio per ligamēta & chordas musculorum cum uenis, arteriis & cute, desuper existentibus ad membrorum flexionem & eorum membrorum finem suarum operationum exigentiam ordinata.

Dolor iuncturarum dupliciter distinguitur, aut ex parte iuncturarum patientium, aut secundum sui essentiam.

Primo modo dicimus, quod aliquis est dolor communis omnibus, uel ferè omnibus iuncturis, & hic artetica uocatur. Artus enim siue articuli iuncturæ dicuntur. Aliquando tamē artetica dicitur, & similiter pro cuiuscunque artus dolore à causa corporea, & hoc modo gutta & artetica erunt termini synonymi, licet Ras. inticulans hoc capitulum uideatur per arteticam intelligere dolorem iuncturarum, quæ sunt supra pedes magnos. Aliquis autem est proprius iuncturis communibus toti corpori quæ sunt iuncturæ spondilium dorsi, quia super ipsis totum corpus fabricatur, sicut naus super carina, & hic uocatur dolor iuncturarum dorsi, aut est proprius iuncturæ deservienti membro particulari. Et hic recipit uariam denominationem secundum membrorum diuersitatem. Si enim sit in iunctura mandibulæ uocatur dolor mandibulæ. Si uero in iunctura humeri uocatur dolor humeri. Et si in iunctura cubiti uocatur dolor cubiti. Et si in iunctura rasetæ uocatur dolor rasetæ. Et quæcunque est in iunctura manus magnæ uocatur chiragra à χηρ quod est manus. Sicut existens in aliqua iunctura pedis magni uocatur podagra, licet postea recipiat uariā denominationem secundum diuersitatem iuncturarum pedis. Nam existens in ischia dicitur sciaticus, si descendit per coxam aut crur. Si uero non descendit dicitur dolor anchæ, & existens in genu dicitur dolor genu, eodē modo in reliquis. Distinguit quoque dolor finem eius essentia, est. n. aliquis extrinsecus aliquis pugnitiu⁹, aliquis pullatiu⁹, & sic de aliis spēs⁹ doloris.

Causa immediata cuiuscunque doloris est, aut mala complexio, aut solutio continui, aut utrumque simul sicut in apostemate. Sed mala complexio est quandoque sine materia existens calida frigida aut sicca, licet secundum plurimum frigida, quia in genere proportionali facilius est transitus. Sed secundum plurimum cum materia, aut mixta ex cholera & phlegmate, & est secundum plurimum. Secundo in causa est sanguis mixtus cum cholera, phlegmate, aut melancholia.

Tertio in causa est phlegma purum, dulce, aut crudum, aut mucilaginosum, aut alterius speciei. Quarto sanguis purus, raro cholera, rarissime melancholia. Ventositas quoque aliquando est in causa & superfluitates multiplicatæ in digestionem tertia aut quarta. Et quandoque hi humores sunt apostemantes, & quandoque non, & secundum plurimum non apostemant apostemate uero. Et hi humores siue apostement siue non, continentur in concavitate iuncturarum & sunt imbibiti in carne & ligamenti conchordis & nervis. Si enim in dolore iuncturarum frequenter accideret spasmus cuius oppositum uidemus. Hi autem humores in iuncturis paulatim congeruntur & proprie phlegma propter debilitatē digestionis & expulsiuæ, sequentem aliquod genus ægritudinis in ipsis. Sed secundum plurimum deriuantur & aggregantur in eis, per uia defluxus. Cuius defluxus causa est quadruplex. Dispositio membrorum mittentium, dispositio membrorum recipientium, præsentia materia, latitudo uiarum. Mittentia autem sunt. Aut totum corpus per cuius repletionem aut cacochymiam generatur artetica, materia non expulsa per conuenientes regiones. Sic enim aliquando restricto fluxu diarrhico generatur artetica, aut aliqui dolores particulares iuncturarum materia ad ipsas conuersa. Aliquando mittentia sunt membra particularia, & frequentius omnibus hepar, secundo cerebrum, tertio matrix, deinde intestina, sicut cum colica permutatur ad iuncturam, similiter splen & membra spiritalia, & quæcunque possunt materiam iuncturis communicare propter aliquam illorum membrorum ægritudinem particularem debilitatē digestionis aut eorum expulsiuam, unde neque eorum nutrimentum debite conuertitur, neque superfluitates per conuenientes regiones expelluntur, sed potius pellunt ad iuncturas facile recipientes quatuor ex causis. Primo quia multis aliis membris supposita. Secundo quia sunt concava in quibus propter uacuitatem materiam facile recipiuntur, & receptæ propter earum substantiam duram & densam non facile expelluntur. Tertio quia doloris, eo quod neruæ, & dolor est causa attractionis materiarum ad eas. Quarto quia debiles eo quod naturaliter creatæ sunt frigide. Sic enim fuit necessarium ne fortibus motibus in quos sunt ordinatæ præter modum caleferent, & propter eandem causam natura instituit humiditates quasdam ad eas deriuari ne fortibus motibus exiccentur. Sed in quibusdam sunt debiles à generatione, eo quod parentes sui fuerunt debilius iuncturarum, quapropter ex dispositione principiorum generationis, similes dispositiones in genitis impreffunt, & in quibusdam sunt debiles accidentiter propter malum regimen sex rerum non naturalium de quo infra, & rerum accidentaliter occurrentium, sicut est percussio, casus & similia. Tertio in causa est præsentia materię peccantis multitudine aut malitia, multiplicatæ propter malum regimen sex rerum, præcipue in cibo & potu. Quarto latitudo uiarum, per quas materia à membris mittentibus ad iuncturas recipientes facile effunditur, huiusmodi autem uia secundum plurimum sunt uenæ, & aliquando concavitates neruorum & porositates ipsorum membrorum. Causæ uero extrinsecæ sunt aeris frigiditas congelans, & siccitas indurans priuando eas humiditate naturaliter ordinata, similiter eius caliditas & humiditas dissoluens & humores ad iuncturas fluere faciens. Somnus quoque superfluum præter modum humectans & superfluitatum dissolutionem prohibens, & uigilia superflua digestionem corrumpens. Item retentio euacuationum conuictarum. Coitus superfluus & tempore non congruo. Vnde ait Hippocrates sexta aphorismorum aphorismo. 28. Eunuchi non podagrizant. Nimia quies, exercitium superfluum tempore non congruo. Accidentia animi digestionem corrumpentia sicut tristitia timor desperatio & similia. Cibi & potus mali & superflui de quibus suo loco age

Io. Arculani

g 4

tur

tur. Causæ uero extraneæ sunt casus, percussio, iuncturarum dislocatio, & similes. Corpora uero magis parata ad dolores iuncturarum merito complexionis sunt frigida & sicca, licet calida & humida merito repletionis: & frigida & humida merito cacochemiæ sint paratiora: & merito ætatis senes sunt paratiores, quàm iuuenes, & iuuenes quàm pueri, quia pueri non podagrizant ante aphrodisia, id est, ante coitum. 6. aphorismorum aphorismo. 30. Et merito sexus magis masculi quàm femellæ sine quia habeant uias latiores, siue forte id non fit merito sexus, sed propter inordinatum regimen libidinis merito sexus sibi concessum. Nam mulier non podagrizat, nisi menstrua defecerint. 6. aphorismorum aphorismo. 29. Tempora magis proportionata doloribus iuncturarum sunt uer & autumnus tertia particula aphorismorum aphorismo. 25. & 22. & 6. aphorismorum aphorismo. 55. Et merito artis, illi, in quibus oportet pedibus & manibus laborare sicut uiatores & portantes onera. Et apud Auicennam humores crudi cū retinentur in corpore & non euacuantur per naturā in egestionem, & urina, nec per artem, non est longinquum, quin euacuent faciant dolores iuncturarum, si expellantur ad eas, aut febres si putrescant. Cum autem natura expellit eos in egestionem aut urina, tu inuenies urinā in eis crassam semper non subtilem, crudam, quare finaliter fit securitas ab eorum malitia. Quod si ita non fuerit, erit unum eorum quæ diximus. Et propter hanc causam uidemus homines inuolentes, & in omni re inordinatissimos nunquam incurere hos dolores neque aliam ægritudinem, quoti die enim superflua expelluntur. Et patientes ægritudines chronicas & conualescentes sunt parati ad dolores iuncturarum, & proprie cum non euacuantur secundum quod oportet, neque eorum uirtutes fortificantur. Dolores iuncturarum habent quatuor tempora, principium, augmentum, statum, & declinationem. Licet quandoque in eis tempora confundantur, cum post statum & augmentum quandoque redeat principium noua materia ad iuncturas defluxa, & quandoque respectu diuersarum materiarum sunt in principio, augmento, statu & declinatione. Propterea difficile est in ipsis metiri medicinas. Dolores isti terminantur quadrupliciter. Aut enim resoluiuntur, & hoc est secundum plurimum. Aut maturantur, sed hoc est raro, eo quod propter uacuitates iuncturarum non suffocantur materiæ neque prohibetur exhalatio, & quia secundum plurimum sunt ex phlegmate, quod difficulter maturatur, & ex cholera, quæ facile resoluitur. Aut induratur quandoque propter materiam humoris, quia phlegma crassum, aut mucilaginosum, aut melancholia, aut quia indocte tractantur, scilicet cum nimis resoluuntur, aut præter modum in frigidantibus, quapropter fit resolutio aut expulso partium subtilium remanentibus partibus terreis. Quarto quandoque permutantur ad membra nobilia, sicut dolore spondilium & humeri ad cerebrum, nucham, aut cor, quandoque ad membra ignobilia sicut ad uarices, & quandoque sic permanent, id est, usque ad finem uitæ suæ, & quandoque uirtute paulatim deficiente propter febres & dolores sequentes materiam regimine naturæ destitutam moriuntur consumpti & marasmati.

Signa doloris iuncturarum cognoscuntur ex relatu ægri & impedimento operationis iuncturæ dolentis. Et quod sit à mala complexione sine materia cognoscitur, quia non est grauitas, neque tumor, neque calor mutatus à naturali, & in calida sentitur caliditas per ægrum aut tangentem, præcesserunt causæ calefacientes, iuuatur à frigidis, nocetur à calidis. Et ex oppositis cognoscitur causa frigida. Mala autem complexio sicca cognoscitur ex asperitate & arefactione sensata per ægrum, & præcesserunt causæ exiccantes, iuuatur ab humidis nocetur à siccis. Et quælibet harum cognoscitur, quia secundum plurimum facile curantur. Quod autem dolor sit materialis, sicut est secundum plurimum cognoscitur ex grauitate sensata, & quia ut plurimum adest tumor, & color est mutatus à naturali, nisi iuncturæ sint profundæ, sicut iunctura humeri & ischiæ. Quod autem sit à materia calida præter grauitatem omnibus doloribus materialibus communē cognoscitur ex caliditate sensata, & rubedine, & ueloci augmento, & dolore pungituo, pulsatio, aut extensiuo magis quàm grauatiuo & ex consuetudine: qui dolores consue-

runt esse à materia calida, & ex augmento eorum tempore uacuitatis & sedatione post comestionem. Item ex inflatione & febre sequente dolorem, & quia magis affligitur in die, & ex urina & egestionibus attestantibus humiditatibus calidis aut frigidis. Item ex reliquis consignantibus sicut ex complexione calida, ætate, regimine præcedente, tempore, arte, & similibus attestantibus caliditati. Et inter alia, quia iuuatur à frigidis, & nocetur à calidis. Et ex signis contrariis cognoscitur materia frigida. Hoc tamen signum sumptum ex iuuantibus & nocentibus, quandoque facit errare, qui error prouenit, tam ex parte doloris, quàm ex parte medicinæ applicitæ. Ex parte quidem doloris, quia dolor aliquando inflammat & non resoluit. In primo casu medicina frigida applicita iuuabit in pendente à materia calida & frigida sedando inflammationem & calida nocebit. In secundo casu, e contra calida iuuabit resoluendo materiam per cuius resolutionem maxime sedatur dolor & frigida nocebit prohibendo resolutionem. Sed ex parte medicinæ applicitæ potest esse error, aut merito proprietatis, aut merito complexionis. Primo, quia quantumcunque medicina deberet merito complexionis suæ contrariæ causæ doloris innare, tamen nocebit merito proprietatis. Inest enim apud Auicennam, unicuique corpori & membro, ut ab una medicina patiat, & non ab alia. Sed merito complexionis medicinæ, quia si est calida attrahendo materiā augebit dolorem etiam pendentem à materia frigida, uel resoluendo minuit dolorem etiam pendentem à materia calida. Si uero frigida aut stupefacit & sic minuit dolorem etiam si ex causa frigida accidat, aut claudendo poros retinet materiam maxime si stiptica fuerit, & sic dolorem augeat etiam in materia calida, & hoc modo causa calida existimabitur frigida, & frigida calida. Sed pro euitando hunc errorem duo attendenda sunt. Primum est, ut attendatur effectus sequens primā impressionem medicinæ & proprie agentis per qualitatem actuale, si enim calida sit & proprie actualiter & iuuat primo occurfu notabili inuamento, dolor pendet à causa frigida, & e contra. Secundo obseruare oportet reliqua signa scripta, & ipsa cum hoc signo conferre, & omnibus æquilibratis uidere, quæ sint pauciora, & indicia huiusmodi exigunt medicum prudentem & exercitatum. Quod si causa fuerit phlegmatica, dolor erit paruus, grauius, locus albus, tumor magnus & mollis tactui, frigidus absque pulsatione & punctione. Si uero fuerit cholericus e contra se habebit, licet tumor in ea quandoque sit maior atque grauedo, eo quod de materia plurimum effunditur ad iuncturam uice una, & modico tempore propter subtilitatem & caliditatem materiæ & rubedo loci magis clara cum pauca tensione, & albescit locus per compressionem. Si uero fuerit sanguinea, color erit rubeus tendens in opacum qui non albescit per compressionem, & dolor erit pulsatiuus & caliditas sensata. Si uero fuerit melancholica, dolor erit minor & profundus, & tumor cum duritie & luiditate. Si uero fuerit uentosa, tensio erit absque grauedine, & dolor quandoque mutabitur & iuuabitur compressione, & si mixta fuerit, quod est secundum plurimum signa erunt confusa, & est de illis quæ non iuuantur à calidis neque frig. & interdum iuuatur calidis & interdum frigidis. Et pro horum notitia considera complexionem, habitudinem, regimen præcedens & reliqua consignantia. Et si fuerit materia paulatim aggregata, dolor erit minor. Nam incipit & paulatim augetur. Si uero subito infusa dolor erit maior & repentinus, & hoc secundum plurimum arguit latitudinem uiarum, & subtilitatem materiæ maxime cum multitudine. Et si materia à toto sit infusa dolor erit pluribus membris communis, & erit arctica secundum plurimum. Si uero cerebro, passio ipsarum procedens hoc indicabit ut catharrus & materia secundum plurimum frigida phlegmatica, licet aliquando calida si in ea sit falsedo quæ aliquando per gustum percipitur & incidit à spondilibus colli & procedit per collum ad humeros & ad iuncturas pedum. Si uero ab hepate, eius præcessit ægritudo cum signis repletionis ipsius & uenarum & materia est calida secundum plurimum. Similiter si fuerit à stomacho & intestinis & reliquis membris, passio ipsorum præcedens hoc indicabit & materia effusa naturæ membrorum mittentium proportionalis.

tionalis. Fortitudo membrorum mittitur cognoscitur ex ipsorum bonis operationibus, bona complexionem, & compositionem, & ipsorum alleviationem cum transmittunt superflua, & ex contrariis ipsorum debilitas cognoscitur. Debilitas vero iuncturarum recipiunt, si naturalis est cognoscitur ex mala figura & reliquis speciebus malae compositionis quae sequitur ipsam malam complexionem. Et ex parte parentum, quia similiter passi fuerunt. Si vero accidentalis cognoscitur ex casu, percussione aut alia aegritudine quae praecelsit. Multitudo materiae aut malitia cognoscitur ex signis repletionis aut cacochymiae perquirenda secunda primi. Latitudo uiarum cognoscitur ex amplitudine uenarum crassitie & ipsarum inflatione si manifesta sunt. Si vero ocula, ex frequentu ipsarum iuncturarum passione. Causae primitivae seipsas ostendunt. Tempora dolorum iuncturarum si ab una pendeant materia non habet novae effusiones facile cognoscuntur. Si vero materiae sunt diversae novae recipientes effusiones confunduntur neque ipsorum potest esse certa cognitio. Dolores iuncturarum, si per resolutionem terminentur dolor paulatim decrescendo procedit, neque remanet durities aut callositas in iuncturis, neque impedimentum in operationibus. Oppositum vero contingit si terminentur ad duritiem. Maturatio vero significatur ex multitudine humorum quibus sanguis est admixtus, & ex augmento febris & doloris perseverantis cum duritie tensa prolongata, & cremo omnium accidentium, quae sedantur perfecta maturatione, & locus apparet mollis cum inundatione. Cumque redeunt dolores & punctiones, apostema uult erumpi. Si vero permittetur cognoscitur ex sedatione doloris iuncturae, & ex nocumento membri ad quod permittitur, non tamen decrevit febris & inquietudo nisi permittetur ad membra ignobilia &c.

Prognostica. Primum Avicennae. Multoties inuiscantur materiae inter iuncturas & sicut sicut gypsum & proprie quae cruda sunt. Secundum. Et multoties oritur super iuncturas eorum caro, & proprie inter digitos, quia torquentur digiti, & fit dolor fortis quandoque, licet quandoque sedetur & sunt haec in habentibus complexiones calidas & secundum plurimum non oritur caro dicta, nisi cum materia est sanguinea, quae est materia illius carnis. Reliqui enim humores, non sunt apti in sanguinem converti. Et in his duobus casibus non est spes curae, sicut nec quando iuncturae indurantur ut flecti non possint, non quidem propter multitudinem humoris extendentis, sed propter exiccationem ipsarum aut putrefactionem materiae iuxta illud Ouid.

Solvere nodosam nescit medicina podagram.

Tertium. Qui incurrunt dolores iuncturarum secundum plurimum incipiunt a podagra pollicis pedis. Quartum. Dolor iuncturarum est morbus hereditarius. Quintum. Curatio dolorum iuncturarum quandoque ducit ad perniciem & proprie cum antiqui sunt, quoniam materia solita fluere ad iuncturas convertitur ad membra nobilia. Sextum. Si succurritur doloribus iuncturarum, in primis cum apparent est cura facilis quod si confirmetur & consensescat & proprie illi qui generati sunt ex humoribus diversis non recipiunt curationem. Septimum. Quando apparent uarices in doloribus, & podagra, est eorum sanatio per eas. Octavum. Dolores iuncturarum aliquando commovent febres, aliquando sequuntur eas. Nonum. Arterica cum curatur secundum plurimum non redit, oppositum est de aliis doloribus iuncturarum. Nam licet curentur redeunt & proprie podagrae. Decimum. Dolores iuncturarum quandoque ducunt ad mortem, & proprie cum antiquantur & sunt continui, quoniam excitant febres continuas ex quibus simul cum doloribus corpus exiccatur, & tabescit. Undecimum. Habentibus dolores iuncturarum prolongantur oschea testiculorum. Duodecimum. Podagra cholerica quandoque attrahit mortem subitam, & proprie apud regem plurimum, id est, sollicitudinem in repercutiendo & infrigidando propter conversionem materiae ad membra nobilia. Decimumtertium. Tabescit membrum illud in cuius iunctura dolor multum prolongatur & proprie quando dislocatur, tum propter prohibitionem a motu, secundo quia debilitatur ex dolore, tertio quia mucilagines obtu-

dunt calorem, & quarto propter dolorem & dislocationem clauditur uia transitus nutrimenti ad membra &c.

Quoniam in iuncturis fuerit dolor, & apostema: & locus, cum tangitur, fuerit tactu calidus, & color rubeus; aeger, si dolet in dextro pede, ex dextra manu: & in sinistro ex sinistra est phlebotomandus. & locus ex hoc medicamine est leniendus. epithema. Recipe. ros. rub. sandali, faufel, sief memithe, boli armeni, opij omnium partes aequales. ex istis in aqua, & aeto dissolutis fiat epithema. psillum quoque aceto infusum in carta missum de panno superponatur: & cum tepuerit, mutetur. & loco eius aliud superponatur. venter praeterea ex apozemate mirobolanorum, & hermodactili. solvatur. apozema mirobolanorum cum hermodactili. Recipe, mirobolanorum citrinorum drach. 15. pulueris turbith fricati, polypodij amborum ana, drach. 3. fenae, seminis fumiterre drach. 3. hermodactyli albi, seminis endiviae, sem. apij rom. omnium ana drach. 2. coquantur in tres libras aquae, donec ad unam redeant: deinde manibus fricentur, & colentur, & bibantur cum sacchari taberget drach. 10. si quis autem apozema fastidiuerit; pilulas istasumat, quae in lecto iacentes surgere, & incedere faciunt, & pedibus ambulare. Pilulae, quae non valentes incedere, faciunt surgere. recipe aloes drach. 1. scammoniae quartam scrupuli. 1. rosarum rub. tritarum sextam drachmae unius, hermodactili albi. drac. semis informetur ex eis pilulae, quae erunt dosi. 1. aeger uero nutriatur ex cibis frigidis, & stipticis: & abstineat a uino, & confectiionibus, quae ex melle sunt, & carne. cum autem apostematis calor quieverit, & eius inflammatio; ex his, quae calidorum apostematum resolvunt, reliquias curetur. quorum unum, recipe ceram in oleo de lilio resolutam: cui admisceatur mucilago sanuigraci & sem. lini. deinde terantur simul, donec uniantur, & fiant ex eis epithema.

Hoc capitulum Rasis intitulum de podagra arterica & sciatica diuiditur in duas partes. In prima ponit curam artericam & podagrae. In secunda curat sciaticam. secunda ibi. Dolor uero qui. Prima in duas, nam in prima curat artericam calidam, in secunda frigidam, secunda ibi. Cum autem cum dolore. Prima iterum in duas. Nam in prima docet curare artericam calidam. In secunda docet ab ipsa praeseruare. secunda ibi. In tempore autem. Prima iterum in sex. Nam in prima ponit signa artericae. In secunda curat per phlebotomiam. In tertia curat per repercussiuam & doloris sedatiuam. In quarta per resolutiuam. In quinta per dietam. In sexta ponit localia conuenientia post sedationem doloris & inflammationis siue conuenientia a medio status ultra. secunda ibi. Aeger si in dextro. tertia ibi. Et locus ex hoc. quarta ibi. Venter uero. quinta ibi. Aeger uero nutriatur. sexta ibi. Cum autem apostematis calor. Quae dicit in omnibus his partibus nota sunt & ex dictis & dicendis notificabuntur magis. Faufel, id est auellana inda frigida & sicca. Sief memithe sunt ex succo memithe inspissato, est autem memithe herba frigida naturae dicta glaucium apud Dioscoridem. Circa quartam partem nota illius decoctionis esse dosim magnam & non conuenire hominibus temporis nostri. Est etiam ratione suae quantitatis multum abhominabilis, sufficeret enim medietas, scilicet sex unc. Secunda notat ut patet ex simplicibus ipsam conuenire in gutta mixta. Similiter pilularum quas secundo describit sufficeret medietas aut duae tertiae. Reliqua nota sunt.

S C H O L I O N

Est phlebotomandus si sanguineus quidem humor multus fuerit; qui plenitudinem efficit, & tumorem ingentem non uenarum modo; sed totius partis male affectae circa cutem, cumque tubentem. quod, si ob bilium defluxum dolores excitantur; tunc is communis scopus humoris affligentis est euacuatio, quae tum per uomitum, tum per ventrem fieri debet, notae biliosae sunt color cutis sufflaues. interdum rubor cum flauo permiscetur colore, item caloris sensus, doloris; lancinantis modo acris.

In tempore

In tempore autem sue incolumitatis, & proprie circa tēpus, in quo eum aegritudo inuadere consuevit, & quā maxime in uere, assuescat phlebotomia uti, & uentris solutione, & ex his quæ cholera expellunt rub. & à potu uini abstineat, & à comestione eorum, quæ ex melle conficiuntur, & à carne. & sint eius cibaria acet. & stiptica, et his similia ex eis, quæ in frigidant. membra autem, quæ hanc consueuerunt incurrere passionem, minus solito laborem pati assuescāt, & præcipue cum tempus inuasionis timetur, & cum corpus fuerit plenum, & uenæ plenæ: & fuerit diu, ex quo neque minus, neque solutus fuerit.

Hic docet præseruare à gutta calida. Et quæ dicit sunt nota. Et nota acetosa sibi cōuenire sicut acetositas citri, citran guli, acreta & similia præter acetum, est. n. maxime neruis & iuncturis inimicum.

Cum autem cum dolore iuncturarum, neque dolor, neque rubor in colore fuerit: fueritque aeger frigida complexionis, & locus tactu sentitur frigidus; in principio curationis eius pilulæ maiores de hermodactylis dandæ sunt, quæ recipi. hermodactylos, satyrion. mezacchara omnium ana drachmas quinque, hierapicra drachmas decem, colocynthis, centaureæ minoris amborum ana drachmas quinque, euphorbij drachmas duas, turbiti drach. 10. setaragi indi, zingiber, sinapi, piperis, castorei, omnium ana drach. 1. informantur ex eis pilulæ, ex quibus d. 2. 3. & s. ad tres sumantur: hæc nam quæ pilulæ ualde conferunt; quia non ualentes surgere incedere faciunt. epithema ad podagram frigidam. recipe castorei, styracis liquida, euphorbij, mirrhe, aloes, acatie omnium partes æquales ex his omnibus uino ueteri admixtis fiat epithema. cum itaque dolor quieuerit; succuratur patienti ex distillatione multæ aque calidæ ab alto: & inunctio fiat ex oleo de lilio: & emplastrum de bdellio molli, & styrace, ac semine greco, & seminis lini, & ammoniaco superponatur, quod hoc modo conficiatur. ammoniacum, & bdellium in uino ueteri resoluantur: & alia omnia eis admisceantur, quibus fiat emplastrum, & superponatur. hæc nanque aegritudinis est species, quæ in lapidis duritiem transit: & reddit mēbra, & iuncturas fungis similia. quapropter hanc habens passionem à fastidio, & ab aqua frigida, & à cibis crassis abstineat, & à frequenti ebrietate custodiatur. ei; præcipiendum, ut diu sanus est, motu utatur, & à coitu abstineat, præcipue cum satur fuerit: neque balneum ingrediatur: neque exercitetur post comestionem. Vinum præterea uetus, & purum bibat. eis quoque, dum sanus est, utatur, quæ urinam prouocare consueuerunt.

In hac parte curat dolorem iuncturarum frigidum. Et habet duas partes. In prima ponit regimen curatiuum. In secunda regimen præseruatiuum, secunda ibi. Ei; dum est sanus. Prima pars posset diuidi in quinque partes, secundum quod quinque intendit, primo ponit signa doloris iuncturarum, frigidi, secundo describit pilulas solutiuas, tertio describit quædam applicanda exterius, quarto ponit quoddam accidens, ad quod perueniunt patientes dolorem frigidum, quinto ponit dietam conuenientem. Quæ dicit in his partibus satis nota sunt. Et quamuis dicat in principio curationis dandas esse pilulas de hermodactylis intelligendum est præcedente digestionem ut declarabit inferius. Et quia in pilulis ponitur satyrion, est sciendum quatuor esse species satyrionis. Vna geminas habens radices ut testiculos una semper pinguior est altera. Sed secunda singularem tantum habet radicem similem prædictis, nisi quia crassior est. Tertia unam radicem habet similem modo dicto super qua ueluti filum oritur, cui radícula alia parua suspenditur subterque crassiore dictam in terra moratur, quarta uero species cui ob similitudinem manuum duarum nomen à modernis datum est, palma Christi dicta est, cuius interdum folia maculis uiolaceis notata apparent. Orchis etiam uidetur esse species satyrionis maxi-

me quæ cynorchis dicitur, cuius expositio est canis testiculus. Omnes species satyrionis calidæ sunt cum multo humido uentosabili, propterea excitant coitum. Radices enim eorum confectæ cum melle mirabiliter ualent ad coitum, & ualde profunt arteticis præcipue succus eorum cum melle exhibitus mechezera, id est, senæ, sataragi indi, id est, capsa. Emplastrum ultimum sic describitur. Recipe ammoniaci, bdellii, ana, quantum uis, dissoluantur cum uino ueteri, & cum mollificata fuerint secum misceantur styracis, farinæ foenugræci, semen lini, ana quantum sufficit ad inspissandum. In quarta parte dicit, quod hæc aegritudo reddit membra & iuncturas fungis similes, apparent enim in iuncturis tumores quidam pleni phlegmate gypseo. Cætera quæ dicit nota sunt, & magis notificabuntur ex dicendis.

SCHOLION

Si pituitosa sit fluxio, ad digitorum impressionem causis sit tumor, subla xus, & moderatus. color membri mali affecti est candidus. atas hoc modo magis afficitur similis, temperamentum humidum, & frigidum ia consimili æris statu, & tempore hyberno. urina tenuis est, & aquosa: præcedit, & uictus ratio, quæ pituitosum humorem progignit. si autem falsa fuerit pituita, pruritus maximus, & mordacitas partes ægras infestat. si ex atra bile fuerit fluxus: quod raro contingit, color tumoris nigrior est. ætas est uigor ia clinatio, temperamentum frigidum, & siccum, tempus autumnii, regio frigida, & sicca, æris consimilis status, uictusq; atram bilem gignens.

Dolor uero, qui ischiaticus uocatur, est, qui ab ancha per coxam totam usque ad genu in longitudine protenditur: quæ doque etiam in longitudine ad uirga similitudinem exiens per crus usque ad pedes descendit. & tunc, si in complexionem dominatus fuerit calor, & in urina tintura; ex basilica manus eiusdem partis prius minutio facienda est, deinde ex ischiatica. si autem ægri complexionis frigida fuerit, & color fuscus, sæpe prouocandus est uomitus ex apozemate raphani cum syr. acetoso. coxa quoque, ac pedes, & crus ex oleo, in quo castoreum, & euphorbium, & styrax sint resoluta, inungatur assidue. quod, si dolor in coxa mansiuus fiat, æger ex al muri, & nabati, & baurach clysterizetur: & ex enemate acuto quod in cap. de apoplexia nominauimus. collyriū quoque ex cyclamine, et colocynthide factum supponatur, quod usque fieri conuenit, donec æger excoriationem incurrat, ex ea enim, dum accidit plurimum, consequitur sanitas. si autem passio inueterauerit sinapi sumatur, & cum fimo columbino eiusdem quantitatis teratur: & ex apozemate siccum conficiatur: ex quibus coxæ emplastrum superponatur, quod tam diu dimittatur, donec in loco uesica plena aqua fiat, & scindantur. & cum fluat aqua, quæ in eis est, euaporetur locus cum aqua calida. deinde æger per aliquot dies quiescere dimittatur. & si nondū sanitati restitutus fuerit; ad hæc eandem curam redendum est. quod, si aegritudo ualde mansua fuerit, & longi temporis, & timetur, ne uertebra resiliat, aut egressum fuerit: locus ex instrumento, quod rote assimilatur, cauterizandus est: & intendatur cum coctura, ut super caput anchæ, aut coxæ principium ponatur. huius tamē rei sermocinatio istius nostri operis metas transcendit. taliter præterea patientes tempore sospitatis uomere consueverint, & solvere uentrem, & regimen subtiliare, & à cibis crassis, & frequenti ebrietate abstinere.

SCHOLION

Antecedit autem, & quasi auspiciatur hoc uicium aliquando uiciorum musculorum dolor, & maxime lumborum. aliquando uero ab ipsa coxa initium fit. contingit etiam, ut coxæ dolore sublatō circa poplitem solum affligio hæreat. aliis autem iuxta talum: quibusdam uero totum eius æqualiter dolore afficitur. multis quoque dolor figuratur circa inguina urinae difficultatem inducens: & tūc maxime totum crus à coxendicibus usque ad calcaneum dolorem perfert.

In hac parte agens de dolore ischiatico, primo ponit regimen curatiuum, secundo præseruatiuum. secunda ibi. Patientis in tempore sanitatis. Prima in duas. In prima curat dolorem sciaticum in parte aut totaliter pendente à sang. In secunda parte curat ipsum à phlegmate, & humoribus frigidis pendente, secunda ibi. Si autem æger.

Quæ

cundum

cundum plurimum, phlebotometur basilicæ ambæ, si in ambobus pedibus accidere consuevit, aut si tantum in uno basilicæ eiusdem lateris, & proprie si hepar aut splen miserit materiam. Quod si cerebrum mitteret materiam præstantius esset phlebotomare commune, ut simul deferuisset membrum mittenti & recipienti. Quod si accidere consuevit in ambobus manibus phlebotometur utraq; saphena, & si in una manu tantum phlebotometur saphena eiusdem lateris aut basilicæ lateris contrarii, & si mittens esset cerebrum, communis manus contrariæ, & multo plus debemus esse audaciores, et promptiores ad phlebotomandum in regimine præseruatiuo quam curatiuo. Si uero alii humores fuerint in causa absque peccato sanguinis, aut sanguine multum subdominante euacuentur secundum ipsorum exigentiam. Cholera quidē cum cassia tracta, cum decoctione mirabolanorum citrinorum, prunorum & tamarindorum. Cum qua si uenter fuerit stipticus misceatur drach. i. aut quantum tibi uidetur electarii suc. rosæ, aut exhibeatur solum electarium succi rosarum à drach. 2. usque ad 3. cum decoctione suprascripta. Quod si maluerit pilulas, exhibeantur pilulæ de hermodactylis minores circa drach. i. Præstantius tamen est ut solutiuis exoluetibus prætermittantur digestiua. Propterea ante digestionē sufficeret aloes loti, dra. s. mirabolanorum, citrinorum. 3. i. pilularum minorum de hermodactylis. 3. s. cum aqua endiuiz, aut succo rosarum, formetur pilulæ. 7. Si uero in causa fuerit phlegma, exhibeantur pilulæ de hermodactylis maiores circa drach. i. aut. 4. & si maluerit medicinam liquidā, exhibeatur electarium indum, circa drach. 4. præcedentibus tamen debitis digestionibus secundum materiæ exigentiā, & membrorum tamen mittentium quā recipiētium. euacuantur quoque huiusmodi materiæ proprie phlegmaticæ cū diureticis & prouocantibus sudorem. Electarium boni saporis soluens phlegma ex iuncturis. B. hermodactylorum. dra. i. mirabo. citrino. zing. ana. 3. i. miuæ citoniorum, quantum suffi. fiat electarium. est dosi una. Si autem uolueris soluere phlegma & colicam, his adde diagridii. gran. i. 2. est pro duabus uicibus. Si autem opus sit soluere phlegma, cholera & melancholiam, his adde, feneg. polypodii. ana. 3. 2. & sunt tres doses, & adde suprascriptis. 3. s. zing. & erit conueniens in præseruando & curando, bonum tamen est ut pro conseruatione fiant huiusmodi euacuationes integratæ ex suis digestiuis, solutiuis sū exigentiā materiæ. Tertia intentio. i. membrorum rectificatio completur ut infra. Membra namq; mittentia debent regi primo euacuando ab eis superflua, propterea euacuationes de quibus supra debent respicere tam membra mittentia quam recipientia.

Secundo debent eorum discrasia corrigi cum interius & exterius applicitis secundum exigentiam. Et tertio uirtutes eorum roborari cum propriis moderate stipticis. Verum hæ duæ ultimæ intentiones cum eisdem perficiendæ sunt quæ si mul alterant membrorum discrasiam & confortant. Membra autem recipientia confortant cum exterius applicitis ex quibus sunt thermæ aluminosæ, & si fuerint simul aluminosæ, ferreæ, salsæ, multum proderunt. Secundum est lotio eorum cum aqua salsa neque frigida, neque multum calida. Tertium est calcare uuas & proprie nigras aut in ipsis calcatis, dum bulliunt, frequenter tenere pedes. Quartum flores amygdalarum, mirti, camæmillæ, meliloti. rosæ, & proprie eorum decoctio confortat iuncturas. Et si fuerit paratus ad guttas frigidas ponatur cum eis aliquid salis aut aluminis, aut utriusque. Ex sumptis est salua parum cocta, item nux indicæ, item acorus, item edera terrestres: & dicitur quoddam uerbena portata præseruat iuncturas pedum à doloribus. Secundum regimen, scilicet curatiuum tripartitur. Primum debetur causæ antecedenti. Secundum causæ coniunctæ. Tertium est commune utrique curans accidentia & ordinans debetum regimen secundum exigentiam intentionum præcedentium. Primum regimen habet tres intentiones. Prima est euacuatio. Secunda diuersio. Tertia fluxus interceptio. Prima autem intentio scilicet euacuatio complerur cū phlebotomia à qua inchoandū est, si solus sanguis fuerit in causa, aut alii humores peccent cum sanguine dominante. Deinde tertio si æque proportionabiliter creuerint quæ phlebotomia fiat ex parte contraria, sicut dictum fuit in regimine præ-

seruatiuo ad quod recurre. Si uero alii humores peccent cū sanguine subdominante, fiat primo humorum dominantium euacuatio. Deinde se data agitatione & fluxu fiat phlebotomia ex parte contraria per unam diametrum, hauriendo tamen minus ex sanguine quam in casibus præcedentibus. Et hanc credo fuisse opinionem Auic. qui in phlebotomia uideatur ambiguus, si uero alii humores peccauerint absque sanguine soli euacuentur. Sed est notandum quod si naucauerit, uomitus à principio potest concedi cum facilibus, solutio autem uentris minime, nisi cum clysteribus lenitiuis. Timor enim est in administratione lenitiuorum solutiuum ne materiam quæ iam sunt in motu ad iuncturas commotæ à medicina soluente amplius præcipitentur ad iuncturas, & proprie ad iuncturas pedum. Propterea præmittantur digestiua secundum exigentiam materiæ sicut materia existente phlegmatica mel. ros. cum aqua saluiz aut hydromel cum salua bullitum. Et materia existente cholerica, iulep ros. cum aqua endiuiz, & in melancholia syrup. de epithymo, cum aqua buglossæ immixta, hæc misceantur secundum exigentiam, postea materiam digestam euacuentur cum solutiuis superius descriptis in regimine præseruatiuo. Diuertatur autem materia iuxta secundam intentionem huius primi regiminis curatiui cum clysteribus, in quibus hierapicra, benedicta, electarium indum, electarium de succo rosæ, diafenæ, confectio hamech & similia item diuertatur materia cū uomitiuis, & proprie in consuetis, & facile uomentibus. Eligantur autem uomitiua ex superius descriptis in egritudinibus stomachi, & de his statim dicetur in cura ischiaticæ. Leue uomitiui est aqua tepida decoctionis raphani & seminis anethi un. 4. olei acuti odoris & gustus, unc. 2. aceti unc. 1. & tertio diuertatur cum prouocantibus urinam & sudorem. Sed hæc non fiant nisi materia notabiliter minorata. Leue prouocantium urinæ, est aqua decoctionis alparagis, cicerum rubeorum & similia. Sudorem autem prouocant potus aquæ calidæ, cum paucis uino subtili & cooptura sufficienti. Recentio etiam anhelitus & balneum aerium. Intercepitur autem fluxus materiæ iuxta tertiam intentionem huius primi regiminis dupliciter. Primo, cum repercussus applicitis non solum in loco dolente, sed etiam supra cū debita ligatura, quæ tamen non sit multum stricta, sed sit tantæ stricturæ ut confortet & repercutiat, & propterea sit magis stricta in iunctura, ita tamen ut dolorem non inferat, & quanto magis recedat iunctura uersus superius magis relaxetur. Repercussus in materia calida leuia sunt oleum rosarum omphacium, id est, factum ex oliuis immaturis, & ros. immaturis, item oleum ros. bullitum cum quarta parte aceti ad aceti consumptionē. Et fortius est absque consumptione aceti bene cū eo incorporati. Et fortius est ut cum aquis aut succis endiuiz, plantaginis, solatri rosarum & similibus misceatur quarta pars aceti, & modicum sandalorum. Aut fiat defensiuum in forma comuni ex oleo rosarum, aceto, & bolo armeno. Quod si nuxilago psillii, albumen oui oleum rosarum lotum cum aqua plantaginis, & aliquid sandalorum adinuicem misceantur erit efficax in materia cholerica. Item sandali rubei boli armen. sief memithæ, psidæ, ferruginis, opii, ana, confice cū aqua rosarum, aut succo coriandri pauco aceti. & repercutiendo sedant dolorem. Et in forma emplastrum est huiusmodi. Recipe rosarum. 3. i. farinæ hordei. 3. i. s. farinæ fabarum, unc. 3. misceantur cum olei ros. partibus tribus, & acceti parte una. Sed in materia frigida Re. olei de spica. 2. bulliat cum unc. 2. decoctionis gallarum ad eius consumptionē postea misceatur cum eo styracis, myrrhæ, aloes, acatiæ, ana drach. i. ceræ modicum, acetum quantum sufficit fiat unctio mollis. Et tu utere ex his quæ tuo proposito magis deferuiuit. Hæc tamen simul complent hanc intentionem & primam secundi regiminis curatiui. Memorandum tamen quod aliquæ sunt iuncturæ in quibus leuia aut nulla comperunt reperculsiua sicut iuncturæ humeri iuncturæ mādibulæ & spōdiliū ne materia reparat ad principalia membra aut nobilia quibus appropinquat. & iunctura anchæ ne materia in profundo retineat. in reliquis audacius possumus repercutere. Intercepitur secundo materia cum uescicatoriis & causticis. Pro quo est sciendum, quod uescicatoria & caustica aliquando ponuntur ratione materiæ fluentis ad interceptiōdū eius fluxus.

fluxum, aliquando ratione materiæ iam fluxæ ad eradicandum ipsam ex iunctura. Si primo modo, debet fieri supra iuncturam maxime in ea parte per quam materia fluit ad iuncturam. Si uero fiat ratione materiæ iam fluxæ, & in iunctura collecta fiat infra iuncturam aut supra iuncturam, exēpli gratia in dolore humeri ratione materiæ fluentis si materia à cerebro communicetur, aut hepate & membris inferioribus per uenam spatularum, cuius signū est præter alia signa, quia dolor incipit, & est magis in parte superiori humeri, nescitur, aut cauterizetur locus qui uidetur magis conueniens in spacula distante ab humero per tres unc. & eligatur maxime locus per quem creditur transire materia. Si uero materia communicetur humero per uenam affellarem, quod raro accidit, cauterizetur in parte syluestri prope affellam distante à iunctura per unc. 3. Sed ratione materiæ iam fluxæ fiat in adiutorio distante à iunctura per tres unc. aut circa. Si uero adesset dislocatio propter humiditatem lubricantem, reducta prius iunctura ad statum suum modo possibili, fiat cauterizatio cum instrumento triangulato, cuius hæc est figura, in iunctura humeri penetrando solum cutim. Si uero fiat cauterizatio, aut uesticatio ratione materiæ fluentis & fluxæ, fiat in utrisque locis, & eodem modo in cæteris iuncturis. Similiter fiat in dolore cubiti ratione materiæ fluentis in parte superiori & ratione materiæ fluxæ in parte inferiori. Eodem modo in dolore rasæ. Et in omnibus his sola cutis penetranda est, cauendo ne læsio nerui aut chordis commu-nictur, propterea tutius est cauterium actuale aut uesticatio. Si uero dolor sit in iunctura mandibulæ fiat post aurem eiusdem lateris ratione materiæ fluentis aut sub mæto ratione materiæ fluxæ. Si uero in iuncturis colli ratione fluentis, fiat in occipite, sed ratione fluxæ in principio dorsi & sine colli distanter à spondilibus utraq; per 2. unc. Similiter fiat in reliquis doloribus dorsi & lumborum. Sed in dolore ischiatico tam ratione materiæ fluentis quam fluxæ, fiat uesticatio & cauterizatio super iunctura in parte syluestri cum cauterio triangulato aut circulari penetrando rotam cutim, materia enim fluit ad hanc iuncturam per uenas intrinsecas ramificatas à uena chyli ne propter carnositatem multum est dubium de nocumento neruorum aut cordarum. Sed in dolore genu ratione materiæ fluentis cauterizetur super genu alterius partis quam per. 3. unc. ut uideatur cauterizatio super extremitatibus lacertorum. Sed ratione materiæ fluxæ fiat infra genu in fontanella distante à chordis & lacertis. Sed in dolore iuncturæ pedis fiat, supra pedem in parte syluestri aut domestica ubi apparet magnus dolor. Sed secundum plurimum in parte syluestri ratione materiæ fluentis, sed ratione fluxæ sub clauicula pedis. In dolore uero digitorum pedis fiat cauterizatio aut uesticatio in collo pedis. Forma autem cauteriorum tales sunt, in iunctura humeri eligatur cauterium oliuale siue fiat ratione materiæ fluentis siue fluxæ, & fiat in ea parte quæ superius memorata est. Et quandoque ratione materiæ fluentis facimus supra iuncturam in duobus locis, si materia fluat per duas uias superscriptas. Similiter ratione fluxæ facimus infra iuncturam in duobus locis, scilicet parte domestica & syluestri, cum est difficilis eradicatio. Si uero adsit dislocatio propter humiditatem lubricantem, eligatur triangulatum oliuale, & ponatur super iunctura in parte syluestri sicut dictum fuit, similiter in cubito eligatur oliuale, & fiat ut dictum est ratione materiæ fluentis super iuncturam per tres unc. sed ratione fluxæ, parum infra iuncturam, & apud quosdam ratione materiæ fluentis fiat supra iuncturam in duobus locis, scilicet in parte domestica & syluestri, quando materia fluit per utranque partem. Similiter ratione fluxæ fiat parua infra iuncturam in duobus locis, quando materia est difficilis eradicatio nis. Sed in iunctura manus, eligatur cauterium punctuale secundum Albuchasim, & fiat in iunctura manus in quatuor locis. Sed si uolueris solum facere in uno loco aut duobus supra iuncturam ratione fluentis, aut parum infra in uno aut in duobus ratione fluxæ eligatur oliuale, sed in dolore digitorum eligatur punctuale, in parte pectinis correspondente digito illi, aut in rasæ ratione fluentis si fuerit in pollice, sed ratione fluxæ parum infra iuncturam, in dolore mandibulæ eligatur oliuale, & fiat ratione fluentis & fluxæ, sicut

dictum fuit superius, licet forte ratione fluxæ melius esse facere infra iuncturam. In dolore spondilium eligatur oliuale, & fiat ut dictum est licet apud Albuchasim debeat eligi punctuale, & debent fieri tres lineæ secundum latum, ubi est dolor, & in qualibet linea facere quinque cauteria aut plura secundum magnitudinem doloris & toleratiam uirtutis, sed prius signetur lineæ & puncta ubi debent fieri. In iunctura anchæ utantur triplici cauterio, unum est habens figuram sphericam, cuius diameter est medietas palmi, & nō habet alias eminentias: secundum est simile huic, & habet quinque eminentias oliuales, aut ad modum ossium dactylorum: tertium habet solum tres, & homine iacente super latere opposito taliter, ut bene appareat acumen anchæ cauterizetur, & per medietatem palmi intelligo medietatem palmæ manus. Et apud quosdam sunt quatuor cauteria, tria in lateribus æque distantia, tria secundum formam trianguli, quartum in medio. Quidam autem cauterizant in ischiatica non solum ancham, sed etiam loca distantia ad quæ descendit dolor. Credo solum cauterizationem anchæ sufficere cum ibi sit doloris radix. In dolore genu eligatur oliuale, & fiat, ut dictum est superius, neque laudo quod super iunctura genu ponatur, nisi ualde superficialiter, & fiat quando materia nō posset aliter eradicari in pluribus locis secundum exigentiam, sed in iunctura pedis eligatur oliuale & fiat ut dictum est, sed in iunctura digitorum pedis fiat, ut dictum est in digitis manus.

Canones obseruandi in cauterizatione sunt. Primus, non fiat nisi cum alia remedia non contulerint, propter debitatem iuncturæ, latitudinem uiarum aut continuum fluxum materiæ, aut multam materiam existentem in iunctura. Secundus, ut fiat potius cum cauterio actuali quam potenciali, quia magis confortat nec communicat nocuentibus uicinis. Tertius, ut eligantur cauteria idonea & diuersa secundum exigentiam locorum. Quartus, non penetret ultra cutim. Quintus, ut tempore cauterizationis tueantur partes circumstantes cum succis & aquis frigidis, & similibus. Sextus, ut eligatur iuxta posse tempus & hora temperatio non superflue calida aut frigida. Septimus, ut infirmus tempore operationis statuatur & quiescat in situ magis conueniente. Octauus, quod præcedat loci stupefactio in ualde sensitiuis. Nonus, ut locus conferuetur ulceratus per longum tempus, puta per quadraginta dies aut cum sphaera cerea immissa in uulnere, aut simili, aut cum folio hederæ, aut folio caulis ad ignem aliquantulum calefacto, & postea axungia inuncto, aut cum cape trito cum melle. Decimus, ut clauso foramine postea per interualla fiant euacuationes & phlebotomix secundum materiæ exigentiam, ne materia solita fluere ad iuncturas, postea retēta in membris superioribus nobilibus faciat apostema aut febres, & erit nouissimus error peior priore. Vndecimus, ut fiat in causa frigida aut mixta, non autem in calida. Duodecimus, non fiat cauterium cum materia est indurata, aut gypseata in iunctura, nec quando est exiccata & marasmata, sed fiat quando adest multitudo materiæ, aut mollities ligamentorum. Decimus tertius, prius signetur locus, postea cauterium supponatur. Secundum regimen curatiuum, quod debetur causæ coniunctæ exigit in principio repercussiuā, in augmento usque ad medium status repercussiuā mixta cum resolutione, sed deinceps resolutiuā pura. Quæ autem sint repercussiuæ conuenientia in principio possunt patere ex regimen præcedente. Sed resolutiuæ conuenientia in materia frigida sunt huiusmodi. Primum. R. stercoris bouini calidi, sicut egeritur & dolenti loco superponatur, & est melius pluribus aliis. Haliabbas autem addit cum isto de stercore caprino aliquid cineris caulium ad maiorem resolutionem, & cōsulit ante emplastrationem lauare locum cum aqua decoctionis chamæmil. meliloti, anethi, maioranæ, centaureæ, & similibus. Aliud Recipe amoniaci, bdellii, styracis, anapartem unam farinæ foenugr. sem. lini, ana. partem mediam, dissoluatur ammoniacum, bdell. styrax, cum uino ueteri, & cum farinis misceatur incorporando cum oleo costino & fiat emplastrum. Aliud Rafis in Alman. in capitulo proprio ualens ad materiam multam frigidam & in corpore & tempore frigido. Recipe styrac. liquidæ castorei, euphorbii, myrrhæ, aloes, acatiz, ana. partes æquales. Ex his cum uino ueteri

Io. Arculani

h mixtis

mixtis fiat epithima. Aliud Dini. Rec. aloes unc. i. mirrhæ. unc. s. salis, drach. 2. croci, drach. 1. farinæ lupinorum, fursuris subtilis, ana. unc. 2. aquæ cineris quantum sufficit, fiat emplastrum. & in resolutione materiæ frigida valet aqua ardens, oleum benedictum, & similia. Sed cum crassa resoluitur cauendum est à petrificatione, propterea cum resolutionis miscenda sunt mollificantia sicut mucilagines maluaufci, fenugraci, sem. lini, oleum sesaminum, amygdala. dule. pinguedines, medullæ, & similia, quæ uidentur magis opportuna. Sed resolutionum in materia calida est huiusmodi. Recipe mucilaginis fenugraci, mucilaginis sem. lini, ana. unc. s. olei liliorum alborum, unc. 1. ceræ quantum sufficit, fiat unctio. Et ex his possunt elici conuenientia in augmento, oportet enim repercutiua misceri cum resolutionis. Si uero apostema iunctura se tenderet in uiam maturationis quod rarissime accidit, adiungetur cum his quæ consueuerunt reliqua apostemata maturare, & si apostema esset difficilis suppurationis aperiatur ante perfectam maturationem ne putrescant iuncturæ. Sed in materia mixta ad resolueudum. Recipe farinæ, fenugraci, seminis lini, anethi, chamæmillæ, ana. drach. 10. bdellii, styracis liquida, ammoniaci, galbani, ana. drach. 5. olei liliorum quantum sufficit. dissolutis gummis fiat emplastrum. Item urina cocta cum sale, item succus ebuli inspissatus cum oleo rosæ item ex multis sunt unguenta propria in his casibus sicut de limaciis, de scorpiionibus, de ranis, de uulpe, de uespertilionibus, & similibus, coquendo ea cum aqua salita & pinguedo supernatans referuetur, & cum horum decoctione potest locus epithimari, & postquam epithimatum est & exiccatum cum pinguedine ungatur, aut horum carnes salite ponantur in olla perforata, bene desuper obturata, & alia integra sub ea, & sepeliatur in fimo & distilletur & reseruetur. Tertia autem pars huius regiminis curatiui habens duas intentiones, scilicet curationem accidentium & regimen sex rerum perficitur, ut infra. Duo enim sunt accidentia corrigenda, scilicet doloris intentio, & durities remanens in iuncturis. Dolor sedatur dupliciter. Primo remouendo causam, & de hoc sermo precepsit. Secundo cum anodinis fomentando locum dolentem cum oleo chamæmillæ, anethino, aut cum decoctione ex floribus chamæmillæ, meliloti, sem. lini, maluaufci, paretaria, & similibus, & iniunctio cum cassia trac. cum aqua rosæ in principio & cum aqua apii in processu est propria, scilicet conueniens. Et tertio cum stupefacientibus mixtis, cum anodinis, de quibus supra. Vt Recipe micam panis albisimi, & misce eam cum lacte & oleo rosæ aut chamæmil. aut ambob. simul, quibus adde. 20. partem oppii, & croci quartam partem ipsius oppii, & fiat emplastrum. Ad idem. Recipe olei rosæ. vnc. 6. oppii drach. 2. croci drach. 1. ceræ quantum sufficit, & fiat unctio. Ad idem. Recipe caput papaueris al. cum semini. & corticib. suis, hordei mundati, ana. vnc. 1. & bulliant in una lib. aquæ ad consumptionem medietatis & colentur, cui colaturæ addatur mucilaginis psyllii, fenugraci, seminis lini extractæ cum aceto quantum est colatura olei rosæ. mixti cum albumine oui quantum est medietas, fiat linimentum in quo infundatur pannus lineus, frigidus applicetur, & cito calefit remoueat. Item quinto aphorismo. aqua multum frigida infusa super articulos doloris ipsorum sedat sensum obuindendo. Pro secundo accidente curando, est sciendum quod durities iuncturarum est duplex. Est enim quædam in qua iunctura est marasmata & desiccata absque præsentia materiæ, saltem, de qua fit curandum. Altera est cum præsentia humoris mucilaginosi crassi, & aliquando gypsei. Vtraque difficilis, & aliquando impossibilis curationis iuxta illud Ouidii uersum.

Soluere nodosam nescit medicina podagram.

Et maxime difficilis curationis est quando adeo desiccata & marasmata est, quod per frictionem non rubet, & adhuc in qua nullus aut paruus est sensus magis difficilis est. Vtraque pro curatione si possibilis est aut melioratione tempus requirit longum. Prima autem existens absque præsentia materiæ, de qua fit curandum unicam exigit intentionem perficiendam cum notabiliter humectantibus tam qualitatue quâ substantiæ & temperatis in actiuis. Vnde embrocetur particula patiens aut stet infusa in aqua mucilaginosa deco-

ctionis radicum althææ, ulmi, chamæmillæ, meliloti, fœnugraci, seminis, lini, & similium, aut in aqua decoctionis capiti castratorum, cui si esset admixtus sanguis calidus alicuius animalis esset conuenientior, & tempore balneationis huiusmodi particula patiens fricetur ut nutrimentum attrahatur ad ipsam. Propterea quando sunt huiusmodi debet esse perfecta prima & secunda digestio, & iam fit tempus penetrationis nutrimenti ad membra, & cum hoc tunc debet flecti & reflecti ad omnes differentias, maxime ad eas quæ sunt sibi difficiles, & fiat huiusmodi bis in die, & post huiusmodi balneationem ungatur prope ignem moderatè aliqua unctio mollificante, ut Recipe pinguedinis vulpis lupi, olei sesamini, ana. unc. 1. medullæ cruris bouini, mucilaginis maluaufci, fenugraci, sem. lini, ana. drach. 2. ceræ quantum sufficit. Et ad hoc ualent species diaphanæ. Si uero sit cum præsentia materiæ indurata exigit duas intentiones. Prima est mollificatio. Secunda resolutio. Prima completur cum iam dictis. Secunda cum œsopi ceroto descript. Philagrii apud Mesue. Aliud magis resolutiuum. Recipe dialthææ. unc. 3. olei mastichini, olei de lil. olei nucis indicæ, ana. unc. 1. axungie, struthii, aquilæ, morontæ, anatis, gallinæ, asini, medullæ cruris uiruli, cerui, ana. unc. 8. bdellii, hiss. humidæ, styr. liquidæ, ana. drach. 2. pinguedinis testiculorum castorei drach. 1. ceræ quantum sufficit fiat unguentum. Possunt etiâ fieri emplastra miscendo cum suprafcriptis aut aliis quæ uidebuntur magis opportuna farina fenugraci & sem. lini. Fiat etiam resolutio cum marchasita ignita extincta cum aceto, & similiter cum lapide molendini similiter ignito & extincto. Gal. uero testatur quod caseus antiquus coctus cum iure tibiz facile porci rumpendo cutem cum uolentia extrahit lapides gypseos & mollificat duritiem, quod dicit se in multis probasse. Rasis uero hoc recitando addit nasturtium. Secunda intentio ultimi regiminis curatiui, debet regimen sex rerum potest elici ex dictis in de regimine præseruatio. Oportet tamen dietam magis esse tenuem. Quapropter oportet in gutta calida ut à uino abstineatur. Bibat aquam coctam cum quinta aut sexta parte iulep rosæ. Si tamen non posset abstinere sit pauciferum stipicium saltem in principio, & multum lymphatum. In processu tamen digesta materia & notabiliter minorata potest esse subtilius, sed optime lymphatū. Abstineat à carnibus saltem in principio. Utatur auenata, hordeacea, pauco milio, & condiantur sua cibaria cum rebus siccis acerbis, sicut acrosta, uino granatorum, suc. limon. aranci, citrinorum, mirtillorum, & similia. Caueat ab aceto. Sed in gutta frigida apud Rasim, caueat à fastidio, & aqua frigida, & cibis crassis, & a frequenti ebrietate. Eique præcipiendum dum sanus est ut motu utatur, & à coitu abstineat, & præcipue cum satur fuerit, nec balneū ingrediatur, nec exercitetur post comestione. Vinum præterea uetus & purum bibat. Eis quoque utatur dum sanus est, quæ urinum prouocare consueuerunt, & similiter gutta declinante. Credo tamen præstantius esse ut saltem in principio utatur in potu aqua mellis cum salua, & carnes suæ sint auium & proprie syluestrium, sicut perdes, & similia. Regimen etiam resumptiuum tres habet intentiones. Prima est regimen sex rerum, & est quod paulatim reducat ad regimen sanorum incretando dietam, & exercitium paulatim crescat, & proprie secundum iuncturas, quæ ex gutta fuerant impeditæ. Secunda est, quod si aliquid de materia fuerit derelictum cum diureticis & theriaca finiatur, & aliquando cum solutiuis benedictis propriis & confortantibus, aut saltem non debilitantibus membra mittentia neque recipientia. Tertia, quod iuncturæ cum balneis propriis confortantibus, & resoluentibus, & cum unctio ex oleo vulpino, & similibus confortentur, pro qua intentione recurrendum est ad quæ dicta sunt in regimine præseruatio, intentione. 3. Similiter membra nobilia & proprie mittentia confortentur corrigendo ipsorum discretiam sicut cum diarrhodon abbatibus, aromatico rosæ diamulco dulci, trochi. de absinth. de rhabarb. de capparibus, theriaca, mirobalan. chebul. conditis, acoris conditis, diacori, salua, pineis preparatis, fistichis, passulis, & similibus secundum exigentiam, confortantibus tam membra mittentia quam recipientia, quæ tamen membrorum confortatio iuxta posse est attendenda in toto curæ processu.

De

Dolor anchæ & ischiaticus, in quibusdam conueniunt & proprie in essentialibus, scilicet in membro principaliter patiente quod est in iunctura anchæ, & in causis tam intrinsicis quam extrinsecis. Differunt tamen in quibusdam accidentalibus ut puta in doloris extensione. Est enim dolor anchæ dolor fluxus, & in iunctura circumscriptus, sed ischiaticus descendit & extenditur uersus pedem iunctura anchæ non dimissa.

Horum species non sunt nisi quidam modi secundum magis & minus differentes. Est enim quidam fortis clamor, quidam remissus, quidam nouus, quidam antiquus, quidam cōtinuus quidam interpollatus, quidam cum dislocatione, quidam sine & dolor ischiaticus quandoque descendit usque ad coxam, quandoque descendit usque ad genu, & iunctura ipsius motum, & quandoque extenditur usque ad pedem & digitos eius impediens fixationem & firmitatem. Descendit autem quādoque per partem domesticam, dolore lacertis & nervis illius partis communicato per materiam existentem in uena saphena ad musculum illius partis resudantē, & quandoque per syluestre materia resudante ad lacertos & nervos illius partis à uena ischiatica. Et si materia continetur in concauitate iuncturæ, sicut est secundum plurimum, descendit per syluestrem communicando materiam nervo lato, propterea dolor ischiaticus frequentius descendit per syluestrem partem quam domesticam, & causa descensus & extensionis doloris non est nisi multitudo materiæ ubicunque contenta.

Causæ autem sunt duplices corporæ & primitiæ, sed corporæ duplices, per communitatem & propriam. Propriam quidem sunt secundum pluri. materiales alterantes & extendentes ipsius iuncturæ partes & sunt secundum plur. phlegmaticæ crudæ & uentosæ, d. inde mixtæ, deinde sang. raro melan. & rarius cholæ. Sed ex communitate secundum plur. à matrice & ex permutatione materiæ ipsius ad anchas quibus alligatur & adhæret iuxta Hippo. 5. part. Apho. 46. Si matrix in uertebro posita saniem fecerit, necesse est commotum fieri, & apud Auic. multoties permutatur a doloribus matricis, chronicis & remanentibus longo tempore, ita ut sint decem menses. Causæ primitiæ sunt calus, percussio, selesio super re dura, equitatio longa insuetas, saltus, & fortis ambulatio.

Signa causarum materialium propriarum ex generalibus signis superius positis comprehendere possunt. Sunt tamen difficilius inuestigationis quàm signa causarum propriarum dolorum aliarum iuncturarum propter materiæ profunditatem, & maiorem distantiam à sensu, coniecturari tamen possunt à quantitate doloris ab exeuntibus à iuuantibus & nocentibus, & à quibuscircumque circumstantiis, sicut complexio, ætas, sexus, tempore anni, regimine præcedente, & similibus. Signa quod sit per communitatem & maxime à matrice est, quia adest ipsius matricis ægritudo, & quia si permutatur deficit ægritudo matricis & succedit ipse dolor. Causæ primitiæ seipsas ostendunt.

Prognostica. Primum est Aphor. 60. sexta particule. Quibuscunque à coxendico dolore diu molesto coxa resilit foras, his tabescit crur & claudicat si non urantur, huiusmodi enim causa est phlegma mucilaginosum remolliens ligamenta, faciens facilem dislocationem, & facilem reingressum coxæ in pixedem. Secundum, dolor iuncturæ ischiæ est de uehementioribus doloribus iuncturarum, & difficilius curationis quàm dolores aliarum iuncturarum propter loci profunditatem & materiæ multitudinem, quæ attrahitur ad ipsum à toto corpore, licet dolores humeri & spondilium sint periculosiores propter propinquitatem ad membra nobilia. Tertium, dolor ischiaticus & uniuersaliter omnis dolor podagricus, licet curetur & materiæ eradicentur facile redit propter situm membri, & distantiam à membris nobilibus. Econtra est in doloribus chiragricis & iuncturarum superiorum. Quartum. Cum dolor ischiaticus prolongatur extenuatur coxa & tibia. Quintum. Cum apostema anchæ exituratur propter sui profunditatem, quādoque ducit ad mortem. Sextum. Si habenti dolore anchæ appareat rubedo uehementis quantitate trium digitorum non faciens ei dolorem

& accidit ei pruritus uehementis, & desyderat olera, morietur in. 25. diebus. Rubedo namque uehementis non faciens dolorem significat cholera symptomatice & diminute expulsum ad membri dolentis superficiem, propterea facit quendam pruritum sui acuitate, & desyderat olera frig. scilicet dispositio nisi suæ præternaturali contraria. Morietur autem in. 25. qui est fere medius terminus tropicorum materia conuersa ad membra nobilia. Septimum. Iunctura ischiæ rarissime lapidescit aut induratur propter amplitudinem uacuitatis iuncturæ & situm profundum & multitudinem humiditatis eius in comparisonem ad alias iuncturas.

Cura doloris ischiatici similis est curæ doloris aliarum iuncturarum quantum ad præseruationem & resumptionem. Differens tamen à cura aliorum in duobus, scilicet in administratione repercussiuorum quæ debent esse lenia aut nulla, ne materiam in profundo iuncturæ detineant aut coarctent, & sic dolorem augeant, & materiam ineptam resolutioni faciant aut forte etiam ad membra nobilia repellant, sed si ea approximare decreueris, quia forte materia uidetur subtilis aut cal. aut saltem calida admixta sint talia ut confortent locum & materiam uenientem refrenent, sed non repellat, nec in membro coarctent. Similiter resolutiua & attractiua de profundo ad cutis superficiem oportet esse fortiora & leptomis substantiæ propter profunditatem materiæ. Regimen quoque præseruatiuum colligatur ex his quæ dicta sunt in regimine præseruatiui dolorum aliarum iuncturarum, & similiter regimen resumptiuum. Sed regimen curatiuum quantum ad primam intentionem, quæ est euacuatio, completur cum phlebotomia ex basilica eiusdem lateris si sanguis tuit in causa, aut alii humores peccauerint cum sanguine. Postea alii humores euacuentur secundum exigentiam euacuationibus integratis ex digestiuis & eradicatiuis etiam iteratis. Si tamē nausearet aut facile uomeret uomitiua, saltem in principio essent conuenientiora quàm solutiua diuertendo & euacuando, & ante digestionem leuiora competenter, post digestionem fortiora. Ex leuioribus est decoctio raphani. 3. 4. cum unc. 2. oximellis, & fortius est si loco decoctionis accipiat succus eius. Similiter aquæ tepidæ, unc. 4. cum flore & semine genistæ, drach. 2. & fortius his est succus raphani, in quo fustes ellebori steterint infusi per diem & noctem. Et fortius omnibus est si ponatur scrupulum semis ellebori cum uncis duabus oximellis, & cum uncis quatuor aquæ tepidæ. Digestiua sunt. Recipe mellis ros. syrupi de eupatorio, ana drachmas sex, aquæ saluæ uncias duas, aquæ iuniperi, unciam unam misce, & fortius est hoc. Recipe syrupus de calamentho, syrupus de stœcados, mellis rosa. ana, unciam semis aquæ saluæ, uncias duas, aquæ iuniperi unciam unam, misce. Et fortius est si suprascriptis addatur aristoloch. rotund. seminis rutæ siccæ. ana. scrupulum unum. Si tamen humores calidi cum frigidis peccarent temperentur huiusmodi calida cum syrupo aut aqua endiuæ, aut cum iulep. ros. Solutiua autem sunt pilulæ iuuamenti Auicennæ quinto canone. Item pilulæ de hermodactylis maiores Item pilulæ foetidæ. Item electarium indum, hiera Ruffini, hiera Hermetis. Et si materiæ calidæ fuerint in causa, pilulæ de hermodactylis minores, electarium de succo ros. Medicina optima ad dolorem anchæ. Recipe pulpæ colocynthidis, drachmas quinque, passularum sine granis pugillum unum bulliant in tribus libris aquæ donec remaneat tertia pars. da tertiam partem, educit ex phlegmate & humore crudo. Intentio secunda, scilicet diuersio perficitur cum diureticis, id est, urinam prouocantibus. Item cum clysteribus, in primis minus acutis, deinde fortioribus & sanguinem educantibus. In primis asarum secundum omnem modum administrationis, sed maxime eius infusio bibita confert. Decoctio hypericon cum uino bibita quadraginta diebus, sanat dolorem anchæ & ischiaticum. Item decoctio radicum asparagi, nasturtium confert bibitum, clysterizatum, & emplatratum cum aceto, & sauiæ hordei, & cum ungitur locus cum melle, & supraspergitur puluis eius sedat dolorem. Ex compositis est medicamen Hermetis, digerens materiam frigidam & urinam prouocans & est mirabile. Recipe chamædrysos, gentianæ, ana drachmas decem, aristoloch. rotund. drachmas duas, seminis rutæ siccæ drachmas duodecim

Io. Arculani h 2 terantur

terantur & cribellentur cribello subtili. dosis eius est choclear unum cum aqua mellis. Est autem choclear diuersum pondus apud autores, sed sufficiunt drachmæ duæ, aut circa, post cuius exhibitionem aliquibus diebus succedant uomitiua aut solutiua, aut utraque si opportuerit. Sed in calida confert decoctio radicum papauæ. campestris data in potu. Cum his tamen si uis magis prouocare potes decoquere radices asparagi, aut rubearum tinctorum, imo rubea ipsa data in potu cum melicrato prouocando optime confert in frigida & mixta. Est autem melicratum uinum ex melle & aqua factum, loco tamen ipsius possumus hydromel accipere. Ex clysteribus est decoctio ireos & corticum radicū caparis. Et fortior est aqua oliuarum salitarū, & similiter aqua piscium salitorum. Clystere ex centaurea confert ischiaticis educens phlegma ex anchis. Similiter succus & decoctio cucumeris asinini educit similia & sanguinem, & radix cucumeris asinini clysterizata, emplastrata & epithemata optime confert, sed humore existente calido aut mixto huiusmodi cum frigidis temperentur. Est tamen aduertendum quod in usu medicinarum sunt interpolationes faciendæ, sicut in cæteris ægritudinibus chronicis, in quo tempore est uacandum debito regimini: sex rerum & uirtutis restaurationi. Secundum regimen, scilicet locale, aut nō indiget repercussiu in principio aut si indiget sint leuia, & materia fluenti proportionata quæ eligantur ex dictis superius in cura aliorum dolorum iuncturarum. Resolutiua autem in principio sint leuiora & gradatim augendo procedatur, & cum eis intēdatur sedationi doloris, quæ resolutiua possunt applicari tam interius sub forma clysteris quā exterius sub forma unctionis, emplastri, ceroti aut epithematis. Recipe olei liliorum alborum, uncias octo, olei cheiri, olei spicæ, olei chamæmillæ, ana uncias duas, pinguedinis anatis unciam unam, uitellos oui numero duo, calsiæ tractæ, benedictæ simpli, spicæ, sacchari rubei, ana unciam semis, croci, drachmam semis, salis communis, drachmas duas, misce & fiat clystere, quod debite calidum imponatur alternis diebus stomacho ieiuno. Aliud efficacius. florum chamæmillæ, anethi, melilot. ana, manipulum semis, saturiæ, saluæ, ana manipulum unum, chamædryos, manipulum semis, radi. aristolochiæ rotundæ, cartami, nucleorum persicorum, unciam semis, uitellum oui numero uno, croci, drachmam semis, pinguedinis anatis unciam unam, olei liliorum alborum uncias tres, olei spicæ, olei de cheiri, ana unciam unam, sacchar. unciam semis, salis communis, drachmas duas, flores, radices, herbæ, semina nuclei bulliant in sufficienti quantitate ad consumptionem medietatis, deinde exprimantur & colentur, ultimo duodecim unc. ipsius addantur reliqua, & fiat clystere. Exterius etiam fieri possunt fomentationes cum spongiis infusis in decoctione alicuius, aut plurimum infra scriptorum, scilicet florum chamæmil. meliloti, anethi, saturiæ, chamædryos, chamæpithyos, pulegii, solii, assari, hypericoni, iux, saluæ, nasturtii, rutæ siccæ, sauinæ, radicū utriusque aristoloch. hyssopi siccæ, calamenthi, quæ possunt bullire in sufficienti quantitate aquæ, aut aquæ & uini simul, & modico aceti acuti, quæ spongiæ infusæ in hac decoctione applicentur loco dolenti, nunc una, nunc altera post sufficientem eius expressionem, donec locus notabiliter rubere coeperit, & hæc fiant stomacho ieiuno bis aut semel in die, & post earum remotionem

& debitam exiccationem, ungatur cum aliqua unctione resolutiua & confortatiua iuncturæ sua proprietate, sicut est oleum de costis, uulpinum, de croco, de terebinthina, de piperibus, de euphorbio, & similia, quibus possunt addi sagapenum, ammoniacum, oppopanacum, item pinguedines, & similia. Et his non sufficientibus materiæ cōiunctæ sunt eradicandæ & extrahendæ de centro ad circumferentiam. Eradicantur autem cum phlebotomia uenæ ischiaticæ, aut saluæ tellæ pedis dolore descendente per partem syluestrem, aut saphenæ, uel eius qui est in pollice pedis, dolore descendente per partem domesticam, aut curuaturæ poplitis per quamcunque uiam descenderit. Item eradicantur trahendo ipsas à centro ad circumferentiam cum rubificatibus uescicatoriis, & tandem cauteriis, ut Recipe sinapis, fimi columbini, ana unc. i. terantur, & cū sicibus siccis incorporentur, quæ prius sint infusæ in aceto acutissimo. Aliud est emplastrum de sinapi descriptione Mesue in suo Antidotario & hæc posita super locum dolentem debent dimitti cum bona contritione per duodecim horas, aut circa, & si hæc non suffecerint spargatur super emplastro facto ex his parum cātharidarum, nisi timeatur ardor urinæ & nimia prouocatio, & locus uescicatoris quantum fieri potest. conferuetur apertus, & post consolationem replicetur secundum exigentiam. Sed his non sufficientibus fiant cauteria actualia, aut cum instrumento quod rotæ asimilatur, cuius figura est hic descripta, in parte syluestri circa iuncturam anchæ & penetret totam cutim ueram, ut puta fere per medietatem digiti parui secundum latitudinem, aut fiat circa eādem iuncturam cum instrumeto triangulato faciente simul tria cauteria æquidistantia, cuius hæc est figura, & teneantur aperta per quadraginta usque ad sexaginta dies. Vltimum regimen est curare accidentia. De quibus permaxime est dolor cui intendendum est in toto curæ processu, & fiat ualde intensus ordinem curæ regularis præuaricat, ita ut non sufficientibus anodinis & euaporantibus ad stupefacientia, etiam ab initio deueniendum sit & exterius applicita & interius sumptas, sicut est philonium romanum in causa frigida, & requies in causa calida. Exterius autem applicita requirantur in cura dolorum aliarum iuncturarum, opus est enim cum anodinis & euaporantibus exterius applicitis opium aut aliud stupefaciens permiscere, hæc tamen omittantur quantum est possibile. Secundum accidēs est dislocatio iuncturæ propter mucilagines in ipsa contentas, in cuius cura conferunt rubificantia, uescicatoria, cauteria, & omnia multum resoluentia & reductio uertebri in pyxidem quantum est possibile, cui semper iniiciendum est, & eius in ea cum ligatura conseruatio. Possumus enim audacius resolvere & exiccare in hac iunctura quā in cæteris, cum minus timeamus indurationē & petrificationem ex causis superius dictis. Regimen autem sex rerum non naturalium eliciendum ex regimine superius posito in cura dolorum aliarum iuncturarum, est enim omnino simile. Locus tamen iuncturarum & partes circūstantes usque ad genu, imo usque ad pedem si ad ipsum dolor descenderit teneatur calidus, & proprie cum caliga facta ex pelle uulpina, habet enim singularem proprietatē in confortatione iuncturarum. Sed in tempore calido opus est caliga minus calefaciendo, quæ secundum exigentiam ordinetur. Et sic est finis de doloribus iuncturarum.

F I N I S.

IOANNIS

quindecim, quæ Arculani explanationem
desiderant, breuis expositio.

De fluxu urinæ.

Cap. I.



Um ager multum urinæ emittit, & in emissione ardorem non sentit, aut mingit in somno suo, nec patitur sitim, nec corporis extenuationem incurrit; ea, quæ urinam constringunt, danda sunt. medicamen retinens urinam. Recipe glandium drachmam unam, olivani drachmas triginta, seminis coriandri sicci, boli armeni, gummi arabici ana drachmas decem fiat ex eis pulvis, de quo in mane drachmas tres, & circa noctem totidem ad transluendum dentur.

Nunc de urinæ fluore agitur: primumque is curatur, qui est ortus ab intemperie frigida, & humida: cuius signa sunt [cum ager multum urinæ emittit &c.] deinde eos sanat Rasis, qui diabete sunt affecti. id uero cognoscitur ex his uerbis [quod, si cum hac ægitudine &c.] origo ipsius ex caliditate contrahitur. quo ad primam affectionem attinet, illa frigiditas, humiditasque retentione renum facultatem relaxat: uel musculi, qui ceruicem uesticæ mouet, uel colis, qui resolutus laborat. curationis autem scopus in iis consistit, qui renum intemperiem corrigant, musculos roborant, & uesticæ coli medetur. hoc morbo correptis uictus ratio, quæ siccitas, materiasque sistat, est utilis. aeris itaque constitutio, in quo ager uersatur, calida & sicca sit. exercitia temperata cōferunt. somnus sit nocturnus, à quo sæpe excitetur, animi cogitationes profunt, & uigilia. cibis utatur ad siccum declinantibus, & eos fugere oportet, qui tam calidi, quam frigidi urinam prouocant: uini cum aqua, in qua decocta sint stiptica sicca, mixtura sit. carnes comedant cum uino granato, uua acerba, & similibus paratas. præterea diuertantur humores, atque præparentur suis contrariis. post hæc purgentur. quo facto quæ urinam sistant, ea sunt adhibenda medicamenta: quale est illud à Rasi desertum, uel huic simile. R. glandium siccarum. 3. i. o. thuris. 3. 7. myrrhæ. 3. s. coriandri assati, acori, cyperi ana. 3. 2. s. teratur, & cribentur, & mane cū uino nigro stiptico, & aqua, in qua piper long, galanga, cardamomum, & crocus sit coctus, diluta, bibat puluerem ager. hæc Guilielmus Placentinus. uel illud. R. glandium, thuris, myrrhæ, ana. 3. s. decoquas in .3. 3. uini, ut duas partes exhalentur. cola, & cum unc. olei myrtini exhibe. Summe laudantur ex simplicibus myrobalani usti, styrax, thus, myrrha, uinum nigrum, myrtus, & id generis. renes leporis cæteris præstant. quare. R. renum leporis exccatarum, sem. anethi an. partem unam, pirethri, & sem. apii partem. s. cum aqua frigida pulvis propinetur. capræ uestica in pollinem redacta, & cum aqua bibita confert. uestica tauri quoque, uel apri in aceto cocta plurimum ualet. carcericii naturalē obtinet facultatem urinæ sistendæ, inunctiones præterea, emplastra, clysteria, & huiusmodi alia adhibeantur, quæ uim habeant uel nervos roborandi, uel musculos, uel renes, ut tempus postulat.

Quod, si cum hac ægitudine sitis fuerit ualidissima, clamosa, & aqua, quæ bibitur, cito egrediatur; aqua bordei cum psilio detur, & nutriatur cum succo uua acerba, & sumach, & similibus horum nutrientium: & cum cibo, qui fit de simila bordei, & masal, & rob acetosum da ei in potu: & prohibeatur à labore, & cum muliere concumbere. isti quoque trochisci in potu sumantur. Recipe spodij drachmas decem, lactucæ, seminis portulacæ ana drachmas quindecim, coriandri sicci drachmam. 2. seminis rose rub.

boli armeni ana drachmas quinque, balauſtie drachmas duas, camphoræ drachmam semis. sumantur in potu cum succo granati acetosi. herba etiam frigida terantur, & super renes ponantur. & caueat sibi à cibis calidis, & uino, & ab omnibus, quæ urinam prouocant. illud autem, quod ex nimio stolidorum errore prouenit, est; quia dant in hac ægitudine medicinas calidas: unde illico ducunt ipsum ad phthisim.

Sed ad urinæ fluorem descendamus, qui originem à caliditate trahit. dicitur diabetes, id est transitus urinæ continuus, aut uerius potionis non mutata. is diuturnum est malum circa renes consistens, multa quæ sitim inducens, & quicquid bibitur, hoc simul ut, & quale assumptum est, per urinam redditur. sit ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, attractricisque tantum robur, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. signa sunt [quod, si cum hac ægitudine sitis fuerit ualidissima, & aqua, quæ bibitur, cito egreditur] sed & hæc ægrotantes concomitantur; quod uiscera uri uidentur, lumbi intumescunt, testes, & coxæ. & si mordens caliditas in uisceribus augeatur; uenter superior corrugatur, & uenæ in ipso eleuantur, uniuersum habitum gracilem habent, & totius corporis tabes accedit grauis. quod ad curandi rationem attinet, obtundamus primum humoris acrimoniam, sanguinemque, ac qui sunt cum eo permixti ferrosi humores, eorum fluxui resistamus, & renum intemperiem corrigamus. itaque in principio uena secetur gibberis, & moderatè sanguis auferatur. quæ etiam mediocriter urinam cient, quæque uitiatum, & in renes imbibitum humorem expurgent, utamur. sed in inueterato morbo contra est faciendum: neque enim uenam secabimus, cum totum corpus acius reddatur: neque urinam prouocantia exhibebimus; quia multiplicat, augentque malum. quid igitur faciendum? ea uictus ratio sit, quæ frigidam possideat facultatem, & humidam. eligat igitur aerem ager septentrionalē, uel sibi paret artificialem frigidam: uiuet motum, & exercitia: frictiones tamen, quæ in brachiis fiunt, conueniunt maxime: ideo coitum fugiat, animo quoque quiescat, somnus ad longiorem noctis spacium perducatur, quam uigilia. tenuis admodum digesta nocet: sed cibi sint boni succi, & qui difficulter commutari possint, & mordacitate careant, aut qui facile acrimoniam frangunt. talia sunt oua forbilia, lac cum butyro coctum, caseus recens compactus, & salis experts. lac tamen per silicis, aut ferrum ignitum scissum ualde prodest: item carnes porcinæ iuuenes macræ plurimum coctæ. pro forbitione lac, à quo sit butyrum extractum, optimum est, & aqua, quæ ex cucurbita assata distillatur. uinum granatū acetosum, psilane succus frigidus, & si esset necesse, uinum crassum ponticum cum aqua, in qua calybs, uel ferrum sit extinctum porrigatur. ex oleribus autem probatur intybu, lactuca, & portulaca. ex fructibus pyra, poma, mala punica: & inter pisces saxatiles in diabetes autem curatione multa nobis spectanda proponuntur: nam, si inuitis urina excidat, ut etiam ager lectum permeat; causam primum aufere mus. si à potu id largiore fiat; bibatur parcius. si à potus, uel cibi qualitate salia, acris; ut esu coeparum, porcorum lar go; ægrotans abstineatur: si sphincter uesticæ est resolutus mora longa in aqua frigida, uel alio frigido contacta; sanetur paralysis per calorifica omnia. uerum, si idem est ruptus, uel laceratus, uel sectus, nisi initio sanetur; difficilem habet postea curationem, si uerò ob hepatis, uel renum calidam intemperiem; sumantur, admoveanturque refrigerantia. Sed in uniuersum sumatur spodij. 3. i. o. lactucæ, sem. portulacæ ana. 3. i. s. coriandri sicci. 3. i. sem. rosarum rubeorum, boli

Io. Marinelli

h

3

armeni

armenii an. 3. 5. balauftiæ. 3. 2. camphoræ. 3. s. fiant trochisci, & potu sumantur mane & sero antequam æger comedat, cū uino granato acetoso. & Arnaldus dī Villa noua alios trochiscos describit hoc pacto. R. rosarum, spodii ana. 3. 10. se. portulacæ, succi glychiritiæ, boli, sumach ana. 3. 2. sem. lactucæ, coriandri, sandali, berberis ana. 3. 1. dragaganthi, gummi arabici, balauftiarum ana. 3. 2. camphoræ. 3. s. fiant cum succo granatorum acetosorum: quorum alterum exhibe mane, alterum sero. ait se quatuor diebus iuuenem quendam curasse, qui lectum permeiebat diabete affectus. alii ab eodem Arnaldo notati recipiūt carabæ, boli armeni, myrobolanorum nigrorum torrefactorum, medullæ glandium excorticatarum, sumach, coriandri torrefacti in aceto extincti, rosarum, spodii, sem. lactucæ, portulacæ, gum. arabici ana. drachm. 2. conficiantur cum succo granatorum acetosorum, & drach. 1. s. detur cum syrupo rosaceo. & illi à Michaele Sa uonarola medico peritissimo feliciter porrigebantur: qui habent acatiæ. 3. 2. rosarum. 3. 3. balauftiarum. 3. 4. gummi. 3. 1. dragaganti. 3. s. bibantur cum mucilagine psyllii, & aquæ cucurbitæ. & si placet, adhibere poteris aliquid camphoræ, thuris etiam. 3. 1. uel. 3. s. cum aqua absinthii multis prodest, syrups, de quibus ante erat dicendum, rosacei, myrtini, & similes conueniunt. rhabarbatum quoq; uel aliud lene medicamentum est utile. præterea extrinsecus hypochôdriis, lum bis, & peccini illiniones, cataplasmata, cerata, & id generis alia refrigerantia adhibeantur, qualia sunt eas, quæ recipiunt sandalorum alborum, & rubeorum, rosarum, gum. arabici, spodii, sumach, balauftiarum, acatiæ, hypocistidis ana. 3. s. terantur omnia, & cum aqua rosarum nixta lumbis applicen tur. Aliud. R. acatiæ, thuris, succi barbæ hircinæ, laudani, myrrhæ, gallarum ana. 3. 2. emplastrum cum aqua rosarum pa retur, renibus, lumbisq; applicetur. Aliud, quod habet fari næ hordeaceæ. 3. s. pampinorum uitis, extremitatum salicū, burfæ pastoris ana. M. s. corticum granatorum. 3. 2. s. portu lacæ. M. 1. sem. cotoneorum. 3. 1. rosarum rubeorum. M. 1. s. ebulliant omnia in aqua, donec ad mellis crassitudinem de ueniant. deinde addantur olei rosacei. 3. 2. olei myrtini. 3. 1. denuo bulliāt, & singatur emplastrum. ex iam commemoratis potest fieri ceratum adiectionis hypocistidis, acatiæ, bolo armenico, resina, & cera. hæc doctissimus Fuchsius. illinatur etiam renes ex oleo rosaceo, uiolaceo, populeone, & similibus frigidis. uel recipe olei rosacei, uiolarum, mandra goræ, succi umbilici ueneris, aquæ rosarum, succi semperui uæ aceti albi ana. 3. 3. quibus omnibus simul calefactis addan tur farinæ hordeaceæ lib. 1. rosarum. 3. 3. myrtillorum. 3. 2. sandalorum omnium. 3. 1. in puluerem redigantur, & cum aliis misceatur, & emplastrum renibus apponatur tepidum; calida enim ad pthysin perducunt ægrotantem.

De uermibus, qui generantur in uentre, & ano. Cap. 2

Qui hoc nouimento solitus est ledi, à cibis crassis, & unctuosius sibi cauere debet. quotidie, antequam comedat, sumat buccellas aliquas cum sinapi & almu ri; hoc enim ipsos generari prohibet. si uero ad tempus eos generari contingat, non conuenit, nisi ut expellantur. medicamen ascarides expellens, Burungi excorticati, cum ualde famelicus est æger, drachmæ septem sumantur. medicamen magnum expellens lumbricos. Recipe burungi excorticati, tur bith, seminis nigellæ omnium partes æquales, lupinorum, nasturtij, canabel ana partem semis. sumantur ex eo in potu; drachmæ septem, prius tamen bibat æger lac mox, ut multum fuerit per tres dies: & deinde die quarta dietet se, & de prædicto medicamine in lacte adhuc calido, ut est multum, dissoluto. & acetum, dum est ualde famelicus; bibat. uermes uerò minuti, qui in ano sunt, pro quibus generatur pruritus in eo, & ideo fricatur anus, expelluntur, si co tum ex oleo abluto inuolutum immittatur: aut immittatur inuolutum oleo de chrysomil. aut succo mentastri, aut inuoluitur ex parua quantitate aloes, & felle uaccino, & superponatur.

Lumbricorum, quos græci *ἐλμινθες* uocant, omnium generum origo est ex cruda, crassa, pituitosa; materia, & putredini accomodas; qualis in infantibus pueris, atque iis, qui ad pubertatem accedunt, colligitur: non autem ex calida, acris, aut melancholica substantia: quæ alimenti naturam egressa lumbricis prouocandis inapta redditur. neque etiam ex biliosis recrementis quæ neque eos gignunt, neque alunt; uerum perimunt. eorum igitur tres sunt uniuersæ differentiæ prima teretum, siue rotundorum, qui in gracilibus plerique intestinis consistunt, & uentriculum subeunt: idcirco sæpe per os reiciuntur, uel quibuldam etiam sic naribus redduntur. secunda latorum, qui instar fasciarum, & institarum sunt lati, & longi, qui, si dicere licet, sunt permutatio intrinsecus tenuia ambiētis intestina membranæ in corpus quoddam uiuum, & animalis modo mobile. lati quidem in medio intestini nascuntur. tertiā lumbricorum differentiam nominat ascaridas, qui tenues, ac breues, uermibusque similes lumbrici sunt in recto intestino, & in extremo ani magna ex parte reperiuntur.

Cognoscuntur uerò rotundi: quod genus pueris est peculiare, & plurima parte cum febricula; sed per febrium initia orti substantiam ex subiecta differentia retinent: in statu ex malicia morbi: in declinatione ex toto corpore ad melius mutato. uerum hoc malo affectus incredibilis morfus stomachi, ac uentris concomitatur: tussiculæ tenues, & exiguæ, & frequenter irritantes, & siccæ; cum tamen nihil reiciant. in somno tremunt, & præter rationem exurgunt. nonnulli cum clamore expergeunt, & iterum sopiuntur. quidam linguam foras protundunt, oculosq; claudunt, ac taciurni stant, molesteq; ferunt excitantes ob imbecillitatem uigilare nequeunt. pulsus inæquales, & febres augeant inordinatè, quæ cum extremorum perfrictione tertiā, interim quartam die, ac nocte accessionem sine ratione habent. quibuldam oculi sanguine sunt suffusi. nonnullis appetitus amissio est. pueris etiam, dum dormiunt, conuulsio, manducatioq; linguæ, cui acitit conformatio oris in modum lætentium, aut accipientium cibum, aliquibus quoque dentium stridor accidit: quod contingere uerisimile est animalculis attrahentibus cibum, mordentibusq; uentrem, ac intestina. aliis nauisæ, & rosionis causæ stomacho peculiare creantur: atque ægri cibum respuunt, compulsi autem ad cibum nauseabundi uix quod assumunt, deglutunt, uel etiam reuomit. plerisque aluus descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. contingit etiam aliquando faciem fieri rubicundam maximè circa malas: uerum color rursus in liuorem transit. alii instar declinantium absurda in somnis loquuntur. alii decubitus transmutant, & ex loco ad locum sese uicissim proiciunt. quidā motu pulsus destituuntur, ac refrigerantur, ac tenentur quendam, & frigidum sudorem exudant.

Qui à latis lumbricis uexantur, consequitur hos corporis gracilitas, & imbecilitas cum tarditate, assiduusque famis sensus. certissimum inditium est, si cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernantur.

Ascarides, qui sunt circa extremas intestini recti, ac primā internam adstrictionem ani partem, sphincterem græcis appellatam, uehementem in ano pruritum excitant, assidueq; ad egerendum irritant. & qui hoc morbo afficiuntur, ut plurimum ab excretionem melius habent. generatur hæc species à prauis alimentis, perfrictione, & ciborum corruptione. sed curandi ratio, p morborū diuersitate uariatur: tamen in quatuor diuidimus partes: in uictus rationem, in lumbricorum necem, in necatis, aut non necatis educationem, atque in accipientium correctionem.

Victus ratio, quæ à Rasi breuiter hoc modo describitur [Qui hoc nouimento solitus est ledi, à cibis crassis, & unctuosius sibi cauere debet] sit calida, & sicca; potissimum si febre ægrotantes uacauerint, cibisq; utatur probi succi, & qui facile in totum corpus distribuuntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugeant. quales sunt panis frumenti bene coctus, panata, ut dicitur, cum oleo omphacino, carnes uitulorum, hœdorum, perdicum, pullorum, auicularum paruari, aqua, in qua sint ciceres decocti, & huiusmodi alia. ex oleribus conferunt buglossa, parum saluæ, fœniculi, borago. sed fluxu concomitante, uel calida affectione acetosa stipica, quemad-

quemadmodum granata, & sumach cōueniunt. quōd, si egro tantis uirtus debilis reddatur, parentur oua, carnis aqua, pul li distillati cū gramine, aut siligine, aut anetho, aut aniso, & similibus. ex fructibus conueniunt oliuæ salitæ, persicorum, prunorum anima, nuces siccæ, quorum facultas est uermium paruum, & ascaridum expellendarum. uinum tenue sit, ac facilis digestio nis, maluatium tamen; nisi febris adsit, sum mope re commendatur. sed dilutum aqua graminis uel siligi nis maiorem in modum confert. præterea liberalius sunt nu triendi, famemq; minimè ferant. quod lumbrici, nisi cibum habeant, quem adsumant; statim subinde solida corpora abro dāt. omnia uerò, quæ pituitosos humores procreare possunt, alimenta fugienda. & quæ incidere, eligenda, ut docet nos Rasis, quæ lumbricos generari prohibent illis uerbis [Quo tidie, antequam comedat; sumat bucellas aliquas cum sinapi, & almu] pōrō aer parum sit calidus, & siccus, uitet æger animi passiones, somnus multus nocet, sed exercitiū cōfert.

Curandi ratio secunda non est differenda. & interdum, si mul febris, si adest, & lumbricorum habere curam: interdum autem parum de febre sollicitos esse oportet, ac studiose lūbricos de corpore eximere. ascarides in infantibus sunt edu cendi cum glandibus ex melle, & sale paratis. prouectiori bus uerò, cum sanescunt, dat Rasis burungorum excorticato rum drac. 7. sed conferunt clysteres ex acri muria, aut deco cto absinthii, centaurii minoris, calaminthæ, lupinorum, pul legii, & aliorum adiectis oleis parati. post clysteres, ait Aetius, rectum intestinum simplicibus quidem acatia, hypoci sthidae, rhois succo aut alio adstringente sublinendum est. car nem quoque salitam ueterem pinguedine derafa sublongā, & rotundā formabimus; atq; adaptatū podici intendemus, li gamentoque adhibito quā diu sustinere possint, inditam sinemus; deinde soluemus, simulq; ascarides illi adhærentes educemus. id quod declarat Rasis, cum inquit [uermes uerò minuti, qui in ano sunt &c. expelluntur, si cottum ex oleo ab luto inuolutum immittatur: aut &c.] sequitur curatio tam rotundorum, quā latorum, quæ in hoc cōsistit, ut hos prius occisos expellamus. amara quidem medicamenta eos maxi mē occidunt. inter simplicia, ubi febris absit, sunt absinthium abrotanum, calamintha, marrubium, dictamnus, hyssopus, ru ta, folia persici, coriandri semen, cornu ceruinum, lupini, mē tha, pullegium, origanum, filix, gramen, gētiāna, aristolochia rotunda, allia, brasiacæ semen. inter omnia laudatissimum est aloë, & pueris ore aperto, ac diducto per fistulam quandam ualido munitam canali inuitis illam iniiciemus. uerum, si febris adest, adiungenda sunt in ybi utriusque semina, itemq; earundem herbarum succi. ex comprehensis simplicibus me dicamentis uaria composita effici possunt, ueluti decocta, pulueres, cataplasmata, emplastra, & unguenta. inter reliqua medicamentum à Rasi descriptum unice cōfert: id est, ut [bi bar æger lac tepidum mox, ut multum fuerit, per tres dies, & deinde die quarta dieter se, & de medicamine suo in lacte adhuc calido, ut est multum dissoluto] tale habet burungi excorticati, turbiæ, sem. nigellæ omnium partes æquales lupinorum, nasturtii, canabel partem semis. quidam (inquit pe ritissimus Michael Sauonarola) sæpe à lūbricis angebatur, qui bibeat lib. 4. lactis, & statim cessabat dolor mordēs: de inde egrediebatur lac cum uermium materia. cui assentitur Auic. qui ait & quandoque sumit in potu habens uermes lac per duos dies. deinde tertio die in lacte potat medicinā in terficiem eos. serapia, quæ conueniunt, sunt de absinthio, mentha, calamintha cum aquis cichorii, portulacæ, acetosæ, graminis, & similia. si adest fluxus optimum est remedium succus plantaginis cum saccharo rosato exhibitus: sumach dissolutum in aqua: terra sigillata, ut uult Auic. cum uino bi bita, semen portulacæ. maxima adest præsidia illud. R. san tonici lib. s. pithetri, panis assati, & in aceto extincti ana. 3. cornucervi usti in aceto extincti. 3. 2. sem. canapis, cymi ni, cinnamomi ana. 3. 1. nigellæ. 3. 2. lupinorum ustorum, sa nis ammoniaci, nasturtii ana. 3. 1. s. absinthii, sem. caulium ana. 3. 3. mellis quod sufficit. confice electarium, qui lumbricos subito necat. Aliud ad idem, quod habet santonici. 3. 3. cen taurii, absinthii, cornucervi usti an. 3. 4. pulueris lupinorum, pithetri ana. 3. 2. calaminthæ, pullegii, origani ana. 3. 1. nigellæ, sileris montani an. 3. s. abrotani. 3. 3. gentianæ, arist. longæ

ana. 3. 2. menthæ. 3. s. croci. 3. 1. detur, ut Sauonarolæ placet, sero, & mane cum melle confectum. extrinsecus etiam umbi licus felle taurino foueatur, aut hoc unguento, quod reci pit olei amygdalarum amararum, & absinthitis ana. 3. 1. fellis taurini. 3. s. centaurii minoris, absinthii, lupinorum ana. 3. 2. foliorum persici, cornu cernini usti, aloes, abrotani ana. 3. 1. ceræ quod satis est. fiat unguentum. quidam inungunt uen trem, cum melle calido, atque superponunt illud empla strum, quod recipit hypocisthitis, acatiæ, aloes ana. 3. 3. su mach. 3. s. tere omnia cum aqua rosarum mixta, & succo ab sinthii, & applica. interficit omnes lumbricos. Aliud recipit farinæ lupinorum combustorum, aloes, absinthii, rutæ, colo cynthidis æquales partes. conficiantur omnia cum succo ab sinthii, ebuli, & aceti. aut imponatur regioni totius uentri culi hoc ceratum. R. aloes, absinthii, farinæ lupinorum ana. 3. 2. nigellæ, menthæ, origani, pullegii, marrubii ana. 3. 1. cen taurii minoris, calaminthæ ana. 3. s. olei absinthitis, & amygdalarum amararum ana. 3. 2. olei costini. 3. 1. fellis taurini. 3. s. cum cera, & resina quātum sufficit fiat ceratum. enecatos ue rō per prædicta medicamenta lumbricos citra dilatationem expellere oportet. expelluntur autem magna ex parte per glandes clysteria, & per purgantia medicamenta. glans fiat ex melle, & saccharo: uel qd̄ educit præcipue ascaridas, fiat hoc clystere. R. cētaurii, carthami, & hyssopi, partes æquales coque, & para. si uerò febris existat, his addantur, ueluti cor tices radicum mori, granatorum, & huiusmodi frigidorum. medicamenta purgantia sunt aloes, rhabarbarum, hiera sim plex, & composita, uel aliud tale. R. succi aphodillorum, suc ci absinthii, santonici, sifimbrii, fabarū, lupinorū partes æqua les. decoquantur ad crassitudinem, addaturque aloë ad pon dus omnium. Accidentia, quæ lumbricos comitantur, sunt febris, animi deliquia, syncopis, epilepsia, & id generis alia. si febris adsit; intrinsecus utere frigidis; qualia sunt semē por tulacæ, coriandrum, attriplex, & similia. extrinsecus uermi cularis. si fluxus torqueat egrotantem; sis sollicitus, ne appe titus amissio fiat. si animi angatur; recipe macis, florum bu glossæ, rosarum ana. M. s. coriandri, boli armenii, ceræ sigilla tæ ana. 3. 1. ligni aloes. 3. s. absinthii. 3. 1. corallorum rubeo rum. 3. s. zedoariæ. 3. 1. olis de corde cerui. 3. s. dictamni. 3. 1. s. fiat sacculus. uel ex aquis buglossæ, rosarum, & endiuiz cum antedictis fiat epithema. alias præterea affectiones, in quas inciderit æger, cura, quemadmodum ulus & ratio po stulat.

De hæmorrhoidibus, fistulis, & ragadiis, quæ in ano sunt. Cap. 3.

Cum sanguis recens sine dolore per inferiorem fluit re gionem, interpolate tamen; non est constringendus, ni si patiens ex eo debilitetur; à multis enim passionibus ex inde liberatur. si autem ex eo debilitetur, & indiget con strictione; trochisci de charabe cum succo sumach dentur. in comestione quoque sumat sumachiam, et cibum, qui cum suc co uix acerbæ sit, & his similia de illis quæ nutrienda sunt. si uero multum debilitetur; nutriatur cum succo carnis, cui plurimum admiscetur succ. citon. & uinum quoque bibat sti pticum: & super hepar ponatur emplastrum de spica, quod in capitulo de hepate nominauimus. et, si ista nō suffecerint; confectio de scoria ferri detur, quæ recipit mirobalanorum indorum, bel. emb. omnium, ana drachmas quinq; spica, scbi nāthi, ciperis, zingiberis, piperis, olibani, ameos omnium ana drachmas duas. scoria infuse in aceto per hebdomadā unam & postea torrefactæ drachmas quindecim. conficiantur om nia cum melle despumato, quod fuerit cōctum cum apozema te emblic. sicut in capitulo de melancholia nominauimus: de quo quotidie ad uicis magnitudinem sumatur. hoc namque hæmorrhoidarum, & mensruorum sanguinem constringit fluxui quoque uentris longi temporis remedium affert.

Sed ad hæmorrhoidas, rhagadias, & ani fistulas cum Rasi exponendas accedamus. hæmorrhoides à græcis dicuntur uenarum in sede explicationes dilatationesq; de quibus lo quitur Rasis ibi [cum sanguis recens &c.] de rimis ani, si

Io. Marinelli h 4 uc

ue rhagadiis [cum uero in ano rhagadias habuerit patiens] de fistula [fistula uero generatur in ano uelociter &c.] ex quibus rebus facile cognoscitur horum morborum aliud ab alio deduci posse. hæmorrhoidarum quædã sunt cœcæ, quæ scilicet intumescunt, & nihil, aut parum admodum sanguinis excernunt, quarum curatione Rafis adhibet illis uerbis [cū autem in ano oritur aliquid præminens] alia aperta, quæ ni mirum certis quibusdam temporibus panduntur, ac sanguine emittunt: quas recenset, cum inquit [cum sanguis recens] ex quibus colligitur hæmorrhoidas non esse constringendas cum nuper in lucem proderint, nisi ægri uires debiliores in dies efficiantur. fiunt autem hæmorrhoides propter copiam sanguinis fœculenti, & melancholici, quem iecur ad ipsas reponit, signa, per quæ malum deprehenditur, non admodum requiruntur: oculis enim utrique, uel tactu talem deprehenduntur. sed cum sanguinis uacuat copia uires iam decedere inciperit; alius casia aut iure pingui, aut decocto brassicæ est leniēda, ne stercois durum eas sedat. fistulis præterea sanguinē quatuor generibus: uictus ratione frigida astringente, uel ut docet ibi Rafis [in comestione quoque sumat sumachiā, & cibum, qui cum succo uuæ acerbæ sit &c.] deinde iis, quæ auertunt: ut sectione uenæ basilicæ, dextræ, cucurbitulis hypochond. dextro affixis, frictionibus ligaturæ, & brachiorū foribus. post hæc sanguinem crassum reddamus, & uenarum illarum ora contrahamus refrigerantibus sumptis, & admodum, ut syrupo myrtino, cydoniorum, granatorum cum aqua rosarum, solatri, plantaginis. optime conferunt trochisci de carabe, de quibus sic loquitur Rafis [si autem ex eo debilitetur, & indiget constrictione, trochisci de carabe cum succo sumach dentur] laudatissimum est remedium saccharum rosatum cum boli armenicæ, uel hæmalthicæ, uel corallii rubri drach. i. horis duabus ante cibum. hæc si non profuerint, cōpositum ē scoria ferri à Rafis hoc modo descriptum patetur [R. mirbalanorum indorum, bel. &c.] uel tryphæ Phe. nonis ʒ. i. intrinsecus, & extrinsecus applicada propinanda que sunt ea quæ eandē habeant facultatē, quā diximus. Quartum genus sanguinis hæmorrhoidalis sistendi est, ut eius nitium emendemus. idq; euenerit, si uictus largior fuit; tenui utamur: si aquosior: siccante. si biliosus: cholagogis: si pituitosus phlegmagogis: si hæmorrhoides doleant: anodinis, ut lacte cocto, uittellis ouorum, œlypo, uel butyro recenti.

Si autem in ano oritur aliquid prominens extra, ex quo magnus provenit dolor, nec ab eo fluit aliquid; succus cœpæ cum panca lana, aut fel uaccinum superponatur. suppositorium quoque longum de cyclamine subiiciatur, quod patiens per totam teneat noctem. et, si contingat egredi, remittatur, donec infrigidetur, & egrediatur sanguis. cum autem dolor uehementissimus fuerit, & apostema magnum in ano; phlebotometur æger: & emplastrum postea superponatur; sedat enim hæmorrhoidarum dolorem, cum adest apostema cum eis. quod recipit melilotum, chamæmilam: quæ tam diu in aqua coquantur, donec dissoluantur. deinde sumatur ex aqua decoctionis earum, quantum una manu capi potest, uittellus oui assati unius, croci drachmam. i. opij drachmas duas, seminis lini triti, fœnugræci, malua-nisci omnium ana manipulum unum. conficiantur omnia ex rob, in quo bdellii drachmæ tres fuerint dissolutæ ex folio superposita. postquam eorum superficies ex oleo sesamino, in quo adeps gallinaceus fuerit dissolutus, aut anatis, iuncta fuerit; more emplastri superponatur dum adhuc sit tepida. alia confectio dolorem, & apostema sedans. cœpe album optimè coctum teratur, & cum butyro uaccino misceatur, ut mollescat, ut tepescat in ano, in quo est apostema, superponatur; hoc enim dolorem sedat uehementem.

Primū signa hæmorrhoidum occultarū ostēdit Rafis, hoc est [si autem in ano oritur aliquid prominens extra, ex quo magnus provenit dolor, nec ab eo fluit aliquid] deinde eas curat: quæ si uel tumore ingenti dolent, nec dolor est uehementis; naturæ permittit, ne apertæ, quod, si tumoris, aut doloris

magnitudo cōpellat: quod sæpe cancri, & fistulæ, & affectus alii difficiles his partibus per ualentia remedia apertis superueniunt; in primis alius quoque lubrica est reddenda, ut antè paulò docui, ne stercois durities dolorifica fluxionem geminet. sanguis etiam malus, si abundet, corrigatur uictu idoneo, & cæteris: & emittatur deinde hæmorrhoidibus apertis per hirudines, aut scalpellum, aut ut nunc docet Rafis [succus cœpæ cum pauca lana, aut fel uaccinū superponatur suppositorium quoque longum de cyclamine subiiciatur &c.] quæ cum fluxerint, uel, ut inquit Autor, [cum dolor uehementissimus fuerit, & apostema magnum in ano] post sanguinis missionem, ut antea diximus; dolor leuiatur oleo uiolato, uel rosato, uel amygdalarum dulcium, uel lini, uel lumbricorum, millepedarum, scarabeorum cum uittello oui, uel [emplastrum superponatur: sedat enim hæmorrhoidarum dolorem cum adest apostema. quod recipit &c.] mica panis cum lacte, & oui uittello cocta albumine tandem adiecto, & adipe gallinæ præstantissimum est remedium. Simile quoque est illud Rafis [cœpe album optimè coctum teratur &c.] sedat enim grauissimos dolores. inleffus, aut focus est saluberimus: qui fiet ex decocto maluæ, althææ, uiolarum, florum chamæmeli, meliloti, capsi, nymphææ, se. lini, fœnugræci, papaueris albi, & hyoscyami albi, quæ nisi suffecerint, stupefacientibus tactum dolor est prohibendus.

De ani rhagadiis.

Cum uero in ano ragadias habuerit patiens, quæ cum leuiant cum ipsius uenter sicca est; pil. de bdellio utatur, quæ recip. myrobalanorum nigr. chebulorū amborum ana drachmas decem, sagapeni drachmas tres, nasturtij albi drachmas duas, bdellij albi, mollis, & pinguis drachmas quindecim. dissoluatur bdellium in succo porrorum, & ex eo conficiantur alia, & informentur ex eis pilulæ, & sumatur ex eis frequenter à drachma una usque ad drachmas quatuor. locus uero, si adustionem patitur; ex unguento de cerussa inungatur. si autem non sentitur in eo adustio; unguatur ex unguento, quod fit ex adipe, quod in gibbo cameli inuenitur, & bdellio, quod sic fit uidelicet. unguentum de sene. recipe cere citrinæ, olei sesumini, adipis anatis, medulle cruoris uaccinæ, adipis, qui est in gibbo cameli, bdellij omnium partes æquales. bdellium prius mucilagine seminis lini dissoluatur, deinde omnia misceantur; hoc enim optimum existit. si autem æger ragadias in ano habuerit profundas, à quibus satens uirus fluxerit; medicamen acutum, quod in capitulo de ulceribus oculorum descripsimus, ei superponatur quod æger per duos dies patiat. & si in eis aliquid remaneat, quod resudet; medicinam iterum apponatur: quod eo usque fiat, donec locus siccetur, & non resudet, si fuerit profundus. quod, si ea, quæ ibi sunt eminentia extra pendencia fuerint in tantum, ut arescant, et nigrescant; butyrum tepidum multoties superfundatur, donec nigredo ab eo remoueatur. si autem resudatio reuersa fuerit; acutū medicamen iterum ibi apponatur. & si non resudauerit; ex unguento de cerussa curetur. & etiam quando eminentes hæmorrhoides extra; curamus cum ferro canterizando: loqui tamen de hoc plus est, quam huius nostri libri modus requirat.

Rimæ sedis, quas græci ζαχιδες uocant, sunt scissuræ, quæ in musculo anum claudente aut in circulo, & extrema ani corona fiunt: similes iis, quæ in labiis ob boreā flatum asperiores accidunt. hæc euenire solent propter acrim humorum defluxum, aut inflammationem, aut condylomatum extensionem. morbus ipse oculis obuius est: itaque notis non indiget quæ in eius nos cognitionem ducant. Sed curandi ratio ea sit. Si rhagades ab acrimis humoribus oriuntur: tū ii omnium primum purgandi sunt, ac contemperandi, uel maxime pilulis utatur de bdellio à Rafis hoc pacto compositis R. myrobalanorum nigr. chep. ana. 3. ʒ. ʒ. sagapeni. 3. ʒ. nasturtii

flurtii albi. 3. 2. bdellii albi mollis, & pinguis. 3. 1. 5. dissoluatur bdellium in succo porrorum, & ex eo conficiantur alia, & pilule formentur. quod, si locum male affectum ardor, & inflammatio affligat; unguento candido caphurato hodie uocato illinendus erit. quod uerba illa declarant [locus uero si adustionem patiatur, ex unguento de cerussa inungatur] quod habet olei rosati, albuminis oui partes aequales. cera, & cerussa, quod satis est. alius etiam toto curationis tempore cibis humectantibus, & pinguibus mollienda. huius autem generis sunt malua, spinachia, lac amygdalarum dulcium, oua sorbilia, in scula pinguis, & id genus alia. sunt tamen nonnunquam ob frigiditatem, siccitatemque rhagades sine ulla inflammatione: quarum curationi adhibemus calefacientia, & humectantia stiptica. tale quidem est unguentum de adipe camelli, & bdellio à Rasis sic commemoratum [R. ceræ citrinae, olei selamini &c.] in loco adipis camelli quidam ponunt caprinum. uerum, si rhagades erunt profundæ, ac ulcerosæ, à quibus fortens uirus fluat; primum mitioribus procedendum est medicamentis, & tandem, si erit necesse; ad medicamen acutum, quod Rasis explicat, poterimus peruenire. quod toties faciendum, quod putredo illa remoneatur, & consolidetur ulcus. consolidatio fiet postea cum unguento de cerussa: aut recipe olei rosacei, myrtini ana. ʒ. i. thuris, malthiches, lithargyrii, sanguinis draconis ana. ʒ. i. aloes, plumbi usti, cerussæ, balaustiarum, boli armeni ana. ʒ. s. ceræ albæ quod satis est. fiat unguentum. cauteria omnino sunt uitanda, ne fistula superueniant, ad quarum curationem nunc transeamus.

De fistula ani.

Fistula uero generatur in ano uelociter; quoniam figura eius facit esse illud necessarium. quæ aut sunt penetrantes, aut non penetrantes utrinque. cum autem perforata sunt; utrinque stercus egreditur ex eis, & uentositas. si autem non egreditur stercus neque uentositas; non est penetrans ab utraque parte. loqui uero de eius cura perfectè plus est, quàm hic noster liber exponat. sed, quia omnes fere homines semper maximum incurunt errorem in cura eius, unde & maximum incurunt nocumentum; nos excitabimus eos ad hoc, quod huic ægritudini congruum erit. & ostendemus, qualiter à prædicto errore se custodiant. & dicemus, quod, si fistula utrinque perforata, cum ab ano remota fuerit; nullo modo ferro tangenda est: in incisione enim ferri contingit stercus inuoluntariè egredi. est etiam aliud, quare fistula ab utraque parte perforata ferro tangi non debet; quia toto tempore uitæ ægri sic permanere poterit non magnum faciens nocumentum: neque prouenit ex ea aliud nisi resudatio, & fluxus. si autem illud, quod ab ea fluxerit acutum fuerit, & mordacitium, & fætidū habuerit odorem, cuius etiam quantitas quotidie augeatur, erit fistula putrida, & cum hoc perpe, & est iomeno; cui ex medicamine acuto, & ex eo, quod complet omnia succurrendum est, antequam dilatetur, & magnificetur. cum autem non resudauerit nisi parum, neque eius quantitas quotidie augeatur, neque magnificetur, neque odor ibi augmentatus fuerit; non est in ea aliquid, quod sit timendum nisi resudatio, & fluxus: qui medicari potest, donec sicceatur, & detumescat, & non resudet per longum tempus. si autem resudatio redierit; medicamen prædictum adhibeatur. & hoc modo poterit blandiri per totum tempus uitæ ægri: & non nocebit. modus adhibendi huic ægritudini medicamen ex collyrio, quod in capitulo de fistula oculi nominauimus, sumatur, & optimè teratur, & fistula prematur, donec quicquid in ea continetur, egrediatur. & si radius eam ingredi poterit; inmoluetur cotto: deinde ex prædicto medicamine, postquam mollificatum fuerit; intinctus in fistulam immittatur. si uero in ea minime radius ingredi poterit; dissoluatur medicamen in aqua, & subleuetur co-

xa ægri supposito puluinar, & eo supino iacente prædictū medicamen dissillando super fistulam fundatur. & fiat hoc in mane, & circa noctem per tres dies: & sedeat in aqua de curcuma, & lauetur ex ea.

Quandoquidem ex mala ulcerum curatione, & præcipue circa sedem sæpe fistula succedit; consequenter de his dicendum est. fistula est sinus callo obductus aliquatenus indolens in pluribus nascens particulis: magna uero parte ex abscissi bus oritur parum dextre curatis. callus autem est continua quædam caro albida, madoris experts, eoque etiam doloris neque uena, neque nervo ad ipsum pertinente. ani fistulæ notatur inde, quod ore apparente, aut non apparente dolor ipsis oboritur, & purulenta humiditas per anū profundatur. sed duplex est uel perforata, uel nō, utrinque. indicia præter cultrum excisorium, aut setam porcinam demissam nōscuntur, quia, ut ait Rasis [cū perforatæ sunt, utrinque stercus egreditur, & uentositas] non perforatæ itidem cognoscuntur cum inquit [si autem non egreditur stercus, neque uentositas, nō est penetrās ab utraque parte] sed de signis alijs fortasse copiosius differemus. quod ad curandi rationem attinet, fistula utrinque perforata non est ferro tangenda: cui opinioni assensit primum Rasis ibi [& dicemus, quod si fistula &c.] deinde Aui. qui negat nisi fuerit nocumentum cursus plurimum, id est, uirus, & fœtor superfluous non erit malum eas dimittere, ut cum ferro non tangantur. quod aliter factum esse ab antiquis declarat Rasis. sed inquit Paulus, si qui timidiuſculi chirurgiam fugiant; Hippocratica uti debent deligatura. iubet siquidem Hippocrates linum quintuplex crudū per cultrum foratum, uel specillum fistulæ demittere, & lini principia coniungi, ac quotidie, donec corpus totum, quod duabus oris intercedit dissectum linum eructet. uerum lege Pauli, qui abudè de hac re differit. quapropter iubet Rasis, si pus exiens fuerit acutum, & mordicans, & mali odoris, & continuum, fistulaque putrida; cum medicamentis acutis, ne maior in dies euadat, corrigi: sed primum cū leui, & nonnihil potenti, quale est unguentum apostolicū, uel centaurium deinde cum mundificantibus saniem: postea, ubi caro iam nuba apparuerit; cum abstergentibus & siccantibus, ut est aristolochia cum melle, & pauco sale parata. tamen, si fistula huiusmodi generis fuerit, quod emittat parum uirus, & omnino à prædicta differat, ea facile curabitur. uerum, si ad pristinum statum redierit; medicamen, modūque docet Rasis.

De egressione ani, & matricis. Cap. 4.

Cum anus extra egreditur carens apostemate, & ita disponitur, quod, si impellatur; ingreditur; cerussa, balaustia, gallarum, aluminis, antimoniū omnium partes sumantur aequales, & in puluerem redigantur: & super anum ex oleo rosa. calefacto inunctum puluerizetur: & anus intromittatur & constringatur. quod tamen fieri conuenit; postquam æger à sella reuersus fuerit, ne eum cito ad selam surgere sit necesse. sumatur etiam galla, balaustia, cupule glandium, folia myrti, & coquantur in aqua donec rubea fiat, & sedeat in ea, & lauetur ex ea. quod, si anus, qui apostemosus est, ingredi minime potest; æger aquam calidā frequenter ingrediatur: & in ea sedeat. ungat anū ex cera, et oleo chamæmelino, aut anethino, donec ingrediatur. cumq; intromissus fuerit ex his quæ nominauimus curetur.

Accidit interdum, ut pp musculorū obliquorū sedē sursum reuellentium resolutionem, aut imbecillitatem anus procidat. quapropter sit, ut manibus, aut medicamentis opem ferentibus egeat. huius curatio alia est, si anus est inflammatus alia, si non. si autem anus nulla inflammatione occupatus exciderit; statim impulsus in suum locum protundi, ac reponi debet. sed, ne iterum procidat; adstringentia extrinsecus medicamenta apponenda sunt. id quod confirmat ibi Rasis [cū anus extra egreditur carens apostemate, & ita disponitur, quod, si impellatur; ingreditur; cerussa &c.] uerum, si sedis procidentia ab intemperie fuerit humida, siccabis: si frigida; calefacies: si utraque; & calefacies, & siccabis: idque cum medicamin

dicamine adstringenti, ut est dictum. primum igitur oleo rosaceo calente circūlinendus, aut uino stiptico detergendus est anus: ac subinde in suum locum repositus deligandus erit. idque statim fiat, ut excreuit æger, ne, ut monet Rasis, cum ipsum ad egerendum iterum necessitas urget, denuo procidat. incoquenda præterea sunt in aqua, donec tubescat, galla, balauftium, glandium calices, malicorium, cortices granatorum, cotoneorumque, & similia, ex quorum decocto in fessus, & ablutiones parentur. post hæc aut arida admouere, ac inspergere medicamenta licebit, ut bolus armenius, thus, sanguis draconis, galla, acacia, myrrha, & eius generis adstringentia medicamina. uerum, ubi anus inflammatus fuerit de quo Rasis hoc modo loquitur [quod, si anus, qui apertissimus est, ingredi minime potest] ita, ut in tumore elatus impelli, & reponi nequeat; antequam Rasis medicamenta adhibeamus; si circumstantiarum ratio postulatuerit; uelut plenitudo; tum primum uena erit secanda, et uomitus ciendus. sed etiam in principio apponemus adstringentia, & reprimentia. tamen, si nulla fuerit plenitudo; æger in aqua calidam, ut uult Rasis, conscendat, & illic ad tempus immoretur: uel concinnetur fessio ex decocto chamæmeli, maluz, althææ, sem. lini, foenugreci, & similibus. postea illinatur locus ex unguento santalino, uel oleo rosaceo, myrteo, cydoniorum puluere à Rasi iam descripto insperfo. & tandem quoniam sedes procidit tum à uiolento desidendi, & cohabitæ respirationis conatu, tum ex mora longa in aqua frigida, aut super lapide, tum ex tumore præter naturam, aut ex decubitu pituitæ; purga primum, post intemperiem impressam corrige.

De egressione matricis.

Vulua præterea, si egressa fuerit; similiter erit medicanda. est tamen necesse, ut fortiter ligetur, et ut ægra semper supina iaceat, & coxa superius eleuetur.

Vterus procidit raro quidem, sed nonnunquam fit laxatis humore multo ligamentis, uel abscessu, ac ulcere exessis aut partu improspere, uel lapsu ab alto ruptis. causam, nisi inflatio prohibeat, auferemus, & uterus loco nativo restitueremus, ac medicamenta, quæ iubet Rasis superius dicta tunc poterimus admouere. Si aliqua erit inflatio; ea est dissipanda foris ex cumino, aniso, baccis lauri, & eius generis aliis, quæ hydromeliter, aut uino rubro adstringente sint cocta. mox, ne recidat, insperges pulueribus stypticis ante scriptis à Rasi: postea repones. Doctor præterea nos monet laborantem figurare supinam post factam ligationem, ut coxas habeat sublimiores, poplitesque flexos cruribus diuarcatis. Sed primum conuenit foeces clystere prius euacuari, urinaque excerni, quod uulua undiqueque sit libera. cucurbitulæ quoque agglutinatæ cum flamma copiosiore umbilico maxime conferunt. suffitus etiam graueolentium est præsidium salutare, ut pennarum perdicis, gallinarum, asinæ foetidæ, castorii, & similibus per infundibulum, uel cathedram perforatam exceptorum. odoranda sunt simul iucunda: & interim obstetrix manibus subleuiat.

De superfluitate mēstruorum constringenda. Cap. 5.

Pro superfluis mēstruis constringendis trochisci de Kabe per hebdomadam unam sunt dandi. quod, si non contulerint; confectio de scoria detur: & fiat minutio ex basilica. uentose quoque ad mamillas apponantur, & in comestione cibis utatur stypticis. & hoc medicamen æger sibi sibiiciat, quod recip. olibani, balauftiarum, gallarum, antimonij, acatiæ, aluminis omnium partes æquales. puluis horum optime tritorum cum pauca lana subijciatur. fœmur uerò, & dorsum ex epithimatis, qua in capitulo de fluxu uentris nominauimus, epithimetur: & sedeat in aqua de curcuma. quod, si ista non contulerint; ex alio pessario acuto fiat immissio, & maneat in uulua.

Nimix mensum purgationes mulieribus sunt; quando ultra consuetum tempus purgationis magna copia effluxerint. tempus uerò purgationis nullum statutum est, nullumque ordinatum: siquidem multis ad duos, tresque dies: haud paucis usque ad quintum: nonnullis & ad septimum: rarissime ad duodecimum usque purgantur. id uerò accidit propter aperta, aut fracta uasa uel magna, uel parua: ob partus grandiores, aut abortus. Sequitur ad redundantes sanguinis eruptiones decoloratio, ac coloris uitatio, aliquando cum febre, aliquando citra febre, appetitus prostratus, & difficilis concoctio. sæpe etiam pedum, ac totius corporis tumores, & omnia, quæ ad nimium hæmorrhoidum fluxum consequuntur, sunt. curatio igitur, quam & Rasis adhibet, ea sit, ut imprimis extremi artus ab alis, & inguinibus uinculis excipiantur: uel sanguinis missio fiat ex basilica. cucurbitulas etiam leues iuxta Hippocratis, & Rasis sententiam magnas subter mamillas affigere conuenit. cibis, & potionibus austeris, & adstringentibus utantur tamen imperandum est unius, aut alterius diei ieiunium. quod si tolerare nequeant; panis micæ sive posca exhibebimus, aut alicam lotam, aut orzyræ ex posca, aut ouum forbile molle frige factum. asis autem potius, quam elixis uescatur ægra; carnis maxime, quibus suapte natura deficandi facultas inest; ut auim montanarum, & agrestium animalium. uino abstinentum est, eiusque loco hydromel austerum, aut omphacomel, aut huiusmodi quippiam ipsi exhibeatur. motum uitet. sumat adhuc syrpos, ut rosaceum, & myrrinum. mirificè ualent trochisci de carbæ à Rasi commemorati, itemque compositum è scoria ferri: uerum pilulæ, quæ habent sanguinis draconis, boli armenij, coralliorum, olibani, gum. arabici, opij, lapidis hæmatitis partes æquales: atque cum succo plantaginis compositæ, negligendæ non sunt. quid de his, quæ accipiunt terref. lemnæ boli armenij, thuris, mastiches, gallarum singu. 3. 2. sanguinis draconis, hæmatitis utriusque 3. 1. cornu cerui uulsi drach. 1. hypocistidis, acatiæ, coralliorum rubeorum sing. drach. s. balauftiorum, rosarum purpurearum utriusque 3. 2. succini 3. 1. formetur pilulæ de quibus excipiantur syrpo myrrino pondus drach. 1. hæ quidem maximam habent facultatem mensum sistendorum. pessulorum usus non contemnit Rasis; qualis est ille ab eo paratus, qui recipit olibani, balauftiorum, gallarum, antimonij, acatiæ, aluminis singu. partes æquales, quorum puluis tenuissimus lana rosaceo intincta exceptus in mulieris pudendum immitatur. cui tum uirtute, tum simplicibus medicamentis simile erit is, qui habet thuris, balauftiorum, gallarum sing. drach. 1. boli armenij. 3. 2. gummi arabici, acatiæ, succini, cornu cerui uulsi singu. 3. 2. extrinsecus loca, uelut fœmura, & dorsum, & huiusmodi alia oleis rosaceo, myrrino, cydoniorum, & uino austero foueantur: adhibeanturque unguenta, emplastra, cerata, & epithemata adstringentia; quale supra in capite de fluxu uentris dictum est. infessus etiam ex decocto curcuz, si sanguis frigidus sit, & aquosus: uel aliorum medicamentorum simplicium; si alia necessitas urget; parati conueniunt. hæc si non sufficiant; ad fortiora te conueras.

De prouocatione mēstruorum. Cap. 6.

Cum ex retentione mēstruorum magna sequitur passio; trochisci de myrrha dentur, qui recip. myrrhæ drachmas tres, lupinorum optime tritorum drachmas quinque, foliorum rutæ, mentastri, pulegij, cymini, rubæ, de qua tingitur, assæ, sagapeni, opopanax omnium ana drachmas duas. informantur trochisci ponderates drachmas duas, ex quibus detur in die unus cum aqua, in qua seminum imperi coctum fuerit: hoc nanque medicamen ad uehemens existit in prouocandis mēstruis, ut etiam sætum excutiat, si qua eo sæpe utatur. uentose quoque sub curuatura poplitis sunt ponendæ, et phlebotomia ex sapena facienda est: postremo quoque uentose fœmori superponendæ. Supp-

Supprimeretur menstrualis purgatio uel naturaliter, uel præter naturam. si naturaliter, hinc deprehendemus potissimum, quod mulier nulla inde molestia uel totius corporis, uel uteri afficiatur. si præter naturam; morbi causa est interim totum corpus male affectum: nonnunquam locis peculiari uicio conflantibus ex frigidityte infesta, aut intemperie, aut ictu abortum, seu acquisita malignitate: sed plerumque ob hebetudinem, uel principaliori quadam parte primario affecta: ueluti iecinore, uentriculo, thorace, aut id genus aliqua longo morbo uitata. notæ sunt corporis grauitas, nausea, falditium, & horridi quidam discursus: similes quidem iis, quæ conceperunt, accidunt. dolores circa lumbos, frēmora, collum, finciput, & oculorum fundamenta existunt. præterea febres continuæ, urinæ nigricantes cum rubra quadam sanie, & aliquando urinæ difficultas, aut suppressio fit. uerum curandi ratio pro causarum diuersitate uariatur: nam menses si ob totum corpus male affectum retenti fuerint; quemadmodum ob sanguinis parsimoniam; ex inedia, aut uictu paruo, aut morbo longo, aut alia uacuatione suppressi propriè non sunt: nec cieri possunt, antequam mulier reddita sit habitior. si plenitudinis ratione menses detinentur, & nihil aliud prohibent; secunda est uena malleoli, aut poplitis: idque non ante statutum mensium tempus. itaque uel Rasi obtemperabimus, qui inquit [& phlebotomia ex saphena facienda est] neque etiam inutilis erit, si cruribus cucurbitulæ affigantur: quod idem declarat illis uerbis [uentose quoque sub curatura poplitis sunt ponendæ] & illis [postremò uentose foemori superponendæ.] plenitudo cognoscitur, quod mulieres menstruo tempore magis grauentur, doloresq; uehementiores circa lumbos, & pubem sentiant: uenæq; illis in tumorem insignem attollantur. si aliqua intemperies, qualis frigida, mensium profluuium impedit cum contariis abigenda est. cibi calidi sint, uinumque fuluum, odoratum, & antiquum. exercitia, & quæ corpus calefacere possunt, admodum. decocta præterea, fomenta, balnea, inunctiones, & similia parari possunt: est pulegio, thymo, calamintia, abrotano, dictamnio, radice iridis, casia, acoro, affaro, & fauina. tempora uerò his sumendis, aliisq; similibus medicamentis maxime sunt idonea: alterum cum purgationis hora aduenit: alterum post balneum, uel fomentationem. frigiditytis autem notæ sunt, quod mulieres somnolentiores sint, & ad omnem motum segiores, ac colore candidiores. contrà uerò sunt signa caliditatis quæ intemperies sic erit curanda. mulieres humectare oportet uberiore, humidiorq; cibo, ac potu: quales prius, & alicæ sorbitiones sunt: carnis uescantur agnorum, hoc dorumq; piscibus teneras carnes habentibus, auiibus, lacte: oleribus lactuca, cucurbita: fructibus ficibus recentibus. uinum bibant candidum, non admodum antiquum, & dilutum. balnea parentur aquarum dulcium, & ea omnia, quæ hecicis adhibentur. si menses morantur humores crassi, & pituitosi, uictus ratio extenuet, & alia medicamenta incendant, & ad expulsionem faciant: cuiusmodi est ille syrupus: qui recipit calamintia, capil. uene, buglosi singu. M. i. seminis foeniculi, anisi utriusque. ʒ. s. apii, anisi, asparagi, ruscii, stœcados, passulorum singu. drach. i. prassii, dauci, schinanti, cuscute singu. drach. ʒ. cinnamomi, aristolochie longæ, baccarum lauri singu. partem quartam. hæc omnia contrita bulliant ad tertie partis consumptionem, & adiecto saccharo fiat syrupus, cuius unc. ʒ. dentur cum decocto calamintia. aut ægra decoctum sumat, quod habet radicem acori, iridis, petroselinii, asparagi singu. ʒ. i. seminum apii, foeniculi, ruscii, anisi, dauci, ammi, urticæ singu. drach. i. calamintia, abinthii utriusque. M. s. origani, abrotani, artemisie, pulegii, affari singu. M. i. hyssopo. M. i. s. decoquantur in aqua, donec tertia pars absumpta sit. deinde color transfusus saccharum adiciatur, & albo oui purificetur adiectis syrupis de calamintia, hyssopo, marrubio singu. ʒ. i. s. fiat potio, de qua quotidie in aurora detur pondus. ʒ. 4. digesta materia purgatorium aliquod sumatur medicamen; quemadmodum est hiera picra, pilulæ aureæ, de

agarico, & huiusmodi alia. inunctio quoque fiat hoc unguento, quod accipit olei liliacei, rutacei utriusque. ʒ. i. artemisie, pulegii, calamintia singu. ʒ. i. radice iridis. ʒ. 2. hyssopi, origani utriusque. ʒ. 3. cum cera, quod satis est, fiat unguentum. dein parietur hoc balneum. R. fauinæ, iuniperi, saluæ, rucæ, parietariæ, serpilli, roris marini, artemisie, maluæ, calamintia, asparagi, ruscii singu. M. i. singula bulliant in aqua, in qua sedeat mulier, lauaturq; rochisci tandem de myrrha, qui à Rasi traduntur, exhibeantur. mulieres pingues curabimus uictus ratione extenuante, exercitiis uelocibus, & his medicamentis, quæ exilius corpus reddere possunt: contrà graciles curabimus ægrotantes. si mensium profluuium impedit uel uteri uitium, uel iecinoris, uel uentriculi, uel cuiuscunque generis aliud; principio causam remouebimus: deinceps ad mensium prouocationem progrediemur.

De rhagadiis uulvæ. Cap. 7.

Hæc curanda sunt ex medicamine de rhagadiis ani. pessarium quoque ex adipe anatis, & hyssopo, & ceroto, & medulla cruris ceruini mixtis cum cera dissoluta in oleo de lilio, aut narciscino subijciatur, si nec febris, neque acuitas affuerint. quod, si illud fuerit cum calore, & acuitate; oleum rosaceum adhibeatur. ex unguento quoque de cerussa similiter fiat pessarium. si autem calor fuerit uehementior; sumatur succus portulacæ, aut lactucæ, aut mucilago psyllii, & fiat tabula de plumbo similis marmoris, in qua teruntur colores, habens in circuitu labium paruum. & ponatur in ea aliquid de prædictis succis, et cum pistello plumbeo super ipsam moueatur, ut de plumbo prædicto liquori multum misceatur. & in ipsius succus, ex quo fiat pessarium; postquam oleum rosaceum ei admixtum fuerit, & superponatur: hoc enim medicamine cancro uulnerato, qui est in matrice, optimum existit, & alijs ei similibus.

Rimæ in uulvæ ostio ex enixu uiolento uel materia frigida sunt: quod fortasse ibi declarat Rasis [si nec febris, neque acuitas affuerint] curatq; [pessarium quoque ex adipe anatis.] sed & ex materia calida, & humorum acrimia influxu locos rumpente, ac corrodeute fieri solent. notas, atque curationem adhibet Rasis, cum inquit [quod, si illud fuerit cum calore, & acuitate; oleum rosaceum &c.] uerum primum latent: postea paulatim ad sensum perueniunt: nam & ad manuum contactum, & in coitu dolores excitantur. in primis igitur chirurgiam, & omnia pharmaca mordacia reprobare oportet. deinde ea sit curatio, quæ & ani descripta est. quapropter, si ex causa frigida fiant rhagades; præter pessum à Rasi paratum curentur illitæ cefypo, & butyro recenti sine sale: aut oleo resudante ex nucis ueteri. dum uritur: aut iris illyrica terebinthina excepta imponatur. quod, si ex humorum calidorum, uel acrimia influxu oriatur; oleum rosaceum, uiolatum per mortarium plumbeum pistillo plumbeo ductum, donec mellis habeat crassitudinem, adhibeatur: uel ex unguento de cerussa caphurato dicto fiat pessulus. tamen inflammatione in dies ægētī pessum paremus à Rasi traditum ibi [sumatur succus portulacæ, aut lactucæ &c.] est quidem admodum utilis cancro ulcerato. uerum præstantissimum est illud remedium, quod habet dragaganti, gummi arabici in aqua rosarum infusorum, cerussæ lotæ, olibani, sanguinis draconis singu. drach. i. lythargirii drach. s. olei rosacei drach. ʒ. cum cera, quæ satis sit, fiat unguentum liquidum. decoctum quoque inicitur tale, quod recipit cerussæ, aloes, olibani, sanguinis draconis, boli armenii singu. drach. ʒ. bulliant in aqua debitæ quantitatis, donec prima, & secunda pars sit absumpta: & colore transfundatur.

De ulceribus

De ulce. & apostemate, quod fit in matrice. Cap. 8.

SI cum apostematibus istis adest calor, & febris: phlebotomia ex basilica fiat: et patiens aqua hordei nutriatur, & liniatur renes, & femur, & ilia, & fumen ex epithimate apostematis calidum: et in frigidetur locus, quantum possibile est. si uero, postquam febris, et acuitas quieverit; remanserit ex apostemate aliquid; ex unctionibus liquidis curetur: et mulier in huius liquidis sedeat, donec mollescat, et maturetur. pessarium mollificans dura apostemata matricis, et cōserens doloribus in ea factis, et paulatim ea quiescere faciens. recipe adipis anatis, medullæ cruris ceruini, medullæ cruris uaccini, bdelii mollis, croci, uitel. oui assati, sæcis olei de seminibus, sæcis olei de lilio omnium ana partes æquales. dissoluantur in uino, aut rob: et fiat ex eis pessarium: est enim optimum ad sedandum dolorem, et mollificandum duritiem matricis. patiens præterea sedeat in aqua in qua conquantur fœnugrecum, et chamæmilla, et melilotum, et caulium extremitates sigillatim, aut omnia simul.

Nunc ad uulua calidos abscessus transeamus, ac primum ne facti augeantur, uerum remoueatur, doceamus: deinde, nisi remittentur; quo pacto suppurauerit, caliditateis notæ sunt illa uerba [si cum apostematibus istis adest calor, & febris] ne abscessus augeatur [phlebotomia ex basilica fiat &c.] suppurauerit, si illa audiemus [si uero postquam febris &c.] præter dicta à Rasi notatur abscessus caliditas à dolore acuto, siti, linguæ nigredine, extremorum membrorum sudore, interim uocis amissione, spasmus, & syncopi. urina est rubea, pauca, & frequens. quo ad uictus rationem remoueatur causa. unde cōuenit aqua hordei, lactuca, cucurbita, uinum granatorum, carnes hoc dicitur. sed prohibet Auic. in principio cibum, & potum, ac iubet nulsionem sanguinis fieri primum ex basilica: postea ex saphena. præterea exhibeantur syrapi rosacei, uiolacei, de nenuphare, & huiusmodi. euacuatio fiat ea, quæ humores corrigit peccantes. illinantur renes, fœmur, ilia & fumen ex epithimate parato è ossis, caphura, lentibus excorticatis, uiolis, portulaca, & similibus. quod, si abscessus aliquis remanserit: ad suppurationem ducatur cum medicamentis maturantibus, ac dolorem sedantibus: quale est pessus à Rasi descriptus. mirifice etiam conferunt emplastra, fomenta, illinationes, pessuli, lectiones ex althæa, fœnugreco, chamæmillo, meliloto, anetho, malua, croco, semine lini, lana non abluta, spica, bliti, & id generis huiusmodi cum oleis, medullis, & adipibus paratæ.

De ulceribus, quæ fiunt in matrice, & eius cancro. Cap. 9.

Cum à uulua fluxerit sanies spissa, aut uirus tenuis si ex propinquo manat loco, neque fuerit ibi profunditas fœtida, neque putrida; sumenda sunt aloes, & myrrha, & sanguis draconis, & sarcocolla, atque olibanum, & loco superponenda, donec consolidetur. si autem ex loto manauerit remoto; ex pessario quod nominauimus in cap. de sang. & sanie, fiat prodispositio. si autem, quod fluxerit, est fœtidum odorem habens malum; ex pessario secundo acuto fiat iniectio: postquam locus mundificatus fuerit; ex aqua et melle iniectis per instrumentum æneum.

Exulceratur uulua ex infelici partu, aut foetu excusso, aut corrupto: uel ex medicamentis acerbis, uel fluore, uel abscessibus disruptis. Rasi uero duas curat ulcerum differentias: altera cum cancro, quæ est [si uero cum hoc, quod fuit &c.] altera sine cancro: eaque est [cum à uulua fluxerit] morbo non cancroso laborantes in parte agra dolorem punctuorum percipiunt atque ex interuallis fœtidi,

saniofique humores ex ulcere sordido excernuntur. cetera autem signa consequuntur malè habenti utero peculiaria, ut radices oculorum dolor, & similia. sed ulcus in conspectum ueniens specillo oriculario deprehenditur: altum uero, & reconditum ea, quæ excernuntur, indicant. huius morbi curatio constituitur ea, quam eius qualitas postulet. nam, si ulcus non cancrosum pus habet crassum, nec mali odoris; clementer est abstergendum cum aqua mellita, uel prassii decocto: eoque magis, si ulcus conspicuum fuerit. deinde Rasi medicamentum, quod habet aloes, myrrhæ, sanguinis draconis, sarcocollæ, & olibanum est malo applicandum. huius facultas uel cera glutinat. uerum, ubi generis ulcus non fœtidum, sed profundum fuerit; abstergentia primum, postea quæ ad cicatricem ducant, sunt adhibenda: uel quæ simul abstergant, glutinentque. itaque olim à Rasi paratum medicamen dissolutum in uuluum iniicitur. quod recipit seminis melonis, citrulli, cucurbitæ purgati ana drach. 10. boli armenii, gummi arabici, olibanum, thuris, sanguinis draconis singul. 3. 10. opii drach. 2. s. lemnis apii. 3. 2. figantur trochisci, qui in lacte dissoluti imitantur. quando autem humor defluxus fuerit fœculentus; abluamus aqua, ut tradit Rasi mellita, uel prassianæ cremore cum melle, uel mulla, si opus fuerit, cum decocto radices iridis, aristolochiæ, absinthii, aut agrimonie. hinc pessulus acutus subiiciatur, cuiusmodi est illud. R. cerussa, sarcocollæ, olibanum, gummi arabici, apii, sanguinis draconis partem unam, aluminis usti partem semis.

Si uero cum hoc quod fuit, fuerit punctio, & dolor, & apostema durum, quod tactu discernitur; summo per cauendum est, ne ex alio acuto medicamine tangatur: sed fiat iniectio ex confusione plumbi, quam diximus; aut ex uigeto de cerussa. & phlebotometur ex basilica, et custodiatur ab omnibus, quæ coleram nigram gignunt, & seminibus, & speciebus, quæ pro condimento admiscuntur cibis.

Sequitur autem, ut ulcus cancrosum curemus. id uero conspicitur præter notas à Rasi positas ex ulceribus rosis, ac inæqualibus plurima ex parte fordibus, concreta colluie humorum ingrata. uictus ratio, cuius meminit Rasi illis uerbis [& custodiantur ab omnibus &c.] fit ea, quæ non succos melancholicos gignat; sed prohibeat potius. uenit basilicæ sectione utamur primū: mox, si corpus uitiosis redūdet humoribus; id purgemus. præterea reiectis iuxta Rasi sententiam medicamentis acutis, corrodentibus & causticis ad benigniora nos conferamus: qualia sunt ab eo nunc citata, & parum antea tradita adiciatur, si erit necesse succus, aut liquor stillaticius portulacæ, plantaginis, bursæ pastoricæ, & alia. uel Recipe rosacei olei 5. 2. adipis, & medullæ anseris utriusque 3. s. & subiiciatur. dolorem sedat, mirificeque confert illitio ex adipe gallinaceo, oleo chamæmellino, & uiolaceo parata. quod, si dolor iterum augeatur; ad frigida redeas, & paulatim ad calafacientia te uertas.

De præfocatione matricis. Cap. 10

Cum menstrua per longum spacium temporis reuenta fuerint, aut mulier à commixtione uiridū abstinerit, licet ualde affectauerit, & euenierit grauitas, & dolor in inferioribus partibus femoris, & senserit quasi aliquod sursum trahi à parte suminis; fortasse post ista superueniet ei syncopis, & quasi mortua cadet, perpendi quoque uix poterit, quod ipsa attrahat acrem, uel habeat pulsum: et forsitan præfocabitur, et morietur, et forsitan sanabitur: laboriose tamen. hæc itaque passia ilico, ut euenierit curanda est ex huius curatio ne et pedes fortiter fricentur, et ligentur: et uentosa magna superponatur, et obstetrici quoque præcipiatur, ut digitum

digitum oleo bene redolente inungat, et in circuitu oris nulus, dum est intus bene commoueat. naribus præterea conditi insuffletur, et circa aures ipsius uoces clamando proferantur, et nihil, quod bene redoleat, olfaciat: imo bene redolentia, et algasia remoueantur: et pestem, et eius in feriora ex eis epithimentur: et naribus malum reddeantia odorem applicentur, ut sterius, castoreum, et sulphur.

Suffocatio, seu strangulatus uteri, de quo in præsentia differit Rasis, nihil aliud est, nisi eiusdem ad superiora attractio. ad huius curationem duo pertinent: nempe uel præsentem sanare, uel impendentem prohibere. præsentem curat ibi Rasis [hæc itaque passio ilico ut euenerit] impendentem prohibet [cum autem sanitati restituta fuerit] fit strangulatus ob tensionem, quæ creatur à plenitudine, quæ ad mensurorum retentionem sequitur: idque confirmat Rasis [cum menstrua per longum spacium temporis retenta fuerint] accidit etiam non raro ob cohibitum semine, ut illa est Rasis sententia [aut mulier à commixtione uiri diu abstinerit] aliquando quoque propter refrigerationem tempore effluentis purgationis: interdum ob difficilem quempiam abortum euenit. notas, cum accessio propinqua est, describit illas Rasis [& euenerit grauitas & dolor in inferioribus partibus femoris, & senserit quasi aliquod sursum trahi à parte lumbinis] has comitatur torpor mentis, curium imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. cum iam instat: [fortasse post ista superueniet eis synopsis &c.] præter hæc mens desipit, sensuum instrumenta deprehenduntur, uox obmutescit, crura contrahuntur: deinde maxillæ rubere incipiunt, faciesque repletur. cum remittet: humiditas quadam ad tactum ex locis muliebribus præcedit, sonus quidam exauditur, ac aliquod ex intestinis progreditur, ipsaque mulsa paulatim laxatur, atque sic mens ipsis, & sensus redit. in accessione igitur non solum, ut inquit Rasis [pedes fortiter fricentur, & ligentur] sed etiam crura tota, corpusque totum deligare, atque perficere conuenit, ut animo destituta se se recipiant. cucurbitulas uero quemadmodum sentit Rasis [& uentosa magna superponatur] adglutinemus inguinibus, & imo uentri cum multa flamma, & leues, & eue te incisat: in uuluum autem, quando longius accessio se produxerit: unguenta odoratissima infusa ipsam solent detrahere, sicut oleum amaracinum: quod ibi declaratum est [& obstetrici quoque præcipiatur &c.] styrax, aloes lignum, cinnamomum, garyophyl. & similia naribus etiam iuxta illam sententiam [naribus præterea conditi insuffletur &c.] admoueatür foeniculus lucernæ nuper extinctus plumæ perdicum, uel gallinarum, aut lanæ, faciniæque combustæ, solæ calciamentorum, cœparum, uel aliorum cortices, capræ cornu combustum, pix super carbonibus eliquata, galbanum, castorium, & huiusmodi alia. itaque foetida naribus admoueantur, pudenda ex odoratis suffiantur. mulier etiam maximis uocibus excitetur, propriumque nomen inclametur. ex dictis, ut opinatur ibi Rasis [& pestem, & eius inferiora ex eis epithimentur] fiant epithemata [& naribus malum reddentia odorem applicentur] nam ea sunt admouenda, quæ sternutationes excitant: ut est struthium, castorium, sulphur, piper, & similia.

Cum autem sanitati restituta fuerit: ex hoc medicamine curetur, ne agritudo redeat, quod si hæc agritudo post mensurorum uenerit restrictionem: ea dentur, quæ menstrua provocant, & in pedibus fiat minutio, & uentose in eis apponantur. si autem post longam uiri disunctionem contingat, ex quo etiam sæpe accidit: incipiat uiri consuetudinem habere, aut obstetrix iteret illud, quod sæpe diximus, in omni paucio tempore: aut medicamina, quæ minuant spermata dentur, quæ prædiximus. & dentur trochisci de myrrha, quos in cap. de mensuris pronocandis nominauimus.

Dicit autem Rasis: ut impendentem prohibeamus suffocationem, ubi accessio quæ uerit: prædicta medicamina renouemus. sed, quoniam omnes leuat uomitus, & eas maxime, quæ à cibo infestantur: ad uomitum cogantur. si causa morbi est mensurorum suppressio, ut iubet Rasis: ea pro uocabimus. unde exhibendi sunt trochisci de myrrha, de de quibus alias locutus fuit. in tertio die lumbis, & illis cucurbitulæ cum scarificatione applicentur, & sanguinis missio, ut illa uerba sonant [& in pedibus fiat minutio, & uentose in eis apponantur] fiat. ne autem postea ex feminis corruptione in id graue symptoma mulier incidat, si nubilus, uel nupta est uiro suo tradatur: si non uult nubere, uel monialis est: uena sæpe secetur, interdicianturque uinum, carnes, oua, &c. semen, & sanguinem augmentia. deambulationes, labor multus, ieiunium, gestationesque imperentur. sedula obstetrix ea, quæ antea tradita sunt, repetet. & tandem semen gigni prohibentibus, & genitum abstinentibus utantur agræ.

De gibbositate.

Cap. 11.

Qum gibbositas fieri incipit: pilule maiores de hermodactylis dande sunt, & oleum de rasni cum apozemat e de seminibus sæpe sumendum. locus quoque de oleo sambacino, in quo styrax liquida, & castoreum, & euphorbium resoluta sint, frequenter inungendus, & à frigidis cibis abstinendum. aqua etiam calida, in qua colla sint mentastrum, & samfucus, & stachas arabicum ab alto super locum distillanda est. deinde frequens frictio, et inunctio ex oleis calidis facienda est. Quod, si sis, qui hanc patitur agritudinem, puer fuerit: balneum solummodo, & unctioes sufficiunt ex his, quæ diximus.

Gibberum quidem dicunt eum, qui spondiles à debito loco remotas habet. huius morbi genus fit uel ob percussionem, & huiusmodi alia: uel ob humidam intemperiem, aqueam, aut siccam, uel uetoris uel ob apostema ortu. idititia percussionis sunt nota: intemperie, humidæ ex tactu cognoscuntur: siccam comitatur febris acuta: apostema sequitur febris atrox: dolor uehemens, & similia. duas curat Rasis differentias: primum nempe humidam: deinde eam quæ contrahitur ab apostemate. Humida est [cum gibbositas fieri recipit &c.] ab apostemate contracta [si autem cum gibbositas incipit: affuerit febris &c.] quo ad primam partem attinet, ea curatione utamur, quam in paralyfim adhibere solemus. syrupi è stocade, è quinque radicibus in his humoribus digerendis plurimum ualent. quo facto ad horum euacuationem accedamus cum pilulis ex hermodactylo, cocchicis aggregatiuis, & id generis aliis. si uerò humiditas illa fuerit frigida: localia admoueamus adstringentia calida, uel calidis admista: primum scilicet illitio fiat ex oleo liliaceo, & mastichino: deinde rutaceo: postea è castorio: hinc ex euphorbio parato. quapropter dicit Rasis [locus quoque ex oleo sambacino &c.] si humiditas fuerit calida: illinatur locus non ex frigidis medicamentis, sed debite calidis stypticis. embrochæ, & fots aquæ calidæ, ut præceptor noster docet, in qua sint decocta mentastrum, samfucus, stachas arabicum, & huiusmodi alia mirifice conferunt: si hæc sequatur inunctio calida adstringens. uictus ratio fit calida, & sicca. itaque [à frigidis cibis est abstinendum] qui partibus affectis nocent. oleum de rasni nullum paratur.

Si autem cum gibbositas incipit affuerit febris: à prædicto regimine omnino abstinendum est. sed apozema ex herbis factum cum cassia fistula in potu est tribuendum. phlebotomia quoque ex basilica facienda est, et emplastra uehementia loco superponenda.

sectio primum fiat uenæ basilicæ uel saltem, si aliquid impedierit, cucurbitulæ apponantur partibus inferioribus.

Io. Marinelli I bus

bus; ut materia diuertatur. manna, calisia, tamarindi, & huiusmodi corrigan tum morbum, tum symptomata. loca lia admoveamus; quale est oleum rosaceum, myrtinū, nenupharinum. emplastra quoque fiant ex rosis, myrto, sandalis, hordei farina, & similibus, & postea ad efficaciam proficiscamur. uictus constitutio sit frigida; qualis ptisana hordei. ubi febris quieuerit; inungatur locus ex oleo chamæmellino, anethino, liliaceo. emplastrum fiat ex mal uauisco, farina fœnugræci, semine lini, adipe anatis, anle ris, & gallinarum. robur addatur spondylibus, pectorif que oisibus cum ligaturis, facculis, ut dicunt, è stupa cane pæcea in albumine oui madefacta paratis. si uerò abscessus ortum trahat ab intemperie frigida; corpus purgetur cum pilulis ex hermodactylo, cocchicis dictis, foetidis, & similibus. emplastro utatur eger, quod habet ammiacum, & laudanum mixum, & in mortario cum pitillo dissolutum: uel emplastro, quod recipit oppopanacum, ammoniacum, bdellium, sagapenum: quæ in uino dissol uantur, & cum adipe auium, & farina lini, & fœnugræci apponatur. illinatur ex oleo spicato, malthichino, costi no, & huiusmodi. iaceat supinè. cibus sit temperatus, uel aliquam habeat facultatem calidam. causæ aliæ remo ueantur contrariis.

De uaricibus. Cap. 12.

Quæ uenæ grossæ, & plenæ, & diuerso modo cur uatæ, & uirides in crure apparuerint; ægritudo, quæ uitis uocatur, adesse significatur. hæc autē ægritudo frequentius accidit his, qui multum pedibus la borare consueuerunt; & qui cibaria choleram nigram ge nerantia frequenter sumunt. in principio itaque curatio nis huius passionis basilicam minuere conuenit, & uen trem ex his, quæ choleram ducunt nigram, soluere: quo rum mentionem fecimus in capitulo de melancholia. hæc autem sæpe facienda sunt, & ab omnibus, quibus melan choliæ patientes custodiuntur, in hac ægritudine absti nendum. postquam uerò hoc regimen diu adhibitum fue rit; ex uenis, quas in crure apparuisse diximus, minutio fiat: à quibus sanguis tandiu fluere dimittatur, donec quicquid in eis est, euacuetur. deinde huiusmodi patiens choleram nigram expellentibus utatur: & ex basilica minuat: & caneat sibi ab omnibus, quæ choleram ge nerant nigram.

Varix est uenæ dilatatio aliquando in temporibus, ali quando in ima uentris parte sub umbilico, nonnunquam etiam circa testiculos, sed maxime in cruribus. notas des cribit Rasis primum; ut [quæ uenæ grossæ, & plenæ &c.] causas colligimus ibi [hæc autem ægritudo frequentius accidit his, qui] hic enim originem trahit plurima parte ex materia melancholica: aliquando autem ex sanguine pituitoso crasso, uel puro, & nō putrido. iis uerò, qui mul tum exercitii sustinent, euenire quoque solet. curatio igitur sit, ut sanguinis misio fiat ex basilica manus, uel sal uatella eiusdem pedis, & iuxta Auic. sententiam eodem, uel sequenti die secetur saphena. præterea concoquatur materia, euacueturque his medicamentis, quæ humores purgant melancholicos, & similes peccantes: de quibus olim actum est. quod sæpe est repetendum; cum materia plerumq; melancholica difficilè curetur. cibos uiter morbum detinentes; quemadmodum sunt carnes bouum, le guminia, pedum labor, & huiusmodi alia: & his utatur æger, qui bonum sanguinem generent; quales sunt pul li, oua, & similia. ad chirurgiam tandem te conseras; de qua uide Hippoc. Paulum, & Actium: & quæ dic ta sunt, repetas.

Hæc passio, postquam mansua fuerit; incurabi lis est. cum autem incipit; si ei subueniatur, & ut debet, medicata fuerit; aut sanatur, aut manet sic nihil addens. cum ergo pedis crassities augeri uideatur, & color obscurari, uenæ quoque, quæ uites uocantur, appa rere cæperint; æger quotidie cogendus est uomere. & cu stodiendus ab ambulatione nimia, & statione: & uenter uomitu præcedente ex pilulis maioribus de hermodacty lis soluendus. de inde ad uomitum redeundum. post illud hoc quoque multoties fieri oportet. æger præterea à cibis crassis est abstinendus, & tibia à calcaneo incipiendo sursum usque ad genu stringenda. ante tamen constri ctionem epithimanda ex oleo, & myrrha, et acatis, et hy pocysthide, & alumine cum aceto forti dissolutis. ex basi lica quoque manus contraria partis minutio facienda est. neque erectus stet nisi pes strictus ligatus fuerit. neque epithima nullo modo dimittat. uomitu quoque frequen ter utatur. quod, si paruum interceperit spatium à præ cedenti uomitu, & appetit quiescere; uapora ipsum cum seminibus caulium, & stercade arabico, cinere de uitis, & lupinis, & nitro, & stercore caprino, & farina fœnu græci: & liniatur etiam ex aqua cineris per spaciū unius diei, aut duorum. ipsa enim huius ægritudinis maximam resoluit partem, aut leniorem reddit.

Elephantia uniuersi corporis cancer est. sic est uoca ta, quod corio elephantis cutis in eo perfimilis uideatur: nam maculis quibusdam ad atrum colorem uergentibus inficitur, inæqualiterque aspera, crassa, & ueluti squam mis fœda, liuens, ferinaque redditur. origo morbi est ex atra bile, quæ ex crasso, & feculento sanguine, aut flaua bile nimium uiti procreatur, aut pituita falsa. qui obno xii futuri sunt huic morbo pestilenti, iis inest segnities, spiratio tarda, spirandi difficultas, motus difficilis, alui restrictio assidua, respiratio grauis, & foetida, ructus, cōtinui, appetitus non obtusus, & alacritas uehemens ad coitum. cumq; pedis, siue alius membri cutis crassa, ut docet ibi Rasis [cum ergo pedis crassities &c.] fuerit: primum malæ crassiores fiunt, & mentum dilatatur, deinde rube scunt non florido, sed liuido colore. capilli capitis, piliq; superciliorum maxima ex parte decidunt. nasus fit finus, aures erosæ, labra crassa, uox rauca, & sub lingua uenulæ uaricosæ fiunt. quanquam uerò præsens malum ferè incu rabile est, im pendensq; difficile: tamen humanum est us que ad experimentum procedere: nam, si facultas omni no huius mali curandi data non fuerit; saltem nobis sat erit prohibere. primum igitur miseri ægrotantis cibus erit panis hordeaceus, aut triticeus recens: ex oleribus la tuca, beta, malua, lapathum, sisarum, ptisana, oua sorbi lia, alica lota, lac cum melle non sunt ingrata. efus carniū hoedorum, gallinarum, caporum, auicularum montana rum, & similibus rectè dantur: item pisces molli carne præditi: item ficus, uux arefactæ, pirum coctum in aqua mulsa. potus sit uinum tenue, album, & aquosum. somnū diuturnum uitet, nocturnumq; completetur. deambu let, aut gestationibus committatur, clamore exercea tur, aut fictionibus, aliisue exercitationum generibus utatur. post longum à coena interstitium deambulatio len ta, ac sensim facta commoda est. uictus ratio deniq; sit ad calidum, & humidum declinans. quapropter ait Rasis [& custodiendus ab ambulatione nimia, & statione] & [æger præterea à cibis est abstinendus] quò ad curatio nem attinet, principio hæc tradit Rasis [æger quotidie cogendus est uomere] quod facile erit, si decoctum rap hani, in quò elleborus niger sit maceratus, exhibebimus. deinde habendus est modus in euacuando: quibus id me dicamentis

dicamentis sit faciendum in capite de melancholia est a-
dum pilulas tamen ex hermodactylo transglutindas præ-
bet Rasis, quo quidem facto uomitus repetatur. præte-
rea epithemate ex oleo, myrrha, acatia, hypocisthede,
alumine, & aceto parato utatur. fomenta quoque ex fuma-
ria, origano, scabiosa, chamæmelo, meliloto, & simili-
bus non inutilia fortasse erunt; uerum sunt commoda, &
arida maxime, si post sufficientem ex horum usu exudatio-
nem nationes in mari, aut sulphurentis & purulen-
tis aquis fient: uel potius decocto aliquo eorum, quæ ad-
stringunt; plantaginis nempe, aut betæ, aut helixines per-
fundantur. post hæc [& tibia à calcaneo incipiendo sur-
sum usque ad genu stringenda] si morbus crura affligat.
[ex bacilla quoque manus contrariæ partis minutio faci-
enda est] sed in principio curationis tradunt quidam,
& inter morbi initia & magis uere, in quo potissimum
hoc malum nascitur, & intenditur: reuiuiscit enim ali-
quo modo infusus calor, & sensibilibus corpus ipsum alle-
uatur. auferendum uerò sanguinem uolunt, si malum al-
teram partem occupat; ex altero gibbero: si utranque;
ex utroque: ac incidenda interna, aut media, quæ in gib-
beris existit uena. post sanguinis detractionem nouem,
decemue diebus interpositis aluum inferne subducendam
arbitrantur. [neque erectus stet, nisi pes strictus ligatus
fuerit] & illinatur ex oleo masticino, myrrino, ablinchi-
no: uel [neque epithima nullo modo dimittat] corrobor-
rant quidem, ac uires refocillant, atque materiæ fluxum
reprimunt. cumque omnino conandum sit, ut omnem
corporis habitum ab hoc malo occupatū liquefaciamus;
per interualla opportunè purgationes adhibeantur, & ci-
bi apponatur, qui facile concoqui, & distribui possint:
deinceps [uomitu frequenter utatur] isque à cibo, aut
ieiunius à radiculis. postea ad elleborum perueni. hinc ui-
rium refocillatrice uictus ratione utare, ac medicamen-
tis, quæ summam cutem desiccant, adstringantque; qua-
le est illud à Rasi ibi descriptum, quod recipit semen cau-
lium, stoechadis arabici, cineris uitis, lupini, nitri, ster-
coris caprini, farinæ foenugraci quod sufficiat: exter-
gunt quidem, ac repurgant. mirabile tandem est elephā-
tiz remedium uiperarum efus: qua de re lege Gal. lib.
11. ad Glauconem cap. penultimo.

De ulceratione renum, quæ exterius
fit in cute. Cap. 14.

Qum aliquis longo tempore supinus super dor-
sum iacet, loca renum plurimumque rubent, &
mala ibi sunt ulcera: cum ergo loca ista rubere
cum augmento uisa fuerint; milium, siue panicum, aut fo-
lia falicis sub eo sternenda sunt: & ipse in die est multoties
eleuandus, loca quoque, quæ rubent aqua rosata super niuè
infrigidata roranda sunt, et stibellanda ipsa. quod, si calor
perseuerauerit; imponatur epithima de alubram, quod in
cap. de apostematibus nominauimus. & si uescicæ, & ulce-
ra ibi exorta fuerint; ex unguento de cerussa curentur.

Curat nunc Rasis renum affectus, qui exterius nos affli-
gunt. itaque primum qui impendit morbus, eum prohibet
ibi [cum ergo loca ista rubere cum augmento uisa fue-
rint] deinde ad illius, qui adest, curationem descendit; cū
inquit [& si uescicæ, & ulcera ibi exorta fuerint] causæ
sunt [quum aliquis longo tempore supinus super dorsum
iacet, &c.] & humor biliosus, & falsus, propter quem ul-
cera in renes peruenire solent. signa sunt tum per se mani-
festa, tum rubor, pruritus, punctio, ardor ea declarant. no-
tatur etiam pauca sanies, si ulcus præfens consistat, furfu-
res, & quædam antecesserunt pustulæ, & nonnunquam
grauis dolor. curationis igitur scopus erit adhibere ea,
quæ leniāt, medicamēta. uictus ratio frigida sit, & humida;
quales sunt carnes, olera, fructus, & huiusmodi, quæ opi-
mè cōcoqui possint. sectio fiat quoque uenæ basilicæ: quod

summo pere commendat Auicenna. & si opus fuerit; ap-
ponantur cucurbitulæ. post hæc corpus est purgandum cū
lenibus ut manna, casia, & id generis alia. ciere quidem
uomitum non est inutile, quod tamen sine molestia fiat.
hinc & quæ iubet Rasis, perficienda sunt. & si ulcus exor-
tum fuerit; post abstersionem ad cicatricem duces.

De dolore, qui fit in membris
manifestis. Cap. 15

Qum dolor in manu, aut in pede fit; æger iterrogā-
dus est, si ex percussione hoc ei accidit: aut, si super
ipsam diu iacuit: aut si cōtingit ex causa intrinse-
ca. Si autem ab exteriori causa non contingerit; locus do-
lens considerandus est, an sit magis rubens, quàm reliquū
corpus, aut non: si enim toto corpore rubicundior fuerit;
& ex calidi apostematibus medicamine curandus erit. & si mē-
brum neque fuerit calidum, neque rubens, sed iam quoti-
die obfuscatur, & siccatur; aqua calida ab alto super ip-
sum distillanda est, & ex oleo, & cera resoluta inungē-
dus, & dimittendus sic, donec dolor sedetur. quod, si locus
crassior uideatur, & tactu etiam frigidior sentiat; fre-
quenter erit fricandus, & aqua calida, in qua samplicus,
& chamæmilla, & staccas arabicum cocta fuerint ab alto
ut diximus, super ipsum erit distillanda, & ex oleo cheiri-
citrino inungendus. regimen quoque subtiliandum erit. ip-
se uerò utatur exercitio, & in balneo sudet. si autem ista
non suffecerint; uenter ex his soluitur, quæ humiditates
educunt. membrum præterea, si tactu sentitur frigidum;
fricetur prius, et deinde inungatur ex oleo coslino, et sam-
bacino, et oleo de been tepidis, et his similibus. quod, si ista
non suffecerint; ex unguentis, quæ in capitulo de paralyse
nominauimus; inungendus erit, donec sanetur.

Membra, quæ extrema dicuntur, dolore affecta curat
nunc Rasis. huius mali causa duplex est descripta: uel [æger
interrogandus est, si ex percussione hoc ei accidit, aut] id
quod propter uulnera, fracturas, contusiones, luxationes
ulcera, & id generis extrinseca alia euenire confirmat.
uel [si ab exteriori causa non contingerit] quod fit à san-
guine bono, & crassitie mediocri, qui in particulam illam
uniuersim influit, atque propter copiam impactus inheret.
intrinsicæ affectionis origo uel contrahitur à caliditate;
qualis est eam, quam diximus; uel ab alia intemperie, de
qua suo loco agemus. notæ indicant causas. igitur, si causa
aliqua fuerit extrinseca; dolorem sedabimus cum his, quæ
leniendi, atque causam remouendi facultatem habet: ac
si corporis totius plenitudo fuerit; humores sistemus cum
his, quæ diuertunt, concoquunt, euacuantque, medicamen-
tis. ubi uerò malum intrinsicus oriatur, cuius inditium
præter ea, quæ dicta sunt, est dolor uehemens, qui urget, ni-
si eiusmodi sit, qui sensum omnino difficilem habuerit:
pulsus in profundo molestus accidit, tendique prorsus, ac
frangi particula apparet, & uehementem calorem persen-
tit, ut quasi cōburi uideat: unde refrigerari desiderat. qua
propter principio totum corpus euacuare oportet: præfer-
tim ubi sanguine plenum hoc fuerit, & uis laborantis uali-
da, tēpusque anni, regio, ætas, & id genus alia nō impedi-
rint. itaque, si in parte aliqua inferiore morbus cōsisterit; tūc
icidere oportet in gibbero uenā aut interiorem, aut mediā:
nisi alterum puta crus malis scarificare, aut in eo uenam
pertundere. si aliqua pars superior patitur; per interiora
sanguis est educendus: semper enim fluxionis motum ad
contrarium trahere expedit. post uenæ sectionem mem-
brum laborantem perfundere, ac illinere oportet medica-
minibus, quæ id, quod influit, repellere sint idonea: &
quod iam in malè affectam partem se recepit, uacuare
queant: quæque robur iis, quæ laborant, partibus addant:
Io. Marinelli i 2 & ca

& ea tandem, quæ ad phlegmonis curationem pertinent, omnia admovebimus. præterea [si membrum neque fuerit calidum, neque rubeum; sed iam quotidie offuscatur, & siccatur; &c.] de affectibus frigidis, & quodam modo sic cis agit Rasis: cuius curatio ea sit, quam ad paralytim. sanādam adhiberi solemus. primum uerò lenis quidem, & frequens sit frictio: lenis, ne materia ad locum malè affectum defluat: frequens uerò, ut calor reuiuiscat. deinde dolorē sedabimus, siccamque intemperiem corrigemus cum embrocis, & inunctionibus ex oleo & cera factis, quæ, si non

suffecerint; fomenta parata, quæ doloris mitigandi uim habent, materiæ dissoluendæ, & membri corroborandi: atque illinitiones fiant. interim uictus ratio calida existat, & sicca: quod facile cognoscitur ex his [ipse uerò utatur exercitio, & in balneo sudet] hæc ubi non contulerint; corpus plenum euacuetur. quod nisi fiat erit; medicamenta, quæ calefaciunt, siccant, & resoluunt, plurimum ualent: huiusmodi quidem sunt inunctiones ex oleo costino, sambacino, & aliis similibus factæ. quæ demum si nihil profecerint: ad ueram paralytim curandam est accedendum.

FINIS.

REGISTRVM.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ

a b c d e f g h i Terna omnia præter i diuenum

Tabulæ registrum per se pater.

IOANNIS HERCVLANI

DE AVICENNAE QUANTO CRODINI
CONCERNANT.

In quo de solo dicitur.

FRANCIA, ACADEMIA VITAE IMPERIALIS.

PARISIIS, MDCCLXXV.

PER BENEDICTUM DE LAMBERG, ACADEMIAE SECRETARIUM.



FRANCIA
Ecole de Médecine

1775

